





NAZIONALE

B. Prov.

BIBLIOTECA

XVI

51

NAPOLI

VITT. EM. III

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XXXX



6

Palchetto

Num.° d'ordine 32

B. Prov.
XVI
51

ENCYCLOPÉDIE METHODIQUE,

OU

PAR ORDRE DE MATIERES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;

*Précédée d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout
l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT,
premiers Éditeurs de l'Encyclopédie.*

THE

OF

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

16226

ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

BOTANIQUE,

PAR M. LAMARCK, de l'Institut national de France ;

*CONTINUÉE par J. L. M. POIRET, Professeur d'Histoire naturelle, de
plusieurs Sociétés savantes et littéraires.*

TOME SEPTIÈME.



A PARIS,

Chez H. AGASSE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, n°. 6.

M. DCCCVI.





SCLÉRIE. *Scleria*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs monoïques, de la famille des fouchets, qui a des rapports avec les *carex*, &c qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont disposées en épis ou en panicules; les fleurs mâles réunies avec les fleurs femelles dans la même panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques; dans les fleurs mâles, une balle de deux à six valves, renfermant une ou deux fleurs & plus; dans les femelles, une balle de deux à quatre valves, uniflore.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

* Les fleurs mâles sont solitaires ou quelquefois androgynes.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Une *balle calicinale* de deux à six valves, à une, deux ou plusieurs fleurs; les valves persistantes, ovales, concaves, en carène, aiguës, sans arête.

2°. Une *balle interne*, tenant lieu de corolle, composée de plusieurs valves oblongues, muriquées, plus longues & plus étroites que les valves calicinales, séparant les étamines.

3°. D'une à trois *étamines*, placées sous chacune des valves internes, terminées par des anthères linéaires.

* Les fleurs femelles solitaires, axillaires, terminales, ou placées entre les valves calicinales des fleurs mâles.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Une *balle calicinale* de deux à quatre valves uniflores; les valves ovales, concaves, en carène, sans arête, persistantes.

2°. Point de *balle intérieure*.

3°. Un *ovaire* presque rond, rétréci à sa base, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des valves, entier ou trisé, terminé par des stigmates capillaires & réfléchis en dehors.

Les *semences* sont globuleuses ou oblongues, luisantes, colorées, souvent très-blanches, dont l'enveloppe est dure, coriace, presque officieuse; entourées à leur base par la balle calicinale, persistante.

Observations. Ce genre, assez voisin des *carex*, en diffère par plusieurs caractères très-saillans, par leurs valves calicinales, ordinairement plus nombreuses.

breuses; par leurs semences globuleuses ou un peu oblongues, luisantes, point enveloppées, comme celles des *carex*, par une sorte d'urcéole agrandi, mais soudées à leur base par les deux valves intérieures, persistantes. Ces semences ont beaucoup de rapports avec celles des *alyra*; mais ce dernier genre appartient à la famille des graminées, tandis que les *scleria* se rapportent à celle des fouchets; ce que l'on reconnoît aisément à la gaine de leurs feuilles entières, point fendues longitudinalement, comme celles des graminées, outre les caractères de la fructification.

ESPÈCES.

1. *SCLÉRIÉ flagelliforme.* *Scleria flagellum*. Swartz.

Scleria culmo triquetra, scandente, scaberrima; foliis trifariam retrorsum aculeatis, floribus paniculatis, rachis villosa. Swartz, Prodr. pag. 18. — Id. Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 88.

Scleria (flagellum Nigrorum), culmo articulato, scabra; pedunculis axillaribus, paniculatis; floribus pedicellatis. Berg. Atl. Holmiz. 1765. pag. 144. tab. 4.

Scleria margaritifera. Gärtn. de Frukt. & Sem. vol. 1. pag. 13. tab. 2. fig. 7.

Carex (lithosperma), spicis paniculatis, masculis; floribus femineis, solitariis; seminibus globosis, nitidis. Linn. Syll. Plant. vol. 4. pag. 115. n°. 40.

Schanus (lithospermus), culmo triquetra, foliis paniculatis villosis, seminibus globosis, nitidis; foliis trifariam aculeatis. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 65.

Schanus secans. Amoenit. Acad. vol. 5. pag. 391. — Syll. Natur. vol. 2. pag. 865.

Scirpus lithospermus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 51.

Cyperus maximus, americanus, lithospermi semine. Morif. Oxon. Hist. 3. p. 237. §. 8. tab. 11. fig. 16. Mala.

Arundo (farcta), tenuis, altissimè scandens. Aubl. Guian. pag. 52. ?

Gramen cyperoides, filvaticum, maximum, geniculatum, asperius, semine nitidissimis. Sloan. Jan. 36. Hist. 1. pag. 118. tab. 77. fig. 1.

Carex amboinica. Rumph. Amboin. 6. pag. 20.

Caden-pulla. Rheed. Malabar. vol. 12. pag. 89. tab. 48.

On distingue cette espèce à ses tiges grimpantes, & qui s'élèvent autour des arbres, auxquelles elles s'accrochent à la hauteur de soixante ou quatre-vingt pieds : toutes ses parties sont hérissées de petits aiguillons recourbés & accrochans.

Ses tiges sont souples, triangulaires, très-hautes, grimpantes, striées, hérissées de poils très-fins, & armées, sur leurs angles, de petits aiguillons recourbés. Les feuilles sont longues d'un pied, linéaires, vaginales à leur base, striées, en carène, glabres à leur face supérieure, hispides en dessous, chargées, à leurs bords & sur leur carène, d'aiguillons courts, recourbés ; leurs gaines sont courtes, roides, pileuses à leur orifice.

Les fleurs sont disposées en épis ou panicules axillaires, dont les pédoncules sont comprimés, chargés d'aiguillons, & sortent de la gaine des feuilles ; leurs ramifications simples, étalées, légèrement velues, munies à leur base de bractées ou feuilles florales stériles, plus courtes aux ramifications supérieures ; les pédoncules propres alternes, environnés d'une petite gaine à leur base ; les fleurs mâles mélangées avec les femelles. Les premières ont une balle à six valves calicinales, aiguës ; les supérieures plus grandes, comprimées à leur sommet ; plusieurs autres valves ou écailles internes, membraneuses, lancéolées, sous chacune desquelles se trouvent ordinairement trois étamines, dont les filamens sont stériles, de la longueur des écailles, supportant des anthères linéaires, jaunâtres. La balle des fleurs femelles est à quatre ou six valves unifoires, aiguës, en carène ; les intérieures plus courtes ; elles environnent un ovaire oblong, à trois faces, surmonté d'un style filiforme, de la longueur du calice, terminé par un stigmate simple, aigu. Le fruit est une petite semence globuleuse, variée de blanc & de brun, tuberculée à son sommet.

Cette plante croît à la Jamaïque, à Surinam, parmi les buissons & les arbres des grandes forêts. M. Ledru l'a aussi recueillie à Porto-Ricco, & a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

Observations. Je soupçonne que c'est de cette plante dont parle Aublet, sous le nom d'*urandá furda* (liane coupante), & qu'il apprit, dit-il, à connaître, parce que, s'étant égaré le soir dans une forêt d'Aroura, elle lui coupa ses habits & ses bottes.

2. SCLÉRIE à larges feuilles. *Scleria latifolia*. Swartz.

Scleria culmo triquetra, foliis, erectis, levis ; foliis lato-lanceolatis, nervosis ; floribus paniculatis. Swartz, Prodr. pag. 19. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 95. — Lam. Illustr. Gen. tab. 752.

Cette plante s'élève à la hauteur de huit à dix pieds. Ses tiges sont simples, feuillées, lisses, à trois angles, légèrement striées, garnies de feuilles longues d'un à deux pieds, larges d'un pouce & demi à deux pouces, lancéolées, plissées, nerveuses, roides, striées, parfaitement lisses ; leur gaine est terminée en avant par une petite saillie mucronée.

Les fleurs sont disposées en une panicule assez ample, terminale, sortant de l'aisselle des feuilles supérieures, droite, roide, rameuse ; les rameaux alternes, presque simples ; les fleurs mâles, mêlées avec les femelles, toutes presque stériles, munies chacune, à leur base, d'une petite foliole stérile. Les fleurs mâles, peu nombreuses & terminales, ont une balle calicinale, composée de trois à quatre valves glabres, ovales, aiguës, carénées, persistantes, à deux ou trois fleurs ; les valves intérieures, qui tiennent lieu de corolle, sont plus petites, plus étroites ; elles renferment trois étamines fort menues.

Les fleurs femelles sont très-nombreuses, inférieures ; leur balle composée de quatre valves unifoires ; les deux valves extérieures lancéolées ; les deux intérieures larges, ovales, acuminées, persistantes. L'ovaire est arrondi ; le style trifide à son sommet, persistant ; les stigmates réfléchis, velus & blanchâtres. Les semences sont dures, presque osseuses, globuleuses, très-blanches & luisantes.

Cette plante croît sur les montagnes arides, dans les forêts, à la Jamaïque. (V. f. in herb. Lam.)

3. SCLÉRIE non épineuse. *Scleria mitis*. Berg.

Scleria culmo triquetra, scandente, foliis levibus ; floribus paniculatis, rachi glabra. Berg. Act. Holm. 1765. pag. 145. tab. 5. — Swartz, Prodr. pag. 18, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 90.

Ses tiges sont droites, triangulaires, grimpantes, hautes de deux à quatre pieds, point articulées, glabres, très-lisses sur leurs angles ; garnies de feuilles linéaires-lancéolées, médiocrement élargies, un peu carénées, striées, glabres à leurs deux faces, un peu pâles en dessous ; leurs gaines sont longues, glabres, serrées, un peu rudes sur leurs angles lorsqu'on les passe entre les doigts.

Les fleurs forment une panicule serrée, allongée, qui sort de la gaine des feuilles supérieures, composée de rameaux simples, alternes, glabres, triangulaires ; les épillets sont très-petits, légèrement pédicellés. La balle des fleurs mâles ressemble à celle du *Scleria flagellum*, mais les valves sont un peu plus ovales ; elles renferment chacune trois étamines. Les fleurs femelles ont leur balle unifoire, dont les valves intérieures sont plus grandes que les extérieures. Les semences sont globuleuses, d'un blanc de neige, tuberculées & noisettes à

leur sommet, environnées à leur base d'une petite membrane ciliée.

Cette espèce croît à la Jamaïque, à Surinam, à Porto-Ricco, où elle a été observée par M. Lodu, qui m'en a communiqué un exemplaire.

4. SCLÉRIE mucronée. *Scleria mucronata*.

Scleria caule triquetra, aspero; foliis ensiformibus, subulbris; vaginis asperis, paniculis axillariis, elongatis; seminibus glandiformibus, mucronatis. (N.)

Ses tiges sont droites, triangulaires, rudes sur leurs angles, feuillées dans toute leur longueur, assez élevées, striées, garnies de feuilles alternes, ensiformes, d'un vert un peu glauque, roides, longues, très-aiguës à leur sommet, larges d'environ un demi-pouce, striées, un peu rudes à leurs bords, embrassant les tiges par une longue gaine triangulaire, entière, rude & comme chagrinée sur toute sa surface.

Les fleurs sont disposées en panicules droites, un peu serrées, médiocrement rameuses, sortant au nombre de deux ou trois de l'aisselle des feuilles supérieures, & dont l'ensemble forme une panicule générale, droite, serrée, longue presque d'un pied, dont les ramifications sont inégales, assez courtes, rudes, triangulaires; les fleurs nombreuses, sessiles, foliaires, éparées ou réunies par petits paquets; les écailles calicinales d'un brun-cendré. Je n'y ai point vu de fleurs mâles. Les fleurs femelles sont très-nombreuses; les semences ovales, luisantes, blanches, lavées de noir, surmontées à leur sommet d'une petite pointe droite, & dont la base est environnée par la balle calicinale persistante, tronquée, en forme de cupule; ce qui donne à ces semences l'aspect d'un petit gland.

J'ignore le lieu natal de cette plante, que je soupçonne originaire des Indes. (V. f. in herb. Lam.)

5. SCLÉRIE de Ceilan. *Scleria zeylanica*.

Scleria culmo debili, subaspero; foliis linearibus, acutis, glabris; paniculis caudatis, alternis, axillariis, longis bracteatis; semine globoso, apice tuberculato. (N.)

Ses tiges sont droites, simples, hautes d'environ quatre à cinq pieds, foibles, triangulaires, un peu rudes, particulièrement sur leurs angles; garnies de feuilles alternes, rudes à leurs bords, assez larges, linéaires, très-aiguës, striées. Les gaines sont triangulaires, & la base des feuilles supérieures est presque décurrence, & forme une sorte d'aile sur les deux angles opposés des tiges.

De l'aisselle des feuilles sortent des panicules de fleurs droites, peu étalées, plusieurs fois ramifiées: ces fleurs sont, les unes sessiles, d'autres

pédunculées. Ces dernières, ordinairement à la partie supérieure des rameaux, m'ont paru être des fleurs mâles; elles sont assez nombreuses, réunies sur des épillets fort petits, un peu roufflets, aigus; foliaires ou réunies deux à trois; la base des ramifications munie d'une bractée sétacée, très-fine, une fois plus longue que les épillets, & une autre à chaque épillet, à peine de la longueur des valves; celles-ci sont glabres, étroites, un peu aigües, à trois étamines; les filaments courts, les anthères aigües, formant une sorte de houppe après leur épanouissement. Les fleurs femelles sont axillaires, pourvues d'un ovaire trigone, d'un style, & de trois stigmates allongés, pubescens; il leur succède des semences globuleuses, très-blanches, lisses, luisantes, unies à leur sommet d'un petit tubercule en forme de mamelon.

Cette plante croît à l'île de Ceilan; elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Sonnerat. (V. f. in herb. Lam.) M. du Petit-Thouars a également recueilli cette plante à l'île de Madagascar.

6. SCLÉRIE à semences réticulaires. *Scleria reticularis*. Mich.

Scleria foliis glaberrimis, levibus, angustis; floribus subpaniculatis, lateralibus terminalibusque; seminibus reticulatis. (N.)

Scleria erecta, glaberrima levissimaque, fasciculis lateralibus & terminali remotissimis, subsessilibus, subramosis, paucifloris; semine globoso, reticulato, foveolis compresso. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 167.

Ses tiges sont droites, glabres, très-lisses, grêles, à trois angles tranchans, simples, hautes d'un à deux pieds, garnies de feuilles alternes, étroites, graminiformes, assez longues, aiguës, striées, très-glabres, point rudes, munies d'une longue gaine lisse, finement striée, tronquée à la partie antérieure de son orifice.

Les fleurs sont latérales & terminales, disposées en petites panicules courtes, axillaires, distantes, pédunculées ou presque sessiles, médiocrement rameuses; les épillets pédicellés, fort petits, étroits, presque subulés, pauciflores, de couleur roufflette, munis à leur base d'une bractée sétacée, très-fine, une fois plus longue que l'épillet. Les valves sont étroites, aigües; les semences globuleuses, réticulées, & marquées de petites foveolles.

Cette plante croît à la Caroline; elle y a été recueillie par M. Boë, qui m'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

7. SCLÉRIE filiforme. *Scleria filiformis*. Swartz.

Scleria culmo simplici, filiformi, levi; foliis subulatis, spica simpliciusculis, fasciculis folioliformi,

subj. his, glabris. Swartz, Prodr. pag. 19, & Flor. Ind. occid. pag. 91.

Cette plante croit en gazon. Ses tiges sont droites, simples, filiformes, hautes d'un à deux pieds, glabres, à trois angles tranchants, garnies de feuilles alternes, sessiles ou dépourvues de gaine, linéaires, relevées en carène, aiguës, glabres, hispides à leurs bords.

Les fleurs sont monoïques, disposées en épis simples, terminaux, au nombre de deux à quatre, alternes, composés de trois ou six épillets sessiles, rapprochés, munis à leur base d'une petite foliole capillaire, & sous les valves de quelques écailles fort petites. Les fleurs mâles sont mêlées avec les femelles. Les premières ont une balle à quatre valves, les extérieures plus petites, aiguës, serrées, souvent purpurines à leur sommet; plusieurs écailles intérieures linéaires, fort petites, blanchâtres, imbriquées, aiguës, renant lieu de corolle, sous chacune desquelles est une seule étamine. Les fleurs femelles sont solitaires, placées entre les écailles calicinales des fleurs mâles. L'ovaire est arrondi, blanchâtre; le style filiforme, de la longueur des valves, tridacte à sa partie supérieure; les stigmates capillaires, réfléchis; les semences obscures, oblongues, un peu trigones & blanches.

Cette plante croît à la Jamaïque. (*Descript. ex Swartz.*)

8. SCLÉRIE à feuilles sétacées. *Scleria setacea.*

Scleria culmo foliisque setaceis, glaberrimis; spicis axillaribus, minimis, longè pedunculatis; spiculis angustis, paucicellatis seu subsessilibus. (N.)

Ses racines sont courtes, fibreuses, fasciculées: il s'en élève des tiges nombreuses, réunies en gazon, hautes de huit à dix pouces & plus, très-grêles, fines, sétacées, triangulaires, glabres, lisses, très-simples, garnies de feuilles alternes, vaginales à leur base, glabres, assez semblables aux tiges, mais un peu plus larges, légèrement fléchies, dont les gaines sont longues, très-étroites, tronquées à leur partie antérieure, fort lisses.

De l'orifice de chaque gaine, même à part de celles du bas, il sort un pédoncule droit, très-fin, long d'un pouce & plus, terminé par deux, trois, à peine quatre épillets pédicellés, quelquefois un ou deux sessiles, petits, étroits, ovales-oblongs, aiguës, d'un roux-clair, munis de petites bractées courtes, sétacées, à peu près de la longueur de l'épillet.

Cette plante croît dans l'Amérique; elle a été recueillie par M. Ledru à Porto-Ricco. (*V. f. in herb. Lam.*)

9. SCLÉRIE à fleurs difflantes. *Scleria difflans.*

Scleria culmo triquetro, debili, glaberrimo, levi; foliis angustissimis, levibus; floribus spicatis, terminalibus; spiculis paucifloris, hirsutis; bracteis ciliatis. (N.)

Cette plante, par la disposition de ses fleurs en un épi grêle, interrompu, me paroît très-différente du *Scleria ciliata* de Michx.; elle ne peut pas convenir davantage au *Scleria interrupta* du même auteur, cette dernière espèce étant pubescente, & ses fleurs dépourvues de bractées; mais elle a beaucoup de rapports avec ces deux plantes.

Ses tiges sont droites, foibles, hautes de deux ou trois pieds, très-glabres, anguleuses, lisses sur leurs trois angles, feuillées dans toute leur longueur. Les feuilles sont alternes, longues, étroites, glabres, lisses, striées, subulées; leur gaine est étroite, tronquée à sa partie antérieure. Les fleurs forment un épi terminal, grêle, allongé, composé d'épillets assez petits, alternes, distans, sessiles, solitaires, renfermant trois à quatre fleurs, garnies à leur base de bractées filiformes, de la longueur des fleurs, fortement ciliées, presque en aile. Les valves sont étroites, oblongues, aiguës, un peu hérissées & ciliées vers leur sommet.

Cette plante a été recueillie par M. Ledru dans les savannes marécageuses à Porto-Ricco; il a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (*V. f.*)

10. SCLÉRIE interrompue. *Scleria interrupta*, Michx.

Scleria parvula, caeta pubens, spica à glomeratis distinde alternis, sessilibus, ebracteatis, paucifloris, hispida. Michx., Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 168.

Cette espèce diffère de notre *Scleria difflans* par ses fleurs dépourvues de bractées, & par le duvet léger qui recouvre toutes les parties. C'est d'ailleurs une fort petite plante, dont les tiges sont grêles, droites, triangulaires, les feuilles étroites & pubescentes. Ses fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un épi composé de petits paquets alternes, distans les uns des autres, sessiles; les épillets sont peu nombreux, privés de bractées; les valves sont hérissées de poils roides & courts.

Cette plante croît dans les prés humides, depuis la Caroline jusque dans la Floride. M. Richard l'a également observée dans la Guiane française. (*Descript. ex Michx.*)

11. SCLÉRIE à gaines purpurines. *Scleria purpurea.*

Scleria culmo triquetro, subaspero; foliis longissimis, angustis, subglabris; vaginis purpureis, spicis brevibus, axillaribus terminalibusque. (N.)

Ses tiges sont longues, grêles, triangulaires,

hautes d'un à deux pieds, simples, à angles très-faillans & un peu rudes, garnis de feuilles alternes, vaginales, très-étroites, longues, subulées, striées, presque glabres, d'un vert-pâle, embrassant les tiges par une gaine entière, allongée, rude sur les angles, de couleur rougeâtre ou pourpre.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles supérieures & à l'extrémité des tiges, en petits épis courts, presque solitaires, peu garnis, presque simples, droits, longs d'un à deux pouces; les épillets sessiles, alternes, presque uniflores, dont les valves sont très-aiguës, rouscâtres; munis à leur base d'une bractée très-fine, sétacée, souvent au moins une fois plus longue que l'épillet. Les semences sont blanches, luisantes, petites, globuleuses, plus courtes que les balles calicinales, qui persistent avec elles. Je n'ai point observé les fleurs mâles.

Cette plante croît en Amérique, à l'île Saint-Thomas. (V. f. in herb. Lam.)

12. SCLÈRE oliganthe. *Scleria oligantha*. Mich.

Scleria glabra, culmo triquetro, levi; foliis angustissimis, asperis; pedunculis lateralibus setaceis, subulatis, subunifloris; floribus terminalibus paucifloris. (N.)

Scleria gracilis, debilis, glabra; culmo angulis acutissimis, levibus; foliis angustissimis, asperis; pedunculis lateralibus foliis duobus, inter se distinctis, setaceis, subunifloris; floribus terminalibus paucifloris, à se invicem distinctis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 167.

Cette espèce a des tiges droites, foibles, grêles, hautes d'environ un pied ou un pied & demi, simples, à trois angles faillans, très-aigus, très-faibles; garnies de feuilles alternes, fort étroites, striées, aiguës, très longues, rudes tant à leurs bords que sur leur carène, vaginales à leur base.

Les fleurs sont séparées, terminales, en très-petit nombre, supportées par des pédoncules latéraux, souvent au nombre de deux, au même point d'insertion, simples, sétacées, presque uniflores. Ses semences sont blanches, luisantes, petites & globuleuses.

Cette plante croît au milieu des forêts, dans les prairies, à la Caroline. (V. f.)

13. SCLÈRE hirsutée. *Scleria hirtella*. Swartz.

Scleria culma simpliciter, filiformi, pubescente; foliis linearibus; spica simpliciter, hirtella. Swartz, Prodr. pag. 19, & Flor. Ind. occid. vol. 1. p. 93.

Scleria gracilis, angustifolia; foliis bracteisque hirsutis; fasciculo terminali paucifloro. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 168.

Cette plante s'élève à peine à la hauteur d'un

pied; les racines sont petites, noirâtres, filiformes; ses tiges très-faibles, droites, filiformes, striées, à trois faces, lâches, pubescentes, garnies de feuilles alternes, distantes, linéaires, très-étroites, hirsutées, légèrement carénées.

Les fleurs sont réunies en un épi simple, terminal, composé de trois ou quatre épillets ferrés, sessiles, alternes, très-rapprochés, hérissés de poils courts, munis à leur base de feuilles florales velues, subulées, un peu plus longues que les épillets. Les fleurs mâles ont une balle de deux à quatre valves, à deux fleurs lancéolées, aiguës, garnies à leurs bords de cils d'un brun-noirâtre, de plus une ou deux valves intérieures plus minces, plus petites. Les filaments sont solitaires; les anthères linéaires, d'un jaune-pâle. Les fleurs femelles sont solitaires, réunies dans les mêmes épis avec les fleurs mâles; leur calice est à deux valves uniflores, lancéolées, élargies, ciliées; le style est à deux ou trois divisions, les stigmates velus & réfléchis; les semences blanches, globuleuses, luisantes, très-dures.

Cette plante croît dans les forêts, sur les montagnes, à la Jamaïque. (Descript. ex Swartz.)

14. SCLÈRE ciliée. *Scleria ciliata*. Mich.

Scleria culma erecto, foliis angustissimis, subulatis; fasciculo terminali solitario, paucifloro; bracteis ciliatis; seminibus scabrisculis. (N.)

Scleria glabriuscula, striata erecta; foliis angustissimis, longissimis, parum minutissime ciliatis; fasciculo unico terminali, fusca, pauciflora; bracteis bracteolisque ciliatis; semine globoso, scaberrima. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 167.

Quoique cette plante ait les bractées fortement ciliées, la disposition de ses fleurs en un seul paquet & non en un épi interrompu, empêche de la confondre avec notre *Scleria distans*.

Ses tiges sont roides, droites, triangulaires, très-glabres, lisses sur leurs angles, garnies de feuilles alternes, fort longues, très-étroites, glabres, à peine munies en partie de quelques cils très-fins & rares. Ses fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en un seul paquet, de couleur brune, composé d'épillets peu nombreux, dont les bractées, tant celles qui sont à la base du fascicule, que celles de chaque épillet, sont garnies de cils à leurs bords. Les semences sont globuleuses, un peu rudes.

Cette plante a été découverte par Michaux, dans la Caroline.

15. SCLÈRE à trois paquets. *Scleria triglomerata*. Mich.

Scleria glabra, angustifolia; culmo acutissimè triquetro, angulis asperis; fasciculo terminali, subtri-

glomerato; *glomerulis sessilibus*, *alternis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 168.

Cette plante a des tiges glabres, triangulaires, droites, simples, feuillées; les angles sont tranchans, très-aigus, chargés d'aspérités. Les feuilles alternes, glabres, fort étroites, aiguës; les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en un fascicule divisé en trois paquets peu distans, sessiles, alternes.

Cette espèce a été découverte par Michaux, dans la Caroline.

16. SCLÈRIE à trois ailes. *Scleria triolata*.

Scleria culmo triquetra, vaginis suberiatatis involuta; foliis ensiformibus, asperis; panicula elongata; bracteis setaceis; seminibus parvis, obtusis. (N.)

Cette espèce a quelques rapports avec le *Scleria mucronata*; mais ses semences ne sont point mucronées, & les gaines des feuilles ont leurs angles ailés, d'une manière très-remarquable.

Les tiges sont triangulaires, hautes de trois à quatre pieds, revêtues dans presque toute leur longueur par les gaines des feuilles. Celles-ci sont presque ensiformes, longues d'environ un pied, sur huit à dix pouces de large, membranées, nerveuses, un peu rudes à leurs bords & sur leur principale nervure, quelquefois un peu pubescentes, très-rapprochées à la partie inférieure des tiges; leurs gaines sont un peu lâches, striées, ailées, particulièrement sur deux de leurs angles, quelquefois légèrement purpurines.

Les fleurs sont disposées en panicules axillaires, plus longues que les entre-nœuds, droites, un peu rapprochées; leurs rameaux courts, rougeâtres, médiocrement ramifiés, munis de bractées sétacées. Les épillets sont petits, oblongs, obtus, d'un blanc-pâle, cendré; les fleurs mâles ont environ une ligne & demie de longueur; leurs écailles inférieures très-serrées, les supérieures lâches; les fleurs femelles, semblables aux mâles, renferment un style triadé, & produisent des semences assez petites, blanches, luisantes, ovales, longues d'environ une ligne, très-obscures à leur sommet.

Cette espèce a été recueillie à l'île de Madagascar par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

17. SCLÈRIE à grappes. *Scleria racemosa*.

Scleria culmo triquetra, acutangula; foliis ensiformibus, setosis, vaginâ lobo obtuso antice productâ; racemis axillaribus; seminibus magnis, subglobosis. (N.)

Espèce distinguée de ses congénères par ses fleurs disposées en grappes courtes, axillaires; par ses semences de la grosseur d'un petit pois, presque globuleuses.

Ses tiges sont hautes de deux pieds & plus, roides, dures, triangulaires; les angles sont faillans. Les feuilles sont alternes, ensiformes, longues d'environ un pied, larges d'un demi-pouce, fermes, striées, rudes à leurs bords; leur gaine triangulaire, presque glabre, prolongée à la partie antérieure en un lobe faillant, obtus, arrondi.

Les fleurs sortent des aisselles des feuilles supérieures, plutôt en grappes courtes qu'en panicules, longues de deux à trois pouces. Les rameaux sont solitaires, surtout les inférieurs, presque simples, munis, à la base de chaque paquet, d'une bractée très-étroite, lancéolée, subulée. Les fleurs mâles sont les plus nombreuses, disposées sur deux épillets un peu épais, obtus; les uns sessiles, d'autres pédicellés, composés d'écaillés renflées; celles de la base ventrues; les deux inférieures plus longues & embrassant toutes les autres, quelques filets ou écailles minces mêlés parmi. Les fleurs femelles sont moins nombreuses; les épillets uniflores; leurs écailles extérieures, comme celles des fleurs mâles. Les semences consistent en une petite noix très-blanche, luisante, presque ronde, longue d'environ trois lignes, acuminée par une portion du style, persillante.

Cette plante croît dans les marais, à Madagascar, où elle a été découverte par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

SCLÉROCARPE. *Sclerocarpus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, radiées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *encelia*, & qui comprend des herbes presque ligneuses, exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, à trois nervures; les fleurs solitaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle radiée; trois demi-fleurons; un calice double, l'intérieur à trois folioles, l'extérieur à deux ou trois; des semences comprimées, point aigrettées; le réceptacle garni de poaillettes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont composées de fleurons fertiles dans le centre, & de trois demi-fleurons à la circonférence.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double; l'extérieur composé de deux ou trois folioles très-grandes, assez semblables aux feuilles supérieures, ovales, lancéolées, crénelées; l'intérieur formé par trois petites folioles presque en forme d'écaillés, appliquées contre chaque demi-fleuron.

2°. Une corolle contenant des fleurons dans le centre, douze environ, droits, tubules, un peu

denticulés à leur orifice, tous fertiles; trois demi-fleurs à la circonférence, très-courts, presque entiers, stériles.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments sont courts, capillaires; les anthères oblongues, réunies presque en cylindre.

4°. Un ovaire ovale, un peu comprimé, surmonté d'un style simple, terminé par un stigmate bifide, réfléchi en dehors.

Les semences sont ovales, comprimées, sans aigrette, enveloppées par les paillerets.

Le réceptacle est garni de paillerets durs, ventrués, pliés en deux, enveloppant chaque semence, s'ouvrant à leur côté intérieur, aigus à leur sommet, rudes, un peu velues.

ES P È C E.

1. SCLÉROCARPE d'Afrique. *Sclerocarpus africanus*. Jacq.

Sclerocarpus foliis alternis, ovatis, strigoso-pilosis; floribus sessilibus, foliariis. (N.)

Sclerocarpus africanus. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 176. — Idem, Act. Helv. 9. pag. 34. tab. 1. fig. 1. — Murray, Syst. veget. edit. 14. pag. 783. — Juss. Plant. Gener. pag. 186. — Lam. Illustr. Gener. tab. 701. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 2261. n°. 1.

Cette plante a des tiges droites, dures, cylindriques, rameuses, hautes d'environ deux pieds, à peine striées, d'un vert-sale ou cendré, rudes, hérissées de poils courts, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, fermes, rudes au toucher, d'une grandeur médiocre, un peu velues, rétrécies à leur base, aigües ou un peu acuminées à leur sommet, veinées, nerveuses, dentées en scie à leurs bords; les dents grossières, inégales, aigües; les pétioles comprimés, étroits, plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires, sessiles à l'extrémité des rameaux, munies d'un double calice, composé chacun de trois folioles. L'extérieur pourroit être considéré comme formé par trois bractées semblables aux feuilles, mais plus petites; l'intérieur est très-court, à trois folioles ovales, aigües, sous chacune desquelles est un demi-fleuron fort petit. La corolle est jaune; les fleurons droits, serrés, tubulés, terminés par de très-petites dents courtes & droites.

Cette plante croît dans la Guinée. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O (V. v.)

SCLÉROTE. *Sclerotium*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, qui a des rapports avec les truffes, & qui est encore

bien peu connu quant aux parties de la fructification : nous nous bornerons à le mentionner ici rapidement. Il se distingue des truffes (*tuber*), en ce qu'on n'a observé, dans l'intérieur de la substance de ces plantes, aucune de ces veines que l'on remarque dans l'intérieur des truffes; leur écorce coriace & leur chair très-ferme les séparent également de ces espèces de tremella; quo l'on a réunies, dans un genre particulier, sous le nom de *tubercularia*.

Les sclérotés sont donc des productions fongueuses, charnues, très-simples, globuleuses ou oblongues, assez petites, dont la chair est ferme, sans aucune veine, point pulvérulente, revêtue d'une écorce dure, coriace, qui ne s'entrouvre & ne se détache jamais de la chair à laquelle elle adhère. Les espèces les plus remarquables de ce genre sont les suivantes :

ES P È C E S.

1. SCLÉROTE du safran. *Sclerotium crocorum*. Pers.

Sclerotium subterraneum, majusculum, difforme, rufum; radiis fibrillosis coherens. Pers. Synops. pag. 119.

Tuber parasiticum, radiis instructum, in vivis vegetabilibus parasitans. Bull. Champ. pag. 31. tab. 46. — Lam. Illustr. Gener. tab. 887. fig. 1. — Foug. de Bandar. Act. Acad. Paris. 1782, pag. 163. tab. 1-3.

Tuber parasiticum, rubrum, elongatum, squamosum. Gmel. Syst. Nat. 1481.

Vulgairement la mort du safran.

Cette plante, si funeste au safran, dont elle attaque les bulbes qu'elle fait périr en très-peu de tems, & qui gagne rapidement une safranière entière, à l'aspect d'une petite truffe. Sa forme est arrondie ou irrégulière, quelquefois de la grosseur d'une petite noisette, de couleur rousse. Sa chair est ferme; elle est munie à ses côtes, de racines fibreuses, ramifiées, & par lesquelles elle se reproduit. Elle s'attache d'abord aux enveloppes coriaces & membranées de la bulbe du safran par des espèces de suçoirs charnus fixés aux extrémités de ses fibres radicales. (Voyez l'article SAGRAN cultivé, vol. VI, page 387.)

2. SCLÉROTE des champignons. *Sclerotium fusarium*. Pers.

Sclerotium difforme, lobatum, pallidum, in fungis putrescentibus parasiticum. Pers. Synops. pag. 120.

Sclerotium (subterraneum), globoso-difforme, aggregatum, subterraneum. Var. β . *truncorum*. Tod. Fung. Meckl. 1. pag. 3. tab. 1. fig. 5. c, d, e.

C'est une petite masse de forme très-irrégulière,

qui s'attache souvent sur la racine ou la base de l'*agaric tubéreux* de Bulliard. Lorsqu'elle commence à croître, elle est à peine de la grosseur d'un grain de moutarde; elle parvient ensuite, par son développement, à trois & même six lignes de diamètre. Elle prend des formes variées, lobées irrégulièrement, d'un blanc-pâle, tuberculeux.

Elle croît sous terre, presque à sa surface, sur les racines, particulièrement sur celles de quelques champignons.

3. **SCLÉROTE des mouffes.** *Sclerotium muscorum*. Pers.

Sclerotium subterraneum, aureum, subrotundum, superficie tuberculat. Pers. Synopf. pag. 120.

Sclerotium subterraneum. Var. 2, *muscorum*. Tod. Fung. Meckl. t. pag. 3. tab. 1. fig. 5. a, b.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, s'en distingue par ses formes un peu moins irrégulières, arrondies; elle a deux à trois lignes & plus de diamètre. Sa surface est tuberculeuse, sa consistance un peu molle, sa couleur d'un jaune d'or.

Elle croît, pendant l'été, sur les racines des mouffes.

4. **SCLÉROTE lacuneux.** *Sclerotium lacunosum*. Pers.

Sclerotium subterraneum, rotundiusculum, lacunosum, nigrum. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 15. tab. 3. fig. 7.

Cette espèce est de la grosseur d'un petit pois; elle croît sous terre sur les racines de l'*agaric racemosus*. Pers. Elle est de couleur noire. Sa forme est presque ronde, & sa surface est parsemée de sinuosités & de vides.

5. **SCLÉROTE dur.** *Sclerotium durum*. Pers.

Sclerotium ovatum, durum, substriatum, obscurum, nigrum. Pers. in Annal. Botan. It. t. 1. pag. 31. Idem, Synopf. pag. 121. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 277. n°. 745.

Sa forme est indéterminée, quelquefois allongée, plus souvent ovale, un peu aplatie, d'une consistance ferme & dure, même intérieurement. Sa chair est blanche, coriace, d'une couleur noirâtre à l'extérieur. Il croît, en automne & pendant l'hiver, sur les tiges sèches des herbes & arbutus, entre l'écorce & l'aubier, à leur base.

6. **SCLÉROTE des bouffes.** *Sclerotium fuscovarium*. Decand.

Sclerotium rotundatum, nigrum, rugosum, intus album, durum. (N.)

Sclerotium fuscovarium. Decand. Flor. fr. vol. 2. pag. 277. n°. 744.

Il se rencontre sous les bouffes de vache, & ne présente que des tubercules arrondis ou irréguliers, noirâtres, un peu ridés, dépourvus de racines. Si on les coupe, on trouve qu'ils sont formés d'une chair compacte, dure, d'un blanc de lait. Cette espèce a été découverte par M. Dufour. (Decand. l. c.)

7. **SCLÉROTE comprimé.** *Sclerotium complanatum*. Pers.

Sclerotium complanatum, erectum, subspissatum, pallidum. Pers. Synopf. pag. 121.

Sclerotium (complanatum), pyriforme, complanatum; stipite brevissimo. Tode, Fung. Meckl. 1. pag. 5. tab. 5. fig. 9.

Il est très-remarquable par sa forme, qui ressemble à celle d'une petite poire, surtout quand il est développé; il est médiocrement pédiculé, lisse, ovale-oblong, blanchâtre, un peu transparent; il prend insensiblement une couleur jaunâtre, & puis celle d'un brun-foncé, opaque; enfin, il finit par se déformer tellement, qu'il devient comprimé, presque plat. Sa substance est blanche, d'abord cartilagineuse, & ensuite cartilagineuse. Sa surface se fend & laisse échapper une petite poussière blanchâtre, très-fine. Il a presque deux lignes de longueur.

Il croît sur les feuilles & les graminées en putréfaction, presque réduits en fumier, pendant les hivers doux.

8. **SCLÉROTE enraciné.** *Sclerotium radicatum*. Tode.

Sclerotium terrestre, ovatum, nigrum, radicatum. Pers. Synopf. pag. 122.

Sclerotium (radicatum), sphaericum, basi pro-dulla, radicatum, fuscum. Tode, Fung. Meckl. 1. pag. 5. tab. 5. fig. 8.

Ce sclérote se montre à la surface des terrains humides, ombragés, à moitié enraciné, muni d'une petite racine fibreuse. Il a environ une ligne de diamètre; sa couleur tire sur le noir; son épiderme est lisse, membraneux; sa substance compacte, un peu succulente; sa forme ovale. Il s'entr'ouvre un peu à son centre, & croît dans le mois de septembre.

9. **SCLÉROTE du chou.** *Sclerotium brassicae*.

Sclerotium oblongum, depressum, nigrum, intus nigro-punctatum. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 15. — Synopf. pag. 122.

On le rencontre pendant l'hiver, entre les feuilles à demi-purifiées du chou: il est large de deux ou trois lignes, aplati, allongé, noir en dehors, parsemé de points noirâtres en dedans.

10. **SCLÉROTE**

10. SCLÉROTE variable. *Sclerotium varium*. Persf.

Sclerotium subrotundum oblongumque, sublobatum, varium, rugosum, è colore albo, dein fuscifcente, nigrum. Persf. Synopl. pag. 122. n°. 9.

Elvela broffica. Hoffm. Veget. Crypt. 2. pag. 18. tab. 5. fig. 2. (*Exclusis nonnullis synonymis.*)

Ce sont des tubérosités de forme extrêmement variée, arrondies, oblongues, en forme de rein, divisées en lobes très-irréguliers, également variés en leur grandeur, solitaires ou réunies trois à six ensemble, s'offrant d'abord sous la forme de petits globules d'un blanc de neige, qui grossissent, & deviennent ensuite roussâtres & noirs. On les rencontre pendant l'hiver sur les tiges & les nervures des choux entassés & putrés.

11. SCLÉROTE grainé. *Sclerotium fermen*. Tode.

Sclerotium gregarium, sphaericum, nigrescente-sphaericum, demum corragatum. Persf. Synopl. p. 123. n°. 10.

Sclerotium sphaericum, nigrescens, corragatum, fermen. Tode, Fung. Meckl. 1. pag. 4. tab. 4. fig. 6.

Spharia (brassicae), *difformis, atrâ, carne alâ*. Dickf. Plant. crypt. pag. 23. — Bolton Fung. rab. 119. fig. 1. 2. — Rehl. Cantab. n°. 1037.

Tremella sphaerica, fissilis, gregaria, nigra. Gled. Abhandl. 2. pag. 346.

Lycoperdon subterraneum, rugosum, congestum. Hall. Hist. 2178.

Lycoperdon brassicae. Berg. in Act. Holm. 1765. pag. 213.

Lycoperdon (minimum), globoso difforme, solitum, gregarium, radice diffusum. Mart. Syst. veget. pag. 981. — Comment. Gotting. 1772. pag. 83.

Lycoperdon oleraceum. Pollich. Pal. 3. p. 314.

Cette espèce, d'abord de la grosseur d'une graine de moutarde, acquiert jusqu'à environ deux lignes de diamètre; elle est très-glabre, blanche dans sa jeunesse; elle devient ensuite fauve, brune, noire, & alors son enveloppe se charge de rides: à cette époque, elle termine son existence. Sa consistance est un peu pulpeuse, mais ferme, solide, & blanche en dedans.

Elle croît dans l'automne & le printemps, au pied des tiges à demi-pourries, & sur les racines des choux, des panais, de la pomme de terre, &c.

12. SCLÉROTE pubescent. *Sclerotium pubescens*. Persf.

Sclerotium gregarium, globosum, pallidum, basi villosum. Persf. Synopl. pag. 123. n°. 11.

Botanique. Tome VII.

Cette plante est fort petite, n'ayant guère plus d'une ligne de diamètre; elle forme de petits globules nombreux, réunis, d'un blanc-pâle, pubescens à leur base, quelquefois un peu concaves à leur sommet. On la rencontre vers la fin de l'automne, entre les lames d'un agaric en putréfaction.

13. SCLÉROTE pourpre. *Sclerotium purpureum*. Tode.

Sclerotium ovale, perpendiculare (erectum), glaberrimum, minimum, spatsum. Tode, Fung. Meckl. 1. pag. 2. tab. 1. fig. 2. — Persf. Synopl. pag. 125. n°. 15.

Cette espèce, assez rare, est fort petite, & ne peut guère se distinguer qu'à la loupe. Sa forme est ovale; sa surface très-glabre, purpurine, un peu luisante; sa consistance dure, en partie enfoncée dans l'écorce, sur les rameaux du chêne. Elle se rencontre au commencement du printemps.

14. SCLÉROTE globuleux. *Sclerotium globulare*. Decand.

Sclerotium minimum, lucidum, nigrum, intus carne gelatinosa, luteâ. (N.)

Sclerotium globulare. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 278. n°. 746.

Ce sclérote croît sur le bois mort, à demi-pourri, & y est à moitié enfoncé; il n'offre qu'un globule noir, luisant, gros comme une tête d'épingle, assez dur, rempli d'une chair molle, gélatinuse, jaunâtre. Il a été découvert par monsieur Dufour. (Decand. l. c.)

Cette espèce ne seroit-elle pas une variété du *sclerotium immersum*, ovale, decumbens, glabrum, alale? Var. α. Lutescens. Tode, Fung. Meckl. 1. pag. 2. tab. 1. fig. 3.

SCOBIFORMES (Semences). *Scobiformia semina*. On donne ce nom aux semences lorsqu'elles sont extrêmement petites, & qu'elles ressemblent en quelque sorte à de la poussière de bois ou des sciures très-fines: telles sont celles des orchis.

SCOLOPIER. *Scolopia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, qui paroît appartenir à la famille des oranges, & avoir quelques rapports avec les *limonia*; il comprend des atterisreaux exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont disposées en une longue grappe; les pédoncules très-allongés, articulés à leur base.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice inférieur, à trois ou quatre divisions profondes; une corolle à trois ou quatre pétales; un grand nombre d'étamines insérées sur le receptacle; le

B

un seul style; une baie couronnée par le style, à une seule loge, à six semences enveloppées d'une tunique propre.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, divisé en trois ou quatre découpures concaves, ovales, obtuses, très-ouvertes.

2°. Une corolle à trois ou quatre pétales presque coriacés, oblongs, ouverts, obtus, persistants, une fois plus longs que le calice.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filaments sont filiformes, un peu aplatis à leur partie inférieure, velus à leur base, étalés, persistants, de la longueur de la corolle, insérés sur le calice, terminés par des anthères lineaires.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style droit, cylindrique, plus long que les étamines, terminé par un ligament épais, à trois lobes, marqués en dessus de trois fossettes.

Le fruit est une baie arrondie, presque à une seule loge, surmontée du style persistant.

Les semences sont au nombre de deux ou trois, un peu arrondies, presque à quatre faces, renfermées dans une enveloppe membraneuse, pulpeuse, argileuse; les semences rapprochées, placées les unes sur les autres, souvent deux par deux.

ESPÈCES.

1. SCOLYMER nain. *Scolopia pusilla*. Willd.

Scolopia pusilla. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 981.

Limonia pusilla. Gærtn. de Fruct. & Sem. Cent. 41. pag. 279. tab. 58. fig. 4.

Malus limonia, *lentiscifolia*, *eylanica*; *fruticosa*, *varia magnitudine*. Pluken. Almag. pag. 239. ?

Je ne connois, sur cette plante, aucun détail qui puisse en donner de notions plus étendues que celles qui nous ont été livrées par Gærtner, sur les caractères du genre. Il paroît que c'est un arbrisseau fort petit, dont les feuilles ressemblent un peu, par leur forme, aux folioles de celles du lentisque. Ses fleurs sont disposées en une longue grappe, dont les pédoncules sont très-longs.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ♀

SCOLOSANTHE. *Scolosanthus*. Ce genre, établi par M. Vahl (Eglog. 1. pag. 11. tab. 10.), dont il cite une seule espèce, *scolosanthus verifco-*

lor, a été placé dans les Illustrations des Genres de M. Lamarck, parmi les *eufébas*. C'est le

Euféba parviflora. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 288. n°. 1481. tab. 67. fig. 8. Ic. *Mal.*

C'est un petit arbrisseau, haut d'environ deux pieds, rameux, qui a presque le port du *justicia spinosa*. Les rameaux épineux portent des fleurs dans leur jeunesse; ils s'allongent ensuite; ces fleurs sont axillaires, d'un jaune de safran; les fruits blancs, monoïpèmes; les feuilles glabres, fort petites, entières, en ovale renversée, rétrécies, aiguës à leur base.

Cette plante croît à l'île de Sainte-Croix. ♀ (V. f.)

SCOLYME. *Scolymus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, semi-flosculueuses, de la famille des chicotacées, qui a des rapports avec les chardons, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à feuilles dures, épineuses, décurrentes; les fleurs munies de bractées pinnatifides.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice imbriqué, muni de bractées roides, épineuses; une corolle semi-flosculeuse, toutes les fleurs hermaphrodites; les semences enveloppées par les paillettes tridentées du réceptacle, à peine aigretées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont composées de demi-fleurs tous hermaphrodites; elles offrent :

1°. Un calice commun, ovale, imbriqué, composé d'écaillés lâches, nombreuses, lancéolées, épineuses, garnies en dessous de bractées roides, pinnatifides, épineuses.

2°. Une corolle formée de demi-fleurs imbriquées, tous égaux, nombreux, hermaphrodites; chaque fleur monopétale, ligulée, lineaire, tronquée à son sommet, divisée en cinq dents très-courtes.

3°. Cinq étamines frangénelles, dont les filaments sont très-courts, capillaires, munis d'anthères subulées, réunies en tube.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, plus long que les étamines, terminé par deux stigmates réfléchis.

Les semences sont solitaires, oblongues, triangulaires, acuminées à leur base, à peine aigretées.

Le réceptacle est convexe, garni de paillettes planes, un peu arrondies, tridentées à leur sommet, plus longues que les semences qu'elles supportent.

Observations. Ce genre, borné jusqu'à présent à un très-petit nombre d'espèces, est assez naturel. Les plantes qu'il renferme ont toutes un port qui leur est particulier; elles sont dures; leurs feuilles sont fermes, coriaces, très-épineuses, à nervures blanches; les tiges ailées; les épines fortes; les calices munis de bractées assez grandes, toides, presque semblables aux feuilles; les corolles jaunes, assez amples; les semences enveloppées par les paillettes du réceptacle.

E S P È C E S.

1. SCOLYME à grandes fleurs. *Scolymus grandiflorus*. Desfont.

Scolymus caule subsimplici, floribus solitariis, sessilibus; superis oppositis; bracteis coriaceis, nervosis; lanceolatis, acutis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 240. tab. 218.

Scolymus floribus solitariis, lateralibus, sessilibus; foliis decurrentibus; caule subsimplici, villosa, erecto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1631. n°. 3.

Scolymus chrysanthemus, aegyptiacus, perennis, feracior. Vaill. Act. Acad. Paris. 1721. pag. 219. — Vaill. Herb. Desfont.

C'est une fort belle espèce, remarquable par ses grandes fleurs simples, latérales; par les tiges presque simples, par la roideur de ses feuilles & la forme de ses épines, que, dans mon Voyage en Barbarie, j'ai confondue avec le *scolymus hispanicus*, mais qui en est très-distincte.

Ses racines sont blanches, charnues, filiformes, de l'épaisseur du doigt: il s'en élève une tige droite, médiocrement velue, simple ou un peu rameuse, ailée sur les principaux angles, dans toute sa longueur; les ailes inégalement sinuées, dentées; les dents terminées par une épine très-aiguë. Les feuilles sont alternes, sessiles, étroites, lancéolées, décourcées, dures, très-roides, vertes, traversées par des veines blanchâtres, pinnatifides ou profondément sinuées & lobées; les lobes ovales, lancéolés, aigus, sinués ou profondément dentés; chaque dent terminée par une épine roide, très-dure.

Les fleurs sont solitaires, sessiles, axillaires, situées vers l'extrémité des tiges, au nombre de trois à six ou huit, médiocrement distantes; les inférieures plus écartées, environnées chacune de trois bractées, cinq à six aux supérieures; ces bractées sont très-épaisses, coriaces, lancéolées, concaves à leur partie inférieure, canaliculées vers leur sommet, presque pinnatifides, dentées, épineuses à leurs bords, marquées de grosses nervures blanches, un peu velues.

Les calices sont ovales, garnis d'écaillés imbriquées, linéaires, lancéolées, glabres, mem-

braneuses à leurs bords, terminées, la plupart, par une épine courte; les écaillés extérieures plus courtes, obtuses; les intérieures aiguës. La corolle est fort grande, d'un beau jaune, composée de demi-fleurs tous hermaphrodites, terminées par une languette lancéolée, rétrécie à son sommet, denticulée. Les semences sont lisses, glabres, en ovale renversé, convexes d'un côté, placées entre les paillettes du réceptacle, surmontées d'une aigrette filiforme, composée de deux ou trois poils fragiles, simples, caducs. Le réceptacle est hémisphérique, garni de paillettes comprimées, obtuses.

Cette plante est très-commune sur les côtes de Barbarie; je l'ai particulièrement recueillie sur les collines arides & pierreuses, situées en face de l'île de Tabarque, aux environs de la Calle & de Boune. (V. v.)

2. SCOLYME d'Espagne. *Scolymus hispanicus*. Linn.

Scolymus ramis patentibus, floribus axillaribus, aggregatis, sessilibus; bracteis foliaceis, dentato-spinosis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 241.

Scolymus foliis margine incrassatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1145. — Millet, Dict. n°. 2. 8. Icon. tab. 229. — Ganan, Monsp. pag. 419. — Fotskh. Flor. aegypt. arab. Centur. 5. pag. 145.

Scolymus floribus subaggregatis, foliis scabris, caudâ mediâ subius hirtis, interruptè decurrentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1630. n°. 2.

Scolymus floribus congestis. Linn. Syst. veger. pag. 603. — Poitea, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 231.

Scolymus vivax. Sauvag. Monsp. 294.

Scolymus chrysanthemus. C. Bauh. Pin. pag. 184. — Tournef. Inst. R. Herb. 480. — Zannich. Hist. tab. 175. — Vaill. Act. Acad. Paris. 1721. pag. 219.

Scolymus Theophrasti, hispanicus. Clus. Hist. 2. pag. 153. lc. — Tabern. lc. 694.

Carduus chrysanthemus. Dodon. Pempt. p. 725. Icon.

Scolymus congestus. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 116. n°. 95.

On distingue cette espèce du *scolymus grandiflorus*, par ses tiges rameuses, plus élevées; par ses feuilles à demi-décourcées, par ses bractées foliacées, par ses fleurs nombreuses, plus petites, souvent agrégées.

Ses racines sont charnues, fusiformes, souvent rameuses; les tiges hautes de trois ou quatre pieds, rameuses; les rameaux étalés, velus, garnis d'ailes épineuses, inégalement dentées. Les

feuilles sont étroites, sessiles, alternes, lancéolées, alongées, d'un vert blanchâtre, un peu velues sur leurs principales nervures à leur face inférieure, glabres en dessus, traversées de veines blanchâtres, sinuées, dentées à leur contour; les dents armées de fortes épines subulées.

Les fleurs sont sessiles, solitaires ou médiocrement agrégées vers l'extrémité des rameaux, garnies de bractées à trois folioles, roides, lancéolées, foliacées, canaliculées, un peu plus longues que les filiers, inégalement dentées, épineuses à leurs bords, très-aiguës à leur sommet.

Le calice est ovale, un peu allongé, garni d'écaillés imbriquées, linéaires, lancéolées, la plupart terminées en une pointe épineuse. La corolle est de couleur jaune, composée de demi-fleurs tous hermaphrodites, linéaires, rétrécies à leur partie supérieure, dentées à leur sommet; les anthères jeunes, conées; les semences lisses, en ovale renversé, convexes d'un côté, renfermées entre les pailettes du réceptacle, couronnées par une aigrette sessile, composée de deux ou trois filiers simples, caducs. Le réceptacle est hémisphérique, garni de pailettes courtes, obtuses.

Cette espèce croit dans les sols arides, en Barbarie, où je l'ai recueillie, ainsi que dans les départements méridionaux de la France. (V. v.)

3. SCOLYME maculé. *Scolymus maculatus*.

Scolymus ramis patentibus, foliis marginibus cartilagineis, involucri pectinato-multifidis, seminibus pappe distinctis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 242.

Scolymus floribus solitariis, foliis subtriangulis, levibus, caule clato, dentato. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1630. n°. 1.

Scolymus floribus solitariis. Linn. Syst. veget. pag. 602. — Poit. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 251.

Scolymus foliis marginibus attenuatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1142. — Gouan, Monsp. pag. 419. — Miller, Dict. n°. 1. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 992. — Kniph. Centur. 9. n°. 85. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 116. n°. 95.

Scolymus annuus. Hort. Upsal. 244.

Scolymus. Hort. Cliff. 388.

Scolymus chrysanthemum, annuus. Tournef. Inst. R. Herb. 480. — Vaillant, Aft. Acad. Paris. 1721. pag. 219. — Dodart. Mem. pag. 111. Ic. — Dodart. Icon. Acad. 1666. 4. pag. 303.

Scolymus Theophrasti, narbonensis. Clus. Hist. 2. pag. 153. Ic.

Cardui chrisanthemi altera icon. Dodon. Pempt. 725. Icon.

Scolymus Theophrasti. Lobel. Icon. 2. pag. 6.

Spina latea. J. Bauh. Hist. 3. pag. 84. Icon.

Cette espèce se distingue des précédentes, à ses racines annuelles, à ses feuilles supérieures, cartilagineuses à leurs bords, à ses bractées profondément pinnées, à ses fleurs plus petites, & à ses semences coriées dépourvus d'aigrettes.

Les racines sont fusiformes, souvent ramufées; les tiges médiocrement velues, aîlées dans toute leur longueur, hautes au moins de trois pieds; les aîles épineuses, inégalement dentées; les rameaux nombreux, étalés; les feuilles intérieures lancéolées; les supérieures plus étroites, longues de six à dix pouces, roides, épineuses, marquées de raches blanches, cartilagineuses à leur contour, sinuées, lobées, inégalement dentées; les dents épineuses.

Les fleurs sont solitaires ou agrégées sur un pédoncule commun, situées le long des rameaux & dans leur bifurcation. Leur calice est ovale, muni d'écaillés imbriquées, linéaires, lancéolées, garni en dessous de quatre à cinq bractées coriées, pectinées, cartilagineuses à leurs bords, plus longues que la corolle, armées de dents longues, un peu inégales, subulées, terminées par une pointe aigüe.

Les fleurs sont composées de demi-fleurs tous hermaphrodites, de couleur jaune, linéaires, dentées à leur sommet; les anthères sont brunes; les stigmates réfléchis; les semences lisses, sans aigrettes, convexes d'un côté, enveloppées par les pailettes du réceptacle.

Cette plante croît au milieu des champs, dans les sols arides; elle se rencontre dans les départements méridionaux de la France. Je l'ai également observée sur les côtes de Barbarie. (V. v.)

SCOPAIRF. *Scoparia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des scrophulariées, qui a des rapports avec les *bauleia*, & qui comprend des arbrutes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont verrucées, au nombre de trois ou quatre; les fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice partagé en quatre; une corolle en roue; à quatre découpures; quatre étamines; un style; une capsule bivalve, à deux loges, à plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à quatre découpures aiguës.

2°. Une corolle monopétale, en roue, ouverte, dont l'orifice est velu, le tube très-court, le limbe partagé en quatre découpures obtuses, égales.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont subulés, égaux, plus courts que la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, conique, surmonté d'un style subulé, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate aigu.

Le fruit est une capsule ovale, globuleuse, à deux sillons, à deux valves, à deux loges, avec une cloison parallèle aux valves, contenant des semences nombreuses, ovales-oblongues.

E S P È C E S.

1. SCOPIRE à trois feuilles. *Scoparia dulcis*.

Scoparia foliis ternis, floribus pedunculatis. Linn. Syst. veget. pag. 157. n°. 1. — Jacq. Amer. 17. — Vahl, Symbol. 1. pag. 12. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 337. n°. 1647. tab. 85.

Scoparia foliis ternis, lanceolatis linearibus, superius serratis, deorsum attenuatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 50.

Scoparia (ternata), foliis lanceolatis, apice serratis, ramis ternatis, nervio villosa. Fotskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 31. n°. 4.

Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. Hort. Cliff. 320. — Roeyen, Lugd. Bat. 301. — Miller, Dict. n°. 1.

Samoloides. Boeth. Lugd. Bat. 2. pag. 165.

Veronica americana, erecta, frutescens & ramosa. Herm. Parad. 241. tab. 141.

Veronica fruticosa, erecta, dulcis, hexangulari caule. Sloan, Jam. 81. Hist. 21. pag. 195. tab. 108. fig. 2.

Phytoides americanum, flore albo, tetrapetalo. Ph. Ken. Amag. pag. 296. tab. 215. fig. 1.

g. Tupicava. Pif. Bras. 146.

Vulgairement escobilla au Pérou.

Cette espèce se distingue des suivantes par ses fleurs pédonculées, & ses feuilles trois par trois à chaque verticille.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, divisées des leur base en rameaux effilés, droits, anguleux, verdâtres, très-glabres, ordinairement à six angles peu saillants, garnis de feuilles verticillées, distantes, réunies trois par trois à chaque verticille; lancéolées, longues de six à sept lignes, larges de deux, pédonculées, glabres à leurs deux faces, veines, entières, légèrement

denticulées vers leur sommet, un peu aiguës; leur pétiole de moitié plus court que la feuille, & celui-ci moins longue que les entre-nœuds.

Les fleurs sont petites, situées au nombre de trois à chaque verticille, une dans l'aisselle de chaque feuille, supportées par un pédoncule capillaire, uniflore, presque de moitié plus court que les feuilles. Le calice est glabre, verdâtre, divisé en quatre découpures un peu aiguës; la corolle petite, de couleur blanche, monopétale, en roue. Son tube est court, velu à son orifice; le limbe partagé en quatre lobes ovales, obtus; quatre étamines droites, plus courtes que la corolle; un ovaire un peu globuleux; une capsule ovale, médiocrement arrondie, petite, à deux loges, renfermant un grand nombre de semences fort petites.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, à la Jamaïque, au Pérou: on la trouve aussi en Égypte. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

2. SCOPIRE COUCHÉE. *Scoparia procumbens*. Jacq.

Scoparia foliis quaternis, foliis sessilibus. Jacq. Stirp. Amer. pag. 18. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 337. n°. 1648. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 652. n°. 2.

Cette plante est à peine haute d'un pied & demi, assez semblable à *Scoparia dulcis*; mais les tiges sont dichotomes, couchées à leur partie inférieure, relevées vers leur sommet, garnies de feuilles subulées, acuminées, un peu roides, sessiles, terminées quatre par quatre, les deux intérieures opposées, un peu plus courtes que les extérieures.

Les fleurs sont blanches, petites, sessiles; elles naissent dans la bifurcation des rameaux, & quelque fois dans les aisselles des feuilles; le tube de la corolle un peu frange à sa partie supérieure, & parfaitement glabre.

Cette plante croît en Amérique, dans les environs de Carthagène, dans les sables des côtes antillimes. ○ (Descript. ex Jacq.)

3. SCOPIRE EN ARBRE. *Scoparia arborea*. Linn. Suppl.

Scoparia foliis lanceolatis, alternis, integerrimis; corymbis supra decompositis, trichotomis. Linn. 1. Suppl. pag. 125. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 337. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 655. n°. 3.

Scoparia foliis lanceolatis, alternis, integris; panicula trichotoma, caule arborea. Thunb. Prodr. pag. 19.

Cette espèce paroît être un arbrisseau assez élevé, qui offre l'aspect d'un olivier ou d'un phyllirea,

dont les tiges sont arborescentes, & les rameaux garnis de feuilles alternes, lanceolées, très-entières. Ses fleurs sont extrêmement nombreuses, disposées en une panicule très-ample, à plusieurs divisions, & dont les ramifications sont trichotomes. La corolle est petite.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance. *h*.

SCOPOLIER. *Scopolia*. Linn. Suppl. Genre de plantes encore peu connu, à fleurs composées, qui paroît se rapprocher de la famille des corymbifères, & avoir quelques rapports avec les *tarchanathus*. Il renferme des arbres exotiques à l'Europe, dont les rameaux portent à leur extrémité des feuilles alternes, sans stipules. Les fleurs sont solitaires, aillaiées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs aggrégées, réunies dans un calice à deux folioles concaves; des corolles infundibuliformes, à quatre divisions; huit anthères oblongues, disposées sur deux rangs, rapprochées & conniventes, en forme de colonne; quatre sessiles; un ovaire supérieur; un stigmate sessile.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs aggrégées, réunies dans un calice commun, offrent :

1°. Un calice en forme de collerette, composé de deux folioles égales, oblongues, obtuses, glabres, concaves, nerveuses.

2°. Une corolle infundibuliforme, petite, velue, divisée à son orifice en quatre découpures ou en quatre dents presque égales, un peu obtuses.

3°. Huit étamines, dont quatre sont munies de filaments droits, courts, filiformes, placés circulairement à l'extrémité de l'ovaire, surmontés par autant d'anthères anguleuses, conniventes, en forme de colonne, dominées par quatre autres anthères sessiles, & dans la même situation.

4°. Un ovaire supérieur, droit, glabre, muni à son sommet de quelques filets soyeux; point de style; un stigmate court, aigu.

Le fruit n'a point encore été observé.

Observations. Forster à établi, sous le nom de *Scopolia*, un autre genre encore moins connu que celui-ci, qui en est très-différent, dont le calice est supérieur, terminé par cinq dents; l'ovaire inférieur, surmonté de trois styles, terminés par trois stigmates; le fruit monosperme; quelques-unes des fleurs mâles, & non hermaphrodites, point différentes par leur calice, munies d'une corolle à cinq pétales & de cinq étamines. (Forster, Nov. Gen. tab. 72.)

1. **SCOPOLIER à fleurs composées.** *Scopolia composita*. Linn. f.

Scopolia foliis alternis, integris; pedunculis axillaribus, unifloris, subnatis. (N.)

Scopolia composita. Linn. f. Suppl. pag. 409. — Juss. Gen. Plant. pag. 438.

C'est un arbre dont le tronc se divise en branches & en rameaux cylindriques, glabres, feuilles à leur sommet. Les feuilles sont alternes, médiocrement pétiolées, oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces, veinées, entières à leurs bords, longues d'environ trois pouces, dépourvues de stipules.

Les fleurs sont solitaires, pédonculées, situées dans l'aisselle des feuilles, & ne se montrent souvent qu'après la chute de ces dernières. Les pédoncules sont simples, filiformes, solitaires, un peu penchés, terminés par une seule fleur, dont le calice est composé de deux folioles concaves, en forme de collerette, renfermant plusieurs corolles infundibuliformes, à cinq découpures à leur sommet.

Cette plante croît à l'île de Java. *h* (*Describe. ex Linn. f.*)

Nota. Voyez, pour la *Scopolia carniolica* de Jacquin, l'article SARAQUIER, vol. 6. pag. 336. Voyez aussi JUSQUIAME à fleurs pendantes.

SCORZONÈRE. *Scorzonera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des chioracées, qui a des rapports avec les *tragopogon*, & qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont ordinairement entières, quelquefois laciniées; les fleurs jaunes dans la plupart des espèces, bleuâtres dans quelques-unes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice composé d'écaillés imbriquées, scarieuses sur leurs bords; des fleurs semi-fosculuses, toutes hermaphrodites; les semences surmontées d'une étroite plumose; le réceptacle nu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs offrent :

1°. Un calice commun, alongé, presque cylindrique, composé d'écaillés imbriquées, scarieuses à leurs bords.

2°. Une corolle composée de demi-fleurons imbriqués, tous hermaphrodites; les extérieurs un peu plus longs.

Chaque demi-fleuron monopétale, terminé par une languette linéaire, tronquée, divisée en cinq dents à son sommet.

3°. Cinq étamines capillaires, synergétiques, dont les filaments sont courts; les autres cylindriques, réunies en tube.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates rétrécis.

Les semences sont solitaires, oblongues, cylindriques, fittées, une fois plus courtes que le calice, surmontées d'une aigrette plumuleuse, renfermées dans le calice ovale, oblong, connivent, & placées sur un réceptacle nu.

Observations. Ce genre, assez bien établi par ses caractères généraux, distingué des *tragopogon* par les calices imbriqués, par les semences surmontées d'une aigrette sessile, avait cependant besoin de quelque réforme pour être renfermé dans ses bornes naturelles. Quelques-unes des espèces que Linné y avait rapportées, offroient dans leurs semences un caractère assez particulier, constitué par des stries transverses, tuberculées, & une forme presque quadrangulaire; de plus, des calices ventrus, & quelques autres différences dans le port, telles que le *scorzonera tingiana* & le *scorzonera picridium*. M. Desfontaines en a formé le genre *picridium*. (Voyez PICRIDIE.)

ESPÈCES.

1. *SCORZONÈRE* d'Espagne. *Scorzonera Hispania*. Linn.

Scorzonera caule ramoso, foliis amplexicaulibus, lanceolatis, integris, basi subserrulatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1499. n°. 4.

Scorzonera caule ramoso, foliis amplexicaulibus, lanceolatis, integris, basi serrulatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1112. — Hort. Cliff. 388. — Hort. Upsal. 241. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 6. — Gronov. Orient. 244. — Miller, Dictionn. — Scopol. Carn. n°. 951. — Blackw. tab. 46. — Kniph. Centur. 7. n°. 83. — Gouan, Monsp. pag. 405. n°. 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 159. n°. 2. — Germ. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 367. tab. 159. — Lam. Illustr. Gener. tab. 647. fig. 5.

Scorzonera caule ramoso, foliis amplexicaulibus, unaulatis. Sauvag. 82.

Scorzonera denticulata. Lam. Flot. franç. vol. 2. pag. 82. n°. 78.

Scorzonera latifolia, sinuata. C. Bauh. Pin. 275. — Tournef. Inst. R. Herb. 476.

Tragopogon hispanicum, sive scorzonera. Magn. Botan. Monsp. pag. 260.

Tragopogon hispanicum, sive scorzonera, aut scorzonera. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1660. Icon.

Scorzonera major, hispanica, prima. Cluf. Hist. 2. pag. 138.

Scorzonera latifolia, sinuata, major, hispanica. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 7. tab. 9. fig. 1.

2. *Scorzonera latifolia, sinuata; radice amarâ*. C. Bauh. Pin. 275. — Tournef. Inst. R. Herb. 476.

3. *Scorzonera latifolia, sinuata; floribus plenâ*. C. Bauh. Pin. 275. — Tournef. Inst. R. Herb. 476.

Cette plante, si connue par l'usage que l'on fait de ses racines comme aliment, est remarquable par ses tiges hautes, rameuses; par les feuilles larges, amplexicaules, légèrement denticulées.

Ses racines sont simples, pivotantes, de la grosseur du doigt, alongées, nœuds en dehors; elles produisent des tiges hautes de deux ou trois pieds, glabres, très-lisses, épaisses, flétries ou canelées, très-rameuses surtout à leur partie supérieure, feuillées; les feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, très-glabres, nerveuses, vertes à leurs deux faces, entières à leurs bords, mais légèrement ondulées, & souvent garnies de quelques petites dents rares à leur partie inférieure, acuminées à leur sommet, élargies en spatule dans leur milieu, rétrécies vers leur base; celles de la base des tiges supérieures ou des pédoncules, très-étroites, lancéolées, longuement acuminées.

Les fleurs sont terminales, solitaires, portées sur de longs pédoncules presque nus, fistuleux; les calices oblongs, presque cylindriques, un peu cottonneux à leur base & sur le bord des écailles inférieures; ces écailles sont imbriquées, larges, glabres, d'un vert jaunâtre, lancéolées, presque aiguës, scarieuses à leurs bords, les extérieures ovales, beaucoup plus courtes. La corolle est grande, de couleur jaune, composée de demi-fleurons tous hermaphrodites; leur languette linéaire, tronquée & légèrement denticulée à son sommet. Les semences sont alongées, presque cylindriques, étroites, canelées, surmontées d'une aigrette sessile, plumuleuse; le réceptacle est nu.

Cette plante croit en Espagne & dans les départements méridionaux de la France. (V. v.)

Cette scorzonère se cultive comme plante alimentaire. Ses racines passent pour purgatives, aperitives, diurétiques, mais adoucies par la culture, elles paroissent avoir perdu une partie de ces propriétés. Elles renferment un suc doux, gommeux, qui les rend propres à calmer la toux & les ardeurs d'urine. C'est d'ailleurs un aliment sain, léger, point échauffant.

4. *SCORZONÈRE* à feuilles purpurines. *Scorzonera purpurea*. Linn.

Scorzonera foliis lineari-subulatis, integris, canaliculato-triquetris; pedunculis cylindricis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1113. — Jacq. Austr. vol. 1. tab. 35. — Miller, Dict. n°. 4. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 949. tab. 46. — Poirer, Voyag. en Baib.

vol. 2. pag. 225. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 219. — Lam. Illustr. Gener. tab. 647. fig. 3.

Scorzonera (purpurea), foliis linearibus-subulatis, canaliculato-triquetris; caule ramofo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1502. n°. 13.

Scorzonera angustifolia, subcaerulea. C. Bauh. Pin. 275. — Vahl. Atl. Acad. Paris. 1721. pag. 209. — Tourn. Inst. R. Herb. 476.

Scorzonera angustifolia, elatior, pannonica, quarta. Clus. Hist. 2. pag. 139. Icon.

Scorzonera caule ramofo, tereti; foliis linearibus, acuminatis; calicibus obtusifolius. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 7. tab. 2.

β. *Scorzonera (rosea), foliis lanceolato-linearibus, planis; caulibus carinatis-linearibus; caule unifloro.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1502. n°. 12.

Scorzonera rosea. Walld. & Kitaib. Plant. rar. Hungar.

Scorzonera purpurea. Roth. Germ. vol. 1. pag. 335. — vol. II. pag. 250. — Hoffm. Gener. 173.

Scorzonera silvestris, foliis angustis, flore caeruleo. Mentz. Pug. tab. 1. fig. 1.

Tragopogonis species, five scorzonera major, angustifolia, fuscacaulis flore. J. Éauh. Hist. 2. p. 1062.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles étroites, linéaires, subulées, canaliculées; en quoi elle diffère du *scorzonera undulata*. Ses fleurs sont bleues.

Ses racines sont épaisses, charnues, ovales, oblongues, blanchâtres en dedans. Elles produisent une tige droite, cylindrique, presque simple, ou médiocrement rameuse, feuillée particulièrement à sa partie inférieure, haute de huit à dix pouces, uniflore. Les feuilles sont très-étroites, linéaires, glabres, vertes, entières à leurs bords, canaliculées particulièrement à leur sommet, longuement subulées, presque aussi longues que les tiges.

Les fleurs sont solitaires, terminales, de couleur bleue; les calices ovales, oblongs, presque cylindriques, composés d'écaillés glabres, imbriquées, inégales; les intérieures, beaucoup plus longues, acuminées à l'extérieure, courtes, ovales; la corolle au moins une fois plus grande que le calice; les étamines blanchâtres; les semences allongées, surmontées d'une aigrette plumbeuse.

Cette plante croît en Allemagne, en Autriche, dans la Sibérie. Je l'ai également recueillie sur les côtes de Barbarie. 7 (P. v.)

Observations. Les variétés que cette plante offre dans ses feuilles, sont telles qu'il est difficile de trouver des individus parfaitement semblables. Le grand nombre que j'en ai recueilli en Barbarie, ne m'a point offert des caractères assez constants pour y reconnaître les deux espèces que quelques au-

teurs modernes ont établies. Les tiges sont tantôt simples, uniflores; tantôt rameuses: la couleur de la corolle tantôt purpurine, tantôt un peu rougeâtre.

3. *SCORZONÈRE* à feuilles ondulées. *Scorzonera undulata.* Desfont.

Scorzonera foliis lanceolato-subulatis, undulatis, integerrimis; squamis calicinis exterioribus mucronatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 219. — Lam. Illustr. Gener. tab. 647. fig. 2.

Scorzonera foliis linearibus-lanceolatis, attenuatis, tomentosis, undulatis; caule subramoso. Vahl. Symb. 2. pag. 85.

Scorzonera graca, saxatilis; foliis angustis, tomentosis, undulatis. Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. pag. 36.

Scorzonera purpurea. Var. Poir. Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 225.

Cette plante a de grands rapports avec le *scorzonera purpurea*; il en diffère par ses feuilles ondulées, & souvent tomenteuses, lanceolées, plus larges.

Ses racines sont presque fusiformes, charnues; elles produisent des tiges droites, hautes d'un pied & plus, striées, presque cylindriques, feuillées, quelquefois simples, plus souvent divisées vers leur partie supérieure en trois ou quatre rameaux élançés, uniflores, plus ou moins tomenteux. Les feuilles sont lanceolées, allongées, très-souvent glabres à leurs deux faces, quelquefois velues ou légèrement tomenteuses, entières, ondulées à leurs bords, quelquefois largement échancrées, récurvées & longuement subulées à leur sommet, vaginales & canaliculées à leur base, marquées de trois ou cinq nervures longitudinales, peu sensibles, longues de quatre à six pouces & plus, larges de quatre ou six lignes.

Les fleurs sont solitaires, terminales; leur calice glabre, ovale, oblong, garni d'écaillés imbriquées; les extérieures beaucoup plus courtes, ovales, membraneuses à leurs bords, quelquefois légèrement tomenteuses, presque mucronées à leur sommet, liches ou réfléchies. La corolle est d'un bleu-violet, de la grandeur de celle du *scorzonera hispanica*, composée entièrement de demi-tubercles, tous hermaphrodites, linéaires, plus longs du double que le calice, dentés à leur sommet. Les anthères sont brunes; les semences allongées, couronnées par une aigrette fusile, plumbeuse, dont les poils sont inégaux, entre-mêlés comme une toile d'araignée.

Cette plante croît sur les côtes de Barbarie, dans les terrains sablonneux. 7 (P. v.)

Observations. Cette plante, que j'ai présentée dans mon Voyage en Barbarie, connue une variété

du *Scorzonera purpurea*, affecte des formes très-variables dans les feuilles. Elles sont quelquefois très larges à leur base, rétrécies dans leur milieu, considérablement élargies vers leur sommet; les unes terminées en aigle, d'autres arrondies en spatule; quelques-unes ont des feuilles d'un pied & demi de longueur, qui offrent sur le même individu les variétés dont je viens de parler. J'ai recueilli cette plante dans les environs de la Calle, en Afrique.

4. SCORZONÈRE laciniée. *Scorzonera laciniata*. Linn.

Scorzonera foliis inferioribus, pinnatifidis, linearibus, superioribus linearibus; calicibus glabris; squamis inferioribus patulis, mucronatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1506. n°. 24.

Scorzonera foliis linearibus, dentatis, acutis; caule erecto; calicem squamis patulis-mucronatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1114. — Roy. Lugd. Bar. 120. — Hort. Upsal. 142. — Dalib. Paris. 142. — Pollich. Pal. 734. — Miller, Dict. n°. 6. — Jacq. Austr. tab. 356. — Scholl. Barb. n°. 630. — Hoffm. Germ. 273. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 335. — vol. II. pag. 251. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 159. n°. 4. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 367. tab. 159. — Lam. Illustr. Gener. tab. 647. fig. 4.

Scorzonera foliis linearibus, dentatis. Linn. Spec. Plant. edit. r. pag. 791. — Gouan, Monsp. pag. 406. n°. 3.

Scorzonera caule folioso, ramoso; foliis angustifolius; imis rariis semipinnatis; superioribus linearibus, lanceolatis. Haller, Helv. n°. 12.

Scorzonera foliis laciniatis. Tournef. Infl. R. Herb. 477. — Garid. Aix. 434.

Tragopogon laciniatum, luteum. C. Bauh. Pin. 174. — Rai, Hist. 251.

Tragopogon folio laciniato, flore pallido. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1059.

Tragopogon laciniatis foliis. Col. Phytogr. 21.

Tragopogon tenuissimè laciniatum. Magn. Botan. Monsp. 259.

Tragopogon refeda minoribus foliis. Barret. Icon. rar. tab. 799.

Scorzonera paucifida. Lam. Flot. franç. vol. 2. pag. 83. n°. 78.

Cette plante se distingue à ses feuilles très-étroites, divisées en dents pinnuliformes, très-aiguës.

Ses racines sont fusiformes, charnues, noires; ses tiges droites, hautes au moins d'un pied, plus basses lorsqu'elle n'est point cultivée, quelquefois un peu couchées à leur base, glabres, fistuleuses, striées, cylindriques, rameuses; les rameaux alternes, élançés. Les feuilles sont alternes, Botanique. Tome VII.

pétiolées, alongées, très-fines, glabres à leurs deux faces, de couleur verte, lineaires; les unes pinnatifides, d'autres divisées seulement en quelques dents étroites, alongées, aiguës; les pinnules distantes, lineaires, subulées, très-inegales, situées particulièrement vers le milieu des feuilles; les supérieures beaucoup plus fines.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des tiges & des rameaux, soutenues par des pédoncules longs, épais, presque dépourvus de feuilles. Les calices sont glabres; ovales; un peu cylindriques, assez épais, composés d'écaillés imbriquées, les intérieures lineaires, alongées, scarieuses à leurs bords, remarquables par une petite dent située un peu au dessous de leur extrémité, & rejetée au dehors; les écaillés extérieures beaucoup plus courtes, ovales, un peu aiguës; quelques-unes lâches. La corolle est d'une grandeur médiocre, de couleur jaune; les demi-fleurs hermaphrodites, imbriquées; les semences étroites, alongées, presque subulées, obtuses, dures, striées, surmontées d'une aigrette sessile, blanchâtre, plumeuse; le réceptacle nu.

Cette plante croît sur le bord des champs, en France, en Allemagne, aux environs de Paris. On la cultive dans le Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

5. SCORZONÈRE octangulaire. *Scorzonera octangularis*. Willden.

Scorzonera foliis inferioribus, decursivè pinnatifidis, lanceolatis; superioribus linearibus-lanceolatis; calicibus inapertis octangularibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1506. n°. 25.

Scorzonera octangularis. Hort.

Scorzonera (refedifolia), caule diffuso, lanato; foliis hastato-pinnatifidis; caulinis integerrimis linearibus; calicibus tomentosis. Gouan, Illustr. 53. ?

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce & le *Scorzonera laciniata*, d'après Willdenow, mais ses feuilles radicales sont beaucoup plus larges, laciniées; les découpures lancéolées & décurrentes; les inférieures pinnatifides; les pinnules confluentes à leur base, lancéolées; les supérieures lineaires, lancéolées, entières. Les calices sont blanchâtres, & se présentent avec huit angles avant l'épanouissement des fleurs.

La plante que Gouan a nommée *Scorzonera refedifolia*, paroit être la même que celle-ci; mais les tiges, d'après cet auteur, sont diffusives, étalées, tandis qu'elles sont droites dans cette espèce.

Cette plante croît dans les départeremens méridionaux de la France & dans l'Europe méridionale. *

6. SCORZONÈRE à feuilles de réséda. *Scorzonera refedifolia*. Linn.

Scorzonera foliis obtusè dentatis, caule divaricato, calicum apicibus tomentosis. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 617. n°. 8. — Miller, Dict. n°. 7. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 83. n°. 78.

Scorzonera (resedifolia), foliis linearibus, dentato-pinnatifidis, glabris; calicibus apice albidocartilagineis; caule erecto. Vahl, Symb. 2. pag. 87. — Willd. Spec. Plant. vol. 8. pag. 1505. n°. 22.

Leontodon mucronatum. Forsk. Flor. ægypt. tab. 144.

Chondrilla ficula, tragopogonoides, maritima. Boccon. Sic. pag. 13. tab. 7. fig. A. C. *Mediocris.*

Cette plante diffère du *Scorzonera coronopifolia*, par ses tiges ramifiées & par les feuilles bien moins laciniées.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu fistuleuses, glabres, hautes d'un à deux pieds, divisées, surtout à la partie inférieure, en rameaux presque dichotomes, les supérieurs diffus. Les feuilles caulaires sont alternes, sessiles, lancéolées, aiguës à leur sommet, à peine pinnatifides, plus souvent munies à leurs bords de quelques dents écartées, obtuses, inégales, alongées, linéaires, pinuliformes, glabres ou un peu velues; leur partie inférieure retrecie en pétiole; les feuilles supérieures entières, plus étroites.

Les fleurs sont terminales, portées sur de longs pédoncules, uniflores, fistuleux, striés. Leur calice est un peu ovale, oblong, composé d'écailles imbriquées; les intérieures droites, grandes, lancéolées, membraneuses à leurs bords, acuminées; les extérieures beaucoup plus courtes, ovales. La corolle est jaune; les semences alongées, striées longitudinalement, ovales à leur partie inférieure, prolongées & cylindriques à leur partie supérieure, surmontée d'une aigrette roussie, blanchâtre, plumeuse.

Cette plante croît en Espagne & dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

7. SCORZONÈRE corne de cerf. *Scorzonera coronopifolia.* Desfont.

Scorzonera foliis pinnatifido-lacinatis, pubescentibus; caule subnudo, simplici, unifloro. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 220. tab. 212.

Scorzonera (brevicaulis), foliis integris pinnatifidis; caule tomentoso, subaphyllo, unifloro. Vahl, Symb. 2. pag. 88. tab. 44.

Scorzonera (coronopifolia), foliis pinnatifidis, dentatis, obtusis, pubescentibus; scapo subaphyllo, nudo, tomentoso, unifloro. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1507. n°. 27.

Cette plante a quelques rapports avec le *Scorzonera*

mera resedifolia, dont elle diffère par ses feuilles plus profondément laciniées, presque pinnatifides; par les tiges plus simples.

Ses racines sont sififormes, de la grosseur du petit doigt ou du pouce, d'où s'élève une tige simple, droite, striée, haute d'environ huit à dix pouces, nue ou garnie de quelques feuilles à la partie inférieure, terminée par une seule fleur. Les feuilles sont radicales pour le plus grand nombre, pubescentes, laciniées ou pinnatifides, élargies dans leur milieu, aiguës à leur sommet, tombantes, ordinairement un peu plus courtes que les tiges; les pinnules sont linéaires, inégales, aiguës, un peu écartées; les unes entières, d'autres laciniées; les pétioles canaliculés, striés, dilatés à leur base.

Les fleurs sont solitaires, terminales; leur calice ovale, oblong, composé d'écailles imbriquées, souvent tombantes à leurs bords; les extérieures ovales, les intérieures lancéolées, beaucoup plus longues, membraneuses à leur contour. La corolle est semi-fistuleuse, les demi-fleurs tous hermaphrodites, de couleur jaune, dentelés à leur sommet, une fois plus longs que les calices; les anthères brunes; les stigmates réfléchis; les semences alongées, tudes, cylindriques, couronnées par une aigrette sessile & plumeuse; le réceptacle nu & convexe.

Cette plante a été observée sur les montagnes de l'Afrique septentrionale, par M. Desfontaines. (V. Desfont.)

8. SCORZONÈRE à feuilles de chausse-trape. *Scorzonera calcitrapifolia.* Vahl.

Scorzonera foliis inferioribus lyratis; lacinis oblongis, mucronatis; superioribus pinnatifidis. Vahl, Symb. 2. pag. 87. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1505. n°. 23.

Scorzonera resedifolia. Retz. Observ. 3. pag. 42.

Scorzonera orientalis, foliis calcitrapæ, flore flavescente. Tournef. Infr. R. Herb. Coroll. 36.

Scorzonera pratensis, foliis laciniatis, glabris. Buxb. Centur. 2. pag. 27. tab. 22.

Tragopogon reseda minoris folio, supinum. Barrel, Icon. rar. 800.

On distingue cette espèce du *Scorzonera resedifolia* à ses feuilles inférieures en lyre, mucronées à leurs divisions & aux calices dont les écailles n'ont point leur sommet blanchâtre & cartilagineux.

Ses tiges sont droites, herbacées, hautes d'environ un pied, rudes, striées, médiocrement rameuses; les rameaux étalés, alternes; les feuilles inférieures & radicales sont très-nombreuses, longucs de trois à quatre pouces, retrecies en pé-

tiolo à leur base, pinnatifides ou en forme de lyres; les découpures alternes, un peu arrondies ou oblongues, souvent irrégulières, mucronées; la terminale trois & quatre fois plus grande que les autres; les feuilles caulinaires supérieures, dilatées, peu nombreuses, pinnatifides; leurs découpures linéaires, lancéolées, rudes à leurs bords.

Leurs fleurs sont solitaires, terminales; les pédoncules longs de trois à quatre pouces, légèrement sillonnés, munis à leur partie supérieure d'une petite feuille subulée & entière. Le calice est de la grandeur de celui du *Scorzonera humilis*, composé d'écailles ovales, acuminées, en carène, très-ordinairement glabres, mais souvent blanchâtres & très-tomentueuses à leur sommet. La corolle est d'un jaune de soufre; les semences surmontées d'une aigrette plumeuse.

Cette plante croît dans le Levant & sur les côtes de l'Afrique septentrionale, dans le royaume de Tunis. 7

9. SCORZONÈRE à feuilles de chondrille. *Scorzonera chondrilloides*. Poutret.

Scorzonera foliis linearibus, obtusis, subdentatis; caule ramossimo, pedunculis squamosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1505. n°. 21.

Scorzonera chondrilloides. Poutret.

Cette scorzonère a tout le port d'un *chondrilla*, tant dans la forme de ses feuilles, que dans la disposition de ses rameaux nombreux.

Ses tiges sont basses, hautes de quatre à six pouces, très-rameuses; les rameaux épars, diffus, presque dépourvus de feuilles, ou garnis seulement de quelques folioles très-courtes, linéaires, éparfes, sessiles, ordinairement très-entières. Les feuilles radicales sont linéaires, entières, ou très-souvent plus ou moins déchirées à leurs bords; d'autres fois sinuées & légèrement dentées, obtuses à leur sommet; les feuilles caulinaires inférieures moins échanquées à leur contour, presque entières. La corolle est composée de demi-fleurs hermaphrodites; les semences surmontées d'une aigrette sessile & plumeuse; les pédoncules munis de quelques écailles éparfes.

Cette plante se rencontre dans l'Espagne. (Description, ex Willd.)

10. SCORZONÈRE d'Orient. *Scorzonera orientalis*. Linn.

Scorzonera foliis sinuatis, denticulatis, acutis; caulis subnigrescentibus. Linn. Syst. Plant. vol. 3, pag. 618. n°. 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1507. n°. 17.

Cette plante a des tiges basses, presque simples, cylindriques, feuillées, presque à une seule fleur,

garnies de feuilles alternes, glabres, sinuées, profondément dentées, assez semblables à celles du *Leontodon*; les divisions finement denticulées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires, terminales; leur calice composé d'écailles imbriquées; les inférieures environnées d'une large membrane scarieuse; la corolle jaune, de la grandeur de celle du *Scorzonera humilis*.

Cette plante se rencontre dans l'Orient.

11. SCORZONÈRE tubéreuse. *Scorzonera tuberosa*. Pall.

Scorzonera caule uniflora, foliis; foliis linearibus, junctis pubescentibus; radice tuberosa. Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1501. n°. 10.

Scorzonera tuberosa. Pallas, Itin. vol. 3. Append. n°. 131. tab. Y, fig. 3.

Scorzonera humilis, tuberosa, syriaca. Morif. Ox. Hist. 3. 5. 7. tab. 9. fig. 16.

Chondrilla altera, Dioscoridis. Rauw. Itin. 217.

Cette espèce, quoique fort petite, a de très-grosses racines tubéreuses, presque globuleuses, qui en produisent plusieurs autres moins grosses; il s'en élève une tige haute de deux à quatre pouces, cylindrique, presque simple, quelquefois divisée en deux ou trois rameaux, garnie de feuilles alternes, linéaires, aiguës, en carène, pubescentes à leur face inférieure; elles forment de gaines alternes, blanchâtres, membraneuses.

Les fleurs sont terminales, inclinées avant la floraison. Leur calice est pubescent, garni extérieurement d'environ huit petites écailles très-courtes, lâches, réfléchies & sétacées à leur sommet. Les écailles intérieures, à peu près en même nombre, sont aussi longues que la corolle, membraneuses à leurs bords. La corolle est jaune, semiofculéuse; les demi-fleurs de la circonférence de couleur purpurine en dessous, tronqués & crénelés à leur sommet. Les semences sont striées, de la longueur du calice, surmontées d'une aigrette sessile.

Cette plante croît dans les terrains limoneux & desséchés sur les bords du Volga, & dans la Syrie. 7

Les Calmoucks se nourrissent des racines de cette plante.

12. SCORZONÈRE tomenteuse. *Scorzonera tomentosa*. Linn.

Scorzonera foliis ovatis, nervosis, tomentosis, integerrimis, sessilibus. Linn. Syst. Plant. vol. 3, pag. 615. n°. 1. — Pallas, Itin. 3. pag. 682. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1498. n°. 1.

Scorzonera orientalis, latifolia, nervosa, cana

distima & *tomentosa*. Tournef. Inst. R. Herb. Coll. 36.

Ses tiges sont droites, presque simples, immenses, assez semblables, ainsi que les feuilles, au *gentiana asclepiadea*; hautes d'environ un pied. Les feuilles radicales sont ovales, lancéolées, aiguës, pétioles, nerveuses, très-entières, chargées à leurs deux faces d'un léger duvet, ainsi que toutes les autres parties de la plante; les feuilles caulinaires alternes, sessiles, amplexicaules, ovales, acuminées, un peu plus étroites.

Les fleurs sont terminales, situées sur des rameaux florifères, axillaires, solitaires, à peine plus longs que les feuilles, munis d'une ou deux petites folioles lancéolées, & supportant une ou deux fleurs médiocrement pédonculées; les pédoncules axillaires & beaucoup plus courts que les feuilles. Les semences sont cylindriques, striées, couronnées par une aigrette sessile, dont les filaments sont rudes.

Cette plante croît dans l'Arménie. ✕ (*Descript. ex Willd.*)

13. SCORZONÈRE à feuilles étroites. *Scorzonera angustifolia*. Linn.

Scorzonera foliis subulotis, integris; pedunculo incrassato; caule basi villosa. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1113. — Jacq. Vind. 140. — Gnan. Monsp. pag. 406. n°. 2. — Miller, Dict. n°. 5. — Scop. Carn. n°. 90. — Scholl. Barb. n°. 629. — Hoffm. Germ. 273. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 335. — vol. II. pag. 251. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 159. n°. 3. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1503.

Scorzonera caule simplicis, uniflora; foliis linearilanceolatis. Smelt. Sibir. vol. 2. pag. 2. tab. 1.

Scorzonera caule nudo, uniflora; foliis linearibus. Hallet, Helv. n°. 11.

Scorzonera angustifolia, prima. C. Bauh. Pin. 275. — Tournef. Inst. R. Herb. 476. — Garid. Aix. pag. 434.

Tragopogonis species, sive scorzonera humilis, angustifolia. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1061. Icon.

Scorzonera humilis, angustifolia, pannonica, tertia. Clus. Hist. 188. — Idem, Stirp. Pannon. pag. 636. tab. 637.

Scorzonera foliis nervosis, seu viperaria humilis. Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 82. §. 7. tab. 9. fig. 10.

Scorzonera subulata. Lam. Flot. franç. vol. 2. pag. 81. n°. 78.

On distingue cette espèce à ses tiges basses, point rameuses, uniflores; à ses feuilles étroites, entières, subulées.

Ses racines sont simples, épaisses, charnues, laiteuses, brunes en dehors: il s'en élève une ou plusieurs tiges simples ou quelquefois un peu rameuses à leur base, hautes de six à sept pouces au plus, droites, grêles, cylindriques, cotonneuses à leur sommet, velues à leur base, quelquefois entièrement glabres, presque point feuillées, munies à leur base de feuilles radicales nombreuses, ramassées presque en touffe, droites, sessiles, très-étroites, linéaires, à peu près aussi longues que les tiges, très-entières à leurs bords, glabres ou un peu velues, aiguës, subulées à leur sommet; les caulinaires, au nombre d'une à deux, alternes, fort petites, subulées.

Les fleurs sont solitaires, terminales; leur pédoncule, qui n'est que la continuation de la tige, cotonneux, un peu renflé vers son sommet. Les calices sont à peine pubescens avant leur entier développement, glabres, composés d'écaillés imbriquées, inégales; les intérieures beaucoup plus longues, lancéolées, aiguës, un peu membraneuses à leurs bords; les extérieures très-courtes, ovales, lancéolées; celles de la base un peu tomentueuses. La corolle est grande, presque une fois plus grande que le calice, légèrement purpurine extérieurement aux demi-fleurs de la circonférence, jaune en dedans & aux demi-fleurs du centre; les semences oblongues, étroites, couronnées par une aigrette très-fine, dont les poils sont entre-mêlés comme une toile d'araignée.

Cette plante croît dans les pâturages, sur les collines, en France, en Espagne, en Autriche, dans les environs de Montpellier. Je l'ai également observée dans les environs d'Avranches. ✕ (*V. v.*)

14. SCORZONÈRE à feuilles de pin. *Scorzonera pinifolia*. Willd.

Scorzonera foliis subulotis, acutis; calicibus sonatis; caule uniflora, tomentosa. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1503. n°. 15.

Scorzonera caule simplicissimo, uniflora, tomentosa; foliis subulotis, acutis; calicibus cylindricis; pedunculis calicibusque lineatis; seminibus globosis. Gouan, Illustr. 53.

Tragopogon pinifolius, hispanicum. Bartel. Icon. rar. tab. 496. Bona.

Cette espèce a des rapports avec la *scorzonera angustifolia* & le *purpurea*; elle diffère de ces deux plantes par des caractères qui lui sont propres; de la première, par son port & les feuilles subulées; de la seconde, par la couleur de sa corolle.

Ses racines sont simples, fusiformes; elles poussent une tige droite, haute de cinq à six pouces, très-feuillée, chargée d'un duvet blanc & tomentueux. Les feuilles sont très-fertées, étroites, su-

bulbées, aiguës, striées & nerveuses, tomenteuses à leur base, glabres à leur partie supérieure, très-étroites, larges à peine d'une ligne, sur trois & quatre pouces de long; les feuilles radicales plus longues que les autres, souvent égales aux tiges.

Celles-ci ne portent qu'une seule fleur terminale, qui paroit souvent sortir du milieu des feuilles. Son pédoncule est court, lanugineux, renflé vers son sommet. Le calice est cylindrique, coronné, composé d'écaillés larges, imbriquées, acuminées; les intérieures plus grandes, presque longues d'un pouce. La corolle est d'un jaune de soufre, assez semblable à celle de la scorzonère d'Espagne, mais un peu plus grande; les demi-fleurs dilatéés à leur sommet, à cinq dents profondes, d'une couleur violette ou purpurine en dessous. Les semences sont glabres, couronnées par une aigrette blanche.

Cette plante croit en Espagne & dans les départements méridionaux de la France. ♀

15. SCORZONÈRE nerveuse. *Scorzonera nervosa*. Lamarck.

Scorzonera caule subnudo, uniflora; foliis lato-lanceolatis, nervosis, planis. Linn.

Scorzonera humilis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 112. — Horr. Cliff. 382. — Flor. suec. 647. 686. — Mart. medic. 178. — Gort. Ingr. 118. — Miller, Dict. n. 2. — Scholl. Barb. n. 628. — Pollich. Pal. n. 723. — Hoffm. Germ. 272. — Roth. Germ. vol. I. pag. 248. — vol. II. pag. 334.

Scorzonera lanata. Schrank, Bavar. 2. pag. 306.

Scorzonera humilis, latifolia, nervosa. C. Bauh. Pin. 175. — Tournef. Inst. R. Herb. 476.

Scorzonera humilis, latifolia, pannonica. Cluf. Hist. 2. pag. 138.

Scorzonera nervosa. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 81. n. 78.

Tragopogon species, five scorzonera humilis, latifolia. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1061. Icon.

Scorzonera (humilis), caule subnudo, subuniflora, calcinifque squamis lanatis; foliis oblongo-lanceolatis, nervosis, planis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1495. n. 3.

1. *Scorzonera (austriaca), caule subnudo, uniflora, calcinifque squamis glabris; foliis lineari-lanceolatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1498. n. 2.

Scorzonera humilis. Jacq. Austr. tab. 36. — Hoff. Synop. 420.

Scorzonera caule nudo, uniflora; foliis lanceolatis. Haller, Helv. n. 10.

Scorzonera iustriaca, graminifolia. Buxb. Cent. 2. pag. 26. tab. 21. ?

Scorzonera humilis, angustifolia, pannonica. Cluf. Hist. 2. pag. 139.

Scorzonera palustris, pulveriflora. ? Tournef. Inst. R. Herb. pag. 477.

Cette plante, distinguée par ses feuilles lancéolées, planes & nerveuses, par les tiges simples, uniflores, varie dans les proportions de grandeur de ces mêmes parties, & dans la présence ou la privation d'un duvet qui les revêt quelquefois en partie, & je crois que c'est à tort que quelques auteurs ont essayé de former deux espèces de ces variétés.

Les racines sont simples, épaisses, un peu pivotantes; elles produisent des tiges presque simples, tendres, droites, nues ou à peine feuillées, glabres ou un peu coroneufes, cylindriques, particulièrement à leur base, variables dans leur longueur, ayant depuis six pouces jusqu'à un pied & plus de haut. Les feuilles, presque toutes radicales, sont pétiolées, lancéolées, allongées, très-aiguës, élargies presque en ovale-oblong dans leur milieu, rétrécies à leurs deux extrémités, vertes, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures longitudinales assez semblables à celles du plantain lancéolé, très-entières à leurs bords; les feuilles caulinaires rares, étroites, linéaires, sessiles.

Les fleurs sont terminales, foliaires; leur calice imbriqué, composé d'écaillés inégales, glabres ou un peu coteueufes, lancéolées, aiguës. Les corolles sont jaunes, plus grandes que les calices, composées de demi-fleurs hermaphrodites; les semences allongées, étroites, striées, couronnées par une aigrette plumeuse.

Des observations constantes m'ont fait connoître que cette plante, dont les tiges sont coteueufes, surtout à leur base, ainsi que les écaillés calicinales, perdoit son duvet en vieillissant. Dans la variété β , les feuilles sont plus étroites, lancéolées, presque linéaires.

Cette plante croit en France, en Allemagne, dans les prés découverts; je l'ai recueillie dans les environs de Laon. ♀ (V. v.)

C'est à cette plante, dit M. Durande, que l'on doit attribuer plus particulièrement les propriétés diaphorétiques que l'on accorde à la scorzonère d'Espagne & au salis. On peut manger les jeunes tiges; elle plaît à tous les bestiaux. Les cochons bouleversent les prés pour y chercher les racines de cette espèce.

16. SCORZONÈRE à feuilles de gramin. *Scorzonera graminifolia*. Linn.

Scorzonera foliis lineari-ensiformibus, integris, carinatis. Miller, Dict. n. 3. — Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 616. n. 4. — Jacq. Obf. 4. pag. 13. tab. 100.

Scorzonera lufitanica, *gramineo folio*; *flore pallidi luteo*. Buxb. Cent. 2. pag. 26. tab. 21. — Tournef. Inst. R. Herb. 477.

Scorzonera caule ramofo, *foliis linearibus*, *acuminatis*, *carinatis*; *calicibus acutis*. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 4.

Scorzonera (*graminifolia*), *foliis lineariformibus*, *acuminatis*, *rigidis*, *nervosis*, *carinatis*; *calicibus villosis*, *basi foliofo*; *caule subramoso*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1501. n°. 9.

Cette plante se distingue du *Scorzonera nervosa* par ses tiges plus élevées & garnies de feuilles dans toute leur longueur, presque jusque sous le calice des feuilles.

Ses racines sont de couleur brune en dehors, épaisses, charnues, & produisent une ou deux tiges cylindriques, droites, striées, souvent simples, feuillées, quelquefois un peu veineuses, hautes d'environ un pied, glabres, mais légèrement lanugineuses à leur base, surtout au point d'insertion des feuilles. Celles-ci sont alternes, épaisses, glabres, très-entières, linéaires, ensiformes, aiguës.

Les fleurs sont solitaires, terminales. Leur calice est glabre, composé d'écales imbriquées, aiguës, la corolle d'un jaune-clair, assez semblable à celle du *Scorzonera humilis*; les demi-fleurs inégaux, tronqués & dentés à leur sommet.

Cette plante se rencontre dans le Portugal & en Sibérie. x

17. SCORZONÈRE à feuilles de pastel. *Scorzonera glabifolia*. Willd.

Scorzonera caule subuniflora, *foliofo*; *foliis linearilanceolatis*, *acuminatis*, *glabris*, *nervosis*, *planis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1499. n°. 5.

Scorzonera graminifolia. Hoffm. Germ. 271. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 334. — vol. II. pag. 249.

Scorzonera angustifolia, *altéra*. Buxb. Halenf. 298. — Nonn. Erford. 110.

Cette plante, qui se rapproche du *Scorzonera graminifolia*, surtout dans quelques-unes de ses variétés, en diffère, d'après Willdenow, par ses feuilles caulinares plus courtes, point rondes ni relevées en carène; par ses feuilles radicales beaucoup plus longues; par ses calices glabres & nus.

Elle varie beaucoup, tant dans ses feuilles que dans ses tiges. Ces dernières sont droites, munies d'une, de trois ou quatre fleurs: très-souvent elles sont uniflores; les feuilles linéaires, lancéolées ou oblongues-lancéolées, longuement acuminées, rétrécies à leurs deux extrémités, planes, glabres, nerveuses, point dentelées à leurs bords, assez semblables à celles du *Scorzonera hispanica*,

dont elles diffèrent surtout dans les proportions de leur grandeur. Les fleurs sont jaunes, femi-boicéolées; tous les fleurons hermaphrodites.

Cette plante croît sur les collines, en Allemagne, en Bohême & dans la Silésie. x

18. SCORZONÈRE acaule. *Scorzonera acaulis*. Willden.

Scorzonera foliis runcinatis, *glabris*; *scapo nudo*, *uniflora*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1508. n°. 31.

Scorzonera (*taraxaci*), *scapo nudo*, *uniflora*; *foliis lanceolatis*, *runcinato-dentatis*, *acuminatis*. Roth. Beitr. 1. pag. 120. — Idem, Caral. 1. pag. 95.

Cette espèce a le port d'un pissenlit. Ses feuilles sont toutes radicales, glabres, lancéolées, roncées & dentées à leur contour, acuminées à leur sommet. Les tiges sont des hampes nues, terminées par une seule fleur.

Cette plante croît naturellement dans la Silésie. x

19. SCORZONÈRE à petites feuilles. *Scorzonera parvifolia*. Jacq.

Scorzonera caule ramofo, *basi foliofo*; *foliis lanceolato-ensiformibus*, *glabris*, *nervosis*, *planis*, *radio calice breviora*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1500. n°. 7.

Scorzonera (*parviflora*), *caulibus ramofo*; *foliis lineariformibus*, *integriss*; *radio corollae brevissimo*. Murr. Sytl. veget. pag. 710. — Jacq. Flor. austr. vol. 4. tab. 305. — Hoff. Synopl. 421.

Cette plante, assez semblable au *Scorzonera caricifolia*, dont peut être elle n'est qu'une variété, s'en distingue par sa corolle, dont les demi-fleurs de la circonférence sont plus courts que le calice; les tiges rameuses, feuillées seulement à leur partie inférieure; les feuilles glabres, lancéolées, ensiformes, planes, nerveuses, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet.

Cette plante croît en Autriche, dans la Pannonie, dans les prés humides. x

20. SCORZONÈRE à feuilles de laiche. *Scorzonera caricifolia*. Pallas.

Scorzonera caule subuniflora, *foliofo*, *ascendente*; *foliis lanceolato-ensiformibus*, *glabris*, *nervosis*, *planis*; *radio calice longiore*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1500. n°. 6.

Scorzonera caricifolia. Pallas, Itin. 3. Append. n°. 131. tab. J. i. fig. 1.

Ses tiges sont plus ordinairement couchées à leur base, ascendantes, simples, uniflores, feuillées, quelquefois droites & rameuses, garnies de

feuilles lancéolées, glabres, en forme de lame d'épée, planes, nerveuses. Cette plante d'ailleurs se rapproche beaucoup du *Scorzonera parviflora*; elle en diffère en ce que ses tiges sont feuillées dans toute leur longueur, & non pas seulement à leur base, & en ce que les corolles sont, à la circonférence, plus longues que le calice.

Cette plante croît en Sibérie, dans les terrains humides & bas. ¶

21. SCORZONÈRE grêle. *Scorzonera pusilla*. Pall.

Scorzonera foliis filiformibus, apice circinnatis; caule ramosa. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1501. n°. 11.

Scorzonera pusilla. Pallas, Itin. vol. 2. Append. n°. 122. tab. L.

Ses racines sont vivaces, chargées vers leur collet d'un duvet coroneux très-épais: il s'en élève plusieurs tiges droites ou un peu ascendantes, feuillées dans toute leur longueur, rameuses ou divisées en pédoncules florifères. Les feuilles sont allongées, filiformes, frangées à leur extrémité.

Les fleurs ont au nombre de trois ou quatre, rarement davantage. Leur calice est composé d'écaillés larges; les intérieures insensiblement plus étroites & plus longues, mais cependant plus courtes que la corolle. La corolle est composée de demi-fleurs tous hermaphrodites; ceux de la circonférence sont pâles & rarement développés. Les semences renfermées dans le calice agrandi & coinné, sont glabres, striées, couronnées par une très-longue aigrette sessile, plumeuse à sa partie inférieure, pileuse vers son sommet.

Cette plante croît sur les hauteurs, dans le voisinage de la mer Caspienne. ¶

22. SCORZONÈRE à semences velues. *Scorzonera eriosperma*. Marfch.

Scorzonera foliis linearibus, acuminatis, carinatis, basi lanatis; caule ramoso, calicibus incanis, seminibus tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1504. n°. 18.

Scorzonera (eriosperma), foliis lineari-subulatis, canaliculatis, caulique basi sublanatis; seminibus tomentis candidissima tellis. Marfch. Casp. 117. n°. 28. *Exclusa synonymo*.

Cette espèce me paroît très-rapprochée du *Scorzonera hirsuta*, surtout de la variété β; peut-être n'en est-elle elle-même qu'une simple variété. Ces plantes ont pour caractères communs des semences velues.

Celle-ci a des tiges rameuses, lanugineuses à leur base; des feuilles linéaires, acuminées ou subulées, relevées en carène, munies à leur partie inférieure de poils lanugineux. Les calices sont

pubescons, blanchâtres; les semences revêtues d'un duvet très-blanc.

Cette plante croît sur les montagnes, parmi les gazons, dans les terrains sablonneux aux environs de la mer Caspienne. ¶

23. SCORZONÈRE de Crète. *Scorzonera cretica*. Willden.

Scorzonera foliis linearibus, planis, subciliatis; caule basi ramoso, seminibus tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1504. n°. 19.

Scorzonera cretica, angustifolia; semine tomento, candidissimo. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 36.

C'est encore une espèce à semences velues, qui a également beaucoup de rapports avec le *Scorzonera eriosperma*.

Ses racines sont tubéreuses, de la grosseur du doigt, divisées en plusieurs parties. Ses tiges sont ascendantes, hautes de quelques pouces, divisées à leur base en deux ou trois rameaux. Les feuilles sont planes, linéaires, nerveuses, ciliées à leurs bords, particulièrement vers leur base, de la longueur des tiges; les rameaux munis, à leur point d'insertion, d'une petite feuille courte, nus dans toute leur longueur, garnis seulement de quelques écailles courtes, éparées.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux. Leur calice est composé d'écaillés imbriquées; les extérieures très-courtes, pubescentes, membraneuses à leurs bords; les intérieures plus allongées, membraneuses. La corolle ne contient que des demi-fleurs tous hermaphrodites. Les semences sont revêtues d'un duvet coroneux très-blanc, surmontées d'une aigrette sessile.

Cette plante se rencontre dans l'île de Crète. ¶

24. SCORZONÈRE velue. *Scorzonera hirsuta*. Linn.

Scorzonera foliis linearibus, caulique uniflora, hirsuta. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 617. n°. 7. — Mantiss. 278. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 80. n°. 78.

Tragopogon callicibus corollâ brevioribus, foliis integris, strictis, ciliatis; caule hirsuto, pedunculis superius incrassatis. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 157. n°. 2.

Tragopogon hirsutus. C. Bauh. Pin. 247. — Tournef. Inst. R. Herb. pag. 477. — Gatid. Aix. 469. tab. 75.

Tragopogon alter luteus. Col. Ecphr. 1. pag. 234. tab. 233.

Scorzonera (eriosperma), caule basi ramoso, mal-

tiflora; foliis truncatis, subulatis; seminibus lanatis.
Gouan, Illust. 53.

Scorzonera (villosa), foliis linearibus, carinatis, villosis; caule ramofo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1504. n°. 17.

Scorzonera (villosa), tota villosa; caule ramofo, striata; foliis carinatis, integerrimis; seminis ovatis, flavis; extimis subius rubellis. Scop. Carn. n°. 952. tab. 46.

Toutes les parties de cette plante sont velues & ciliées. Ses racines sont épaisses, charnues; elles produisent des tiges presque simples, droites, dures, hautes d'environ six à dix pouces & quelquefois plus, cylindriques, très-velues & même lanugineuses & tomentueuses à leur base. Ces tiges, dans les individus cultivés, sont beaucoup plus élevées, & se divisent vers leur sommet en plusieurs rameaux simples, droits, uniflores. Les feuilles sont alternes, sessiles, étroites, linéaires, effilées, très-aiguës à leur sommet, droites, striées ou nerveulées, longues au moins de la moitié des tiges, canaliculées vers leur base, chargées de quelques poils fins, épars, alongés; ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont foliaires à l'extrémité des tiges, assez grandes, de couleur jaune. Les calices sont presque glabres, composés d'écaillés imbriquées, presque sur deux rangs; les intérieures droites, linéaires, obtuses, beaucoup plus grandes que les autres, membraneuses & blanchâtres à leurs bords, ciliées à leur courour, obtuses à leur sommet; les extérieures beaucoup plus courtes, ovales, obtuses; la corolle une fois plus grande que le calice; les semences velues, couronnées par une aigrette blanchâtre, légèrement plumeuse; le réceptacle nu.

Cette plante croît naturellement dans les départements méridionaux de la France, aux environs d'Aix, dans les lieux secs & stériles. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

La plante β , distinguée par quelques auteurs comme espèce, ne diffère guère de la précédente que par les tiges rameuses, plus élevées; par les feuilles plus fortement relevées en carène; la duvet qui recouvre les tiges, plus épais; la corolle jaune; les demi-fleurs de la circonférence un peu rougeâtres en dehors.

Cette plante se rencontre dans les environs de Tergeste.

25. SCORZONÈRE rude. *Scorzonera aspera.* Desfont.

Scorzonera foliis asperis, lanceolatis, dentato-pinnatis; stylo incurvo; pappo sessili, supernè plumoso. Desfont. Annal. Mus. Paris. vol. 1. pag. 133. tab. 9.

Ses racines sont charnues, pivotantes & latentes, de la grosseur du doigt; elles produisent plusieurs tiges divisées, dès leur base, en quelques rameaux simples, effilés, pubescens, légèrement liliés, droits ou rabattus, longs d'environ un pied & demi, uniflores, garnis inférieurement de feuilles rares, & dans le reste de leur longueur de petites écaillés ou folioles courtes, aiguës. Ces feuilles sont un peu rudes, d'un blanc-cendré; les supérieures sessiles, lanceolées, dentées à leur contour, aiguës à leur sommet; les inférieures & les radicales en forme de spatule, décurrentes sur un pétiole triangulaire, aplati en dessous, inégalement dentées, & même presque pinnatifides, avec de petites dents interrompues entre les divisions, qui sont ovales, distinctes, horizontales; toutes les découpures & les dents terminées par un poil roide.

Les fleurs sont foliaires à l'extrémité de chaque rameau. Leur calice est ovale, alongé, imbriqué, composé d'écaillés filiformes, oblongues, obtuses, serrées, vertes dans leur milieu, blanches & membraneuses à leurs bords. Chaque fleur est formée par des demi-fleurs jaunes, tronqués, finement dentés à leur sommet, dont le tube est velu, filiforme; ils laissent, par leur rapprochement vers la circonférence, un espace vide & circulaire au centre de la fleur. Les anthères sont brunes; le style filiforme, long, arqué, surmonté de deux stigmates courts, recourbés. Les semences sont alongées, velues, cannelées, rétrécies inférieurement, couronnées par une aigrette rougeâtre, sessile, composée de poils roides, barbus depuis leur milieu jusqu'à leur sommet. Le réceptacle est plan, nu, alvéolé.

Cette plante est originaire du Levant, d'où elle a été rapportée par MM. Bruguère & Olivier. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

26. SCORZONÈRE hispide. *Scorzonera asperissima.* Willd.

Scorzonera foliis runcinatis, hispidis; caule subiflora, subsolitosa, hispida. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1507. n°. 29.

Cette espèce a le port du *Leontodon hispidum*, remarquable par ses poils roides, épais, blanchâtres, fourchus à leur sommet, dont les tiges, ainsi que les feuilles, sont chargées.

Ses tiges sont droites, simples, hispides, presque nues, garnies au plus de deux ou trois petites feuilles étroites, acuminées. Les feuilles radicales sont oblongues, roncées, hispides. Les fleurs, au nombre de deux au plus, sont situées à l'extrémité des tiges, portées sur des pédoncules un peu renflés à leur partie supérieure, particulièrement sous le calice. La corolle est jaune, composée

composée de demi-fleurs tous hermaphrodites. Les semences sont oblongues, linéaires, surmontées d'une aigrette plumeuse, un peu pédicellée.

Cette plante croît dans la Galatie. (*Descript. ex Willd.*)

27. SCORZONÈRE à fleurs de crépis. *Scorzonera crepioides*.

Scorzonera caule ramossimo, floribus subpaniculatis; calicibus albidis-pubescentibus, pappo simplici. (N.)

Je ne connois ni la partie inférieure ni les feuilles de cette plante : le caractère de ses fleurs la range parmi les Scorzonères, quoiqu'elle ait l'aspect d'un *crépis*, étant même assez ressemblante au *crépis biennis*.

Ses tiges se divisent en rameaux assez nombreux, grêles, cylindriques, striés, un peu pubescens, ramifiés à leur sommet, nus dans leur longueur, munis, à leur base & à celle de leurs divisions, d'une petite feuille sessile, amplexicaule, linéaire, lancéolée, acuminée, velue.

Les fleurs sont d'une grandeur médiocre, disposées, à l'extrémité des rameaux, en une sorte de panicle, dont les pédoncules sont grêles, blanchâtres, pubescens, inégaux ou supportant quelquefois deux ou trois fleurs pédicellées. Les calices sont ovales, serrés, composés d'écaillés droites, inégales, imbriquées; les intérieures plus longues, étroites, linéaires, obtuses, pubescentes, un peu blanchâtres, presque farineuses; les extérieures très-courtes, ovales. La corolle est jaune, une fois plus longue que le calice, composée de demi-fleurs tous hermaphrodites, denticulés à leur sommet. Les semences sont courtes, ovales, oblongues, striées longitudinalement, surmontées d'une aigrette sessile, très-blanche; les poils fins, simples & foyeux. Le réceptacle est nu.

J'ai recueilli cette plante sur les côtes de Barbarie, dans les environs de la Calle. (*V. v.*)

28. SCORZONÈRE naine. *Scorzonera pumila*.

Scorzonera foliis pinnatifidis, acutis, glabris; scapo squamoso, glabro, aëstifero. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1507. n°. 26.

Scorzonera (acutis), foliis pinnatis; pinnulis linearibus, glabris; apicibus alois. Cavan. Ic. Rar. vol. 2. pag. 19. tab. 121. fig. 2.

Ses racines sont courtes, grêles, cylindriques, garnies de quelques fibres pâres; il s'en élève des tiges courtes, foibles, cylindriques, très-simples, uniflores, longues de deux ou trois pouces, dépourvues de feuilles, garnies seulement de quelques écaillés éparfes, courtes, aiguës. Les feuilles,

Botanique. Tome VII.

toutes radicales, sont étroites, allongées, nombreuses, étendues sur la terre, charnues, d'un vert-foncé, presque pinnatifides; les découpures courtes, linéaires, inégales, aiguës, terminées par une petite glande très-blanche, surmontées d'un petit filet foyeux.

Les fleurs sont grandes, de couleur jaune, solitaires à l'extrémité des tiges. Le calice est allongé, presque cylindrique, composé d'écaillés imbriquées, lancéolées, d'un vert-roussâtre, aiguës. La corolle est formée de demi-fleurs, tous terminés par cinq petites dents; les extérieurs plus longs que les intérieurs. Le réceptacle est nu; les semences étroites, allongées, surmontées d'une aigrette sessile & pileuse.

Cette plante croît en Espagne, aux pieds des montagnes, en face de la mer. ☉ (*Descript. ex Cavan.*)

29. SCORZONÈRE à feuilles de pissenlit. *Scorzonera taraxacifolia*. Jacq.

Scorzonera foliis runcinatis, obtusis, glabris; scapo aphyllis, ramosis; pedunculis incrassatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1508. n°. 30.

Scorzonera (taraxacifolia), foliis runcinatis, in petiolum decurrentibus; scapo ramoso, aphyllis. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 160. — Idem, Collect. 152.

Ses racines sont droites, épaisses, fusiformes, jaunâtres en dehors, garnies de quelques fibres charnues, & de filaments courts, capillaires; il s'en élève plusieurs tiges droites, médiocrement rameuses, dépourvues de feuilles. Les rameaux sont alternes, nus, très-simples. Les feuilles, toutes radicales, ressemblent assez à celles du pissenlit; elles sont lancéolées, allongées, obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, roncées à leurs bords ou échanrées en découpures irrégulières, obtuses, rétrécies & décurrentes sur le pétiole à leur base.

Les fleurs sont solitaires, terminales, supportées par de longs pédoncules simples, striés, un peu renflés à leur sommet. Les calices sont légèrement hispides, composés d'écaillés droites, imbriquées, inégales; les intérieures très-longues, subulées. La corolle est jaune, assez grande; les demi-fleurs obus, tronqués & presque entiers à leur sommet; les semences étroites, subulées, surmontées d'une aigrette courte, simple, sessile.

Cette plante croît dans la Bohême. ♀

30. SCORZONÈRE allongée. *Scorzonera elongata*. Willd.

Scorzonera foliis subulis tomentosis, radicalibus lyratis, caulinis pinnatis; caudiculis subramosis, foliosis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1508. n°. 31.

D

Catananche (γίανκα), *foliis incisif.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1142.

Catananche lutea, foliis variè incisif. Vaill. Aët. Patif. 1721. n°. 216.

Scorzonera græca, saxatilis & maritima; foliis variè laciniatis. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 36. & Itin. vol. 1. pag. 223. tab. 223.

Cette plante, qui est le *catananche græca* de Linné, & qui a déjà été décrite, dans cet ouvrage, sous le nom de *capudone* de Grèce (vol. 1), a paru à Willdenow devoir être rangée parmi les scorzonères, dont elle offre, dans ses fleurs, tous les caractères.

Ses tiges sont droites, nombreuses, simples ou médiocrement rameuses; les feuilles radicales, échancrées en forme de lyre, blanchâtres & tomenteuses en dessous; celles des tiges, pinnatifides, blanches à leur face inférieure, à découpures lancéolées, aiguës; celles des rameaux, simples, rates, entières. Les fleurs sont terminales, supportées par des pédoncules allongés. Les calices sont oblongs, composés d'écailles imbriquées, obtuses, membraneuses à leurs bords. La corolle est jaune; elle contient des demi-fleurs tous hermaphrodites. Les semences sont pileuses, surmontées d'une aigrette sessile, foieuse & dentée. Le réceptacle est nu.

Cette plante croît en Grèce, sur les rochers, dans le voisinage de la mer. (*Descript. ex Willd.*)

31. SCORZONÈRE dichotome, *Scorzonera dichotoma*. Vahl.

Scorzonera foliis radicalibus runcinatis; caule ramofo, dichotomo, subaphyllo. Vahl. Symbol. 2. pag. 89. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 450.

Lactuca flava, foliis ligulatis, flavis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 143.

Ses tiges sont rameuses, dichotomes, presque entièrement dépourvues de feuilles, qui sont remplacées par une petite foliole en forme d'écaille, à l'insertion de chaque rameau. Les feuilles radicales sont presque en lyre, sinuées ou roncées, munies, à leurs bords, de petites dents très-inegales, mucronées, épineuses, très-nombreuses. Les feuilles caulinaires, lorsqu'il en existe, sont amplexicaules, situées à leur contour.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux. Leur calice est glabre, composé d'écailles inégales, imbriquées; celles de la base, membraneuses à leurs bords, plus petites, & formant presque un second calice. La corolle est d'un jaune-foncé; elle renferme des demi-fleurs tous hermaphrodites. Les semences sont tudes, aigrettes; le réceptacle nu.

Cette plante croît en Egypte: M. Desfontaines

l'a également recueillie sur les côtes de la Barbarie, dans le royaume de Tunis. x

32. SCORZONÈRE du Cap. *Scorzonera capensis*. Thunb.

Scorzonera foliis lineari-lanceolatis, glabris; caule paniculato. Thunb. Prodr. 41. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1505. n°. 10.

M. Thunberg, qui a observé & recueilli cette plante au Cap de Bonne-Espérance, ne l'a indiquée que par une notice trop concise pour nous en donner une idée bien exacte. Ses feuilles sont glabres, linéaires, lancéolées; les tiges se divisent en rameaux nombreux, qui forment, par leur ensemble, une sorte de panicule terminale.

33. SCORZONÈRE pinnatifide. *Scorzonera pinnatifida*. Mich.

Scorzonera caule trebbo, trifloro; pedunculis elongatis, foliis lanceolatis, acutissimis, acutè pinnatifidis, interdum varietè dentatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 89.

Cette plante, d'après Michaux, doit être distinguée, de ses congénères, par ses feuilles lancéolées, très-aiguës, pinnatifides; les pinnules aiguës, quelquefois médiocrement dentées. Ses tiges sont droites, ordinairement munies de trois fleurs, supportées chacune par un pédoncule allongé, uniflore.

Cette plante croît dans les terrains incultes, à la Caroline. (*Descript. ex Mich.*)

Espèces peu connues,

* *Scorzonera* (ciliata), caule procumbente, ramofo, scabro; pedunculis squamosis, foliis retrorsum, alternatim obtusis sinuato-dentatis, glabris, marginè aculeis, ciliatis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 143. n°. 55.

* *Scorzonera* (hispida), foliis linearibus dentatis, ciliatis; scapis unifloris. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 215. n°. 73.

SCOTIE. *Scotia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs papilionacées, de la famille des légumineuses, qui à des rapports avec les *casta*, & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, munies de stipules subulées; les fleurs fasciculées ou en épis.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice turbiné, à cinq découpures; cinq pétales connexes, oblongs, formant un tube ventru; dix étamines libres, inégales; une gousse périculée.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, turbiné, de la même couleur que les pétales, caduc, divisé médiocrement en cinq lobes à son bord.

2°. Une corolle à cinq pétales ovales-oblongs, égaux, réguliers, insérés sur le bord du calice, réunis latéralement en un tube ventru.

3°. Dix étamines libres, dont les filaments sont filiformes, inégaux, les plus longs dépassant un peu les pétales, terminés par des anthères inclinées.

4°. Un ovaire pédicellé, oblong, point anguleux, surmonté d'un style un peu courbé, plus long que les étamines, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une gousse pédicellée, qui n'est encore qu'imparfaitement connue.

E S P È C E.

SCOTIE éclatante. *Scotia speciosa*. Jacq.

Scotia foliis pinnatis, foliolis parvis, acutis; floribus coccineis, sub fasciculatis, spicatis. (N.)

Scotia speciosa. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 75. — Idem, Collect. 1. pag. 93. — Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 56. — Juss. Genet. Plant. pag. 347. — Lam. Illustr. Gener. tab. 331.

Scotia afro. Thunb. Prodr. 79.

Theodora speciosa. Medic. Monograph. pag. 16. tab. 1.

Guaicum (afrum), *foliis multijugis, acutis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 547.

Gailardinoides. Hort. Cliff. 439.

Acacia africana, quae acacia similis; foliis myrti parvis, aculeatis, pinnatis; flore coccineis, tetrapetaloides. Walth. Hort. 2. tab. 2.

Afra arbor, acacia similis; foliis myrti aculeatis, spicatis. Boerh. Lugd. Bar. 2. pag. 57.

Petit arbrisseau auquel la belle couleur rouge de ses fleurs donne de l'éclat, dont les riges sont très-dures, presque ruberculées, divisées en rameaux durs, roides, inégaux, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de folioles fort petites, ovales, un peu oblongues, opposées, très-entières, fermes, roides, persistantes, glabres à leurs deux faces, mucronées, &c. piquantes à leur sommet, dont le pétiole commun est articulé, canaliculé, bordé latéralement, muni à sa base de stipules fort petites, appliquées contre les rameaux, subulées.

Les fleurs sont d'une belle couleur rouge, assez

grandes, disposées latéralement, sur les rameaux ou à leur extrémité, en un épi court, sur lequel elles sont presque fasciculées ou en bouquet. Leur calice est coloré, turbiné, divisé à son orifice, en cinq lobes peu profonds. La corolle est composée de cinq pétales égaux, ovales, oblongs, obtus, quelquefois un peu crénelés à leur contour. L'ovaire est supérieur, pédicellé.

Cette plante croît au Sénégal & au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. f.)

SCROPHULAIRE. *Scrophularia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des scrophulaires, qui a des rapports avec les *didymas*, &c. qui comprend des herbes ou des arbrisseaux, les uns exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les tiges sont tétragones, les feuilles très-souvent opposées, les pédoncules multiflores, munis de deux bractées à leur point de division; les fleurs paniculées, en épis, opposées, axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq lobes; une corolle presque globuleuse; le tube court & renflé; le limbe irrégulier, presque labié, à cinq découpures; les deux supérieures horizontales, orbiculaires; l'inférieure réfléchie à son lobe du milieu; quatre étamines didymes; un style; une capsule acuminée, à deux loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, à cinq découpures arrondies, obtuses, plus courtes que la corolle.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, dont le tube est renflé, globuleux, assez grand; le limbe petit, à cinq divisions; les deux supérieures grandes, horizontales, orbiculaires; deux latérales étalées; une troisième inférieure, réfléchie.

3°. Quatre étamines dont les filaments sont linéaires, inclinés, didymes, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères à une seule loge, qui s'ouvrent transversalement à leur sommet.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un style simple.

Le fruit est une capsule arrondie, acuminée, à deux loges, à deux valves, dont la cloison est formée par le bord rentrant des valves.

Les semences sont nombreuses & fort petites; le réceptacle arrondi, pénétrant dans les deux loges.

Observations. Les scrophulaires forment un genre très-naturel, dans lequel les espèces se trouvent rapprochées par un grand nombre de caractères tirés, soit de leur port habituel, soit des parties essentielles de la fructification : plusieurs ont même tant d'affinité entr'elles, que, quoique réellement distinctes, il est difficile de leur assigner un caractère bien tranché. La disposition des fleurs, celle des feuilles, la forme des calices & de la corolle varient peu, & n'offrent la plupart de différences essentielles que dans leur grandeur relative, leur couleur, &c.

E S P È C E S.

1. SCROPHULAIRE nouveuse. *Scrophularia nodosa*. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, trinervatis; caule obtusangulo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 863. — Mater. medic. 156. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 193. — Gunn. Norveg. n°. 732. — Tab. 4. fig. 1-3. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 775. — Pollich. Pal. n°. 590. — Ludw. E&T. tab. 72. — Kniph. Centur. 2. n°. 81. — Hoffm. Germ. 220. — Roth. Germ. vol. I. pag. 166. — vol. II. par. 58. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 335. n°. 390. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 288. n°. 1.

Scrophularia foliis cordatis, racemo terminali. Hort. Cliff. 322. — Flor. Succ. 520, 560. — Roy. Lugd. Bat. 293. — Gronov. Virgin. 71. — Dalib. Paris. 191.

Scrophularia caule quadrangulo, paniculato; foliis cordatis, oblongis. Haller. Helv. n°. 326.

Scrophularia foliis cordatis, basi transversis; caule & ramis, spicâ nudâ, paniculatâ, terminatis. Crantz. Ault. pag. 325.

Scrophularia nodosa, feida. C. Bauh. Pin. 235. — Tourn. Inst. R. Herb. 166.

Scrophularia. Camet. Epitom. 866. — Rivin. tab. 106. — Blacw. tab. 87. — Dodon. Pempt. pag. 50. Icon.

Scrophularia major. Lobel. Icon. 533.

Scrophularia vulgaris & major. J. Bauh. Hist. 3. pag. 421. Icon.

Scrophularia radicenodosa. Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 1. tab. 6. fig. 3.

Vulgairement la grande scrophulaire, l'herbe aux hémorrhoides.

Cette plante se distingue de la *scrophularia aquatica* par ses racines noueuses, par ses feuilles à dentelures très-aiguës, par ses tiges légèrement ailées.

Ses racines sont un peu horizontales, dures, épaisses, noueuses, noirâtres, presque tuberculeuses, munies de fibres assez fortes : il s'en élève des tiges étroites, dures, quadrangulaires, d'un

vert-noirâtre, hautes de deux à trois pieds, glabres, rameuses, striées, garnies de feuilles pétioles, opposées, quelquefois ternées, d'un vert-foncé, glabres à leurs deux faces, ovales, lancéolées, très-aiguës à leur sommet, un peu cordiformes à leur base, dentées inégalement à leur contour; les dents fort aiguës, marquées en dessous de nervures assez fortes.

Ses fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des riges, en une grappe longue, rameuse, nue, quelques-unes inférieures, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, chacune des divisions garnie à sa base de petites bractées très-courtes, filiformes, aiguës. Le calice est d'un vert-foncé, divisé en cinq découpures un peu arrondies, obtuses, très-glabres; la corolle d'une couleur pourpre-foncée, courte, presque à deux lèvres; le tube renflé. Le fruit est une capsule arrondie, acuminée, à deux loges polypermes.

Cette plante croît dans les lieux couverts, les bois & les haies, dans les différentes contrées de l'Europe septentrionale. (V. v.)

Cette scrophulaire a une odeur forte & désagréable; les feuilles sont résolutives & détersives : on les emploie extérieurement pour calmer les douleurs hémorrhoidales, & déterger les vieux ulcères. Les semences passent pour vermifuges. On prescrit aussi ces mêmes feuilles en gargarisme contre les équinancs. Les chèvres se nourrissent assez volontiers de cette plante, mais les autres bestiaux n'en veulent point. Les fleurs plaisent beaucoup aux abeilles. On a faussement prétendu que les feuilles corrigeoient le goût du féné; le decoction le rend plus vénéux. Autrefois on portoit dans les poches les tubercules des racines pour dissiper les hémorrhoides. On fait aujourd'hui à quoi s'en tenir sur ces prétendus moyens curatifs.

2. SCROPHULAIRE du Maryland. *Scrophularia marylandica*. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, serratis, acutis, basi rotundatis; caule obtusangulo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 863. — Hort. Upsal. 177. — Miller, Dict. n°. 16. — Kniph. Centur. 2. n°. 80. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 269. n°. 1.

Scrophularia foliis cordatis, oppositis; racemo terminali. Gronov. Virgin. 71.

Scrophularia marylandica, longo profunde serrato, utriculato. Rai, Suppl. 396.

Cette espèce est très-voisine de la *scrophularia nodosa*, à laquelle elle ressemble presque dans toutes ses parties; elle diffère par ses tiges au moins une fois plus élevées, par ses feuilles échancrées en cœur à leur base, dentées en scie à leur contour, arrondies à leur partie inférieure, aiguës à leur sommet, mais sans les trois nervures qui ca-

rafférissent les *Scrophularia aquatica*; les pétioles légèrement barbus des deux côtés; les tiges sont tétragones, les angles obtus; les fleurs disposées en une grappe terminale.

Cette plante se rencontre dans la Virginie. ✕

3. SCROPHULAIRE AQUATIQUE. *Scrophularia aquatica*. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, petiolatis, decurrentibus, obtusis; caule membranatis, angulato; racemis terminalibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. — Hort. Upsal. 177. — Mater. medic. t. 56. — Crantz. Aultr. 316. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 776. — Pollich. Pal. n°. 597. — Oeder. Flor. dan. tab. 507. — Blackw. tab. 86. — Kniph. Centur. 11. n°. 92. — Sabbat. Hort. 2. tab. 89. — Hoffm. Germ. 220. — Roth. Germ. vol. I. pag. 266. — vol. II. pag. 59. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 270. n°. 3. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 324. n°. 390. — Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 289. n°. 2. — Gouan, Monsp. pag. 305. n°. 2.

Scrophularia caule quadrangulo, alato, paniculato; foliis ovato-lanceolatis. Haller. Helv. n°. 325.

Scrophularia foliis cordatis; petiolorum alis in caulem decurrentibus. Guettard, Stamp. vol. 2. pag. 201.

Scrophularia foliis oppositis, ex elliptico decrescentibus; caule & ramo paniculatis nudisque; spicis terminalibus. Sauvag. Monsp. 138.

Betonica aquatica. Dodon. Pempt. pag. 50. Ic.

Scrophularia radice fibrosa, betonica foliis. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 8. fig. 4.

Scrophularia aquatica, major; caule semibratio. Loefel. Pruss. 248. tab. 75.

Scrophularia maxima, radice fibrosa. J. Bauh. Hist. 3. pag. 421. Icon.

Scrophularia aquatica, major. C. Bauh. Pin. 235. — Tournef. Inf. R. Herb. pag. 166. — Garidel, Aix. pag. 455. — Magn. Botan. Monsp. 234.

Volgairement la *Scrophularia aquatique*, bétoune aquatique, herbe du liège.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la *Scrophularia nodosa*; elle en diffère par ses racines fibreuses, point tuberculées ni noueuses; par les tiges médiocrement ailées, par ses feuilles obtuses, tant à leur sommet, qu'à leur crénelure.

Ses racines sont composées de fibres grêles, touffues, presque fasciculées; elles produisent des tiges droites, très-glabres, tétragones, rameuses, un peu ailées sur leurs angles, hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles opposées, pétiolées, en cœur à leur base, ovales, oblongues; les

supérieures plus étroites, médiocrement échan-crées à leur base, obtuses à leur sommet, simplement crénelées à leur contour; les crénelures obtuses, quelquefois terminées par une très-petite pointe courte; vertes, glabres à leurs deux faces, un peu plus pâles en dessous, nerveuses; les pétioles comprimés, élargis, amplexicaux à leur base.

Les fleurs forment une longue grappe droite, terminale, nue, en forme d'épi, composé de plusieurs petites grappes opposées, rameuses à l'extrémité du pédoncule commun, garnies de bractées opposées, étroites, lancéolées; celles des ramifications supérieures beaucoup plus petites. La corolle est rougeâtre & de couleur ferrugineuse.

Cette plante croît en Europe, sur le bord des eaux courantes & des ruisseaux. ♂ (V. v.)

Son odeur est moins forte que celle de la *Scrophulaire* nouvelle. On lui attribue à peu près les mêmes propriétés, mais son usage intérieur est suspect: on l'emploie à l'extérieur comme détersive; elle corrige un peu la saveur du féné, mais elle fatigue beaucoup l'estomac.

4. SCROPHULAIRE AUCULÉE. *Scrophularia auriculata*. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, subius tomentosis, basi appendiculatis; racemis terminalibus. Linné, Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. — Allion. Flor. pedemont. n°. 250. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 56.

Scrophularia foliis oblongis, cordatis, subius hirsutis, duplicato-dentatis, basi appendiculatis; petiolis aequalibus, racemis terminalibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 270. n°. 4.

Betonica aquatica septentrionalium. Lobel, Icon. 533.

β. *Scrophularia (sulphurea) foliis cordato-oblongis, basi appendiculatis; racemis terminalibus*. Lxcll. It. — Linn. Spec. Plant. 620. — Miller, Dict. n°. 3.

Scrophularia aquatica, flore sulphurea. Mich.

Cette espèce a le port du *Scrophularia nodosa*, mais dépourvue de tubercules à ses racines. Ses tiges sont droites, glabres ou un peu pileuses, simples ou médiocrement rameuses, quadrangulaires, hautes d'environ un pied & demi, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ridées, oblongues, en cœur à leur base, obtuses à leur sommet, chargées en dessous de poils très-courts, glabres à leur face supérieure, longues d'environ quatre pouces, larges d'un pouce & demi, quelquefois plus étroites, munies, à leur contour, d'une double dentelure; les dents inégales, ova-

les, un peu obtuses; les inférieures sont un peu ailées à leur base; les pinnules, au nombre de deux ou quatre, lobées; le lobe terminal plus grand, ovale, en cœur; les feuilles supérieures simples, en forme de cœur.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en grappes nues, presque verticillées; les pédoncules communs courts, simples, opposés, dichotomes à leur sommet; les divisions rameuses, munies de bractées petites, linéaires, plus courtes que le calice, situées à la base de chaque pédicelle. Le calice est persistant, à cinq découpures arrondies, ferrées, membraneuses à leurs bords. La corolle est de couleur purpurine, ouverte, assez semblable à celle du *Scrophularia nodosa*, mais un peu plus petite; l'orifice du tube est garni d'une lame orbiculaire. Le fruit est une capsule en forme de poire, glabre, aiguë, à deux lozes, à deux valves, marquée de chaque côté d'un sillon longitudinal; elle renferme des semences noires, oblongues, fort petites, ridées & ponctuées, attachées à un réceptacle central.

Cette plante croît en Espagne, dans le comté de Nice & aux environs d'Alger. (V. f.)

La plante paraît être une variété de la précédente, dont la différence consiste principalement dans la couleur des fleurs d'un vert-jaunâtre ou un peu couleur de soufre.

5. SCROPHULAIRE appendiculée. *Scrophularia appendiculata*. Jacq.

Scrophularia foliis ovatis, cordatis, glabris, inciso-ferratis, basi appendiculatis; petiolis dilatatis; racemis terminalibus, compositis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 271. n° 5.

Scrophularia (appendiculata), foliis cordatis, inciso-ferratis, glabris, infimis varietate appendiculatis; racemis terminalibus, compositis. Jacq. Hort. Schoub. 3. pag. 19. tab. 286.

Scrophularia (Izergiana), glabra; foliis cordatis, obtusis dentatis, incisifs; racemo terminali, composito, aphyllis. Vahl, Symbol. 2. pag. 67.

Ses tiges sont droites, glabres, quadrangulaires, garnies de feuilles opposées, ovales, en cœur, munies, à leur contour, d'une double rangée de dents en scie ou médiocrement incisées; les radicales pétiolées, munies vers leur base, sur leur pétiole, de deux ou quatre folioles alternes; il n'en existe que deux sur les feuilles caulinaires; elles sont étroites, lancéolées, médiocrement pétiolées, dentées en scie à leur contour, situées à la base de la feuille. Les pétioles sont glabres, dilatés, plus élargis à leur partie supérieure.

Les fleurs sont assez semblables à celles du *Scrophularia nodosa*; mais plus grandes, d'un pourpre foncé ou un peu jaunâtres, disposées en un long

épi terminal, composé de petites grappes opposées, axillaires, supportées par un pédoncule rameux à sa base, dont les divisions sont munies, à leur base, de deux bractées opposées, lancéolées, aiguës. Les fruits sont glabres, globuleux, acuminés.

Cette plante croît dans le royaume de Tunis. ?

6. SCROPHULAIRE à feuilles de mélisse. *Scrophularia scorodonia*. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, duplicato-ferratis; racemo composito, foliis interstinctis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. — Roven, Lugd. Bar. 296. — Hudf. Angl. 240. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 195. n° 5. ? — Miller, Dict. n° 5. — Allion. Flor. pedem. n° 251. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 55. — Gouan, Monsp. pag. 304. n° 3. — Blakw. tab. 87. — Lam. Illustr. Gener. tab. 533.

Scrophularia foliis cordatis, duplicato-ferratis, pubescentibus; panicula terminalibus, trichotomis, foliis interstinctis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 541. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 271. n° 6.

Scrophularia foliis oblongo-cordatis, oppositis, inaequaliter ferratis; racemo composito. Sauv. Monsp. 138.

Scrophularia melissi folio. Tourn. Inst. R. Herb. pag. 166. — Schw. Specim. n° 546.

Scrophularia scorodonia folio. Pluken. Almag. pag. 338. tab. 59. fig. 5. — Rai, Hist. 766. — Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 482. 5. f. tab. 35. fig. 6.

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce & le *Scrophularia nodosa*, le *Scrophularia auriculata*. On la distingue à ses feuilles légèrement pubescentes en dessous, point ailées à leur base, dont la dentelure est aiguë; les fleurs presque paniculées, feuillées.

Ses tiges sont droites, tétragones, pileuses, saillantes à leurs angles, médiocrement rameuses, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles pétiolées, opposées, ovales, oblongues, élargies & échancrées en cœur à leur base, rétrécies & obtuses à leur sommet, vertes, glabres à leur face supérieure, légèrement pubescentes en dessous, à double dentelure à leur contour; les dents aiguës, inégales, un peu mucronées; les feuilles inférieures obtuses.

Les fleurs sont presque disposées en une panicle lâche, terminale, allongée. Les rameaux inférieurs sortent de l'aisselle des feuilles supérieures; les rameaux supérieurs dépourvus de feuilles. Les pédoncules communs fort alternes, rameux; les partiels inégaux, filiformes, munis à leur base de

bractées petites, étroites, subulées. Les calices sont divisés en cinq découpures ovales, obtuses, environnées d'un rebord blanc & membraneux. La corolle est semblable à celle du *Scrophularia canina*, & de la même grandeur.

Cette plante croît dans le Portugal, en Italie, dans l'île de Jersey & dans le royaume de Tunis. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

7. SCROPHULAIRE glabre. *Scrophularia glabrata*. Aiton.

Scrophularia foliis oblongo-lanceolatis, cordatis, duplicato-ferratis, glabris; paniculis racemosis, terminalibus, trichotomis; caule suffruticoso. Aiton; Hort. Kew. vol. 2. p. 341. — Jacq. Hort. Schönb. 2. pag. 44. tab. 209. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 272. n° 7.

Cette plante a des tiges glabres, un peu frutescentes, droites, médiocrement rameuses, tétragones, garnies de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces, garnies à leur base d'une double dentelure; les dents obtuses, en scie. Les fleurs sont disposées en une panicule composée de grappes partielles, terminales; la plupart trichotomes, dépourvues de feuilles.

Cette plante croît naturellement aux îles Canaries. 8

8. SCROPHULAIRE à feuilles de bétoine. *Scrophularia betonicifolia*. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, oblongis, dentatis; dentibus integerrimis, bases profundioribus. Linn. Mantiss. 87. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 272. n° 8.

Scrophularia betonica folio. Tourn. Inst. R. Herb. 166.

Scrophularia aquatica, montana, mollior. Barrel. Ic. 274. Mala.

Scrophularia (cordata), foliis cordato-sagittatis, acutis ferratis; racemis terminalibus. ? Miller, Dict. n° 4.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, quadrangulaires, légèrement pubescentes, un peu rougeâtres ou purpurines à leur base, rameuses; les rameaux opposés, très-ouverts, striés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, oblongues, en cœur à leur base, environ trois fois plus longues que larges, ridées, glabres en dessus, un peu pubescentes à leur face inférieure, dentées à leur contour; les dents acuminées, irrégulières; celles de la base plus profondes; les pétioles beaucoup plus courts que les feuilles.

Les fleurs forment une panicule terminale, médiocrement

feuillée, composée de grappes latérales, opposées, axillaires, munies de bractées très-étroites, linéaires, lancéolées. La corolle est d'un pourpre-noirâtre, verte à une de ses lèvres; les anthères très-jaunes; les capsules glabres, un peu arrondies, acuminées.

Cette plante croît dans le Portugal. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

9. SCROPHULAIRE d'Orient. *Scrophularia orientalis*. Linn.

Scrophularia foliis lanceolatis, ferratis, petiolatis; caulibus ternis, ramis oppositis. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 147. n° 7. — Mill. Dict. n° 12. Pallas, Itin. vol. 3. pag. 651. — Kniph. Centur. 5. n° 80. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 273. n° 9.

Scrophularia foliis lanceolato-linearibus, acutis ferratis, inferis incisis; racemo composito. Roy. Lugd. Bat. 249.

Scrophularia orientalis, foliis cannabinis. Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. 9.

Il est facile de distinguer cette espèce à ses feuilles étroites, lancéolées, incisées à leur partie inférieure ou presque ternées.

Les tiges sont droites, rameuses, hautes de deux ou trois pieds, glabres, quadrangulaires, striées, garnies de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, glabres, vertes à leurs deux faces, un peu pâles en dessous, veinées, aiguës, acuminées à leur sommet, longues d'environ trois pouces sur un demi-pouce & plus de large; les nœuds entières; d'autres incisées vers leur base ou presque ternées, finement dentées en scie à leur contour; les dents inégales, très-aiguës; les pétioles courts, canaliculés.

Les fleurs forment une longue panicule terminale, composée de grappes latérales, alternes, un peu étalées, rameuses, munies de bractées courtes, aiguës. Le calice est glabre, verdâtre, divisé en cinq découpures courtes, ovales, très-obtuses, environnées, à leur contour, d'un liseret blanchâtre & membraneux. La corolle est purpurine ou un peu verdâtre, d'une grandeur médiocre, presque globuleuse, une fois plus grande que le calice. Les capsules sont glabres, ovales, un peu globuleuses, aiguës.

Cette plante croît dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

10. SCROPHULAIRE frutescente. *Scrophularia frutescens*. Linn.

Scrophularia foliis subcarneosis, sessilibus, apice recurvis. Linn. Syst. veget. pag. 366.

Scrophularia foliis lanceolatis, obtusis, ferrato-dentatis; pedunculis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 2.

pag. 866. — Mantiff. 418. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 56.

Scrophularia foliis subcarnosis, superioribus sessilibus, dentatis, glabris, apicè recurvis; paniculâ racemosa; pedunculis bifidis, multifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 273. n°. 10.

Scrophularia foliis lanceolatis, obtusis, serrato-dentatis; pedunculis bifidis. Roy. Lugd. Bat. 294.

Scrophularia lusitanica, frutescens, verbenaca foliis. Tournef. Inst. R. Herb. 167. — Rai, Suppl. 396. — Schaw. Specim. n°. 345.

Scrophularia peregrina, frutescens; foliis tenui crassifolius. Herm. Lugd. Bat. pag. 345. tab. 347.

Un caractère particulier à cette espèce est d'avoir la pointe de ses feuilles supérieures fortement recourbée, presque sessiles.

Ses tiges sont droites, frutescentes, rameuses à leur partie inférieure, tétragones, glabres, aiguës à leurs angles, garnies de feuilles ovales, un peu charnues, glabres à leurs deux faces, de couleur verte; les inférieures pétiolées, dentées, obtuses à leur sommet; les supérieures & terminales presque sessiles, assez petites, ovales, luisantes, un peu oblongues, dentées irrégulièrement à leurs bords; les dents aiguës; leur sommet acuminé, très-souvent recourbé.

Les fleurs sont composées de petites grappes la plupart opposées, situées, à l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles supérieures. Les pédoncules sont opposés, souvent trifides ou bifides; les bractées entières, étroites, aiguës, à peu près aussi longues que les pédoncules partiels. Le calice est divisé en cinq découpures verdâtres, courtes, un peu ovales, obtuses, colorées à leurs bords. La corolle est petite, d'un pourpre foncé; les découpures latérales de couleur blanche; l'inférieure fort petite; les capsules arrondies, petites, aiguës.

Cette plante croît dans le Portugal, & se rencontre aussi dans le royaume de Tunis, proche Elhammah. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

11. SCROPHULAIRE des rochers. *Scrophularia rupestris.* Willd.

Scrophularia foliis oblongis, petiolatis, dentatis, glabrisculis; racemo terminali, pedunculis trifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 274. n°. 11.

Scrophularia rupestris. Marshall ab Bieberstein.

Cette espèce, d'après Willdenow, a de très-grands rapports avec le *Scrophularia frutescens*, dont elle n'est peut-être qu'une simple variété. Elle en diffère par ses tiges plus basses, hautes d'un demi-pied, légèrement pubescentes; par ses feuilles toutes pétiolées, oblongues, plus roides, plus petites; par une grappe terminale, dont les pé-

doncules sont trifides, composés de trois fleurs, garnies de bractées fort petites, obtuses, non aiguës.

Cette plante croît dans la Tauride, sur les rochers. x

12. SCROPHULAIRE hétérophile. *Scrophularia heterophylla.* Willden.

Scrophularia foliis subcarnosis, ternatis, trilobis simplicibusque; paniculâ racemosa, caule frutescente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 274. n°. 12.

Scrophularia cretica, frutescens; folio vario, crassiflori. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. pag. 9.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux quadrangulaires, à angles obtus, garnis de feuilles opposées, glabres, charnues; les inférieures ternées; les deux folioles latérales oblongues, obtuses, six fois plus petites que la terminale; celle-ci profondément divisée en trois lobes inégaux, incisés, dentés; les dents écartées, obtuses; les supérieures sont, les unes à trois lobes, les autres elliptiques, rétrécies à leur base, dentées, incisées.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, nue, composée de grappes très-longues, réunies deux par deux. Cette plante se rapproche, par la forme de ses feuilles simples, du *Scrophularia frutescens*, mais toutes ses feuilles sont longuement pétiolées.

Cette espèce se rencontre naturellement dans l'île de Crète. h (Descript. ex Willd.)

13. SCROPHULAIRE de Sibérie. *Scrophularia altaica.* Willden.

Scrophularia foliis cordatis, duplicato-dentatis, dentibus inferioribus, basin respicientibus; racemo terminali composito; pedunculis bi-triflorisque alternis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 274. n°. 13.

Scrophularia (altaica), foliis cordatis, ovatis, duplicatè dentato-serratis, dentibus basin respicientibus; racemo composito, aphylo. Murr. Comment. Goett. 1781. pag. 35. tab. 2.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, échan-crées en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces, munies à leur contour d'une double rangée de dents en scie; les inférieures dirigées vers la base. Les fleurs sont disposées presque en grappes terminales; les unes situées à l'extrémité des rameaux, les autres dans leur dichotomie, dépour-vues de feuilles. Les corolles sont d'un jaune-pâle.

Cette plante croît sur les montagnes élevées de la Sibérie. x

14. SCROPHULAIRE précoce. *Scrophularia vernalis.* Linn.

Scrophularia

Scrophularia foliis cordatis, pubescentibus, duplicato-ferratis; paniculis axillaribus, aichotomis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 342. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 274. n° 14.

Scrophularia foliis cordatis, caulinis ternis; pedunculis axillaribus, solitariis, bifidis. Linn. Syst. veget. pag. 469. — Miller, Dict. n° 13. — Hoffm. Germ. 120. — Roth Germ. vol. 1. pag. 266. — vol. II. pag. 59. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 335. n° 390.

Scrophularia foliis longè petiolatis, cordatis, subhirsutis; petiolis in alis ramosis. Haller, Helv. n° 327.

Scrophularia foliis cordatis, pedunculis axillaribus, solitariis, dichotomis. Linn. Spec. Plant. pag. 60. — Hort. Cliff. 322. — Hort. Upf. 177. — Royen, Lugd. Bat. 293. — Gouan, Monip. pag. 304. n° 4.

Scrophularia foliis oppositis, cordatis; pedunculis solitariis, lateralibus, multifloris. Sauvag. Monip. 119 & 166.

Scrophularia flore luteo. C. Bauh. Pin. 236, & Prodr. 112. tab. 112. — Rivia. tab. 107. — Tournef. Inst. R. Herb. 166.

Scrophularia lutea, magna, amplis foliis. J. Bauh. Hist. 3. pag. 422. Icon.

Scrophularia montana, maxima, latifolia. Barrel. Icon. rar. tab. 275.

Lamium pannonicum, secundum, exoticum. Clus. Hist. 2. pag. 38.

β. *Scrophularia bracteæ ad pedunculis divisionem ovatis, densatis, florum longitudine.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 275.

Scrophularia vernalis. Weder. Flor. dan. tab. 411.

Cette espèce est remarquable par ses tiges & ses feuilles velues ou pubescentes, à dentelures inégales, aiguës, par ses grappes axillaires, la plupart dichotomes; par ses fleurs jaunâtres.

Ses tiges sont droites, assez fortes, fistuleuses, striées, quadrangulaires, hautes de deux pieds & plus, rameuses, chargées de poils courts, garnies de feuilles opposées, pétiolées, assez grandes, ovales, en cœur à leur base; les inférieures presque aussi larges que longues, supportées par des pétioles planes, très-longues, fort velues; les supérieures plus petites, plus étroites, d'un vert foncé, glabres à leur face supérieure, velues ou pubescentes en dessous, traversées par des veines noires, irrégulièrement incisées ou dentées à leur contour; les dents inégales, aiguës, placées sur un double rang.

Les fleurs sont disposées, dans les aisselles des feuilles supérieures, par petites grappes en forme

Botanique. Tome VII.

de bouquets, dont le pédoncule commun est plus long que les feuilles, cylindrique, dichotome ou trifide; les divisions rameuses à leur sommet, munies de bractées linéaires, lancéolées, presque entières. La corolle est jaune, globuleuse, très-resserrée à son ouverture.

La variété β, d'après Willdennow, a des feuilles munies de dents obtuses; les bractées inférieures & celles des premières divisions du pédoncule, grandes, ovales, dentées.

Cette plante croît en Italie, en Suisse, en Autriche, & dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

15. SCROPHULAIRE élégante. *Scrophularia arguta.* Aiton.

Scrophularia foliis cordatis, glabris, duplicato-ferratis; paniculis axillaribus, dichotomis; caulis acuminatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 342. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 275. n° 15.

Cette plante, qui a de très-grands rapports avec la *Scrophularia vernalis*, en diffère par ses tiges & ses feuilles glabres, & par ses fleurs rougeâtres, beaucoup plus petites. Ses tiges sont droites, quadrangulaires, rameuses; ses feuilles ovales, en cœur, gâbres à leurs deux faces, munies à leurs bords d'un double rang de dents inégales, en scie. Les fleurs sont disposées en petites panicules axillaires, latérales, dont le pédoncule commun se bifurque à son sommet. La corolle est petite, de couleur rouge; les capsules acuminées.

Cette plante se trouve à l'île de Madère, & dans celle de Ténériffe. ☉

16. SCROPHULAIRE trifoliée. *Scrophularia trifoliata.* Linn.

Scrophularia foliis glabris, inferioribus ternato-pinnatis, obtusis, superioribus simplicibus; pedunculis suberifloris, axillaribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 865. — Miller, Dict. n° 7. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 54. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 275. n° 16.

Scrophularia sambucifolia, flore rubro, luteo, var. pulchro. Pluken. Almag. pag. 338. tab. 313. fig. 6.

Scrophularia subacundo, erecto, nigricante folio; flore luteo, pallido; capsula turgida. Botcon. Mus. 2. pag. 65. tab. 60. — Tournef. Inst. R. Herb. 167.

Ses tiges sont droites, glabres, simples ou médiocrement rameuses, tétragones, striées, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, en cœur à leur base, lisses, glabres à leurs deux faces, veinées, luisantes, longues d'environ

E

trois pouces, sur presque deux de large; obtuses à leur sommet, inégalement dentées sur un double rang à leurs bords; les dents obtuses. Les feuilles inférieures font souvent auriculées à leur base, & paroissent trifoliées. M. Desfontaines en a observé en Barbarie une variété à feuilles laciniées.

Les fleurs forment un épi ou une grappe extrêmement longue, composée de petites grappes latérales, alternes, dont les pédoncules simples se ramifient à leur sommet en pédicelles inégaux, munis de bractées linéaires; les unes plus longues, d'autres plus courtes que les pédoncules partiels. Le calice est divisé en cinq découpures ovales, obuses, membraneuses à leurs bords. La corolle est de couleur purpurine, assez semblable à celle du *Scrophularia aquatica*. Le fruit est une capsule en forme de poire, lisse, mucronée, plus longue que le calice.

Cette plante croît sur le bord des champs, & le long des rivages de la mer, dans l'île de Corse, & sur les côtes de la Barbarie. (V. f.)

Nota. Le *Scrophularia appendiculata* de Jacquin paroît différer bien peu de cette espèce, & devroit peut-être y être rapportée.

17. SCROPHULARIA à feuilles de sureau. *Scrophularia sambucifolia*. Linn.

Scrophularia foliis interruptè pinnatis, cordatis, inaequalibus; racemo terminali; pedunculis axillaribus, geminis, dichotomis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 865. — Kniph. Centur. 7. n°. 84. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 276. n°. 17.

Scrophularia foliis diffusis, pedunculis axillaribus, aggregatis. Royen, Lugd. Bat. 202.

Scrophularia sambucifolia. Parkins, Theat. 611. Miller, Dict. & tab. 231.

Sideritis sambucifolia. Prosp. Alpin. Exor. pag. 203. tab. 202.

Scrophularia foliis laciniatis. C. Bauh. Pin. 236. & Prod.: 112.

Scrophularia sambucifolia, capsulis maximis. Moriz. Oxon. Hist. 2. pag. 483. §. 5. tab. 8. fig. 6.

Scrophularia hispanica, sambucifolia, glabro. Tournef. Inst. R. Herb. 166.

♂. *Scrophularia iustanica, maximo flore, foliis diffusis*. Rai, Suppl. 396.

Ses tiges sont droites, glabres, hautes de trois à quatre pieds, rameuses, tétragones, un peu ailées sur leurs angles par les pétioles décurrens, garnies de feuilles opposées, pétioolées, ailées; les pinnules distantes, opposées ou alternes, point confluentes, au nombre de cinq à sept, lancéolées, en cœur à leur base, ridées, glabres à leur face supérieure, dentées en scie à leur contour, aiguës

à leur sommet; la foliole terminale plus grande, un peu lobée ou incisée.

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale, composée de petites grappes partielles, dont les pédoncules sont réunis de six par deux dans les aisselles des feuilles supérieures, souvent dichotomes, très-courts, ramifiés. Les corolles sont grandes, de couleur purpurine; leur lèvre inférieure verdâtre.

Cette plante a une odeur forte, approchant de celle du sureau. Elle croît en Espagne, en Portugal & dans le Levant. ♀

18. SCROPHULARIA mellifera. *Scrophularia mellifera*. Desfont.

Scrophularia glabra, foliis inferioribus pinnatis; foliolis ovatis, dentato serratis; floribus axillaribus, fundo corollae mellifero. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 53. tab. 145.

Scrophularia (viridiflora), foliis interruptè pinnatis; foliolis ovato-oblongis, serratis, utrinque glabris, racemo terminali subnudo, longissimo. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 194.

Scrophularia (mellifera), foliis inferioribus interruptè pinnatis, superioribus ternatis; foliolis oblongis, floribus axillaribus. Vahl, Symbol. 2. pag. 88. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 276. n°. 18.

Scrophularia foliis pinnatis, subinterruptis; foliolis subquinis, oblongis; floribus axillaribus, corolla fundo mellifero. Aiton, Hort. Kewen. vol. 2. pag. 343.

C'est une très-belle espèce, remarquable par la hauteur de ses tiges, par ses feuilles inférieures, ailées; par ses fleurs vertes, grandes, quelquefois un peu purpurines en dehors, munies de glandes mellifères.

Ses tiges sont glabres, quadrangulaires, légèrement ailées, ou à angles saillans sur leurs côtés, fermes, épaisses, rameuses, hautes de quatre à six pieds, garnies de feuilles opposées, pétioolées, parfaitement glabres, ailées; les folioles point décurrens, inégales, ovales ou ovales-oblongues, d'autant plus petites, qu'elles approchent davantage de la base, inégalement dentées en scie, quelquefois incisées, d'un vert-foncé à leurs deux faces; la foliole terminale beaucoup plus grande; les feuilles inférieures amples, composées de sept à neuf folioles; celles du milieu de cinq; les supérieures ternées.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux & des tiges, de très-longues grappes droites, composées de petites grappes axillaires, opposées; les pédoncules communs ramifiés inégalement; chaque pédicelle court, uniflore, garni à sa base de deux bractées linéaires, glabres, opposées; leur

calice est vert, glabre, divisé en cinq découpures concaves, un peu arrondies, blanchâtres & membraneuses à leurs bords. La corolle est grande, courte, ovette, de couleur verte, quelquefois d'un pourpre très-foncé en dehors, à deux lèvres; la supérieure plus longue, horizontale, à deux lobes orbiculaires; l'inférieure trilobée: dans l'intérieur & à la base du tube, deux glandes assez grosses, opposées, qui distillent une liqueur noirâtre, abondante; une petite lame orbiculaire à l'orifice du tube.

Les éramines sont aussi longues que la corolle, didynames; les filamens larges, aplatis, terminés par des anthères un peu arrondies, comprimées; les deux éramines inférieures paroissent plus tard que les supérieures, & restent roulées en spirale dans le foud de la corolle jusqu'au moment de la fécondation; alors les filamens se déroulent peu à peu jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la hauteur qu'ils doivent avoir. J'ai observé cette particularité dans plusieurs autres espèces de ce genre. Le style est persistant, le stigmate épais; il leur succède une capsule glabre, assez grosse, pyriforme, acuminée, à deux valves, à deux loges, contenant des semences nombreuses, roulées, fort petites, arrondies, ponctuées lorsqu'on les examine à la loupe, attachées sur un réceptacle central, arrondi.

J'ai observé cette plante en Barbarie, dans les lieux humides, le long des bords de la mer, aux environs du bassin de France, de la Calle & de Bonne. ♀ (F. v.)

19. SCROPHULAIRE hispide. *Scrophularia hispida*. Desfont.

Scrophularia caule tetragono, erecto, hispido; foliis pinnatis, duplicato-crenatis; lobo terminali cordato, maximo; racemo composito, aphylo. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 19.

Scrophularia (hispida), foliis pinnatis, villosis; foliolo terminali maximo, cordato; racemo terminali, caule hispido. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 276. n°. 19.

Cette plante a quelques rapports avec la *Scrophularia sambucifolia*; elle en diffère par ses tiges hispides, par la forme de ses folioles, par les corolles moins grandes.

Ses tiges sont droites, fermes, simples ou médiocrement rameuses, hautes d'environ deux pieds ou deux pieds & demi, munies de poils rudes, courts, très-nombreux; garnies de feuilles opposées, médiocrement petiolées, molles, velues, de couleur cendrée, longues de quatre à cinq poeues, larges de deux ou trois, ailées, composées de pinnules ovales, peu nombreuses, légèrement pétiolées, à double crénelure à leurs bords; la pin-

nule terminale très-grande, échancrée en cœur, quelquefois un peu lobée ou incisée.

Les fleurs forment une assez longue grappe terminale interrompue, dépourvue de feuilles, haute presque d'un pied, composée de grappes partielles, oppolées & alternes, velues, rameuses; les pédoncules partiellement inégaux, unisères, munis de bractées linéaires, les unes plus longues, d'autres plus courtes que les pédicelles. Le calice est glabre, persistant, divisé en cinq découpures fertiles, arrondies, membraneuses à leurs bords. La corolle est ouverte, de la grandeur de celle du *Scrophularia nodosa*. Son tube est court & globuleux, garni à son orifice d'une petite lame orbiculaire, divisé en deux lèvres; la supérieure plus longue, horizontale, partagée en deux lobes arrondis; l'inférieure trilobée. Les éramines sont didynames; le style persistant; la capsule lisse, très-glabre, en forme de poite, mucronée à son sommet, à deux valves, à deux loges, renfermant des semences nombreuses, fort petites, de couleur brune, oblongues, obtuses, ponctuées & ridées, attachées à un réceptacle central & chatnu.

Cette plante croit entre les sentes des rochers, sur le mont Atlas, dans les environs de Tlemcen en Barbarie, où elle a été découverte par M. Desfontaines. ♀ (*Descript. ex Desfont.*)

20. SCROPHULAIRE canine. *Scrophularia canina*, Linn.

Scrophularia foliis pinnatis; racemo terminali, nudo; pseudoculis bifidis. Linn. Spec. Plant. 855. — Virid. Cliff. 6. — Hort. Cliffort. 322. — Royen, Lugd. Bat. 204. — Sauvag. Monsp. 247. — Kniph. Centur. 4. n°. 75. — Sibbar. Hort. 2. tab. 00. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 53. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 257. n°. 20.

Scrophularia foliis inferioribus pinnatis, summis integris, duplicato-ferratis; racemis axillaribus. Miller, Dict. n°. 9.

Scrophularia multifida. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 337. n°. 392.

Scrophularia foliis pinnatis, pinnis lobatis, circumferratis; caule paniculato. Valet. Helv. n°. 928.

Scrophularia foliis pinnatis, caule paniculato. Scopol. Carn. edit. 1. pag. 4-8. n°. 4. — Idem. edit. 2. n°. 778.

Scrophularia ruta canina dista, vulgaris. C. Bauh. Pinn. 236. — Tournef. Inst. R. Herb. 167. — Shaw. Spec. n°. 545. — Morif. Oxon. Hist. 2. 6. 5. tab. 9. fig. 8. — Zuccich. Hist. tab. 221. — Parkinson, Theat. 610. Icon.

Ruta canina. Clus. Hist. 2. pag. 209. Icon. — Lobel. Icon. 2. pag. 55. — Tabern. Icon. 136. —

Gerard, Hist. 1256. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 973. Ic.

Scrophularia tercia dodonea tenuifolia, ruta canina quibusdam vocata? J. Bauh. Hist. 3. pag. 423.

β. *Scrophularia lucida*? Pallas, Nov. Act. Petr. 10. pag. 513.

Scrophularia orientalis, *chrysanthemifolia*; *flor. minimo*, *atro-purpureo*. Tournet. Coroll. 9.

γ. *Eodem*, *caule pedunculique pubescentibus*. Kop. Centur. exf. 4.

On distingue cette espèce à ses feuilles ailées, dont les pinnules sont plus ou moins laciniées assez finement, surtout celles des feuilles supérieures.

Ses tiges sont droites, glabres, quadrangulaires, hautes d'un pied ou d'un pied & demi, très-rameuses; les rameaux nombreux, paniculés, dichotomes, garnis de feuilles opposées, pétiolées. Parfaitement glabres, vertes à leurs deux faces; les feuilles inférieures incisées, alongées, légèrement pinnatifides; les supérieures ailées ou profondément pinnatifides; les découpures écartées, linéaires, simples ou laciniées, lubées ou dentées, aiguës.

Les fleurs sont divisées, à l'extrémité des rameaux, en un épi de six à huit pouces de long, composé de grappes opposées, axillaires, pédonculées; les pédoncules la plupart dichotomes, ayant très-souvent une fleur pédonculée dans leur dichotomie; les divisions rameuses, un peu paniculées à leur sommet; les grappes inférieures alternes. Le calice est court, divisé en cinq découpures arrondies, glabres, verdâtres, blanches & membraneuses à leurs bords. La corolle est petite, d'un pourpre foncé, dépourvue de lames à son orifice; le pistil & deux des étamines saillantes hors de la corolle; la capsule globuleuse, très-glabre, de la grosseur d'un petit pois, acuminée par le style persistant, contenant des semences nombreuses, fort petites, attachées à un réceptacle central.

Cette plante croît en Suisse, en Italie, dans les départements méridionaux de la France. Je l'ai recueillie aux environs de Lyon. ☉ (V. v.)

La variété β, qui peut-être pourroit être distinguée comme espèce, diffère de la précédente par ses feuilles plus petites, incisées ou profondément dentées, à dents aiguës; les feuilles inférieures bipinnées; les petites grappes dichotomes. Cette plante croît dans le Levant & la Tauride. Willd.

21. SCROPHULAIRE ailée. *Scrophularia pinnata*. Miller.

Scrophularia foliis pinnatis, foliolis incisjs; racemis simplicibus, terminalibus. Mill. Dict. n°. 15.

Scrophularia orientalis, *chrysanthemifolia*; *flor. minimo*, *variegato*. Tournet. Inf. R. Herb. Coroll. 9.

Cette plante, que Miller regarde comme une espèce distincte, n'est peut-être qu'une variété du *Scrophularia canina*.

Ses tiges, d'après cet auteur, sont grêles, hautes de trois pieds, garnies de feuilles dont les inférieures sont deux fois ailées; les pinnules irrégulièrement découpées & dentées, sessiles, d'un vert-luisant. La partie supérieure des tiges est chargée de petites grappes de fleurs latérales & terminales, éloignées les unes des autres. La corolle est petite, de couleur purpurine, avec une bordure blanche.

Cette plante croît à Gibraltar & dans le Levant. ☉ (*Descript. ex Miller.*)

22. SCROPHULAIRE luisante. *Scrophularia lucida*. Linn.

Scrophularia foliis inferioribus bipinnatis, subcanosis, glaberrimis; racemis bipartitis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 865. — Syst. Nat. edit. 13. pag. 414. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 54.

Scrophularia foliis bipinnatis, glaberrimis, l-cidijs; racemis bipartitis, terminalibus. Mill. Dict. n°. 11.

Scrophularia saxatilis, lucida, leserii maffliensis folio. Boccon. Mus. tab. 117. — Tournet. Inf. R. Herb. 167. — Schaw. Spec. n°. 543.

Scrophularia glaucofolia, in amphylacinijs diviso. Tournet. Coroll. pag. 9. — Idem. Itin. vol. 1. pag. 221. Icon. 85.

A. *Scrophularia foliis flicis, modo laciniatis, vel ruta canina, latifolia*. C. Bauh. Pin. 236. — Tournet. Inf. R. Herb. 167. — Schaw. Spec. n°. 542. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 9. fig. 7. *Malta*. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 54.

Scrophularia cretica prima. Clus. Hist. 2. pag. 209. Icon.

Scrophularia cretica, latifolia. Parkins, Theatr. pag. 610. Icon.

Scrophularia indica. Gerard, Hist. 716. Icon.

Scrophularia (filicifolia), foliis pinnatis, foliolis acutis dentatis, racemis terminalibus. Miller, Dict. n°. 10.

Cette espèce a de grands rapports avec le *Scrophularia canina*; elle en diffère par ses feuilles grasses, un peu charnues, luisantes, souvent bipinnées, & par une petite lame qui garnit l'orifice du tube de la corolle.

Ses tiges sont très-glabres, presque cylindriques, d'un vert-foncé, à peine quadrangulaires, légèrement membraneuses sur leurs angles, hautes

d'environ un pied & demi, très-rameuses; les rameaux opposés, axillaires, simples, droits, garnis de feuilles opposées, pétiolées, presque deux fois ailées, allongées, un peu charnues, glabres à leurs deux faces; les folioles profondément incisées, presque pinnatifides ou dentées, à dents aiguës, irrégulières.

Les fleurs sont disposées en longs épis nus, composés de grappes la plupart alternes, un peu allongées, rameuses, munies de petites bractées courtes, presque filiformes. Le calice est divisé en cinq découpures verdâtres, glabres, membraneuses & blanches à leur contour, un peu arrondies, ébrouées. La corolle est petite, pâle, purpurine; la lèvre supérieure rotatoire; le style droit ou un peu courbé, saillant hors de la corolle; le stigmate épais, coloré; la capsule petite, globuleuse, à une suture.

Cette plante croît dans le Levant, aux environs de Naples, dans l'île de Crète & sur les côtes de Barbarie, dans les sentes des rochers & sur les vieux murs. On la cultive au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. (V. v.).

23. SCROPHULAIRE variée. *Scrophularia variagata*. Martsch.

Scrophularia caulis hosi lignescens; foliis bipinnatifidis, pubescentibus; racemis elongatis; pedicellis brevibus, v. illis glaberrimis hirsutis. Martsch. ab Biebstein, Crisp. pag. 116. n°. 20. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 278. n°. 22.

Ses tiges sont droites, ligneuses, particulièrement vers leur base, garnies de feuilles opposées, pétiolées, deux fois ailées, pubescentes. Les fleurs sont disposées en grappes allongées, situées à l'extrémité des tiges. Les pédoncules communs se ramifient en pédicelles courts, inégaux, hérissés de poils courbés en hampe à leur sommet.

Cette plante croît aux bords de la mer Caspienne, sur les collines stériles & pierreuses.

24. SCROPHULAIRE de Chine. *Scrophularia chinensis*. Linn.

Scrophularia foliis ovato-oblongis, serratis, pubescentibus. Linn. Mantiss. pag. 270. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 278. n°. 23.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, à angles mousses, marquées de quatre sillons, légèrement pubescentes, rameuses, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles opposées, pétiolées, allongées ou ovales-oblongues, lancéolées, molles, un peu pubescentes, dentées en scie à leur contour; les dents obtuses, assez semblables aux feuilles du *tanacetum balsamita*.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en grappes très-longues, simples,

dont le pédoncule commun est simple, divisé à son sommet en rameaux courts, inégaux; sous chaque pédicelle une bractée courte, ovale, finement dentée; les capsules comprimées.

Cette plante croît naturellement dans la Chine. (Descript. ex Linn.)

25. SCROPHULAIRE méridionale. *Scrophularia meridionalis*. Linn. f.

Scrophularia foliis oblongo-ovatis, serratis, glabris; pedunculis unifloris. Linn. f. Suppl. pag. 280. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 278. n°. 24.

Ses tiges sont droites, herbacées, quadrangulaires, divisées en rameaux opposés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales ou un peu oblongues, lisses à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, toutes les dents égales; les pétiolés un peu plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale, dépourvue de feuilles, & dont les pédoncules sont simples, uniflores, un peu plus longs que les fleurs, munis à leur base de bractées foliacées, plus courtes que les feuilles, distantes, souvent très-entières; les inférieures opposées & les supérieures alternes. La corolle est ovale, de la grandeur de celle du *Scrophularia sambucina*.

Cette plante se trouve à la Nouvelle-Grenade. (Descript. ex Linn. f.)

26. SCROPHULAIRE écarlate. *Scrophularia coccinea*. Linn.

Scrophularia foliis quaternis, ovatis; floribus verticillatis, spicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 866. — Roven, Lugd. Bat. 294. — Miller, Dict. n°. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 279. n°. 25.

Scrophularia flore coccinea, foliis utricis quaternis, caulibus ambulentibus. Hoult. Mss.

Cette plante a des tiges droites, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles ovales, sessiles, d'un vert-pâle à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, zigzags à leur sommet; les feuilles inférieures opposées, ainsi que les supérieures; celles du milieu réunies au nombre de trois ou quatre à chaque nœud, presque amplexicaules, assez semblables aux feuilles de l'ortie. Les fleurs sont verticillées, réunies en épi à l'extrémité des tiges, d'une belle couleur écarlate, & de la grosseur de celles du *Scrophularia nodosa*.

Cette plante croît naturellement à la Vera-Cruz. On la cultive dans quelques jardins en Angleterre.

27. SCROPHULAIRE voyageuse. *Scrophularia peruviana*. Linn.

Scrophularia foliis cordatis, lineatis, lucidis; pedunculis axillaribus, bifloris; caule scapulari. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 866. — Mantiss. 418. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 179. n° 26.

Scrophularia foliis cordatis, superioribus alternis; pedunculis axillaribus, bifloris. Linn. Spec. Plant. 621. — Hort. Cliff. 322. — Royen, Lugd. Bat. 295. — Gouan, Monip. pag. 304. n° 6. — Miller, Dict. n° 14. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 289. n° 3. — Sav. vag. Monip. 116.

Scrophularia geminiflora. Lam. Flot. franç. vol. 2. pag. 336. n° 390.

Scrophularia urticifolia. C. Bauh. Pin. 226. — Tournef. Inst. R. Herb. 166. — Magnol, Botan. Monip. pag. 234. — Moit. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 8. fig. 1.

Scrophularia peregrina. Camer. Hort. pag. 157. tab. 43.

Scrophularia flore rabo Camerarii. J. Bauh. Hist. 3. pag. 422. Leon.

8. *Scrophularia (italica), foliis cordatis, duplicato-ferratis; racemo composito.* ? Flor. leyd. Prodr. 196. — Miller, Dict. n° 6.

Scrophularia nemorensis, folio urtica rugoso; flore atro-punicante. Hort. Cathol.

On distingue cette plante à ses feuilles glabres, luisantes, en cœur; à ses pédoncules axillaires, dichotomes, terminés par deux fleurs.

Ses tiges sont droites, glabres, anguleuses, souvent de couleur purpurine, lisses, très-simples, hautes d'environ un pied & demi, munies de quatre, cinq ou six angles saillans, garnies de feuilles pétioles, opposées, ovales, en forme de cœur, échancrées à leur base, glabres à leurs deux faces, veinées, luisantes, aiguës à leur sommet, bordées de dents courtes & obtuses; les feuilles supérieures ordinairement alternes, beaucoup plus petites.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles supérieures. Leurs pédoncules sont simples, glabres, filiformes, plus longs que les feuilles; ils sont assez ordinairement fourchus à leur extrémité, & ne portent que deux fleurs, quelquefois quatre, cinq ou six. Leur calice est glabre, verdâtre, à cinq découpures ovales, courtes; la corolle petite, de couleur purpurine; les capsules globuleuses, glabres, à deux loges, à deux valves, remplies de semences fort petites.

Cette plante croît dans les provinces méridionales de la France, en Italie. Je l'ai également recueillie dans la ci-devant Bretagne, aux environs de Fougères. ○ (V. v.)

SCROTIFORMES (Semences). (Scrotiformia

semina.) Les semences reçoivent cette dénomination, ainsi que les fruits, & quelquefois une portion de la corolle, lorsque ces parties ont quelque ressemblance, par leur forme, aux testicules d'un animal.

SCYPHOPHORE. *Scyphophorus*. Genre de plantes acotylédones, de la famille des algues. C'est une division des lichens de Linné; il faut y rapporter toutes les espèces qui ont assez généralement des feuilles roides, cartilagineuses ou membraneuses, très-fragiles, droites & ascendantes, flexueuses, la plupart inégalement & plus ou moins profondément laciniées, finies ou crénelées presqu'en lobes, vertes en dessus, très-souvent blanchâtres à leur face inférieure.

La fructification consiste dans de petites tiges (*bacilla*) fistuleuses ou tubuleuses, simples ou rameuses, insérées sur les feuilles, épaissies à leur sommet, dilatées en une sorte d'entonnoir fermé, & portant, sur les bords de cet entonnoir, des tubercules irréguliers, convexes, fongueux, presque globuleux, quelquefois si portées immédiatement par les feuilles, quelquefois aussi celles-ci font à peine visibles ou nulles.

Les cladonies (*cladonia*) sont un autre genre très-voisin de celui-ci, composé de plantes dont les tiges sont tubulées, simples ou rameuses, nues ou chargées de quelques petites folioles; les tiges terminées à leur sommet, non par des espèces d'entonnoirs, mais par des tubercules fongueux, solitaires, sessiles, comme on le voit dans le lichen *subulatus*, *rangiferinus*, *uncialis*, &c.

Observations. La plupart des espèces qui composent ce nouveau genre ayant déjà été décrites à l'article LICHEN, nous ne faisons qu'indiquer ici les principales qu'il convient d'y rapporter, & quelques autres décrites par Michaux dans la *Flora de l'Amérique septentrionale*. Il faudrait donc rappeler dans ce genre le lichen *cocciferus* de Linné, & toutes les variétés; le lichen *pyxidatus* & ses variétés; le lichen *cornutus*, *gracilis*; le lichen *convolutus*. Lam. Dict. &c.

* Espèces de Michaux.

1. SCYPHOPHORE sulfuré. *Scyphophorus sulphureus*. Mich.

Lichen *bucillis crassus, submembranaceus, subclavato-elongatus, levissimus, sulphureus; summitate denigra* d'former *subdivisi & rimoso-pertusi; scyphorum tuberculis confluentibus, atro-fuscis*. Mich. Flor. boreal. Amet. vol. 2. pag. 328.

Ce scyphophore est d'un blanc légèrement lavé, d'un jaune de soufre. Ses tiges sont d'abord très-simples, épaissies, un peu membraneuses, lisses, alongées presqu'en massue, portant à leur sommet

un petit renflement en entonnoir; ces tiges s'allongent jusqu'à la longueur de deux ou trois pouces, s'épaississent insensiblement, deviennent à leur sommet rameuses ou laciniées d'une manière très-irrégulière. Les entonnoirs fertiles sont fort petits, chargés à leurs bords de tubercules confluent, d'un pourpre foncé: il arrive souvent que ces bords sont prolifères.

Cette plante croît dans le Canada, où elle a été découverte par Michaux.

1. *SCYPHOPHORE verticillé. Scyphophora verticillaris. Mich.*

Scyphophora scyphis bacillorum, verticilliformibus, fronsculiferis & margine minutissime tuberculosa; tuberculis fuliginosis. Mich. Flor. bor. Amér. vol. 1. pag. 329.

C'est une espèce d'un port très-élégant par ses succulentes & nombreux proliférations, qui forment comme autant de verticilles.

Ses tiges sont filiformes, un peu épaissies, d'un blanc-faïe, simples ou un peu bifurquées à leur base, droites, hautes de deux pouces & demi ou trois pouces; leurs entonnoirs prolifères dans leur centre, au nombre de six à sept, presque égaux, écartés; chacun de ces nouveaux entonnoirs en produit d'autres sur son bord, disposés comme en verticilles, & qui deviennent souvent à leur tour plusieurs fois prolifères, chargés à leurs bords extérieurs de petits tubercules de couleur de faïe; les entonnoirs garnis, en dedans & à leur disque, de petites folioles crénelées, lobées, très-irrégulières, semblables à celles de la base des tiges.

Cette espèce a été recueillie, par Michaux, dans la Caroline.

SÉBESTIER. Cordia. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des borraginées, qui a des rapports avec les *patagonia* & les *ehretia*, qui comprend des arbres ou arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont tudes, les fleurs terminales ou axillaires, disposées en panicule ou en corymbe, variables dans la forme & le nombre des parties de leur fructification.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice presque tubulé, à cinq divisions; une corolle infundibuliforme; ordinairement cinq étamines; un style aichotome; un drupe à deux ou quatre loges; des semences solitaires.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, presque tubulé, persistant, à cinq divisions.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est de la longueur du calice, le limbe campanulé, à cinq, quelquefois à six ou huit découpures ouvertes, un peu obtuses.

3°. Cinq étamines, quelquefois quatre ou huit, dont les filaments sont tubuleux, attachés au tube de la corolle, terminé par des antères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, acuminé, surmonté d'un style de la longueur des étamines, bifide à sa partie supérieure, à découpures fourchues, terminées par des stigmates obtus.

Le fruit est un drupe globuleux ou ovale, acuminé; un noyau filonné ou parsemé de toffettes, à deux ou quatre loges, dont quelques-unes avortent quelquefois.

Les semences sont solitaires, ovales, acuminées à leur sommet.

Observations. Quoique ce genre paroisse assez naturel dans un certain nombre de ses espèces, tellement même que la plupart sont assez difficiles à distinguer, néanmoins plusieurs autres s'écartent tellement du caractère générique, qu'il est possible qu'elles appartiennent à un autre genre, surtout celles citées par Aublet. La corolle est infundibuliforme dans le plus grand nombre, campanulée dans d'autres. Son limbe varie dans ses divisions, ordinairement au nombre de cinq, quelquefois de quatre, six ou huit : ce ne font, dans les unes, que des dents courtes; dans d'autres, elles sont plus profondes. Le nombre des étamines éprouve les mêmes variations que celui des découpures de la corolle : il en arrive de même pour le calice. Le nombre des loges, celui des semences, n'est pas plus constant. D'ailleurs, la plupart de ces espèces n'ayant point été complètement décrites ou observées, laissent de grandes difficultés pour leur détermination. Peut-être a-t-on confondu des variétés avec des espèces, ou pris des espèces pour des variétés. Il seroit bien à désirer, pour la perfection de ce genre, que les voyageurs y apportassent la plus grande attention, & surtout qu'ils s'assurassent de ce qu'il peut y avoir de variable ou de constant dans les organes de la fructification.

Les feuilles, dans le plus grand nombre des espèces, sont épaisses, coriaces ou membraneuses, entières ou dentées, chargées, soit à leurs deux faces, ou plus souvent à leur face supérieure, d'aspérités formées par de très-petits points blanchâtres, très-nombreux, quelquefois à peine sensibles. Ce genre ne diffère essentiellement des *ehretia* que par son style bifide ou dichotome, chaque branche terminée par des stigmates également dichotomes. Les fruits sont plutôt des drupes que des baies. Dans les *cabillites (ehretia)*, les fruits sont au contraire plutôt des baies que des drupes, & le style est simple, terminé par deux stigmates simples. Les *carmona* de Cavanilles, dont

nous parlerons à la fin des espèces, offrent un drupe à six loges.

ESPÈCES.

1. SÉBESTIER domestique. *Cardia myxa*. Linn.

Cardia foliis ovatis, suprà glabris; corymbis lateraliibus, calicibus decemfidiatis. Linn. Syst. veg. t. pag. 161. — Mater. medic. pag. 67. — Miller, Dict. n°. 2. — Vahl, Symbol. 1. pag. 19. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1072. n°. 1.

Cardia foliis subovatis, serrato-dentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 190. — Hort. Cliff. 63.

Mixa seu sebesten. J. Bauh. Hist. 1. pag. 197. Ic. — Rai, Hist. 1555.

Sebestena sivebris & domestica. C. Bauh. Pin. 446. — Prop. Alpin. Egypt. 30. ?

Carnus sanguinea. Forsk. Flor. ægypt.- arab. pag. 33.

2. *Cardia* (officialis), *foliis ovatis, acutiusculis, superat inaequaliter serratis; calice subcylindrico*. Levl. Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 420. n°. 1895. tab. 96. fig. 3.

Sebestena domestica, seu myxa. Commel. Hort. 1. pag. 139. tab. 72. — Blackw. tab. 398.

Vidi-maram. Rheed. Malab. vol. 4. pag. 97. tab. 37. — Rai, Hist. 1563. — Burm. Fior. ind. 58.

Prunus sebifera, longiore folia, modèr spatiosa. Pluken. Almag. pag. 306. tab. 217. fig. 3.

3. *Cardia* (obliqua), *foliis subrotundo-cordatis, nervosis, obliquis*. Willd. Hytogr. 1. pag. 4. n°. 16. tab. 4. fig. 1. — Idem, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1072. n°. 2.

Cette espèce offre de grandes difficultés, & jusqu'à ce que nous ayons des détails très-exacts, soit sur les parties de sa fructification, & si sur les variations qu'elle a pu éprouver par la culture, il nous restera toujours beaucoup de doutes sur le véritable *cardia myxa* de Linné. Il est cependant à présumer que cet auteur a réuni deux espèces, l'une des Indes & l'autre, que l'on rencontre en Egypte, à moins que l'on ne suppose qu'elle y ait été apportée autrefois des Indes orientales, & qu'elle s'y soit naturalisée. Le port de cet arbre & les légères différences qu'on y remarque dans la forme de ses feuilles ne me paroissent pas suffisants pour les séparer; il faudroit, comme je viens de le dire, y reconnoître d'ailleurs d'autres caractères dans les fleurs, surtout dans les fruits. Ces considérations m'ont déterminé à rapprocher des espèces que M. Lamarck a cru devoir distinguer.

C'est un arbre d'une médiocre grandeur, dont le tronc est épais, le bois blanchâtre, l'écorce

écailleuse, marquée de quelques lignes tourpures; les branches & les rameaux très-lisses, de couleur cendrée, ponctués, garnis de feuilles alternes, pétiolées, grandes, presque ovales ou quelquefois un peu arrondies, rétrécies à leur base, élargies, arrondies & un peu aiguës à leur sommet, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, & pubescentes dans leur jeunesse, rugées dans leur vieillesse, entières à leur partie inférieure, dentées ou presque légèrement sinuées vers leur sommet; les dentelures inégales, difformes, obtuses ou aiguës, à nervures latérales, obliques, saillantes, avec des veines réticulées. Les pétiolés sont glabres, cylindriques, presque de deux tiers plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, assez ample, serrée, rameuse, d'une odeur agréable; les rameaux alternes; leurs ramifications courtes, peu nombreuses. Le calice est cylindrique, vert, à cinq découpures aiguës; la corolle blanche, à cinq ou six découpures ovées, un peu réfléchies. Les fruits sont des drupes ovales, acuminées, glabres, pulpeux, renfermant un noyau profondément filonné, à deux loges; les autres avortant. La plante y diffère de la précédente par ses feuilles entières, nullement sinuées ou dentées; par ses calices dépourvus de fibres.

Cette plante croît dans les Indes, au Malabar, dans l'Egypte. (V. f. in herb. Joff.)

Ses fruits, macérés dans le sel & le vinaigre, se mangent dans l'Inde. Ils passent pour secourables dans les diarrhées: on leur donne le nom de *stéifes*. On fait avec 1. ut pulpe une excellente glu, en les pilant lorsqu'elles sont mûres, & en les lavant dans de l'eau qui se charge d'un mucilage très-visqueux. Les Egyptiens le servent de ce mucilage, en forme d'emplâtre, pour toutes les tumeurs squirreuses: il est propre à résoudre toutes sortes de duretés. Quelques-uns sont aussi usés, pendant plusieurs jours, de bois préparés avec ce mélange, du suc de Canli & la poudre de réglisse, pour se guérir de la toux. Les sebestes sont plus visqueuses que les jujubes, & bien plus en usage dans les rhumes, la difficulté de respirer, dans la pleurésie, la péripneumonie, l'enrouement & l'ardeur d'urine; ils les adoucit & lâchent le ventre. On les fait entrer dans les tisanes pectorales, humectantes & adoucissantes.

2. SÉBESTIER monoïque. *Cardia monaca*. Roxb.

Cardia foliis subrotundo-ovatis, dentatis, venosis, scabris; corymbis axillaribus, monacis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1072. n°. 3.

Cardia monaca. Roxb. Coromand. vol. 1. p. 43. tab. 58.

Cette

Cette espèce est remarquable par ses fleurs monoïques, par ses fruits jaunâtres, globuleux, terminés en pointe, & par ses feuilles ovales, un peu arrondies, dentées.

Ses rameaux sont garnis de feuilles simples, alternes, ovales, pétiolées, très-rudes, longues de trois pouces & plus, larges de deux, veinées, marquées de nervures latérales, simples, alternes; à lâches & courtes dentelures à leurs bords, aiguës à leur sommet, soutenues par des pétioles presque de deux tiers plus courts que les feuilles, rudes, arrondies.

Les fleurs sont monoïques, disposées en corymbes axillaires ou terminaux, beaucoup plus courts que les feuilles, dont les rameaux sont très-courts. La corolle est blanche, petite, infundibuliforme, à cinq découpures ovales, obtuses; cinq étamines renfermées dans le tube de la corolle, dont les filaments sont subulés, élargis à leur base; les anthères lancéolées. Les fruits sont des drupes ovales, aigus, acuminés, remplis d'une pulpe glutineuse.

Cette plante croît au Coromandel, dans les forêts. *Th* (*Descript. ex Roxb.*)

3. SÉBESTIER à feuilles dentées en scie. *Cordia ferrata* Juss.

Cordia foliis cordatis, glaberrimis, argutè serratis; panicula terminali. (N.)

Cette espèce, qui paroît se rapprocher, par son port, du *Cordia monoica*, en diffère par ses feuilles glabres & non rudes au toucher, à dentelures très-rapprochées; par ses fleurs terminales en panicule & non en corymbe.

Les rameaux sont droits, cylindriques, lisses, très-glabres, d'un brun-noirâtre, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, aiguës ou un peu acuminées à leur sommet, irrégulièrement & très-finement dentées en scie à leur contour, membraneuses, glabres à leurs deux faces, d'un verrouillé en dessus, d'un jaune-verdâtre en dessous, longues d'environ trois pouces & plus, sur deux de large; à nervures simples, alternes.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, serrée, un peu conique, un peu feuillée à la base de ses premiers rameaux. Le calice, d'après les observations de M. de Jussieu, est petit, urcéolé, divisé en cinq lobes à ses bords. La corolle est petite, blanche, monopétale, à cinq lobes réguliers, tubuleux à la base, ouverte à son limbe; elle renferme cinq étamines alternes avec les lobes de la corolle, & dont les anthères sont arrondies. L'ovaire est supérieur, surmonté d'un style, & terminé par un stigmate bifide.

Cette plante a été recueillie dans l'Inde, par Botanique. Tome V II.

M. Jof. Martin. *Th* (*P. f. in herb. Jussieu. Sine fruct.*)

4. SÉBESTIER en cœur. *Cordia subcordata*, Lam. *Cordia foliis subcordatis, integris, superne levibus; calice cylindrico.* Linn. *Illustr. Gener. vol. 1. pag. 421.* — Commerc. Herb.

An novella nigra, seu salinari? Rumph. Amboina. vol. 2. pag. 226. tab. 75.

C'est un arbre dont les rameaux sont étalés, touffus, glabres, de couleur brune ou gristère, garnis de feuilles alternes, pétiolées, amples, ovales, presqu'en cœur ou un peu arrondies, entières ou à peine légèrement ondulées à leurs bords, glabres, lisses à leur face supérieure, qui est quelquefois couverte de petits points blanchâtres à peine sensibles; légèrement pubescentes en dessous, le long de leurs principales nervures, surtout dans leur jeunesse, longues de quatre à six pouces & plus, sur presqu'autant de largeur.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en petites grappes courtes, lâches, peu garnies. Le calice est d'une seule pièce, tubulé, glabre, approchant de la forme de celui des *Alnus*, divisé à son limbe en trois dents. La corolle est grande, blanchâtre, lavée de rouge, infundibuliforme, ridée ou plissée; le tube au moins une fois plus long que le calice, très-évasé vers son orifice; le limbe ample, divisé ordinairement en six ou sept lobes arrondis; les étamines au nombre de six, quelquefois sept; les filaments inférés sur le tube, & de la longueur du tube de la corolle; les anthères oblongues, versatile; l'ovaire arrondi; le style plus court que les étamines, bifide vers son sommet; le stigmate partagé en deux. Le fruit est un drupe un peu ovale, légèrement acuminé, au moins de la grosseur d'une noisette, à quatre loges, qui en partie se confondent, en partie avortent.

Cette plante a été découverte dans les Indes, aux îles Praslin, par Commerçon. *Th* (*P. f. in herb. Juss.*)

5. SÉBESTIER à coques. *Cordia allodora*.

Cordia foliis oblongo-ovatis, integerrimis; floribus corymbosis, calicibus internodiis racemosis. Linn. *Spec. Plant. vol. 1. pag. 174.* — Willden. *Spec. Plant. vol. 1. pag. 1075. n° 14.*

Cordia glabra. Linn. *Spec. Plant. edit. 1. p. 191.* *Collococcus foliis rugosis, venosis, oblongo-ovatis, floribus laxè racemosis.* Brown. *Jam. 167.*

Cerafo effinis, arbor bacifera, racemosa; flore pentapetalo, herbaceo, guttato; fructu coccineo, monogyreno, viscido; semine rugoso. Sloan, *Jam. F*

169. Hist. 2. pag. 95. tab. 203. fig. 2. — Rai, Dendr. 45.

Cerafa americana, foliis rugosis, fructu villosio. Pluken. Phytogr. tab. 158. fig. 1.

C. Cordia (ehretioïdes), *foliis oblongo-ovatis, basi acutis, integerrimis; paniculis lateralibus, foliis brevioribus.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 421. n.º. 1902.

C'est un arbre d'une hauteur médiocre, dont le tronc se divise, vers son sommet, en branches diffuses & en rameaux épars, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, oblongues, rétrécies à leur base, aiguës ou acuminées à leur sommet, très-entières à leurs bords, ridées, presque glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en corymbes lâches, un peu paniculés, dont les pédoncules sont rameux, très-inégaux; les calices tomenteux en dedans; la corolle d'une grandeur médiocre, monopétale, infundibuliforme, divisée, à son limbe, en cinq divisions assez profondes, de couleur un peu herbacée, jaunâtre. Le fruit est un drupe de couleur rouge assez vive, visqueux, velu, renfermant un noyau ridé, lacuneux.

La plante se paroît avoir de si grands rapports avec la précédente, que j'ai cru devoir provisoirement l'y rapporter jusqu'à un plus ample examen sur des individus bien observés. Ses feuilles sont presque glabres, veinées, ovales-oblongues, aiguës à leurs deux extrémités, point en cœur; les fleurs sont petites. Les fruits ne me sont point connus.

Cette plante croît à la Jamaïque. La variété a été rapportée de Saint-Domingue par Joseph Martin. (V. f. in herb. Lam.)

6. SÉBESTIER à quatre feuilles. *Cordia tetraphylla*. Aubl.

Cordia foliis quaternis, obovatis, integerrimis, glabris; pedunculis lateralibus, multifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1076. n.º. 18.

Cordia foliis verticillatis, fructu oliviformi. Aubl. vol. 1. pag. 124. tab. 88.

Cordia (tetraphylla), *foliis verticillato-quaternis, ovatis, basi angustatis; corymbis lateralibus.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 422. n.º. 1908.

Arbrisseau d'environ six à sept pieds de hauteur sur un pied de diamètre, dont le bois est blanc, compact; les branches noueuses, ainsi que les rameaux; chaque nœud garni de quatre feuilles verticillées, presque sessiles, fermes, ovales, nettement veillées, un peu réticulées, entières à leurs bords, vertes, glabres à leurs deux faces, rétrécies à

leur base, arrondies, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont latérales, portées sur de longs pédoncules terminés par quelques fleurs sessiles, dont le calice est d'une seule pièce, à cinq dents aiguës. La corolle est blanche, infundibuliforme; son tube rétréci à sa base, évasé jusqu'à son limbe, qui se divise en cinq lobes ouverts, arrondis, un peu aigus; elle renferme cinq étamines, dont les filaments, plus longs que la corolle, se terminent par une anthere à deux lobes. L'ovaire est arrondi, un peu ovale; le style deux fois fourchu; les stigmates obtus. Le fruit est un drupe jaunâtre, charnu, de la forme & de la grosseur d'une olive, renfermant un noyau très-dur, presque à une loge.

Cette plante croît dans la Guiane, aux lieux sablonneux, peu éloignés de la mer. (J)

7. SÉBESTIER verbenacé. *Cordia gerascanthus*. Linn.

Cordia foliis lanceolato-ovatis, integerrimis; panicula terminali, calicibus tomentosis, decemfidiatis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 422. n.º. 193. tab. 96. fig. 2.

Cordia foliis lanceolatis, ovatis, scabris; panicula terminali, calicibus decemfidiatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 273. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 43. tab. 175. fig. 16. — Swartz, Observ. 86. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1074. n.º. 8.

Gerascanthus foliis ovato-oblongis, utrinque prodivis; racemis terminalibus. Brown. Jam. 170. tab. 29. fig. 3.

Vulgairement bois de Chypre.

Cette espèce a quelques rapports avec le *Cordia collococca*; les feuilles sont moins allongées; les fleurs terminales; les calices tomenteux, marqués de dix stries.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, revêtus particulièrement, vers leur partie supérieure, d'un duvet peu épais, cendré, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, épaisses, coriaces, très-entières à leurs bords, un peu rétrécies à leur base, un peu acuminées, obtuses à leur sommet, d'un vert foncé, presque glabres à leur face supérieure, plus pâles en dessous, supportées par un pétiole court, dépourvu de stipules.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des rameaux, en une panicule terminale, dont les ramifications sont composées de bouquets épais, dont les pédicelles sont très-courts, inégaux; les principales divisions munies, à leur base, de bractées sessiles ou un peu pétiolées, étroites, linéaires, lancéolées, aiguës. Le calice est monophylle,

oblong, infundibuliforme, dur, légèrement denté à ses bords, marqué de dix stries très-profondes, pubescent, de couleur cendrée. La corolle m'a paru rougeâtre dans l'état de dessiccation, médiocre, une fois plus grande que le calice, divisée à son limbe en cinq, quelquefois quatre ou six découpures linéaires, presque ovales, obtuses. Les étamines sont au nombre de cinq, de la longueur du tube de la corolle; les anthères petites, globuleuses; le style droit, deux fois bifide à son sommet; les stigmates épais; l'ovaire un peu ovale, strié.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les forêts; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. *h* (V. f.)

8. SIBESTIER NOUVEAU. *Cordia nodosa*. Lam.

Cordia foliis subternis, ovato-oblongis, acuminatis; ramulis nodosis, hispida; calice baccato. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1905.

Cordia (hirsuta), *foliis oblongis, utrinque attenuatis, pubescentibus; caule pedunculisque corymbosis, terminalibus, axillaribusque hirsutis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1076. n°. 15.

Cordia collococca. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 219. tab. 86.

Vulgairement achira-mouron.

Cette plante diffère du *Cordia collococca* par ses feuilles plus étroites, pubescentes; par ses tiges & ses pédoncules velus, par ses corymbes plus serrés, presque en ombelle, point dichotomes ni divariqués; enfin par ses fruits blancs, obliquement acuminés.

C'est un arbre de moyenne grandeur, dont le tronc s'élève à la hauteur de cinq ou six pieds, revêtu d'une écorce roussâtre, qui porte plusieurs branches nouvelles, dont les rameaux sont hérissés de poils roides, aigus; les feuilles, au nombre de trois ou quatre à chaque nœud, sont alternes, entières, sessiles, ovales, de couleur verte, couvertes de poils à leurs deux faces, aigües à leur sommet, longues de six à sept pouces sur environ trois pouces de largeur.

Les fleurs sont disposées en bouquets dans l'aisselle des feuilles; leurs pédoncules hérissés de poils roussâtres; les calices d'une seule pièce, turbinés, velus, à cinq dents très-courtes; la corolle blanchâtre, en forme d'entonnoir; le tube renflé à son orifice, divisé en cinq lobes arrondis, ouverts; cinq étamines, dont les anthères sont sagittées; un ovaire acuminé; un style de la longueur de la corolle, deux fois bifide; des stigmates obtus. Le fruit est un drupe de couleur blanche, ovale, aigu, à une loge, incliné horizontalement, rempli d'une pulpe gélatineuse & visqueuse, contenant un noyau ovale, filopé, pointu, à deux

ou à une seule loge par avortement, qui renferme une amande solitaire.

Cette plante croît en Guiane & à l'île de Cayenne. *h*

9. SIBESTIER JAUNÂTRE. *Cordia flavescens*. Aubl.

Cordia foliis oblongis, acuminatis, reticulato-venosis, glabris; racemis axillaribus. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1074. n°. 9.

Cordia foliis ovato-oblongis, acuminatis; fructu viridi, flavescens, cerasiforme. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 226. tab. 89.

Cordia (samentosa), *foliis ovato-oblongis, acuminatis, nudis, integerrimis; racemis lateralibus, urapibus obtusis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. p. 422. n°. 1907.

Arbrisseau dont les racines produisent plusieurs tiges ligneuses, samentueuses, longues de huit à neuf pieds, qui s'étendent sur les plantes & les arbres qui les avoisinent; garnies de feuilles alternes, médiocrement pétioles, ovales, oblongues, vertes, lisses à leurs deux faces, nerveuses, réticulées, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de six à sept pouces, sur trois de large.

Les fleurs naissent en grappes latérales, portées sur un ass. x long pédoncule. Leur calice est profondément découpé en cinq à six divisions arrondies, aigües. La corolle est monopétale, de couleur jaunâtre, en forme d'entonnoir; le tube renflé à la partie qui débord le calice; son limbe partagé en quatre ou six lobes arrondis, ouverts. Les étamines sont au nombre de cinq à six; les anthères sagittées; l'ovaire verdâtre; le style deux fois fourchu. Le fruit est un drupe de couleur purpurine, enveloppé d'une membrane ferme & sèche, & dont les semences fournissent une matière gommeuse.

Cet arbrisseau croît dans l'île de Cayenne & dans la Guiane, parmi les arbrisseaux qui enourent les Savannes; il fleurit & fructifie dans le courant de l'été. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

10. SIBESTIER ÉPINEUX. *Cordia spinifera*. Linn.

Cordia foliis ovatis, acutis, serratis, scabris; petiolis subspinosis. Linn. Mantiss. 206. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 421. n°. 940. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1073. n°. 4.

Ses rameaux sont roides, droits, tomenteux, de couleur brune, filutrineuse, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, dentées en scie à leurs bords, aigües à leur sommet, rudes à leur face supérieure, tomenteuses en dessous, de la grandeur des feuilles du cerisier, supportées par des pétioles très-courts, géniculés, dont la base de

vient épineuse à la partie de l'articulation qui persiste après la chute des feuilles.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, filiformes, simples ou bifides, de la longueur des feuilles. Leur calice est d'une seule pièce, campanulé, à cinq dents peu marquées; la corolle monopétale, campanulée, divisée à son limbe en cinq dentelures, une fois plus grande que le calice. L'ovaire est arrondi, surmonté d'un style filiforme, deux fois bifide à son sommet, terminé par des stigmates aigus. Les étamines sont au nombre de cinq. Les fruits sont de petites drupes épars, de couleur noire, fécales, de la grosseur des groseilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *Th* (V. f.)

11. SEBESTIER à quatre étamines. *Cardia tetrandra*. Aubl.

Cardia foliis ovatis, basi subcordatis, subtus asperis; corymbo terminali, floribus quadrifidis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1909.

Cardia foliis ovatis, acutis, basi inaequaliter cordatis, subtus scabris; cyma terminali, floribus tetrandris. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1076. n°. 16.

Cardia (tetrandra), *foliis ovatis, subtus asperis; floribus parvis, corymbosis; fructu albo, tetrapyræna*. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 222. tab. 87.

Vulgairement bois Marguerite ou arbre à parafol.

C'est un grand arbre dont le tronc s'élève à quarante ou cinquante pieds de hauteur, revêtu d'une écorce grisâtre, qui se divise en branches diffuses & en rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, oblongues, terminées en pointe, vertes en dessus, plus pâles & rudes à leur face inférieure, nerveuses, un peu en cœur à leur base, entières ou légèrement ondulées à leurs bords, longues de huit à dix pouces sur trois ou quatre pouces de largeur; leur pétiole long d'un pouce.

À l'extrémité des rameaux & dans l'aisselle des feuilles naissent de grosses touffes de fleurs en corymbe, dont le pédoncule commun est fourchu, dichotome à son sommet, & rameux. Le calice est turbiné, d'une seule pièce, divisé à son bord en quatre lobes arrondis, aigus. La corolle est verdâtre, monopétale, infundibuliforme. Son tube est court; son limbe partagé en quatre lobes ouverts, presque ronds, un peu aigus. Les étamines sont au nombre de quatre, attachées un peu au dessous des divisions de la corolle; les anthères grisâtres, à deux loges; l'ovaire rougeâtre; le style vert, deux fois fourchu; les stigmates obtus. Les fruits sont un drupe blanchâtre, arrondi,

contenant trois ou quatre offelets ou noyaux un peu ovales, ridés, enveloppés d'une substance blanche & gélatineuse.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la Cayenne & de la Guiane, particulièrement sur le bord des rivières. Ceux qui croissent sur le bord de la mer sont de moitié moins élevés que ceux des forêts. *Th* (Descript. ex Aubl.)

12. SEBESTIER velu. *Cardia toquæva*. Aubl.

Cardia foliis cordatis, acuminatis, villosis; racemis campofitis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1911.

Cardia foliis cordata-ovatis, acuminatis, intergerimis, tomentosis; corymbo paniculo, subterminali. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1074. n°. 10.

Cardia foliis cordatis, acuminatis, villosis; floribus racemosis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 228. tab. 90.

Vulgairement toquève.

C'est un arbrisseau très-rameux, qui s'élève à la hauteur de cinq ou six pieds, dont les branches sont diffuses; les rameaux tendres & cassans, velus, revêtus d'une écorce roussâtre, chargés de feuilles alternes, presque fécales, ovales, en cœur à leur base, entières à leurs bords, aigues à leur sommet, rudes & velues à leur face supérieure, tomenteuses & d'un vert-pâle en dessous, longues de quatre à six pouces, sur trois ou quatre de largeur.

Les fleurs sont disposées en grappes composées, axillaires & terminales, dont le pédoncule commun est long, velu, dépourvu de feuilles. Le calice est presque tubulé, à cinq dents; la corolle blanche, tubulée; le tube court; le limbe évasé, partagé en cinq lobes arrondis; cinq étamines, dont les filamens sont plus longs que la corolle; les anthères allongées, à deux loges; l'ovaire arrondi, oblong, un peu velu à son sommet, dont le style est deux fois fourchu. L'ovaire est un drupe jaunâtre, charnu, à une seule loge, contenant un noyau foliaire.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane, dans les terrains défrichés par les Galabibis qui habitent près des bords de la rivière de Séménari. *Th*

13. SEBESTIER à grandes feuilles. *Cardia macrophylla*. Linn.

Cardia foliis ovata-oblongis, villosis, venosis, maximis; racemis corymbosis, calice evathiformi. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 421. n°. 1901.

Cardia foliis ovatis, villosis, sesquipedalibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 264. — Mill. Dict. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1075. n°. 112.

Collococcus platyphyllus, major, racemis umbellatis. Brown. Jam. 168.

Prunus racemosa, foliis oblongis, hirsutis, maximis; fuda rubra. Sloan. Jam. 184. Hist. 2. pag. 130. tab. 211. fig. 1. — Rai, Dendr. 43.

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de dix-huit à vingt pieds & même davantage, muni de branches assez fortes & de rameaux alternes, distichés, cendrés, pubescens, garnis de feuilles très-grandes, alternes, pétiolées, ovales, velues, longues d'un demi-pied, très-entières, obtuses ou acuminées à leur sommet; les pétioles courts, épais, un peu velus. Les fleurs sont nombreuses, serrées, disposées vers l'extrémité des rameaux, en grappes ou panicules presque ombellées, courtes, auxquelles succèdent des fruits rouges, de la grosseur d'un pois, très-pulpeux.

Cette plante se rencontre à la Jamaïque. *h* (*V. f. in herb. J. f. & Lam.*)

14. **SABSTIER** à grandes fleurs. *Cordia sebestena*. Linn.

Cordia foliis ovatis, subrepandis, scabris; calice cylindrico, tubo brevioris. Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 421. n°. 1898. tab. 26. fig. 1.

Cordia foliis oblongo-ovatis, repandis, scabris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 190. — Hassk. Iter. 418. — Miller, Dict. n°. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1073. n°. 5.

Cordia foliis subovatis, subrepandis. Jacq. Amer. pag. 42.

Cordia nucis juglandis folio. Plum. Gen. Amer. & Icon. 105.

Cordia foliis amplioribus, hirtis; tubo floris subaquati. Brown. Jam. 202.

Schifana scabra; flore minato, crispo. Dillen. Eltham. pag. 341. tab. 255. fig. 331.

p. Cordia (africana), foliis subrotundo-ovalibus, integris; panicula terminali; calicibus turbinatis; drupâ nucleo triquetra. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 420. n°. 1896.

Wangey. Bruce, Iter 5. pag. 54. — Edit. Germ. 5. pag. 63. tab. 17.

Caryophyllus spurius, inodorus; folio subrotundo, scabro; flore racemoso, hexapetaloides, coccineo. Sloan. Jam. 136. Hist. 2. pag. 20. tab. 64. — Rai, Suppl. 86. — Catesb. Carol. vol. 2. pag. 91. tab. 91.

Navalla nigra. Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 226. tab. 75. — Bown. Flor. ind. 59.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de sept à huit pieds, dont les tiges sont droites, glabres, cylindriques, rameuses; les rameaux alternes, garnis

de feuilles très-médiocrement pétiolées, alternes, ovales, un peu arrondies, quelquefois oblongues, rudes, de couleur verte, les plus jeunes légèrement denticées en scie, légèrement ondulées à leurs bords lorsqu'elles sont plus anciennes; les supérieures & terminales très-entières; les pétioles cylindriques, dépourvus de stipules.

Les fleurs sont disposées en deux grosses grappes à l'extrémité des rameaux, garnis de pédoncules rameux, qui soutiennent une, deux & même trois fleurs. Leur calice est d'une seule pièce, oblong, divisé à son orifice en trois découpures. La corolle est grande, en forme d'entonnoir, d'un jaune foncé, de couleur écarlate, selon quelques auteurs, à moins qu'il ne soit question d'une autre espèce confondue avec celle-ci, à cinq divisions obtuses, ovales, crénelées ou ondulées à leurs bords. Les étamines sont au nombre de cinq; le pistil droit, divisé en deux à son sommet, chaque division fourchue; les stigmates obtus, recourbés en dehors. Le fruit est un drupe ovale, presque en forme de poire, obtus, dont le noyau est sillonné par plusieurs côtes assez profondes.

Cette plante croît dans plusieurs îles de l'Amérique, particulièrement à Saint-Domingue. On la trouve aussi aux Indes orientales, si toutefois c'est la même espèce. *h* (*V. f. in herb. Lam. & S. Dom.*)

La plante *p*, très-voisine de la précédente, en est une variété remarquable, ou peut-être une espèce distincte. Ses feuilles sont ovales, moins allongées, un peu arrondies, entières; les fleurs plutôt disposées en panicule qu'en grappes; les calices sont turbinés; les drupes renferment un noyau à trois côtés. Elle a été observée en Afrique par Bruce, dans son voyage en Abyssinie. *h* (*V. f. in herb. Lippi, apud D. Jussieu.*)

15. **SABSTIER** du Pérou. *Cordia lutea*. Lam.

Cordia foliis ovatis, obtusis, superius crenatis; corymbis lateralibus terminalibusque; calicibus decemfidiatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 421. n°. 1897.

Pavonia (lutea), foliis petiolatis, subrotundo-crenatis, asperis; floribus racemosis. Dombey. Herb.

Vulgairement, au Pérou, membrileño ou petit coignassier.

C'est un arbrisseau d'environ douze à quinze pieds de haut, dont les rameaux sont flexueux, glabres, d'un gris cendré, pubescens à leur partie supérieure, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales ou presque arrondies, vertes, rudes à leurs deux faces, marquées en dessus de très-petits points blanchâtres, un peu pubescens en dessous dans leur jeunesse, entières à leur partie inférieure, crénelées dans plus de leur moitié supérieure; les

érénelures obrufes, peu profondes, longues d'un à deux pouces & plus, larges d'un pouce & demi; les pétioles pubescens, de moitié plus courts que les feuilles.

Les fleurs forment de petites grappes latérales & terminales, dont les rameaux sont revêtus d'un duvet cendré ou un peu jaunâtre; les pédoncules très-courts; les calices fortement striés, ovales, d'une seule pièce, terminés par quatre dents ovales, courtes, un peu scarieuses à leurs bords. La corolle est jaunâtre, tubuleuse; le tube de la longueur du calice; le limbe ouvert, assez grand, à six, sept ou huit découpures. Les étamines sont au nombre de huit; les filamens droits, filiformes, velus à leur base; les anthères ovales, comprimées; le style de la longueur des étamines, bifide à sa partie supérieure. Le fruit est un drupe ovale, aigu, pulpeux, blanchâtre, renfermant un noyau ovale-oblong, terminé par une pointe recourbée, divisé en quatre loges, ou en deux par avortement.

Cette plante a été recueillie par Dombey à Huanza & aux environs de Lima, où elle est fort commune. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

16. SÉBESTIER à feuilles de sauge. *Cordia salvifolia*. Juss.

Cordia foliis ovato-lanceolatis, obtusis, rugosis, asperimis, subius reticulato-venosis; racemis lateralibus. (N.)

Ses rameaux sont glabres, striés, cendrés ou un peu jaunâtres, un peu pubescens dans leur jeunesse, garnis de feuilles pétioles, alternes, très-fermes, coriaces, ovales-oblongues, très-rudes, raboteuses comme une rape, chargées en dessus d'un très-grand nombre d'aspérités blanchâtres, ridées, munies en dessous de nervures roides, très-saillantes, & de veines également saillantes, disposées en réseau: ces feuilles ont un à deux pouces de longueur, sur environ un pouce de large; les pétioles sont courts, fermes, rudes, longs de deux à trois lignes. Les fleurs forment de petites grappes la plupart latérales, dont les ramifications sont roides, velues, hérissées de poils blanchâtres.

J'ignore le lieu natal de cette plante, qui a été communiquée à M. de Jussieu par M. Dupuis. (*V. f. in herb. Juss.*)

17. SÉBESTIER de Saint-Domingue. *Cordia dominicensis*. Lam.

Cordia foliis ovatis, integris, asperis, subius albicantibus; panicula terminali, calicibus cylindricis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 421. n°. 1900. — Herb. Juss.

Ses rameaux sont épais, anguleux, très-rudes

au toucher, d'un brun-noirâtre, un peu pubescens à leur partie supérieure, garnis de feuilles grandes; pétioles, alternes, ovales, très-entières, rudes à leurs deux faces, coriaces, épaisses, d'un vert-foncé en dessus, d'un vert-jaunâtre ou blanchâtre en dessous; les supérieures longues de six à huit pouces, larges de quatre ou cinq, marquées de nervures fortes, saillantes en dessous, un peu pubescens, médiocrement rameuses à leur sommet, & dont l'intervalle est rempli par des veines, les unes parallèles, d'autres en réseau; les pétioles sont rudes, presque cylindriques, courts, épais, très-rudes.

Les fleurs sont disposées en grappes droites, moins longues que les feuilles; les rameaux courts, inégaux, droits, cylindriques, roides, scabres, un peu pubescens. Ils deviennent les pédoncules propres, uniflores. Les calices sont cylindriques, rouffâtres, longs de six à sept lignes, obtus, un peu évasés. Je ne connois point la corolle ni les autres parties de la fructification.

Cette plante croît à Saint-Domingue. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

18. SÉBESTIER lisse. *Cordia levigata*. Lam.

Cordia foliis ovatis, venosis, midis; panicula lateralibus, flaminibus inferius villosis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1912.

Cette espèce est remarquable par ses corolles en foucoupe ou presque campanulées, assez semblables à celles de l'*Ehretia tinifolia*, & par ses étamines velues à leur partie inférieure.

Ses rameaux sont grêles, effilés, de couleur cendrée, noueux, cylindriques, garnis de feuilles pétioles, alternes, ovales ou un peu arrondies, assez petites, très-entières, obtuses ou un peu aiguës, retrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, coriaces, vertes & luisantes à leur face supérieure, pâles en dessous, traversées par des veines fines, disposées en réseau; les pétioles grêles, courts, un peu comprimés. Les panicules sont latérales & terminales, courtes, mais plus longues que les feuilles, glabres, rameuses; les calices sont glabres, courts, striés; la corolle ouverte, presque en foucoupe, ou un peu campanulée, assez semblable à celle de l'*Ehretia tinifolia*; son limbe divisé en lobes ovales, obtus; les étamines plus courtes que la corolle, velues à leur base.

Cette plante croît aux Antilles & à Saint-Domingue. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

19. SÉBESTIER du Sénégal. *Cordia senegalensis*. Jussieu.

Cordia floribus tetrandris; foliis membranaceis, ovatis, acumatis, glabris; racemis brevibus. (N.)

C'est un arbre d'une médiocre grandeur, dont le tronc s'élève à environ vingt pieds de haut, & dont les rameaux sont grêles, noirâtres, cylindriques, très-glabres, garnis de feuilles pétioles, alternes, minces, membraneuses, très-entières, ovales, acuminées, longues de quatre à cinq pouces, larges de trois environ, vertes & glabres à leurs deux faces, chargées de nervures qui se divisent en veinules distribuées en réseau; les pétioles sont glabres, comprimés, longs d'environ deux pouces & plus.

Les fleurs forment une petite grappe paniculée, à rameaux courts, filiformes, à peine plus longs que les pétioles; les pédoncules propres, très-courts, uniflores; les fleurs, d'après l'observation de M. Adanson, ont leur calice monophylle, à trois divisions; la corolle monopétale, à demi-divisée en quatre; les étamines sont au nombre de quatre, insérées sur le tube de la corolle; l'ovaire est surmonté d'un style & de deux stigmates, chacun divisé en deux. Les fruits ne sont pas encore connus.

Cette plante a été rapportée du Sénégal par M. Adanson; peut-être, mieux connue, pourroit-elle former un genre particulier. Je ne l'ai mentionnée ici que d'après le rapprochement que M. de Jussieu en a fait lui-même des *Cordia* dans son herbier. (V. f. in herb. Juss.)

20. SÉBESTIER à feuilles de buis. *Cordia buxifolia*. Juss.

Cordia foliis coriaceis, ovato-subcuneatis, integerrimis; floribus paniculatis, lateralibus, terminatis. (N.)

Cette espèce se rapproche beaucoup, par son port, de l'*Arbutus buxifolia* Willd., des *Arbutus* de Cavanilles, surtout d'après la forme de ses feuilles; mais le caractère de ses calices rubulés en détermine le genre, quoique le fruit ne me soit pas connu. D'ailleurs, les fleurs sont paniculées, & non en grappes comme celles des *Arbutus*.

Ses rameaux sont alternes, cylindriques, très-glabres, striés, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, nombreuses, petites, assez semblables à celles du buis, ovales, coriaces, dures, très-entières, rudes, & chargées, à leur face supérieure, de points blanchâtres, médiocrement nerveuses, à peine longues d'un pouce, obtuses, arrondies à leur sommet, un peu rétrécies en coin à leur base; les pétioles sont très-courts, quelquefois nuls.

Les fleurs sont disposées en panicules latérales ou terminales, médiocrement garnies, un peu pubescentes ou de couleur cendrée sur leurs ramifications; le calice est court, d'une seule pièce, ovale-tubulé, divisé à son orifice en quatre lobes ovales, obtus. La corolle est infundibuliforme; son

tube cylindrique, plus long que le calice; le limbe ouvert, d'une grandeur médiocre; le style bitté; chaque division terminée par un stigmate simple, en tête. Le fruit n'est pas encore connu.

Cette plante a été communiquée par M. Dupuis à M. de Jussieu. J'ignore son lieu natal. (V. f. in herb. Juss.)

21. SÉBESTIER élevé. *Cordia exaltata*. Lam.

Cordia foliis ovatis, basi acutis, apiculis; corymbis terminali, floribus quinquefidis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1910.

C'est un grand arbre dont les rameaux sont glabres, striés, garnis de feuilles pétioles, alternes, rudes à leurs deux faces, ovales, rétrécies, aiguës à leur base, très-entières, obtuses, un peu acuminées à leur sommet, coriaces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, presque luisantes, longues de quatre pouces & plus, sur deux pouces au moins de largeur, soutenues par des pétioles très-courts, striés, légèrement comprimés.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, un peu plus long que les feuilles; leurs ramifications glabres, diffusées; les pédoncules propres, épais, très-courts, uniflores. Le calice est court, glabre, élargi, campanulé, terminé par cinq petites pointes très-aiguës, persistantes. Le fruit est un drupe globuleux, de la grosseur d'un pois, pulpeux, à deux loges, contenant chacune une semence solitaire.

Cet arbuste croît dans la Guiane, où il a été observé par M. Richard (V. f. in herb. Lam.)

22. SÉBESTIER nerveux. *Cordia nervosa*. Lam.

Cordia foliis alternis oppositifolius, ovato-oblongis, acuminatis, nervosis; corymbis brevi, bracteis subulatis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. p. 422. n°. 1906.

C'est un arbre remarquable par la forme de ses feuilles très-grandes, ovales-oblongues; par leurs nervures saillantes, & qui à quelques rapports avec le *Cordia flavescens* d'Aublert.

Ses rameaux sont rudes, de couleur cendrée, anguleux, épais, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales-oblongues, glabres & luisantes à leur face supérieure, d'un vert foncé, nerveuses & d'un jaune-pâle en dessous, légèrement pubescentes, marquées de nervures fortes, saillantes, obliques, parallèles, un peu rameuses ou confluentes vers les bords des feuilles, qui sont longues de huit à dix pouces, sur quatre & plus de largeur, entières, acuminées à leur sommet; les pétioles très-courts, épais, noueux à leur base.

Les fleurs sont disposées en une panicule ou corymbe très-court; les premières divisions presque dichotomes; les rameaux courts, épais, pres-

que ligneux, glabres, accompagnés de bractées subules. Les calices sont glabres, d'une seule pièce, très-ouverts à l'époque des fruits, divisés à leurs bords en cinq découpures courtes, ovales, presque obtuses. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante a été recueillie, par M. Richard, dans la Guiane. (V. f. in herb. Lam.)

23. SÉBÉSTIER à feuilles rondes. *Cordia rotundifolia*. Ruiz & Pav.

Cordia foliis subrotundis ovalibus crenatis, scarbis; pedunculis corymbo-dichotomis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 24. tab. 148.

Prunus sebifera. Pluken. Almag. pag. 306. — Phytogr. tab. 217. fig. 2.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur d'environ douze pieds, dont les tiges sont droites, souvent presque couchées, cylindriques, très-rameuses; les rameaux très-longs, souples, flexueux, velus dans leur jeunesse, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, un peu arrondies ou ovales, crénelées à leur contour, ridées, très-veinées, rudes, un peu hispides, longues de deux à trois poices, sur deux de large.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, dichotome, au nombre de dix à douze, grandes, sessiles, de couleur jaune. Le calice est tubulé, strié, terminé par cinq dents aiguës & courtes. La corolle est grande, infundibuliforme; son tube est droit, de la longueur du calice, dilaté à son orifice; le limbe divisé en cinq découpures plissées, ovales, aiguës. Les filamens, au nombre de cinq, sont droits, subulés, velus à leur base; les anthères ovales, oblongues, concaves; l'ovaire ovale, acuminé; le style filiforme, bifide, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates bides. Le fruit est un drupe blanchâtre, ovale, acuminé, à demi-enveloppé par le calice & par une pulpe visqueuse, renfermant une noix ovale, acuminée, à cinq filons, à deux loges. Souvent le limbe de la corolle varie depuis six jusqu'à huit découpures; alors les mêmes variétés se retrouvent dans le nombre des étamines & des filons de la noix.

Cette plante croît au Pérou, aux environs de Lima, &c. dans les terrains arides, sablonneux, & sur le bord des chemins.

On emploie cette plante en décoction dans les fluxions & l'inflammation des yeux. Elle fleurit dans l'été & à la fin du printemps.

24. SÉBÉSTIER denté. *Cordia dentata*.

Cordia foliis ovatis, angulato-incisus, dentatis; panicula dichotoma, amplâ, divaricata; ramis petiolatis, hirsutis. (N.)

Espèce remarquable par la grandeur & la beauté de ses panicules amples, à ramifications nombreuses, divariquées, dichotomes, & par ses feuilles dentées ou incisées, presque anguleuses.

Ses rameaux sont un peu flexueux, bruns ou cendrés, cylindriques, rudes, chargés de poils courts, roides, blanchâtres, garnis de feuilles pétioles, alternes, ovales ou quelquefois un peu arrondies, assez grandes, rudes, couvertes de petits points blanchâtres à leur face supérieure, d'un vert-foncé, plus pâles, & un peu jaunâtres en dessous; les uns à peine denticulés; les autres médiocrement incisés, un peu anguleux, à dentelures courtes, aiguës; les nervures filiformes, saillantes, alternes, traversées par des veines parallèles & des veinules réticulées. Les feuilles ont de trois à cinq poices de long, sur deux ou quatre de large; les pétioles velus, grêles, cylindriques, longs d'un pouce & plus.

Les panicules sont amples, terminales, étalées; les ramifications nombreuses, dichotomes, divariquées, insensiblement plus courtes, roides, pubescentes. Les pédoncules propres font très-courts, uniflores. Le calice est court, presque campanulé, strié, obtus, à peine denticulé; la corolle blanche, infundibuliforme, presque campanulée. Son tube est court, dilaté à son orifice; son limbe ample, très-ouvert, entier ou un peu sinué à ses bords, à cinq ou six lobes très-courts.

Cette plante croît à Curaçao; elle a été communiquée par M. Vahl à M. de Jussieu. (V. f. in herb. Juss.)

25. SÉBÉSTIER à petites fleurs. *Cordia micrantha*. Swartz.

Cordia foliis ellipticis, acutis, integris, membranaceis, venosis; racemis compositis, laxis. Swartz, Prodr. pag. 47. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 460. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1075.

Cette espèce a des rapports avec le *Cordia allodora*; elle en diffère par ses feuilles un peu hispides en dessous, bien moins rétrécies à leurs deux extrémités; par ses grappes bien moins garnies, & par ses fleurs beaucoup plus petites.

Ses rameaux sont glabres, ridés, un peu tortueux, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, coriaces, pétioles, ovales, elliptiques, très-entières, d'un vert-foncé & presque luisantes en dessus, plus pâles à leur face inférieure, à peine rétrécies à leur base, obtuses ou quelquefois médiocrement acuminées à leur sommet, membranées dans leur jeunesse & un peu hispides en dessous, marquées de nervures saillantes & de veinules parallèles & en réseau; les pétioles courts, striés.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux,

rameaux, en panicules courtes, lâches, moins longues que les feuilles; les ramifications un peu comprimées & cendrées. Les calices sont très-courts, glabres, striés; la corolle fort petite.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les montagnes, au milieu des forêts. *H* (*V. f. in herb. Justeu.*)

26. SIBESTIER de la Chine. *Cordia sinensis*. Lamarck.

Cordia foliis oblongis, obtusis, ad axillas nervorum, villosis; paniculis foliis brevioribus. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 423. n°. 1914.

Cette espèce a des rapports avec le *Cordia indica*, surtout par la disposition & la forme de ses fleurs; elle en diffère par ses feuilles beaucoup plus étroites, velues aux aisselles des nervures.

Ses rameaux sont grêles, effilés, glabres, cylindriques, un peu striés, légèrement comprimés à leur partie supérieure, garnis de feuilles alternes, pétioles, oblongues, presque elliptiques, très-entières, obtuses à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, longues de deux à trois pouces, sur environ un demi-pouce de large, vertes, glabres, marquées en dessous de nervures fines, parallèles, dont les aisselles sont très-ordinairement munies de petites touffes de poils couchés & cendrés. Les pétioles sont filiformes, longs au moins d'un pouce, très-glabres.

Les fleurs forment de petites panicules latérales & terminales, dont les ramifications sont très-glabres, fines, divariquées ou dichotomes, souvent recourbées en dehors. Le calice est glabre, court, ovale, d'un vert-blanchâtre, à peine strié, ouvert, campanulé après la floraison, à quatre ou cinq lobes courts, obtus à son orifice. La corolle est blanchâtre, infundibuliforme, lobée à son limbe, environ une fois plus longue que le calice. Le fruit est un petit drupe ovale, contenant un noyau à deux loges.

Cet arbre croît dans la Chine. *H* (*V. f. in herb. Lamarck.*)

27. SIBESTIER de l'Inde. *Cordia indica*. Lam.

Cordia foliis ovatis, petiolatis, nudis; floribus paniculatis, tubo corollæ tubo incluso. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 422. n°. 1913.

On distingue cette espèce du *Cordia sinensis* à ses feuilles beaucoup plus larges, & dont les nervures sont d'ailleurs dépourvues de ces petites touffes de poils qui s'observent dans leurs aisselles sur le *Cordia sinensis*; mais les fleurs ont beaucoup de ressemblance.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, élançés, garnis de feuilles pétioles, alternes, ovales ou

Botanique. Tome VII.

ovales-lancéolées, très-entières, obtuses ou un peu aiguës, membracées, glabres, longues de deux à quatre pouces, larges d'un à deux pouces, vertes en dessus, plus pâles en dessous, à nervures obliques; les inférieures dirigées vers le sommet des feuilles; leur intervalle occupé par des veines réticulées; les pétioles grêles, souples, longs d'un pouce & demi.

Les fleurs sont disposées en panicules latérales & terminales, allongées, ramuscées, nées à leur partie inférieure; les rameaux alternes, terminés chacun par de petites grappes pendantes. Les pédoncules sont courts, inégaux; les calices d'une seule pièce, campanulés, glabres, blanchâtres, lobés & comme déchirés à leurs bords, très-ouverts, mais ovales & fermes avant la floraison. La corolle est petite; son tube entièrement renfermé dans le calice; son limbe court, ouvert. Les drupes sont petites, ovales, à deux loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales; d'où elle a été rapportée par M. Sonnerat. *H* (*V. f. in herb. Lom.*)

28. SIBESTIER à feuilles elliptiques. *Cordia elliptica*. Swartz.

Cordia foliis oblongis, apice attenuatis, integris, subopacis; racemis compositis, diffusis; drupis acuminatis. Swartz, Prodr. pag. 47. — Idem, Floit. Ind. occid. vol. 1. pag. 461. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1075. n°. 13.

Vulgairement manjak.

C'est un grand arbre, dont le tronc est épais, les branches étalées, les rameaux cylindriques, striés, dichotomes, garnis de feuilles alternes, pétioles, oblongues, un peu rétrécies à leur base, allongées, lancéolées à leur sommet, entières, un peu coriaces, glabres à leurs deux faces, luisantes, nerveuses & veinées, soutenues par des pétioles à demi-cylindriques, glabres, canaliculés en dessus.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, dichotomes, dont les ramifications sont très-étalées; les fleurs presque stériles, assez grandes, unilatérales. Le calice est coriace, elliptique, tubulé, glabre, persistant, à deux ou cinq découpures à son orifice; la corolle blanche; le tube en buse à sa base, à peine plus long que le calice; le limbe à cinq divisions linéaires, lancéolées, réfléchies; les filaments barbus, attachés au tube de la corolle; les anthères oblongues, tombantes, glanduleuses à leur sommet. L'ovaire est oblong; le style cylindrique; le stigmate dichotome. Le fruit est un drupe ovale, acuminé, long d'environ six lignes, soutenu par le calice très-ouvert & agrandi. Il contient un noyau osseux & ridé.

Cette plante se rencontre à la Jamaïque & à Saint-Domingue. *H* (*Descrip. ex Swartz.*)

G

* *Espèces moins connues.*

* *Cordia (aspera)*, foliis ovatis, acuminatis, asperis; floribus cymosis, rugosis. Forst. Prodrum. n°. 109.

Elle croît dans l'île de Tongatabu, où elle a été observée par Forster. Ses feuilles sont rudes, ovales, acuminées; les fleurs rugueuses, disposées en cime.

* *Cordia (dichotoma)*, foliis oblongo-ovatis, vix crenatis; corymbis dichotomis. Forst. Prodrum. n°. 110.

Forster a découvert cette plante dans la Nouvelle-Calédonie. Ses feuilles sont ovales, oblongues, à peine crénelées à leurs bords. Les fleurs sont disposées en un corymbe dichotome.

Observations. M. Cavanilles a établi un genre particulier sous le nom de *carmona*, dans lequel rentre le *Cordia ret-sa*, Vahl, Symbol. 2. pag. 42, qui est l'*ebretia buxifolia* de Roxburg. Coromand. 1. pag. 42. tab. 57. Le caractère essentiel de ce genre consiste, d'après M. Cavanilles, en un calice à cinq divisions profondes, très-étroites; une corolle infundibuliforme, à cinq découpures ovales; cinq étamines; deux styles capitulaires, terminés par des stigmates simples; un drupe globuleux, à six loges, chaque loge contenant une semence oblongue, solitaire.

Il revient à sur ce genre, & sur les espèces qui le composent, dans le Supplément de cet ouvrage.

SECHI. *Sechium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des euphorbes, qui a des rapports avec les *marounea* Aubl. & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles anguleuses, dont les fleurs sont disposées en grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques; un calice (ou corolle) campanulé, à cinq divisions; une petite dent entre chaque découpure; dans les fleurs mâles, un filament central, partagé en quatre à son sommet; quatre anthères; dans les fleurs femelles, un ovaire supérieur; un style; un stigmate, une grosse pomme charnue, monoïperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques, les mâles & les femelles réunies sur le même individu.

* Les fleurs mâles offrent :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, divisé jusque vers son milieu en cinq parties égales; entre chaque division une petite dent courte.

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne regarde comme calice les petites dents situées dans les dé-

coupures, & comme corolles les plus grandes divisions.

3°. Une seule étamine, dont le filament est central, épais, partagé en quatre à son sommet, terminé par quatre anthères en cœur.

4°. Point d'ovaire.

* Les fleurs femelles offrent :

1°. Un calice comme celui des fleurs mâles.

2°. Point de corolle.

3°. Point d'étamines.

4°. Un ovaire ovale, un style épais, simple, terminé par un stigmate en tête.

Le fruit est une très-grosse pomme charnue, un peu comprimée, en cœur renversé, contenant une seule semence ovale, obtuse.

Observations. L'espèce qui compose seule ce genre, seroit-elle le *ficus edulis* de Jacquin, Amer. pag. 258? La description que cet auteur donne des parties de la fructification, s'écarte en plusieurs points de celle de Brown, ou bien sont considérées sous d'autres rapports. Le calice & la corolle se ressemblent beaucoup; le premier est un tube campanulé, ouvert, dont le limbe se divise en cinq découpures planes; lancéolées, à uncinées; la corolle, adnée au calice, est également tubulée, campanulée; les découpures une fois plus longues que celles du calice; la partie supérieure du tube est murée de dix folioles. Les filaments des étamines, au nombre de cinq, sont moins élevés, réunis en cylindre, séparés à leur sommet. L'ovaire est inférieur; le style droit, cylindrique, de la longueur du calice; le stigmate très-grand, en rondache, tabaté, se divise à son bord en cinq découpures; les fruits très-gros, &c. (Voyez *SYCYOTE* comestible.)

Si par la suite l'observation confirme l'identité de ces deux plantes, il faudra rappeler dans ce genre le *ficus edulis* de Jacquin, dont les caractères de la fructification ne conviennent qu'en partie aux *ficus*.

ES PÈ C E.

SECHI d'Amérique. *Sechium americanum*.

Sechium foliis cordato-angulatis; racemis minoribus ad alas. Brown, Jam. pag. 355.

An ficus edulis? Var. vulgò dicta chayote françaises. Jacq. Amer. pag. 255.

Chocho. Adanson, Famille des Plant. vol. 2. pag. 300.

Ses tiges sont grimpantes; les feuilles anguleuses, alternes, en hancrées en cœur à leur base; les fleurs disposées en petites grappes axillaires. Le

fruit est une pomme glabre, charnue, de la grosseur d'un œuf de pigeon, un peu comprimée, à une seule loge, contenant une seule semence ovale, elliptique.

Cette plante croît naturellement à la Jamaïque, où on la cultive aussi à cause de ses fruits que l'on mange, & qui s'emploient dans les ragoûts. O.

SECURIDACA. *Securidaca*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, irrégulières, attaché à la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *browsea*, & qui comprend des arbrutes ou sous-arbrutes, dont les racines sont grimpantes dans la plupart; les feuilles simples, alternes, & les fleurs en épis ou paniculées, axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à trois folioles; une corolle papilionacée; l'étendard fort petit, à deux rétales entre deux ailes très grandes; huit étamines monadelphes; un style; une gousse ovale, à une seule loge monosperme, terminée par une aile plane, dilatée.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, caduc, composé de trois folioles ovales, colorées, deux inférieures, une supérieure.

2°. Une corolle papilionacée, à cinq pétales irréguliers, dont les ailes sont grandes, étalées, un peu arrondies, très-obtuses, saillantes d'entre les divisions latérales du calice; l'étendard fort petit, à deux pétales droits, oblongs, réfléchis à leur sommet, réunis par leur base avec la carène, celle-ci presque cylindrique, de la longueur des ailes, élargie à son limbe, munie d'un appendice plissé & obtus.

3°. Huit étamines monadelphes, dont les filaments, réunis à leur base en un seul paquet, sont terminés par des anthères droites & oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, surmonté d'un style subulé, terminé par un stigmate plan, dilaté, légèrement denté.

Le fruit est une gousse capsulaire, ovale & renflée à sa partie inférieure, à une seule loge, surmontée d'une aile allongée, aplatie, dilatée, obtuse; elle ne renferme qu'une seule semence oblongue.

E S P È C E S.

1. **SECURIDACA à tige grimpante.** *Securidaca foeniculacea*. Linn.

Securidaca caule scandente; foliis ovato-oblongis acutis; floribus spicato-racemosis. (N.) Lam. Illust. Gener. tab. 599. fig. 1.

Securidaca caule scandente. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 972. — Jacq. Stirp. Amer. p. 197. tab. 183. fig. 38. — Idem, Stirp. Amer. Pic. tab. 186.

Securidaca caule scandente, foliis oblongis, acutis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 89. n°. 2.

Securidaca foliis oblongis, spicis racemosis. Brown, Jam. 241.

Spartium scandens, fructu cristato & alato; flore rubro. Plum. Spec. & Icon. tab. 247. fig. 1.

Arbrut ou sous-arbrut dont les tiges sont grimpantes, & dont les rameaux, chargés de feuilles dans leur jeunesse, deviennent ensuite des espèces de vrilles très-fortes. Les feuilles sont alternes, pétioles, ovales-oblongues, glabres à leurs deux faces, très-entiers à leurs bords, aiguës à leur sommet ou quelquefois un peu obtuses.

Les fleurs sont disposées en épis ou en grappes latérales, lâches, opposées aux feuilles, médiocrement pédonculées; leur calice est composé de trois petites folioles caduques. La corolle est papilionacée, rougeâtre, inodore; l'étendard divisé en deux pétales aigus; les ailes longues, rétrécies à leur base; la carène garnie d'un ample appendice; le fruit est une gousse presque capsulaire, à une seule loge surmontée d'une grande aile membraneuse, amincie à ses bords, obtuse à son sommet.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. h

2. **SECURIDACA à tiges droites.** *Securidaca erecta*. Linn.

Securidaca caule erecto, strigato; foliis oblongis; floribus racemosis. (N.)

Securidaca caule erecto. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 992. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 197. tab. 183. fig. 39. — Idem, Stirp. Amer. Pic. tab. 261. fig. 56. — Swartz, Oberv. pag. 274.

Securidaca caule erecto, foliis oblongis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 898. n°. 1.

C'est un grand arbrut ou sous-arbrut, dont les tiges sont droites & non grimpantes, hautes d'environ douze pieds, divisées en rameaux grêles, faibles, alongés, peu nombreux, & dont les feuilles sont médiocrement pétioles, alternes, oblongues, glabres à leurs deux faces; les fleurs disposées en grappes latérales vers l'extrémité des rameaux, nombreuses, purpurines; les deux pétales, qui composent l'étendard, sont obtus; les ailes arrondies; la carène munie d'un appendice comprimé & réfléchi.

Cet arbrut croît dans les lieux pierreux de la Nouvelle-Espagne. h

3. **SECURIDACA à rameaux entiers.** *Securidaca virgata*. Swartz.

Securidaca caule scandente ; foliis subrotundis, obtusissimis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 899. n.° 3.

Securidaca caule scandente, ramis virgatis, foliis subrotundis. Swartz, Prodr. pag. 104. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1084.

Securidaca fruticosa ; foliis subrotundis ; ramulis tenuissimis ; spicis laxis, terminalibus. Brown, Jam. 187.

Sparium alterum, scandens, fructu alato, flore variegato. Plum. Spec. Icon. tab. 248. fig. 1.

Arbuste dont les tiges se divisent en rameaux grêles, alternes, effilés, glabres, striés, un peu cendrés, garnis de feuilles nombreuses, petites, légèrement pétioles, alternes, ovales ou presque rondes, entières à leurs bords, un peu goudronnées, minces, d'un vert tendre, un peu plus pâles en dessous, très-obtus, les nervures à peine sensibles ; arrondies à leur base, longues de cinq à six lignes & plus ; les pétioles très-courts.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux, en épis courts, denses, dont l'ensemble forme une sorte de panicule. Les pédoncules propres sont grêles, simples, filiformes, presque aussi longs que les fleurs. Le calice est fort petit ; la corolle d'une grandeur médiocre, d'un blanc teint de bleu. Le fruit est glabre, point strié, cendré, un peu pubescent dans sa jeunesse, surmonté d'une aile simple, membraneuse, très-mince.

Cet arbrisseau croît à Saint-Domingue & à la Martinique. (V. f. in herb. Lam.)

4. *SECURIDACA* à fleurs paniculées. *Securidaca paniculata.*

Securidaca foliis oblongis, acutis ; floribus terminalibus, paniculatis. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 599. fig. 2.

Arbuste dont les tiges droites se divisent en rameaux alternes, cylindriques, glabres, striés, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, simples, entières, coriaces, très-lisses à leurs deux faces, luisantes à leur face supérieure, oblongues, médiocrement échancrées en cœur à leur base, acuminées, aiguës à leur sommet, longues de trois à quatre pouces, sur deux pouces de large, marquées de nervures réticulées ; soutenues par des pétioles courts, épais ; d'environ deux lignes de long.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en panicules étalées, dont les ramifications sont grêles, simples, alternes ; les fleurs nombreuses, éparées, médiocrement pédonculées ; le rachis commun, hèsse de pointes ou de petits tubercules après la chute des fleurs. Le calice est fort petit ; la corolle médiocre, d'un blanc-jaunâtre, à ce qu'il lui a paru d'après la des-

secation. Le fruit est une gousse dure, ovale, profondément cannelée, à une seule loge, surmontée d'une aile membraneuse, ovale-oblongue, comprimée, très-obtuse.

Cette plante croît à Cayenne, où elle a été recueillie par M. Leblond. (V. f. in herb. Lam.)

SÈQUIER d'Amérique. *Sequiera americana.* Linn.

Sequiera foliis ellipticis, emarginatis ; aculeis recurvis, floribus racemosis. (N.)

Sequiera americana. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 608. — Syst. veget. 501. — Juss. Gen. Plant. 440.

Sequiera aculeata. Jacq. Stirp. Amer. pag. 170. — Idem, edit. 2. Plid. pag. 82. — Loefl. Iter, 191.

C'est un arbrisseau d'une hauteur médiocre, qui seul constitue un genre particulier à fleurs incomplètes, polyandriques, dont la famille & les rapports ne sont pas encore déterminés. Ses tiges se divisent en rameaux alternes, un peu diffus, armés, à la base des feuilles, d'aiguillons recourbés, qui manquent assez souvent ; garnis de feuilles alternes, pétioles, elliptiques, glabres à leurs deux faces, échancrées à leur sommet, entières à leurs bords. Les fleurs sont disposées en grappes à l'extrémité des rameaux.

Le caractère particulier de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles ; point de corolle ; un grand nombre d'étamines ; un seul style ; une semence terminée par une grande aile ; deux autres petites ailes latérales.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq folioles ouvertes, persistantes, oblongues, concaves, colorées ; les deux extérieures un peu plus petites.

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne regarde comme telle le calice.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filaments sont capillaires, étales, plus longs que le calice, terminés par des anthères oblongues, un peu comprimées.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, comprimé, muni à son sommet d'une aile mince, latérale, & d'une aile plus épaisse à l'autre côté ; surmonté d'un style très-court, inséré sur le côté le plus épais de l'ovaire, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une capsule oblongue, plus épaisse d'un côté, aillée de l'autre, munie à sa base de trois appendices en forme d'ailes, à une seule loge non ouverte, renfermant une semence glabre, foliacée, oblongue.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, aux environs de Carthagène, le long des chemins. h

Observations. Loureiro, dans sa *Flora de la Cochinchine*, a ajouté une nouvelle espèce à ce genre, sous le nom de *seguiera afasica*, qui ne m'est point connue.

SÈHIME. *Sehima*. Forsk. Genre de plantes unilobées ou monocotylédones, à fleurs glumacées, polygames, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *ischamum*, dont les fleurs sont disposées en épis, &c qui comprend des herbes exotiques à l'Europe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux valves, à deux fleurs ; des fleurs pédonculées mâles ; d'autres fleurs sessiles, l'une hermaphrodite, l'autre mâle.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de deux valves linéaires, lancéolées, biflores, plus longues que la corolle ; la valve extérieure terminée par deux scies ; l'intérieure aristée à son sommet.

2°. Une corolle à deux valves, valves intérieurement, linéaires, transparentes, mutiques.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, terminés par des anthères oblongues, bifides à leur sommet ; point de style dans les fleurs mâles.

4°. Un ovaire dans les fleurs hermaphrodites, surmonté de deux styles grêles, terminés par des stigmates plumeux.

Des semences solitaires.

Observations. Ce genre, qui a de très-grands rapports avec les *ischamum*, en diffère par les épillets pédonculés, qui ne contiennent que des fleurs mâles, au nombre de deux.

ESPÈCES.

SÈHIME d'Yémen. *Sehima ischamoides*. Forskh.

Sehima spica simplicis ; spiculis conjugatis, bifloris ; flore masculo mutico, hermaphrodito, aristato. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 178. n°. 91.

Cette plante a des tiges droites, filiformes, glabres, articulées, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, simples ou quelquefois un peu rameuses, garnies de feuilles alternes, planes, linéaires, striées, glabres, scabres, un peu velues à leur base, dont les gaines, plus longues que les feuilles, sont glabres, striées.

Les fleurs sont disposées en un épi terminal, ferré, long de six à sept pouces, composé d'épillets géminés, l'un sessile, l'autre pédonculé ; tous deux composés d'un calice à deux valves, biflores, &c d'une corolle bivalve. Dans l'épillet sessile, la fleur extérieure est mâle, l'intérieure hermaphrodite. Dans l'épillet pédonculé, les deux fleurs sont mâles.

Cette plante croît naturellement dans les montagnes de l'Yémen, où elle a été découverte &c décrite par Forskhall.

SEIGLE. *Secale*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a de grands rapports avec les fromens, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont longues, alternes, vaginales à leur base ; les tiges hautes ; les fleurs réunies en un épi allongé, composé d'épillets solitaires & biflores sur chaque dent de l'axe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux valves, à deux fleurs solitaires sur chaque dent de l'axe ; les valves opposées, plus petites que la corolle.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont réunies sur un rachis ou réceptacle commun, allongé, denté, portant des épillets sessiles, à deux fleurs, solitaires sur chaque dent de l'axe.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à deux valves, à deux fleurs ; les valves opposées, droites, linéaires, acuminées, plus petites que les fleurs.

2°. Une corolle composée de deux valves ; l'extérieure plus roide, ventrue, acuminée, comprimée, ciliée sur ses bords, terminée par une longue barbe ; la valve intérieure plane, lancéolée, mutique.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, pendans hors de la fleur, terminés par des anthères oblongues & fourchues.

4°. Un ovaire supérieur, turbiné, surmonté de deux styles velus ; terminé par des stigmates simples.

Les semences sont oblongues, solitaires, presque cylindriques, nues, acuminées à leur sommet, renfermées dans les valves de la corolle, qui s'en détachent.

ESPÈCES.

1. **SEIGLE commun.** *Secale cereale*. Linn.

Secale glumarum ciliis scabris. Linn. Spec. Plant.

vol. 1. pag. 124. — Hort. Upf. 21. — Haller, Helv. n°. 1421. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 624. n°. 1189. — Idem, Ill. vol. 1. pag. 211. n°. 1158. tab. 49. — Kœler, Gram. pag. 367. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 471. n°. 1.

Secale glumis floralibus glabris, ora demicalatâ.
Haller, in Comm. Nov. Goett. VI. pag. 12.

α. *Secale hybernæ.* Linn.

Secale hybernæ, vel majus. Tournef. Inst. R. Herb. 513. — C. Bauh. Pin. 22. — Idem, Theatr. Botan. 425. Icon. — Blakw. tab. 424.

Secale. J. Bauh. Hist. 2. pag. 416. Icon.

Rogæ, sive secale. Dodon. Pempt. 499. Icon.

β. *Secale vernum.* Linn.

Secale vernum vel minus. C. Bauh. Pin. 23. — Tournef. Inst. R. Herb. 513.

Secale alterum. Dalech. Hist. 1. pag. 396. Icon.

γ. *Secale compositum.* Kœler, Gram. pag. 368.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, articulées, très-simples, hautes de quatre à cinq pieds, garnies de feuilles alternes, d'une largeur médiocre, aiguës, glabres, striées, munies d'une longue guaine cylindrique, ferrée contre les tiges qu'elle embrasse, nue à son orifice; les articulations d'un brun-roussâtre au dessus de leur renflement.

Les tiges sont terminées par un épi simple, un peu grêle, long de quatre à cinq pouces, médiocrement comprimé, chargé de barbes droites, longues, très-rudes & accrochantes lorsqu'on les touche du sommet à leur base. Les épillets sont sessiles, biflores, alternes, très-serrés, disposés sur deux rangs; les valves florales extérieures très-aiguës, concaves, garnies à leurs bords de cils rudes; les intérieures plus étroites, membraneuses, plus courtes, enveloppées en partie par les valves extérieures. Elles font accompagnées extérieurement de deux paillettes calcinales, serrées, étroites, plus courtes que les fleurs. Les semences sont étroites, allongées, un peu aiguës à leur sommet, marquées d'une de leur face d'un sillon longitudinal.

Cette plante fournit quelques variétés: on en distingue deux principales dans la culture, mais qui ne diffèrent guère que dans les proportions de leur grandeur. L'une est le *seigle d'hiver*, qui s'élève davantage, & dont les épis sont plus longs, plus forts, mieux garnis: on le sème ordinairement en automne. L'autre est le *seigle d'été*, plus petit; ses épis plus grêles, & qui ne se lèvent guère qu'au printemps. Une autre variété plus remarquable, mais qu'on ne cultive que par curiosité, est le *seigle à épis rameux*.

Le *seigle ergoté* est le produit d'une maladie fort

singulière, à laquelle on a donné le nom d'*ergot* ou d'*étram* dans quelques contrées. C'est une production monstrueuse, c'est le grain même du seigle qui grossit, s'allonge considérablement, souvent de plus d'un pouce. Il est ordinairement un peu courbé comme un ergot, extérieurement d'un noir-violet plus ou moins foncé, blanc en dedans, très-serme, souvent un peu rétréci à ses deux extrémités, soutenu par les valves de la corolle. On attribue à cette production des effets très-funestes, tant pour les hommes que pour les animaux, particulièrement d'occasionner la gangrène sèche, qui fait tomber les extrémités du corps, mais heureusement l'ergot n'est pas très-commun, & n'attaque que quelques épis dans le même champ.

On cultive le seigle, particulièrement dans les climats froids; il aime les terres meubles & légères. On le soupçonne originaire du Levant, particulièrement de l'île de Crète. ○ (P. v.)

Le seigle cultivé dans les contrées septentrionales de l'Europe sert de nourriture à la plupart de ses habitants, surtout dans les pays où le blé ne réussit point parfaitement, comme dans des terrains trop fecs, trop légers, qui conviennent si bien au seigle. Sa farine donne un pain plus rafraîchissant que celle du froment, mais moins nutritif. Il peut convenir dans le cas de conspilation, mais il nuit aux personnes sujettes aux aigreurs. Mêlée en petite quantité avec la farine de froment, celle du seigle tient le pain frais, lui donne plus de faveur, mais elle le rend un peu plus pesant. On en fait des galettes aussi dures que le biscuit de mer, & qui se conservent toute l'année. Le pain d'épices est un mélange de seigle, d'orge & de miel. Quelques personnes font sôrir les grains du seigle, les mêlent avec ceux du café, & les emploient aux mêmes usages; mais il s'en faut de beaucoup que cette boisson ait les qualités & le parfum agréable du café pur. Lorsque le seigle ne mûrit pas, on le sèche au four, on sépare le grain non mûr, qu'on mange en hiver, préparé comme des petits pois.

Semé de bonne heure, on peut faucher le seigle pour fourrage, avant que le ruyau monte; il repousse ensuite sans que la récolte en souffre, surtout s'il survient de la pluie peu de tems après. Le seigle voulant être confié à une terre sèche, le froment à une terre forte, on a tort de les mêler pour faire du *métail*; l'un des deux manque nécessairement: ils ne mûrissent pas également, & la moisson s'en fait mal. Il vaut mieux les semer, les moule séparément, & mêler ensuite les farines. Le seigle bien mûr donne moins de son, plus de farine. Cette farine, appliquée extérieurement, est résolutive & désinfective. Le carapline de seigle & de sel de tarre dissipe l'esquimaie catarrhale. L'extrait de farine de seigle, traité avec l'acide nitreux, a donné à M. Cheval un tiers-moins

d'acide saccharin que le froment. Enfin le grain mis à germer, ensuite passé au tourail, est réduit en une farine rousse, sucrée, qui se conserve & sert dans les voyages. En la pétrissant avec de l'huile, du lait ou des sucres de fruits, selon les saisons & les ressources, on la mange dans le Nord sans autre apprêt & sans être cuire : elle est très-nourrissante. Avec de l'eau, elle fermente, & donne de l'eau-de-vie par la distillation.

La paille de seigle, longue, flexible, soignée dans le battage, sert à attacher la vigne, les jeunes arbres; à faire des liens, à empailler des chaises, à couvrir les habitations. Pour rendre ces couvertures plus solides, plus unies, & les mettre à l'abri du feu, on trempe la paille verticalement dans de la terre glaise délayée, & après l'avoir placée, on fait un enduit général avec la même terre. Cette paille est encore très-bonne pour les moutons, à qui la préfèrent à celle du froment : ces animaux mangent aussi les balles de seigle.

2. SEIGLE velu. *Secale villosum*. Linn.

Secale glutarum ciliis villosis, squamis calicinis canisformibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 124. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 210. n° 1159. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 471. n° 2. — Gouan, Hort. Monsp. pag. 56.

Gramen spicatum, fsecalinum; glumis villosis, in aristis longissimas desinensibus. Tourn. Infl. R. Herb. pag. 518.

Gramen fsecalinum maximum. Park. Theatr. 1144.

Confer cum hordeo ciliato. Dict. vol. 4. pag. 604.

β. *Gramen creticum, spicatum, fsecalinum; glumis ciliaribus*. Tourn. Coroll. pag. 39. — Buxb. Cent. 5. pag. 21. tab. 41.

Cette plante a des tiges droites, glabres, fermes, cylindriques, verticales, simples, hautes de deux ou trois pieds, articulées; les articulations d'un rouge-brun, au nombre de trois ou quatre, garnies de feuilles alternes, un peu étroites, lisses, d'un vert un peu glauque, rudes au toucher; leur gaine longue, striée, un peu renflée, glabre, munie à son orifice de quelques poils fins, rares, & d'une membrane courte, blanche, très-mince, entière, tronquée.

Les tiges sont terminées par un épi un peu touffu, alongé, médiocrement comprimé, composé d'épillet solitaires sur chaque dent de l'axe. Les deux valves calicinales font coriaces, membranées à leurs bords, tronquées à leur sommet, prolongées dans leur milieu en une arête droite, rude, subulée; marquées sur leur dos de deux nervures verdâtres, hérissées de poils blancs & nombreux. Ce calice contient deux fleurs sessiles, fertiles, & dans leur milieu une troisième stérile, pedicellée. Sa valve extérieure est concave, un

peu ventrue, presque glabre, légèrement velue vers son sommet, terminée par une très-longue barbe, chargée à sa base de quelques poils blancs, rude à sa partie supérieure. La valve intérieure est plane, obusée, mince, transparente, en partie enveloppée par la valve extérieure.

Cette plante croît naturellement dans les départements méridionaux de la France, & dans le Levant. Je l'ai également recueillie aux environs de Lyon. (La variété β se trouve à l'île de Crète.) On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (P. v.)

3. SEIGLE hérissé. *Secale hirtum*. Lam.

Secale spica brevi, ovata, distichâ; glauculis villosissimis, breviter aristatis. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 210. n° 1160.

β. *Secale orientale*. Linn. ?

Secale glumis hirsutis, squamis calicinis, subulatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 124. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 471. n° 3.

Gramen orientale, fsecalinum; spica brevi & laetâ. Tourn. Infl. R. Herb. Coroll. 39.

Cette espèce, communiquée à M. Lamarck par M. Vahl, paroît avoir beaucoup de rapports avec le seigle orientale de Linné, dont peut-être elle n'est qu'une variété; ce qui m'a engagé à réunir provisoirement ces deux espèces.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, médiocrement élevées, garnies de feuilles glabres, alternes, étroites, aiguës. Les épis sont petits, comprimés, composés d'épillets distichés, hérissés de poils; les valves extérieures des corolles, terminées par une barbe plus courte que les fleurs.

Cette plante croît naturellement en Espagne. (P. f. in herb. Lam.) La plante β se rencontre dans les îles de l'Archipel.

4. SEIGLE de Crète. *Secale creticum*. Linn.

Secale glumis extrorsum ciliatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 125. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 210. n° 1161. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 472. n° 4.

Gramen creticum, spicatum, fsecalinum, altissimum; tuberculi radice. Tourn. Infl. R. Herb. Coroll. 39. — Scheuch. Gram. 32.

On distingue cette espèce à ses racines noueuses, tuberculeuses, d'où s'élèvent des tiges fort hautes, grêles, cylindriques, glabres, garnies de feuilles alternes, étroites, aiguës, striées; les épis solitaires, terminaux, composés d'épillets sessiles, comprimés, dont les valves extérieures sont ciliées en dehors.

Cette plante a été observée par Toutnefort, dans l'île de Crète.

* *Secale* (pungens), *spica subovatâ*; *plumia subpatula*, *scabris pungentibus*. Perf. Synop. Plant. vol. 1. pag. 108. n°. 5.

An triticum (squamrosum), *spica ovali*, *squamrofa*; *spiculis distichis*; *calicibus trifloris*, *patentissimis*; *valvulis calicinis corollinæ lineari-subulosis*, *scabris*, *rigidis*? Roth, Botan. Beytr. 1. pag. 128, 129.

SÉLAGINE. *Selago*. Genre de plantes dicotylédones ou bilobées, à fleurs complètes, monopétales, tubulées, affilées à la famille des gartilliers, qui a des rapports avec les *cranthemum*, les *hebenstretia*, &c qui comprend des herbes ou des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, souvent confuses, rapprochées, les fleurs la plupart irrégulières, disposées en épis terminaux, simples ou rameux, ou quelquefois en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à quatre ou cinq divisions; une corolle tubulée, filiforme; le limbe, à trois ou cinq découpures; quatre étamines didymes; un style, un stigmate; une ou deux semences renfermées dans le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, d'une seule pièce, persistant, à quatre ou cinq divisions; l'inférieure ordinairement plus grande.

2°. Une corolle monopétale, dont le tube est petit, filiforme, quelquefois allongé, à peine ouvert; le limbe à trois ou cinq divisions presque égales, ouvertes; les deux supérieures plus petites, l'inférieure plus grande.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont capillaires, plus longs que la corolle sur laquelle ils sont insérés; les deux filaments supérieurs plus longs, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire supérieur presque rond, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple, aigu.

Le fruit consiste en une ou deux semences un peu arrondies, enveloppées par le calice.

Observations. Ce genre a quelques rapports avec la famille des labiées, par ses semences nues au foris du calice; mais outre qu'il n'en renferme ordinairement qu'une ou deux, la forme de la corolle infundibuliforme le rapproche davantage des gartilliers. Ses caractères génériques sont un peu va-

riables, surtout dans le nombre des divisions du calice &c de la corolle. Cette dernière est tantôt régulière, plus ordinairement irrégulière, à quatre ou cinq découpures à son limbe; le calice éprouve les mêmes variétés. Quelques-unes de ces espèces, surtout celles dont la corolle est régulière, pourroient être séparées &c réunies dans un genre particulier.

E S P È C E S.

1. **SÉLAGINE à corymbe.** *Selago corymbosa*.

Selago corymbo multipli, floribus disjunctis, foliis filiformibus, fasciculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 876. — Fab. Helmsl. 48. — Kniph. Cent. 8. n°. 84. — Berg. Plant. Capenf. pag. 156. n°. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 181. n°. 1.

Selago caule erecto, corymbo terminali. Hort. Cliff. 321. — Royen, Lugd. Bar. 300.

Camphorata africana, umbellata, frutescens. Commel. Hort. 2. pag. 79. tab. 20. — Rai, Suppl. 130.

Millefolio affinis maderaspatana, camphorata foliis radiatim nascentibus. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 30. — Rai, Suppl. 219.

2. *Selago* (cineræ), *corymbo composita; foliis linearibus fasciculatis, glabris, margine reflexo*. Linn. f. Suppl. pag. 285. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 181. n°. 2.

C'est un petit arbrisseau qui produit, des mêmes racines, plusieurs tiges droites, grêles, hautes d'environ un pied, cylindriques, légèrement pubescentes, presque simples ou rameuses à leur partie supérieure; les rameaux simples, courts, alternes, ramassés, garnis de feuilles éparées par paquets, linéaires, très-étroites, simples, filiformes, un peu pubescentes, obtuses, sessiles, longues de trois à quatre lignes, très-nombreuses.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en petits corymbes, dont l'ensemble forme un corymbe ample, fastigié. Le calice est fort petit, divisé en cinq découpures linéaires, un peu ovales, droites, presque égales, de couleur brune, un peu rudes sur leur dos, membraneuses & ciliées à leurs bords, munies à leur base de bractées solitaires, linéaires, concaves, obtuses, ciliées tant à leurs bords que sur leur dos. La corolle est blanchâtre ou d'un blanc-jaunâtre, infundibuliforme; le tube grêle, cylindrique, un peu plus long que le calice; le limbe un peu ouvert, à cinq découpures oblongues, obtuses, inégales; elle renferme quatre filaments capillaires, terminés par des anthères jaunes, arrondies. L'ovaire est fort petit, arrondi; le style sessile, comprimé, courbé, presque aussi long que la corolle; le stigmate extrêmement petit.

La

La plante ne paroît être qu'une variété de la précédente; elle en diffère par ses feuilles entièrement glabres, réfléchies à leurs bords. Ses fleurs sont disposées en un corymbe composé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. v.)

2. SÉLAGINE à plusieurs épis. *Selago polyflora*. Linn.

Selago corymbifera fasciculata; foliis filiformibus, aggregatis. Linn. Mantill. 250. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 181. n° 3.

Valeriana africana, fruticans; foliis erica. Commel. Hort. 2. pag. 221. tab. III.

Ses tiges sont frutescentes, droites, lisses, rameuses, hautes d'un demi-pied, garnies de feuilles fasciculées, nombreuses à chaque fascicule, filiformes, presque linéaires, roides, nues à leurs deux faces, une fois plus épaisses, &c. deux fois plus courtes que celles du *Selago corymbosa*, avec lequel cette espèce a beaucoup de rapports.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe composé de plusieurs épis fasciculés. Les calices sont petits, hispides; les corolles blanches; les fruits ovales, qui se partagent en deux semences appliqués l'une contre l'autre par une surface plane, environnées par le calice persistant.

Cette plante croît dans les campagnes sablonneuses, au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V. f. in herb. Lam.)

3. SÉLAGINE à feuilles de verveine. *Selago verbenacea*. Linn. f.

Selago spicis fasciculatis, foliis oblongis, glabris; caule tetragono, retriangulo. Linn. f. Suppl. 285. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 182.

Ses tiges sont droites, tétragones; les angles égaux, garnis de feuilles épaisses, oblongues, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en plusieurs épis alongés, fasciculés, assez semblables, par leur disposition, à l'inflorescence de plusieurs espèces de verveine.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

4. SÉLAGINE à feuilles de raiponce. *Selago rapunculoides*. Linn.

Selago spicis corymbosus, foliis dentatis. Linn. Amerit. Academ. vol. 4. pag. 319. &c. vol. 6. Afr. 25. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 182. n° 4.

Botanique. Tome VII.

Rapunculus foliis angustissimis, dentatis; floribus umbellatis. Burm. Afric. pag. 113. tab. 42. fig. 1.

Cette espèce a des tiges droites, cylindriques, très-simples, ligneuses, épaisses, rudes au toucher, hautes au moins de deux pieds, garnies à leur partie inférieure, de feuilles nombreuses, rapprochées, alternes, un peu épaisses, sessiles, entières, très-étroites, linéaires, aiguës à leur sommet, denticulées à leurs bords; les feuilles supérieures beaucoup plus courtes, distantes, pointues.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe touffu, en cime, dont les pédoncules sont divisés, à leur partie supérieure, en rameaux courts, presque simples, munis de bractées presque imbriquées, oblongues, lancéolées, aiguës. Les calices sont très-courts, tubulés; la corolle infundibuliforme. Son tube est grêle, alongé; le limbe à quatre découpures ouvertes, ovales, obuses, inégales; les deux extérieures plus grandes.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h*

5. SÉLAGINE bâtarde. *Selago spuria*. Linn.

Selago spicis corymbosus, foliis linearibus, denticulatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 877. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 182. n° 6.

Melampyrum africanum, spicatum; foliis angustissimis. Burm. Afric. pag. 115. tab. 42. fig. 3.

Ses tiges sont frutescentes, droites, presque simples, cylindriques, souvent de couleur purpurine, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles nombreuses, épaisses, alongées, sessiles, très-étroites, alternes, linéaires, très-rapprochées, denticulées à leurs bords, aiguës à leur sommet; les supérieures plus courtes, moins serrées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en plusieurs épis presque fasciculés, simples, cylindriques, oblongs, obtus, fortement imbriqués de bractées nombreuses, oblongues, membraneuses, aiguës, entières. Les calices sont glabres, courts, tubulés; la corolle monopétale, infundibuliforme; son tube grêle, filiforme, environ une fois plus long que le calice; le limbe divisé en cinq découpures courtes, inégales, obtuses; les étamines sont didynames; le style terminé par un stigmate capité. Le calice forme, autour des semences, une sorte de capsule qui se divise en six valves.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

6. SÉLAGINE dentée. *Selago dentata*. (N.)

H

Selago spicis subumbellatis; foliis subulatis, glabris, laevibus breviter dentatis; caule ramossimo. (N.)

Valerianoides aethiopicum, rhymela offic., umbellatum; pssylli crebrioribus crenatis foliis; ramossimum. Pluken. Amalth. pag. 207. tab. 445. fig. 7.

Arbrisseau peu élevé, qui a des rapports avec le *Selago spuria*, dont les tiges sont droites, divisées en rameaux alternes, diffus, nombreux, grêles, droits, glabres, cylindriques, garnis de feuilles éparées, sessiles, fort petites, linéaires-subulées, un peu épicées, appliquées contre les tiges, aiguës à leur sommet, munies à leurs bords de quelques petites dents obtuses, distantes, très-courtes, quelques-unes très-entières.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en épis courts, fasciculés, presque ombellés; les rameaux simples ou quelquefois légèrement rameux, munis de bractées lancéolées, aiguës, entières. Le calice est court, tubuleux; la corolle a un tube alongé, filiforme, élargi vers son orifice, divisé, à son limbe, en cinq lobes courts. Les fruits sont petits, disposés en un épi cylindrique & court.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V. f. in herb. Lam.)

7. SÉLAGINE capitée. *Selago capitata*. Linn.

Selago capitata terminalibus foliis fasciculatis, linearibus, curvatis, glabris. Linn. Mantill. 368. — Bern. Plant. Capens. pag. 157. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 184. n°. 16.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, de couleur cendrée, un peu glabres; les ramifications velues, brunes, inégales, garnies de feuilles fasciculées, charnues, linéaires, sessiles, un peu rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, subulées vers leur sommet, marquées en dessous d'un sillon longitudinal, longues à peine d'un pouce, de quatre à cinq à chaque fascicule.

Les fleurs sont disposées en épis en forme de cônes arrondis, solitaires à l'extrémité de chaque rameau, pedunculées, munies de bractées rhomboidales, membraneuses, aiguës, glabres, un peu concaves à leur base, planes à leurs bords, enveloppant chaque fleur. Le calice est d'une seule pièce, tubuleux, lâche, membraneux, à nervures anguleuses; plus court que les bractées, divisé à son orifice, en cinq découpures ovales, aiguës, droites, inégales, ciliées, dentées à leurs bords; les trois supérieures plus courtes, les deux inférieures plus larges & un peu plus longues. La corolle est infundibuliforme; son tube grêle, cylindrique, un peu plus long que le calice; le limbe partagé en cinq découpures ovales, oblongues, presque égales, un peu obtuses, ouvertes &

médiocrement réfléchies en dehors; les filaments des étamines, au nombre de quatre, insérés à un peu décurrens sur le tube; les anthères arrondies, à deux loges; le style subulé, de la longueur des étamines supérieures; le stigmate simple.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. *h*

8. SÉLAGINE fasciculée. *Selago fasciculata*. Linn.

Selago corymbo multiplici, foliis obovatis, glabris, serratis. Linn. Mantill. 250. — Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 496. — Idem. Collect. vol. 3. pag. 246. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 183. n°. 9. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 3. tab. 51. fig. 6. — Lam. Ill. Gen. tab. 521. fig. 2.

Tithymali facie planta aethiopica, brevibus serratis foliis, ad caulem imbricatis; foliis pinnatis in spicas summo ramulo aspidifolii. Pluken. Analth. pag. 202. tab. 446. fig. 4.

Ses tiges sont droites, très-simples, lisses, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes, presque éparées, sessiles, assez larges, ovales, un peu oblongues, lisses à leurs deux faces, fortement dentées à leur base, à leurs bords, très-entières à leur base & légèrement décurrentes, aiguës à leur sommet.

Les fleurs forment un corymbe épais, raméux à l'extrémité des tiges, garni de bractées alternes, sessiles, ovales, lancéolées, entières, acuminées, situées tant sur la longueur des pedoncules que sous chaque calice; ce dernier est tubuleux, divisé à son orifice en cinq dents subulées. La corolle est de couleur purpurine, tubuleuse; son tube est grêle, une fois plus long que le calice; elle renferme quatre étamines didynames, un style terminé par un stigmate obtus.

Cette plante croît sur les montagnes, au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V. f. in herb. Lam.)

9. SÉLAGINE à feuilles de polygala. *Selago polygaloides*. Linn. f.

Selago spicis terminalibus, bracteis calicibusque carinatis; laminibus scaris; foliis linearibus, glabris, margine reflexis. Linn. f. Suppl. pag. 284. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 183. n°. 10.

Ses tiges sont droites, garnies de feuilles alternes, alongées, linéaires, glabres à leurs deux faces, entières & roulées en dedans à leurs bords, assez semblables à celles du polygala commun. Les fleurs sont disposées en épis terminaux & pendans, munis de bractées relevées en carène, ainsi que les divisions du calice; un peu rudes à leur face extérieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

10. SÉLAGINE à épis ovales. *Selago ovata*. Ait.

Selago spicis strobilinis ovatis, terminalibus; foliis fasciatis, linearibus; caule fruticoso. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 355. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. p. 181. n° 11. — Curris, Magaf. n° 62. — Lam. Illustr. Gener. tab. 521. fig. 1.

— *Lippia (ovata), capitulis ovatis; foliis linearibus, integerrimis*. Linn. Mantiff. 89. — Burm. Prodr. 17.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont couchées, hautes d'environ un pied, garnies çà & là de petits nœuds filiformes, divisées en rameaux cylindriques, inégaux, alérnes, pubescents, munis de feuilles éparées, linéaires, un peu grasses, lisses à leurs deux faces, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, plus étroites à leur base, longues d'environ un pouce, dans l'aisselle desquelles naissent plusieurs autres petites feuilles, souvent au nombre de trois.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en forme de cône ovale, composé de bractées imbriquées, scieruses, glabres, ovales, plus longues que les calices, réfléchies à leur sommet, striées sous chaque fleur & dans la longueur des pédoncules. Le calice est tubulé, à cinq dents. La corolle est infundibuliforme, divisée, à son limbe, en cinq découpures ovales, obtuses, d'une couleur violette-foncée; elle renferme quatre étamines inférées sur le tube. L'ovaire est surmonté d'un style filiforme & d'un stigmate simple.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

11. SÉLAGINE écarlate. *Selago coccinea*. Linn.

Selago spicis corymbosis, foliis inferioribus linearibus, integerrimis; superioribus lanceolato-subulatis, subdentatis. Linn. Amœn. Academ. vol. 6. Artic. n° 21. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 184. n° 12.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *selago rapunculoides*, mais les feuilles sont beaucoup plus épaisses, très-glabres; les inférieures linéaires, très-entières; les supérieures lancéolées, subulées, légèrement dentées. Les fleurs sont disposées en épis qui forment, par leur réunion, un corymbe terminal. Les corolles sont d'une couleur pourpre très-foncée; la découpure extérieure de leur limbe, plus grande que les autres. Les tiges forment plusieurs ensemble des mêmes racines; elles sont très-simples, feuillées, hautes d'un pied.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. (V.)

12. SÉLAGINE à tiges roides. *Selago striata*. Berg.

Selago spicis subrotundis, paniculatis; foliis fasciculatis, filiformibus, hirsutis. Berg. Plant. Capenf. pag. 155. n° 1.

Cette plante a des tiges ligneuses, cylindriques, rameuses, un peu noueuses, pubescentes, striées, divisées en rameaux épais, très-longs, droits, simples, striés, velus, garnis de feuilles fasciculées, réunies au plus en nombre de huit à chaque fascicule, linéaires, filiformes, velues, un peu aiguës à leur sommet, longues de trois à quatre lignes, ouvertes, roulées à leurs bords, plus longues que les entrenœuds.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en plusieurs épis arrondis, paniculés, dont les pédoncules sont munis, à leur base & dans leur longueur, de bractées lancéolées, aiguës; celles qui se trouvent immédiatement sous les fleurs sont planes, ovales, velues, plus grandes que le calice; celui-ci, d'une seule pièce, tubulé, à cinq divisions subulées, égales. La corolle est monopétale, infundibuliforme, glabre, de couleur rouge; le tube cylindrique & filiforme, une fois plus long que le calice, renferme à sa partie supérieure; le limbe partagé en cinq découpures ovales, oblongues, obtuses, arrondies, très-ouvertes, plus courtes que le tube, presque égales, une d'elles un peu plus grande; quatre étamines didynames, insérées sur le tube de la corolle; des anthères arrondies; l'ovaire oblong & supérieur, surmonté d'un style sétacé, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (V. (Descript. ex Berg.)

13. SÉLAGINE à feuilles triangulaires. *Selago triquetra*. Linn. f.

Selago foliis triquetris, imbricatis, recurvato-reflexis, glabris; spicis terminalibus. Linn. f. Suppl. pag. 284. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 184. n° 17.

La seule phrase de Linné fils, sur cette plante sans description, sans figures, ne me permet pas d'affirmer que l'espèce dont je vais parler soit véritablement la même que la sienne, quoiqu'elle en ait le principal caractère par ses feuilles triangulaires & glabres.

C'est un arbrisseau dont les tiges ou les branches se divisent, vers leur sommet, en un grand nombre de rameaux presque fasciculés, inégaux, très-simples, assez courts, glabres, cylindriques, épars, très-droits, garnis, dans toute leur longueur, de feuilles nombreuses, imbriquées, éparées, filiformes, très-glabres, très-entières, étroites, fort petites, subulées, triangulaires, ou relevées, sur le dos, en carène saillante, vertes, un peu charnues, droites, appliquées contre les tiges,

mais réfléchies en dehors à mesure qu'elles vieillissent.

Les fleurs, non encore développés dans les individus que j'ai observés, étoient disposés en épis courts, réunis en une tête ovale, terminale, munie de bractées ou de feuilles florales assez semblables à celles des rameaux, mais un peu plus larges, légèrement membraneuses à leurs bords, presque plan, s, aigus, avec une nervure saillante. Les feuilles supérieures des rameaux offrent presque le même caractère à mesure qu'elles approchent du sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *b* (*V. f. in herb. Lam.*)

14. SÉLAGINE frutescente. *Selago frutescens*. Linn.

Selago capitulis subrotundis, terminalibus; foliis sparsis, linearibus, obtusis, integerrimis; caule fruticoso. Linn. Mantiss. 87. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 185. n°. 18.

C'est un arbrisseau assez élevé, dont les tiges se divisent en rameaux épars, inégaux, simples, droits, garnis de feuilles fort petites, épaisses, sessiles, linéaires, très-entières à leurs bords, obtus à leur sommet, glabres à leurs deux faces, nombreuses, très-rapprochées, serrées contre les tiges. Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des rameaux, en têtes presque sessiles & arrondies.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *b*

15. SÉLAGINE à dents de scie. *Selago serrata*. Berg.

Selago spicis corymbosis; foliis oppositis, cuneiformibus, obtusis, serratis, glabris, decurrentibus. Berg. Plant. Capens. pag. 159. n°. 5.

Cette plante, dont les fruits ne sont pas connus, paroît, par son port, s'écarter un peu des autres espèces de ce genre.

Ses tiges sont droites, simples, herbacées, cylindriques, glabres, garnies de feuilles opposées, sessiles, cuneiformes, glabres à leurs deux faces, obtus à leur sommet, rétrécies en coin à leur base, un peu décurrens, nombreuses, ouvertes, un peu plus longues que les entrenœuds.

Les fleurs sont disposées en corymbes composés de plusieurs épis médiocres, munis, sous chaque fleur, de bractées lancéolées, aigus, un peu dentées, situées également le long des pédoncules. Le calice est divisé en cinq découpures égales, linéaires, subulées, aigus, droites, persistantes. La corolle est monopétale; son tube droit, cylindrique, plusieurs fois plus long que le calice, un peu piléux à son orifice. Le limbe est partagé

en cinq divisions obtuses, presque égales, ouvertes, nerveuses. Les filaments, au nombre de quatre, sont subulés, plus courts que la corolle; les deux supérieurs plus longs que les inférieurs; les anthères arrondies; l'ovaire ovale, le style subulé, un peu plus long que la corolle; le stigmate simple, aigu.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Berg.*)

* *Espèces moins connues.*

* *Selago (hirta) hirta, spicis longissimis, foliis obovatis*. Linn. f. Suppl. pag. 285.

Cette plante est hérissée de poils sur toutes ses parties; les feuilles sont en ovale renversé, & les épis très-longs. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Selago (rotundifolia), corymbis compositis; foliis ovatis, glabris, obtusis*. Linn. f. Suppl. pag. 285.

Ses feuilles sont glabres, ovales, obtuses; les fleurs disposées en un corymbe composé. On la trouve au Cap de Bonne-Espérance.

* *Selago (canescens), spicis terminalibus; foliis filiformibus, fasciculatis, glabris*. Linn. f. Suppl. pag. 284.

Cette espèce, recueillie au Cap de Bonne-Espérance, a des feuilles glabres, filiformes, fasciculées; des épis terminaux.

* *Selago (geniculata), spicis terminalibus; foliis linearibus, fasciculatis, glabris, margine reflexis*. Linn. f. Suppl. pag. 284.

Les rameaux, dans cette espèce, sont très-étalés & divariqués; les feuilles glabres, linéaires, fasciculées, réfléchies à leurs bords; les fleurs disposées en épis terminaux. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Selago (hispida), spicis terminalibus; foliis linearibus, sparsis, reflexis, hispidis*. Linn. f. Suppl. pag. 284.

Les feuilles sont linéaires, épaisses, hispides, réfléchies; les épis terminaux. On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

* *Selago (ciliata), floribus spicatis; foliis ovatis, ciliatis, acutis*. Linn. f. Suppl. pag. 285.

Cette plante a des feuilles ovales, ciliées à leurs bords, aigus à leur sommet; les fleurs sont disposées en épis. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Le *Selago dubia* de Linné a été rangé par la suite & par lui-même dans les *eranthemum*. (*Voyez dans ce Dictionnaire, ERANTHÈME à feuilles étroites, n°. 1.*)

Le *selago lychnides* a été reconnu par Linné fils pour appartenir à *erinus* ; il l'a mentionné sous le nom d'*erinus fragrans*. (Voyez dans ce Dictionnaire, l'article ERINE.)

SELIEN. *Selinum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs en ombelles, de la famille des ombellifères, qui a des rapports avec les athamantes & les ciguës, & qui comprend des herbes presque toutes indigènes de l'Europe, à feuilles ailées, & dont les ombelles sont munies de collettes à plusieurs folioles ; la collette générale nulle dans plusieurs espèces.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Cinq pétales en cœur, tous égaux ; des semences ovales, oblongues, planes, comprimées, striées dans leur milieu ; des collettes partielles, réfléchies, à plusieurs folioles.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs, disposées en ombelles, offrent :

Une ombelle universelle, à rayons nombreux, plane, ouverte ; d'autres ombelles partielles, de même forme ; les unes & les autres munies d'une collette à plusieurs folioles linéaires, lancéolées, réfléchies.

Chaque fleur offre :

- 1°. Un calice d'une seule pièce, à peine sensible.
- 2°. Une corolle composée de cinq pétales en cœur, tous égaux, sans fleurs stériles.
- 3°. Cinq étamines, dont les filaments sont capillaires, & les anthères arrondies.
- 4°. Un ovaire inférieur, surmonté de deux styles réfléchis, terminés par des stigmates simples.

Deux semences ovales, oblongues, planes, comprimées, striées dans leur milieu, membraneuses à leurs côtés, appliquées fortement l'une contre l'autre.

Observations. Ce genre a beaucoup de rapports avec les athamantes : ces derniers n'en diffèrent essentiellement que par leurs semences plus ou moins velues ou pubescentes, tandis qu'elles sont parfaitement glabres dans les selins, ordinairement relevées de cinq nervures, dont les deux latérales sont saillantes ou membraneuses. C'est d'après ces considérations que nous avons réuni aux selins quelques athamantes qui offroient ce caractère, tels que l'*athamanta cervaria*, & l'*athamanta orcoselinum*, espèces que M. Lamarck a lui-même exclues du genre athamante.

Les *selinum* décrits par M. Cavanilles dans les *Icon. Rar.*, forment un genre nouveau établi par M. Petsoon, ainsi qu'on le verra à la fin de cet article.

ESPÈCES.

1. SELIN sauvage. *Selinum silvestre*. Linn.

Selinum caule levi ; radice fusiformi, multiplici. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 136. n°. 1.

Selinum radice fusiformi, multiplici ; stylis cretulis, corollulis explicatis. Linn. f. Suppl. pag. 180.

Selinum radice fusiformi, multiplici. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 350. — Hort. Clifort. 93. — Hort. Upsal. 59. — Roy. Lugd. Bat. 106. — Cæder. Flor. dan. tab. 412. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 132. — vol. II, pag. 352.

Selinum laetescens, caule aspero, foliis triplicatopinnatis. Hall. Helv. n°. 800. ?

Selinum laetescens. Var. 2. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 418. n°. 1001.

Apium silvestre Dodonæi, thysselinum quorundam. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 188. 1c.

Apium silvestre, lacteo succo turgens. C. Bauhin, Pin. 153.

Thysselinum Plinii. Lobel. Observ. 409. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 319. 5. 9. tab. 17. fig. 2. — Tournef. Inst. R. Herb. 319.

Apium silvestre, sive thysselinum. Dodon. Pempt. pag. 699. Icon.

Cette plante est un peu laiteuse ; elle a des racines charnues, fusiformes, divisées en plusieurs ramifications alongées : il s'en élève un grand nombre de tiges droites, lisses, glabres, cylindriques, presque point striées, rameuses, hautes de deux ou trois pieds, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-amples, deux ou trois fois ailées, composées de folioles opposées, pinnatifides ou incisées ; les découpures entières, étroites, linéaires, aiguës, divergentes.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des rameaux & des tiges, en ombelles & ombellules blanches, médiocrement garnies, étalées ; les ombellules, petites, distantes ; les collettes, tant universelles que partielles, sont composées de plusieurs folioles linéaires, lancéolées, aiguës, membraneuses à leurs bords, à peine réfléchies ; les semences sont ovales, oblongues, obtuses, munies dans leur milieu de trois sillons & de trois côtes saillantes.

Cette plante croît en Auvergne, dans l'Alsace & dans plusieurs autres contrées de l'Europe, dans les bois, dans les lieux humides. (V. f.)

Cette espèce, ainsi que le *selinum poliflorum*, passe pour diurétique, emménagogue, carminative ; mais elle n'est plus en usage : on la regarde même comme un poison caustique, dont l'usage interne seroit très-dangereux. Sa racine est acre.

Les Russes & les Lapons s'en servent au lieu de gingembre, comme masticator; les vaches, les chevaux & les chèvres la mangent.

2. SELIN des marais. *Selinum palustre*. Linn.

Selinum caule striato; radice fusiformi, subdivisâ radiis umbellâ hispida. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1397. n°. 2.

Selinum sublaetescens, radice unied. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 350. — Ædth. Flor. dan. tab. 257. — Jacq. Vind. 49. — Pollich. Pal. n°. 276. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 232. — Gmel Sibit. vol. 1. pag. 204. — Roth. Germ. vol. 1. p. 132. — vol. II. pag. 555. — Hoffm. Germ. 95. — Lam. Illustr. Gen. tab. 200. fig. 1. — Smith, Flor. britann. vol. 1. pag. 303.

Selinum sublaetescens, leve; foliis quadruplicato pinnatis, linearibus. Hall. Hclv. n°. 799.

Selinum laetescens. Var. a. Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 418. n°. 1001.

Selinum silvestre. Jacq. Flor. austr. tab. 152. — Hort. Synopf. 145.

Selinum (tysselinum), *falcis caulis hispida; umbellâ retrof.* Crantz. Austr. pag. 170.

Thyselinum angustifolium. Rivin. tab. 13.

Seseli palustre, laetescens, acris, foliis serrulatis; flore albo, semine lato. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 188. Icon.

Selinum foliolis & lacinalis oblongo-linearibus. Guert. Stamp. vol. 2. pag. 70.

Selinum palustre, laetescens. Flor. lappon. 110. — Flor. suec. 227, 259. — Hort. Cliff. 92. — Royen, Lugd. Bat. 116.

Seseli palustre, laetescens. C. Bauh. Pin. t62, & Prodr. 85.

Thyselinum palustre. Tourn. Infl. R. Herb. 319.

Selinum montanum. Schleich, Centur. exf. 31.

Cette espèce est peu distincte du *Selinum silvestre*; elle n'en est peut-être qu'une simple variété, distinguée par des tiges moins nombreuses, des feuilles moins amples; elle est un peu laiteuse.

Ses racines ont épaisses, fusiformes; ses tiges médiocrement rameuses, droites, cylindriques, très-dures, ordinairement foliaires, profondément cannelées, & non pas légèrement striées, glabres ou un peu hispides sur les angles, garnies de feuilles amples, pétiolées, alternes, trois & presque quatre fois ailées; les folioles linéaires, oblongues, opposées; les terminales beaucoup plus allongées. Les fleurs sont réunies en ombelles terminales, planes, grandes, les rayons un peu pubescens, au nombre de vingt à vingt-cinq & plus.

La collerette universelle est composée de huit à dix folioles linéaires, un peu membraneuses à leurs bords, réfléchies sur le pédoncule; les ombelles partielles plus garnies; leur collerette semblable à la collerette universelle. Les semences sont comprimées, elliptiques, à trois côtes saillantes sur le dos, environnées d'une aile membraneuse.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Europe, dans l'Auvergne, le Dauphiné, aux lieux marécageux. (V. f.)

On lui attribue les mêmes propriétés qu'au *Selinum silvestre*: les racines sont encore plus caustiques. On n'en fait d'ailleurs aucun usage.

3. SELIN d'Autriche. *Selinum austriacum*. Linn.

Selinum caule sulcato; involucro universali polyphylo; foliolis cuneiformibus, incisâ. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1397. n°. 3.

Selinum (austriacum), *caule striato, sulcato; foliis ovatis, incisâ.* Linn. Syst. veget. pag. 278. — Jacq. Flor. austr. vol. 1. tab. 71.

Selinum (austriacum), *foliolis subovatis, trifidis, incisâ.* Jacq. Vind. 49. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 319. — Hort. Synopf. 145.

Selinum (argenteum), *foliis longis, bipinnatis; foliolis ovatis, sapè trifidis.* Villars, Dauph. vol. 2. pag. 636. — Allion, Flor. pedem. n°. 1304.

Selinum petiolis argenteis & viridibus; striis lineatis; semine alis latis, albidis. Crantz. Austr. Fasc. 3. pag. 43. tab. 14. fig. 2.

Selinum nigrum. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 420. n°. 1001.

Dauci tertium genus. Fuchs, Hist. pag. 233.

Cette espèce a des racines rameuses, branchues, un peu jaunâtres, munies à leur collet de membranes sèches, noirâtres: il s'en élève une tige droite, haute d'environ deux pieds, à peire rameuse, glabre, striée, un peu cannelée, de couleur vert-âtre, mais dont les stries sont d'un blanc-argente, garnies de feuilles pétiolées, alternes, au moins deux fois ailées; les radicales, de forme triangulaire, glabres à leurs deux faces, composées de folioles élargies, d'un vert-foncé ou noirâtre en dessus, plus pâles en dessous, divisées ordinairement en trois lobes cunéiformes, incisés, aigus. Les pétiolés sont longs, durs, cylindriques, striés, un peu canaliculés à leur partie supérieure; les stries mélangées de vert & de blanc-argente; les feuilles caulinaires plus petites, une seule fois ailées; leurs découpures terminées par une petite pointe blanchâtre.

L'ombelle universelle est ample, hémisphérique, de vingt à trente rayons, munie d'une collerette d'environ huit à douze folioles planes, membra-

neufes, lancéolées, réfléchies, souvent blanchâtres à leurs bords; les ombelles, ainsi que les collerettes, partielles, plus petites, mais semblables à l'ombelle universelle; les pétales sont blancs & réguliers; les semences sont assez grandes, comprimées, munies, à leurs bords, d'une large membrane mince, ailée, & sur leur dos de trois côtes membraneuses.

Cette plante croît en Autriche, en Italie, dans les départemens méridionaux de la France, aux lieux stériles & pierreux. (V. f.)

4. SELIN de Sibirie. *Selinum sibiricum*.

Selinum foliis tripinnatis; involucri universali partibusque acoloribus, encephalyllis Herz. Observ. botan. 2. pag. 16. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1398. n°. 4.

Cette plante est remarquable par les collerettes partielles très-blanches, qui enveloppent entièrement les ombelles partielles avant leur entier développement. Elle a des racines fusiformes, d'une odeur de carotte dans leur jeunesse, & qui produisent des tiges droites, fistuleuses, hautes d'environ trois pieds, glauques, striées, garnies de feuilles à ternes, petiolées, trois fois ailées, dont les pinnules sont laciniées, aiguës, blanchâtres à leur sommet; les pétioles comprimés, canaliculés en dessus; les gaines des feuilles supérieures blanchâtres.

Les fleurs, disposées en ombelles, ont leurs pédoncules striés, au nombre de vingt à trente pour l'ombelle universelle, qui est environnée d'une collerette composée de neuf folioles appliquées contre les rayons, lancéolées, membraneuses, blanchâtres, transparentes, vertes sur leur côté, de la longueur de la moitié des pédoncules; les ombelles partielles ont le même nombre de rayons, leur collerette semblable à la première, mais les folioles plus larges & un peu plus longues que les fleurs: celles-ci sont blanches, à cinq pétales en cœur; les semences sont oblongues, un peu arrondies, relevées de trois côtes sur leur dos, outre les ailes marginales.

Cette plante croît dans la Sibirie. (Descript. ex Retz.)

5. SELIN de Monnier. *Selinum Monnieri*. Linn.

Selinum umbellulis confertis; involucri universali, reflexo; seminum costis quinque membranaceis. Linn. Amoenit. Academ. vol. 4. pag. 269. — Jacq. Hort. Vind. tab. 62. — Gouan, Illustr. 11. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1400. n°. 8.

Ligusticum minus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 474.

Cnidium confertum. Mœnch. Method. 98.

Cette espèce se rapproche beaucoup des *Ligusticum* par les membranes ailées qui garnissent les côtes de ses semences; mais toutes les autres parties, ses feuilles, son port, offrent les caractères des selins.

Ses tiges sont droites, glabres, un peu verdâtres, striées, presque cylindriques, médiocrement anguleuses, un peu rameuses, hautes d'un à deux pieds, garnies de feuilles ternées, pétioles, trois fois ailées, glabres à leurs deux faces, composées de folioles un peu étroites, courtes, médiocrement linéaires, obtuses, simples, quelquefois trifides, sur leur folioles terminales, entières à leurs bords.

Les fleurs sont blanches, réunies en ombelles terminales, serrées; l'ombelle universelle munie d'une collerette à plusieurs folioles étroites, réfléchies, caduques; les rayons assez nombreux, presque égaux, légèrement pubescens; les ombelles partielles petites, médiocrement ouvertes, garnies de collerettes assez semblables à celle de l'ombelle universelle, mais plus petites. Les semences sont courtes, un peu grosses, ovales, garnies dans leur milieu de cinq côtes saillantes, membraneuses.

Cette plante croît naturellement dans les départemens méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

6. SELIN perfillé. *Selinum oreofelinum*.

Selinum foliolis ovato-acutis, acutis serratis & incisif. Linn. Hort. Cliff. 92. — Roy. Lugd. Bat. 106.

Athamanta (oreofelinum), foliolis divaricatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 132. — Flor. suec. 2. n°. 241. — Mill. Dict. n°. 4. — Jacq. Flor. Austr. tab. 68. — Pollich. Pal. n°. 279. — Hoffm. Germ. 96. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1403. n°. 6.

Selinum oreofelinum. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 470. n°. 1001.

Selinum foliolis triplicato pinnatis, refractis. Hall. Helv. n°. 803.

Selinum foliolis laciniatisque oblongo-linearibus. Guertard, Scamp. vol. 1. pag. 70.

Selinum pinnis ad angulos obtusis pinnatis; pinnulis incisif, non serratis. Flor. suec. edit. 1. n°. 228.

Selinum (oreofelinum), foliolis costis refractis, divaricatis; caule aequali, subnudo. Crantz. Austr. pag. 169.

Selinum oreofelinum. Scop. Carn. edit. 2. n°. 330. Roth. Germ. vol. 1. pag. 133. — Il. pag. 355.

Apium montanum, folio ampliore. C. Bauh. Pin. 153.

Apium montanum, nigrum. C. Bauh. Pin. 153.

— Seguiet, Plant. veton. vol. 2. pag. 31. — J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 101.

Oroscelinum. Cluf. Hist. 2. pag. 193. — Rivin. Pempt. 80. — Cluf. Pann. pag. 694. tab. 695.

Apium montanum Dalechampii. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 103.

Oroscelinum, five velgutta. Dod. Pempt. 656. Icon.

Oroscelinum opii folio, minus. Tourn. Infl. R. Herb. 318.

Oroscelinum nigrum. Delatre, Flore de l'Auvergne, 1. pag. 418.

Cette espèce se distingue à ses feuilles amples, assez semblables à celles du persil & à ses ombelles étalées.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, rameuses, hautes de deux ou trois pieds, striées, point anguleuses, d'un vert-foncé, garnies de feuilles très-grandes, alternes, pétiolées, trois fois ailées, composées de folioles nombreuses, cuneiformes, incisées, trifides ou pinnatifides, d'une grandeur médiocre, glabres à leurs deux faces; les pétioles communs & leurs divisions sont un peu plies, & comme brisés ou interrompus dans leur direction: ils tiennent à la tige par une gaine membraneuse, alongée, striée.

Les fleurs sont blanches, disposées en ombelle à l'extrémité des tiges: les ombelles universelles assez amples, composées de rayons nombreux, presque égaux, glabres, striés, roides, grêles, munis d'une collerette à plusieurs folioles caduques: les ombelles partielles petites; leur collerette composée de folioles très-courtes, presque sétacées, aiguës. Les semences sont glabres, à trois stries sur leur dos.

On rencontre cette espèce en France, en Allemagne, en Angleterre, sur les collines arides. (P. v.)

Sa racine, qui est épaisse & dure, passe pour incisive, diurétique & sudorifique, atténuante. On en a cependant abandonné l'usage. On rapporte, dans les Mémoires de Breslaw, que sa décoction a calmé les douleurs de la goutte. Elle est inutile dans les paturages: les vaches n'en veulent point; mais les chevaux & les moutons la mangent.

7. SELIN glauque. *Selinum glaucum*.

Selinum foliolis pinnatis, decussatis, inciso-angulatis; seminibus natis.

Athamnia cervaria. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 352. — Miller, Dict. n°. 9. — Jacq. Austr. tab. 69. — Pollich. Pal. n°. 278. — Hoffm. Germ. 96. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1401. — Gerstn. de Fruit. & Sem. Cent. 2. tab. 21. fig. 10.

(*sub cervaria rivini*). — Lam. Illustr. Gener. tab. 100. fig. 2.

Selinum glaucum. Lamarek, Flor. franç. vol. 3. pag. 419. n°. 1001.

Selinum foliis radicalibus ovatis, inaequaliter serratis. Hort. Cliff. 92. — Hort. Upf. 59.

Selinum foliis duplicato-pinnatis; pinnis semi-lobatis, circumferratis. Hal. Helv. n°. 804.

Selinum cervaria. Scop. Carn. edit. 2. n°. 331. — Roth. Germ. vol. I. pag. 132. — vol. II. pag. 364.

Selinum (cervaria), foliis cartilagineis, infera appendiculatis, circumferratis; ferris denticulatis. Crantz. Austr. pag. 167. tab. 3. fig. 1.

Libanotis Theophrasti nigra. Tabern. 108.

Cervaria rigida. Mærch. Method. 95.

Seseli pannonicum. Cluf. Pann. pag. 691. tab. 692.

Daucus montanus, apii folio, major. C. Bauh. Pin. 150.

Dauci tertium genus. Fuchs, Hist. 235.

Cervaria Rivin. Rivin. Peut. 12.

Oroscelinum apii folio, majus. Tourn. Infl. R. Herb. 3. 8.

Daucus secundus, selinoides. Lobel. Icon. 720.

Libanotis altera quorundam, alius dicta cervaria, nigra. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 165. Icon.

Vulgairement persil des montagnes.

C'est une plante dont les tiges sont fermes, droites, hautes d'environ trois ou quatre pieds, très glabres, rameuses, lisses, striées, cylindriques, point anguleuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-ampl. deux fois ailées, composées de folioles grandes, presque ovales ou lanceolées, opposées, presque sessiles, un peu pinnatifides ou lobées, dentées en scie à l'or contour, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, presque coriaces, glabres à leurs deux faces, de couleur glauque, veinées à leur face inférieure. Les pétioles sont longs, striés, cylindriques, élargis à leur base en une membrane vaginale.

Les fleurs sont blanches, disposées à l'extrémité des tiges en ombelle. L'universelle est composée de rayons nombreux, grêles, ouverts, munis à leur base d'une collerette à plusieurs folioles petites, linéaires, aiguës, un peu rabattues en dehors: les ombelles partielles ressemblent en tout aux ombelles universelles, mais elles sont beaucoup plus petites: les semences sont glabres, comprimées, elliptiques, marquées à peine de trois stries sur leur dos, point bordées, caractères qui écarte un peu cette espèce de ce genre.

Cette

Cette plante croît sur les coteaux & les montagnes, en France, particulièrement dans les départements méridionaux; en Suisse, en Allemagne, en Autriche, &c. (V. v.)

Cette plante est employée, par les habitants de la Sicile, contre les fièvres intermittentes. Ses racines sont acres, aromatiques, & contiennent une huile essentielle que l'on en retire par distillation. Son extrait, surtout le résineux, est très-amer, un peu aromatique; ce qui fait présumer qu'il pourroit être employé utilement dans les cas de relâchement & de bouffissure.

8. SELIN variable. *Selinum decipiens*. Willd.

Selinum caule fig. 80, inferius nudo; foliis inferioribus bipinnatis; pinnulis lanceolatis, integris incisisque, serratis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 1450. n°. 9. — Schröd. & Wendl. Sert. hainov. Fasc. 3. pag. 23. tab. 13.

Cette plante est remarquable par la grandeur de toutes les parties, & par les folioles, les unes incisées, les autres entières.

Ses tiges sont grosses, de l'épaisseur du pouce, ligneuses & dépourvues de feuilles à leur partie inférieure. Les feuilles du bas sont amples, assez semblables à celles de l'angelique, pétiolées, deux fois ailées, composées de folioles lancéolées, dentées en scie; la terminale incisée; les feuilles florales simplement ailées; les folioles entières, incisées ou dentées; les inférieures incisées. Les gaines sont dilatées & dentées.

Les fleurs sont disposées en ombelles & en ombellules: la corollette universelle est composée de plusieurs folioles larges, lancéolées, cuneiformes, trifides, dont les bords sont membraneux. Les corollettes partielles sont également formées de plusieurs folioles lancéolées, plus étroites.

Le lieu natal de cette plante n'est pas encore connu. (Description ex Willd.)

9. SELIN anguleux. *Selinum carvifolia*. Linn.

Selinum caule sulcato, acutangulo; involucrio univulsi nudo; foliis lanceolatis, incis, apice callosomarginatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1398. n°. 5.

Selinum caule sulcato, acutangulo; involucrio univulsi evanido; stylis erectis, petalis connatis. Linn. Suppl. pag. 180.

Selinum caule sulcato, acutangulo; involucrio univulsi evanido; pinnulis fructibus reflexis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 350. — Jacq. Flor. austr. tab. 16. — Pollich. Pal. n°. 277. — Willch. Observ. n°. 78. — De la Chénal. in Act. Helv. 7. p. 336. — C. det. Flor. dan. tab. 667. — Hort. Synops. 145. Botanique, Tome VII.

— Roth. Germ. vol. I. pag. 132. — II. pag. 354. — Hoffm. Germ. 95.

Selinum angulatum. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 419. n°. 1001.

Selinum foliis triplicato-pinnatis; pinnulis latiusculis, simplicibus & trifidis. Hall. Helv. n°. 802. tab. 20.

Selinum caule alato, foliis bi & trifidis. Zinn. Gott. 221.

Selinum foliis pinnatis laciniatis. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 204. tab. 48.

Selinum pseudo-carvifolia. Allion. Flor. pedem. n°. 1306.

Angelica tenuifolia. Riv. Pent. tab. 18. — Rupp. Jen. 277. — Dill. Giff. 137.

Seseli pratense, tenuifolium, seu daucus Caspary Bauhini. Burf. Herb. VIII. 74.

Carvifolia. Bauh. Pin. 158. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 171. — Vaillant, Paris, tab. 5. fig. 2. ?

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois pieds au plus; elles sont droites, glabres, cylindriques, un peu rameuses, d'une grosseur médiocre, striées, fortement anguleuses, à angles tranchans, garnies de feuilles alternes, pétiolées, deux & trois fois ailées, glabres à leurs deux faces, composées de folioles courtes, nombreuses, assez petites, presque linéaires, les unes entières, d'autres trifides ou un peu pinnatides, terminées par une petite pointe ou une callosité blanchâtre. Les feuilles supérieures sont allongées, étroites, moins composées; leurs folioles un peu plus alongées.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales; les ombelles universelles, composées d'un grand nombre de rayons droits, presque égaux, roides, un peu striés, dépourvus de corollette générale; les ombelles partielles fort courtes, ouvertes, munies de corollettes à plusieurs folioles très-fines, courtes, inégales, ordinairement au nombre de deux ou trois. La corolle est blanche, régulière; les pétales connatis; les styles droits, réfléchis à l'époque de la maturité des semences. Les semences sont ovales, obtuses, un peu membraneuses sur leurs angles, très-glabres, un peu comprimées.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Europe, en France, en Suisse, en Allemagne, dans la Sibirie, dans les bois & les prés. Je l'ai recueillie aux environs de Soissons. (V. v.)

Ses racines sont très-dures, épaisses, presque simples, blanchâtres en dedans. La figure de Vaillant me paroît devoir être plutôt rapportée au

fili montanum, qu'à cette plante ; aussi ne l'ai-je citée qu'avec doute.

10. SELIN de chabrée. *Selinum chabrai*. Linn.

Selinum caule tereti, striato; involucri universali nullo; vaginis foliorum laxis; foliolis filiformi-linearibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1399. n°. 6.

Selinum (chabrai), vaginis foliorum caulinarum planis, flaccidis, penaulis. Linn. Syst. veget. pag. 279. — Jacq. Austr. vol. 1. tab. 71. — Hort. Synopf. 146. — Hoffm. Germ. 95.

Selinum (carvifolia), foliis multiplicibus, radicalibus circa costam decussatis. Crantz. Fascicul. 3. pag. 22. tab. 3. fig. 2. — Allion. Flor. pedem. n°. 1305.

Peucedanum (carvifolia), foliis pinnatis; foliolis linearibus, multifidis; caulinis bifariam pinnatis, longioribus. Villars, Dauph. vol. 2. pag. 630.

Selinum latifolens. Var. n. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 418.

Ligusticum decussatum. Moench. Method. 81.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *selinum carvifolia* ; ses folioles sont un peu plus longues, les feuilles caulinaires remarquables par leurs pétioles en gaines larges, pendantes.

Ses racines sont blanchâtres, simples, épaisses, cylindriques ; ses tiges roides, droites, très-glabres, dures, fort anguleuses, verdâtres, striées, médiocrement rameuses ; les rameaux ouverts, alternes ; les feuilles sont alternes, pétiolées ; les inférieures longuement pétiolées, deux fois, rarement trois fois ailées, glabres à leurs deux faces, composées de folioles confluentes à leur base, nerveuses en dessous, simples ou trifides ; leurs divisions irrégulières, presque obtuses, entières à leurs bords ; les feuilles caulinaires soutenues par des pétioles membraneux, en gaine, striés, souvent pendans, lâches ; les folioles linéaires presque filiformes, surtout aux feuilles supérieures.

Les fleurs sont blanches, réunies en ombelles à l'extrémité des tiges & des rameaux ; l'ombelle universelle composée de rayons nombreux, un peu ouverts, toides, très-glabres, striés, inégaux, dépourvus de collettes ; les ombelles partielles, courtes, à rayons assez nombreux, ouverts, planes ; munies de collettes composées de deux ou trois petites folioles fines, très-étroites, inégales, aiguës.

Cette plante croît en France, en Allemagne, en Italie, dans les forêts. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 2 (V. v.)

11. SELIN de Seguier. *Selinum Seguieri*. Linn.

Selinum caule subtereti, striato; involucri universali nullo; foliolis tripartitis, linearibus, mucronatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1399. n°. 7.

Selinum involucri universali, nullo; pappiis divaricatis. Linn. f. Suppl. pag. 179.

Selinum foliis partialibus decussatis; involucri universali, nullo. Linn. Syst. veget. pag. 230. — Jacq. Hort. tab. 61. — Hort. Synopf. 146.

Ligusticum alpinum, perenne ferula folio, floribus albis. Seguiet, Plant. Veron. vol. 2. pag. 41. tab. 13.

Ligusticum alpinum, foliis cicutæ tenuioribus & glabris, radice brevior. Till. Pis. pag. 98. tab. 39. fig. 2. ?

Cette plante pousse des mêmes racines plusieurs tiges glabres, lisses, hautes de trois à quatre pieds, droites, cylindriques, légèrement striées seulement à leur partie supérieure, munies de rameaux dont les supérieurs sont opposés. Les feuilles sont pétiolées, les inférieures alternes, les supérieures opposées, deux & trois fois ailées, très-ouvertes, composées de folioles feibles, linéaires, petites, un peu décurrentes à leur base, aiguës, presque mucronées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux & des tiges, en ombelles composées ; l'ombelle universelle composée de rayons nombreux, environ quarante, dépourvue de collette universelle ; les ombelles partielles petites, à rayons nombreux ; les pédoncules un peu striés ; les involucri partiels sont formés de plusieurs folioles sétacées, plus courtes que les fleurs. La corolle est blanche, ouverte ; les pistils ouverts horizontalement sur les semences.

Cette plante croît en Italie & dans la Carniole. 2

12. SELIN du Canada. *Selinum canadense*. Mich.

Selinum glaberrimum, lucidulum; foliis bipinnatis, foliolis multipartitis, lacinalis lanceolatis, fruticulos ovalibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 165.

Athamanta (chinensis), seminibus membranaceo-striatis; foliis supra decompositis, levibus, multifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 333. ?

Cette plante, d'après Michaux, diffère peu de l'*Athamanta chinensis* de Linné, avec laquelle il conviendrait peut-être de la réunir.

Ses tiges, ainsi que toutes les autres parties de cette plante, sont très-glabres, droites, anguleuses ; les feuilles alternes, luisantes, très-lisses, deux fois ailées, composées de folioles opposées, à plusieurs découpures, dont les divisions sont aiguës, lancéolées ; les fleurs blanches, disposées en ombelles, peu étalées, munies, tant à l'ombelle

univertelle, qu'aux ombellules, d'une collerette à plusieurs folioles. Les femences sont ovales, à cinq ftries, munies sut leurs ftries d'une petite aile courte, membraneuse.

Cette plante croît en Amérique, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, où elle a été observée par Michaux, & à la Chine. ?

13. SELIN à folioles linéaires. *Selinum lineare*. Schum.

Selinum caule sulcato, striato; foliis pinnatifidis; lacinia linearibus, Schumacher. Flor. zeel. pag. 96. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 5.

Cette plante a des tiges droites, sillonnées, ftries, rondes, hautes d'environ deux pieds; les feuilles sont alternes, glabres, de couleur glauque, ailes; les pinnules pinnatifides, à decoupures linéaires; les périoles élargis en une gaine membraneuse. Les fleurs font disposées en ombelles, de couleur blanche; les ombells munies d'une collerette à folioles fétaées & capillaires.

Cette plante croît dans le Dannemack, au milieu des champs.

14. SELIN d'Italie. *Selinum apianum*. Viv.

Selinum caule tereti, striato; involucri univerfolii, monophyllo; foliis vaginis amplexicaulibus, cretids; foliolis filiformibus, mucronatis. Vivian. Flor. ital. — Fragn. tab. 10. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 7.

Les tiges de cette plante sont droites, cylindriques, ftries, divisées en quelques rameaux roides, garnis de feuilles alternes, périolées, ailes, dont les gaines, qui forment en partie les pétioles, sont droites, amplexicaules; les folioles filiformes, mucronées à leur sommet. Les fleurs font disposées en ombelles terminales; l'involucre univerfel n'a qu'une seule foliole.

Cette plante croît en Italie, parmi les rochers des monts Carrares.

Nota. Les espèces suivantes, décrites par M. Cavanilles, n'ont ni le port ni même les caractères essentiels des selins. Ce font des plantes basses, presque ligneuses, dont les tiges font presque entièrement enveloppées par des gaines, courtes, imbriquées, qui se terminent par une feuille tres-courte, à trois ou cinq petites folioles lancéolées ou subulées; il faut en excepter le *Selinum acule*, qui a un port très-différent. Les fleurs font jaunes; les fruits ovales, renfés & non comprimés; les ombelles simples.

M. Perfoon, dans l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de *Synopsis Plantarum*, a séparé

ces plantes des *Selinum*, & les a rangées dans un genre particulier, sous le nom de *Mulinum*, qui nous paroit devoit être confervé, & qu'à l'ordre alphabétique nous force de placer à la suite, & sous le nom de *Selinum*.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des ombelles simples; un involucre à plusieurs folioles; des fruits ovales, renfés, profondément sillonnés, à angles arrondis; les pétales jaunes; les calices denticulés.

15. SELIN prolifère. *Selinum proliferum*. Cavan.

Selinum foliis trifidis, vaginantibus; lacinia subulatis, umbellâ proliferâ. Cavan. Icon. rar. vol. 5. pag. 58. tab. 486. fig. 1.

Mulinum proliferum. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 1.

Ses racines font tortueuses, rameuses, garnies de quelques fibres; elles produisent une tige presque simple, haute de trois ou quatre pouces, presque revêtue dans toute fa longueur par les gaines des feuilles: celles-ci font imbriquées, éparfes, très-rapprochées, glabres, munies d'une gaine ftriee, d'abord très-ferrée contre la tige, qui s'en écarte ensuite, se rétrécit, prend la forme d'un périole, & se termine par une petite feuille à trois folioles subulées, piquantes, longues de deux à trois lignes.

Les fleurs font disposées en une ombelle simple, souvent prolifère dans son centre, d'où s'élève une seconde ombelle. La collerette est composée de cinq à sept folioles linéaires, subulées, persistantes; les rayons font courts, uniflores, environ au nombre de douze; le pédoncule commun, qui les soutient, long d'environ un pouce. La corolle est jaune, étalée, les pétales ovales, aigus, très-entiers. Le fruit est arrondi, & se divise en deux femences glabres, ovales, marquées sur leur dos de deux petites ftries très-rapprochées, & à leurs bords d'une aile membraneuse, arrondie; surmontées d'une pointe très-courte.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, au port Descado; elle fleurit au mois de septembre. (*Descript. ex Cavan.*)

16. SELIN à petites feuilles. *Selinum microphyllum*.

Selinum foliis minutis, profundè tripartitis; petiolis caulem vaginantibus. Cavan. Icon. rar. vol. 5. pag. 59. n°. 555. tab. 489. fig. 2.

Mulinum microphyllum. Perfoon, Synopf. Plant. pag. 306. n°. 2.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la précédente. Ses tiges font ligneuses, épaisses, ramifiées, longues de trois à quatre pouces, 12

convertis en entier par les gaines des feuilles, semblables à de petites écailles persistantes, imbriquées. Ces gaines sont presque cylindriques, très-nombreuses, munies, à leurs bords, de cils blanchâtres; elles se terminent en un pétiole court, subulé, long d'une ligne, qui supporte à son sommet une très-petite feuille à trois découpures divergentes, très-courtes, lancéolées, tenninées par un poil blanc & caduc.

Les fleurs sont disposées en une ombelle simple, munie d'une collerette à trois ou quatre folioles linéaires, subulées, persistantes; les rayons, au nombre de trois à sept, soutenus à l'extrémité d'un pédoncule commun, longs de deux lignes. Les pétales sont jaunes; les fruits ovales, semblables d'ailleurs à ceux du *Selinum proliferum*.

Cette plante croît, avec la précédente, dans l'Amérique méridionale. (J. *Descript. ex Cavan.*)

17. SELIN épineux. *Selinum spinosum*. Cavan.

Selinum foliis quinquepartitis, laciniis lanceolatis, acuminatis; petiolis basi caulem vaginantibus. Cavan. Icon. rar. vol. 5. pag. 58. n°. 556. tab. 487. fig. 1.

Malinum spinosum. Petf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 3.

Coiron, vulg. Née. Herb.

Ses racines poussent des tiges nombreuses, rapprochées, cylindriques, hautes d'un demi-pied, rameuses, épaisses, garnies de feuilles épaisses, presque palmées, dont les gaines sont épaisses, longues d'un demi-pouce, rubulées, embrassant les tiges, se terminant en un pétiole canaliculé, linéaire, cannelé, pileux à ses bords, s'épanouissant en une feuille presque palmée, à cinq découpures inégales, lancéolées, très-aiguës, roides, piquantes, longues d'un demi-pouce; les deux latérales plus courtes.

Les fleurs sont disposées en une ombelle simple, terminale, dont la collerette est composée de dix à douze folioles lancéolées, subulées, persistantes; les rayons, environ au nombre de trente, courts, supportés par un pédoncule commun, droit, long d'un pouce & plus. La corolle est d'un jaune un peu rougeâtre; les pétales ovales, marqués de trois lignes; les fruits arrondis, assez gros.

Cette plante croît dans les hautes montagnes du Chili, où elle fleurit en janvier & février. (J. *Descript. ex Cavan.*)

18. SELIN acaule. *Selinum acaule*. Cavan.

Selinum foliis ovatis, infernè attenuatis; umbellâ radicali, sessili. Cavan. Icon. rar. vol. 5. pag. 59. n°. 557. tab. 487. fig. 2.

Mulinum acaule. Petf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 4.

Cette plante ne convient au nouveau genre *mulinum* que par les fruits, nullement par son port & par ses feuilles; elle n'a point de tiges. Ses feuilles sont ovales, très-entières.

Ses racines sont grosses, fortes, épaisses, & produisent, de leur collet, des feuilles nombreuses, imbriquées, ovales, presque spatulées, rétrécies en pétiole à leur base, glabres, ovales, obovées, très-inégales. De leur centre s'élève une ombelle simple, sessile, environnée par un involucre, composée de plusieurs folioles. Les rayons sont grêles, nombreux, longs d'un demi-pouce. La corolle est d'un jaune-clair. Le fruit, plus grand que dans les espèces précédentes, est ovale, marqué sur le dos de deux fortes stries saillantes, & à leurs bords d'une aile large, plane, ovale.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, au port Descado, où elle fleurit dans le mois de décembre. (J. *Descript. ex Cavan.*)

SEMENCES ou GRAINES. (*Semina*.) C'est cette partie essentielle du fruit, renfermée dans le pétaicpe, qui contient le principe d'une nouvelle plante de la même espèce que celle dont elle est une production. Destinées à perpétuer les espèces, à succéder à celles qui les ont produites, les semences sont donc le principal objet de la végétation. Les organes dont les végétaux sont pourvus, les opérations successives qu'ils exécutent à l'aide de ces organes, leur développement lent ou rapide, sont autant de moyens employés par la nature pour conduire les semences à une parfaite maturité, & l'on ne peut se défendre d'un vif sentiment d'admiration pour l'eternelle sagesse, lorsque l'on considère, avec l'œil attentif de l'observation, cette marche simple, mais sublime, qui conduit tous les êtres vivans au même but, à leur reproduction. Toutes les fois que des causes accidentelles ne les ont point interrompus dans les actes successifs de leur développement, ils ne cessent jamais d'exister qu'après avoir donné naissance à d'autres êtres semblables à eux.

L'examen rapide que nous allons faire des parties constitutives & essentielles des semences, en devenant la base de caractères très-importans dans l'étude de la botanique, nous apprendra en même tems avec quels soins attentifs la nature les a pourvus, soit de ce qui leur étoit nécessaire pour parvenir à une maturité complète, soit de tout ce qui pouvoit les mettre à l'abri des accidens particuliers auxquels elles sont exposées.

Les fruits n'existent jamais sans semences, à moins qu'elles n'avortent; mais les semences ne sont pas toujours des fruits: cette distinction est très-essentielle pour s'entendre. Une plante dont

des semences ou des graines, & non pas des fruits, lorsque les premières ne sont pas renfermées dans cette enveloppe particulière à laquelle on a donné le nom de *péricarpe*; ainsi le blé, l'orge, l'avoine, donnent des semences nues & non des fruits, les bêtes qui les enveloppe ne pouvant être regardées comme un *péricarpe*: on pourroit presque en dire autant des ombelles; mais les pommes, les prunes, &c. sont de véritables fruits, leurs semences étant renfermées dans une enveloppe épaisse, charnue, succulente; les fèves, les haricots, les melons, sont également de véritables fruits, & en général il est peu de semences qui n'aient un *péricarpe*. (*Voyez ce mot.*)

Les semences, soit enveloppées d'un *péricarpe*, soit nues, ont toutes des attributs qui leur sont communs & essentiels, & d'autres attributs particuliers, relatifs au genre ou à l'espèce à laquelle elles appartiennent.

Les semences, considérées en elles-mêmes, & relativement à leurs parties internes, essentielles & constitutives, sont composées de l'*embryon* & du *périsperme*.

L'*embryon* ou la plante (*embryo, corculum*), que quelques botanistes ont nommé le *germe*, est la partie la plus essentielle des semences; c'est la plante en miniature, à laquelle il ne manque que le développement convenable, & qui lui est imprimé par la germination. L'*embryon* est composé de deux parties essentielles, la *plumule* & la *radicule*, & presque toujours d'un ou de deux lobes ou *cotylédons*. (*Voyez ces mots.*)

L'*embryon* présente, tant dans sa forme que dans sa situation & sa direction, plusieurs caractères importants. Considéré quant à sa forme, il est cylindrique, comprimé, &c. Dans sa direction, il est droit, courbé en demi-cercle, entièrement circulaire ou en anneau, roulé en spirale, &c. Quant à sa situation, lorsqu'il est pourvu d'un *périsperme*, il réside tantôt dans le centre de cet organe, d'autrefois il l'entoure, ou bien il est placé à son sommet ou à sa base.

Quoique chaque semence ne contienne très-ordinairement qu'un seul *embryon*, il est des plantes cependant dans lesquelles on en trouve plusieurs. M. de Jussieu en a observé trois dans le *citrus aurantium*; Gærner en a remarqué deux dans le *pinus cembra*, & M. Ledru, voyageur très-instruit, a fait la même remarque pour les semences de *Evonymus europæus*.

La partie de l'*embryon* qui doit fournir les racines, & dont elle contient le rudiment, se nomme *radicule* (*radicalis, rosetum*); c'est elle qui s'échappe la première des enveloppes de la semence. Les observations de Grew & de Malpighi nous apprennent que, sous une apparence tendre & délicate, la *radicule* présente néanmoins

les mêmes éléments que les racines, savoir: une enveloppe, le parenchyme, la moelle & des vaisseaux.

Quoique l'*embryon* n'ait qu'une seule radicule, cependant celui du seigle, du froment, de l'orge, se divise en trois, quatre & même six parties distinctes, tellement qu'on seroit tenté de les regarder comme autant de radicules.

La radicule varie dans sa position ou dans sa situation, dans sa direction, dans sa forme & dans sa longueur. Considérée quant à sa position, elle est *supérieure*, c'est-à-dire que son extrémité inférieure est opposée au point d'attache de la semence dans les borraginées, les apocinées, les diplacées, les aménacées, les ombellifères, les euphorbes, &c.; *inférieure*, c'est-à-dire que son extrémité inférieure est dirigée vers le point d'attache de la semence dans les fleurs composées, &c. Dans plusieurs autres familles, elle est tantôt inférieure, tantôt supérieure, comme dans les rosacées, les lilacées, les rubiacées, les myrtes, les gentianes, &c. Considérée quant à sa direction, elle est *droite* dans les diplacées; *courbée* dans les solanées. Considérée quant à sa forme, elle est *conique* dans les cucurbitacées, *cylindrique* dans les caryophyllées, en *massue* dans l'épine-vinette, le caie, &c. Enfin, considérée quant à sa longueur, ou elle excède les cotylédons, comme dans le manglier, ou elle les égale comme dans la plupart des ombellifères, ou elle est plus courte comme dans les plantes monocotylédones, dans les légumineuses, &c.

La radicule est une partie si essentielle de l'*embryon*, que si on la retranche pendant la germination, la *plumule* périt; & si la plante continue alors à végéter, comme Malpighi l'a observé, c'est qu'il se forme une cicatrice, un nœud à la partie retranchée, qui donne naissance à des boutons, d'où il sort de petites racines; en sorte que cette espèce de bourrelet ou de nœud devient, comme le dit Sennelier, une radicule qui produit les mêmes effets que la véritable, & qui sert également au développement de la *plumule*.

On donne le nom de *plumule* à la partie de l'*embryon* qui doit se diriger vers le ciel, & former la tige & les rameaux. Gærner nous apprend que toutes les semences monocotylédones ou à un seul lobe, à l'exception de quelques graminées, sont dépourvues de *plumule*, & qu'il est même plusieurs semences dicotylédones où l'on seroit tenté de révoquer en doute son existence si l'on ne faisoit attention qu'elle est étroitement unie aux cotylédons qui la recouvrent. Cet habile observateur distingue deux espèces de *plumules*, les unes simples, & les autres composées. Les *plumules* simples sont celles qui ont des folioles sessiles & opposées par paires, comme dans le carthame, dans le laurier, &c. Les *plumules* composées sont celles

qui portent, sur un pétiole commun, des folioles tantôt conjuguées, comme dans le tamarin; tantôt digitées, comme dans le lupin; tantôt serrées & entaillées, comme dans la guêlle, dans la vesce, &c.

La radicule & la plumule ont une destination très-différente. Si l'on place une semence en terre, de manière que la radicule soit en haut, & la plumule en bas, elles ne tarderont pas à reprendre l'une & l'autre la direction qui semble leur être prescrite par la nature. Lorsque l'on sème des graines de haricot ou de toute autre plante, il est certain que, de toutes les semences qu'on a déposées dans le sein de la terre, il en est peu dont la radicule regarde la terre; toutes cependant, au moment de la germination, se replient verticalement en en-bas pour s'enfoncer dans l'intérieur de la terre, tandis que les plumules se replient verticalement en en-haut pour gagner l'air, qui est l'élément naturel de la tige.

Les cotylédons (voyez ce mot) sont ordinairement la partie la plus considérable de l'embryon. Ils paroissent, dit M. Ventenat, destinés, par la nature, à entretenir & à augmenter les principes de la vie végétale; aussi se flétrissent-ils au moment où les fucs, puisés dans l'intérieur de la terre, peuvent circuler dans la jeune plante. Les belles expériences de Bonnet prouvent leur grande utilité dans la végétation. Ce savant physicien coupa les cotylédons des embryons de quelques haricots qu'il avoit tenus pendant plusieurs jours dans l'eau. Il eut la patience & l'habileté d'élever ces embryons sévres & mutilés; mais il n'obtint que des végétaux maigres, très-petits, ou pour ainsi dire des plantes en miniature.

Dans le plus grand nombre de végétaux, les lobes ou cotylédons s'allongent, & sortent de terre en même tems que la tige naissante, & alors ils se changent en cette sorte particulière de feuilles qui naissent les premières, & qui ont très-souvent une forme différente de celles des feuilles qui viennent en suite. On les a nommées *feuilles féminales*: elles tombent dès que la plantule est assez forte pour se suffire à elle-même, & se nourrir des fucs de la terre. Néanmoins, dans beaucoup d'autres végétaux, les feuilles féminales, telles que celles des haricots, sont très-distinctes des lobes ou cotylédons qui restent dans la terre, où ils pourrissent.

Les lobes des planter dicotylédones présentent des différences dans leur texture, dans leur plicature, leur manière d'être dans la graine non germée, & leurs développemens divers pendant la germination. Ces différences sont constantes & uniformes dans les espèces d'un même genre, & dans les genres qui constituent des familles naturelles. Par exemple, les lobes sont droits dans les rosacées; repliés sur eux-mêmes dans les malpi-

ghies, les geraniens; réfléchis sur la radicule dans les capriers, les saponaires; recoquillés dans les malvacées; contournés dans les liliacées; semi-cylindriques dans les priméracées; foliacés, c'est-à-dire, planes ou semblables à de petites feuilles dans les acanthes, &c.

On trouve, dans les semences d'un très-grand nombre de végétaux, sous le tégument propre à chacune d'elles, un ou deux corps particuliers, distincts de ce tégument & de l'embryon lui-même, qui environnent ou accompagnent cet embryon, & qu'on peut considérer comme ses parties accessoires. L'un de ces corps a été nommé *périsperme*, & l'autre *vitellus*.

Le *périsperme* (*perispermum* Luff. *albumen* Gærtn.) est un corps particulier, plus ou moins charnu, qu'on trouve dans les semences d'un grand nombre de végétaux lorsqu'on a enlevé les deux tuniques dont elles sont ordinairement recouvertes; il est distinct de ces enveloppes & de l'embryon, & qui ressemble, dans la plupart, au blanc de l'œuf par sa consistance & sa couleur, d'où vient que Grew & Gærtner l'ont nommé *albumen*. Malpighi l'appeloit *secundina interna*. Il ne faut pas confondre le périsperme avec cette lame mince & charnue, adhérente à une portion de la surface intérieure de la membrane de la semence qui recouvre immédiatement l'embryon dans plusieurs rosacées, légumineuses, &c. Le vrai périsperme est donc distinct de l'enveloppe intérieure de la semence, & il est simplement contigu à l'embryon. Affect ordinairement il l'entoure; quelque fois néanmoins il en est entouré, c'est-à-dire qu'il occupe le centre de la semence. Cette manière d'être est exprimée par ces mots latins: *embryo periphericus* Gærtn., ou *corculum typo circumpositum* Luff. Les arroches, les ananthes, les caryophyllées, &c. en offrent un exemple.

Le périsperme varie, quant à la substance: tantôt il est *farineux*, comme dans les graminées; tantôt il est *corné*, comme dans le café; tantôt *légumeux*, comme dans les oméllitères; tantôt *amygdacé*, comme la belle-de-nuit. La couleur du périsperme est ordinairement d'un blanc plus ou moins vit, plus ou moins terne, & comme le nombre des graines qui ont de l'odeur est très-petit, il est ordinairement inodore.

Le périsperme paroît se former, à l'époque de la maturité des semences, par la liqueur condensée de l'amnios, & il persiste sous une forme plus ou moins solide, jusqu'à ce que la semence ait été déposée dans le sein de la terre. C'est alors qu'elle est excitée par la vertu germinative, il se reloue insensiblement en une sorte de liqueur ou de mucilage, afin de contribuer à la nourriture de la jeune plante. Cet organe n'est pas toujours apparent dans les semences, soit peut-être parce que la liqueur de l'amnios n'y étoit pas très-abondante, soit parce que cette liqueur a été entièrement pompée &

absorbée par l'embryon. Il n'est donc pas étonnant qu'il existe des familles dans lesquelles on n'en découvre aucune trace, telles que les naïades, les daphnés, les proées, les acanthes, les labiées, les borraginées, les bignonées, les composées, les crucifères, les sponaires, les malpighies, les gurtiers, les mélastomes, les mystes, les cucurbitacées, les amentacées, &c. Mais s'il est des plantes où les vestiges du périsperme ne sont point apparens, il en est plusieurs où ils sont très-sensibles. Par exemple, cet organe paroît suppléer dans quelques féselténiers & capriers, dans des rosacées & des legumineuses, par une lame charnue, plus ou moins épaisse, qui rapaisse la membrane intérieure des semences; & dans la famille des malvacées, des liférons, il existe par petites portions distinctes & situées entre les plus que forment les lobes de l'embryon, qui sont tronçés & comme chiffonnés.

Puisque la présence ou la disparition du périsperme, dit M. Vautier, semble tenir aux fonctions vitales de la plante, il suit que cet organe doit, ou exister, ou être nul dans les ordres parfaitement naturels. En effet, les semences sont pourvues d'un périsperme dans les graminées, les rubiacées, les ombellifères; elles en sont absolument privées dans les labiées, les composées, les crucifères, &c. ainsi que nous l'avons dit plus haut. Si l'on peut élever quelques doutes sur la valeur du caractère fourni par la présence ou l'absence du périsperme dans certaines familles, il n'en est pas de même de celle qui résulte du caractère que l'on tire de la portion de cet organe. En effet, la position du périsperme est constante dans tous les ordres où ce corps est apparent: tantôt il entoure l'embryon, ainsi qu'il a été dit plus haut; d'autres fois il en est entouré. Les considérations tirées de la nature de cet organe sont assez constantes dans les familles; & si l'on en excepte les aroïdes, les massifères & les cistes, dans lesquels elle varie, on trouve que cet organe est constamment charnu ou cartilagineux dans les palmiers, les asptéges, les joncs, les lilacées, les personnées, les solanées, les apocinées, les tubiacées, &c. farineux dans les graminées, &c.

Le périsperme n'est jamais que contigu à l'embryon, sans s'y confondre par une adhérence parfaite; mais il a quelquefois une cohésion remarquable avec le régument propre à la semence. A cet égard, M. Richard assure que toutes les fois que le périsperme est cohérent avec le régument propre de la semence, l'embryon est unilobé; & qu'au contraire l'embryon est généralement bilobé ou à deux cotylédons toutes les fois qu'il n'y a point de cohésion entre le périsperme & le régument propre de la semence. La vérification de cette intéressante observation paroît avoir une grande importance.

Le second des corps accessoires de l'embryon

est celui que Gærtner a nommé *viellus*, le comparant au jaune de l'œuf. Ce corps est bien moins connu que le périsperme, moins facile à distinguer, moins fréquent dans les semences, & peut-être que ce qu'on prend pour lui n'est pas réellement, dit M. Lamarck, un corps particulier, mais un appendice de l'embryon même, qui auroit une conformation propre à y donner lieu. Au reste, le *viellus* est un petit corps placé ordinairement entre le périsperme & l'embryon. Ce petit corps, que Malpighi avoit observé, adhère à l'embryon qu'il entoure, & c'est par ce caractère qu'il diffère du périsperme, qui est simplement contigu à l'embryon. Sa figure est très-variée: dans les graminées, où il est plus facile d'observer cet organe, il ressemble à une écaille taillée en écu, ou à un écusson. Quoique Gærtner l'ait comparé au jaune de l'œuf, il ne paroît pas cependant que sa nature & ses fonctions soient encore bien connues.

Les semences, considérées à l'extérieur, présentent d'abord une partie très-remarquable, appelée *ombilic*, *cicatrice* (*hilum* Linn.) Gærtner distingue deux espèces d'ombilic, l'un extérieur, & l'autre intérieur. L'ombilic extérieur (la véritable cicatrice), appelé *fenestra* par Malpighi, l'*hilum* de Linné, est cette partie de la graine qui forme l'ouverture observée dans son enveloppe extérieure. C'est son point d'attache avec le placenta ou le réceptacle propre de la semence. C'est depuis cette ouverture que les vaisseaux nourriciers se ramifient dans toutes les parties de la graine, & vont aboutir à la partie opposée où se forme l'ombilic intérieur, le *chalaz* de Gærtner. L'ombilic extérieur se resserre & se ferme jusqu'à un certain point, à mesure que la graine mûrit; mais il laisse toujours un petit passage par lequel les liqueurs s'introduisent. Cet ombilic varie par sa forme, par le lieu qu'il occupe, par sa consistance, qui est tantôt membraneuse, ou charnue, ou spongieuse; & tantôt coriace, ou crustacée, ou presque osseuse.

Gærtner a déterminé les différentes parties de la graine dégagée du péricarpe, ou renfermée dans cet organe, en les rapportant à l'ombilic extérieur. Il distingue de cette manière cinq régions dans la graine; savoir: *la base*, *le sommet*, *le ventre*, *le dos* & *les côtés*. Lorsque les semences sont dégagées du péricarpe, leur base, si elles sont oblongues ou presque globuleuses, est l'extrémité où est placé l'ombilic, & le sommet se trouve dans la partie opposée; mais si l'ombilic est situé entre les deux extrémités ou sur les bords d'une semence arrondie & légèrement comprimée, alors le ventre est la région où est situé l'ombilic; la partie opposée est le dos, & les autres parties sont les côtés.

Lorsque les semences sont renfermées dans un péricarpe, la partie contiguë à l'axe commun est le ventre; celle qui lui est opposée est le dos; l'ex-

trémité supérieure forme le sommet, quand même l'ombilic y seroit placé; l'autre extrémité est la base. La connoissance de la manière dont Gærtner a envisagé la graine, par rapport à sa situation, est nécessaire à ceux qui lisent les descriptions de ce célèbre botaniste; mais on peut rigoureusement s'en tenir à l'opinion de Linné, adoptée par la plupart des autres botanistes, qui fixe toujours la base de la semence dans le point de son ombilic.

La graine est enveloppée de membranes qui éclatent & se rompent diversement dans la germination. Gærtner a distingué deux espèces d'enveloppes; à savoir: les enveloppes propres & les accessoires: il compte parmi les enveloppes propres, celle qu'il appelle *test* ou enveloppe testacée (*testa*), & parmi les enveloppes accessoires, celles que les botanistes désignent par le nom d'*Arille* (*arillus*).

L'enveloppe appelée *test* (*testa*) paroît quelquefois seule & unique; mais plus souvent on en découvre une autre située au dessous d'elle. Ainsi chaque semence est ordinairement pourvue de deux enveloppes. L'enveloppe testacée, le *test* ou la plus extérieure, varie beaucoup dans sa consistance. Elle est membraneuse, coriace, spongieuse, charnue, crustacée, osseuse; elle est toujours composée d'une seule tunique, qui n'a d'autre ouverture que celle de l'ombilic, quoiqu'elle paroisse comme formée de deux valves dans les *diopirois*, les *royens*, &c. Sa couleur est toujours plus foncée que celle de la graine qu'elle renferme. Gærtner a observé qu'elle adhéroît fortement aux graines dans quelques familles monocotylédones, & que si on ne l'apprenoit pas dans certaines plantes, comme dans les *rhizophora*, les *jambosifera*, les *caryophyllus*, les *laurus* & autres, dont les semences sont appelées *acocce*, sans coque, c'est qu'elle se trouve collée aux parois du péricarpe. Cette enveloppe prend encore le nom de *tunique* ou de *tégument propre*. Elle est très-remarquable dans la fève, où elle porte le nom de *robe*; très-visible & distincte dans les pepins de poire & de pomme, &c.

L'enveloppe interne est facile à apercevoir dans un grand nombre de semences, surtout lorsqu'elles sont fraîches: il en est néanmoins quelques-unes où on la distingue difficilement; mais, comme l'observe Gærtner, on ne peut révoquer en doute son existence, & il est probable qu'elle est adhérente à la graine. Sa substance, toujours membraneuse, est quelquefois recouverte intérieurement d'une lame charnue; elle se sépare facilement de l'enveloppe testacée ou plus extérieure, & elle est d'une seule pièce. Les vaisseaux de l'ombilic rampent sur sa surface extérieure; leurs dernières ramifications pénètrent insensiblement dans la substance, & parviennent ainsi jusqu'à la graine. Le point où le réunissent les ramifica-

tions des vaisseaux, est appelé *ombilic interne* ou *chalaza*; c'est une petite tache colorée ou un petit tubercule, tantôt spongieux, tantôt calleux, forme par l'extrémité des vaisseaux ombilicaux internes, qu'on voit sur la membrane extérieure. Le *chalaza* se trouve, dans diverses graines, en opposition avec l'ombilic externe.

Les enveloppes accessoires couvrent la semence en tout ou en partie, & peuvent en être séparées avec facilité. Ces enveloppes sont l'épiderme & l'arille.

L'épiderme est cette pellicule très-mince qui enveloppe toute la graine, & qui ne la quitte jamais. Il est placé sur l'enveloppe extérieure; il est ordinairement membraneux, quelquefois il est couvert de poils, de petits tubercules, &c. il devient mucilagineux quand on le met dans l'eau.

L'arille est une enveloppe accessoire qui tire son origine de l'ombilic externe, auquel elle est adnée, & qui n'adhère point à l'enveloppe testacée ou externe dont elle se sépare facilement. Sa substance est quelquefois cartilagineuse, quelquefois elle est succulente, comme dans l'*evonymus*; l'arille recouvre tantôt la semence entière, comme dans le jaismin; tantôt il n'en recouvre qu'une partie plus ou moins grande, comme dans le *celastrus*, &c.; ordinairement il ne renferme qu'une seule semence, quelquefois néanmoins il en contient deux, comme dans le fusain, où il est assez vivement coloré, ainsi que dans beaucoup d'autres plantes; il est laciné dans le muscadier, où il prend le nom de *macis*. L'existence de l'arille n'est pas d'ailleurs d'une nécessité absolue; aussi trouve-t-on beaucoup de semences qui sont dépourvues de cette enveloppe.

Les semences sont parvenues à leur maturité lorsque leur substance a passé de l'état gélatineux à celui d'une certaine consistance, & lorsqu'elles remplissent exactement leur enveloppe. On donne à quelques-unes le nom d'*amandes*, particulièrement aux semences des fruits drupacés, ou des drupes. Cette amande est renfermée dans un noyau ou une boîte ligneuse, formée le plus souvent de deux battans ou valves solides, plus ou moins étroitement fermées. Duhamel, d'après des observations particulières, pense que le noyau est formé d'abord par une enveloppe glanduleuse. Si l'on fait macérer, dit-il, des noyaux dans l'eau, ils se divisent en petits grains semblables à ceux de la capsule pierreuse des poires; il est même des noyaux qui se dégradent sans macération préalable. Les noyaux paroissent unis à la pulpe qui les recouvre. On voit clairement, dit Duhamel, dans la pêche, une quantité de fibres qui lient cette pulpe au noyau. On les observe de même sur les abricots, & l'on voit surtout, dans la ratune où les deux battans s'unissent, une très-grosse fibre qui y est engagée. Cette fibre s'échappe & se divise en plusieurs faisceaux ou troncs principaux, lesquels

lesquels se subdivisent encore, & forment plusieurs rameaux particuliers, garnis d'un duvet très-fin, qui constitue dans la suite la pulpe ou enveloppe succulente.

Les amandes & les noyaux parviennent à leur grosseur avant que la pulpe du fruit soit formée. Si l'on examine alors les noyaux, on verra qu'ils sont remplis d'une humeur glaireuse, transparente, qu'on peut comparer à la glaire des œufs. Dans cette glaire est enchaînée une petite vessie qui contient une autre liqueur parfaitement transparente, comparée au jaune de l'œuf. A mesure que le fruit se forme, on voit paroître au sommet de la petite vessie un point blanc, lequel paroît adhérer à la vessie que par une espèce de vaisseau, tandis que la communication qui existe entre la vessie & l'humeur glaireuse, est rendue sensible par les vaisseaux nombreux qui semblent lier l'une à l'autre. Le petit point blanc, qui est la semence ou l'amande, grossit, & la vessie croît avec lui : celle-ci s'approprie la substance glaireuse, & l'amande se nourrit ensuite aux dépens de la vessie, en consommant la matière qu'elle contient.

Les semences varient infiniment quant à leur nombre, leur forme, leur surface, leurs accidens, leur grandeur & leur couleur.

1°. Le nombre des semences paroît affez constamment le même dans quelques familles naturelles. Par exemple, les fleurs des graminées ne donnent qu'une seule semence : on en trouve deux dans celles des ombellifères, quatre dans celles des labiées & de plusieurs borraginées. Les fleurs de la famille des orchis & de celles des pavots en fournissent un très grand nombre. Il paroît en général que la capsule est, de tous les péricarpes, celui qui contient le plus grand nombre de graines.

2°. La forme des semences est extrêmement variée; elle est réniforme dans le haricot, globuleuse dans le pois, arrondie dans l'orobe, triangulaire dans les polygones, &c. Quelquefois les semences sont si petites, qu'il est presque impossible d'en déterminer les formes : on dit alors qu'elles ressemblent à de la poussière de bois (*semina scabiformia*), comme dans les orchis, &c. Ces semences sont nues (*nuda*) lorsqu'elles n'ont d'autre enveloppe que leur tunique propre, comme celles des graminées, des labiées, des bourraches, des ombellifères, &c.; elles sont couvertes (*teila*) lorsqu'indépendamment de leur tunique propre, elles sont renfermées dans cette enveloppe particulière qui porte le nom de *péricarpe*, & qui constitue le fruit, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

3°. Les semences, considérées quant à leur surface, sont velues, tomenteuses, éclabées, lisses, filonées, tuberculeuses, ridées, échinées ou couvertes de piquans (*muricata*, *echinata*), hérissées de poils rudes, &c.

Botanique. Tome VII.

4°. La nature, toujours occupée de la conservation des espèces, a pourvu les semences d'appendices ou accessoires qui servent à les défendre contre la voracité des animaux, ou à faciliter leur dispersion. Ainsi, l'on rencontre des semences dont les unes sont armées d'une pointe à leur sommet; les autres sont couvertes d'aiguillons ou d'épines; celles-ci sont munies de membranes sailantes, plus ou moins fermes, que l'on nomme des ailes; alors ces semences sont ailées. Dans la scabieuse, le calice de la fleur persiste, & forme une couronne au sommet de la semence; ces semences sont couronnées. Dans les composées, un grand nombre de semences est surmontée d'une jolie aigrette, quelquefois soyeuse, & d'une blancheur éclatante, qui les fait voltiger de toutes parts au gré des vents. Dans les épilobes, dans plusieurs apocinées, les semences sont chevelues; dans les *dryas*, dans les clematites, &c. elles sont surmontées d'un filameux souvent très-long, velu dans toute son étendue, auquel GATNER a donné le nom de *canda*, queue. (Voyez AIGRETTE.)

On conçoit aisément, dit M. Lamarck, que les aigrettes & les ailes ont été visiblement destinées pour faciliter la dispersion des semences. On voit, quelque temps après la maturité, celles qui ont été pourvues de ces accessoires légers & délicats, voltiger de toutes parts au gré du vent, & entretenir, entre les différentes portions de terrain, une sorte de commerce & de circulation de richesses. Dans certaines plantes, l'élasticité que la capsule acquiert en se desséchant, supplée aux aigrettes & aux ailes; c'est une surprise agréable, de voir cette enveloppe éclater subitement avec explosion, & faire pour ainsi dire l'office de la main du semeur, en lançant à quelques pieds de distance les graines qu'elle tenoit renfermées. On peut faire cette observation sur le genêt, le *geranium*, le *momordica elaterium*, &c. l'*impatiens noli tangere*, espèce de balsamine, a été ainsi nommé parce que quand son fruit est mûr, il s'ouvre avec effort au plus léger choc, & fait jaillir une multitude de semences entre les doigts de celui qui l'a touché.

5°. La grandeur des semences offre de grandes différences, depuis l'amande du cocotier, qui a la grosseur & la forme d'un œuf d'autouche, jusqu'aux graines des mouffes, des fougères, qui ressemblent à de la poussière.

6°. La couleur des semences paroît être presque susceptible des mêmes différences que celle des fleurs & des fruits. Les semences de *Tubus precatorius* sont d'un rouge vif ou d'écarlate; celles du coix ou larme-de-Job sont d'un blanc luisant, & ressemblent à des perles, tant par leur forme que par leur couleur; celles du *croton cyanospermum*, d'un bleu-azur; les graines des pivoines sont purpurines ou noirâtres; celles de l'*adonis*

printannier sont vertes : il en est plusieurs qui sont bigarrées ou teintes de diverses couleurs, telles que celles de la gesle, du lupin, du haticot, &c.

Les semences conservent plus ou moins longtemps leur faculté germinative : il en est qui la perdent peu de tems après la maturité, comme celles du café, de la fraxinelle, des chênes, &c. ; mais il en est d'autres qui retiennent cette propriété pendant un grand nombre d'années, comme celles de plusieurs légumineuses. En général, l'embryon garde long-tems la faculté germinative si ses lobes sont grands, volumineux, comme dans les cucurbitacées, le *mammea*, l'amandier, le *laurus* *perf.*, &c. : au contraire, il perd cette faculté & il se dessèche promptement si ses lobes sont petits, comme dans les rubiacées, dans les renouées, &c.

Les graines sont la partie des végétaux qui, dans tous les climats, fournissent, en plus grande abondance, les alimens nécessaires à la vie. Le blé & le riz font la nourriture de presque tous les habitans du globe. Il n'est presque pas une seule espèce de graines qui ne soient destinées à la nourriture de quelques animaux. Il est d'autres graines qui présentent des ressources pour enrichir nos climats, tandis que d'autres, par l'huile qu'on en exprime, suppléent en quelque sorte à l'absence du jour.

La connoissance de la structure intérieure de la semence, dit M. Véménat, n'est pas moins importante pour le médecin que pour le naturaliste. Il est des graines dont les différentes parties ont des vertus ou des propriétés différentes. Par exemple, la semence entiere des euphorbes purge fortement : cette vertu purgative reside uniquement dans l'embryon, & non dans le péricarpe charnu, qui est doux & sans aucune qualité nuisible. Aussi Serapion, Bauhin, Herman, Bayle, Geoffroy, ont-ils averti de les séparer, ainsi que l'enveloppe externe, après avoir remarqué que le reste ou le péricarpe étoit infiniment plus doux. Aublet a également observé que le péricarpe de l'*omphalea* & de l'*aveca*, séparé de l'embryon, devient un aliment sain. Adanson nous apprend aussi que la vertu purgative des semences du *jatropha* *curcas* Linn. ne reside que dans l'embryon, puis-que les Nègres du Sénégal mangent impunément, & même avec sensualité, une grande quantité de ces semences après en avoir ôté l'embryon. La même différence entre les vertus de l'embryon & celles du péricarpe a lieu dans beaucoup d'autres plantes. Les graines du nerprun & du sophtier reçoivent de même leur propriété active de l'embryon. Les huiles exprimées de la chair de l'olive s'altèrent, & sont moins douces lorsque le pressoir a brisé le noyau & la graine qu'il contient. M. de Jussieu ajoute à ces observations, que, dans le cas où les semences sont dépouillées

de péricarpe, la radicule & la plume de l'embryon contiennent souvent une propriété qui ne se trouve point dans ses lobes. C'est la raison pour laquelle le chocolat est infiniment plus agreable l'orique, dans la fabrication, les radicules ont été séparées : c'est ainsi que l'huile qu'on retire des amandes par une pression légère, est moins sujette à s'altérer que celle qu'on obtient lorsque les semences ont été entièrement brisées.

SEMI-FLOSCULEUSE (Fleur). *Flos semiflosculosa.* On donne, aux fleurs compoées, le nom de *semi-flosculeuses* lorsqu'elles sont uniquement composées de demi-fleurons, tant à leur circonférence que dans leur centre. On les nomme aussi *fleurs ligulées* ou *corolles ligulées* (*corolla ligulata*) ; elles sont formées de petites corolles ou demi-fleurons tubulés vers leur base, & dont le limbe se termine par une lame simple ou une languette remarquable. Ces demi-fleurons sont ordinairement placés par imbrication, c'est-à-dire que ceux du centre sont graduellement plus courts que ceux de la circonférence ; quelquefois ils sont tous égaux. La scorzonère, la laitue, le pissenlit, ont des fleurs semi-flosculeuses.

SÉMINATION. *Seminatio.* On désigne, par cette dénomination, les moyens que la nature emploie pour la dispersion des semences à l'époque de leur maturité, afin de les répandre au loin & de fertiliser toutes les parties du globe. Rien de plus admirable que les ressources nombreuses ménagées par la nature, dans l'organisation des semences, pour favoriser cette dispersion. Pour ne nous arrêter qu'aux plus brillantes, nous remarquerons, par exemple, que les aigrettes & les ailes ont été visiblement destinées à cette importante fonction. On voit, quelques tems après la maturité, celles des semences qui ont été pourvues de ces accessoires légers & délicats, voler de toutes parts au gré du vent, & entretenir, entre les différentes portions de terrain, une sorte de commerce & de circulation de titchesses.

Dans certaines plantes, l'élasticité que la capsule acquiert en se desschant, supplée aux aigrettes & aux ailes : c'est une surprise agreable, devoir cette enveloppe éclater subitement avec explosion, & faire pour ainsi dire l'office de la main du semeur, en lançant à quelques pieds de distance les graines qu'elle tenoit renfermées. On peut faire cette observation sur le genêt, le *geranium*, le *momordica* *elaterium*, &c. L'*impatiens noli me tangere* a été ainsi nommé, parce que quand son fruit est mûr, il s'ouvre avec effort au plus léger choc, & fait jaillir une multitude de semences entre les doigts de celui qui l'a touché.

On peut encore ajouter à ces moyens la considération des crochets ou hameçons par lesquels

une quantité de graines, comme celles de l'*apornic*, de la *bardane*, &c. s'attachent aux animaux, qui s'en débarrassent par une légère secousse; & l'action même des eaux courantes & des tortons qui servent de véhicule à une multitude d'autres semences, & souvent vont enrichir un terrain éloigné par de nouvelles productions qui s'y naturalisent peu à peu.

SÉNAPE de la Guiane. *Senapea guianensis*. Aubl. Guian. vol. 2. Suppl. pag. 22. tab. 381.

Genre de plantes qui n'est encore connu que très - imparfaitement, établi par Aublet, dont il n'a pu observer, dans les parties de la fructification, que le calice & les fruits: il n'en décrit qu'une seule espèce, sous le nom de *senape de la Guiane*.

C'est un arbrisseau grimpant, dont les branches & les rameaux se répandent sur les arbres qui l'avoiennent. Ses tiges s'élèvent peu, & n'ont guère que deux pouces de diamètre. Les branches sont revêtues d'une écorce cendrée. Les feuilles sont glabres, alternes, pétiolées, fermes, de couleur verte, ovales, entières à leur contour, un peu ondulées sur leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de six pouces, sur deux pouces & demi de large, traversées par une forte nervure longitudinale, & par plusieurs autres latérales & saillantes, supportées par un pétiole très-court, épais, canaliculé en dessus.

Le fruit est pédonculé; c'est une baie arrondie, très-grande, à une seule loge, à six côtes, dont trois plus saillantes que les autres, de trois pouces de diamètre, & dont l'écorce est épaisse, charnue, jaunâtre, tapissée intérieurement d'une membrane mince, lisse & blanchâtre, sous laquelle est une substance pulpeuse, douce, fondante, très-blanche, qui renferme environ vingt semences ovales, un peu irrégulières, & qui contiennent une amande dont l'écorce est mince, ridée, très-blanche. A la base de ces fruits est un calice persistant, divisé profondément en cinq ou six parties arrondies, aiguës. La corolle, les étamines & les pistils ne font pas connus.

Cette plante croît dans la Guiane, parmi les bois; elle est en fruit au mois de janvier. Les singes & plusieurs autres animaux se nourrissent de la pulpe de ses fruits. *(Description de Aubl.)*

SÉNÉBIÈRE. *Seneciera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des crucifères, qui a des rapports avec les *passiflora* (*lepidium*), & qui comprend des herbes exotiques ou indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont simples ou pinnatifides; les fleurs disposées en grappes axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une *silique* courte, à deux valves globuleuses, attachées à une cloison linéaire; à deux loges; une semence un peu arrondie, foliaire dans chaque loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* à quatre folioles ovales, concaves, caduques.

2°. Une *corolle* à quatre pétales en croix, tous égaux, au moins une fois plus longs que le calice; les onglets étroits, allongés; le limbe ovale, obtus.

3°. Six *étamines* tétrastynes, dont les filaments sont subulés, de la longueur du calice, deux opposés plus courts; les anthères petites, simples.

4°. Un *ovaire* ovale, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une petite *silique* courte, à deux lobes quelquefois un peu écartés à leur sommet, à deux valves globuleuses, un peu ridées, réunies par une cloison linéaire, plus courte que les valves; à deux loges, renfermant chacune une seule semence arrondie ou un peu échancrée en rein.

Observations. Ce genre a été établi par M. Decandolle, qui a jugé, avec raison, que les espèces qui composent ce nouveau genre ne pouvoient, d'après la considération de leur silique, être rapportées ni aux *lepidium* ni aux *cochlearia*, quoiqu'ayant avec eux de très-grands rapports; ils en diffèrent par leur silique à deux valves globuleuses, à deux loges, une seule semence dans chaque loge; par une cloison plus courte que les valves.

Czermar avoit, peu auparavant, formé du *cochlearia coronopus*, un genre particulier, sous le nom de *coronopus*, réforme qui avoit été indiquée par M. de Jussieu. Les *seneciera* ont tant de rapports avec les *coronopus*, les espèces de ces deux genres étant d'ailleurs peu nombreuses, qu'on ne peut guère le dispenser de les réunir sans tomber dans les inconvénients occasionnés par la trop grande multiplication des genres. Les siliques, dans les *coronopus*, diffèrent de celles des *seneciera*, en ce qu'elles font un peu comprimées, que la cloison est quelquefois un peu plus longue que les valves, & que ces valves restent ordinairement fermées.

ESPÈCES.

1. *SÉNÉBIÈRE* pinnatifide. *Seneciera pinnatifida*. Ducand.

Senebiera foliis pinnatifidis, pinnulis minimis, ovatis, subincisis racemis lateralibus. (N.)

Senebiera foliis pinnatifidis, racemis lateralibus. Decand. Mem. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, an 7. pag. 144. tab. 9.

Lepidium (didymum), foliis pinnatifidis, caule erecto; fructibus didymis. Linn. Mant. 92.

Lepidium floribus didymis, foliis pinnatifidis, fructibus didymis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 374. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 439.

Lepidium (anglicum), floribus didymis, tetrapetalis; foliis pinnatifidis; caule procumbente, piloso. Hudf. Angl. 280.

1. *Eadem, pinnulis brevioribus, latioribusque.*

Cochlearia (humifusa), caule humifuso, pubente; foliis pinnatifidis, pinnulis incisis, scilicet lateralibus; siliculis didymis, subrugosis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 27.

Biscutella (apetala), floribus apetalis, calicibus margine scabris. Walther. Flor. carol. p. 174.

Cette espèce a, par son port, par ses rameaux couchés, par ses feuilles, beaucoup de rapports avec le *senebiera coronopus*; elle en diffère par ses fruits.

Ses racines sont grêles; ses tiges herbacées, couchées, rameuses dès leur base, étalées sur la terre, striées, pubescentes, longues de huit à dix pouces, garnies de feuilles éparfes, nombreuses, sessiles, courtes, pinnatifides, glabres, verdâtres; les pinnules petites, opposées, quelquefois unes alternes, sessiles, ovales ou un peu cuneiformes, légèrement incisées, surtout vers leur sommet; les dernières un peu confluentes.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, presque simples, longues d'environ un pouce; chaque fleur supportée par un pédoncule propre, court, capillaire. Ces fleurs sont fort petites; les pétales à peine sensibles, très-caducs, de couleur blanche; le calice à quatre folioles courtes, caduques; quelques auteurs prétendent qu'il n'existe dans cette plante que deux étamines fertiles, les quatre autres étant privées d'anthères. Les silicules sont divisées en deux valves globuleuses, ridées, renfermant chacune une semence réniforme.

La plante a diffère de la précédente par ses pinnules un peu plus courtes & plus élargies; elles sont encore incisées plus régulièrement.

Cette plante croît en Angleterre, en France, dans les environs de Quimper, où elle a été observée par M. du Petit-Thomars; en Amérique, à Monte-Video & dans l'Asie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. La variété qu'on trouve à la Caroline, elle m'a été communiquée par M. Boiss. (V. v.)

2. *SÈNEBIÈRE à feuilles entières. Senebiera integrifolia.*

Senebiera foliis linearibus, obtusis, integerrimis; racemis terminalibus; siliculis rugosis, didymis. (N.)

Senebiera foliis integris, racemis terminalibus. Decand. Mem. de la Société d'Hist. nat. de Paris, an 7. pag. 144. tab. 8.

Cette plante a des racines grêles, blanchâtres, presque simples; elles produisent une tige droite, herbacée, légèrement pubescente, ramifiée presque dès la base, grêle, cylindrique, garnie de feuilles éparfes, alternes, un peu charnues, glabres à leurs deux faces, linéaires, très-étroites, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, longues d'un pouce & plus, larges d'une ligne environ.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales à l'extrémité de chaque rameau, longues d'un à deux pouces, droites, peu ramifiées. Leur calice est composé de quatre petites folioles ovales, ouvertes, caduques. La corolle est blanche, petite, à quatre pétales. Les fruits sont de petites silicules à deux valves globuleuses, ridées ou marquées de sillons tortueux. Chaque valve renferme une semence touffue, attachée à la partie supérieure de la cloison.

Cette plante a été recueillie par Commerçon, à l'île de Madagascar. (V. f. in herb. Juss.)

3. *SÈNEBIÈRE corne de cerf. Senebiera coronopus.*

Senebiera foliis pinnatifidis, pinnis linearibus subintegris, obtusis; siliculis subcompressis, echinato-cristatis. (N.)

Coronopus. Lam. Ill. Gener. tab. 558. — Gærtn. de Fruct. & Sem. tab. 142.

Cochlearia (coronopus), foliis pinnatifidis, caule depressa. Linn. Spec. Plant. 80.

Cranon corne de cerf. Lam. Encycl. méthod. vol. 2. pag. 165.

Nous avons exposé plus haut, en traçant des caractères généraux de ce genre, les traits qui nous porteroient à réunir les *senebiera* de Decandolle au *coronopus* de Gærtner & de Lamarck. Nous rappelons ici cette espèce, dont on trouvera la description dans le second volume de cet ouvrage, au mot CRANON.

4. *SÈNEBIÈRE à dents en scie. Senebiera serrata.*

Senebiera foliis simplicibus, lanceolatis, serrato-subincisis; siliculis axillaribus, aggregatis, subcompressis, rugosis; ramis procumbentibus. (N.)

Coronopus. Gærtn. Lam.

Cette espèce a le port du *senecio coronopus*, mais elle en est très-distincte par ses feuilles entières, profondément dentées en scie, & par ses filiques fortement ridées & non chargées de pointes en forme de crête.

Ses racines sont presque simples, étroites, allongées, fusiformes, d'un blanc-jaunâtre; les tiges se divisent, presque dès leur base, en plusieurs rameaux étendus sur la terre, durs, presque ligneux, cylindriques, pubescens, garnis de feuilles alternes, pétiolées, très-simples, lancéolées, rétrécies à leur base, plus ou moins profondément dentées en scie ou presque incisées, particulièrement à leur partie supérieure; aiguës à leur sommet & aux dentelures, longues d'un pouce & plus, larges de quatre à cinq lignes.

Les fleurs sont sessiles, réunies par paquets dans l'aisselle des feuilles. Les fruits sont presque globuleux, un peu comprimés, fortement ridés, glabres, à deux lobes réunis, à peine légèrement échancrés à leur sommet, à deux valves opposées, à deux lobes; chaque loge renfermant une petite semence de couleur fauve, un peu comprimée, oblongue, médiocrement échancrée en rein à un de ses côtés. La cloison n'est point saillante hors des valves.

Cette plante a été recueillie par Comteson, à Monte-Video. ? ? (V. f. in herb. Juss.)

SENEÇON. *Senecio*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *cineraria* & les *tussilago*, & qui comprend des sous-arbrisseaux ou des herbes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont entières ou pinnatifides, dont les fleurs sont souvent disposées en corymbes flosculeuses ou radiées; les fleurons ordinairement très-courts & nombreux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice cylindrique, presque simple, caliculé, les écailles terminées par une pointe membraneuse; une corolle flosculeuse ou radiée; des semences couronnées par une aigrette simple; un réceptacle nu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun, simple, conique, droit, presque tronqué, canaliculé à sa base, composé de plusieurs écailles tubuleuses, droites, égales, parallèles, très-approchées, environnées à leur base par quelques autres, très-courtes, imbriquées, terminées à leur sommet par un point sec, membraneux, souvent noirâtre.

2°. Une corolle flosculeuse ou radiée, composée dans le centre de fleurons nombreux, hermaphro-

dités, tubuleuses, infundibuliformes, à cinq découpures, & réfléchis à leur limbe; à la circonférence, des demi-fleurons femelles lorsqu'il en existe, oblongs, légèrement tridentés à leur sommet, fertiles.

3°. Cinq étamines dans les fleurs hermaphrodites, dont les filaments sont fort courts, capillaires, terminés par des anthères cylindriques, tubules, synergés.

4°. Un ovaire ovale, tant dans les fleurs hermaphrodites, que dans les femelles, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates oblongs, réfléchis en dehois.

Les semences sont ovales, solitaires dans les deux sortes de fleurs, surmontées d'une aigrette simple, allongée; renfermées dans le calice persistant, conique & convexe.

Le réceptacle est plane, nu, quelquefois alvéolé & un peu convexe.

Observations. Quoique ce genre paroisse assez naturel & bien caractérisé, cependant il se trouve en concurrence avec quelques autres dont il diffère peu. Il ne se distingue des *cineraria* qu'en ce que ces derniers sont privés du second calice, qui se trouve dans les *senecio* à la base du premier; dans les *tussilago*, l'aigrette est pédicellée; dans les *erigeron* & les *solidago*, les folioles calicinales sont imbriquées; elles sont simples, égales dans les *senecio*.

Tournefort avoit séparé les *senecio* des Juncées, en plaçant parmi les premiers toutes les espèces à fleurs flosculeuses, & parmi les seconds celles à fleurs radiées. Ces deux genres ont été rétablis par Thunberg. Linné en a fait une division du genre *senecio*, que j'ai conservée à raison de la très-grande affinité qui se trouve entre les deux genres de Tournefort.

ESPÈCES.

* Fleurs flosculeuses.

1. SENEÇON commun. *Senecio vulgaris*, Linn.

Senecio corollis nudis; foliis pinnato-finnatis, amplexicaulibus; floribus sparsis. Linn. Spec. Plant. 1216. — Roy. Lugd. Bat. 165. — Flor. suec. 690, 747. — Dalib. Paris. 257. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 135. n°. 117. — Hall. Helv. n°. 58. — Pollich. Pal. n°. 793. — Wedd. Flin. dan. tab. 513. — Blackw. tab. 132. — Knorr. Del. 2. tab. S. 5. — Hoffm. Germ. 194. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 362. — Il. pag. 336. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 134. n°. 117. — Gertr. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 400. tab. 166. fig. 3.

Senecio corollis nudis; foliis amplexicaulibus,

pinnatifida, dentatis; floribus corymbo-coarctatis.
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1979. n°. 20.

Senecio floribus hermaphroditis; foliis amplexicaulis, pinnato-fenatis. Scopoli. Carn. edit. 1. pag. 380. — Idem, edit. 2. n°. 1063.

Senecio foliis amplexicaulis, subpinnatifidis, fenatis; pappi omnibus tubulosis, monoclinis.
Necker, Gallob. Batav. 353.

Senecio foliis pinnatifidis, denticulatis, laciniis aquilibus, patentissimis; rachis linearis. Hurt. Cliff. 406.

Senecio minor, vulgaris. C. Bauh. Pin. 131. — Flor. lappon. 196. — Tourn. Inil. R. Herb. 456.

Senecio erigeron. Tabern. 168. Icon.

Erigeron minus. Dodon. Pempt. 641. Icon.

Senecio vulgaris, sive erigeron. J. Bauh. Ilust. 2. pag. 1041.

Vulgairement le senecio, herbe au charpentier.

Plante extrêmement commune, remarquable par la mollesse de toutes ses parties pulpeuses, presque charnues, & dont les fleurs sont petites, toutes bisulcaulées.

Ses tiges sont droites, tendres, presque glabres, cylindriques, striées, ramées, fistuleuses, hautes d'environ un pied; les rameaux alternes, un peu étalés, garnis de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, molles, presque charnues, ailées; les pinnules confluentes, irrégulières, oblongues, médiocrement élargies, finées ou denticulées à leur contour, glabres à leurs deux faces, quelquefois un peu blanchâtres, presque coroneuses en dessous.

Les fleurs sont disposées en une sorte de corymbe lâches à l'extrémité des tiges, supportées par des pédoncules grêles, filiformes, inégaux, un peu pendans; les calices sont cylindriques, composés d'écaillés très serrées, droites, fort étroites, glabres, aiguës, noirâtres à leur sommet, rabattues entièrement sur les pédoncules après l'émission des semences, munies à leur base de quelques petites écaillés très-courtes, imbriquées; la corolle est jaune, toute composée de fleurons hermaphrodites, à peine plus longs que le calice; les semences étroites, ovales, un peu noirâtres, surmontées d'une aigrette très-blanche, simple, soyeuse, très-fine; le réceptacle un peu convexe, nu, médiocrement alvéolé.

Cette plante croît partout dans les champs, & surtout dans les lieux cultivés; elle se reproduit & reste verte toute l'année. ☉ (V. v.)

Le senecio passe pour émollient & un peu rafraîchissant. Il est d'une saveur herbacée, un peu acide, & rougit le papier bleu. On ne l'emploie

qu'à l'extérieur pour dissiper les inflammations, & amollir les engorgemens, adoucir les hémorrhoides. Les petits oïseaux, surtout les chardonnières, font très-frands des semences. Il est inutile dans les prairies, mais non dans les pâturages; les chèvres, les cochons le mangent; les chevaux & les moutons n'en veulent point.

2. SENEÇON D'ARABIE. *Senecio arabicus.*

Senecio corollis nudis; foliis subpinnatis, petiolatis, levibus; calicibus intus. Linn. Syst. veg. 1. pag. 756. n°. 10. — Maniss. 114. — Vahl, Symb. 1. pag. 72. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1980. n°. 22.

Senecio hieracifolius. Forskhal, Catalog. Plant. ægypt. pag. 73. n°. 446.

Cette espèce a le port du senecio commun, ou du senecio jacobée. Ses tiges sont droites, lisses, cylindriques, hautes d'environ un pied & demi, médiocrement rameuses, garnies de feuilles assez semblables à celles du *Symbrium amethystinum*, ou du *senecio triflorus*; lisses à leurs deux faces, pétioles, alternes, pinnatifides ou presque deux fois ailées, finées ou dentées, d'une grandeur médiocre.

Les fleurs sont disposées en une sorte de corymbe terminal, sur portées par des pédoncules rameux; les pédoncules partent latéralement & médiocrement ramifiés; la corolle est jaune, semblable à celle du senecio commun, composée de fleurons tous hermaphrodites; les calices point membraneux à leur sommet.

Cette plante se rencontre dans l'Égypte. ☉

3. SENEÇON À FEUILLES DE PEUCEDANUM *Senecio peucedanifolius.* Linn.

Senecio corollis nudis; foliis pinnatis, filiformibus. Linn. f. Suppl. pag. 372. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1979. n°. 21.

Jacobaea (peucedanifolia), foliis pinnatis, glabris; pinnis linearibus. Thunb. Prodr. pag. 157. — Idem, Nov. Gener. Plant. pag. 175.

Cacalia (peucedanifolia), caule fruticosa; foliis subpinnatis, filiformibus. Jacq. Icon. rar. vol. 3. tab. 581. — Idem, Coll. ct. 5. pag. 149.

Ses tiges sont droites, un peu ligneuses, cylindriques, striées, hautes d'environ un pied & demi, rameuses, garnies de feuilles alternes, presque fasciculées, distantes, linéaires ou filiformes, longues de deux ou trois pouces, simples ou presque deux fois ailées; les pinnules très-étroites, filiformes, distantes, au nombre de neuf & plus, glabres, entières.

La réunion des rameaux fleuris forme une panicule terminale, fastigiée. La corolle est jaune,

compolée uniquement de flurons hermaphrodites, tous fertiles; les femences surmontées d'une aigrette simple, pileuse, à peu près de la longueur des corolles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

4. SENEÇON à tiges nues. *Senecio pseudo-china*. Linn.

Senecio corollis nudis; foliis lyroto-pinnatifidis, dentatis; scapo subnudo, longifloro. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1978. n° 18.

Senecio corollis nudis; scapo subnudo, longifloro. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1216. — Royle, Lugd. Bat. 164. — Mill. Dict. n° 2.

Senecio macrostachyus, rospifolius; floribus maximis, cujus radix nonnullis china dicitur. Dillen. Litham. pag. 345. tab. 258. fig. 335.

Ses racines sont fortes, & pouffent des feuilles radicales, nombreuses, très-variables dans leurs formes, assez semblables à celles des radis; tantôt ovales, anguleuses, dentées, incisées à leur partie inférieure; tantôt en forme de lyre; les pinnules inférieures, oblongues, anguleuses & dentées; la terminale ovale, anguleuse, quelquefois pinnatifide, à découpures égales, mais profondément & inégalement dentées.

Les tiges font des espèces de hampes presque nues, hautes d'environ quatre pouces, terminées par une, deux & même trois fleurs. Les corolles sont jaunes, discoides, compolées uniquement de fleurons tous hermaphrodites & fertiles.

Cette espèce se rencontre dans les Indes orientales. *z*

5. SENEÇON du Japon. *Senecio japonicus*. Thunb.

Senecio corollis nudis; foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis, acutis, incisis; stipulis foliaceis, subpatentibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 190. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1978. n° 19.

Senecio (japonicus), corollis nudis; foliis petiolatis, inciso-pinnatifidis, dentatis, glabris. Thunb. Flor. Japon. pag. 315.

Ses tiges sont droites, hautes de deux pieds, foibles, charnues, cannelées, velues, garnies de feuilles pétiolées, alternes, laches, presque en lyre ou incisées-pinnatifides, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles en dessous, longues de six à sept pouces; les découpures oblongues, aiguës, inégalement dentées, munies à la base de leur pétiole de deux stipules dentées.

Les fleurs sont grandes, entièrement floules, disposées en panicule à l'extrémité des

tiges, soutennues par des pédoncules nus, inclinés, à deux ou trois divisions capillaires, longs d'environ un pouce, & garnies de quelques petites écailles. Les calices sont canaliculés; les écailles à peine scarieuses à leur sommet.

Cette plante croît au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

6. SENEÇON rougeâtre. *Senecio erubescens*. Ait.

Senecio corollis nudis; foliis lyatis, utrinque pilosis, viscosis, superioribus oblongo-lanceolatis, acutatis; caucibus ascendentibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 190. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1975. n° 8.

Cette espèce produit des tiges un peu couchées à leur partie inférieure, relevées & ascendantes à leur partie supérieure, garnies de feuilles alternes les inférieures finues à leur contour en forme de lyre, visqueuses, pileuses à leurs deux faces; les feuilles supérieures sont oblongues, lanceolées, dentées à leurs bords; les fleurs composées uniquement de fleurons égaux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *O*

7. SENEÇON divariqué. *Senecio divaricatus*. Linn.

Senecio corollis nudis; foliis lanceolatis, dentatis, scabris; ramulis floriferis, divaricatis. Linn. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1977. n° 16.

Ses tiges sont grêles, droites, anguleuses, hautes d'un pied & demi, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, distantes, lanceolées, rudes, tomentueuses, dentées en fe à leurs bords; les rudiments des rameaux non développés dans les aisselles des feuilles inférieures. Il sort de celles de quelques feuilles supérieures, plusieurs rameaux chargés de fleurs, très-divariqués à leur base. Les fleurs sont peu nombreuses, pedunculées, de la grandeur de celles du *senecio virgatus*. Leurs calices sont munis à leur base de plusieurs écailles laches, subulées.

Cette espèce se rencontre dans la Chine. (*Descript. ex Linn.*)

8. SENEÇON paniculé. *Senecio paniculatus*. Berg.

Senecio corollis nudis; foliis linearisubulatis, subpinnatifidis, approximatis; superioribus distantibus, hirsutis; floribus solitariis. Berg. Plant. Capens. pag. 277. n° 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1976. n° 11.

Jacoba (panicularis), foliis linearibus, denticulatis, glabris; capitulis solitariis. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem, Nov. Gener. Plant. p. 172.

Cette plante a des tiges droites, herbacées, cylindriques, hautes d'environ un pied, glabres,

striées, presque nues, rameuses à leur partie supérieure; les rameaux alternes, panicules, peu garnis de feuilles, presque simples, un peu ramifiés à leur partie supérieure. Les feuilles caulinaïres sont filiformes, alternes, un peu charnues, linéaires, subulces, aiguës à leur sommet, roulées à leurs bords, presque pinnatifides, ou à deux ou trois divisions, dentées à leur contour, glabres à leurs deux faces, très-rapprochées à la base des rameaux, longues d'environ deux pouces; les feuilles des rameaux plus petites, alternes, amplexicaules, distantes, dentées à leur base.

Les fleurs sont solitaires, pédonculées à l'extrémité des rameaux; les pédoncules échilleux. Le calice est ovale, oblong, lisse, tronqué, composé de plusieurs folioles linéaires, concaves, égales, droites, parallèles, contiguës, pointues à leur sommet; des écailles courtes, imbriquées; les inférieures lâches, enveloppant la base du calice. La corolle est jaune, à peine aussi longue que le calice, composée de fleurons égaux, hermaphrodites, infundibuliformes; le tube cylindrique; le limbe un peu campanulé, à cinq découpures ouvertes, calicées à leur sommet; cinq filaments capillaires; des anthers tubulées, à cinq divisions courtes à leur sommet; un ovaire ovale, oblong, rude, surmonté d'une aigrette filiforme, pileuse, de la longueur de la corolle.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. h

9. SENEÇON à feuilles d'épervière. *Senecio hieracifolius*. Linn.

Senecio corollis nudis; foliis oblongis, amplexicaulis, inaequaliter profunde dentatis; caule herbaceo, virgato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1974. n° 5.

Senecio annuus, foliis amplexicaulis, oblongis, acutis, inaequaliter acutèque serrato-laceris; calicibus oblongis, levibus, basi multifidis; radiis nullis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 119.

Senecio corollis nudis; foliis amplexicaulis, laceris; caule herbaceo, erecto. Linn. Syst. veget. pag. 756. n° 1. — Hort. Upsal. 261. — Mill. Dict. n° 1.

Senecio foliis lanceolatis, amplexicaulis, levibus, acutè sinuatis, denticulatis; caule herbaceo. Hort. Cliff. 406. — Royen, Lugd. Bat. 163.

Senecio americanus, altissimus, blattaria seu hieracii folio. Herm. Paradis. pag. 226. tab. 226. — Pluken. Phytogr. pag. 112. fig. 1.

Ses tiges sont roides, droites, épaisses, herbacées, hautes d'environ un pied & demi, bien moins rameuses & moins paniculées que dans la plupart des autres espèces; les rameaux droits, effilés; les feuilles sont alternes, sessiles, amplexicaules; celles

des tiges, lancéolées, oblongues, presque déchiquetées, ou inégalement & profondément sinuées, ou plutôt dentées à leurs bords, lisses à leurs deux faces, aiguës à leur sommet; les feuilles des rameaux entières ou bien moins dentées.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en une sorte de corymbe lâche. Les calices sont lisses, oblongs, composés d'écailles droites, imbriquées, très-glabres, de la longueur des fleurons, munies à leur base de plusieurs autres écailles très-courtes, sétacées. La corolle est ovale dans son disque, formée de fleurons courts, hermaphrodites, fort petits, d'un jaune pâle; le style est jaunâtre; les fleurons de la circonférence blanchâtres; point de demi-fleurons.

On rencontre cette plante dans plusieurs contrées de l'Amérique septentrionale, & à la Caroline. O (V. f.)

10. SENEÇON très-feuillé. *Senecio vestitus*. Thunb.

Senecio corollis nudis, foliis ovatis, serratis, glabris; panicula composita. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1977. n° 14.

Jacobaea vestita. Thunb. Prodr. pag. 256. — Id. Nov. Gen. Plant. pag. 173.

Jacobaea ceylanica, flore luteo, folio cordati serratis. Seb. Thesaur. vol. 1. pag. 34. tab. 22. fig. 5.

h. *Senecio (vestitus), corollis radiantibus; foliis cuneiformibus, inaequaliter serratis, glabris, amplexicaulis; caule fruticoso, glabro*. Berg. Plant. Capenf. pag. 282. n° 7.

Senecio (tigens), corollis radiantibus; foliis amplexicaulis, oblongis, indivisis, denticulatis, nudis; caule fruticoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1224. ?

J'ai réuni ici plusieurs plantes qui peuvent être le même, ou qui ne sont réellement que des variétés les unes des autres. La principale différence consiste dans les fleurs toutes composées de fleurons dans la plante de Thunberg, munies de demi-fleurons à la circonférence dans celles de Bergius & de Linné. Les feuilles paraissent offrir très-peu de différence, & le port est presque le même. Ces observations doivent porter les botanistes à de nouvelles recherches sur ces plantes.

Les tiges sont glabres, presque ligneuses, droites; les rameaux effilés, cylindriques, légèrement striés, simples, alternes, longs d'environ un pied, très-glabres, garnis de feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, ovales, oblongues, cuneiformes, glabres à leurs deux faces, très-fermes,

à nervures obliques, finement veinées, très-nombreuses & rapprochées, longues d'environ quatre pouces, inégalement dentées en scie à leurs bords, traversées, dans leur milieu, par une nervure très-forte.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, une panicule presque en corymbe, glabre, presque nue, composée, garnie, à la base des ramifications, de petites écailles subulées. Le calice est oblong, cylindrique, tronqué, composé de plusieurs folioles linéaires, concaves, parallèles, aiguës, marquées d'un filon longitudinal, enveloppées, à leur base, par quelques écailles courtes & rares. La corolle est jaune, un peu plus longue que le calice, composée de fleurons hermaphrodites, tubulés, un peu élargis à leur sommet, divisés, à leur limbe, en cinq découpures ovales, aiguës, épaisses, un peu réfléchies. Dans la plante de Bergius, la circonférence est munie de demi-fleurons femelles ovales, oblongs, à quatre nervures, plus courts que les fleurons du disque, roulés en dehors. Leur onglet est tubulé, filiforme, de la longueur du calice. Ces demi-fleurons manquent dans la plante de Thunberg, ou peut-être avortent. L'ovaire est oblong, un peu rude, couronné par une aigrette pileuse, sessile, de la longueur de la corolle; le style cylindrique; le stigmate bifide; le réceptacle nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, proche Paadeberg. 7

11. SENEÇON à feuilles de verveine. *Senecio verbenafolius*. Willd.

Senecio corollis nudis, foliis obovatis, petiolatis, inciso-dentatis; pedunculis filiformibus, trifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1980. n°. 23.

Senecio verbenafolius. Jacq. Hort. vol. 1. pag. 2. tab. 3.

Cette plante a le plus grand rapport avec le *senecio triflorus*, avec laquelle elle a tant de ressemblance, qu'elle pourroit bien n'en être qu'une variété; cependant elle en diffère par ses fleurs toutes flosculées, par ses feuilles moins profondément incisées, par ses rameaux plus roides.

Ses tiges sont droites, cylindriques, striées, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétioolées, en ovale renversé, un peu oblongues, incisées & dentées à leur contour, aiguës à leur sommet, vertes, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont disposées vers l'extrémité des rameaux, réunies ordinairement au nombre de trois, sur des pédoncules allongés, filiformes. La corolle est dis-cordée, composée de fleurons hermaphrodites, fertiles.

On rencontre cette plante dans les plaines de l'Égypte. ○

Botanique. Tome VII.

11. SENEÇON de Croatie. *Senecio croaticus*. Willd.

Senecio corollis nudis, foliis oblongo-lanceolatis, argutis serratis, glabris; floribus corymbosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1978. n°. 18.

Senecio croaticus. Waldf. & Kitaib. Plant. rar. Hungar.

Cette plante est parfaitement semblable au *senecio ferracenicus*, par son port, par la forme de ses feuilles & par la disposition de ses fleurs; elle en diffère en ce que ses corolles sont discoides, composées entièrement de fleurons, & non radiées. Les écailles qui garnissent la base du calice sont filiformes, & presque aussi longues que le calice intérieur. Les feuilles sont oblongues, lancéolées, finement dentées en scie, glabres à leurs deux faces; les fleurs disposées en corymbe.

Cette plante se trouve dans la Croatie. x

13. SENEÇON à fleurs penchées. *Senecio cernuus*. Linn. f.

Senecio corollis nudis, foliis ellipticis, dentato-ferratis, pilosiusculis; pedunculis elongatis, unifloris. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 190. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1974. n°. 7.

Senecio (cernuus), floribus flosculosis, nubilissimis cernuis; foliis erectis, auriculatis. Linn. f. Suppl. 370.

Senecio rubens. Jacq. Hort. vol. 3. pag. 30. tab. 98.

Senecio (uniflorus), corollis nudis; foliis ovatis, dentatis, erectis; pedunculis unifloris, elongatis. Retz. Observ. botan. 3. pag. 42.

Ses tiges sont herbacées, droites, hautes d'environ un pied, garnies de feuilles alternes, pétioolées, elliptiques, rudés, un peu pileuses, veinées, presque rongées, dentées en scie à leurs bords, munies souvent, à leur base, de deux espèces d'oreillettes anguleuses, presque semblables à des stipules.

Les fleurs sont portées, vers l'extrémité des tiges, sur des pédoncules solitaires, simples, allongés, penchés & presque pendans à l'époque de la floraison, redressés ensuite. La corolle est violette, composée uniquement de fleurons tous fertiles. Le calice est cylindrique, un peu renflé à sa base, & environné inférieurement de quelques folioles subulées.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ○

14. SENEÇON à feuilles de pêcher. *Senecio persicifolius*. Linn.

Senecio corollis nudis, foliis lanceolatis, intege-

L

rimis, basi dentatis. Linn. Syst. veget. pag. 756. n°. 4. — Amén. Académ. vol. 6. Afric. 62. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1976. n°. 9.

Jacobaea (perficifolia), *foliis amplexicaulis, subulsi tomentosis, floribus paniculatis.* Thunberg, Prodr. pag. 156. — Idem, Nov. Genet. Plant. 170.

Cette espèce a des tiges presque herbacées ou médiocrement ligneuses, droites, cylindriques, striées, presque glabres à leur partie inférieure, rameuses, hautes d'un pied & plus; les rameaux alternes, filiformes, droits, étalés, légèrement tomenteux, ramifiés à leur sommet & fastigiés. Les feuilles sont alternes, sessiles, auriculées à leur base, à demi-amplexicaules, linéaires, entières & roulées à leurs bords, glabres en dessus, blanches & tomenteuses en dessous, longues d'un pouce. Les fleurs sont disposées en panicule terminale; le calice lanugineux & blanchâtre à sa base, point scarieux à son sommet; la corolle composée de fleurons égaux.

Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance. *h* (Description ex Thunb.)

15. *SENECION* à feuilles étroites. *Senecio angustifolius.* Thunb.

Senecio corollis nudis, foliis linearibus, integerrimis, glabris; floribus paniculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1973. n°. 2.

Jacobaea angustifolia. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem, Nov. Gener. Plant. pag. 170.

Ses tiges sont droites, frutescentes, entièrement glabres, striées, rameuses, hautes d'un pied & plus, divisées en rameaux alternes, filiformes, droits, simples, flexueux, un peu fastigiés, garnis de feuilles alternes, sessiles, linéaires, très-étroites, entières, ouvertes, un peu roulées à leurs bords, réfléchies à leur sommet, longues d'un pouce.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale; les calices cylindriques, glabres, composés d'écaillés droites, serrées, étroites, point membraneuses à leur sommet. La corolle est composée de fleurons rous hermaphrodites & fertiles.

Cette espèce se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h*

16. *SENECION* d'un blanc de neige. *Senecio niveus.* Thunb.

Senecio corollis nudis foliis linearibus, obtusifolius, integerrimis, lanatis; floribus solitariis, terminalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1974. n°. 4.

Jacobaea (nivea), *foliis linearibus, lanatis; flo-*

ribus solitariis. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem, Nov. Gen. Plant. pag. 171.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied, ligneuses, chargées, dans toute leur longueur, d'un duvet lanugineux très-blanc, divisées en rameaux alternes, filiformes, alongés, droits, flexueux, lanugineux, ramifiés à leur sommet, fastigiés; les feuilles sont sessiles, alternes, linéaires, entières, un peu obtuses à leur sommet, roulées à leurs bords, longues d'un pouce, tomenteuses à leurs deux faces, particulièrement à leur face inférieure, où elles sont d'une grande blancheur. Les fleurs sont réunies en rétes à l'extrémité des rameaux supérieurs; leur calice est tomenteux, principalement à sa base. Ses écailles ne sont point scarieuses.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (Description ex Thunb.)

17. *SENECION* mucroné. *Senecio mucronatus.* Thunb.

Senecio corollis nudis, foliis linearibus, integerrimis, mucronatis, subulsi tomentosis; floribus paniculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1974. n°. 3.

Jacobaea mucronata. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem, Nov. Gener. Plant. 171.

Cette plante a des tiges droites, cylindriques, ligneuses, hautes d'un pied & plus, rameuses, couvertes d'un duvet tomenteux & cendré; les rameaux nombreux & agrégés à la partie inférieure des tiges, alternes, alongés, chargés de feuilles vers leur base, nus à leur partie supérieure, tomenteux inférieurement, presque glabres vers leur sommet, divisés en d'autres petits rameaux paniculés.

Les fleurs sont éparées, sessiles, linéaires, mucronées, très-entières, roulées à leurs bords, vertes & velues en dessus, revêtues en dessous d'un duvet très-blanc, droites, un peu ouvertes, longues d'un pouce. Les fleurs sont toutes stériles & disposées en panicules étalées & terminales. Les calices sont à peine scarieux à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (Description ex Thunb.)

18. *SENECION* bidenté. *Senecio bidentatus.* Thunb.

Senecio corollis nudis, foliis linearibus, ellipticis, dentatis, tomentosis; floribus sessilibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1976. n°. 12.

Jacobaea bidentata. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem, Nov. Gener. Plant. pag. 172.

Ses tiges sont ligneuses, droites, cylindriques, striées, tomenteuses à leur partie inférieure, un peu flexueuses, presque point rameuses, excepté

à leur sommet, où elles se divisent en une sorte de panicule, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles éparées, sessiles, linéaires, elliptiques, les unes presque glabres, d'autres tomenteuses; quelques-unes plus élargies, munies, vers leur milieu, d'une ou deux dents; le plus grand nombre denticulées & roulées à leurs bords, ouvertes, un peu contournées, longues de trois à quatre pouces.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en petites têtes solitaires, sessiles, à l'extrémité d'un pédoncule commun. Ces pédoncules sont flexueux, filiformes; les inférieurs longs de trois à quatre pouces, les supérieurs très-courts; l'ensemble de toutes ces têtes forme une sorte de corymbe affecté touffu. Les écailles calicinales sont glabres, médiocrement scarieuses à leur sommet; les corolles toutes fistuleuses, égales.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h* (*Descript. ex Thunb.*)

19. SENEÇON à feuilles rudes. *Senecio scaber*. Thunb.

Senecio corollis nudis, foliis oblongo-serratis, scabris; paniculis compositis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1677. n°. 13.

Jacobaea scabra. Thunb. Prodr. pag. 156. — Idem, Nov. Gen. Plant. pag. 173.

Ses tiges sont droites, herbacées, cylindriques, fistuleuses, légèrement pubescentes, rameuses, striées, un peu flexueuses, hautes de deux pieds, divisées en rameaux alternes; les inférieurs plus longs; les supérieurs plus courts, élancés, ramifiés en panicule, droits, étalés. Les feuilles caulinaires sont alternes, sessiles, ovales, oblongues, obtuses à leur sommet, dentées en scie à leur contour, épaisses & un peu roulées à leurs bords, veinées, rudes à leur face inférieure, pubescentes, longues de trois à quatre pouces; celles des tiges sont amplexicaules, lancéolées, dentées en scie, à peine longues d'un pouce.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une panicule très-ramifiée, hémisphérique. Le calice est composé d'écailles point membraneuses à leur sommet; les extérieures très-courtes & formant un petit calice; la corolle uniquement composée de fleurons; les semences surmontées d'une aigrette pileuse.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle fleurit au mois de décembre & de janvier. (*Descript. ex Thunb.*)

20. SENEÇON biflore. *Senecio biflorus*. Vahl.

Senecio corollis nudis, foliis linearibus, planis, subsessatibus, levibus; pedunculis subbifloris, caule frutescente.

Senecio. Vahl, Symbol. 1. pag. 72. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1776. n°. 10.

Senecio linearifolius, radio nullo. Forsk. Floz. ægypt.-arab. pag. 119. n°. 502.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu ligneuses, canelées, divisées en rameaux alternes, striés, garnis de feuilles alternes, amplexicaules, linéaires, très-ouvertes, écartées, médiocrement denticulées à leurs bords, quelquefois très-entières, lisses, glabres à leurs deux faces, planes, un peu épaisses, légèrement dilatées à leur base, ciliées à leur contour.

Les fleurs sont peu nombreuses, situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, supportées par des pédoncules munis, à leur sommet, de deux & quelquefois quatre fleurs; une petite foliole s'accroît à la base de chaque pédoncule. La corolle est de la grandeur de celle du fenouil commun; elle est uniquement composée de fleurons hermaphrodites, sessiles; le calice cylindrique, droit, garni, à sa base, de quelques petites folioles très-courtes.

Cette plante se rencontre dans les plaines de l'Arabie-Heureuse. *h*

21. SENEÇON à feuilles recourbées. *Senecio reclinatus*. Linn. f.

Senecio corollis nudis, calicibus ventricosus, subimbricatis; foliis filiformi-linearibus, integerrimis, glabris. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 189. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1773. n°. 1.

Senecio (reclinatus), corollis nudis, foliis linearibus, sparsis, scabris, recurvis; caule frutescente. Linn. f. Suppl. pag. 369. — Lhérit. Stirp. Nov. 9. tab. 5.

Senecio graminifolius. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 174. — Idem, Miscell. vol. 2. pag. 322.

Senecio chrysocoma. Meerb. Ic. 156.

Jacobaea (reclinata), foliis linearibus, glabris; floribus pedunculatis. Thunb. Prodr. 156.

Cette plante a des rapports avec le *Senecio longifolius*; elle en diffère par ses corolles dépourvues de demi-fleurons; par ses feuilles rudes, entières, point laciniées, recourbées en dehors.

Ses tiges sont droites, herbacées, hautes d'environ trois pieds, cylindriques, de couleur verte, un peu frutescentes à leur base, munies, à leur partie inférieure, de quelques rameaux alternes. Les feuilles sont éparées, sessiles, glabres à leurs deux faces, très-longues, entières, linéaires, rudes, bordées en dessous à leur contour, courbées en dehors, longues de six à sept pouces; les vernières, munies vers leur base de quelques dents courtes.

Les fleurs sont disposées en panicules à l'extrémité des tiges, soutenues par des pédoncules inclinés, garnis de quelques bractées éparpillées. Leur calice est cylindrique, composé d'écaillés droites, égales, linéaires, scarieuses à leur sommet, enveloppées, à leur base, par un second calice ouvert, fort court, à folioles égales, courbées, aiguës. La corolle est de couleur jaune; elle ne contient que des fleurons tous hermaphrodites & fertiles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

22. SENEÇON à fleurs purpurines. *Senecio purpureus*. Linn.

Senecio corollis nudis; foliis lyratis, hirtis, superioribus lanceolatis, dentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1215. — Berg. Plant. Capenf. pag. 276. n°. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1975. n°. 6.

Jacobaea (purpurea), foliis inferioribus lyratis, superioribus lanceolatis, dentatis; floribus solitariis. Thunb. Prodr. 157. — Idem, Nov. Gen. Plant. pag. 174.

Cacalia (villnfa), caule herbaceo; tota villosa; foliis lyratis, inferioribus petiolatis; superioribus amplexicaulis, summis lanceolatis. Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 580. — Idem, Collect. vol. 2. pag. 347.

Senecio viscosus, athiopius; flore purpureo. Breyn. Centur. pag. 139. tab. 67.

Ses tiges sont droites, herbacées, presque simples, hautes d'environ un pied, assez souvent rameuses à leur partie supérieure, striées, anguleuses, chargées de quelques poils rares, garnies de feuilles sessiles, alternes, oblongues, lancéolées, obtuses à leur sommet, lyrées, presque roncées, crénelées à leur contour, un peu visqueuses, velues; les feuilles supérieures, lancéolées, dentées, sagittées à leur base.

Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux, cinq environ à chaque corymbe, dont les pédoncules communs sont velus; les pédoncules propres uniflores, très-courts, inégaux, munis de bractées linéaires, aiguës, velues. Le calice est ovale, garni de poils visqueux, composé d'écaillés linéaires, étroites, droites, concaves, parallèles, amincies à leurs bords, aiguës & un peu réfléchies à leur sommet, canaliculées à leur base par quelques petites écaillés subulées. La corolle est de couleur purpurine, un peu plus longue que le calice, composée uniquement de fleurons fertiles, infundibuliformes, dont le tube est étroit, alongé; le limbe campanulé, plus court que le tube, à cinq découpures ouvertes; les filaments capillaires; les anthères réunies en un tube strié, droit, à cinq

découpures à son orifice, l'ovaire presque cylindrique, couronné d'une aigrette simple, pileuse, sessile, blanchâtre, de la longueur de la corolle; un style de la longueur des étamines, cylindrique, terminé par deux stigmates oblongs, recourbés. Le réceptacle est nu, un peu alvéolé.

On rencontre cette plante sur les gazons, au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

23. SENEÇON effilé. *Senecio virgatus*. Linn.

Senecio corollis nudis; foliis lyratis, subulis tomentosis; pedunculis unifloris, squamis subulatis. Linn. Syst. veger. pag. 759. n°. 5. — Amoenit. Acad. vol. 6. Afric. 63. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1977. n°. 15.

Jacobaea (tomentosa), foliis pinnatis, lanatis; pinnis lanceolatis. Thunb. Prodr. 157. — Idem, Nov. Gen. Plant. 175. ?

Thunberg soupçonne que cette plante est la même que le *Senecio virgatus* de Linné. Voici la description qu'il en donne, un peu différente, à la vérité, de celle de Linné, mais qui cependant en présente les caractères les plus essentiels.

« Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & plus, médiocrement ligneuses, flexueuses, striées, un peu fistuleuses & légèrement lanugineuses, divisées en rameaux alternes, peu nombreux, alongés, ramifiés en pédoncules à leur sommet: les feuilles sont droites, ailées, lanugineuses, blanchâtres, longues de trois pouces; les pinnules presque opposées, linéaires-lancéolées, entières, roulées à leurs bords, longues d'un demi-pouce; les fleurs réunies en têtes foliaires, à l'extrémité des ramifications qui sont munies d'écaillés foliacées, linéaires, sétacées, flexueuses, longues à peine d'une ligne. Le calice est tomenteux, point scarieux à son sommet. »

D'après Linné, cette plante a des tiges divisées en rameaux tomenteux. Les feuilles sont petiolées, en forme de lyre, tomenteuses ou lanugineuses & blanches en dessous. Les pédoncules sont terminaux, listés, droits, alongés, uniflores, garnis de folioles alternes & subulées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

* * Fleurs radiées; demi-fleurons roulés en dehors.

24. SENEÇON des forêts. *Senecio silvaticus*. Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis pinnatifidis, dentulatis; caule corymbofo, erecto. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 217. — Reyg. Ged. vol. 1. pag. 206. n°. 3. — Pollich. Pal. n°. 797. — Martusch. Sil. n°. 617. — Gouan, Illustr. botan. pag. 67. —

Hoffm. Germ. 254. — Roth. Germ. vol. I. pag. 363. — Il. pag. 338. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1985.

Senecio foliis pinnatifidis, denticulatis; florum radiis revolutis, linearibus. Iter Gott. 326. — Flor. Suec. 689, 748. — Dalib. Parif. 358.

Senecio jacobaeae. Var. β . Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 134. n°. 117.

Senecio foliis pinnatis, pinnis alternè majoribus, semipinnatis, angulosis; calicibus levibus; radiis brevissimis, revolutis. Haller. Helv. n°. 59.

Senecio corollis revolutis-radiantibus; foliis subpinnatifidis; floribus corymbosis. Necker. Gallob. pag. 354.

Senecio minor, latiore folio seu montanus. C. Bauh. Pin. 131. — Dillen. Elth. 258. tab. 258. fig. 337.

Jacobaea senecionis, folio incano, perennis. ? Rai, Hist. 285, pag. 285. — Haller, Jen. pag. 177. tab. 4. — Tourn. Inst. R. Herb. 486.

Senecio montana, mollior, pallido parvo flore. Barrel. Icon. Rar. 401.

Senecium montanum. Tabern. Icon. 169.

β . *Idem, caule subtomentoso, foliis pubescentibus.*

Cette espèce n'est que médiocrement distinguée du *senecio jacobaeae* : ses feuilles n'ont pas la forme de lyre aussi fortement prononcée, & les demi-fleurs de la circonférence sont roulés en dehors, surtout lorsque la floraison est un peu avancée.

Ses tiges sont droites, fermes, assez dures, presque glabres ou un peu pubescentes, surtout à leur partie supérieure, fortement striées, cylindriques, rameuses, hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles sessiles, alternes, pinnatifides, élargies, obtuses; les pinnules ou découpures sont profondes, inégales, lancéolées, obtuses, un peu denticulées ou incisées à leurs bords, épaisses, d'un vert-foncé, presque glabres à leurs deux faces, confluentes & décurrentes à leur base; les pinnules inférieures plus écartées, plus étroites; les feuilles radicales oblongues, presque entières.

Les fleurs sont nombreuses, & disposées, à l'extrémité des tiges, en un fort beau corymbe ample, droit, élargi; les pédoncules sont longs, médiocrement rameux, inégaux, glabres ou un peu pubescens. Les calices sont cylindriques, composés de folioles droites, linéaires, aiguës, un peu striées, glabres, verdâtres, un peu scarieuses à leurs bords supérieurs & à leur sommet. La corolle est jaune, radiale; les demi-fleurs linéaires, distans les uns des autres, roulés en dehors après la floraison; leur tube plus court que les fleurs du centre. Les semences sont petites, couronnées d'une aigrette très-blanche, simple, sessile.

La plante β est remarquable par ses tiges revêtues d'un duvet tomenteux, blanchâtre; par ses feuilles pubescentes, & par les découpures de ses pinnules plus aiguës. Les fleurs forment ordinairement un corymbe moins étalé.

Cette plante croît dans les forêts des contrées septentrionales de l'Europe. J'ai recueilli la variété β dans les départemens méridionaux de l'Europe. ○ (V. v.)

25. *SENEÇON visqueux. Senecio viscosus.* Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis pinnatifidis, viscidis; squamis calicinis laxis, longitudine perianthii. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1217. — Flor. Suec. edis. 2. n°. 749. — Pollich. Pal. n°. 794. — Martusch. Sil. n°. 616. — Derr. Nass. pag. 213. — Hoffm. Germ. pag. 294. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 132. n°. 117. — Roth. Germ. vol. I. pag. 363. — vol. II. pag. 337. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1984. n°. 38.

Senecio foliis viscidis, pinnatis; pinnis semipinnatis, angulosis; calicibus hirsutis. Haller, Helv. n°. 60.

Senecio corollis revolutis-radiantibus; foliis calicinis perianthium subquantibus; foliis pinnatifidis. Necker, Gallob. pag. 353.

Senecio foliis pinnatifidis, sessilibus; laciniis angulosis; superioribus latioribus; florum radiis disco brevioribus. Roym. Lugd. Bat. 142. — Iter W. Got. 142. — Dalib. Parif. 258.

Senecio hirsutus, viscidus, graveolens. Dillen. Elth. pag. 347. tab. 258. fig. 336.

Senecio incanus, pinguis. C. Bauh. Pin. 131.

Jacobaea pannonica, prima, Clusii. Tournes. Inst. R. Herb. 486. — Clus. Hist. 21.

Senecio hirsutus, viscidus, major odoratus. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1043. Icon.

Erigeron tomentosum, alterum. Lobel. Icon. 226.

Cette plante a des rapports avec le *senecio commun* : on l'en distingue à ses tiges visqueuses, & surtout à ses fleurs pourvues à leur circonférence de demi-fleurs, tandis qu'il n'existe que des fleurs dans celles du *senecio commun*.

Ses racines sont fibreuses, filiformes : il s'en élève une lige droite, cylindrique, striée, un peu pubescente, visqueuse surtout à sa partie supérieure, légèrement odorante, haute de deux à trois pieds, rameuse, d'un vert-foncé, garnie de feuilles alternes, presque sessiles, molles, d'un vert-blanchâtre, presque glabres à leurs deux faces, molles, un peu visqueuses, lancéolées, pinnatifides ou profondément sinuées ou lobées; les lobes inégaux, obtus, denticulés; les feuilles inférieures plus étroites; la plupart recroisées en pétiole à leur

basse; les supérieures plus larges, obtuses, presque amplexicaules.

Les fleurs sont assez nombreuses, disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe lâche, supportées par des pédoncules grêles, presque simples, chargés de poils courts & visqueux. Les calices sont cylindriques, tronqués, composés de folioles très-étroites, linéaires, pubescentes, visqueuses, droites, égales, presque aiguës, un peu scarifiées à leur sommet, lâches, garnies à leur base de quelques folioles setacées, allongées. La corolle, assez semblable à celle du *Senecio commun*, est jaune, munie à sa circonférence de demi-fleurs roulés à leurs bords, plus petits que les fleurs. Les femences sont brunes, petites, étroites, surmontées d'une aigrette simple, très-blanche, testée.

Cette plante croît en Europe, dans les bois, sur les lieux montueux. ○ (V. v.)

26. *SENECON* à feuilles de marguerite. *Senecio leucanthemifolius*. Poiret.

Senecio corollis revolutis; foliis spatulatis, inferioribus petiolatis, superioribus amplexicaulis, incisivo-crenatis; corymbo paucifloro; caulibus numerosis, infirmis prostratis. (N.)

Senecio corollis revolutis; foliis spatulatis, incisivo-crenatis; corymbo paucifloro. Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 238.

Senecio foliis elliptico-spatulatis, glabris, incisodentatis; corymbo paucifloro. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 271. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1982. n°. 30.

g. *Idem; minimus; caule simpliciter, humillimo; foliis subovatis, dentato-trois.* (N.)

Il est difficile, en suivant les variétés de cette plante, surtout dans les formes de ses feuilles, de la distinguer constamment du *Senecio crassifolius* & du *Senecio humilis*; cependant elles sont en général plus grandes, plus larges, plusieurs d'entre elles assez semblables à celles de la marguerite.

Ses racines sont garnies de fibres simples, droites, capillaires, nombreuses, d'un blanc-jauâtre; il s'en élève plusieurs viges, celles du milieu droites, les latérales courbées à leur partie inférieure, glabres, cylindriques, herbacées, striées, fistuleuses, redressées, à peine ramusculées, garnies de feuilles alternes; les inférieures pétiolées ou décurrentes sur le pétiole, ovales, un peu spatulées, élargies vers leur sommet, rétrécies à leur base; les supérieures plus allongées, sessiles, amplexicaules, presque elliptiques, un peu charnues, vertes, glabres à leurs deux faces, inégalement incisées & dentées à leur contour; les dents courtes, très-aiguës.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe lâche, supportées par des pédoncules filiformes, simples ou médiocrement rameux, munis de quelques petites folioles très-courtes, aiguës. Le calice est cylindrique, canaliculé, composé de folioles étroites, subulées, presque égales, point scarifiées à leur sommet, garnies à leur base de quelques écailles courtes, presque setacées, aiguës. La corolle est jaune, radiale, semblable à celle du *Senecio jacobaea*; les demi-fleurs linéaires, roulées en dehors, sans étamines; les fleurs hermaphrodites, à cinq dents; les femences fort petites, surmontées d'une aigrette blanche, simple, sessile, velue; le réceptacle nu, un peu alvéolé.

Cette plante croît en Barbarie, aux environs de Lacalle, dans les prés secs, où je l'ai recueillie. ○ (V. v.)

La plante se diffère de la précédente par ses tiges basses, simples, hautes d'un à deux pouces; ses feuilles sont pétiolées, ovales ou ovals-oblongues, la plupart un peu rongées & denticulées à leurs bords, obtuses à leur sommet; les fleurs peu nombreuses, supportées par des pédoncules courts. Je l'ai recueillie dans les mêmes lieux que la précédente.

27. *SENECON* à feuilles grasses. *Senecio crassifolius*. Willd.

Senecio corollis revolutis, foliis amplexicaulis, carnosiss, lanceolato-linearibus, obtusè sinuatis; pedunculis squamosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1982. n°. 28.

Jacobaea maritima, senecionis folio crasso & lucido, Massiliensis. Tourn. Inst. R. Herb. 480.

Jacobaea maritima, minima, glabra, senecionis folio, italica. Bartel. Ic. Rar. 261.

Cette espèce pourroit bien n'être qu'une variété de mon *Senecio leucanthemifolius*, à feuilles plus étroites, lancéolées, & dont les corolles sont un peu plus grandes.

Ses racines sont fibreuses, & produisent des tiges glabres, tendres, cylindriques, couchées à leur base, ascendantes à leur partie supérieure, grêles, striées, succulentes, rameuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, étroites, lancéolées, linéaires, longues d'un pouce, sinuées à leurs bords, entières; les découpures obtuses, un peu charnues, glabres & vertes à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, à peine rétrécies à leur base; les feuilles supérieures plus courtes, très-entières.

Les fleurs sont disposées en un corymbe lâche à l'extrémité des tiges & des rameaux, portées sur des pédoncules simples ou médiocrement rameux, munis de quelques écailles courtes. La corolle est

jaune, radiée, assez semblable à celle du *Senecio jacobaea*; les demi-fleurs de la circonférence, femelles & recourbés en dehors; les fleurons du centre nombreux, hermaphrodites.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Marseille & en Italie, sur les côtes maritimes. ○ (V. f.)

28. SENEÇON à tiges basses. *Senecio humilis*. Desfont.

Senecio foliis subspatulatis, obtusis, duplicato-dentatis; caule procumbente, ligulis revolutis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 271. tab. 233.

Senecio corollis revolutis, foliis lanceolatis, basi attenuatis, dentato-ferratis; caule procumbente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1982. n°. 29.

Senecio leucanthemifolius. Var. Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 238.

Cette espèce tient le milieu entre le *Senecio crassifolius* & le *Senecio leucanthemifolius*; elle ne diffère essentiellement de l'une & de l'autre, que par son port un peu différent, & par ses feuilles plus étroites, médiocrement spatulées.

Ses racines sont composées d'un grand nombre de fibres capillaires, fasciculées, entortillées, d'un blanc-roussâtre: il s'en élève des tiges nombreuses, courtes, courbées ou couchées à leur base, simples ou médiocrement rameuses, striées, glabres ou un peu velues, hautes de quatre à huit pouces & plus, garnies de feuilles alternes, pétiolées, distantes, un peu spatulées, lancéolées, vertes, glabres à leurs deux faces, quelquefois munies de poils très-rare, inégalement dentées à leur contour, presque laciniées, longues au moins d'un pouce, larges de trois lignes environ, obtuses, un peu élargies à leur sommet, rétrécies insensiblement à leur base, & décurrentes sur un pétiole beaucoup plus court que les feuilles; les supérieures presque sessiles.

Les fleurs sont peu nombreuses, disposées en un corymbe terminal & lâche, supportées par des pédoncules presque filiformes, presque simples, courts, quelquefois un peu allongés, nus ou garnis de quelques petites folioles tubulées. Le calice est cylindrique, composé de folioles étroites, linéaires, presque égales, droites, rapprochées, médiocrement aiguës, environnées, à leur base, de quelques écailles courtes, inégales, tubulées, aiguës. La corolle est jaune, radiée, les demi-fleurs femelles réfléchis & roulés en dehors; les fleurons hermaphrodites tubulés, divisés en cinq dents à leur limbe; cinq étamines, dont les anthères sont réunies en tube; les semences grêles, petites, oblongues, surmontées d'une aigrette blanchâtre, sessile, pileuse, un peu velue; le réceptacle nu.

Cette plante est commune dans les champs in-

cultes de la Barbarie; je l'ai recueillie au commencement de l'automne, aux environs de Lacalle. ○ (V. v.)

29. SENEÇON à petites corolles. *Senecio nebrodensis*. Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis lyratis, sinuatis, obtusis, petiolatis; caule hirsuto. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 217. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1986. n°. 42.

Jacobaea montana, senecionis pallido parvo flore. Bartcl. Icon. Rar. 1081. tab. 401.

Jacobaea nebrodensis, altera; oblongo folio latiori, minus incano, lacerato. Rai, Suppl. 179.

Cette plante a le port du *Senecio* commun, dont il diffère par ses feuilles plus grandes, plus obtuses, & par ses fleurs radiées.

Ses tiges sont droites, cylindriques, médiocrement rameuses, velues, garnies de feuilles molles, alternes, presque lancéolées, élargies, sinuées, presque en lyre, obtuses à leur sommet; les lobes très-entiers, d'un vert un peu blanchâtre. Les fleurs sont disposées en corymbe lâche à l'extrémité des tiges, soutenues par des pédoncules simples, foliitaires, garnis de poil visqueux; les calices composés de folioles étroites, égales, point membraneuses à leur sommet; la corolle assez semblable à celle du *Senecio filotica*, de couleur jaune, radiée; les demi-fleurons de la circonférence très-courts, garnis seulement d'un pistil sans étamines, médiocrement roulés en dehors; les fleurons du centre hermaphrodites; les semences allongées, surmontées d'une aigrette blanche, sessile, simple, un peu velue; le réceptacle nu, un peu convexe, légèrement alvéolé.

Cette plante croît en Sicile, en Espagne & dans les Pyrénées. ○ (V. f.)

30. SENEÇON géant. *Senecio giganteus*. Desfont.

Senecio foliis pinnatifido-lobatis, inaequaliter dentatis; lobo terminali maximo, floribus corymbosis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 273. tab. 234.

Senecio corollis revolutis, foliis petiolatis; inferioribus lyrato-pinnatifidis, dentatis; superioribus oblongis, inaequaliter grosse serratis; corymbo divaricato. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1983. n°. 32.

Cette plante est remarquable par la hauteur de ses tiges, l'ampleur de ses feuilles; par ses fleurs disposées en un corymbe étalé.

Ses tiges sont droites, glabres, striées, rameuses, de l'épaisseur du doigt, hautes de cinq à six pieds & plus, garnies de feuilles alternes, pétiolées, légèrement tomenteuses, quelquefois entièrement glabres à leurs deux faces; les feuilles caulinaires inférieures, longues d'environ un pied & demi,

larges de huit à dix pouces, pinnatifides ou lobées; les lobes ovales ou ovales-oblongues, obtus, inégalement dentées; les supérieures ovales-oblongues ou lancéolées.

Les fleurs sont nombreuses, réunies en un corymbe terminal, ample, étalé, convexe; supportées par des pédoncules nus & rameux; les ramifications garnies de petites folioles subulées, très-aiguës. Leur calice est cylindrique, composé de folioles linéaires, lancéolées, toutes égales, un peu aiguës. La corolle est jaune, de la grandeur de celle du *senecio jacobaeae*, radiale; les demi-fleurs petits, linéaires, roulés en dehors, semelles; les fleurons hermaphrodites, divisés en cinq dents à leur orifice. Les anthères sont jaunes, connées; les semences glabres, fort petites, couronnées par une aigrette simple & velue; le réceptacle nu & convexe.

Cette plante croît dans le royaume d'Alger, sur le bord des ruisseaux, aux environs de Belide, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. (*Descript. ex Desfont.*)

31. SENEÇON auriculé. *Senecio auriculatus*. Desfont.

Senecio foliis pinnatifidis, amplexicaulis; pinnulis obtusis, dentatis, remotiusculis; radio vix conspicuo. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 272. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1982. n°. 31.

Ses tiges sont droites, herbacées, velues, presque hétérofilées, striées, simples ou un peu rameuses, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, garnies de feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, distantes, un peu velues, munies de deux oreillettes à leur base, longues d'environ trois pouces, sur huit à dix lignes de large, pinnatifides; les pinnules écartées, inégalement dentées, obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont assez nombreuses, disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe ferré, dont les pédoncules sont rameux; les pédoncules partiels très-courts, inégaux. Le calice est simple, cylindrique, composé de folioles subulées, égales, point scarieuses à leur sommet. La corolle est jaune, de la grandeur de celle du *senecio hieracifolius*, à peine radiale; les demi-fleurs de la circonférence capillaires, peu sensibles, de la longueur du calice, renfermant un style très-fin; deux stigmates; point d'étamines; les fleurons tous hermaphrodites, terminés par cinq dents. Les semences sont lisses, glabres, surmontées d'une aigrette simple, sessile, d'un blanc de neige, velue, plus longue que le calice.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines, dans les déserts de la Barbarie. (*Descript. ex Desfont.*)

32. SENEÇON d'Egypte. *Senecio aegyptius*. Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis amplexicaulis, linearibus lanceolatis, pinnatifidis; squamis calicinis brevioribus, sphacelatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1981. n°. 25.

Senecio corollis revolutis, foliis amplexicaulis, sinuatis; squamis calicinis brevioribus integris, sphacelatis. Linn. Syst. veget. pag. 756. n°. 14. — Hort. Upsal. 241. n°. 6.

Jacobaea aegyptiaca, senecionis folio; flore minor. Vaill. Aët. Acad. Paris. 1720. pag. 298.

Ses tiges sont droites, médiocrement rameuses, glabres, striées, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, linéaires-lancéolées, médiocrement divisées à leur contour, sinuées, presque pinnatifides, assez semblables à celles du *senecio commun*, mais les découpsures moins profondes. Les fleurs sont terminales; les pédoncules nus, souvent à deux divisions, quelquefois garnis d'une ou de deux petites écailles. Les calices sont courts; les folioles intérieures droites, scarieuses à leur sommet, & les écailles extérieures qui environnent la base, très-simples, également scarieuses. La corolle est jaune, petite, radiale; les demi-fleurs courts, réfléchis en dehors.

Cette plante croît dans l'Egypte.

33. SENEÇON à trois fleurs. *Senecio triflorus*. Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis petiolatis, oblongis, sinuatis; pedunculis subtrifloris; calicibus concavis; squamis minimis, intusculis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1980. n°. 24.

Senecio corollis revolutis; foliis sessilibus, sinuatis; calicibus concavis; squamis minimis, intusculis. Linn. Syst. veget. pag. 756. n°. 13. — Hort. Upsal. 261. n°. 5. — Willd. Observ. n°. 130. — Kniph. Centur. 1. n°. 80.

Senecio foliis pinnatifidis; laciniis inaequalibus, erectis. Hort. Cliff. 406.

Senecio foliis sinuatis, petiolatis; pedunculis folio longioribus; floribus radiis disco brevioribus. Royen, Lugd. Bat. 165.

Jacobaea aegyptiaca, senecionis folio, semisofculis vix conspicuis. Vaill. Aët. Acad. Paris. ann. 1720. pag. 298.

Cette espèce a l'aspect du *senecio vulgaris*, mais ses feuilles sont moins profondément divisées; ses tiges sont droites, presque glabres, verdâtres, striées, garnies de feuilles pétioles, alternes; les supérieures sessiles, oblongues, sinuées à leur contour, un peu pinnatifides; les découpsures droites, inégales.

Les

Les fleurs sont disposées en une panicule lâche, terminale, dont les pédoncules sont longues, nus ou garnis d'une ou de deux petites écailles fort courtes, ordinairement à trois divisions uniflores. Les calices sont coniques, glabres, frisés, point scarieu à leur sommet, munis à leur base de quelques petites écailles inégales. La corolle est jaune, médiocrement radiale; les demi-fleurs très-courts, quelquefois à peine sensibles, réfléchis en dehors.

Cette plante croît dans l'Égypte. ○

34. SENEÇON de Java. *Senecio javanicus*. Willd.

Senecio corollis revolutis; foliis linearibus, pinnatifido-dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1984. n°. 37.

Senecio (coronopifolius), corollis radiantibus, revolutis; foliis linearibus, pinnatifido-dentatis; caule herbaceo. Burm. Flor. Ind. pag. 181. tab. 60. fig. 5.

Ses racines sont droites, blanchâtres, perpendiculaires; elles produisent plusieurs tiges hautes d'un demi-pied & plus, très-glabres, divisées, dès leur partie inférieure, en rameaux alternes, redressés, glabres, garnis de feuilles éparées, sessiles, très-étroites, linéaires, longues au moins de deux pouces, divisées à leurs bords en dents courtes, très-inégales, alternes ou opposées, presque disposées en aile.

Les fleurs sont disposées en une panicule lâche, terminale, dont les pédoncules sont alternes, simples ou médiocrement ramifiés, filiformes, plus longs que les feuilles, munis de quelques petites bractées sétacées. Les calices sont très-glabres, composés de folioles linéaires, égales, excepté quelques-unes à la base, très-courtes, presque sétacées, aiguës. La corolle est jaune, d'une grandeur très-médiocre; les demi-fleurs de la circonférence recourbés en dehors. Les semences sont surmontées d'une aigrette très-blanche.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de Java.

35. SENEÇON cendré. *Senecio cinerascens*. Aiton.

Senecio corollis revolutis; foliis pinnatifidis, tomentosis, margine revolutis; panicula patula; squamis calycinis exterioribus patentibus. Aiton, Hort. Kewen. vol. 3. pag. 191. — Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2. pag. 12. tab. 150. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1984. n°. 36.

C'est un arbrisseau dont les tiges, droites, ligneuses, cylindriques, rameuses, s'élèvent à la hauteur de cinq à six pieds; elles se divisent en rameaux glabres, blanchâtres dans leur jeunesse. Les feuilles sont éparées, pétiolées, profondément pinnatifides, lanugineuses, blanchâtres & tomen-

Botanique. Tome VII.

teuses à leurs deux faces, longues d'environ quatre pouces; les découpures linéaires, lancéolées, aiguës; les feuilles des rameaux plus étroites, linéaires, lancéolées, plus ou moins profondément dentées en scie à leurs bords; les supérieures entières.

Les fleurs sont disposées en une panicule lâche, terminale, étalée, peu garnie, dont les pédoncules sont droits, lanugineux, blanchâtres, longs de deux à trois pouces. Les écailles extérieures des calices sont ouvertes, subulées, point scarieuses; les intérieures au moins une fois plus longues, d'un vert-pâle à leur base, jaunâtres à leur partie supérieure, avec une pointe brune; droites, concaves, égales, cylindriques. Les corolles sont jaunes, radiales; les demi-fleurs de la circonférence au nombre de quatre à sept, très-ouverts, à peine réfléchis, légèrement tridentés à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ☞ (Descript. en Jacq.)

36. SENEÇON multifide. *Senecio multifidus*. Burm.

Senecio corollis revolutis; foliis bipinnatifidis, linearibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1986. n°. 41.

Senecio (tenuifolius), corollis revolutis; foliis pinnatifidis; pinnis cornatis, apice bifidis; caule herbaceo. Burm. Flor. Ind. pag. 181. tab. 60. fig. 41.

Cette plante a de grands rapports avec le *cineraria anthemoides*, à laquelle, si elle étoit mieux connue, il faudroit peut-être la rapporter.

Ses tiges sont herbacées, presque dichotomes, droites, très-glabres, filiformes, presque triangulaires, médiocrement élevées. Les feuilles sont alternes, pétiolées, glabres, verdâtres, médiocres, presque deux fois ailées, à découpures fort menues, souvent bifides à leur sommet, presque simples ou munies de quelques dents rares. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, sur des pédoncules grêles, alternes, simples, uniflores, quelquefois dichotomes, garnies de quelques petites bractées subulées. Les folioles calicinales sont droites, longues, linéaires; la corolle d'un jaune orangé; les semences surmontées d'une aigrette très-blanche.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de Java. (V. f. in herb. Lam.)

37. SENEÇON en corne de cerf. *Senecio coronopifolius*. Desfont.

Senecio radiis revolutis; foliis semiteretibus, f. b. carnosis, amplexicaulis; pinnulis linearibus, subulatis, inaequalibus; pedunculis elongatis, unifloris. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 273.

M

Senecio (cotonopifolius), *corollis revolutis*; *foliis pinnatifidis*; *laciniis linearibus*, *subintegerrimis*; *caule corymbofo*, *erecto*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1985. n°. 40. ?

Ses racines sont fibreuses, capillaires, presque velues : il s'en élève une tige droite, cylindrique, médiocrement rameuse, glabre, striée, haute d'environ deux à trois pieds, garnie de feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, charnues, à demi-cylindriques, subulées, longues de trois à quatre pouces, pinnatifides depuis leur milieu jusqu'à leur sommet, médiocrement velues ; les découpures distantes, linéaires, inégales, quelquefois un peu torfes, entières ou incisées & dentées.

Les fleurs sont peu nombreuses, disposées en un corymbe lâche, soutenues par des pédoncules médiocrement rameux, plus souvent uniflores, lisés, droits & feuillés. Le calice est simple, glabre, droit, cylindrique, composé de folioles linéaires, égales, point scarieuses à leur sommet. La corolle, assez semblable à celle du *senecio jacobaea*, est jaune, radiée, les demi-fleurs dépourvus d'étamines, fertiles, linéaires, roulés à leurs bords ; les fleurs tous hermaphrodites, tubulés, divisés en cinq dents à leur sommet ; les semences oblongues & fort petites, surmontées d'une aigrette simple, sessile, blanche, velue ; le réceptacle nu & convexe.

Cette espèce a été recueillie par M. Desfontaines en Barbarie, dans les sables humides du désert ; elle fleurit dans l'hiver. (*Desfont.* ex *Desfont.*)

Willdenow rapporte, mais avec doute, à cette plante une autre qui croit en Espagne, & qui offre quelques différences. Voici la description qu'il en donne. Elle a beaucoup de rapports avec le *senecio siliaticus*, mais les feuilles sont beaucoup plus étroites, ses tiges sont droites, hautes d'un demi-pied ou d'un pied, rameuses, striées, garnies de feuilles alternes, amplexicaules, étroites, pinnatifides ; les pinules linéaires, obtuses, entières dans les feuilles supérieures, dentées aux feuilles inférieures ; les fleurs disposées en corymbe, à l'extrémité des rameaux, & très-longuement pédonculées. ()

38. SENEÇON austral. *Senecio australis*. Willd.

Senecio corollis revolutis; *foliis linearilanceolatis*, *integerrimis*, *basi subnidentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1981. n°. 16.

Senecio angustifolius. Forst. Prodr. n°. 539.

Cette plante, dit Willdenow, a des tiges qui paroissent devoir être ligneuses, divisées en rameaux cylindriques & striés, garnis de feuilles alternes, pétioles, étroites, linéaires, lancéolées, très-entières à leurs bords, un peu charnues, médiocrement rétrécies à leur base, longues d'un

pouce, glabres à leur face supérieure, pubescentes en dessous, munies, à leur partie inférieure, d'une seule dent latérale, subulée, quelquefois de deux presque opposées. Les fleurs sont terminales & paniculées.

Cette plante se rencontre dans la Nouvelle-Zélande. ?

39. SENEÇON de la Zélande. *Senecio laevis*. Forst.

Senecio corollis revolutis; *foliis oblongo-lanceolatis*, *petiolatis*, *aqualiter ferratis*; *summis integerrimis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1981. n°. 27.

Senecio laevis. Forst. Prodr. n°. 538.

Cette plante paroît avoir quelques rapports avec le *senecio australis*. Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques, & probablement herbacées. Ses feuilles sont pétioles, alternes, longues d'un demi-pouce ; les inférieures oblongues, lancéolées, munies à leurs bords de chaque côté, de trois ou quatre des lures en scie ; les supérieures lancéolées, très-entières, & les pétioles très-longs, souvent garnis d'un appendice foliacé. Les fleurs ont leurs corolles radiées, les demi-fleurs de la circonférence recourbées en dehors ; elles ressemblent à celles du *senecio jacobaea*.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande. (*Desfont.* ex *Willd.*)

40. SENEÇON livide. *Senecio lividus*. Linn.

Senecio corollis revolutis; *foliis amplexicaulibus lanceolatis*, *dentatis*; *squamis calicinis brevissimis*, *intactis*. Linn. Syst. veg. pag. 757. n°. 15. — Hort. Upf. 201. n°. 7. — Kniph. Cent. 10. n°. 79. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1983. n°. 33.

Senecio salis sinuatis, *basi latioribus*, *amplexicaulibus*; *floribus corymbofis*; *radiis disco brevioribus*. Roy. Lugd. Bat. 165. ?

Cette plante s'élève peu : ses tiges sont glabres, à peine rameuses, garnies de feuilles alternes, amplexicaules, lancéolées, échancrées en cœur à leur base, dentées à leur contour, un peu aiguës à leur sommet, de couleur verte, quelquefois glauques & tirant sur la couleur de chair à leur face inférieure.

Les fleurs sont disposées en corymbe à l'extrémité des tiges : leur calice est un peu visqueux, finement & agréablement strié ; les écailles intérieures, droites, parallèles, colorées à leur sommet ; les extérieures beaucoup plus petites, scarieuses, point scarieuses. La corolle est jaune, radiée ; les demi-fleurs de la circonférence fort courts & un peu réfléchis.

Cette plante se rencontre en Espagne.

41. SENEÇON à trois lobes. *Senecio trilobus*. Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis amplexicaulibus, obovatis, apice trilobis, serratis; calicinis, squamis sphaecelatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1984. n°. 35.

Senecio corollis revolutis; foliis amplexicaulibus, apice trilobis, squamis, calicinis sphaecelatis, laceris. Linn. Syst. veget. pag. 757. n°. 16. — Hort. Upf. 260. n°. 4.

Jacobaea hispanica, minus laciniosa; petalis brevissimis. Vaill. Paris, 21.

Ses racines sont fibreuses, &c produisent des tiges droites, hautes de six à sept pouces, fermes, épaisses, anguleuses, liriées, velues, divisées à leur partie supérieure en quelques rameaux alternes, garnies de feuilles sessiles, alternes, oblongues, amplexicaules, charnues, légèrement velues, incisées & dentées en scie à leur contour, divisées en trois lobes à leur sommet.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en un corymbe serré, dont les pédoncules sont inégaux, rapprochés, lanugineux. Les calices sont courts, épais, ovales; les folioles internes droites, égales, noirâtres à leur sommet, munies à leur base de quelques écailles très-courtes, dont l'extrémité est noire, déchirée en découpures presque sèches, telle que qu'elles paroissent comme autant de cils noirâtres. La corolle est jaune, radiale; les demi-fleurs rabattus en dehors.

Cette plante se trouve en Espagne. ☉

42. SENEÇON à feuilles de téléphium. *Senecio telephifolius.* Jacq.

Senecio corollis revolutis; foliis obovato-cuneiformibus, apice serratis, glabris, amplexicaulibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1983. n°. 34.

Senecio telephifolius. Jacq. Fragm. bot. vol. 1. pag. 1. tab. 1. fig. 3.

Ses tiges sont droites, cylindriques, striées, hérissées de poils roides & courts, hautes d'environ deux pieds, rameuses, garnies de feuilles sessiles, alternes, amplexicaules, en ovale renversé, cunéiformes, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à la partie supérieure de leur contour, obtuses, élargies à leur sommet, rétrécies à leur base.

Les fleurs sont peu nombreuses, disposées à l'extrémité des tiges en une sorte de corymbe lâche, dont les pédoncules sont médiocrement rameux, presque simples; la corolle radiale, munie à sa circonférence de demi-fleurs femelles, sans étamines, roulés extérieurement à leur sommet.

Cette plante se rencontre aux environs du Cap de Bonne-Espérance. ☉

43. SENEÇON à feuilles glauques. *Senecio glaucus.* Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis amplexicaulibus, lanceolatis, obtusis, dentatis, juncerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1217. — Roy. Lugd. Bat. 164. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1986. n°. 43.

Jacobaea aegyptia, annua, coronapi folio glauco. Vaill. Aët. Acad. Paris. 1720. pag. 297.

Jacobaea aegyptia, folio glauco coronapi. Boeth. Lugd. Bat. 1. pag. 99.

Ses tiges sont droites, herbacées, pubescentes, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, lanceolées, dentées en cornes de cerf, pubescentes, de couleur glauque-cendrée; les dentelures obtuses, très-enrières. Les fleurs sont radiales; les demi-fleurs de la circonférence roulés en dehors.

Cette plante croit dans l'Égypte. ☉

44. SENEÇON variqueux. *Senecio varicosus.* Linn.

Senecio corollis revolutis; foliis ovatis, petiolatis, dentatis, punctulato-varicosi. Linn. Dec. 9. tab. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1987. n°. 44.

Cette plante a des feuilles alternes, pétiolées, ovales, vertes en dessus, d'un rouge de sang à leur face inférieure, dentées à leur contour, légèrement ponctuées & variqueuses. Ses corolles sont composées de fleurs dans leur centre, & à la circonférence de demi-fleurs roulés en dehors.

Cette plante se rencontre dans l'Égypte. ☉

*** Fleurs radiales; demi-fleurs étalés; feuilles pinnatifides.

45. SENEÇON élégant. *Senecio elegans.* Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis piloso-viscidis, pinnatifidis, aequalibus, patentissimis; rachi inferne angustata, calicibus hirsutis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 193. n°. 58. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1990. n°. 58.

Senecio corollis radiantibus; foliis pinnatifidis, aequalibus, patentissimis; margine incrassato, recurvato. Linn. Syst. veget. pag. 630.

Senecio foliis pinnatifidis, dentatis; caule herbaceo, paniculato. Thunb. Prodr. pag. 159.

Senecio corollis radiantibus; foliis pinnatifidis, aequalibus, patentissimis; rachi inferne angustata. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1218. — Hort. Cliff. 406. — Hort. Upf. 260. — Willd. Dict. n°. 5. — Kniph. Cent. 7. n°. 85.

Aster africanus, annuus, senecionis foliis. Commel. Hort. 2. pag. 59. tab. 30.

Jacobaea Capensis; flore purpureo, senecionis folio dentato, Sebaf. Mul. vol. 1. pag. 33. tab. 22. fig. 1.

Jacobaea africana, *laciniosa*, *laetifolia*, flore purpureo. Tourn. Infl. R. Herb. 487. ?

β. *Jacobaea africana*, *frutescens*; flore amplo, purpureo, elegantissimo senecionis folio. Volk. Norib. pag. 225. tab. 225.

Cette espèce est une des plus élégantes de ce genre, remarquable par les fleurs d'une belle couleur pourpre à leur circonférence, d'un jaune-doré dans le centre.

Ses tiges sont herbacées, droites, cylindriques, verdâtres, striées, presque glabres, hautes d'environ trois pieds, rameuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, planes, élargies, vertes à leurs deux faces, un peu charnues, légèrement pileuses & visqueuses, profondément pinnatifides; les découpures un peu élargies, linéaires, obtuses à leur sommet, légèrement incisées ou muries de dents larges, courtes, très-aiguës; celles de la partie supérieure épaisses, recourbées, un peu blanchâtres, presque caulescentes.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un beau corymbe étalé, soutenues par des pédoncules presque simples, allongés, cylindriques, un peu inclinés, munis de quelques petites folioles courtes, linéaires, aiguës. Le calice est un peu élargi, composé de folioles droites, presque égales, linéaires, à peine aiguës, scarieuses, noires à leur sommet, glabres ou quelquefois un peu ciliées. La corolle est d'une grandeur médiocre, ouverte, composée à sa circonférence de demi-fleurs d'une belle couleur pourpre, planes, point réfléchies; les fleurons du centre de couleur jaune, nombreux, hermaphrodites. Les semences sont surmontées d'une aigrette très-blanche, soyeuse, simple, sessile. La plante β a des tiges plus élevées, presque ligneuses. Ses corolles sont un peu plus amples.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. Elle fait aujourd'hui l'ornement des jardins. ☉ (V. v.)

46. SENEÇON mignon. *Senecio venustus*. Ait.

Senecio corollis radiantibus; caule, calice foliisque glabris; foliis pinnatifidis; lacinii linearibus, acutis, dentatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 192. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1990. n°. 57.

Il existe de très-grands rapports entre cette plante & le *senecio elegans*, surtout pour la disposition & la forme des fleurs, dont elle n'est peut-être qu'une variété; elle en diffère par ses feuilles plus étroites & plus aiguës.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, striées, rameuses, garnies de feuilles alternes,

sessiles, parfaitement glabres, très-étroites, allongées, profondément pinnatifides; les découpures linéaires, dentées, aiguës, très-souvent munies, sur la principale nervure, de feuilles inférieures, de quelques aigüilles mous.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des branches, en un corymbe lâche, soutenues par des pédoncules allongés, presque simples. La corolle est d'une belle couleur purpurine, fendue, composée, à la circonférence, de demi-fleurs ouverts, point réfléchis; & dans le centre, de fleurons hermaphrodites. Les semences sont petites, étroites, couronnées par une aigrette blanche, simple, sessile.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. ☉

47. SENEÇON rustique. *Senecio squalidus*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis semi-amplexicaulibus, pinnatifidis; lacinii linearibus, subdentatis, distantibus; caule erecto. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1991. n°. 59.

Senecio corollis radiantibus, calice longioribus, integris; foliis pinnatifidis; lacinii linearibus, distantibus. Linn. Syst. veget. pag. 757. — Hort. Upsal. 160.

Senecio radio patente; foliis ellipticis, integerrimis; foliis pinnatifidis; lacinii sublinearibus, distantibus. Smith, Britan. vol. 2. pag. 883.

Senecio gallicus. Villars, Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 250.

Jacobaea pumila, *gallica*. Boccon. Sic. pag. 76. tab. 41. fig. 1.

Jacobaea feula, *chrysanthemum creticum* folio. Tourn. Infl. R. Herb. 486. — Barrel. Icon. Rat. 262. fig. 2.

Senecio silvaticus. Var. α. Gouan, Ill. 67.

Cette espèce est petite. Ses tiges sont basses, droites, glabres, cylindriques, hautes de huit à dix pouces, presque simples, herbacées, à peine striées, garnies de feuilles alternes, sessiles, à demi-amplexicaules, oblongues, glabres à leurs deux faces, pinnatifides; les découpures étroites, linéaires, distantes, médiocrement dentées, approchant des feuilles du *chrysanthemum*.

Les fleurs sont peu nombreuses, presque solitaires & alternes à l'extrémité des tiges, supportées par des pédoncules simples, allongés, munis à leur base, & quelquefois dans leur longueur, de quelques petites folioles courtes, très-étroites, aiguës. Les calices sont glabres, cylindriques, composés de folioles droites, rapprochées, presque égales, un peu aiguës. La corolle est jaune, petite, radiale; les demi-fleurs très-ouverts,

elliptiques, entiers à leur languette, point roulés; les fleurons tous hermaphrodites, un peu plus longs que les calices; les semences petites, étroites, couronnées par une aigrette simple, filiforme, blanchâtre.

Cette plante croît dans les champs & sur les murs, en Angleterre & dans les départements méridionaux de la France. ☉ (V. f.)

48. SENEÇON à feuilles de roquette. *Senecio erucifolius*. Linn.

Senecio corollis radiatibus; foliis pinnatifidis, densatis, subhirsutis; caule erecto. Linn. Syst. veget. pag. 757. n°. 26. — Flot. fucc. edit. 2. n°. 750. — Willch. Observ. n°. 131. — Pollich. Pal. n°. 796. — Hoffm. Germ. 294. — Roth, Germ. vol. I. pag. 363. — vol. II. pag. 338. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1991. n°. 60.

Senecio scanonensis. Iter Scan. 215.

Senecio jacobaea, selandica, incana. Lobel. Ill. 76.

Jacobaea incana, altera. C. Bauh. Pin. 131.

Jacobaea artemisia folio, radice repente. Vaillant, Parif. Aët. Academ. pag. 366.

Jacobaea altissima, foliis eruce, artemisiave similibus & amaris. Rupp. Jen. 164.

Jacobaea incana, repens. Battel. Icon. Rat. 1075. tab. 153.

Cette espèce paroît, au premier aspect, avoir de très-grands rapports avec le *senecio jacobaea*; elle en diffère par ses tiges légèrement velues, par ses feuilles un peu blanchâtres, & dont les découpures sont courtes, élargies.

Ses racines sont rampantes, & produisent une tige droite, haute de deux ou trois pieds, dure, cylindrique, striée, rameuse, velue ou pubescente, caractère qu'elle perd souvent par la culture; garnie de feuilles alternes, sessiles, alongées, élargies, vertes ou peu blanchâtres, surtout à leur face inférieure; pubescentes, pinnatifides; les découpures courtes, presque égales, élargies, obtuses à leur sommet, garnies de quelques dents aiguës à leur contour.

Les fleurs sont assez nombreuses, disposées en corymbe à l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules simples ou médiocrement rameux, souvent dichotomes, cylindriques, pubescents, inégaux, garnis de quelques petites folioles linéaires, courtes, aiguës. Le calice est un peu épais, cylindrique, composé de folioles droites, égales, très-étroites, aiguës, terminées par une pointe scariée un peu rougeâtre. La corolle est jaune, radiale, assez semblable à celle du *senecio jacobaea*; les demi-fleurons ouverts, point recourbés; les fleurons tous hermaphrodites, un peu plus

longs que les calices; les semences petites, velues, surmontées d'une aigrette très-blanche, simple, filiforme, plus longue que les folioles calicinales.

Cette plante se rencontre dans les contrées méridionales de l'Europe, en France, dans les environs de Paris. ☉ (V. v.)

49. SENEÇON jacobée. *Senecio jacobaea*. Linn.

Senecio radio patente; foliis lyrato-bipinnatifidis, divaricatis, densatis, glabris; caule erecto. Smith. Britan. vol. 2. pag. 385. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1997. n°. 76.

Senecio corollis radiatibus, foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis; caule erecto. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 3217. — Hort. Cliff. 406. — Flot. fucc. 688. 751. — Royen, Lugd. Bat. 174. — Dalib. Parif. 257. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1072. — Pollich. Pal. n°. 797. — Kniph. Centur. 6. n°. 83. — Knorr. Delic. 1. tab. 1. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 134. n°. 127. — Hoffm. Germ. 294. — Roth. Germ. vol. I. pag. 364. — vol. II. pag. 340.

Senecio foliis lineatis, pinnis densatis, extrema maxima. Halck. Helv. n°. 62.

Jacobaea vulgaris, laciniata. C. Bauh. Pin. n°. 111. — Tournef. Infl. R. Herb. 485. — Morif. Hist. 3. pag. 108. §. 7. tab. 8. fig. 8.

Herba Sancti Jacobi. Fusch. Hist. 742. 1c.

Jacobaea vulgaris. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1057. Icon.

Jacobaea. Dodon. Pempt. 642. 1c.

β. *Jacobaea vulgaris, flore nudo*. Raj, Angl. 2. pag. 82. — Morif. Hist. 3. pag. 108. — Pollich. 1. c.

Jacobaea vulgaris, laciniata; flore discoide. Vail. Aët. Academ. Parif. 1720. pag. 383.

Vulgairement la jacobée ou herbe de Saint-Jacques.

Cette espèce, l'une des plus communes de ce genre après le fenécon commun, se distingue du fenécon des forêts par ses feuilles laciniées en forme de lyre, & surtout par les fleurs, dont la corolle est munie de demi-fleurons à sa circonférence.

Ses tiges sont droites, hautes de deux à trois pieds, glabres, cannelées, rameuses particulièrement à leur partie supérieure, souvent rougeâtres vers leur base, un peu anguleuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées ou presque sessiles, surtout les supérieures; glabres à leurs deux faces, ciliées; les folioles souvent pinnatifides, à découpures inégales, laciniées ou dentées, anguleuses ou obtuses.

Ses fleurs sont nombreuses, disposées en un corymbe terminal, supportées par des pédoncules allongés, rameux à leur sommet; les ramifications courtes, inégales, un peu pubescentes, munies de quelques folioles subulées. Les calices sont composés de folioles étroites, égales, subulées, scarieuses à leur sommet, enveloppées à leur base de quelques autres petites folioles courtes. La corolle est jaune, radiale; les demi-fleurons femelles, quelquefois rares ou presque nus. Leur languette est plus ou moins allongée, entière ou presque à trois lobes à son sommet; les femelles petites, couronnées par une aigrette simple, sessile, très-blanche.

Cette plante croît en Europe, dans les prés un peu humides. (V. v.)

Les feuilles passent pour vulnérables, expectorantes & déterives; mais elles sont rarement employées. Leur sève est acre, amère, désagréable; on en obtient une couleur qui résiste peu à l'action de l'air.

50. SENEÇON aquatique. *Senecio aquaticus*. Smith.

Senecio radio patente, foliis ellipticis; foliis lyreatis, serratis; inferioribus obovatis, integris; seminibus glabris. Smith, Britan. vol. 2. pag. 88. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1997. n°. 77.

Senecio corollis radiantibus; foliis dentatis; radicalibus ovatis, cuneatis pinnatifidis; lacinia eximie majore. Hudf. Angl. 366. — Hoffm. Germ. 294. — Hort. Synop. 460. — Cædr. Flor. dan. tab. 784.

Jacobaea latifolia. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1057.

Jacobaea terria, latifolia. Cluf. Hist. 2. pag. 23.

Senecio jacobaea. Var. v. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 227.

Cette espèce a quelques rapports avec le *senecio jacobaea*. Ses feuilles sont plus larges, bien moins profondément divisées; ses tiges plus hautes.

Ses racines sont fermes, presque horizontales, munies de fibres simples, capillaires; elles produisent une riga étroite, cylindrique, un peu rougeâtre, glabre, rameuse, haute de trois à quatre pieds, garnie de feuilles alternes, pétiolées, en forme de lyre; les inférieures ovales, presque entières, oblongues, dentées; les supérieures presque sessiles, incisées, dentées en scie, molles, glabres à leurs deux faces; les découpures irrégulières, peu profondes.

Les fleurs sont réunies en un corymbe terminal, supportées par des pédoncules allongés, rameux à leur extrémité, garnis de quelques folioles subulées. Les calices sont cylindriques, composés de folioles droites, égales, étroites, un peu aiguës,

scarieuses à leur sommet, canaliculées à leur base. La corolle est radiale, de couleur jaune; les demi-fleurons planes, ouverts, point réfléchis; les fleurons tous hermaphrodites, un peu plus longs que le calice; les femelles glabres, étroites, surmontées d'une aigrette très-blanche, sessile, simple, velue.

Cette plante croît en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, dans les terrains marécageux. 2

51. SENEÇON à feuilles d'aurone. *Senecio abrotanifolius*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis pinnato-multifidis, linearibus, nudis, acutis; pedunculis subulifloris. Linn. Syst. veg. 631. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1995. n°. 70.

Senecio corollis radiantibus; foliis pinnato-multifidis, linearibus, nudis, acutis; floribus corymbosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1219. — Jacq. Flor. austr. tab. 79. — Mill. Dict. n°. 6. — Hop. Cent. ext. 4. — Scop. Carn. ed. 2. n°. 1073. — Jacq. Flor. austr. tab. 79. — Hoff. Synop. 459.

Solidago foliis vaginosis, pinnatis; pinnis perangustis, acutis, simplicibus & bifidis. Haller, Helv. n°. 71.

Achillaea montana, artemisia tenuifolia facie. Lobel, Adverf. 333. Icon. 746.

Ageratum ferulaceum. Murr. Icon. 87. — J. Bauh. Hist. 3. pars 1. pag. 152.

Jacobaea alpina, foliis multifidis, eschleriana; flore luteo, plerumque gemello. Pluk. Almag. pag. 194.

Chrysanthemum alpinum, foliis abrotanifolius. C. Bauh. Pin. 134.

Chrysanthemum alpinum, secundum. Cluf. Hist. 1. pag. 33. tab. 334.

Jacobaea foliis ferulaceis, flore minore. Tourn. Inst. R. Herb. 486.

Cette plante est distinguée par ses feuilles ailées, à plusieurs divisions fines, aiguës, glabres, linéaires, & par ses fleurs petites.

Ses racines sont dures, un peu horizontales, garnies de fibres simples, assez nombreuses. Ses tiges sont droites, dures, roides, presque ligneuses, cylindriques, glabres, striées, d'un vert-blanchâtre. Les feuilles sont pétiolées, alternes; les radicales & inférieures deux fois ailées, assez amples, à découpures fines, glabres, linéaires, entières ou quelquefois un peu divisées, très-aiguës, ressemblant presque à celles de l'aurone; les feuilles supérieures simplement ailées, presque sessiles, vertes, fort menues.

Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux,

supportées par des pédoncules alternes, pubescents, rameux, munis de petites folioles subulées; les ramifications terminées quelquefois par deux fleurs. Les calices sont glabres, d'un vert-jaunâtre, composés de folioles égales, concaves, un peu carénées, aiguës, à peine scarifiées à leur sommet, médiocrement canaliculées. La corolle est rasée, d'un jaune doré; les fleurons hermaphrodites, à peine plus longs que les calices, d'un jaune-ponce; les demi-fleurons ouverts, point réfléchis; leur languette ovale, oblongue ou elliptique, à cinq petites dents à son sommet, d'un jaune plus clair, satiné; les semences petites, surmontées d'une aigrette blanche, sessile, simple, un peu velue.

Cette plante croît en Europe, dans les Alpes, la Suisse, les Pyrénées, sur les lieux montueux. (V. v.)

52. SENEÇON à feuilles fines. *Senecio tenuifolius*. Linn.

Senecio floribus radiantibus; foliis pinnatis; pinnis linearibus, subulatis, subacutis, subtus pubescentibus; caule subhirsuto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1996. n°. 75.

Senecio corollis radiantibus, foliis omnibus pinnatis, pinnis linearibus, pedunculis corymbosis, caule erecto. Linn. Syst. veget. pag. 358. — Jacq. Flor. austr. vol. 3. tab. 278. — Hoff. Synop. 460. vol. II. pag. 340.

Senecio radio patente; foliis pinnatifidis, subrevolutis, subtus pallidioribus, pubescentibus; caule erecto, villosis. Smith, Britan. vol. 2. pag. 884.

Senecio erucifolius. Hudf. Angl. 366. — Relhan. Cantab. 316. — Curtis, Lond. Falc. 5. tab. 64.

Senecio abrotanifolius. Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 133. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 431.

Cette espèce a de grands rapports avec le *senecio abrotanifolius*, avec lequel on l'a confondue. Elle s'en distingue par les tiges un peu velues, par ses feuilles simplement ailées, pubescentes en dessous.

Ses racines sont médiocrement épaisses, dures, fibreuses; elles produisent des tiges droites, cylindriques, striées, médiocrement velues, rameuses à leur sommet, rougeâtres à leur base. Les feuilles sont alternes, pétiolées, assez amples, ailées; les folioles étroites, linéaires, subulées à leur sommet, vertes, glabres en dessus, quelquefois pubescentes à leur face inférieure, quelquefois aussi un peu incisées & médiocrement roulées à leurs bords; les feuilles supérieures sessiles, également ailées, mais plus petites.

Les fleurs sont disposées en corymbe à l'extrémité des tiges, soutenues par des pédoncules alternes, inégaux, pubescents, médiocrement rameux, munis de quelques petites folioles subulées.

Les calices sont composés de folioles simples, étroites, égales, aiguës. La corolle est d'un grandeur médiocre, rasée, de couleur jaune; les demi-fleurons ouverts, point réfléchis.

Cette plante se rencontre dans les forêts en Angleterre, en Autriche, en Bohême, en Allemagne, en France, à Fontainebleau, à Marcoulli, &c. (V. f.)

53. SENEÇON à feuilles de dauphinelle. *Senecio delphinifolius*. Desfont.

Senecio radiis patentibus, foliis multifloram decompositis; foliolis linearibus, divaricatis, acutiusculis. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 272.

Senecio foliis pinnato-multifidis, linearibus, revolutis, subtus villosis; caule subulato. Vahl, Symb. 2. pag. 71. tab. 45.

Senecio floribus radiantibus, foliis pinnatis; pinnis linearibus, tripartitis, margine revolutis, subtus villosis; caule subulato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1996. n°. 94.

Jacobaea multifida, umbellata, annua. Eoccon. Sic. pag. 94. tab. 5.

Jacobaea odonidis foliis, floribus in umbellam dispositis. Shaw, Afric. Specim. n°. 347.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, cylindriques, glabres ou légèrement velues, n'édiocrement striées, rameuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles presque velues, souvent glabres, alternes; les feuilles radicales lobées; les lobes obtus, inégaux; celles des tiges plusieurs fois composées; les folioles linéaires, inégales, divariquées, obtusius ou un peu aiguës, roulées à leurs bords.

Les fleurs sont nombreuses, disposées en corymbe à l'extrémité des tiges, supportées par des pédoncules droits, inégaux, garnis de petites feuilles subulées. Les calices sont cylindriques, composés de folioles égales, subulées, point scarifiées à leur sommet, munies extérieurement & à leur base d'un second calice lâche, très-cour. La corolle est rasée, de couleur jaune, assez semblable à celle du *senecio jacobaea*, composée à la circonférence de demi-fleurons linéaires, ouverts, denticulés à leur sommet. Les fleurons du disque sont hermaphrodites, divisés en cinq dents à leur limbe. Les semences sont petites, oblongues, couronnées par une aigrette simple, sessile, velue, d'un blanc de neige; le réceptacle nu & convexe.

Cette plante se rencontre dans les champs, sur les côtes de la Barbarie. (Descript. ex Desf.)

54. SENEÇON du Canada. *Senecio canadensis*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis omnibus bipin-

natis, linearibus; pedunculis corymbosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1219. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1996. n°. 73.

Jacobaea charophyllifolia, mariana. Pluk. Mantiff. pag. 107.

Ses tiges sont droites, lisses, cylindriques, striées, garnies de feuilles alternes, deux fois ailées, linéaires, glabres à leurs deux faces; les supérieures simplement ailées. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe fastigie. Les calices sont cylindriques, composés de folioles droites, simples, égales, rouffétrées. La corolle est de couleur jaunâtre, radiale; les demi-fleurs tout-à-fait ouverts, point réfléchis.

On rencontre cette plante dans le Canada.

55. SENEÇON à grandes fleurs. *Senecio grandiflorus.* Berg.

Senecio corollis radiantibus; foliis pinnatifidis, lacinii linearifoliatas. Berg. Plant. Capenf. pag. 180. n°. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1994. n°. 69.

Senecio foliis pinnatis, glabris; pinnis linearibus, floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 159.

Jacobaea coronopifolia, rigentibus foliis, aethiopica. Pluk. Mantiff. pag. 106. tab. 421. fig. 5.

Ses tiges sont droites, cylindriques, herbacées, glabres, striées, hautes de plusieurs pieds, garnies de feuilles alternes, distantes, sessiles, un peu tudes au toucher, pinnatifides; les découpures linéaires, subulées, très-alongées. Les fleurs sont peu nombreuses, disposées en un corymbe lâche, simple, dont les pédoncules sont munies de feuilles ou de bractées subulées; celles de leur base pinnatifides.

Le calice est glabre, tronqué, composé de plusieurs folioles linéaires, aiguës, un peu concaves, relevées en carène en dehors, droites, égales, parallèles, enveloppées à leur base de quelques autres petites folioles courtes, imbriquées. La corolle est grande, radiale; les fleurons du centre hermaphrodites, jaunâtres, tubulés, à cinq dents à leur sommet. Les demi-fleurs de la circonférence de couleur purpurine, linéaires, obus, ouverts, échancrés à leur sommet; l'onglet filiforme, de la longueur du calice; les étamines capillaires; les anthères cylindriques, à cinq dents à leur orifice; l'ovaire ovale, oblong, comprimé, couronné d'une aigrette simple, pileuse, de la longueur de la corolle.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (Description. ex Berg.)

56. SENEÇON à feuilles de chrysanthème. *Senecio chrysanthemifolius.*

Senecio corollis radiantibus; foliis glaberrimis, laxè pinnatifidis; pinnis longissimis, inaequaliter subpinnatis; coule ramossissimo. (N.)

Jacobaea ficula, chrysanthemi facie. Boccon. Sic. pag. 66. tab. 67.

Jacobaea tenuissimè lacinata, buptolmi flore. Tourn. Inst. R. Herb. 486.

Cette plante a des tiges droites, un peu tortueuses à leur partie supérieure, glabres, striées, très-rameuses, cylindriques, d'un vert jaunâtre, hautes de trois à quatre pieds; les rameaux diffus, alternes; les feuilles pétioles, alternes, pinnatifides ou fortement lacinées, amples, un peu charnues, vertes, glabres à leurs deux faces; les découpures distantes, très-longues, étroites, linéaires, dentées ou finement lacinées à leurs bords, presque pinnatifides; les dentelures simples, étroites, linéaires, obtuses, très-inégaux; les feuilles supérieures sessiles, presque amplexicaules, moins composées.

Les fleurs sont d'une grosseur médiocre, plus grandes que celles du *Senecio jacobaea*, auxquelles d'ailleurs elles ressemblent; disposées à l'extrémité des rameaux en un corymbe étalé; soutenues par des pédoncules grêles, inégaux, ramifiés, munis de petites bractées subulées. Leur calice est cylindrique, glabre, tronqué, composé de folioles égales, parallèles, linéaires, un peu aiguës, scarieuses & noirâtres à leur sommet, enveloppées à leur base par quelques petites folioles courtes, ouvertes, lancéolées, aiguës. La corolle est radiale, de couleur jaune; les demi-fleurs ouverts, un peu réfléchis, linéaires, obtus; les fleurons plus longs que le calice, divisés en cinq dents à leur sommet; les semences petites, glabres, surmontées d'une aigrette blanche, presque soyeuse, simple, sessile.

Cette plante croît naturellement dans la Sicile. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

57. SENEÇON hasté. *Senecio hastatus.* Linn.

Senecio corollis radiantibus, petiolis amplexicaulis, pedunculis folio triplo longioribus, foliis pinnatifidis. Linn. Syst. veget. pag. 717. n°. 22. — Roy. Lugd. Bat. 164. — Mill. Dict. n°. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1987. n°. 45.

Senecio (glutinofus), foliis pinnatifidis, viscosis; lacinii angulatis, dentatis; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 158. ?

Jacobaea asra, perennis, viscosa, lutea, asplenii foliis. Vaill. Paris. AG. Acad. 1720. pag. 298. — Dill. Eltham. pag. 183. tab. 152. fig. 184.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied & demi, épaisses, visqueuses, légèrement velues, rameuses,

rameuses, cylindriques, frêles, paniculées à leur sommet, garnies de feuilles alternes, sessiles, oblongues, glutineuses, vertes, tendres, légèrement velues, presque pinnatifides ou laciniées à leur contour; les découpages obtusés, dentés ou presque déchiquetés; les feuilles supérieures plus courtes, amplexicaules.

Les fleurs forment une panicule terminale, droite, dont les pédoncules sont trois à quatre fois plus longs que les feuilles, velus, inégaux. Les calices sont cylindriques, visqueux, pubescents. La corolle est jaune, radiale; les demi-fleurs longs, linéaires, obtus, presque entiers à leur sommet, ouverts, point réfléchis; les fleurons courts, à cinq découpages aiguës; les semences petites, ovales, oblongues, surmontées d'une aigrette plus courte que les fleurons.

Cette plante croît dans l'Afrique.

58. SENEÇON laineux. *Senecio pubigerus*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; petiolis radicalibus lanatis, foliis runcinatis, caulibus simplicissimis; floribus lateralibus, sessilibus. Linn. *Syst. veget.* pag. 717. n° 25. — *Amœn. Acad.* vol. 6. Afr. 65. — *Willd. Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1988. n° 52.

Jacobaea africana, monomotapetosa. Brey. Cent. tab. 65. — *Motif. Oxon. Hist.* 3. §. 7. tab. 18. fig. 32.

Cette plante, différente du *senecio hastatus*, avec lequel elle ne doit pas être confondue, a ses racines vivaces, d'où s'élèvent des tiges hautes d'un pied, très-simples, garnies dans leur longueur de trois à quatre feuilles à demi-amplexicaules, fort petites, pinnatifides. Les feuilles radicales sont pétiolées, glabres, pinnatifides, entrecroisées à leurs bords, obtusés à leur sommet, munies à la base de leur pétiole d'un duvet mou & lanugineux.

Il n'existe souvent qu'une seule fleur terminale, de couleur jaune, accompagnée quelquefois de quelques autres latérales & sessiles. Ces fleurs sont radiales; les demi-fleurs de la circonférence sont de couleur violette, à ce qui suffit pour distinguer cette plante, au premier aspect, du *senecio hastatus*, dont les demi-fleurs sont jaunes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Linn.*)

59. SENEÇON uniflore. *Senecio uniflorus*. Allion.

Senecio corollis radiantibus; foliis tomentosis, oblongis, dentatis; caule folioso, unifloro. Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1992.

Senecio uniflorus. Allion. *Flor. pedem.* n° 728. tab. 17. fig. 3.

Solidago foliis tomentosis, ovatis & semipinnatis. Hall. *Helv.* n° 70.

Botanique. Tome VII.

Jacobaea pumila, sinuatis foliis, argentea; summo caule flore singulari. Pluk. *Phytogr.* tab. 39. fig. 7.

C'est une plante fort petite, dont les tiges basses ont à peine un pouce ou un pouce & demi de haut; elles sont droites, très-simples, uniflores, velues, garnies de feuilles alternes, lancéolées, entières ou médiocrement dentées. Les feuilles radicales sont oblongues, les unes entières, d'autres sinuées ou dentées, quelquefois pinnatifides, tomenteuses & blanchâtres à leurs deux faces.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque tige, assez grandes, de couleur jaune, radiales; les demi-fleurs à languettes linéaires, planes, point roulées en dehors; les fleurons tous hermaphrodites; les semences petites, surmontées d'une aigrette blanche, sessile, très-simple.

Cette plante croît sur le sommet des Alpes, du Valais & du Piémont. 4 (V. f.)

60. SENEÇON blanchâtre. *Senecio incanus*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis utrinque tomentosis, niveis, pinnatifidis; laciniis linearibus, obtusis, subdentatis; corymbo cœvato. Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1993. n° 64.

Senecio corollis radiantibus; foliis utrinque tomentosis, subpinnatis, obtusis; corymbo subovoïde. Linn. *Spec. Plant.* vol. 2. pag. 1219. — Gouan, *Monsp.* pag. 440. — *Mill. Dict.* n° 11. — Gouan, *Illustr.* pag. 67. — *Lam. Flor. franç.* vol. 2. pag. 133. n° 117. — *Willd. Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1993. n° 64.

Senecio tomentosus, foliis pinnatis, pinnis subrotundatis, umbellâ globosâ. Hall. *Helv.* n° 61.

Jacobaea pumila, absinthii melliferi foliis incanis, floribus velut in umbellâ positis. Pluken. *Almag.* pag. 194. tab. 39. fig. 6.

Chrysanthemum alpinum, incanum; foliis laciniatis. C. Bauh. *Pin.* 134.

Jacobaea alpina, incana, minor. Byrr. *Icon. Rar.* 262. — *Boccon. Mus.* 2. pag. 20. tab. 8.

Absinthium alpinum, umbelliferum, tenuifolium & minus. C. Bauh. *Pin.* 140.

Jacobaea alpina, absinthii folio, humilior. Tournef. *Inst. R. Herb.* 486.

Vulgairement génipi jaune.

3. *Senecio foliis incanis, bipinnatifidis; caulibus altioribus*. Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1993.

Cette espèce est remarquable par ses tiges peu élevées, par les feuilles pinnatifides, tomenteuses, très-blanches, & par ses fleurs disposées en un corymbe serré.

Ses racines épaisses, chargées d'un grand nom-

bre de fibres droites, allongées, filiformes : elles produisent une ou plusieurs tiges droites, hautes de deux à quatre poices, presque simples, cylindriques, tomentueuses, très-blanches. Les feuilles inférieures ou radicales sont oblongues, blanches & tomentueuses à leurs deux faces, quelquefois un peu verdâtres à leur face supérieure, médiocrement pétiolées, pinnatifides ; les découpures linéaires, courtes, obtuses, quelquefois légèrement dentées à leurs bords ; elles sont un peu plus fines & plus aiguës aux feuilles caulinaires supérieures.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe serré, un peu globuleux, dont les pédoncules sont inégaux, presque simples, courts, alternes, très-cotonneux. Les calices sont courts, velus, tomentueux, composés de folioles droites, linéaires, scarieuses & noirâtres à leur sommet. La corolle est jaune, médiocre, radiée, un peu plus longue que le calice. La plante β , citée par Willdenow, diffère de la précédente par ses tiges beaucoup plus hautes, & par ses feuilles deux fois ailes.

Cette plante croît sur les Alpes, en Suisse, en Autriche, dans les Pyrénées, & dans les départements méridionaux de la France. La variété β se rencontre dans les Alpes maritimes de l'Italie. γ (V. f.)

61. SENEÇON de la Carniole. *Senecio carniolicus*, Willd.

Senecio corollis radiantibus ; foliis lanceolatis, subpinnatifidis, subtus incanis ; corymba cœruleo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1993. n°. 65.

Senecio incanus, Scop. Carn. edit. 2. n°. 1071.

Chrysanthemum alpinum, jundenbergense, jacobea affine. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1058. Icon.

Chrysanthemum alpinum, pinum, Clus. Hist. 1. pag. 333.

Willdenow a cru devoir distinguer cette plante du *Senecio incanus*, malgré les rapports nombreux qui existent entre ces deux plantes, & que la plupart des autres botanistes avoient ou réunis ou confondus. Les principales différences consistent dans les feuilles moins divisées, blanches seulement à leur face inférieure, vertes en dessus ; dans les calices pubescents, & beaucoup plus scarieux à leur sommet.

Ses tiges d'ailleurs sont basses ; ses feuilles lancéolées, dentées ou pinnatifides, blanches & pubescentes en dessous, les plus jeunes entièrement blanches ; les feuilles caulinaires lancéolées, légèrement dentées, rarement pinnatifides ; les fleurs disposées en un corymbe serré. Elle varie par ses feuilles toutes entières, dentées, point pinnatifides.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Carniole ; elle ne paroît devoir être réunie avec le *Senecio incanus*. Je ne l'ai présentée ici séparément que parce qu'elle ne m'est point connue ; cependant, parmi des échantillons recueillis sur les Alpes, j'en possède qui approchent de cette dernière espèce. γ

62. SENEÇON à petites fleurs. *Senecio parviflorus*.

Senecio corollis radiantibus ; calice parum longioribus ; foliis utrinque tomentosis, niveis, pinnatifidis ; laciniis oblongis, densatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1994. n°. 66.

Senecio parviflorus, Allion. Flor. pedem. 1°. 727. tab. 38. fig. 3.

Cette espèce, très-rapprochée du *Senecio incanus*, & que Haller regarde comme une variété, en est distinguée, d'après Allioni, par ses fleurs plus petites, & par la forme un peu différente de ses feuilles.

Ses tiges sont très-peu élevées, droites, simples, blanches, pubescentes, feuillées. Les feuilles sont alternes, presque sessiles, oblongues, pinnatifides, tomentueuses & d'un blanc de neige à leurs deux faces, à découpures oblongues, dentées. Les fleurs sont jaunes, petites, radiées, un peu plus longues que le calice, à demi-fleurons ouverts, point roulés à leur sommet.

Cette plante croît sur les montagnes alpines du Piémont. γ

63. SENEÇON doré. *Senecio aureus*, Linn.

Senecio corollis radiantibus ; foliis radicalibus ovatis, cordatis, serratis, petiolatis ; caulinis pinnatifidis, dentatis ; laciniis terminali lanceolatis ; pedunculis incrassatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1998. n°. 79.

Senecio corollis radiantibus, foliis crenatis ; infimis cordatis, petiolatis ; superioribus pinnatifidis, lyratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1220. — Mill. Dict. n°. 3. — Gronov. Virg. 126.

Senecio (aureus), caule simplicissimo, ramatè oligophyllo ; foliis denticulatis ; radicalibus cordatis, rotundato-obtusis ; caulinis petiolo pinnatifidis, corymbo pedunculis unifloris subumbellatis. Michaux, Flor. borcal. Amer. vol. 2. pag. 120.

Jacobaea virginiana, foliis imis alacris glabris, caulescentibus barbata. Motif. Oxon. Hist. 3. pag. 110. — Rai, Suppl. 180.

Ses tiges sont droites, cylindriques, simples, hautes d'environ deux pieds ; les feuilles radicales pétiolées, ovales, émarginées en cœur à leur base, un peu arrondies, de couleur pourpre à leur face inférieure, supportées par des pétioles allongés, velus, longs d'environ un pouce & demi ; les

feuilles caulinaires alternes, pinnatifides; les pinules dentées, un peu inégales; la terminale lanceolée.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en un corymbe étalé, presque ombellé; soutenues par des pédoncules allongés, presque filiformes, simples, épaissis à leur partie inférieure, un peu velus, ordinairement unilatéraux. La corolle est radiale, de couleur jaune; les filets du centre tous hermaphrodites; les demi-fleurons de la circonférence femelles ouverts, point réfléchis; les femelles petites, couronnées par une aigrette simple, sessile, velue.

Cette plante croît dans la Virginie & au Canada, dans les lieux humides & ombragés. (V. f.)

64. SENEÇON balsamite. *Senecio balsamita*. Willd.

Senecio corollis radiantibus; foliis radicalibus oblongis, serratis, petiolatis; caulinis pinnatis, lyris, serratis; floribus umbellatis, caule basi villosulo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1998. n° 30.

Senecio balsamita. Mülh. in Lit.

Cette plante a des rapports avec le *senecio aureus*; elle en diffère par la forme de ses feuilles, par ses pédoncules point velus ni réfléchis à leur sommet.

Ses tiges sont droites, velues à leur partie inférieure, hautes d'un demi-pied ou d'un pied; les feuilles radicales pétiolées, oblongues, entières, dentées en icie à leurs bords, obtuses à leur sommet, longues d'un pouce, plus courtes que les pétioles; les feuilles caulinaires alternes; les inférieures ailées ou en forme de lyre; les découpures lanceolées, très-courtes, dentées en icie; la découpeure terminale beaucoup plus grande, oblongue; les feuilles supérieures pinnatis & dentées.

Les fleurs sont presque disposées en ombelle à l'extrémité des tiges, supportées par des pédoncules très-longs, égaux. Les corolles sont radiales; les demi-fleurons de la circonférence ouverts, point réfléchis.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique. (V. f.)

65. SENEÇON ovale. *Senecio obovatus*. Willd.

Senecio corollis radiantibus; foliis radicalibus obovatis, serratis, petiolatis; caulinis pinnatis, dentatis; floribus umbellatis, caule glabresculo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1999. n° 81.

Senecio obovatus. Mülh. in Lit.

Cette espèce diffère, par la forme de ses feuilles radicales en ovale renversé, du *senecio balsamita*.

Ses tiges sont droites, presqu'égales, pubescentes à leur partie supérieure, garnies de feuilles alternes; les radicales pétiolées, longues d'un demi-pouce ou d'un pouce, ovales, dentées en icie à leur contour; les dentelures obtuses; les pétioles plus longs que les feuilles; ce les des tiges pinnatifides & dentées; les fleurs filiformes en une ombelle terminale; les pédoncules un peu épaissis.

Cette plante se rencontre dans les contrées septentrionales de l'Amérique. (V. f.)

Observations. Cette espèce, ainsi que le *senecio balsamita*, que j'ai présentée ici d'après Willdenow, paroissent offrir trop peu de différences pour être séparées comme espèces du *senecio aureus*. Elles n'en sont bien distinguées que par la forme de leurs feuilles inférieures, qui peuvent bien être susceptibles de quelques variétés. Elles sont d'ailleurs toutes trois originaires des mêmes contrées.

66. SENEÇON printannier. *Senecio vernalis*. Willd.

Senecio corollis radiantibus; foliis amplexicaulibus, pinnatifidis, hirsutis, crispato-dentatis; caule lanato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1988. n° 53.

Senecio corollis radiantibus, radiis potentibus; foliis pinnatis, hirsutis, crispis, cauleque piloso-lanatis. Walldt. & Ktze. Plant. rar. Hungar. 1. pag. 23. tab. 24.

Ses tiges sont droites, cylindriques, revêtues d'un duvet blancâtre, lanugineux; garnies de feuilles alternes, amplexicaules, assez semblables, par leur forme, à celles du *senecio communis*; oblongues, pinnatifides, crépues & dentées à leurs bords, chargées de poils blanchâtres. Les fleurs sont radiales, composées, à leur circonférence, de demi-fleurons ouverts, point roulés, femelles, & dans leur centre de fleurons hermaphrodites.

Cette plante croît en Hongrie, dans les terrains stériles & les décombres. (V. f.)

67. SENEÇON des montagnes. *Senecio montanus*. Willd.

Senecio corollis radiantibus; foliis amplexicaulibus, lyrato-pinnatifidis, serratis, planis, cauleque glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1989. n° 54.

Senecio paradoxus. Hoppe.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *senecio vernalis*, dont elle ne paroît être qu'une variété. Elle en diffère par ses feuilles en lyre, pinnatifides, planes, plus jeunes ordinairement pubescentes. Ses tiges sont glabres; les fleurs radiales, quelquefois composées uniquement de fleurons.

Cette plante croît sur les montagnes, aux environs de Salsbourg. ☉

68. SENEÇON à feuilles en lyre. *Senecio lyrotus*. Linn.

Senecio pilosus, corollis radiantibus; foliis infimis lyrotis, dentatis; supremis lyrotis, amplexicaulis; lobis marginis mucronatis. Linn. f. Suppl. pag. 369. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1988. n.° 5c.

Senecio foliis infimis lyrotis; supremis sinuato-dentatis, villosis; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Cette espèce, d'après Linné fils, est une de celles dont les tiges sont les plus élevées. Elles sont rameuses, garnies de feuilles alternes; les inférieures en forme de lyre, dentées à leurs bords; les supérieures profondément sinuées, presque pinnatifides, amplexicaules, velues; les lobes arrondis, & armés de petites pointes à leurs bords. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale; la corolle composée, à sa circonférence, de demi-fleurs ouverts, point roulés à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

69. SENEÇON denté. *Senecio dentatus*. Jacq.

Senecio corollis radiantibus; foliis semiamplexicaulis, pinnatifidis; laciniis linearibus, acutis, dentatis, distantibus; pedunculis elongatis; caule erecto, diffuso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1989. n.° 56.

Senecio dentatus. Jacq. Collect. vol. 5. pag. 150. tab. 6. fig. 2.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes d'un pied & demi ou deux pieds, striées, parfaitement glabres, divisées en rameaux diffus, garnies de feuilles alternes, à demi-amplexicaules, profondément pinnatifides, longues d'environ deux pouces; les découpures étroites, linéaires, dentées à leurs bords, aiguës, écartées les unes des autres, glabres à leurs deux faces, mais un peu velues en dessous sur leurs principales nervures; les découpures des feuilles supérieures sont ordinairement entières à leurs bords.

Les fleurs sont peu nombreuses, situées à l'extrémité des rameaux, disposées en une sorte de corymbe lâche, au nombre d'environ six ou sept; soutenues par des pédoncules simples, allongés. Les calices sont cylindriques, composés de folioles étroites, linéaires, presque aiguës. La corolle est jaune, radiale, de la grandeur de celle du *Senecio jacobaea*; les demi-fleurs ouverts, point roulés.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. ☿ ?

70. SENEÇON des rochers. *Senecio rupestris*.

Senecio corollis radiantibus; foliis amplexicaulis, pinnatifidis, supra glabris; laciniis angulatis, dentatis; caule caliciformi, globeris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1989. n.° 55.

Senecio corollis radiantibus; foliis supra subnudis, pinnatifidis; laciniis angulatis, lobatis, dentatis; caulibus erectis, calicibus nudis. Walld. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. vol. 2. pag. 136. tab. 128.

Cette plante a des racines vivaces & fibreuses; elles produisent une tige droite, cylindrique, striée, parfaitement glabre, haute de six à sept pouces, garnie de feuilles alternes, presque amplexicaules, pinnatifides, glabres, particulièrement à leur face supérieure; leurs découpures divisées en lobes anguleux, dentés.

Les fleurs sont disposées en corymbe, à l'extrémité des tiges, supportées par des pédoncules allongés, presque simples. Les calices sont glabres, cylindriques, composés de folioles droites, égales, un peu aiguës, scarifiées à leur sommet, enveloppées à leur base par quelques autres folioles ouvertes, subulées. La corolle ressemble à celle du *Senecio jacobaea*. Elle est de couleur jaune, radiale; les demi-fleurs ouverts, point roulés à leur sommet; les filons hermaphrodites, fertiles; les semences surmontées d'une aigrette simple, sessile, le réceptacle nu.

Cette plante croît dans la Hongrie & la Croatie, sur les rochers & dans les sols sablonneux. ☿

71. SENEÇON rongé. *Senecio erosus*. Linn. f.

Senecio corollis radiantibus; foliis radicalibus petiolatis, oblongis, sinuatis, serratis, villosis; caule unifloro, subnudo. Linn. f. Suppl. pag. 370. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1992. n.° 62.

Senecio foliis radicalibus sinuato-erosis, dentato-villosis; floribus solitariis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Ses tiges sont droites, simples, uniflores, très-souvent dépourvues de feuilles, ou munies seulement de quelques feuilles alternes, amplexicaules. Les feuilles radicales sont pétiolées, allongées, sinuées; les lobes dentées en scie à leur contour, velues; la base des tiges & celle des feuilles enveloppées d'un duvet tomenteux. Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des tiges, radiales; les demi-fleurs point roulés.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. ☿

72. SENEÇON brillant. *Senecio speciosus*. Willd.

Senecio corollis radiantibus; caule simpliciter, subnudo; foliis radicalibus petiolatis, oblongis, dentatis, ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1991. n.° 61.

Senecio pseudo-china. Andrewf. Reposit. Bot. 5. pag. 291. tab. 291.

Cette espèce est remarquable par la beauté & la grandeur de ses fleurs, d'une belle couleur purpurine. Ses racines sont épaisses & tubéreuses; il s'en élève des tiges hautes d'un demi-pied, cylindriques, striées, ordinairement dépourvues de feuilles, ou munies quelquefois de deux feuilles sessiles, longues d'un pouce, lancéolées, garnies à leurs bords de quelques dents écartées. Les feuilles radicales sont pétioles, allongées, inégalement dentées à leurs bords, pileuses, purpures à leur face inférieure, ciliées à leur contour, longues d'environ trois pouces.

Les fleurs sont peu nombreuses, situées à l'extrémité des tiges, au nombre de trois ou quatre, supportées par des pédoncules simples, alternes, munis dans leur longueur de quelques folioles courtes. La corolle est fort grande, de couleur purpurine, radiée; les demi-fleurons ouverts, planes, point réfléchis, & ne contiennent que des pistils. Les fleurons sont tous hermaphrodites & fertiles; les femences couronnées d'aigrettes sessiles, blanchâtres.

Cette plante croît dans la Chine. 2

73. SENEÇON des Alpes, *Senecio alpinus*. Linn. f.

Senecio corollis radiantibus; foliis cordatis, lyratis, grosse serratis; petiolis auritis. Linn. f. Suppl. pag. 371.

Jacobaea alpina, latiniata; flore huphtalmi. C. Bauh. Pin. 131.

Jacobaea tertia, latifolia, prima. Clus. Hist. 2. pag. 23.

Cineraria (alpina), floribus corymboseis, foliis pinnatis; pinnis terminali maximis, cordatis, incisodentatis; lateralibus cuneatis, apice dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2084. n°. 40.

Cineraria cordifolia, auriculata. Jacquin. Austr. tab. 177.

Cineraria alpina, var. 2. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1243.

Cette espèce a des tiges droites, herbacées, striées, anguleuses ou légèrement cylindriques, simples, hautes au moins de deux pieds, rameuses à leur partie supérieure; les rameaux réunis en une sorte de corymbe. Les feuilles sont pétioles, alternes, distantes, échancrées en cœur à leur base, glabres à leur face supérieure, veinées & blanchâtres en dessous; les feuilles supérieures ovales, découpées en lyre ou pinnatifides; la pinnule terminale très-grande, en cœur, incisée & dentée à ses bords; les latérales cunéiformes, dentées seulement vers leur sommet; les dentelures grosses, obtuses, en scie; les pétioles de la longueur

des feuilles, munis dans leur milieu de dents foliacées, au nombre de deux ou quatre, comme dans les feuilles de *Crysinum barbarea*.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires ou terminaux, solitaires; soutenues par de très-longs pédoncules munis de bractées en forme d'écaillés, fort petites, tubuleuses. Le calice est cylindrique, composé d'écaillés parallèles, droites, égales, scarieuses à leur sommet, garnies en dessous d'un second calice formé de petites folioles serrées & scarieuses à leur pointe. La corolle est radiée, de couleur jaune, assez semblable à celle du *Senecio jacobaea*, mais un peu plus grande. Les femences sont petites, surmontées d'une aigrette simple, blanchâtre, sessile.

Cette plante se rencontre dans les Alpes, en Suisse, en Autriche, dans la Suède. 2

Plusieurs auteurs ont rangé cette plante parmi les cinéraires. Il est évident qu'elle doit être placée parmi les seneçons, ayant un calice caliculé, & les folioles calicinales scarieuses à leur sommet. L'absence de ces caractères, ou du moins du premier, est la seule différence qui existe entre les cinéraires & les seneçons.

74. SENEÇON ombellé. *Senecio umbellatus*. Linn.

Senecio corollis radiantibus, linearibus; foliis pinnatis denticulatis; laciniiis distantibus. Linn. Syst. Plant. pag. 758. n°. 36. — Mantiff. 470. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1999. n°. 82.

Senecio corollis radiantibus, calice longioribus; foliis pinnatis-dentatis, denticulatis; laciniiis distantibus. Linn. Amoen. Acad. vol. 6. Afric. 64. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1220.

Senecio (filifolius), corollis radiantibus; foliis glabris, linearis-subulatis, longissimis, subdecurrentibus; superioribus basi dentatis; floribus paniculatis. Berg. Plant. Capen. pag. 278. n°. 3.

Jacobaea aethiopica; angustifolia & prolongis foliis, rariis crenatis, ad imo caule ad summum usque confertis. Pluken. Mantiff. pag. 107. tab. 421. fig. 5. ? *Medioeris*.

Jacobaea africana, folio capillateo, viridi. Herm. Afric. 14.

Ses tiges sont presque ligneuses, glabres, cylindriques, hautes de deux pieds, striées, rameuses, garnies de feuilles alternes, assez nombreuses, rapprochées, sessiles, ouvertes, redressées, un peu décurrentes, linéaires, subulées, un peu charnues, glabres à leurs deux faces, longues de trois poncees & plus, presque pinnatifides, ou denticulées; les découpures distantes, aiguës; les feuilles supérieures plus écartées, dentées à leur base, sessiles, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en un corymbe termi-

nal, paniculé, presque ombellé; les pédoncules rameux; les rameaux alternes, insensiblement plus courts, très-glabres, munis de petites folioles tubuleuses, finies à la base & le long des pédoncules communs. Le calice est oblong, cylindrique, tronqué, composé de plusieurs folioles linéaires, aiguës, parallèles, converges en dehors, planes & concaves en dedans, garnies à leur base de petites écailles courtes, un peu lâches, presque imbriquées. La corolle est radiale, de couleur jaune, plus longue que le calice; les demi-fleurs de la circonférence femelles, de couleur purpurine, filiformes, tubuleuses, de la longueur du calice; leur languette linéaire, lancéolée, ouverte, obtuse, à quatre nervures, à peine réfléchies; les filaments du centre hermaphrodites, tubuleux, divisés en cinq dents à leur sommet; l'ovaire ovale, oblong, scarifié; comprimé, couronné, seulement dans les fleurs hermaphrodites, d'une aigrette filanche, simple, filiforme, pileuse, de la longueur des corolles; le réceptacle nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ?

75. SENEÇON appendiculé. *Senecio appendiculatus*.

Senecio corollis radiatis; foliis lanceolatis, lyrato-pinnatis, acutatis, nudis; pappiis auritis. Vahl.

Senecio auriculatus. Vahl. Symb. vol. 1. p. 72. tab. 118. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1958. n° 78.

Senecio (lyratus), corollis radiatis; paniculâ corymbosâ, terminali; foliis lanceolatis, lyratis, amplexicaulis, denticulatis. Forsk. Flor. ægypt. arab. pag. 418. n° 77.

Ses tiges sont droites, cylindriques, striées, velues, rameuses, diffusées, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, découpées en lyre, longues d'environ deux pouces, sur six à huit lignes de large; les pinules inégales, alternes ou opposées, entières, dentées à leurs bords; les pétioles munis à leur base de deux appendices ou oreillettes opposées, reniformes, amplexicaules, dentées.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges, en un corymbe paniculé, dont les pédoncules sont rameux, garnis de plusieurs petites folioles éparfes, filiformes, aiguës. Le calice, un peu renflé à sa base, est cylindrique, composé de folioles droites, épaisses, sillonnées dans leur milieu, aiguës, point scarieuses à leur sommet, munies à leur base de petites folioles un peu lâches. La corolle est radiale; les demi-fleurs de la circonférence peu nombreux, ouverts, point réfléchis.

Cette plante croît sur les montagnes, dans l'Arabie heureuse.

76. SENEÇON grêle. *Senecio pauciflorus*. Mich.

Senecio corollis radiatis; radiis minimis; foliis lanceolatis, subin-ciso-dentatis integerrimis; corymbo paucifloro; caule simplici, subnudo. (N.)

Senecio pumilus, caule simplicissimo, rigidi erecto, subnudo; foliis omnibus lanceolatis, nonnullis radicalibus subin-ægris, cæteris rariè in-ciso-dentatis serratis; corymbo paucifloro, calicibus glabellis, radiis parvis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 120.

Cette espèce a des tiges très-simples, roides, droites, cylindriques, presque nues; les folioles, en partie radicales, sont toutes lancéolées; les autres entières; les autres, particulièrement celles des tiges, médiocrement incisées, dentées en scie. Les fleurs sont peu nombreuses, de la grandeur de celles du *Senecio jacobæ*, disposées en corymbe à l'extrémité des tiges. Leurs calices sont glabres; les demi-fleurs de la circonférence sont petites.

Cette plante a été découverte par Michaux dans le Canada, sur le bord des lacs. (Descript. ex Mich.)

77. SENEÇON glabre. *Senecio glabellus*.

Senecio corollis radiatis; foliis pinnatifido-lyratis; foliis distantibus, retro-angulosis; corymbo composito; pappiis subumbellatis; caule simplici, glabello. (N.)

Senecio (lanceus), annuus, glabellus, simplex; foliis pinnatifido-lyratis; foliis distantibus, retro-angulosis, vel obsolete dentatis; corymbo composito, pappiis subumbellatis; floribus multiradiatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 120.

Cette plante est glabre dans toutes les parties; ses tiges sont droites, simples, cylindriques, garnies de feuilles alternes, presque en forme de lyre, pinnatifides; les lobes écartés emeux, un peu arrondis, finies, anguleux, ou bien divisés en dents émoussées. Les filaments sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe composé. Les pédoncules sont aponés, & se divisent vers leur sommet en rameaux presque en ombelle. Les corolles sont radiales.

Cette espèce a été observée par Michaux dans les forêts de la Caroline. (Descript. ex Mich.)

*** Fleurs radiales; demi-fleurs égales; feuilles entières.

78. SENEÇON à feuilles de lin. *Senecio linifolius*.

Senecio corollis radiatis; foliis linearibus, integerrimis; corymbo subsquamato, caule herbaceo. Linn. Spec. Plant. 1220. — Pallas, Iter. vol. 1.

pag. 371. — Wild. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1999. n° 83.

Solidago foliis linearibus, integerrimis; corymbo simpliciter. Hort. Cliff. 410.

Senecio (linifolius), calice basi incrassato, subcylindrico proaeo obovato; squamis calicinis vix apice sphaeculatis. Foisikh. Flor. ægypt.-arab. pag. 150. n° 80.

Linaria aurea affinis. C. Bauh. Pin. 213. — Idem, Prodr. 107.

Jacobaea linifolia, hispanica & italica. Boccon. Mus. 2. pag. 60. tab. 49. — Bartel. Icon. Rar. p. 97. n° 1083. tab. 802.

Cette plante pousse des tiges droites, herbacées, hautes d'environ un pied, cylindriques, striées, à peine pubescentes, divisées en rameaux alternes, presque simples, nombreux, garnis de feuilles alternes, sessiles, un peu fasciculées dans les aisselles, linéaires, allongées, très-entières, aiguës, longues d'un pouce & plus, un peu épaissies, médiocrement hispides & un peu pubescentes ou blanchâtres surtout à leur face inférieure & dans leur jeunesse.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, presque ombellé, supportées par des pédoncules droits, cylindriques, à peine rameux, munis de quelques folioles éparées, très-petites, aiguës. Le calice est cylindrique, composé de folioles très-étroites, égales, un peu aiguës, presque point scarieuses à leur sommet, un peu renflées & canaliculées à leur base. La corolle est jaune, radiée; les demi-fleurs planes, ouverts; leur languette linéaire, obtuse, presque entière à son sommet.

Cette plante croît en Italie, en Espagne & dans la Russie. (V. f.)

79. SENEÇON à feuilles de genévrier. *Senecio juniperifolius*. Linn. f.

Senecio corollis radiantibus; foliis lanceolato-subulatis, subius tomentosis; caule fruticoso. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2000. n° 84.

Senecio fruticosus, foliis subulatis. Linn. f. Suppl. pag. 37.

Senecio foliis lanceolatis, integris, subius tomentosis; panicula terminali. Thunb. Prodr. pag. 157.

C'est un petit arbrisseau d'environ un pied & demi de haut, dont les tiges se divisent en rameaux cylindriques, lisses, garnis de feuilles éparées, alternes, sessiles, médiocrement élargies, subulées, à demi-amplexicaules, mucronées à leur sommet, roulées à leurs bords, lisses à leur face supérieure, tomenteuses en dessous, longues d'un pouce, assez semblables à celles du genévrier commun.

Les fleurs sont réunies en une sorte de panicule ou de corymbe terminal, supportées par des pédoncules allongés, terminés à leur sommet par quatre ou cinq fleurs dont les pédoncules propres sont courts, inégaux, divariqués. La corolle est radiée, de couleur jaune; les demi-fleurs de la circonférence très-nuets.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V.)

80. SENEÇON à feuilles de romarin. *Senecio rosmarinifolius*. Linn. f.

Senecio corollis radiantibus; foliis lanceolato-linearibus, subintegerrimis, glaurescens; corymbo coarctato terminali, pedunculato; caule fruticoso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2000. n° 83.

Senecio corollis radiantibus; foliis linearibus, marginibus revolutis; caule fruticoso. Linn. f. Suppl. pag. 369. — Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 387. — Idem, Collect. vol. 1. pag. 135.

Senecio foliis ellipticis, glabris, summis subius tomentosis; floribus paniculatis, caule fruticoso. Thunb. Prodr. pag. 157.

Arbrisseau dont les tiges sont dures, cylindriques, glabres, rameuses; les rameaux alternes, un peu diffus, garnis de feuilles alternes, sessiles, étroites, linéaires, lancéolées, presque glabres à leurs deux faces; chargées en dessous de quelques poils rares lorsqu'elles sont vues à la loupe, un peu blanchâtres dans leur jeunesse, très-entières à leurs bords; les feuilles inférieures munies la plupart de chaque côté de deux ou trois dents obtuses, & en scie vers leur partie supérieure.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, un corymbe paniculé, serré, porté sur des pédoncules inégaux, médiocrement rameux. Les corolles sont radiées, les demi-fleurs planes, ouverts; les semences petites, surmontées d'une aigrette simple, pileuse, sessile.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

81. SENEÇON à feuilles rudes. *Senecio asper*. Aiton.

Senecio corollis radiantibus; foliis lanceolato-linearibus, dentatis, rigidis, scabris; corymbo terminalibus axillaribusque, pedunculatis; caule fruticoso. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2000. n° 86.

Senecio (crinitus), foliis lanceolatis, glabris, integris, dentatisque; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 157. ?

Senecio (asper), corollis radiantibus; foliis lanceolato-linearibus, dentatis, rigidis; calicibus sublanuginosis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 196.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *Senecio rosmarinifolius* ; elle en diffère principalement par le caractère de ses feuilles rudes, plus profondément dentées. Elle paroît aussi devoir se rapporter à la plante que Thunberg a nommée *Senecio cristatus*.

C'est, d'après Willdenow, un arbrisseau dont les tiges sont droites, hautes de plus de deux pieds, divisées en rameaux striés, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, linéaires, lancéolées, profondément dentées à leurs bords, rarement entières, très-roides, rudes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, pileuses sur leur principale nervure, longues d'un pouce & demi ou deux pouces ; les fleurs forment un corymbe serré, pédonculé, situé vers l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

81. SENEÇON à feuilles toides. *Senecio rigescens*. Jacq.

Senecio corollis radionibus ; foliis lanceolato-linearibus, subinermis, glaucis, argutis denticulatis integerrimis ; corymbo coarctato, terminali ; caule fruticoso. Willden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 2001. n°. 89.

Senecio rigescens. Jacq. Colle&. 5. pag. 150. tab. 6. fig. 1.

Cette plante paroît, par les rapports, tenir le milieu entre le *Senecio rosmarinifolius* & le *Senecio asper*, & se lie tellement à ces deux espèces, que toutes trois pourroient passer pour variétés de la même.

Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques, divisées en rameaux striés, garnis de feuilles alternes, sessiles, linéaires-lancéolées, de couleur glauque, munies en dessous d'un duvet légèrement tomenteux, longues à peine d'un pouce ; les inférieures entières, les supérieures finement denticulées. Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, serré, à la corolle radiée.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. h

83. SENEÇON en croix. *Senecio cruciatus*. Linn. f.

Senecio corollis radiatibus ; foliis linearibus, subtus tomentosis, inferioribus cruciatis, superioribus integris. Linn. f. Suppl. 371. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 2001.

Senecio foliis linearibus, subtus tomentosis, inferioribus unidentatis ; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 157.

Cette espèce est remarquable, particulièrement par la forme de ses feuilles, qui sont alternes, li-

néaires, toides, mucronées à leur sommet, glabres à leur face inférieure, tomentueuses en dessous ; les inférieures à demi-dentées de chaque côté vers leur partie supérieure ; les dentelures égales au sommet, tellement que les deux dentelures forment avec lui une sorte de croix : les feuilles supérieures sont ordinairement en croix. Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, disposées en panicule ; la corolle radiée ; les demi-fleurs ouverts.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

84. SENEÇON tomenteux. *Senecio tomentosus*. Michaux.

Senecio totus incono-tomentosus, caule simplicis ; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, subintegris ; corymbo subumbellato, radiis parvis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 2, pag. 119.

Cette plante a, dans son port, beaucoup d'affinité avec le *cinerario integrifolius* de Jacquin. Ses tiges sont droites, cylindriques, très-simples, tomenteuses, blanchâtres, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, presque entières, revêtues d'un duvet blanchâtre & tomenteux. Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, presque ombellé. La corolle est radiée ; les demi-fleurs sont petits.

Cette plante a été découverte dans la Caroline par Michaux, dans le lieu nommé Flat-Roe.

85. SENEÇON de l'Yemen. *Senecio hadiensis*.

Senecio corollis radionibus, quinque radiatis ; foliis ellipticis, petiolatis, integerrimis, denticulatisque ; caule fruticoso. Vahl, Symbol. 1. pag. 73. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 2002. n°. 92.

Senecio foliis lanceolato-ovatis, crassis, globosis, denticulatis ; paniculato corymbosa. Forskhal, Flot. ægypt.-arab. pag. 149. n°. 79. Icon. tab. 19.

Arbrisseau dont les tiges sont glabres, diffusées, hautes d'environ quatre pieds, dont l'écorce est filandreuse ; les rameaux alternes, faibles, droits, garnis de feuilles pétiolées, alternes, elliptiques ou ovales-lancéolées, entièrement glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, longues d'environ trois pouces, quelquefois un peu denticulées ; les dents rares, fort petites, écartées, supportées par des pétioles plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe assez ample ; supportées par des pédoncules, les uns simples, d'autres rameux à leur sommet, munis à la base des divisions de quelques bractées linéaires, presque filiformes. Le calice est cylindrique, de couleur brune, composé de folioles droites, égales, aiguës, calleuses à leur sommet ; enveloppé d'un second petit calice à huit

huit dents très-courtes, & de quelques petites écailles à sa base. La corolle est jaune, radiale; la circonférence formée par cinq demi-fleurs femelles, fertiles, dont la languette est oblongue, un peu réfléchie, échancrée à son sommet; les fleurs tubulés, hermaphrodites, à cinq dents. Les semences sont petites, linéaires, pileuses, surmontées d'une aigrette filiforme.

Cette plante croît sur les montagnes de l'Arabie heureuse. h

86. SENEÇON des marais. *Senecio paludosus*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis semiamplexicaulis, lanceolatis, argutis serratis, subius subvillosis; corymbo terminali, divaricato; caule striato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2002. n°. 91.

Senecio corollis radiantibus; foliis ensiformibus, acutis serratis, subius subvillosis; caule striato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1220. — Flor. luc. edit. 2. n°. 752. — Mill. Dict. n°. 7. — Pollich. Palat. n°. 798. — Oeder. Flor. dan. tab. 385. — Hofm. Germ. 295. — Roth. Germ. vol. I. pag. 364. — H. pag. 342. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 129. n°. 117.

Senecio foliis linearibus, serratis; floribus umbellatis. Hall. Herb. n°. 66.

Senecio foliis subensiformibus, serratis, subius incanis, florum radio subrevolutis. Necker, Gallob. pag. 353.

Senecio foliis integris, serratis. Guett. Stamp. vol. 2. pag. 559. — Iter Scan. pag. 396.

Solidago caule simplici, corymbo terminali, foliis subius tomentosis, flosculis feminis sexdecim. Lech. 68. — Flor. sac. n°. 686.

Jacobaea foliis longis, integris & mucronatis. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 110. 5. 7. tab. 19. fig. 22.

Conyza palustris, serratifolia. C. Bauh. Pin. 266.

Consolida palustris. Tabern. Icon. 555.

Lingua major. Dalech. Hist. t. pag. 1037. fig. 2.

Jacobaea palustris, altissima, foliis serratis. Tourn. Inst. R. Herb. 485.

Virga aurea, flos solidagini angustifolia effinis; & lingua avis Dalechampii. J. Bauh. Hist. 2. p. 1063. Icon.

Conyza aquatica, maxima, serrato folio. Thal. Haregn. 1. t. 1c. 3.

Solidago palustris, altissimo, incana & tomentosa; foliis longioribus, serratis. Amman. Ruth. 220. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 161.

Jacobaea pyrenaica, persica folio. Tourn. Inst. R. Herb. pag. 486.

Doronicum pyrenaicum, persica folio, glabrum. Schol. Bot.

Botanique. Tome VII.

Senecio paludosus, var. β . Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 129. n°. 117.

Senecio nemorensis, var. α . Gouan, Illustr. 68.

Senecio persicaefolius. Ramond, Bul. Philom. n°. 43. pag. 146. tab. 11.

C'est une grande plante, dont les tiges sont droites, simples, hautes de quatre à cinq pieds, un peu fistuleuses, cy-indriques, verticillées, fortement striées, légèrement lanugineuses, surtout à leur partie supérieure; garnies de feuil les alternes, presque opposées, sessiles, à demi-amplexicaules, alongées, lancéolées, étroites, vertes à leur face supérieure, d'un vert plus pâle en dessous, légèrement pubescentes, surtout dans leur jeunesse; dentées en scie à leurs bords; les dents courtes, écartées, longues de quatre à cinq pouces, larges d'un à deux au plus, aiguës à leur sommet, nombreuses & rapprochées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe feuillé, & dont les pédoncules inférieurs sont situés dans l'aisselle des feuil les supérieurs, presque simples, revêtus d'un duvet blanchâtre, tomenteux; les pédoncules terminaux rameux; les ramifications courtes, inégales, épaissies, un peu ferrées, munies à leur base de petites folioles blanchâtres, sétacées. Le calice est cylindrique, un peu globuleux, presque glabre, composé de folioles droites, planes, elliptiques, aiguës, un peu membraneuses à leurs bords, à peine scarifiées à leur sommet. La corolle est jaune, radiale; les demi-fleurs quelques-unes un peu réfléchies. Les semences petites, surmontées d'une aigrette simple, sessile, blanchâtre.

La plante β , qu'on rencontre dans la Sibirie, ne diffère de la précédente que par ses feuilles blanchâtres & tomenteuses à leurs deux faces: ses tiges s'élèvent très-haut.

La plante γ , regardée comme variété par quelques auteurs, comme espèce par d'autres, paraît offrir des caractères suffisants pour la séparer du *senecio paludosus*. Ses fleurs sont d'un jaune-orange, & approchent de celles du *senecio doronicum*. Toute la plante est glabre; les tiges simples, terminées par des fleurs peu nombreuses, de six à huit, pédonculeuses. Les feuilles sont oblongues, épaissies, rétrécies à leurs deux extrémités, à de nombreuses distances, presque droites; les feuilles inférieures pétioles, ovales, obtuses, & perissent avant la floraison.

Cette plante croît en Europe, dans les marais, sur le bord des rivières & des étangs; la plante β en Sibirie, & celle γ dans les Pyrénées. γ (V. v.)

87. SENEÇON des bois. *Senecio nemorensis*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis ovato-lanceolatis,

ferratis, margine ciliatis, subius tenuissimè pubescentibus, s. fissilibus, basi inaequalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2003. n°. 93.

Senecio corollis radiantibus, oëonis; foliis lanceolatis, biferratis, subius villosis; caule ramoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1221. — Goulin, Monsp. pag. 441. — Jacq. Observ. Bot. vol. 1. pag. 15. tab. 61. 66. — Idem, Flor. austr. tab. 184. — Pollich. Pal. n°. 799. — Hoffm. Germ. 295. — Rorh. Germ. vol. 1. pag. 364. — Il. p. 343. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 129. n°. 117.

Senecio foliis ovato-lanceolatis, ferratis, subius hirsutis; floribus umbellatis. Hall. Helv. n°. 64.

Virga aurea, seu solidago saraceniæ, latifolia, ferrata. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1063. Icon. ? — Pluk. Phytogr. pag. 390. tab. 235. fig. 1.

Jacobaea nemorensis; latiore, rigidiorè & hirsuto folio. Rupp. Jen. 142.

Solidago foliis lanceolatis, ferratis; floralibus ad pedunculum minimis. Emel. Sibir. vol. 2. pag. 165. ?

g. *Senecio foliis basi magis attenuatis & evidentibus inaequalibus.* Willd. l. c.

Senecio Bartelieri. Hoppe.

Cette espèce est distinguée du *senecio paludosus* par ses feuilles plus larges & plus courtes, par les tiges rameuses, & par ses fleurs presque en ombelle.

Ses tiges sont droites, presque glabres, cannelées, de couleur verte, cylindriques, hautes d'environ deux pieds, rameuses à leur partie supérieure; garnies de feuilles alternes, sessiles, ovales, lancéolées, d'un vert-noirâtre ou foncé à leur face supérieure, d'un vert-pâle & un peu pubescentes en dessous, particulièrement dans leur jeunesse, quelquefois un peu ciliées à leurs bords; munies d'un double rang de dents en scie alternativement plus courtes & en scie; les inférieures légèrement pétioolées, un peu rétrécies, & souvent inégales à leur base, aiguës à leur sommet, longues de quatre pouces & plus, sur au moins deux pouces de large.

Les fleurs sont nombreuses, disposées, à l'extrémité des rameaux, en cimes un peu ombellées, dont les pédoncules sont droits, rameux, munis de folioles filiformes & les inférieures assez longues. Le calice est cylindrique, composé de folioles droites, linéaires-incolées, égales, pointues, presque point scarifiées à leur sommet, un peu ouvertes après la floraison; garnies à leur base de quelques petites folioles sétacées. La corolle est radiale, de couleur jaune; les demi-fleurs ouvertes; les semences petites, étroites, surmontées d'une aigrette sessile, simple, blanchâtre.

Cette plante se rencontre dans les départements méridionaux de la France & elle croît aussi en Allemagne & dans l'Autriche. ? (V. v.)

Dans la plante g, les feuilles sont plus fortement rétrécies à leur base, & en même tems leurs côtés plus inégaux.

88. SENEÇON à feuilles ovales. *Senecio ovatus.* Willden.

Senecio corollis radiantibus; foliis ovato-lanceolatis, argute ferratis, utriusque glabris, subsessilibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2004. n°. 94.

Jacobaea ovata. Flor. der Werterau 3. p. 212.

Cette espèce n'est que médiocrement distinguée du *senecio nemorensis*, & se rapproche beaucoup aussi, surtout par les dentelures, du *senecio saraceniæ*.

Ses tiges sont droites, d'un pourpre noirâtre; ses feuilles ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, finement & inégalement dentées en scie à leurs bords; les inférieures presque sessiles & les supérieures pétioolées. Les fleurs sont disposées en corymbe; la corolle radiale, de couleur jaune.

Cette plante croît dans les forêts de l'Allemagne, vers les bords du Rhin. ?

89. SENEÇON sarrasin. *Senecio saraceniæ.* Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis lanceolatis, basi cuneatis, argute ferratis, subsessilibus, glabrisculis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2004. n°. 95.

Senecio corollis radiantibus; floribus corymbosis; foliis lanceolatis, ferratis, glabrisculis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1221. — Hort. Upf. 266. — Gouan, Monsp. 441. — Miller, Dict. n°. 8. — Reyg. Ged. 1. pag. 207. n°. 8. — Murray, Prodr. pag. 71. — Jacq. Flor. austr. tab. 186. — Pollich. Palat. n°. 800. — Matusch. Sil. n°. 620. — Kniph. Centur. 4. n°. 78. — Hoffm. Germ. n°. 295. — Rorh. Germ. vol. 1. pag. 365. — Il. pag. 344. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 131. n°. 117.

Senecio foliis lanceolatis, ferratis, glabris; floribus umbellatis. Haller, Helv. n°. 65.

Senecio floribus radiatis, corymbosis; foliolis sessilibus, lanceolatis, ferratis. Scopol. Carn. edit. 1. n°. 2. pag. 380. — Edit. 2. n°. 1070.

Senecio foliis lanceolatis, ferratis; floralibus pedunculosis aquantibus. Virid. Cliff. 84. — Roy. Lugd. Bat. 163. — Gott. Getr. 481.

Solidago coule simplicis; corymbo terminali; pedunculosis partialibus alternis, nudis, longitudine folii. Hort. Cliff. 410.

Solidago saraceniæ. Fusch. Hist. 728. Icon.

Virga aurea, angustifolia, ferrata. C. Bauh. Pin. 268.

Jacobaea alpina, foliis longioribus, ferratis. Tourn. Ind. R. Herb. 485.

Jacobaea fibrotunda minima, laciniato folio. C. Bauh. Pin. 131.

Consolida aurea. Tabern. Icon. 556.

Virga aurea, angustifolia, serrata, sive solidago faracutia. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1062. Icon.

Cette espèce se distingue du *senecio nemorosus*, par ses feuilles plus longuement lancéolées, quoique fort larges; par les dentelures simples, très-fines; par les fleurs plus petites.

Ses racines sont dures, rampantes; elles produisent une tige droite, cylindrique, glabre, striée, haute de deux à trois pieds, presque simple ou un peu nerveuse à la partie supérieure; les rameaux grêles, effilés; les feuilles font alternes, distantes; les inférieures médiocrement pétiolées, plus larges; les supérieures sessiles, plus étroites, lancéolées, glabres à leurs deux faces, d'un vert un peu clair, pointues à leur sommet, un peu rétrécies en coin à leur base, finement denticulées à leur contour.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, un corymbe médiocrement étalé, soutenues par des pédoncules grêles, lisses, rameux, munis, à la base de leurs divisions, de petites folioles siccées, alongées. Le calice est cylindrique, glabre, assez petit, composé de folioles droites, égales, étroites, aiguës, à peine scarieuses à leur sommet, à peine caliculées. La corolle est radiale, d'un jaunepâle ou couleur de soufre. Les demi-fleurs sont peu nombreux, ouverts; les fleurons un peu plus longs que les calices; les semences petites, couronnées d'une aigrette sessile, simple, d'un blanc-roussâtre.

On rencontre cette plante dans les lieux humides, couverts & montagneux des départemens méridionaux de la France, ainsi que dans l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, &c. 2 (V. v.)

90. *SENEÇON coriace. Senecio coriaccus.* Aiton.

Senecio corollis radiantibus; squamis calicinis adpressis; foliis subdecurrentibus, subius villosis, lanceolatis, serratis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 195. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2004. n°. 96.

Senecio (orientalis), corollis radiantibus; floribus corymbosis; foliis ensiformibus, dentatis, amplexicaulibus. Miller, Dict. n°. 10.

Doria quae Jacobaea orientalis, limonifolia, Tournefortii. Dillen. Eltham. pag. 125. tab. 105. fig. 125.

Jacobaea orientalis, limonifolia. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 36.

Senecio orientalis. Hort. Paris.

Cette plante, très-rapprochée du *senecio doria*,

à des tiges droites, anguleuses, striées, médiocrement cylindriques, à peine rameuses, hautes d'environ trois à quatre pieds, garnies de feuilles radicales pétiolées, membranées, coriaces, assez semblables à celles du *batia limonium*, rétrécies à leur base, & décurrentes sur leur pétiole, alongées, élargies, presque obtusées à leur sommet, dentées en scie à leurs bords, glabres à leur face supérieure, garnies en dessous de quelques poils rares & courts; les feuilles caulinaires lancéolées, sessiles, longues de deux ou trois pouces, élargies à leur base; les inférieures légèrement décurrentes, coriaces, glabres en dessus, un peu pileuses en dessous, dentées en scie à leur contour; les dentelures blanchâtres & cailleuses.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe raîsté, dont les pédoncules sont alongés, rameux & presque ombellés à leur partie supérieure, munis de petites folioles courtes, subulées. Le calice est cylindrique, formé de folioles droites, égales, linéaires, membranées à leurs bords, aiguës, point scarieuses à leur sommet; le petit calice extérieur très-serré contre l'intérieur. La corolle est radiale, de couleur jaune-foncée; les demi-fleurs ouverts; les semences munies d'une aigrette simple, blanche & sessile.

Cette plante se rencontre dans le Levant. 2 (V. v.)

91. *SENEÇON charnu. Senecio doria.* Linn.

Senecio corollis radiantibus; squamis calicinis exterioribus patulis, foliis subdecurrentibus, oblongo-lanceolatis, glabris, serratis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2005. n°. 97.

Senecio corollis radiantibus; floribus corymbosis; foliis subdecurrentibus, nudis, lanceolatis, denticulatis, superioribus sensim minoribus. Linn. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1221. — Jacq. Flor. austr. tab. 185. — Palas, Iter 1. pag. 200. — Dorr. Nass. pag. 213. — Kriph. Centur. 10. n°. 78. Hofm. Germ. 296. — Roth. Germ. vol. 2. pag. 345.

Senecio carnosus. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 131. n°. 117.

Solidago caule simplici; corymbo terminali; pedunculis terminalibus, nudis; foliolo subjecto brevissimo. Hort. Cliff. 410.

Senecio (altissimus), corollis radiantibus; floribus corymbosis; foliis lanceolatis, serratis, semi-amplexicaulibus. Miller, Dict. n°. 9.

Virga aurea major, seu doria. C. Bauh. Pin. 263.

Jacobaea praecox, altissima, limonifolia. Tournef. Inst. R. Herb. 485.

Panax chironium Theophrasti. Tabern. Ic. 871.

Alisma monstrelsenium, fr. dorio. J. Bauhin, Hist. 2. pag. 1064. Icon.

Vulgairement l'herbe dorée.

β. *Jacobaea protensis*, *altissima*, *limoniifolia*; *floribus densifloribus*. Tourn. Inst. R. Herb. p. 485.

Virgo aurea major, *altera*, ex dorio degener. Tourn. l. c. — Hort. Paris.

Il existe de très-grands rapports entre cette espèce & le *senecio coriaceous* : on l'en distingue cependant en ce que ses feuilles, au lieu d'être coriaces, sont charnues & parfaitement glabres à leurs deux faces ; que d'ailleurs ces feuilles diminuent insensiblement de grandeur, tellement que les dernières se confondent presque avec les bractées.

Ses tiges sont droites, assez épaisses, très-simples, hautes d'environ quatre à cinq pieds, glabres, striées, cylindriques, garnies de feuilles alternes ; les inférieures ou radicales pétiolées, fort longues, lancéolées, décurrentes sur leur pétiole, obtuses & souvent élargies à leur sommet ; les caulinares & les supérieures à demi-amplexicaules, lancéolées, acuminées, toutes charnues, très-glabres à leurs deux faces, presque luisantes, légèrement denticulées à leur contour ; les dentelures petites, blanchâtres.

Les fleurs sont très-nombreuses, disposées en un corymbe lâche, étalé, dont les pedoncules sont alternes, très-longs, glabres, divisés à leur sommet en rameaux très-courts, inégaux, un peu fasciculés, munis de bractées petites, lancéolées. Le calice est cylindrique, tronqué, composé de folioles droites, roussâtres, linéaires, aiguës ; celles qui forment le petit calice extérieur, sont lâches, courtes, presque sétacées. La corolle est d'un beau jaune-doré, radiale ; les demi-flurons ouverts ; les semences petites, striées, surmontées d'une aigrette blanche, scissile.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, en Allemagne, en Autriche, dans le Levant, le long des ruisseaux, & dans les lieux humides. ♀ (V. v.)

On emploie les feuilles fraîches de ce *senecio* pour déterger les vieux ulcères & les plaies.

92. SENEÇON d'Orient. *Senecio orientalis*. Willd.

Senecio corollis radiatibus; *synanis colicinis exterioribus lanceolatis*, *patulis*; *foliis subdecurrentibus*, *lanceolatis*, *glabris*, *denticulatis*; *corymbo simplicissimo*, *terminali*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1206. n°. 98.

Jacobaea orientalis, *foliis longioribus*, *dentatis*; *flor. magno*. Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. p. 36.

Cette espèce ressemble assez par ses feuilles au

senecio dorio, & par la grandeur de ses fleurs au *senecio dorianicum*.

Ses tiges sont droites, glabres, striées, médiocrement cylindriques, anguleuses, presque simples, garnies de feuilles alternes, scissiles, lancéolées, semblables à celles du *senecio coriaceous*, mais plus étroites ; les inférieures légèrement décurrentes, glabres à leurs deux faces, denticulées à leurs bords ; les supérieures plus étroites, acuminées, allongées.

Les fleurs sont peu nombreuses, disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe très-simple, dont les pedoncules sont alternes, allongés. Le calice est cylindrique, composé de folioles droites, égales ; le calice extérieur fort petit ; les folioles en forme d'écaillés lancéolées, ouvertes. La corolle est de couleur jaune, radiale, de la même grandeur que celle du *senecio dorianicum*, à laquelle elle ressemble.

Cette plante a été découverte dans le Levant par Tournefort : elle croît dans l'Asie mineure. ♀

93. SENEÇON d'orient. *Senecio dorianicum*. Linn.

Senecio corollis radiatibus; *caule inaequis*, *subuniformi*; *foliis inaequis*, *serotatis*; *radicalibus ovatis*, *sinuatis villosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1221. — Gouan, Monsp. pag. 441. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 106. tab. 7. — Scop. L. Carn. edit. 2. n°. 1067. — Jacq. Flor. austr. 5. Append. tab. 45. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 150. n°. 117. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1207. n°. 100.

Senecio foliis cressis, *serotatis*, *imix*, *periolatis*, *subrotundis*; *caulinis lanceolatis*. Haller, Helv. n°. 67.

Solidago dorianicum. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 380.

Dorianicum foliis lanceolatis, *alternis*, *dentatis*; *caulinis amplexicaulis*, *caule ramoso*. Roy. Lugd. Bat. 160.

Dorianicum longifolium, *hirsutius asperum*. C. Bauh. Pin. 185.

Dorianicum secundum, *austriacum primum*. Clus. Hist. 2. pag. 17. Icon.

β. *Jacobaea integro & crasso hieracii folio*. Tourn. Bot. Monsp. 295. — Seguier, Plant. veron. Suppl. 278.

Dorianicum integro & crasso hieracii folio. Magn. Boron. Monsp. 295. — Seguier, Plant. veron. Suppl. 278.

Dorianicum foliis oblongo-lanceolatis, *serotatis*. Monnier, Observ. 112.

γ. *Dorianicum foliis lanceolatis*, *denticulatis*, *subrotundis tomentosis*; *caule unifloro*. Roy. Lugd. Bat. 160.

Dorianicum helveticum, *humile*, *crassis foliis* &

incanum. C. Bauh. Pin. 185. — Prodr. 97. — Burf. X. 29.

♂. *Tuffilago alpina*, folio oblongo. C. Bauh. 197. — Prodr. 101.

♂. *Virgo aureo*, montano, serrata, magno flore. C. Bauh. Pin. 268.

Cette plante, sujette à plusieurs variétés remarquables, que quelques auteurs soupçonnent devoir être des espèces, se distingue par le duvet coroneux qui recouvre toutes les parties; par les grandes fleurs foliaires, terminales.

Ses tiges sont droites, très-simples, peu garnies de feuilles, cylindriques, herbacées, striées, hautes au moins d'un pied, revêtues d'un duvet coroneux, blanchâtres, garnies de feuilles alternes, presque sessiles; les radicales petiolées, ovales, oblongues, un peu épaisses, glauques, vertes, glabres à leur face supérieure, blanches & coroneuses en dessous, dentées en scie à leur contour, obtuses à leur sommet, rétrécies vers leurs pétioles; les feuilles caulinaires sessiles, plus petites, à demi-amplexicaules, plus étroites, lancéolées, dentées en scie; les dentures courtes, écartées; les feuilles terminales presque subulées ou longuement acuminées.

Les fleurs sont terminales, foliaires ou au nombre de deux ou trois au plus, d'une grandeur remarquable, relativement à celles des autres espèces, assez semblables à celles de la doronic, soutenues par des pédoncules très-simples, allongés, cylindriques, tomenteux, munis d'une ou deux bractées semblables aux feuilles terminales, mais plus petites. Le calice est ample, ovale, composé de folioles égales, droites, presque en carène, un peu tomenteuses, acuminées & un peu scarieuses à leur sommet; le calice extérieur est formé de quelques folioles allongées, sétacées, presque aussi longues que le calice intérieur. La corolle est radiale, d'un beau jaune-doré, ample; les demi-fleurs de la circonférence femelles & fertiles; leur languette allongée, linéaire, un peu réfléchies; les fleurons tubulés, plus longs que le calice, divisés en cinq dents à leur sommet, tous hermaphrodites; les femences petites, glabres, oblongues, un peu comprimées, de couleur brune, surmontées d'une aigrette simple, blanche, sessile, pileuse; le réceptacle nu.

Les variétés que nous avons citées en différent par leurs tiges plus ou moins élevées; par leurs feuilles un peu différentes dans leur forme, quelquefois plus épaisses & à peine dentées; par les fleurs constamment foliaires; mais elles conservent les autres caractères particuliers à cette espèce.

Cette plante se rencontre dans les Alpes, les Pyrénées, en Italie, en Suisse, en Autriche, & dans les départements méridionaux de la France, aux lieux montagneux. ♀ (V. f.)

94. *Senecio* de Battelier. *Senecio Battelierii*. Gouan.

Senecio corollis radientibus; foliis scabris, serratis; radiculibus oblongis, subcorvatis; caulibus lanecolatis; corymbis pnyctici, terminali; caule hirsuto. Willd. Spec. Flant. vol. 3. pag. 226. n°. 99.

Senecio corollis radientibus; caule hirsuto, multifloro, corymboso; foliis serratis; radicalibus ovato-cordatis, petiolatis. Gouan, Illustr. 68.

Jacobaea montana, integro, sublongo folio. Barrel. Icon. Rat. 146. ?

Jacobaea montana, betonica folio. Barrel. Icon. Rat. 801. — Boccon. Mus. 2. tab. 29. — Tourn. Inst. R. Herb. 485.

Cette plante, très-voisine du *senecio doronicum*, s'en distingue par ses fleurs plus nombreuses. Elle pousse des tiges simples, droites, cylindriques, striées, hérissées de poils roides, garnies de feuilles alternes; les radicales & inférieures très-nombreuses, petiolées, ovales-oblongues, un peu échancrées en cœur à leur base, rugées, dentées en scie à leur contour, assez semblables à celles de la bétoune; les feuilles caulinaires plus étroites, oblongues, lancéolées, rugées au toucher, aiguës à leur sommet, distantes; les supérieures presque sessiles.

Les fleurs sont terminales, disposées en un corymbe simple, peu garni; les pédoncules oblongs, presque uniflores; les supérieurs un peu rameux, garnis à leur base de petites folioles linéaires. Leur calice est cylindrique; la corolle radiale, de couleur jaune; les demi-fleurs ouvertes; leur languette linéaire, dentée à son sommet.

Cette plante croit dans les Pyrénées. ♀

95. *Senecio* du mont Baldo. *Senecio boldensis*.

Senecio corollis radiantibus; foliis petiolatis, ovato-cordatis, inaequaliter serratis, subius submembranosis; floribus corymbosis, caule subsimplici. (N.)

Jacobaeo alpino, foliis subrotundis, serratis. Tourn. Inst. R. Herb. 485.

Jacobaea septima, sive foliis rotundis, serratis. C. Bauh. Pin. 131. & Prodr. 69.

Conyzo alpino. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1055. Ic.

Jacobaea latifolia, pannonica. ? Clus. Pann. pag. 574. tab. 575.

Jacobaea pannonica, quarta. Clus. Hist. 4. p. 23.

Cette plante a des rapports avec le *senecio Battelierii*, mais ses feuilles sont moins allongées & plus larges; toutes les parties sont d'ailleurs couvertes de quelques flocons blancs & corneux; ses fleurs moins grandes que celles du *senecio doronicum*.

Cette plante a des racines épaisses, blanchâtres & fibreuses ; elles produisent plusieurs tiges droites, hautes au moins d'un pied, simples, cylindriques, verdâtres, fortement striées, légèrement cotonneuses, particulièrement sur les tiges & dans leur jeunesse ; garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, assez larges, échancrées en cœur à leur base, vertes, presque glabres à leur face supérieure, presque pubescentes, d'un blanc-grisâtre ou un peu blanchâtres en dessous, cotonneuses sur leurs principales nervures, dentées en scie à leur contour ; les dents profondes, aiguës, inégales, presque obtuses à leur sommet, longues de trois pouces au moins, larges d'environ deux pouces, supportées par des pétioles redressés, longs d'un pouce au moins, tomenteux particulièrement à leur base ; les jeunes feuilles axillaires, très-cotonneuses & d'un blanc de neige.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe assez ample, soutenues par des pédoncules, les uns axillaires, d'autres terminaux, médiocrement rameux à leur sommet, un peu cotonneux, munis de quelques bractées presque filiformes, allongées. Les calices sont glabres, presque ovales, composés de folioles droites, égales, linéaires, un peu aiguës, verdâtres dans leur milieu, scarieuses à leurs bords, enveloppées à leur base par quelques folioles rares, presque festonnées, plus courtes que le calice intérieur. La corolle est grande, radiale, d'une belle couleur jaune-soncé ; les demi-fleurs femelles terminés par une languette linéaire, ouverte, à peine réfléchie ; les fleurons tubulés, nombreux, divisés en cinq dents à leur orifice, plus longs que les calices. Les semences sont petites, ovales, oblongues, presque cylindriques, très-glabres, jaunâtres, surmontées d'une aigrette sessile, simple, pileuse, d'un blanc-cendré.

Cette plante croît dans les Alpes ; elle a été recueillie au mont Baldo par M. Bosc, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

96. SENEÇON à feuilles de pastel. *Senecio glastifolius*. Linn. f.

Senecio corollis radiatibus ; foliis amplexicaulis, lanceolatis, subdentatis, levibus. Linn. f. Suppl. pag. 272. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2008. n°. 103.

Senecio foliis amplexicaulis, oblongis, dentatis, glabris ; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. p. 158.

Ses tiges sont droites, herbacées, cylindriques, striées, lutes d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes, distantes, oblongues, lancéolées, lisses à leurs deux faces, légèrement dentées à leur contour, amplexicaules & plus larges à leur base. Les fleurs sont disposées en une pa-

nicule terminale. La corolle est radiale ; les demi-fleurs ouverts & de couleur purpurine.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

97. SENEÇON en lance. *Senecio lanceus*. Ait.

Senecio corollis radiatibus ; foliis lanceolatis, basi cordatis, amplexicaulis, levibus, argutis serratis ; caule frutescente. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 194. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2008. n°. 102.

Senecio (littoreus), foliis amplexicaulis, oblongis, glabris, inaequaliter serratis ; panicula terminali. Thunb. Prodr. 158.

Cette plante a des tiges droites, presque ligneuses, cylindriques, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, lancéolées, échancrées en cœur à leur base, lisses, glabres à leurs deux faces, finement & inégalement dentées en scie à leur contour. Les fleurs sont disposées en panicule à l'extrémité des tiges ; la corolle est radiale.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. h

98. SENEÇON d'automne. *Senecio oporinus*. Willd.

Senecio corollis radiatibus, foliis amplexicaulis ; inferioribus lanceolatis, serratis ; floribus basi dilatatis, ovatis, serratis, apice lanceolatis, integerrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2008. n°. 104.

Senecio (lanceus), corollis radiatibus ; foliis amplexicaulis, glabris, ad oras argutis serratis & scabris, superioribus cordato-lanceolatis, inferioribus lanceolato-oblongis. Jacq. Hort. Schoenb. 3. p. 30. tab. 304.

Cette plante, d'après Willdenow, paroit devoir être distinguée du *Senecio lanceus*, en ce que ses tiges sont herbacées & non ligneuses, & par plusieurs autres différences dans ses feuilles.

Ses tiges sont droites, cylindriques, herbacées, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules ; les inférieures lancéolées, médiocrement amplexicaules, un peu rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords ; les dentelures distantes, fort petites, cartilagineuses à leur sommet ; les feuilles supérieures ovales, amplexicaules, dilatées à leur partie inférieure, insensiblement rétrécies & lancéolées vers leur sommet, dentées en scie seulement depuis leur base jusqu'à leur milieu.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe dont les pédoncules sont rameux. La corolle est radiale ; les demi-fleurs de la circonférence ouverts, d'un jaune-pâle, ainsi que les fleurons du disque ; mais ces derniers, en

vieillissant, prennent une couleur d'un brun-jaune.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.
* (Descript. ex Willd.)

99. SENEÇON de Byzance. *Senecio byzantinus*.

Senecio corollis radiantibus; foliis oblongis, remote dentatis, spinoso-denticulatis, supra nudis; caule herbaceo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1223.
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2009. n°. 107.

Senecio foliis crenato-dentatis, inferioribus pinnato-lyratis, superioribus pinnatifidis. Roy. Lugd. Bat. 330.

Solidago ifaidis folio. Rai, Suppl. 177. n°. 43. 58. ?

Jacobaea fucula, caule rigido, ramofo; foliis ad marginem laciniatis; floribus parvis, luteis. Rai, Suppl. 178. n°. 49.

Hieracium montanum, conyza seu dentaria folio. Bocc. Sic.

Cette plante a le port du *Serratula arvensis* Linn. Elle ressemble également au *senecio rigidus*, mais elle est beaucoup plus étroite dans toutes les parties, remarquable par ses feuilles allongées, dont les dents rares font un peu épineuses.

Ses tiges sont herbacées, vertes, cylindriques, striées, hautes d'environ quatre pieds, chargées de quelques poils blanchâtres, divisées à leur partie inférieure en rameaux très-ouverts, garnis de feuilles alternes, sessiles, lancéolées, amplexicaules, roulées à leurs bords, vertes, luisantes, un peu rudes à leur face supérieure, veinées, verdâtres, un peu velues en dessous, dentées en scie à leur contour; les dents aiguës, saillantes comme de petites épines hors des sinuosités, obtuses; les aisselles des feuilles munies d'autres feuilles fasciculées, rudiments de jeunes rameaux non développés.

La partie supérieure des tiges est une sorte de hampe cylindrique, beaucoup plus étroite que les tiges, lisse, très-longue, filiforme, garnie à sa partie inférieure de feuilles linéaires, très-entières; les dents peu profondes, en scie, presque épineuses; ces hampes sont nues vers leur sommet. Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, soutenues par des pédoncules alternes, peu rameux; les calices scarieux à leur sommet. La corolle est radiale, de couleur jaune; les demi-fleurs au nombre de huit, ovales, à peine tridentés à leur sommet.

Cette plante se rencontre dans le Levant, aux environs de Constantinople. * (Descript. ex Linn.)

100. SENEÇON à feuilles roides. *Senecio rigidus*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis amplexicaulis, spatulatis, repandis, crotis, scabris; caule fruticoso. Linn. Syst. veget. pag. 759. n°. 51. — Hort. Cliff. 406. — Royen, Lugd. Bat. 164. — Miller, Dict. n°. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2013. n°. 121.

Jacobaea africana, frutescens; foliis rigidis & hirsutis. Commel. Hort. 2. pag. 149. tab. 75. — Seba, vol. 1. tab. 22. fig. 5.

Jacobaea africana, ram. fissima; foliis senecionis pinguis, rigidis & luscantibus, subulis incanis. Rai, Suppl. 179.

Ses tiges sont droites, ligneuses, roides, très-brançues, rudes, difformes, hautes de six à sept pieds, munies de rameaux diffus, alternes, garnis de feuilles sessiles, alternes, très-nombreuses, fort roides, amplexicaules, spatulées, un peu sinuées, presque rangées à leur bords, très-rudes, & comme verticillées à leur face supérieure, blanchâtres & légèrement velues en dessous; les feuilles plus petites beaucoup plus étroites, longues d'environ quatre pouces, sur un pouce & demi de large.

Les fleurs sont petites, d'un beau jaune brillant, disposées en corymbe à l'extrémité des rameaux. Les demi-fleurs sont au nombre de cinq, femelles & fertiles; les fleurs mâles, entières, hermaphrodites; les semences petits, surmontées d'une aigrette simple, sessile.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.
* (V. f.)

101. SENEÇON à longues feuilles. *Senecio longifolius*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis linearibus, sparsis; caule fruticoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1221. — Berg. Plant. Capenf. pag. 179. n°. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2009. n°. 105.

Jacobaea africana, folio capillaceo, viridi. Herm. Afric. 14.

Jacobaea africana, frutescens; oblongis foliis, angustis, integris, incanis. Volk, Norib. 224.

Jacobaea africana, frutescens, Lavandula folio latiore & angustiore. Commel. Hort. 2. pag. 141. tab. 61.

Jacobaea aethiopica, Lavandula folio. Breyn. Centur. tab. 63.

Jacobaea aethiopica, angustifolia & prolongis foliis, rariis crenatis. Pluken. Mantiff. pag. 107. tab. 421. fig. 5.

Cette espèce a des tiges presque herbacées, droites, striées, cylindriques, glabres ou légèrement tomenteuses sur leurs bords, divisées à leur partie supérieure en quelques rameaux simples, grêles, un peu tomenteux, garnis de feuilles alternes, sessiles,

éparées, linéaires, allongées, longues de deux à quatre pouces, surtout les inférieures; les unes entières; d'autres munies à leurs bords de quelques dents rares & distantes, glabres à leurs deux faces, ou couvertes, surtout pendant leur jeunesse, d'un duvet cotonneux, caduc; traversées par une nervure assez forte, sillonnée. Il existe dans leur aisselle de petits faisceaux de feuilles, qui sont les rudimens de jeunes rameaux.

Les fleurs sont petites & forment un corymbe terminal, dont les pédoncules sont rameux, garnis à leur base de bractées subulées, & de plusieurs autres plus petites, en forme d'écaillés aiguës, fréquentes, presque imbriquées; le calice est rubiné, composé de folioles linéaires, parallèles, égales, & de quelques autres à la base; subulées, serrées, imbriquées, formant un second calice très-court. La corolle est jaune, radiée, un peu plus grande que le calice; les demi-fleurons de la circonférence ont un tube filiforme, plus long que le calice, terminé par une languette ovale, un peu obtuse, réfléchie à son sommet; les fleurons du disque hermaphrodites, infundibuliformes; leur tube élargi à sa partie supérieure, à cinq dents. Les semences des fleurs hermaphrodites, seules, sont couronnées par une aigrette simple, sessile, pileuse; le réceptacle nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. γ ? (V. f.)

102. SENEÇON à feuilles d'arctioche. *Senecio halmifolius*. Linn.

Senecio corollis radiatis; foliis obovatis, carnosis, fuscis; caule fruticoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1223. — Miller, Dict. n°. 14. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2010. n°. 109.

Senecio (sessilis), foliis elliptico-oblongis, sessilibus, acutatis, glabris; panicula composita. Thunb. Prodr. pag. 158.

Solidago foliis obversis ovatis, carnosis, crenatis; caule fruticoso, corymbo ramoso. Hort. Cliff. 411.

Doria africana arborecens; foliis crassis & succulentis, atriplicem referentibus. Dillen. Eltham. pag. 124. tab. 104. fig. 124.

C'est un arbrisseau de médiocre grandeur, dont les tiges sont droites, ligneuses, glabres, hautes de sept ou huit pieds, munies, dans toute leur longueur, de rameaux alternes, un peu diffus, garnis de feuilles alternes, sessiles, épaisses, charnues, en ovale renversé, glabres à leurs deux faces, crénelées ou légèrement dentées à leurs bords, longues d'environ deux pouces & demi, sur deux pouces de large, un peu blanchâtres.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe composé, lâche, dont les pédoncules communs sont rameux vers leur

sommet; les ramifications presque ombellées. La corolle est radiée, de couleur jaune-pâle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. γ

103. SENEÇON hétérophylle. *Senecio heterophyllus*. Thunb.

Senecio corollis radiatis; foliis lanceolatis, glabris, inferioribus subpetiolatis, profundè dentatis; superioribus sessilibus subintegerrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2010. n°. 108.

Senecio foliis inferioribus, subpetiolatis, oblongis, serratis; superioribus integris; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 157.

Ses tiges sont droites, ligneuses, divisées en rameaux lisses, striés, garnis de feuilles alternes, lancéolées, glabres à leurs deux faces; les inférieures médiocrement pétiolées, oblongues, lancéolées, munies, à chacun de leurs côtés, de quatre ou huit dents allongées. Les feuilles supérieures sont sessiles, plus étroites, lancéolées, ordinairement très-entières, quelquefois munies à leurs bords d'une ou de deux dents.

Les fleurs sont disposées, tant dans l'aisselle des feuilles supérieures qu'à l'extrémité des rameaux, en un corymbe composé, dont les pédoncules sont rameux à leur partie supérieure; les corolles radiées.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. γ (Descript. ex Willd.)

104. SENEÇON à feuilles molles. *Senecio mollis*. Willd.

Senecio corollis radiatis; foliis utrinque tomentosis, oblongis, acutatis, superioribus amplexicaulis, inferioribus petiolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2011. n°. 113.

Jacobaea orientalis, foliis oblongis, non laciniatis, lanceolis. Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. 36.

Ses tiges sont droites, cylindriques, très-simples, hautes d'environ trois pieds, revêtues d'un duvet tomenteux, garnies de feuilles alternes, oblongues, molles, tomenteuses à leurs deux faces, d'un blanc-verdâtre en dessus, d'un blanc de neige en dessous, longues d'environ deux pouces; profondément dentées à leur contour, les dents obtuses, celles de la base plus grands; les feuilles inférieures pétiolées, longues de trois pouces; les supérieures sessiles, amplexicaules. Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, composé; la corolle est radiée.

Cette plante croît dans le Levant & la Galatie. γ (Descript. ex Willd.)

105. SENEÇON de Sibérie. *Senecio sibiricus*. Linn. f.

Senecio

Senecio corollis radiantibus, quinqueradiis; foliis ellipticis, levibus. Linn. f. Suppl. pag. 370.

Ses tiges sont droites, lisses, cylindriques, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles sessiles, alternes, peu nombreuses, elliptiques, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, traversées dans leur milieu par une nervure blanche. Les fleurs sont radiales, de couleur jaune, disposées presque en un corymbe terminal; les demi-fleurs de la circonférence au nombre de cinq; les fleurs de douze à quinze. Le calice est composé de folioles droites, égales, scarieuses à leur sommet; le calice extérieur formé par trois ou quatre petites écailles à la base du calice intérieur.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Descript. ex Linn. f.)

106. SENEÇON à feuilles d'yeuse. *Senecio ilicifolius*. Linn.

Senecio corollis radiantibus; foliis oblongis, sessilibus, dentatis, subius tomentosis, superioribus amplexicaulibus, basi tantum dentatis; corymbo simplici. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2012. n° 115.

Senecio corollis radiantibus; foliis sagittatis, amplexicaulibus, dentatis; caule fruticoso. Linn. Syst. veget. pag. 759. n° 50. — Virid. Cliff. 84. — Hort. Cliff. 406. — Royen, Lugd. Bat. 164. — Miller, Dict. n° 13.

Senecio foliis amplexicaulibus, dentatis, subius tomentosis; panicula subsistigata. Thunb. Prodr. pag. 258.

Jacobaea africana, frutescens; foliis incisifs & subius cinereis. Commel. Plant. rar. pag. 42. tab. 42. — Sebas. Mus. vol. 1. pag. 34. tab. 22. fig. 4.

Senecio (ilicifolius), corollis radiantibus; foliis sessilibus, oblongis, scabris, denticulatis; summis linearibus, hastatis; caule ramoso, scabro. Bergius, Plant. Capenf. pag. 281. n° 6.

Ses tiges sont droites, presque anguleuses, rudes, striées, divisées en rameaux droits, alternes, axillaires, ramifiées à leur sommet, garnies de feuilles sessiles, alternes, oblongues, rudes à leur face supérieure, tomenteuses en dessous, entières, dentées à leur contour, obuses à leur sommet; les supérieures allongées, amplexicaules, dentées seulement à leur base, longues d'environ deux pouces; les dernières linéolées, presque hachées, à angles arrondis, lucides, dentées, mucronées à leur sommet.

Les fleurs sont petites, de couleur jaune, disposées en un corymbe terminal, ample, fastigié, dont les pédoncules sont munis de bractées linéaires, subulées. Le calice est cylindrique, tronqué, composé de folioles linéaires, concaves, parallèles, aiguës, un peu scarieuses à leur sommet, garnies

à leur base de quelques petites écailles tubulées. La corolle est radiale, de couleur jaune, petite, un peu plus longue que le calice; les demi-fleurs filiformes; leur languette ovale, obuse, roulée en dehors; les fleurs hermaphrodites, cylindriques; leur limbe à cinq divisions réfléchies; les semences courtes, petites, couronnées par une aigrette simple, sessile, de la longueur de la corolle; le réceptacle nu, hérissé de très-petits calices propres.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

107. SENEÇON à feuilles en cœur. *Senecio cordifolius*. Linn. f.

Senecio corollis radiantibus; foliis cordatis, dentatis; calicibus simplicissimis. Linn. f. Suppl. p. 472. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2013.

Senecio foliis petiolatis, cordatis, dentatis, glabris; floribus solitariis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Ses tiges sont grêles, en partie couchées, un peu rameuses à leur partie inférieure, garnies de feuilles alternes, pétiolées, en forme de cœur, lisses à leurs deux faces, dentées à leurs bords, un peu obuses à leur sommet. Les fleurs sont terminales, portées sur un long pédoncule presque simple ou garni de très-peu de fleurs. Le calice est simple, point canaliculé; la corolle radiale, de couleur jaune; les demi-fleurs munis d'un ligamate bise et fertile.

Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance. (Descript. ex Linn. f.)

108. SENEÇON à feuilles de peuplier. *Senecio populifolius*.

Senecio corollis radiantibus, foliis ovatis, spatulatis, integris, obtusis, adularioribus superius glabris; caule fruticoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1224.

Senecio (solidaginoides), foliis sessilibus, ovatis, apice dentatis, glaucis; junioribus fruticose-tomentosis; corymbo composto, terminali. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2014. n° 122.

Senecio (solidaginoides), corollis radiantibus; foliis cuneiformibus, superius dentatis, glabris; caule fruticoso. Bergius, Plant. Capenf. pag. 284.

Senecio (solidaginoides), foliis ovatis, apice dentatis, glaucis; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Jacobaea africana, populi alba foliis. Rai, Suppl. 177.

Ses tiges sont droites, ligneuses, munies de rameaux alternes, glabres, effilés, cylindriques, garnis de feuilles alternes, sessiles, épaisses, presque amplexicaules, rétrécies vers leur base, claires

gies en spatules à leur sommet, ou en ovale renversé; entières, dentées à leur partie supérieure, glabres de couleur glauque à leur face supérieure, tomenteuses & foveuses en dessous, particulièrement dans leur jeunesse; veinées, longues d'environ deux pouces.

Les fleurs sont terminales, disposées en un corymbe assez ample, composé, ligulé, dont les pédoncules sont ramuleux, munis de bractées, linéaires, foliaires à la base des divisions; les inférieures plus grandes. Le calice est presque arrondi, tronqué, composé de folioles linéaires, égales, parallèles, scarieuses à leurs bords, quelques autres plus petites, subulées, formant un second calice. La corolle est jaune, radiée, plus longue que le calice; les demi-fleurs femelles; leur languette ovale, obtuse, tridentée, roulée en dehors; les étamens hermaphrodites, tubulés, infundibuliformes; à cinq dents. L'ovaire est ovale, oblong; le style filiforme, un peu plus long que les étamines; les stigmates velus; les semences petites, couronnées par une aigrette simple, sessile; le réceptacle plane, nu, alvéolé, un peu charnu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.
b (V. f.)

* *Especies moins connues.*

* *Senecio (squamosus), foliis amplexicaulis, inciso-dentatis, supra scabris, subtus tomentosis; floribus racemosis.* Thunb. Prodr. pag. 158. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1587. n°. 46.

Ses feuilles sont alternes, amplexicaules, dentées, incisées, rudes à leur face supérieure, tomenteuses en dessous; leurs fleurs disposées en grappes. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio (incisus), foliis amplexicaulis, inciso-dentatis, supra glabris, subtus tomentosis; panicula compressa.* Thunb. Prodr. pag. 158.

Cette espèce, qui paroît avoir de très-grands rapports avec la précédente, en diffère par la disposition de ses fleurs en panicule composée. Ses feuilles sont amplexicaules, alternes, incisées, dentées à leur contour, glabres à leur face supérieure, tomenteuses en dessous. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio (carnosus), foliis petiolatis, lyratis, incis, dentatis, carnosiss; caule acuminato.* Thunb. Prodr. pag. 158.

Ses tiges sont inclinées ou couchées; ses feuilles charnues, alternes, pétiolées, en forme de lyre, incisées, dentées à leur contour. On la rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio (abruptus), foliis amplexicaulis,*

oblongis, villosis, inciso-pinnatifidis, dentatis; caule herboso, paniculato. Thunb. Prodr. pag. 159.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance; elle a des tiges herbacées, divisées en rameaux paniculés. Ses feuilles sont alternes, amplexicaules, oblongues, velues, incisées, pinnatifides, dentées.

* *Senecio (spiraeifolius), foliis radicalibus, pinnatifidis, piloso scabris; floribus paniculatis.* Thunb. Prodr. pag. 159.

Ses fleurs sont radiées, disposées en panicules terminales; ses tiges garnies de feuilles alternes; les radicales pinnatifides, rudes, pileuses. On la rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio (muricatus), foliis pinnatis, hispids; pinnis linearibus, floribus paniculatis.* Thunb. Prodr. pag. 159.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. Ses fleurs sont disposées en panicules terminales; ses feuilles ailées, hispides; les pinnules linéaires.

* *Senecio (levigatus), foliis pinnatis, glabris; pinnis linearibus, integerrimis dentatisque; caule glabro.* Thunb. Prodr. pag. 159.

Ses tiges sont droites, glabres, feuillées, cylindriques; ses feuilles ailées, alternes, parfaitement glabres; les découpures linéaires, très-entières & dentées. On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio (myrrhifolius), foliis bipinnatifidis, dentatis, pilosis; floribus paniculatis.* Thunb. Prodr. pag. 159.

Ses fleurs sont disposées en panicule; ses feuilles deux fois pinnatifides, dentées & pileuses. On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio (diffusus), foliis bipinnatis, linearibus; caulibus diffusis.* Thunb. Prodr. pag. 159.

Senecio corollis radianibus, foliis bipinnatis, linearibus; caulibus diffusis. Linn. f. Suppl. pag. 371. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1594. n°. 72.

Ses tiges sont diffuses, éralées; ses feuilles deux fois ailées, linéaires; les corolles radiées; les demi-fleurs ouvertes, point réfléchies. Cette espèce est très-commune au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio (striatus), foliis linearibus, integerrimis, tomentosis; floribus solitariis.* Thunb. Prodr. pag. 157.

Cette espèce est remarquable par ses fleurs foliaires, radiées. Ses feuilles sont linéaires, très-entières, tomenteuses. On la trouve au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (pinnulatus), foliis linearibus, dentato-pinnatis, glabris; floribus paniculatis; caule piloso, scabro. Thunb. Prodr. pag. 157.

Ses feuilles sont alternes, linéaires, divisées à leurs bords en dents en forme d'ailes, glabres à leurs deux faces; les fleurs disposées en panicule. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (arenarius), foliis amplexicaulibus; superioribus oblongis, hirtis, inaequaliter serratis; floribus solitariis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Cette plante a des fleurs solitaires, des feuilles amplexicaules; les supérieures oblongues, hérissées de poils, inégalement dentées à leurs bords. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (undulatus), foliis amplexicaulibus, cordato-lanceolatis, glabris; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 157.

Ses fleurs sont disposées en une panicule terminale; ses feuilles amplexicaules, alternes, lancéolées, en cœur, glabres à leurs deux faces. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (marginatus), corollis radiantibus; foliis amplexicaulibus, lanceolatis, glabris, subarticulatis, marginatis; corymbo compo. Linn. f. Suppl. pag. 370.

Senecio foliis sessilibus, oblongis, glabris, integris serratisque; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 157.

Les fleurs sont radiées, disposées en panicule; les feuilles alternes, amplexicaules, lancéolées, glabres à leurs deux faces, presque articulées, entières à leurs bords ou quelquefois un peu dentées en scie, bordées à leur contour. On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (maritimus), corollis radiantibus; foliis amplexicaulibus, ovatis, denticulatis, carnosiss; caule herbaceo, procumbente. Linn. f. Suppl. p. 369.

Senecio foliis amplexicaulibus, ovatis, denticulatis, carnosiss; caule herbaceo, decumbente. Thunb. Prodr. pag. 157.

Ses tiges sont herbacées, rampantes; ses feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, ovales ou quelquefois lancéolées, denticulées à leur contour, épaisses, charnues, ainsi que la plupart des autres parties de cette plante. Les corolles sont radiées. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (lanatus), corollis radiantibus; foliis sessilibus, utrinque lanatis, dentatis, infimis ovatis, superioribus lanceolatis. Linn. f. Suppl. pag. 370.

Senecio foliis infimis ovatis, superioribus lanceolatis, dentatis, subtus albo-tomentosis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Les feuilles sont sessiles, alternes, lanugineuses

à leurs deux faces, plus blanches & tomenteuses en dessous, dentées à leur contour; les inférieures ovales, les supérieures lancéolées. La corolle est radiée. Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (quercifolius), foliis amplexicaulibus, oblongis, incis-ferratis, subtus tomentosis; panicula simplic. Thunb. Prodr. pag. 158.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance. Elle a des feuilles alternes, sessiles, oblongues, amplexicaules, glabres à leur face supérieure, tomenteuses en dessous, incisées & dentées en scie à leurs bords. Les fleurs forment une panicule simple à l'extrémité des tiges. La corolle est radiée, ouverte.

* *Senecio* (cispus), foliis infimis petiolatis; superioribus sessilibus, glabris, undulato-denticulatis; floribus terminalibus. Thunb. Prodr. pag. 157.

Cette espèce a des feuilles glabres, alternes, ondulées & denticulées à leurs bords; les feuilles inférieures pétiolées, les supérieures sessiles; les fleurs disposées en corymbe à l'extrémité des tiges. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (crenatus), foliis petiolatis, ovatis, serratis, glabris; panicula compo. Thunb. Prodr. pag. 158.

Ses fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une panicule dont les pedoncules sont ramex à leur partie supérieure. Les feuilles sont pétiolées, alternes, ovales, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour. On la rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (angulatus), corollis radiantibus; foliis petiolatis, ovatis, dentato-angulatis, glabris. Linn. f. Suppl. pag. 369.

Senecio foliis petiolatis, ovatis, dentato-angulatis, glabris; panicula terminali. Thunb. Prodr. pag. 158.

C'est une des espèces les plus élevées de ce genre. Ses feuilles sont pétiolées, alternes, ovales, glabres à leurs deux faces, de couleur glauque, un peu charnues, anguleuses & dentées à leur contour; les fleurs disposées en une panicule terminale; la corolle radiée. Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (repandus), foliis petiolatis, ovatis, repando-crenatis, glabris; floribus paniculatis. Thunb. Prodr. pag. 158.

Ses fleurs sont disposées en une panicule terminale. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ovales, glabres à leurs deux faces, sinuées & crénelées à leurs bords. On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

* *Senecio* (ruilaginoides), foliis crenatis, in-

Amis cordatis, petiolatis, superioribus pinnatifidis, lyratis. Walter. Flor. carol. pag. 208.

Cette plante se rencontre dans la Caroline : elle a des feuilles pétiolées, alternes, crénelées à leur contour ; les inférieures échancrées en cœur ; les supérieures pinnatifides, en forme de lyre.

* *Senecio* (Lam.) *foliis sessilibus, dentatis, oblongis.* Cmel. Iter, vol. 1. pag. 155. tab. 35. fig. 1.

Ses fleurs sont radiales, les demi-fleurons roulés en dehors ; les filices alternes, sessiles, oblongues, lanugineuses, dentées à leurs bords.

SENÉE. *Senecio*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des malvacées, qui a du rapport avec les mauves, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, les fleurs solitaires & axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice intérieur, en forme de coupe, à cinq divisions, un extérieur à trois grandes folioles ; environ dix étamines à la surface & à l'extrémité d'un tube ; une membrane à quatre lobes sous l'ovaire ; un style, cinq stigmates (une capsule à cinq loges) ;

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double, l'extérieur composé de trois grandes folioles en cœur, un peu arrondies ; l'intérieur en forme de coupe, fort petit, divisé jusque vers la moitié, en cinq découpures ; tous deux persistans.

2°. Une corolle environ une fois plus grande que le calice, composée de cinq pétales presque arrondis, connivens à leur base, & faisant corps avec le tube des étamines.

3°. Environ dix étamines, dont les filamens sont réunis en un tube qui supporte à sa partie supérieure & à son sommet des anthers réniformes.

4°. Un ovaire ovale, environné par le tube, muni à sa partie inférieure d'une membrane à quatre lobes ; un style simple ; cinq stigmates globuleux à leur sommet.

Le fruit est une capsule ovale, tomenteuse, probablement à cinq loges, contenant dix semences oblongues, réniformes.

Observations. Ce genre, qui jusqu'alors ne comprend qu'une seule espèce, diffère des mauves par son calice extérieur foliacé, par ses cinq stigmates, par la membrane qui enveloppe la partie inférieure de l'ovaire ; des *gossypium* par le calice extérieur à trois folioles distinctes, & non d'une

seule pièce ; par les cinq divisions du stigmate, par la membrane de l'ovaire. (*Cavassiles*.)

E S P È C E.

SENÉE blanchâtre. *Senecio incana*. Cavan.

Senecio foliis cordatis, ovato-truncatis, apice tridentatis, incanis ; floribus solitariis, axillaribus, sessilibus. Cavan. Dissert. 2. pag. 81. t. b. 35. fig. 3. (*Male fern*.) Juss. Genet. Plant. pag. 274.

Senecio incana. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 695.

Cette plante a des tiges basses, hautes de trois à quatre pouces, simples, blanchâtres, tomenteuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, en cœur, tronquées, revêtues d'un duvet tomenteux & blanchâtre, divisées à leur sommet en trois lobes courts, presque obtus ; celui du milieu plus grand ; les pétiotes plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, presque sessiles, très-grandes ; leur calice extérieur est composé de trois grandes folioles assez semblables aux feuilles caulinaires, veinées, en cœur, un peu arrondies, rétrécies, obtuses à leur sommet. Le calice extérieur est fort petit, d'une seule pièce, à cinq découpures aiguës & ciliées. La corolle paroît être de couleur jaunâtre, au moins une fois plus grande que le calice, composée de cinq pétales arrondis, marqués de veines plus foncées ; les filamens des étamines de couleur purpurine ; les anthers réniformes, presque rondes. L'ovaire est ovale, tomenteux ; les cinq découpures du stigmate rougeâtres, plus longues que le tube des étamines.

Cette plante croît dans l'Arabie, en face de l'île de Socotra. (*Descript. ex Cavan.*)

SEPTADE. *Septa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des joubarbes, qui a des rapports avec les *sempervivum*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, fort petites, dont les feuilles sont presque toutes radicales ; les fleurs presque disposées en ombelle sur une hampe simple.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à sept découpures profondes ; sept pétales ; sept étamines ; sept ovaires & autant de capsules parallèles, polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice partagé en sept découpures très-profondes, étalées, aiguës, persistantes.

2°. Une corolle composée de sept pétales oblongs, égaux, une fois plus longs que le calice.

3°. Sept étamines dont les filaments sont subulés, de la longueur du calice, terminés par des antères droites, presque vides.

4°. Sept ovaires oblongs, surmontés d'autant de styles subulés, de la longueur des étamines, terminés par des stigmates un peu obtus.

Le fruit consiste en sept capsules oblongues, parallèles, aiguës à une seule valve renfermant plusieurs semences.

E S P È C E S.

1. SEPTADE du Cap. *Septas Capensis*, Linn.

Septas foliis glabris, subrotundis, crenatis; caule subnudo, apice umbellifero. (N.)

Septas Capensis. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 139. — Amœn. Acad. vol. 6. Afric. 13. — Lam. Illustr. Gen. tab. 276. fig. 14. — Andrew. Reposit. tab. 90.

Croffula (septas), foliis connatis, crenatis, subrotundis; caule subaphyllo, umbellifero. Thunb. Prodr. 57.

Doravici species pumila, auricula urfi, folio glabro. Pluken. Mantiff. pag. 65. tab. 340. fig. 9.

Trientalis, foliis subrotundis, crenatis. Roy. Lugd. Bat. 538.

C'est une petite plante herbacée, dont les racines sont grêles, fibreuses, garnies de quelques petits tubercules: il s'en élève une tige menue, filiforme, glabre, cylindrique, presque nue, garnie seulement à sa base de quelques feuilles opposées, réunies par leur base, glabres, charnues, ovales, un peu arrondies, rétrécies en un pétiole court à leur base, crénelées à leur contour.

Les fleurs sont terminales, disposées en une sorte d'ombelle simple, dont les pédoncules sont à égale, uniflores, garnis à leur base d'un involucre composé de quatre ou cinq petites folioles très-courtes, subulées. Les calices sont glabres; les corolles droites, à sept pétales étroits, presque obtus, une fois plus longs que les calices. Les fruits sont composés de sept petites capsules ovales, subulées, parallèles, réunies à leur partie inférieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. * (V. f. in herb. Juss.)

2. SEPTADE trichotome. *Septas trichotoma*.

Septas caule simpliciter; umbellâ compositâ, trichotomâ. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 276. fig. 1.

Cette plante paroît très-distincte de la précé-

dente, par la disposition de ses fleurs. Ses tiges sont grêles, simples, terminées par des fleurs disposées en une sorte d'ombelle composée; les pédoncules connés sont simples, au nombre de trois, munis à leur base d'un involucre composé de quatre ou cinq petites folioles très-courtes, subulées, égales; chaque pédoncule consilvie en trois autres parties, simples, uniflores, munis d'un involucre semblable au premier. Les fleurs ressemblent à celles de l'espèce précédente. Je ne connois point les feuilles qui peut être pourroient offrir quelque caractère particulier, & assurer davantage l'existence de cette espèce.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

Nota. On trouve dans la Flore de la Cochinchine de Loureiro, un genre particulier sous le nom de *septas*, qui n'est point le même que celui-ci, mais qui est voisin des *thunbergia*, & dont le nom doit être changé.

SEPTIFORME (Placenta). *Septiformis placenta*. Le placenta ou le réceptacle des semences prend le nom de *septiforme* ou en forme de cloison, dans plusieurs sortes de fruits, comme dans ceux des érophulaires ou perfonnées, parce qu'occupent le centre de la capsule, & étant dilaté sur ses bords, il fait en même tems les fonctions de cloison.

SÉRATONE. *Crotonopsis*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des euphorbes, qui a de grands rapports avec les *crotons*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples, alternes; les fleurs fort petites, solitaires, réunies en un épi terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques; un calice à cinq découpures; une corolle à cinq pétales, nulle dans les fleurs femelles; cinq étamines libres; trois stigmates presque sessiles; une capsule à une seule loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques; les mâles & les femelles réunis sur le même pied.

* Les fleurs mâles, situées au dessus des fleurs femelles, offrent chacune :

1°. Un calice divisé en cinq découpures très-profondes, ovales, obtuses, un peu concaves.

2°. Une corolle composée de cinq pétales plus petits que le calice, alternes avec les découpures du calice, linéaires, oblongs.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont de la

longueur du calice, terminés par des anthères à deux loges séparées.

* Les fleurs femelles, situées au dessous des fleurs mâles sur le même épi, offrent chacune :

1°. Un *calice* comme dans les fleurs mâles, mais dont les découpures sont subulées.

2°. Point de *corolle*.

3°. Un *ovaire* ovoidé, surmonté de trois stigmates presque fétilles, très-courts, bifides.

Le fruit est une capsule courte, petite, ovale, arrondie, à une seule loge qui ne s'ouvre pas, renfermant une semence presque globuleuse, adhérente à la partie supérieure de la capsule.

L'embryon est renversé, ainsi que la semence; renfermé dans une substance très-épaisse, charnue & huileuse.

Observations. Michaux a donné à ce genre le nom de *crotonopsis* à cause de ses rapports avec les *crotons*. Ce nom est composé de deux mots grecs, *croton* & *opsis* (*crotoni socius*), qui a le port d'un *croton*.

ES P È C E S.

SÉRATONE à feuilles linéaires. *Crotonopsis linearis*. Mich.

Crotonopsis caule erecto, dichotomo, ramossimo; foliis linearibus, obtusis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 186. tab. 46.

C'est une plante foible, herbacée, dont les tiges sont droites, grêles, filiformes, couvertes, ainsi que toutes les autres parties de la plante, d'un duvet très-léger, distribué par de très-petites plaques frangées, divisées en rameaux nombreux, alternes, dichotomes à leur sommet. Les feuilles sont alternes, légèrement pétiolées ou presque fétilles, distantes, petites, longues d'environ un pouce, linéaires, un peu lancéolées, très-entières, obtuses ou à peine aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en petits épis grêles, simples. Quelques fleurs sont axillaires; les fleurs mâles situées à l'extrémité de l'épi; les femelles placées au dessous des mâles. Toutes ces fleurs sont alternes, solitaires, fort petites, légèrement pédonculées ou presque fétilles, munies d'une petite bractée très-courte à leur base; les épis feuillés à leur base, & quelquefois dans leur longueur.

Cette plante croît sur les côtes maritimes de la Caroline, proche Long-Bay, & dans les contrées habitées par les Illinois. Elle a été découverte par Michaux.

SÉRINGA. *Philadelphus*. Genre de plantes dioréylédones, à fleurs complètes, polypétalées,

de la famille des myrtes, qui a des rapports avec les *leptospermum*, & qui comprend des arbrisseaux tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont opposées, point ponctuées; les fleurs disposées en corymbes terminaux ou en épis opposés, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un *calice* supérieur à quatre, quelquefois cinq découpures; quatre pétales; environ vingt étamines icosastriques; un *stigmata* à quatre divisions; une capsule à quatre loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* turbiné, d'une seule pièce, à quatre, quelquefois cinq divisions acuminées, persistantes.

2°. Une *corolle* composée de quatre, quelquefois cinq pétales plans, presque ronds, grands, ouverts.

3°. Environ vingt *étamines*, dont les filaments sont subulés, de la longueur du calice, terminés par des anthères droites, à quatre fillos.

4°. Un *ovaire* à demi-inférieur, surmonté d'un style court, filiforme, terminé par un stigmate à quatre divisions.

Le fruit est une capsule ovale, pointue à ses deux extrémités, environnée par le calice depuis sa base jusque vers son milieu, divisée en quatre loges, à quatre valves, renfermant des semences fort petites, oblongues, nombreuses.

Observations. Ce genre diffère des *leptospermum*, en ce que, dans ce dernier, le stigmate est simple & non divisé en quatre découpures; les capsules couronnées ordinairement par les petites dents du calice. Il convient d'y rapporter quelques espèces de *philadelphus*, mentionnées dans plusieurs auteurs, particulièrement le *philadelphus scoparius*, *laniger* d'Aiton.

ES P È C E S.

1. SÉRINGA en bouquets. *Philadelphus coronarius*. Linn.

Philadelphus foliis subdentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 671. — Mill. Dict. n°. 1. — Haller, Helv. n°. 1100. — Kuiper. Centur. 6. n°. 65. — Hoffm. Germ. 169. — Moench. Hall. n°. 401. — Willd. Arb. 204. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 210. — Vol. II. pag. 538. — Germ. de Fruct. & Sem. Centur. 3. t. h. 15. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 420. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 947. n°. 1.

Philadelphus. Hort. Cliff. 188. — Hort. Upfal.
122.

Syringa alba, seu *philadelphus Arhanei*. C. Bauh. Pin. 398. — Tournef. Inst. R. Herb. 617. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 1. tab. 83.

Frutex coronarius. Cist. Hist. t. pag. 55.

1. *Syringa flore albo*, pleno. C. Bauh. Pin. 398. — Tournef. inst. R. H. rb. 617. — Duham. Arbr. l. c.

Syringa italica, flore albo, pleno. Eyst.

7. *Syringa flore albo*, simplicifolia; subsist. ex luto variegata. Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 3.

Vulgairement *Syringa* ou *Séringa*.

Arbuste d'une médiocre hauteur, très-rameux, dont les tiges s'élèvent à cinq ou six pieds de haut, & dont les branches sont grêles, longues, diffuses, divisées en rameaux courts, cylindriques, opposés, revêtus d'une écorce griseuse ou un peu roussâtre, glabre, striée. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles, un peu blanchâtres en dessous, longues d'environ trois pouces, sur presque deux pouces de large & acuminées à leur sommet, légèrement denticulées à leurs bords; les dentelures courtes, en scie, distantes, presque nulles sur plusieurs feuilles; les nervures saillantes, dont trois principales longitudinales; les pétioles courts, canaliculés.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité de rameaux courts, en un corymbe plus ou moins touffu, en bouquet, quelquefois prolongé, presque en épi; supportées par des pédicules propres, courts, alternes, inégaux, redressés. Leur calice est verdâtre, un peu cendré, glabre, à demi-divisé en cinq découpures ovales, acuminées, un peu réfléchies après la floraison. La corolle est blanche, très-odorante, dont l'odeur approche de celle des fleurs de l'orange; composée de quatre pétales ovales, presque ronds, planes, obovates, quelquefois un peu acuminés par une pointe obtuse, dépourvus d'onglets. Le fruit est une capsule ovale, médiocre, à quatre loges, divisée en quatre valves, contenant des semences fort petites, oblongues, rétrécies à leur base, couronnées par quelques petites dents à peine sensibles à la loupe. Plusieurs des fleurs de cette plante, surtout les premières qui paroissent, ont souvent une division de plus dans toutes leurs parties. Ces fleurs se doublent dans la variété 3. Les feuilles sont panachées de jaune & de vert dans la variété 7.

Cet arbuste croît dans les contrées méridionales de l'Europe. Il est cultivé dans les jardins, & sert de décoration aux bosquets de printemps. Ses fleurs ont une odeur de fleurs d'orange très-agréable, mais trop forte pour être respirées de près. (V. v.)

2. *SÉRINGA nain*. *Philadelphus nanus*. Mill.

Philadelphus foliis ovatis, subdentatis; flore solitario, pleno. Miller, Dict. n°. 2. — Duroi, Hartk. 2. pag. 6.

Syringa nana, nunquam florens. Catal. Hort. Angl. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 4.

Philadelphus coronarius. Var. 3. Linn. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 947.

Philadelphus nanus. Desf. Hort. Paris. 172.

Cet arbuste ne se présente guère que comme une variété de l'espèce précédente. Cependant comme il est constamment au moins une fois plus petit, qu'il a un port un peu différent & quelques autres caractères particuliers, il y a tout lieu de croire qu'il constitue une espèce distincte.

Ses tiges sont à peine hautes de trois pieds, glabres, rameuses; les rameaux opposés, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, opposées, ovales, un peu étroites, moins grandes que celles du *philadelphus coronarius*, glabres à leurs deux faces, acuminées, légèrement denticulées à leurs bords.

Ses fleurs sont blanches, ordinairement latérales, presque solitaires, peu nombreuses, très-odorantes. Les pétales sont ovales, arrondis, souvent en nombre double ou triple; les calices verdâtres, à quatre découpures, les capsules ovales, obtuses, à demi-inférieures. Cet arbuste fleurit difficilement; les fleurs ne paroissent pas régulièrement tous les ans.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

3. *SÉRINGA inodore*. *Philadelphus inodorus*. Linn.

Philadelphus foliis integerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 672. — M. l. Dict. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 948. n°. 3.

Philadelphus flore albo, majore, inodoro. Catesb. Carol. vol. 1. pag. 84. tab. 84.

Syringa caroliniana, flore albo, majore, inodoro. Duham. Arbr. vol. 2. pag. 298. n°. 5.

Philadelphus (inodorus), calice viridi; lociniis superne sensim angustatis, longius acuminatis; petalis candidissimis, amplissimis, patentibus, subovalibus; stylo filaminibus longiore, adscise stigmata indiviso fove solito. Michaux, Flot. boreal. Amer. vol. 2. pag. 283.

Cet arbuste est au moins une fois plus élevé que le *philadelphus coronarius*; les tiges parviennent souvent à la hauteur de quinze à seize pieds & plus. Ses rameaux sont grêles, élancés, un peu rougeâtres; ceux qui portent les fleurs, courts, jaunâtres, lisses, un peu striés, opposés, garnis de

feuilles opposées, pétioles, ovales, très-entières à leurs bords, glabres, vertes à leurs deux faces, un peu plus pâles en dessous, acuminées à leur sommet, marquées de trois nervures longitudinales à peine faillantes.

Les fleurs sont terminales, inodores, peu nombreuses, les unes solitaires, les autres disposées en un corymbe presque ombellé, supportées par des pédoncules droits, simples, presque filiformes, courts, très-glabres. Les calices sont verts, lisses, ovales, divisés à demi en quatre découpures lancéolées, longuement acuminées. La corolle est ample, d'un beau blanc, à quatre pétales planes, un peu ovales, larges, légèrement innuées à leur contour; les étamines beaucoup plus courtes que la corolle; le style épais, une fois plus long que les étamines; le stigmate à quatre divisions obtuses.

Cette plante croît dans la Caroline: on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (V. v.)

SÉRIOLE. *Seriola*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, semi-flosculeuses, de la famille des chichoracées, qui a des rapports avec les *hypocheris*, & qui comprend des herbes exotiques ou indigènes de l'Europe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice simple ou un peu imbriqué; des fleurs semi-flosculeuses, toutes hermaphrodites; une aigrette plumeuse, sessile ou pédonculée; un réceptacle garni de paillettes caduques.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toutes hermaphrodites, composées de demi-fleurons.

Chacune d'elles offre:

1°. Un calice commun, simple, cylindrique, composé d'écaillés droites, linéaires, presque égales ou un peu imbriquées.

2°. Une corolle imbriquée, composée de demi-fleurons nombreux, égaux, tous hermaphrodites, dont le tube est grêle, surmonté d'une languette plane, linéaire, tronquée, divisée en cinq petites dents à son sommet.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments sont courts, capillaires; les anthères oblongues, réunies en cylindre.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates réfléchis.

Les semences sont oblongues, de la longueur du calice, souvent prolongées & rétrécies à leur sommet en pédicelle, surmontées d'une aigrette sessile ou pédicellée, plumeuse, ordinairement à dix rayons ouverts.

Le réceptacle est garni de paillettes caduques, de la longueur du calice.

E S R È C E S.

1. SÉRIOLE lisse, *Seriola levigata*. Linn.

Seriola foliis radicalibus obovatis, dentatis, glabris; caule nudo; pappi simplicis, in radio sessilibus, in disco stipitatis. Dest. l'ort. atlant. vol. 2. pag. 237. tab. 216.

Seriola levisscula, foliis obovatis, dentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1139. — Syll. veget. 721. — Valh. Symbol. 2. pag. 90.

Achyrophorus seré glaber, bellidis glauco dentatoque folio. Vaill. Ad. Paris. Acad. ann. 1721. pag. 278.?

Hieracium ramosum, floribus amplis, calicibus valde hirsutis; foliis oblongis, obtusis, dentibus majoribus, inaequalibus, incis. Rai, Suppl. 144.?

Cette espèce se distingue du *Seriola athenensis* par toutes ses parties entièrement glabres, par les tiges nues, presque simples; par l'aigrette non plumeuse des semences.

Ses racines sont rampantes, épaisses, dures, tortueuses, allongées, de la grosseur du petit doigt, chargées, à la partie supérieure de leur base, de stéoles desséchées & en forme d'écaillés brunes. Elles produisent des tiges droites, lisses, un peu striées, très-glabres, cylindriques, simples ou médiocrement rameuses, hautes d'environ un pied & demi; rarement pourvues de feuilles caulinaires, mais seulement d'une petite écaille subulée à la base de chaque rameau. Les feuilles sont toutes radicales, disposées en rosettes, pétioles, en ovale renversé ou presque spatulées, glabres à leurs deux faces, dentées à leurs bords; les dents aiguës, distantes, decurrentes sur leur pétiole, longues d'environ deux pouces.

Les fleurs sont, ou solitaires, ou plus ordinairement disposées en un corymbe très lâche, pauciflore; soutenues par des pédoncules glabres, filiformes, inégaux, uniflores. Leur calice est glabre, cylindrique, composé de folioles intérieures linéaires, égales, & de quelques folioles extérieures beaucoup plus courtes. La corolle est jaune, assez grande; les demi-fleurons une fois plus longs que les calices, linéaires, dentés à leur sommet; les semences glabres, brunes, grêles, effilées, surmontées d'une aigrette simple, rousseâtre, sessile sur les semences de la circonférence, pédicellée sur celles du disque; le réceptacle garni de paillettes membraneuses & caduques.

Cette plante croît en Barbaie. M. Desfontaines l'a recueillie sur le mont Atlas, dans les tentes des rochers. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

Je n'ai présenté qu'avec doute les synonymes de Vaillant

Vaillant & de Rai, quoique cités par Linné. Cette plante étant bien certainement glabre sur toutes ses parties, Vaillant laisse soupçonner que ses feuilles sont un peu velues, & Rai présente les calices comme très-velus. Cette synonymie, ou annonce des variétés, ou appartient à quelque autre espèce.

2. SÉRIOLE de l'Éma. *Seriola aethensis*. Linn.

Seriola hispida, foliis obovatis, subdentatis. Linn. Spec. Plant. 1139. — Jacq. Observ. 4. pag. 3. tab. 79. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 210. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 227. — Willdenow, Spec. Plant. vol. 3. pag. 1619. n°. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 656. fig. 1.

Hypocharis callicibus aequalibus, hispida. Hort. Clif. 385. — Hort. Upl. 240.

Achyrophorus hirsutus, bellidis obtuso folio. Vaill. Act. Acad. Paris. 1721. pag. 213.

Hieracium multicaule, bellidis folio molli. Bocc. Append. 8.

Toutes les parties de cette plante sont chargées de poils roides, simples, plus ou moins nombreux. Ses racines sont grêles, droites, un peu fusiformes, garnies de fibres roussâtres ou cendrées, presque simples, filiformes : il s'en élève des tiges droites, hautes d'environ un pied, très-rameuses presque dès leur base ; les rameaux étalés, diffus, grêles, cylindriques, hispides, médiocrement garnis de feuilles alternes ; les inférieures pétiolées ; les supérieures sessiles, oblongues, en ovale renversé, munies à leurs deux faces de poils blanchâtres & couchés, arrondies, obovées à leur sommet, rétrécies à leur base & un peu décurrentes sur leur pétiole, pourvues à leur contour de quelques dents rares, distantes, fort petites ; les feuilles terminales étroites, sessiles, lancéolées, aiguës, beaucoup plus petites, situées à la base des pédoncules inférieurs ; les supérieurs ou leurs ramifications ordinairement dépourvus de feuilles ou de bractées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une sorte de corymbe lâche, supportées par des pédoncules droits, allongés, presque simples, hispides, inégaux, uniflores. Les calices sont cylindriques, très-velus, simples, composés d'écaillés linéaires, presque égales, oblongues, un peu obtuses. La corolle est jaune, semi-flosculeuse ; les demi-fleurs hermaphrodites ; les semences lisses, oblongues, surmontées d'une aigrette plumbeuse & pédicellée ; celles de la circonférence dépourvues d'aigrette ; le réceptacle garni de paillettes linéaires, aiguës, caduques.

Cette plante croît dans la Sicile & sur les côtes de Barbarie. Je l'ai recueillie dans les environs de Lacalle, & M. Desfontaines l'a observée dans les campagnes de Mascor. On la cultive au Jardin

Botanique. Tome VII.

des Plantes de Paris, où elle acquiert presque le double de hauteur : toutes ses autres parties sont beaucoup plus grandes, surtout les feuilles. (V. v.)

3. SÉRIOLE piquante. *Seriola urens*. Linn.

Seriola urens, caule ramofo, foliis dentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1139. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1620. n°. 4. — Lam. Illustr. Gener. tab. 656. fig. 2.

Hypocharis foliis dentatis, caule ramofo, foliis callicibus hispida. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 810.

Hypocharis hieracii barbati folio ; calice hispido. Vaill. Act. Paris. Acad. ann. 1721. pag. 215.

Hieracium alpinum, densis leonis folio, acuto, piloso, proscisso ; capitulis pungeni lanugine obsitis. Cap. Cath. 95. — Rai, Suppl. 146.

Cette espèce est remarquable par les poils roides & même piquans qui recouvrent toutes ses parties, & par les calices dont les pointes des écailles sont roides, & pénètrent presque dans la peau lorsqu'on y touche.

Ses tiges sont droites, fermes, cylindriques, un peu striées, hérissées de poils, rameuses ; les rameaux assez nombreux, alternes, sortant de l'aisselle des feuilles, presque simples ou un peu ramifiés, feuilles. Les feuilles sont alternes ; les inférieures pétiolées ; les supérieures sessiles, presque à demi-amplexicaules, ovales, un peu oblongues, vertes à leurs deux faces, un peu plus pâles en dessous, légèrement velues, ciliées à leur contour, légèrement échancrées & dentées à leurs bords ; les dents courtes, distantes, aiguës, arrondies, à peine aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont assez nombreuses, paniculées, disposées alternativement sur des pédoncules communs, allongés, hispides ; les pédoncules propres sont courts, inégaux, simples, uniflores, munis chacun à leur infériorité d'une petite foliole très-courte, ovale, lancéolée, aiguë. Le calice est cylindrique, imbriqué vers la base, composé intérieurement de folioles linéaires, droites, presque égales, un peu hispides, aiguës ; les folioles extérieures en forme d'écaillés courtes, étroites, inégales, aiguës, piquantes, presque épineuses à leur sommet, un peu divergentes. La corolle est jaune ; les demi-fleurs tous hermaphrodites, linéaires, dentées à leur sommet, presque une fois plus longue que le calice, les semences allongées, surmontées d'aigrettes presque sessiles, un peu plumbeuses.

Cette plante se rencontre dans la Sicile. (V. f. in herb. Lam.)

4. SÉRIOLE de Crète. *Seriola cretensis*. Linn.

Q

Seriola hirta, foliis runcinatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1139. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1119. n.º 3.

Archyrophorus hirsutus, dentis leonis folio leviter dentato. Vaill. A&C. Acad. Patif. 740.

Cette plante a des rapports avec le *Seriola urens* ; elle s'en distingue par ses poils moins roides, & surtout par ses calices dont les écailles ne sont point piquantes ; ses feuilles roncinnées la séparent également du *Seriola achenensis*.

Ses tiges sont droites, cylindriques, légèrement striées, rameuses, hérissées de poils lâches & courts, garnies de feuilles alternes, plus nombreuses à la base ; les inférieures pétiolées, roncinnées, décurrentes sur les pétioles ; les supérieures sessiles, couvertes à leurs deux faces de quelques poils blanchâtres, couchées, dentées à leurs bords ; les dents courtes, aiguës, distantes. Les fleurs sont jaunes, disposées en un corymbe lâche, terminal ; les calices cylindriques, composés d'écailles linéaires, presqu'aiguës, inégales, hérissées.

Cette plante croît dans l'île de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. f.)

SÉRISSE. *Serissa.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, infundibuliformes, de la famille des rubiacées, qui a quelques rapports avec les *Spicaea*, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles opposées, réunies à leur base par une stipule vaginale, à fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; une corolle infundibuliforme, ciliée à son orifice ; cinq étamines ; un style bifide ; une baie inférieure, à deux semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq, quelquefois quatre découpures ovales, lancéolées, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est court, le limbe divisé en quatre ou cinq lobes, l'orifice cilié.

3°. Cinq étamines, quelquefois quatre, dont les filaments sont extrêmement courts, presque nuls, les anthères renfermées dans le tube de la corolle.

4°. Un ovaire inférieur, ovale presque rond, surmonté d'un style bifide, terminé par deux stigmates simples.

Le fruit est une baie à deux loges, à deux semences.

SÉRISSE fétide. *Serissa fetida.* Willd.

Serissa foliis oppositis, ovato-lanceolatis, utrinque acutis ; floribus axillaribus, sessilibus. (N.)

Serissa fetida. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1061. — Juss. Gener. Plant. pag. 109. — Lam. Illustr. Gener. tab. 171.

Buchozia coprosmodies. Lhéritier, Monogr.

Dysoa fasciculata. Loureiro, Cochinch. pag. 181.

Lycium (feridum), foliis oppositis, ovato-lanceolatis ; stipulis interfoliaceis, setaceo-spinulentibus ; floribus axillaribus, sessilibus. Linn. f. Suppl. pag. 150.

Lycium (japonicum), inerme ; foliis ovatis, nervosis, planis ; floribus sessilibus. Thunb. Flor. japon. pag. 93. tab. 17.

Lycium (indicum), inerme, foliis ovatis, utrinque acutis, nervosis. Retz. Observ. 2. pag. 11.

Manseer. Kempfer. Amoen. 5. pag. 780.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont droites, glabres, rameuses ; les rameaux opposés ou alternes, garnis de feuilles sessiles, opposées, petites, ovales-oblongues ou lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, aiguës à leurs deux extrémités, marquées de quelques veines simples, un peu saillantes ; réunies à leur base par une stipule vaginale, ciliée à ses bords. Ses feuilles broyées ont une odeur forte, extrêmement désagréable.

Les fleurs sont petites, situées dans l'aisselle des feuilles, presque solitaires, sessiles ; leur calice est glabre, verdâtre, un peu allongé, divisé à son sommet en cinq découpures ovales, aiguës. La corolle est en forme d'enfonnoir ; son tube est court, muni à son orifice de poils fins ; le limbe divisé en quatre, plus ordinairement cinq lobes ovales, obtus. Le fruit est une baie inférieure, à deux loges, à deux semences.

Cette plante croît naturellement dans les Indes orientales, à la Chine, au Japon, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. f (V. f.)

SERPICULE. *Serpicula.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des onagres, qui a des rapports avec les *montina*, & qui renferme des herbes exotiques à l'Europe, rampantes, à feuilles alternes, & dont les fleurs sont axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :°

Des fleurs monoïques ; dans les fleurs mâles, un calice d'une seule pièce, à quatre découpures ; une co-

rolle à quatre pétales, quatre étamines courtes; dans les fleurs femelles, un ovaire inférieur, une noix cylindrique, toruleuse, à une seule semence.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont les unes mâles, les autres femelles, sur le même individu.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à quatre divisions courtes, droites, persistantes.

2°. Une corolle composée de quatre pétales oblongs, obus, sessiles, caducs.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont très-courts, capillaires, terminés par des anthères linéaires, de la longueur de la corolle.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice fort petit, presque nul.

2°. Une corolle nulle (ou caduque).

3°. Un ovaire inférieur ovale, sillonné, surmonté d'un style épais, très-court, persistant, terminé par un stigmate obus.

Le fruit est une noix cylindrique, marquée extérieurement d'environ huit côtes cartilagineuses, à une seule loge, renfermant une seule semence.

Observations. Ce genre, d'après les observations de Thunberg, est le même que le *Laurembergia* établi par Bergius dans la *Description des Plantes du Cap de Bonne-Espérance*. Quoique l'exposé des caractères génériques présentés par ce dernier auteur, ne soit pas en tout parfaitement conforme à celui que Linné nous a donné, ce n'est pas une raison pour regarder ces deux genres comme réellement distincts, d'autant plus que ces différences elles-mêmes ne pourroient être considérées que comme des distinctions spécifiques. D'ailleurs, Linné n'a connu ce genre que très-imparfaitement. Il ne dit rien du style & du stigmate. Les fleurs femelles, d'après lui, sont munies d'un calice fort petit, supérieur, persistant, à quatre découpures. Ce calice manque, d'après Bergius, mais cet auteur reconnoît à sa place une sorte de croûte anguleuse, presque charnue, persistante, qui enveloppe l'ovaire en entier. Il y a lieu de soupçonner qu'il s'agit ici du même organe, sous deux dénominations différentes. Enfin, la figure du *Laurembergia repens*, présentée par Bergius, & les caractères que Linné attribue au *Serpicula repens*, se rapportent tellement, que je n'hésite point à considérer ces deux plantes comme appartenantes à la même espèce.

E S P È C E.

SERPICULE rampante. *Serpicula repens*. Linn.

Serpicula foliis alternis, integerrimis. Linn. f. Suppl. pag. 416. — Lam. Illustr. Gen. tab. 788.

Serpicula foliis linearibus. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 124.

Serpicula repens. Linn. Syst. veget. edit. 13. pag. 708. — Mantill. 124.

Serpicula serpillifolia. Burm. Prodr. 26.

Laurembergia repens. Berg. Plant. Cap. pag. 350. tab. 5. fig. 10.

C'est une petite plante herbacée, rampante, à laquelle la forme de ses feuilles & son port donnent l'aspect du *serpilla serpillifolia*. Ses tiges sont glabres, filiformes, cylindriques, médiocrement rameuses, longues de quelques pouces, couchées, rampantes, radicales à leur partie inférieure, garnies de feuilles nombreuses, alternes, fort petites, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, presque obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base presque en un périoie très-court, longues de cinq à six lignes, munies dans leurs aisselles de plusieurs autres petites feuilles.

Les fleurs sont monoïques, toutes axillaires. Les fleurs mâles sont pédonculées dans l'aisselle des feuilles supérieures, réunies ordinairement au nombre de deux ou de quatre, rarement solitaires; les pédoncules droits, très-longs, capillaires, velus, uniflores; le calice également velu, fort petit, à quatre divisions courtes, droites, linéaires; les pétales, au nombre de quatre, plusieurs fois plus longs que les calices, pubescens en dehors, linéaires, concaves, obtus, caducs; les filaments très-courts; les anthères droites, tétragones, très-longues.

Les fleurs femelles sont sessiles ou à peine pédonculées, situées dans l'aisselle des feuilles inférieures, presque solitaires ou quelquefois réunies deux ou trois, dépourvues de corolle, & même de calice selon Bergius. L'ovaire est ovale; le style court, épais, un peu pubescent. Le fruit est une noix toruleuse, à une seule loge, à une seule semence.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

* Espèce moins connue.

* *Serpicula* (verticillata), *foliis verticillatis, aculeato-ferratis*. Linn. f. Suppl. pag. 416.

SERRÉE ou très-rapprochée (Panicle). *Panicula coarctata*. On dit qu'une panicle est serrée lorsque ses rameaux sont nombreux, rapprochés & très-serrés contre la tige, comme dans le *metula carulea*. La même expression a lieu pour plusieurs autres parties des plantes, qui offrent la même

caractère, comme les feuilles, les branches, les pédoncules, &c.

SÉSAME ou JUGEOLINE. *Sesamum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des bignonées, qui a des rapports avec les *cheloë*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles opposées, plus souvent alternes; les fleurs solitaires, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions inégales; une corolle campanulée, à cinq lobes, l'inférieur plus grand; quatre étamines didynames; le rudiment d'une cinquième; un stigmate lanceolé; une capsule à quatre loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, court, persistant, divisé en cinq découpures inégales, droites, lancéolées; la découpure supérieure plus petite.

2°. Une corolle monopétale, presque campanulée; le tube court, arrondi, à peine de la longueur du calice; le limbe ouvert, sensé, très-grand, un peu courbé & campanulé, divisé, à sa partie supérieure, en cinq lobes inégaux; quatre presque égaux, étalés; le cinquième inférieur, un peu plus long que les autres.

3°. Quatre étamines didynames, insérées sur le tube de la corolle, dont les filamens sont courts, sétacés, ascendans, moins longs que la corolle; les deux filamens intérieurs plus courts; le rudiment d'un cinquième; les anthers droites, oblongues, aiguës.

4°. Un ovaire ovale, velu, surmonté d'un style filiforme, ascendant, un peu plus long que les étamines, terminé par un stigmate lanceolé, divisé en deux lames parallèles.

Le fruit est une capsule allongée, obscurément tétragone, un peu comprimée, acuminée, à quatre sillons, à quatre loges, ou, selon Jussieu, à deux loges; chaque loge partagée par la faille de l'angle rentrant du sillon.

Les semences sont nombreuses, un peu ovales, petites, attachées à un réceptacle grêle, central.

Observations. Ce genre a beaucoup de rapports avec les *digitales*, par la grandeur & la forme de ses corolles, & par le rudiment d'une cinquième étamine : il en diffère par ses capsules. Ces dernières lui donnent bien plus d'affinité avec le genre *cheloë*. Quelques-unes des espèces qui le compo-

sent, quoique très-peu nombreuses, offrent quelques difficultés, n'étant guère distinguées que par les formes de leurs feuilles, qui varient dans la même espèce, variétés que la culture peut encore avoir favorisées.

Retzius avait rapporté à ce genre, sous le nom de *sesamum javanicum*, le *columnia longifolia* de Linné, que M. Vahl a jugé n'appartenir à aucun de ces deux genres, qu'il a rangé dans un genre particulier, & dont il a fait les *achimenes sesamoides*, dont le caractère essentiel est d'avoir un calice à cinq divisions, une corolle monopétale, dont le limbe est plane, divisé en quatre lobes presque égaux; les étamines réunies à leurs antères; une capsule à deux loges.

Le *sesamum prostratum* de Retzius (Observ. bot. 4. pag. 28) a de grands rapports avec le *toronia asatica*, & Willdenow soupçonne, avec assez de raison, que ce pourroit bien être la même plante ou du moins une espèce très-voisine.

ESPÈCES.

1. SÉSAME d'Orient. *Sesamum orientale*. Linn.

Sesamum foliis ovato-oblongis, integris. Linn. Syst. veget. pag. 574. — Hort. Cliff. 318. — Flor. zeyl. 318. — Mater. medic. 157. — Miller, Dict. n°. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 558. n°. 1. — Germ. de Fruct. & Sem. tab. 110. — Lam. Illustr. Gener. tab. 528.

Sesamum pedunculo inter duas glandulas. Virid. Cliff. 60. — Royle, Lugd. Bat. 261. — Gronov. Orient. 76.

Sesamum veterum. C. Bauh. Pin. 17.

Sesamum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 896. Icon.

Digitalis orientalis, sesamum d'Ha. Tourne. Inst. R. Herb. 165. — Burm. Thes. zeyl. 87. tab. 38. fig. 1.

Sesamum. Dodon. Pempt. 532. Icon. Bona.

Schit elu. Rheed. Malab. 9. pag. 105. tab. 54.

Vulgairement sésame, jugeoline.

Ses tiges sont droites, herbacées, presque cylindriques, peules, hautes d'environ deux pieds. & plus, munies, à leur partie inférieure, de quelques rameaux courts, inégaux, un peu velus, obscurément quadrangulaires. Les feuilles sont ovales, oblongues; les inférieures opposées, longuement pétioolées, presque entières ou garnies de quelques dents fort distantes, en fcie; les supérieures presque alternes, médiocrement pétioolées, beaucoup plus étroites, très-entières, vertes à leurs deux faces, plus pâles en dessous, garnies de quelques poils rares & courts, légèrement ciliées à leurs bords, veinées, acuminées à leurs sommets.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par un pédoncule court, garni à sa base de deux bractées linéaires, courtes, entre chacune desquelles est située une glande jaunâtre & perforée. Le calice est légèrement cilié, divisé à son orifice en cinq découpures lancéolées, aiguës; la supérieure un peu plus courte. La corolle est blanche, assez semblable, par sa forme & par sa grandeur, à celle de la digitale purpure. Son limbe est divisé en cinq lobes obtus, inégaux; l'inférieur plus allongé. Les capsules sont oblongues, un peu comprimées, marquées de quatre sillons profonds, terminées par le style subulé, persistant; marquées de côtes transversales, s'ouvrant par leur sommet en deux valves, chaque valve composée de deux loges.

Cette plante, originaire des Indes, croît naturellement à l'île de Ceylan, au Malabar. On la cultive en Égypte & dans plusieurs contrées de l'Orient, comme plante économique. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

Le sésame, connu aussi sous le nom de *jueoline*, & qui porte en Égypte celui de *semim*, y est cultivé avec beaucoup de soin, ainsi que dans le Levant, dans l'Italie. On retire de ses semences une huile que les Arabes nomment *sirick*. Cette plante & son huile ont été de tout temps en grande réputation dans l'Orient. Les Babyloniens ou anciens habitants de Bagdad ne se servoient, au rapport d'Hérodote, que de l'huile qu'ils exprimoient du sésame. Plin en parle comme étant également bonne à manger & à brûler, & Dioscoride dit que les Égyptiens en faisoient un grand usage. Il est probable, dit Sonnini, que les peuples actuels des mêmes pays, fort ignorans dans la manipulation des huiles, puisque celle qu'ils retirent de l'olive est fort mauvaise, & propre seulement à la fabrique du savon & à l'usage des manufactures, ne savent pas donner à l'huile de sésame les qualités qu'elle pourroit avoir & qu'elle posséderoit vraisemblablement autrefois.

Les Égyptiens donnent le nom de *tahiné* au marc de l'huile de sésame, auquel ils ajoutent du miel & du jus de citron. Ce ragout est fort en vogue, & ne mérité guère de l'être.

Outre leurs propriétés économiques, le sésame & ses préparations font encore en usage chez les Égyptiens, comme remèdes & comme cosmétiques. Les femmes prétendent que rien n'est plus propre à leur procurer cet embonpoint que toutes recherchent, à leur nettoyer la peau, & à lui donner de la fraîcheur & de l'éclat; à entretenir la beauté de leurs cheveux; enfin à augmenter la quantité de leur lait lorsqu'elles deviennent mères. La médecine égyptienne y trouve également des moyens réels ou supposés de guérison dans plusieurs maladies. On la recommande surtout dans les ophthalmies, quoiqu'elle n'y produise presque

aucun effet. (Voyez Sonnini, *Voyage en Égypte*, vol. 3. pag. 255.)

2. SÉSAME des Indes. *Sesamum indicum*. Linn.

Sesamum foliis ovato-lanceolatis, inferioribus trilobis, superioribus indivisis; caule erecto. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 359. n°. 3.

Sesamum foliis inferioribus trifidis. Linn. Syst. veget. pag. 574. n°. 2. — Roy. Lugd. Bat. 292. — Miller, Dict. n°. 2. — Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 113. n°. 46.

Sesamum foliis inferioribus trifidis, dentatis; superioribus oblongis, serratis. Brown, Jam. 270.

Sesamum indicum. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 204. tab. 76. fig. 1.

Sesamum alterum, foliis trifidis, orientale, semine obscuro. Pluk. Almag. pag. 344. tab. 109. fig. 4.

Digitalis orientalis altera, semine obscuro. Tourn. Inst. A. Herb. 165.

Je serois très-porté à croire que cette plante n'est qu'une variété du *Sesamum orientale*, quoique son port soit un peu différent, & que ses feuilles, surtout les inférieures, soient trifides ou divisées en trois lobes aigus; elles sont d'ailleurs, comme dans l'espèce précédente, légèrement dentées en scie, longuement pétioles, ovales, lancéolées, acuminées; les feuilles supérieures oblongues, plus étroites, entières ou légèrement dentées, supportées par des pétioles bien plus courts, alternes, munis dans leurs aisselles de deux grosses glandes presque globuleuses, jaunâtres, creuses à leur sommet, exsultantes également dans les aisselles où il n'y a point de fleurs. Celles-ci sont solitaires, médiocrement pédonculées, axillaires.

Les tiges sont droites, herbacées, plus élevées & plus rameuses que celles du *Sesamum orientale*, ordinairement glabres, ainsi que les autres parties de cette plante. D'après Forskhal, on la cultive en Égypte, où elle est employée aux mêmes usages que la précédente. On retire, particulièrement de ses semences, une huile employée dans les aliments & à éclaircir.

Cette plante croît naturellement dans les Indes. O

3. SÉSAME lacinié. *Sesamum laciniatum*. Willd.

Sesamum foliis omnibus tripartitis, laciniatis; caule prostrato, hispido. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 359. n°. 4.

Sesamum laciniatum. Klein.

Cette espèce, qui a de grands rapports avec les deux précédentes, dont elle paroît être intermédiaire, en diffère par ses tiges étendues sur la terre, garnies de poils roides, divisées en rameaux

assez nombreux, ascendants ou redressés à leur partie supérieure.

Les feuilles sont opposées, médiocrement pétiolées, toutes profondément partagées en trois lobes obtus à leur sommet, profondément dentées à leurs bords, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, rudes à l'un des deux faces. Les fleurs sont solitaires, axillaires, médiocrement pédonculées; les calices d'une seule pièce, à cinq découpures lancéolées, aiguës, hispides à leurs bords; les capsules oblongues, obtuses à leurs deux extrémités, terminées par le style persistant, large, aigu, s'ouvrant en deux valves, divisées en quatre loges.

Cette espèce croît dans les Indes orientales, dans les environs d'Hydrabad.

Observations. Miller, dans son *Dictionnaire des Jardiniers*, cite une autre espèce de sésame sous le nom de *sésamum* (trifoliatum), *foliis omnibus trifidis*, qui paroît avoir de très-grands rapports avec la plante précédente. On la cultive, dit-il, dans toutes les contrées de l'Orient, ainsi qu'en Afrique, comme une plante légumineuse. Elle a été depuis peu transportée dans la Caroline par les Nègres africains, où elle a très-bien réussi.

Les habitants de ces contrées expriment de ses graines une huile qui se conserve plusieurs années, & ne contracte aucune odeur ni goût de rance; mais au contraire elle devient tout-à-fait douce au bout de deux ans, perd alors le goût chaud qu'elle avoit d'abord, de sorte qu'on s'en sert pour des salades, & qu'elle remplace fort bien l'huile d'olive.

Les Nègres font aussi usage de cette plante comme aliment: ils la font sécher sur le feu, la mêlent avec de l'eau, & l'éteuvent avec d'autres ingrédients; ce qui fait une nourriture saine. On en fait aussi quelquefois une espèce de *pouding*, de même qu'avec le riz & le millet, que bien des personnes trouvent bon. On lui donne à la Caroline le nom de *kenny* ou *kenny*. On cultive cette plante en Angleterre, dans les jardins botaniques.

4. SÉSAME à fleurs jaunes. *Sesamum lateum*. Retz.

Sesamum foliis lanceolatis, longi petiolatis; corollis exilis hispida. Retz. *Observ.* 6. pag. 31. — Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 358. n°. 2.

Ses tiges sont droites, un peu flexueuses, particulièrement à leur partie supérieure, feuillées dans toute leur longueur. Les feuilles sont alternes, longuement pétiolées, lancéolées, aiguës, garnies, tant par leurs nervures qu'à leurs bords, de poils très-courts. Les fleurs sont solitaires, axillaires, médiocrement pédonculées; le pédoncule presque adné avec la base du pétiole. Le ca-

lice, ainsi que les capsules, est chargé de poils roides. La corolle est d'un jaune-foncé, hispide extérieurement.

Cette plante croît dans les forêts des Indes orientales. (*Descript. ex Retz.*)

SESBANE. *Sesban*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, papilionacées, de la famille des légumineuses, qui a de grands rapports avec les *aschinomene* & les *coronilla*, &c. & qui comprend des arbrustes ou des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont aïlées, avec une impaire, munies de stipules; les fleurs disposées en grappes; quelques-unes remarquables par la grandeur de leur corolle.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq dents égales; une gousse allongée, presque cylindrique, à peine articulée, à deux valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, d'une seule pièce, divisé à son orifice en cinq dents égales, pointues.

2°. Une corolle quelquefois très-grande, papilionacée, dont l'étendard est étendu, un peu en cœur; les ailes presque ovales, obtuses, plus courtes que l'étendard; la carène de la longueur des ailes, comprimée, acuminée.

3°. Dix étamines diadelphes, dont les filaments sont réunis en un seul paquet; souvent un filament solitaire, terminé par des anthères petites, un peu arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, allongé, grêle, cylindrique, surmonté d'un style subulé, recourbé, terminé par un stigmate obtus, très-simple.

Le fruit est une gousse presque cylindrique, presque point articulée, à deux valves, contenant plusieurs semences.

Observations. Ce genre diffère des *hedysarum* & des *aschinomene* par la forme de ses siliques point articulées, plus ou moins cylindriques, ordinairement très-allongées; par ses calices, dont toutes les dents sont égales. Il a beaucoup plus de rapports avec les *coronilla*, mais dans celles-ci le calice est divisé en deux lèvres à son orifice; les dents de la lèvre supérieure sont conniventes. On peut ajouter, comme caractères secondaires, que dans la plupart des *coronilla* les fleurs sont disposées en un corymbe presque ombellé; elles sont toutes en grappes dans les *sesbanes*.

La plupart des espèces que j'ai cru devoir réunir dans ce genre, sont des *aschinomene* dans Linné, que Willdenow a réunis ensuite aux *coronilla*.

1. SESBANE à grandes fleurs. *Sesban grandiflora*.

Sesban foliis oblongis, emarginatis, glabris; floribus maximis; leguminibus filiformibus, rectis; caule arborato. (N.)

Æschinome (grandiflora), caule arboroso, foliis maximis, leguminibus filiformibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1060. — Mill. Dict. n.º 6. — Swartz, Obsev. 283. — Vahl, Symbol. 1. pag. 53.

Coronilla (grandiflora), racemis subrifloris; foliis oblongis, emarginatis, glabris; lomentis filiformibus, rectis, compressis; caule arboroso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1145. n.º 1.

Robinia pedunculata subdivisa, foliis pinnatis, floribus folio majoribus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 712.

Dolichos (arborosus), floribus ferrugineis, caudice arboroso. Forsk. Flor. Ægypt-arab. pag. 134.

Sesban officis, arbor India orientalis. Breyn. Prodr. 1. — Comm. Milab. 244.

Golega officis malabarica, arborescens; siliquis majoribus, umbellatis. Rai, Hist. 1734.

Turia. Rumph. Amboin. vol. 1. p. 183. tab. 76.

Agaty. Rheed. Hort. Malab. vol. 1. pag. 95. tab. 51.

Vulgairement l'agathis ou agathy.

Nous ne connoissons, dans la famille des légumineuses, aucune plante qui offre de plus grands & de plus belles fleurs que cette espèce & la suivante.

C'est un arbrisseau très-élegant, dont les tiges sont droites, glabres, hautes de six à huit pieds, garnies à leur partie supérieure de rameaux étalés, un peu touffus, chargés de feuilles nombreuses, alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées de folioles petites, oblongues, opposées, glabres à leurs deux faces, entières, à leurs bords, un peu échancrées à leur sommet, presque sessiles ou un peu aiguës à leur base.

Ses fleurs sont de la grosseur d'un œuf de poule, réunies en petites grappes un peu pendantes, ordinairement au nombre de deux ou trois & plus sur chaque grappe. Leur calice est glabre, un peu campanulé, divisé à son orifice en cinq dents égales, les deux supérieures rapprochées. La corolle est très-grande, jaune ou un peu couleur de rouille; l'étendard ovale, fort étendu; les ailes ovales-oblongues, légèrement courbées en faux vers leur sommet; la carène semblable aux ailes; les étamines diadelphes, un filament libre; le stigmate obtus, légèrement recourbé; le style un peu droit à la partie supérieure. Les gouffes sont longues,

très-grêles, cylindriques, g'abres, un peu comprimées, droites, point sensiblement articulées, renfermant des semences en forme de rein, que l'on assure être un bon aliment.

Cette plante croît dans les Indes orientales, sur la côte du Malabar. Foischal l'a également observée dans l'Égypte. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Ce seroit une acquisition précieuse pour les bosquets de décoration, si ce bel arbrisseau pouvoit s'acclimater dans nos contrées. On prétend que dans les années pluvieuses ce bel arbrisseau se couvre trois & quatre fois de fleurs & de fruits. h (V. f.)

2. SESBANE à fleurs écarlates. *Sesban coccinea*.

Sesban foliis oblongis, emarginatis, pulverulentis; leguminibus filiformibus, subarcuatis, compressis; caule arboroso. (N.)

Coronilla (coccinea), racemis subrifloris; foliis oblongis, emarginatis, pulverulentis; lomentis subarcuato-filiformibus, compressifolius; caule arboroso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1146. n.º 2.

Æschinome (coccinea), arborosa, foliis pinnatis, foliolis numerosis, linearibus, obtusis, pulverulentis; leguminibus compressis, aequalibus. Linn. f. suppl. pag. 330.

Æschinome (coccinea), caule arboroso, foliis innatis, foliolis ovato-oblongis, obtusis, mucronatis; leguminibus subarcuato-filiformibus, compressifolius. Forst. Prodr. n.º 273.

Toeri-mera. Rumph. Herb. Amboin. vol. 1. pag. 190. tab. 77.

Ce joli arbrisseau, très-voisin de *Sesban grandiflora*, ne lui est pas inférieur en beauté: ses fleurs, de même grandeur, pourroient obtenir la préférence par leur belle couleur écarlate; & ce qui rend cette espèce bien distincte ou premier aspect.

Ses tiges sont droites, ligneuses, affez élevées, divisées en rameaux glabres, alternes, inégaux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles ovales, oblongues, presque linéaires, glabres à leurs deux faces, verdâtres, recouvertes d'une poussière blanchâtre ou cendrée, entières à leur contour; les ailes obuses & légèrement mucronées, d'autres échancrées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en petites grappes vers l'extrémité des rameaux, composées chacune de deux ou trois fleurs médiocrement pédonculées, dont le calice est glabre, à cinq dents aiguës; la corolle parfaitement semblable, tant par sa grandeur que par sa forme, à celle de la *Sesban* à grandes fleurs; les gouffes sont longues, très-étroites, cylindriques, un peu arquées, légèrement comprimées, presque subulées à leur sommet.

Cet arbrisseau se rencontre dans les Indes orientales, aux îles des Amis & à la baie Botanique. ¶

3. SESBANE d'Égypte. *Sesban aegyptiacus*.

Sesban racemis multifloris, foliis linearibus, obtusis, mucronatis, rachi foliorum levi; leguminibus filiformibus, teretibus; caule fruticoso. (N.)

Coronilla sesban. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1147. n°. 4.

Æschinomene (sesban), caule herbaceo, levi; leguminibus cylindricis, aequalibus, foliis obtusis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1061. — Mill. Dict. n°. 4. — Vahl, Symbol. 1. pag. 54.

Dolichos æschinomene sesban. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 134.

Galega aegyptiaca, siliquis articulatis. C. Bauh. Pin. 352.

Sesban. Prosp. Alpin. ægypt. pag. 81. tab. 82.

Ses tiges sont droites, glabres, ligneuses, un peu spongieuses, presque cylindriques ou obscurément anguleuses, hautes de quatre ou six pieds & plus, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétioles, ailées avec une impaire, composées de folioles légèrement pétioles, opposées, nombreuses, de vingt-neuf à trente-trois & plus, linéaires, petites, obtuses à leur sommet, mucronées, entières à leurs bords, presque toutes égales, glabres, vertes à leurs deux faces; le pétiole commun articulé à sa base, muni, au lieu de stipules, d'une forte callosité.

Les fleurs sont disposées en grappes rameuses; le calice est court, divisé à son bord en cinq dents courtes, égales. La corolle est petite, de couleur jaune; l'étendard en forme de cœur, échancré à son sommet, ponctué en dessous de taches de rouille, termine à sa base par un onglet linéaire, muni intérieurement de deux petites dents lancéolées, redressées, conniventes; les ailes oblongues, prolongées à leur base en un angle aigu; la carène un peu blanchâtre, tronquée, échancrée à sa partie antérieure, lancéolée, acuminée à son sommet; les étamines diadelphes; un filament libre. Les gouffes sont glabres, alongées, cylindriques, un peu relevées à chaque semence. Celles-ci sont oblongues.

Cette plante croît naturellement en Égypte. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ¶ (V. f.)

Cet arbrisseau est généralement cultivé & employé en Égypte pour former des haies & séparer les possessions. Il est d'un aspect agréable, & croît très-promptement: en moins de trois ans, il est parvenu à la plus grande hauteur. Ses tiges sont

au moins de la grosseur du bras; elles sont d'une grande ressource pour le chauffage dans un pays où il n'existe presque point de forêts, & où le bois est très-rare.

4. SESBANE épineuse. *Sesban aculeatus*.

Sesban racemis paucifloris; foliis linearibus obtusis, mucronatis; rachi foliorum aculeata; leguminibus filiformibus, teretibus; caule herbaceo. (N.)

Coronilla aculeata. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1147. n°. 5.

Æschinomene (bispinosa), caule herbaceo, strigis rarissimis armato, foliis glabris; costâ spinulosa; leguminibus teretibus, longissimis, glabris. Jacq. Ic. Rar. 3. tab. 564.

Æschinomene sesban. Jacq. Collect. 2. pag. 283.

Emerus filiquis geminatis, longissimis. Burm. Thes. Zeyl. pag. 93. tab. 43. ?

Galega indica frutescens, spinulosa; siliquis angustis, longissimis; folio mimosa. Burm. Zeyl. pag. 103.

Colutea exotica, angustifolia, floribus luteis, eversâ parte eleganter punctatis. Pluken. Phytogr. tab. 164. fig. 5.

Colutea sesban, aegyptia foliis accedens, madras-patana. Pluken. Phytogr. tab. 164. fig. 2.

Kedangu. Rheed. Hort. Malab. vol. 6. pag. 49. tab. 27.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *sesban aegyptiacus*; elle en diffère en ce que ses tiges sont herbacées, ses racines annuelles, ses pétioles chargées de quelques petites épines.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétioles, ailées, avec une impaire; composées de folioles opposées, légèrement pétioles, linéaires-oblongues, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, mucronées, vertes, glabres à leurs deux faces; les pétioles munies dans leur longueur de quelques petites épines, quelquefois deux seulement à leur base.

Les fleurs sont d'une grandeur médiocre, réunies en petites grappes peu garnies, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, solitaires, ordinairement plus courtes que les feuilles; les pédoncles propres simples, alternes; le calice est glabre, court, divisé en cinq petites dents. La corolle est jaune, semblable à celle du *sesban aegyptiacus*. Les gouffes sont très-longues, droites, grêles, cylindriques, un peu noueuses, mais sans articulations sensibles; souvent de cinq à six fleurs à chaque grappe: il n'en fructifie que deux ou trois.

Cet

Cette plante croît à l'île de Ceilan & au Malabar. La plante figurée dans Burmann est ligneuse. D'après cet auteur, il ne fait aucune mention des petites épines des pétioles. Elle ne convient guère à la nôtre, que par ses grappes très-peu garnies de fleurs. (V. f.)

5. *SESBANE* d'Amérique. *Sesban occidentalis*.

Sesban racemis paucifloris, foliolis ellipticis; leguminibus teretibus, filiformibus; caule fruticoso. (N.)

Coronilla occidentalis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1148. n° 3.

Emetus filiquis longissimis & angustissimis. Plum. Spec. Plant. Amer. 19. & Icon. 125. fig. 1.

Cette plante tient le milieu entre la *Sesban* d'Égypte & la *Sesban* épineuse; elle diffère de la première par ses fleurs bien moins nombreuses, & de la seconde par ses pétioles dépourvus de pointes épineuses. Peut-être n'en est-elle qu'une variété & peut-être encore ces trois espèces devoient-elles être réunies.

Celle-ci a des tiges droites, glabres, ligneuses, pourvues de rameaux grêles, inégaux, assez nombreux, garnis de feuilles pétioles, alternes, ailées, composées d'un petit nombre de folioles opposées, un peu pédicellées, elliptiques, entières à leurs bords, glabres, vertes à leurs deux faces, obtuses à leurs deux extrémités. Les fleurs sont jaunâtres, petites, disposées en grappes peu garnies; les gouffes cylindriques, fort longues, très-étroites, presque filiformes.

Cette plante croît dans les Indes occidentales.

h

6. *SESBANE* à tige effilée. *Sesban virgata*.

Sesban racemis multifloris, foliolis ellipticis; leguminibus linearibus, ensiformibus, compressis, tetragonis; caule herbaceo. (N.)

Coronilla virgata. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1148. n° 8.

Æschynomene (virgata), caule virgato; leguminibus tetragonis, erectis. Cavan. Icon. Rat. vol. 3. pag. 47. tab. 293.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, très-simples, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes, pétioles, ailées, sans impaire; composées d'environ dix à onze paires de folioles ovales, opposées, légèrement pédicellées, entières, glabres, obtuses, terminées par une petite pointe particulière; les pétioles munis à leur base de petites stipules lancéolées, caduques.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, axillaires, un peu pendantes, plus courtes que les feuilles. Le calice est glabre, d'une seule pièce,

Botanique. Tome VII.

campanulé, divisé à son orifice en cinq dents courtes, aiguës; deux supérieures; trois inférieures. La corolle est d'une grandeur médiocre, de couleur jaune; l'étendard grand, échancré à son sommet, élargi; les ailes ovales, coubées en faux, plus courtes que l'étendard; la carène en forme de demi-lune, bise à ses deux extrémités. Les étamines ont un de leur filament libre, leurs anthères petites, ovales. L'ovaire est oblong, surmonté d'un style subulé, ascendant, terminé par un stigmate obtus. Les gouffes sont longues, comprimées, tétragones, aiguës à leurs deux extrémités; elles renferment des semences luisantes, ovales, échancrées en rein.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. On la cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid, où elle fleurit à la fin du mois d'août.

7. *SESBANE* à fleurs tachetées. *Sesban picta*.

Sesban racemis multifloris, pendulis; foliolis linearibus, obtusis; leguminibus filiformibus, teretibus, moniliformibus; caule herbaceo. (N.)

Coronilla picta. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1148. n° 7.

Æschynomene (picta), foliis pinnatis; pinnulis linearibus, obtusis; floribus racemosis; vexillo postice picto. Cavan. Icon. Rat. vol. 4. pag. 7. tab. 314.

Ses tiges sont glabres, hautes de cinq à six pieds, droites, cylindriques, munies de rameaux alternes, nombreux, diffus, garnis de feuilles pétioles, alternes, ailées, sans impaire; composées d'environ dix-huit paires de folioles linéaires, lancéolées, très-glabres, obtuses à leur sommet, quelquefois un peu échancrées, longues d'environ un demi-pouce, opposées, pédicellées; les pétioles accompagnés de bractées caduques & subulées.

Les fleurs sont disposées en grappes pendantes, axillaires, plus longues que les feuilles; les pédoncules partiels filiformes, alternes, longs d'environ un pouce, munis, à leur point d'insertion, d'une petite bractée très-courte, & presque sous le calice, de deux autres subulées & caduques. Le calice est glabre, campanulé, terminé par cinq dents courtes, presque égales à la corolle; le grand, d'un beau jaune; l'étendard presque orbiculaire, échancré, droit, un peu rabattu à son sommet, marqué, à sa partie antérieure, d'un grand nombre de petits points & de taches noires; les ailes ovales-linéaires, courbées en faux à leur base; la carène plus courte que les ailes, bise à ses deux extrémités. Un des filets est libre; les anthères brunes & ovales; les gouffes cylindriques, un peu arquées, alongées, composées d'environ seize articulations ovales, qui renferment chacune une semence ovale.

R

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne & au Cap de Bonne-Espérance. Cultivée dans le Jardin royal des Plantes de Madrid, elle y a fleuri dans le courant de l'automne.

8. *SESBANE* chanvré. *Sesban cannabina*.

Sesban pedunculis unifloris, subgeminatis; foliis linearibus, obtusis, mucronatis; rachis foliorum levibus; leguminibus filiformibus, compressis; caule herbaceo. (N.)

Coronilla cannabina. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1148. n.º 6.

Æschynomene (cannabina), caule herbaceo; foliis ovatis, acuminatis; pedunculis foliariis; leguminibus compressis, levibus. Retzius, Observ. 5. pag. 26.

Ses tiges sont herbacées, anguleuses, striées, légèrement piluleuses, garnies de feuilles alternes, pétioles, ailées, dont les folioles sont nombreuses, opposées, pileuses, pédicellées, glauques en dessous, linéaires, obtuses, surmontées d'une petite pointe très-courte; les pédicelles barbus au point de leur insertion.

Les fleurs sont petites, situées, dans l'aisselle des feuilles, sur des pédoncules simples, foliaires, uniflores. Leur calice est glabre, campanulé. Les gousses sont longues, linéaires, très-fines, comprimées, un peu tétragones.

Cette plante croît dans les Indes, sur les côtes du Malabar. ☉

Les tiges de cette plante, traitées comme celles du chanvre, fournissent des fils d'un bon usage.

SESEL. *Sirifolia*. *Cajuputi*. Rhumph. Herbar. Amboin. vol. 3. pag. 64. tab. 36. 37.

Arbre des Indes, mentionné dans l'*Herbarium amboinense* de Rhumphius, dont la fructification ne nous est encore que très-peu connue. Son tronc est épais, élevé; les rameaux grêles, alongés, garnis de feuilles alternes, pétioles, lancéolées, entières à leurs bords, aiguës, traversées par trois nervures longitudinales, d'un vert foncé à leur face supérieure, de couleur cendrée en dessous.

Les fleurs sont disposées en grappes très-courtes, pendantes de l'aisselle des feuilles, petites, blanchâtres en dehors avant leur épanouissement, de couleur fauve lorsqu'elles sont ouvertes; il leur succède des baies de la grosseur d'une petite cerise, globuleuses, vertes dans leur jeunesse, d'un jaune-foncé lorsqu'elles sont mûres, renfermant, dans une pulpe succulente, un noyau osseux.

Le jeune bois est jaunâtre: il blanchit ou prend une couleur pâle en vieillissant; il est dur, solide, tenace, dure long-temps; mais il est peu employé par la difficulté de le travailler, & il résiste telle-

ment aux outils, que souvent les habitants, lorsqu'ils veulent dépouiller un terrain de ces arbres afin de le mettre en culture, ils préfèrent de mettre le feu à la partie inférieure des troncs, qui tombent alors d'eux-mêmes; ils emploient les rameaux, foudres & plans, à fabriquer des corbeilles & des instrumens pour la pêche, qui se conservent très-long-temps dans l'eau.

Rumphius cite un autre arbre sous le nom de *sesel laut* (*Sirifolia littorea*), qui approche un peu du précédent, mais qui appartient peut-être à un autre genre, & qui à dans son port quelques rapports avec le canellier. Ses feuilles sont ovales, assez larges, aiguës, entières, marquées de trois nervures, alternes, pétioles. Ses fleurs sont disposées en grappes courtes, opposées aux feuilles; elles produisent de petites baies arrondies, de la grosseur de celles de notre petit prunier sauvage, d'un bleu noirâtre, pulpeuses, renfermant un noyau presque à quatre angles, terminé par une pointe aiguë; les angles incisés & crenelés à leurs bords.

Ces arbres se rencontrent dans les Indes & à l'île d'Amboine; le dernier croît de préférence le long des rivages.

SESEL. *Seseli*. Genre de plantes dicotylédones, de la famille des ombellifères, qui a des rapports avec les anérthes & les arhamantes; il comprend des herbes exotiques ou indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont une & deux fois ailées, les folioles très-étroites, presque filiformes, les fleurs blanches, quelquefois un peu rougeâtres avant leur épanouissement.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une collerette universelle presque nulle; les collerettes partielles à plusieurs folioles; les semences ovales, glabres, striées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont disposées en ombelles; l'ombelle universelle composée de rayons roides, nombreux, ordinairement dépourvue de collerette; les ombelles partielles très-courtes, ramifiées, un peu globuleuses, dont les collerettes sont formées de deux ou trois folioles linéaires, acuminées, de la longueur des pédoncules.

Chaque fleur offre :

1.º Un calice très-court, entier, à peine sensible.

2.º Une corolle régulière, composée de cinq pétales égaux, un peu planes, recéssés, en cœur.

3.º Cinq étamines, dont les filaments sont subulés, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire inférieur, surmonté de deux styles écartés entr'eux, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit est ovale, petit, strié ou cannelé, se divisant en deux semences ovales, striées, planes intérieurement, convexes à l'extérieur.

Observations. Ce genre a, par le port & le feuillage de la plupart des espèces, des rapports avec les *anthemum*, ainsi que par ses semences; mais, dans les aneths, les ombelles & ombellules sont ou inairement dépourvues de collerette, & les fleurs sont jaunes dans beaucoup d'espèces. Dans les *chamanes*, les semences sont velues, & les ombelles, ainsi que les ombellules, sont munies de collerettes.

J'ai réuni, d'après M. Lamarck, le *arum carvi* avec les *seseli*, les différences entre ces deux genres étant trop légères pour les tenir séparées; j'y ai ajouté le *seseli annui*, que le même auteur avoit renvoyé dans ce genre.

Le *seseli leucospermum*, Plant. rar. Hungar. & Persoon, Synops. Plant. vol. 1. pag. 121, ayant ses semences tomenteuses, appartient plutôt aux *achamanes* qu'à ce genre.

ES P È C E S.

1°. *Seseli* annuel. *Seseli annuum*. Linn.

Seseli petiolis ramis, membranaceis, ventricosis, emarginatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 373. — Hort. Cliffort. 103. — Royen, Lugd. Bat. 112. — Sauvag. Monsp. 256. — Jacq. Vind. 225, & Flor. austr. tab. 55. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 356. — Gouan, Illustr. pag. 15. — Hoffm. Germ. 105. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 434. n°. 1018. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1460. n°. 7. — Lam. Illustr. Gener. tab. 202. fig. 1.

2°. *Seseli foliis linearibus, triplicato-pinnatis; caule vaginosis*. Haller, Helv. n°. 762.

3°. *Seseli* (bienne), caule recto, admodum folioso. Crantz, Austr. pag. 204.

4°. *Sium annuum*. Rorh. Germ. vol. 1. pag. 128. — Idem, vol. II. pag. 337.

5°. *Feniculum silvestre, annuum, tragoselinii odore, umbella alba*. Vail. Parif. pag. 54. tab. 9. fig. 4.

6°. *Libanotis tenuifolia, germanica*. C. Bauh. Pin. 158.

7°. *Pimpinella tenuifolia*. Rivin. tab. 83.

Cette espèce, rapprochée du *seseli montanum*, s'en distingue par ses pétioles membraneux, ventrus, échancrés à leur sommet, & par ses collerettes, aussi longues que les fleurs.

8°. Ses tiges sont droites, dures, très-roides, ar-

ticulées, brisées, hautes d'environ un pied, quelquefois plus; rameuses, vertes ou légèrement purpurines, garnies de feuilles nombreuses, alternes, pétioles, vertes à leurs deux faces, dunt & même trois fois ailées, composées de folioles étroites, courtes, presque lanceolées, aiguës, trifides ou pinnatifides; les pétioles membraneux, alongés, ventrus, échancrés ordinairement à leur sommet.

Les fleurs, rougeâtres avant leur épanouissement, deviennent blanches en se développant; elles sont disposées en ombelles un peu convexes, dépourvues de collerette universelle, quelquefois munies d'une seule foliole. Les ombelles partielles sont très-denses, presque agglomérées; leur collerette est composée d'un assez grand nombre de folioles lanceolées, étroites, blanchâtres & membraneuses à leurs bords, ordinairement aussi longues que les fleurs.

Cette plante croît en France, en Allemagne, dans les prés secs & sur le bord des bois; elle est bisannuelle. ♂ (V. v.)

2. *Seseli* de montagne. *Seseli montanum*. Linn.

Seseli petiolis ramis, membranaceis, obovatis, integris; foliis caulinis, angustissimis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 372. — Hort. Cliffort. 102. — Royen, Lugd. Bat. 112. — Dalib. Parif. 92. — Sauvag. Monsp. 256. — Miller, Dict. n°. 1. — Gouan, Illustr. pag. 17. — Backw. tab. 416. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 435. n°. 1018. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1459 n°. 3.

3°. *Saxifraga montana, minor, italica, foliis in breviores partes divisis*. Morif. Hist. 3. pag. 372.

4°. *Meum latifolium, adulteratum*. C. Bauh. Pin. 148.

5°. *Feniculum silvestre, elatius, ferula folio breviora & longiora*. Tourn. Inst. R. Herb. 311.

6°. *Carosolia*. Vaillant, Parif. tab. 5. fig. 2. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 171.

7°. *Seseli* (multicaule), foliis bipinnatis, foliolis linearibus, simplicibus trifidis; involuclis subsulcatis. Retz. Observ. 3. pag. 27.

8°. *Seseli multicaule*. Jacq. Hort. 2. pag. 59. tab. 129.

Ses racines sont épaisses, pivotantes ou fusiformes, brunes en dehors, blanchâtres en dedans; elles produisent une ou plusieurs tiges droites, glabres, cylindriques, un peu roides hautes d'un pied, quelquefois un peu flexueuses à leur partie supérieure, presque simples ou médiocrement rameuses. Les feuilles radicales sont pétiolées, alongées, deux fois ailées; les folioles très-courtes, divergentes, un peu élargies, presque semblables à celles de la carotte, à trois divisions un peu lan-

écoulées, contées, aiguës. Les feuilles caulinaïres sont dilatées, alternes, un peu serrées contre les tiges, simplement ailées; les folioles à trois découpures un peu plus allongées, plus étroites, aiguës, glabres à leurs deux faces, presque canaliculées; les pétioles formés par une gaine allongée, trépanée, de laquelle sortent les rameaux fleuris.

Les fleurs sont disposées, le long des tiges, en ombelles axillaires & terminales; les axillaires ont un pédoncule commun simple, nu, très-courte, qui sort souvent d'une gaine spatulée, sans développement de feuilles; l'ombelle terminale soutenue par un long pédoncule roide, filicé. Les rayons des ombelles universelles sont courts, dépouillés de colletette; les ombelles partielles denses, munies, pour colletette, de deux ou trois petites folioles étroites, aiguës, de la longueur des rayons. La corolle est blanche, petite, régulière; les semences petites, ovales-oblongues, cannelées, un peu pubescentes, cendrées.

La plante β , qui est le *Seseli multicaule*, ne paroît être qu'une variété de la précédente, à tiges plus nombreuses, souvent moins élevées.

Cette plante croît en Europe, dans les lieux secs & montagneux. Le *carvisolia* de Vaillant, tab. 5. fig. 2, convient beaucoup mieux à cette plante qu'au *Seselinum carvisolia*, auquel Linné le rapporte. γ (V. v.)

3. SESELI glauque. *Seseli glaucum*. Linn.

Seseli petiolis ramiferis, membranaceis, oblongis, integris; foliis singularibus binatisque, cuneatis, levibus, petiolo longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 371. — Guettard, Stamp. 64. — Jacq. Aultr. tab. 144. — Gouan, Illustr. pag. 17. n°. 7. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 357. — Hoffm. Germ. 105. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 436. n°. 1018. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1460. n°. 5.

Seseli petiolis ramiferis, membranaceis, oblongis, integris; foliis filiformibus, petiolo longioribus. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 253.

Seseli (osseum), caule alto, ramofo, patente; geniculis offis; ramis & femine striis argenteis. Crantz. Aultr. 107?

Feniculum silvestre, glauco folio. Tourn. Inst. R. Herb. 311.

Daucus glauco folio, similis feniculo toruoso. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 16.

Saxifraga montana, minor, glauca & rigidior. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 273.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Seseli montanum*; ses tiges sont plus élevées, les feuilles plus amples, les folioles plus longues, plus étroites; elle n'en paroît être qu'une variété.

Ses tiges sont droites, cylindriques, articulées, très-glabres, rameuses, légèrement frisées, dures, hautes d'un pied & demi à deux pieds; elles parviennent, dans les plantes cultivées, jusqu'à quatre & cinq pieds de hauteur. Les entre-nœuds sont longs, les articulations dures, renflées; les ramifications étalées, divariquées. Les feuilles sont pétioles, alternes, deux fois ailées; les inférieures amples, les supérieures plus étroites, redressées, de couleur glauque; les folioles longues, très-étroites, filiformes, aiguës, simples ou trifides; les pétioles membraneux, appliqués en forme de gaine contre les tiges, entiers à leur sommet ou quelquefois un peu binnés.

Les fleurs sont terminales & latérales; ces dernières axillaires, dont les pédoncules, plus ou moins allongés & simples, soutiennent des ombelles médiocrement ouvertes; les rayons de l'ombelle universelle égaux, presque filiformes, dépouillés de colletette; cependant j'ai observé quelques individus qui avoient une ou deux petites folioles caduques; les ombelles partielles un peu denses, petites, pourvues d'une colletette à deux ou trois folioles étroites, aiguës. La corolle est blanche; un peu rougeâtre avant son épanouissement. Les semences sont ovales-oblongues, assez semblables à celles du *Seseli* des montagnes.

On rencontre cette plante dans les lieux incultes & montagneux, en France, en Autriche. γ (V. v.)

4. SESELI verticillé. *Seseli verticillatum*. Desf.

Seseli foliolis filiformibus; radiculibus subverticillatis, brevioribus; umbellulis diphinitis, radiis centralibus brevissimis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 260.

Seseli (ammoides), petiolis membranâ destitutis. ? Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 373. — Roy. Lugd. Bat. 112. — Mill. Dict. n°. 6. Exclut *Seseli ammoides*. — Jacq. Hort. 1. tab. 52. — Lam. Illustr. Gener. tab. 202. fig. 2.

Seseli petiolis membranâ destitutis; involucrellis foliolis subulais spathulatisque, simplicibus trifidisque. Gouan, Illustr. pag. 16?

Feniculum lusitanicum, minimum, aere. Tourn. Inst. R. Herb. 312. *Cerast* in Herbario. — Schaw, Specim. n°. 232. Icon.

Ammi Matthioli. Dalech. Hist. Lugd. Bat. vol. 1. pag. 695. Icon. Bona.

Saxifraga annua, acria; millefolii terrestri folio tenuissimo. ? Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 272.

An ammi perenne, pusillum. ? Morif. Hist. 3. pag. 275.

C'est une petite plante, assez bien distinguée par le peu d'élevation de ses tiges; par les deux sortes

de folioles & par leur disposition, par les rayons du centre des on belles, beaucoup plus courts.

Ses racines sont très-grêles, droites, fusiformes, garnies de très-peu de fibres, d'un blanc jaunâtre; il s'en élève une tige droite, cylindrique, grêle, très glaire, légèrement striée, haute d'environ un pied, divisée en rameaux étalés, plus ou moins nombreux, presque filiformes.

Les feuilles sont pétiolées, une & deux fois aîcées, glabres, vertes & les inférieures & radicales membranées, presque verrucées; les folioles très-nuées, à) prochant un peu de celles de la nuit ou de la; les feuilles supérieures alternes, distantes; les folioles très-fines, presque capillaires, beaucoup plus longues, terminées par une très-petite pointe souvent blanchâtre. Les pétioles sont courts, ferrés contre les tiges, membraneux à leurs bords, en gaine à leur insertion.

Les ombelles sont terminales & latérales, opposées aux feuilles, situées à l'extrémité d'un long pédoncule filiforme; les rayons de l'ombelle universelle très-égaux, presque capillaires; ceux du centre fort courts, ouverts, étalés, dépourvus de colletette universelle; les ombellules petites, ramassées; leurs pédoncules très courts, inégaux, munis à leur base d'une colletette de cinq à sept petites folioles serrées, aiguës. Les pétioles sont blancs, petits, en cœur renversé; les filaments très-fins, deux filaments serrés. Les semences sont petites, courtes, glabres, à demi-cylindriques, obtuses, légèrement striées.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans les campagnes du royaume d'Alger, aux environs de Blide. (V. f. Comm. Desfont.)

Observations. Cette espèce paroît bien être la même que le *Seseli ammodu* de Linné, mais elle ne peut être rapportée à la plante du même nom de Jacquin, d'après les observations de M. Desfontaines, qui s'est également assuré de la synonymie de Tournefort, d'après l'examen de son Herbar. C'est à tort que Linné a cité la même synonymie, ainsi que celle du docteur Schumacher au *sum ammi*; ce qui fait d'ailleurs un double emploi.

Seseli à feuilles de boucage. *Seseli pimpinellifolius*.

Seseli caule declinato; umbellæ nubilibus, nutantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 372. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1459. n°. 2. — Willch. in Nov. Act. A. N. C. 4. pag. 369.

Ses racines sont périblantes, & produisent une tige cylindrique, haute d'un pied, couchée avant la floraison, relevée lorsque les fleurs paroissent, droite, ferme, presque nue, garnie seulement d'une ou deux folioles, dont le pétiole membraneux, oblong, en forme de spathe, renferme un pédoncule simple.

Les feuilles inférieures ou radicales sont aîcées; les pinnules découpées en plusieurs segments alternes, & de nouveau en d'autres segments linéaires, alternes, planes, recourbées en dehors. Les fleurs sont penchées avant leur épanouissement; elles se redressent en fleurissant. L'ombelle universelle est dépourvue de colletette; celle des ombelles partielles, linéaire, très-étroite, de la longueur des rayons. Ces ombelles sont laes aîcées, axillaires, situées à l'extrémité d'un pédoncule simple. Les semences sont ovales, petites, marquées sur leur dos de trois fines sillons.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. (V. *Descript. ex Linn.*)

6. *SESELI TORTUEUX. Seseli tortuosum.* Linn.

Seseli caule alto, rigido; foliis linearibus, fasciculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 373. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 226. — Mill. Dict. n°. 5. — Pollich. Palst. n°. 302. — Hoffm. Germ. 105. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 436. n°. 1018. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1461. n°. 10.

Ænanthe striata, rigida. Hort. Cliff. 99. — Sauv. Monsp. 157.

Sium tortuosum. Roth. Germ. vol. 1. pag. 128. — vol. II. pag. 357.

Seseli massiliense, feniculi folio. C. Bauh. Pin. 101.

Feniculum tortuosum. J. Bauh. Hist. 3. pars 1. pag. 16. Icon. — Tourn. Inst. R. Herb. 312.

Seseli massiliense, feniculi folio, quod Dioscoridis censeat. C. Bauh. Pin. 161.

Seseli massiliense, folio feniculi crassiore. Lobel. Icon. 785.

Cette plante se présente sous un aspect assez remarquable par la roideur de toutes ses parties, qui aide beaucoup à la distinguer. Ses tiges sont épaisses, très-jures, presque ligneuses, peu élevées dans leur lieu natal, glabres, d'un vert un peu glauque ou blanchâtre, fortement striées, cylindriques, très-râmeuses, tortueuses, à entre-nœuds courts; les rameaux roides, diffus, étalés, presque en buisson. Les feuilles sont nombreuses, amples; les inférieures pétiolées, opposées, deux fois aîcées; les petites très-roides, épaisses, repliées à leur base, striées, planes en dedans, convexes en dehors; les pinnules opposées, pétiolées; les pétioles presque plans; les folioles glabres, fines, divisées en decoupures étroites, linéaires, non brisées, d'un vert jaunâtre, un peu aiguës, longues d'un demi-pouce & plus. Les feuilles supérieures sont alternes, pétiolées, bien moins composées; les pétioles élargis en une courbe, verte, élargie, striée, blanche & membraneuse à ses bords.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales & latérales; ces dernières axillaires, alternes, soutenues par des pédoncules roides, alonges, fortement striés, les rayons de l'ombelle universelle nombreux, inégaux, médiocrement ouverts, dépourvus de collerette; les ombelles partielles sont petites, presque planes, munies d'une collerette à plusieurs folioles étroites, lancéolées, aiguës, un peu membraneuses à leurs bords, au moins aussi longues que les rayons. La corolle est blanche, petite; les semences petites, striées, blanchâtres.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. Je l'ai recueillie aux environs d'Arx & de Marseille. ♂ (V. v.)

Ses semences passent pour carminatives, diurétiques, emménagogues.

7. *SESELI tuberculeux. Sefeli elatum.* Linn.

Sefeli caule elongato, geniculis callosis, foliis bipinnatis; pennis linearibus, distantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 375. — Mantiss. 357. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1464. n°. 15. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 437. n°. 1018.

Sefeli caule filiformi, rigido; foliis bipinnatis, foliolis ternatis, fructibus scabris. Gouan, Illust. pag. 16. tab. 8.

Feniculum filifere, elatius; fernali folio longiori. Tourn. Inst. R. Herb. 31. — Vaill. Paris. pag. 54.

Saxifraga Matthioli, tenuifolia & umbellifera. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 18.

Daucus montanus, folio feniculi longiore. Magn. Monsp. 194.

Apium montanum, folio tenuiore. C. Bauh. Pin. 153.

On distingue cette espèce à ses semences scabres ou tuberculeuses, & à ses folioles presque cylindriques, alongées, de la grosseur d'un crin de cheval.

Ses tiges sont droites, grêles, cylindriques, très-flesses, à peine striées, hautes d'environ deux pieds, médiocrement rameuses, articulées; les articulations noueuses & blanchâtres. Les feuilles sont pétiolées, étroites, les inférieures deux fois ailées, composées de folioles glabres, étroites, linéaires; les feuilles caulinaires distantes, plus petites, moins composées; leurs folioles longues d'environ un pouce, un peu arrondies, presque capillaires; les feuilles supérieures ternées.

Les ombelles sont petites, terminales & latérales; l'ombelle universelle composée de très-peu de rayons courts, dépourvue de collerette; les ombelles partielles ramassées, un peu globuleuses, composées d'environ huit fleurs blanches, garnies

à leur base de collerettes extrêmement petites, à plusieurs folioles. Les semences sont un peu ovales, petites, scabres ou légèrement tuberculeuses.

Cette plante croît dans les lieux montagneux, sur le bord des bois, en France, en Allemagne. ♀ (V. f.)

8. *SESELI saxifrage. Sefeli saxifragum.* Linn.

Sefeli caule filiformi, divaricato; foliis duplicato-ternatis, linearibus; umbellis subspicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 374. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1463. n°. 14.

Pimpinella saxifraga, tenuifolia. C. Bauh. Pin. 160. — Idem, Prodr. 84. — Burf. VIII. 5.

Sium saxifragum. Roth. Germ. vol. 1. pag. 128. — H. pag. 338.

Pimpinella tenuifolia. Rivin. Pent.

Cette plante a des tiges droites, très-grêles, filiformes, hautes d'un pied, rameuses, dont les ramifications sont fort menues, cylindriques, diffusées, toutes divisées en d'autres rameaux étalés. Les feuilles sont alternes, pétiolées, fort petites, deux fois ternées; les folioles linéaires quelques fois lobées.

Les fleurs sont disposées en ombelles; l'ombelle universelle composée ordinairement de six rayons dépourvus de collerette; les ombelles partielles ne contiennent qu'environ six à huit fleurs environnées à leur base d'une collerette stérécée.

Cette plante croît sur les bords du lac de Genève & dans l'Allemagne. ♀ (Descript. en Linn.)

9. *SESELI turbith. Sefeli turbith.* Linn.

Sefeli involucro universali, monophyllo; seminibus striatis, villosis, stylatis. Linn. Syst. veget. pag. 289. n°. 7. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 310. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1462. n°. 11.

Sefeli terium. Boerh. Lugd. Bat. pag. 50.

Thapsia feniculi folio. C. Bauh. Pin. 184.

Cette plante a beaucoup plus de rapports avec les aihamanes qu'avec les seselis, par les semences velues & sa collerette universelle: cette dernière partie étant d'une seule pièce, pourroit même porter à en faire un genre particulier. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, médiocrement striées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, au moins deux fois ailées, composées de folioles très-fines, presque capillaires, simples ou plus souvent trifides, aiguës, très-glabres, assez semblables à celles du fenouil. Ses fleurs sont blanches, petites, terminales; les semences ovales, un peu alongées, fortement striées, velues, formées de deux longs styles perillans, écartés.

Cette plante se rencontre dans les contrées méridionales de l'Europe. ♀

10. *SESELI hypomarathre*. *Seseli hypomarathrum*. Linn.

Seseli involucriis connato-mono-hyllis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 374. — Jacq. Flor. austr. tab. 143. — Scopol. Carn. edit. 2. n° 358. — Hoffm. Germ. 105. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1462. n° 12.

Seseli (articulatum), *involucro petiiformi*. Crantz. Austr. pag. 205. tab. 5. fig. 1, 2.

Sium hypomarathrum. Roth. Germ. vol. 1. pag. 128. — II. pag. 338.

Daucus montanus, multifido brevique folio. C. Bauh. Pin. 150. ?

Hypomarathrum. Riv. Pent. 66. — Rupp. Jen. 3. pag. 280. — Kram. Austr. 82.

Un des caractères le plus saillant de cette espèce, & qui lui appartient exclusivement, est d'avoir des corolletes partielles d'une seule pièce, ou formées par la réunion de plusieurs folioles connées : elle est d'ailleurs dépourvue de colletette universelle. Son port le rapproche du *seseli glaucum*.

Ses racines sont jaunâtres, rameuses, environnées à leur collet de fibres sétacées : il s'en élève plusieurs tiges grêles, droites ou un peu courbées, presque jonciformes, cylindriques, glauques ou purpurines, un peu rameuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles pétiolées, alternes, deux fois ailées, glauques ; les folioles linéaires, trifides ou pinnatifides ; les pétioles des feuilles inférieures point membraneux ; ceux des feuilles supérieures constitués par une gaine rigide, membraneuse à ses bords ; enfin les dernières ne présentent qu'une gaine sans développement de feuilles.

Les fleurs sont terminales ; l'ombelle universelle formée d'environ neuf rayons inégaux, sans colletette, excepté quelquefois une petite foliole caduque ; les ombelles partielles denses, serrées, munies d'une colletette d'une seule pièce, en forme de bassin, frangée à ses bords, & membraneuse. La corolle est blanche, quelquefois légèrement purpurine ; les semences ovales, presque sessiles, renfermées dans la colletette persistante. Souvent les panicules & toutes les autres parties de la fructification sont lavées d'une teinte de pourpre plus ou moins foncée.

Cette plante croît sur les rochers, dans l'Allemagne, l'Autriche & la Carniole ; elle varie dans la grandeur de ses tiges & de ses feuilles, selon sa naissance dans des sols arides ou fertiles. ♀ (V. f.)

11. *SESELI des Pyrénées*. *Seseli pyrenaicum*. Linn.

Seseli foliis duplicato-pinnatis ; foliolis incisis, acutis, involucriis fissatis, umbellulis longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 374. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1462. n° 13.

Selinum, etale simpliciter, involucro universali nullo ; umbellulis sex radiatis, inaequalibus. Gouan, Illustr. pag. 11. tab. 5.

Selinum vaginis foliorum amplis, foliis triplicato-pinnatis, lobulis ultimis lanceolato-linearibus, acutis, mucronatis. De Lachenal, in Act. Helv. VII. pag. 332. tab. 12.

Carvi alpinum. C. Benth. Pin. 158. — Idem, Prodrom. 84. — Burf. VIII. 36. — Morif. Oxon. Herb. 3. pag. 297. §. 9. tab. 9. fig. 2.

Selinum pyrenaicum. Gouan, Illustr. p. 11. tab. 5.

Le port de cette plante, ses larges feuilles, ses folioles cuneiformes, incisées, l'écartement du genre des *seseli*, & le rapprochement davantage de celui des *selinum* ; mais la fructification ne permet guère de la sortir du genre dans lequel Linné l'a placée.

Ses racines sont épaisses, simples, noirâtres, cylindriques, munies de fibres délicates : elles produisent des tiges hautes d'environ un pied ; glabres, cylindriques, striées, rameuses ; les rameaux axillaires, diffus, quelquefois peu nombreux ; les feuilles radicales sont amples, longuement pétiolées, deux fois ailées, lâches, divariquées ; les pinnules composées de folioles profondément incisées ou simples, cuneiformes, glabres à leurs deux faces, accumulées à leur sommet il n'existe quelquefois qu'une ou deux feuilles caulinaires, de l'axille desquelles sort un rameau ; leur pétiole est élargi, membraneux.

Les fleurs sont blanches, petites, terminales ; l'ombelle universelle est oblongue, & contient environ huit à dix rayons glabres, inégaux, striés, dépourvus de colletette ; les ombelles partielles très-courtes, serrées, munies à leur base d'une colletette composée de plusieurs petites folioles sétacées, plus longues que les ombellules. Les semences sont ovales, striées, à trois côtes, environnées d'un rebord membraneux.

Cette plante se rencontre sur les montagnes des Pyrénées. ♀ (V. f.)

12. *SESELI* à feuilles de férule. *Seseli ferulaefolium*.

Seseli foliis quadruplicato-pinnatis ; foliolis arif-tatis, integris, multifidis. (N.)

Ligusticum pyrenaicum. Gouan, Illustr. pag. 14. tab. 10. fig. 2.

Ligusticum (pyrenaicum), foliis suprà decom-

fœtis; foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus, mucronatis, involucri universali subnullo, deciduo, costis seminum membranaceis, glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1426. n° 8.

Ligusticum alpinum, perenne, ferulifolio, floribus albis. Seguiet, Plant. veron. 41. tab. 13.

Ligusticum pyrenaicum, amplissimo tenuique folio. Tourn. Inst. R. Herb. 323.

3. *Seseli* (aristatum), petiolis rameis submembranaceis, laxis, integerrimis; foliis supra decompositis; foliolis lanceolatis, aristatis; fructibus ovatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 359. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1460. n° 6.

4. *Ligusticum* (lucidum), foliis pinnatifidis, foliolis linearibus, planis. Miller, Dict. n° 4.

Ligusticum pyrenaicum, feniculi folio, lucidum. ? Tourn. Inst. R. Herb. 324.

Cette plante, par la forme de ses pétales, par celle de ses femences glabres & striées, par le défaut de collerette universelle, & a beaucoup plus de rapport avec les *Seseli*, qu'avec les *Ligusticum*, parmi lesquels on l'avait d'abord placé, & qui en a été exécuté par M. Lamarck. (Voyez dans cet ouvrage, l'article LIVICHE.)

J'ai rapporté à cette même espèce, du moins comme variété, le *Seseli aristatum* d'Aiton, qui en offre les principaux caractères, mais je ne l'ai fait qu'avec doute; cette dernière plante ne m'étant pas suffisamment connue. J'en dis autant de la synonymie de Miller, & de celle de Tournefort, que j'y ai ajoutée.

Cette plante a des tiges droites, glabres, cylindriques, rameuses, striées, garnies de feuilles alternes, fertiles, très-amplées & plusieurs fois ailées, surtout les inférieures, glabres, lisses, presque luisantes à leurs deux faces, composées de folioles pinnatifides ou quelquefois entières; les découpures petites, linéaires, mucronées à leur sommet. Les feuilles supérieures sont moins composées.

Les fleurs sont blanches, petites, disposées en ombelles terminales; les ombelles universelles à rayons assez nombreux, dépourvus très-ordinairement de collerette, quelquefois munies de quelques folioles très-caduques. La corolle est régulière; les pétales un peu réfléchis, légèrement écharnés en cœur; les femences sont ovales, assez petites, striées, très-glabres, munies de côtes fort petites, légèrement membranées.

Cette plante se rencontre sur les montagnes, dans les Pyrénées. (V. f.)

13. *Seseli carvi*. *Seseli carvi*. Lam.

Seseli caule ramofo, involucri universali monophyllo, partiali nullo. (N.)

Seseli carvi. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 435. n° 1018. — Idem, Illustr. Gener. tab. 202. fig. 3.

Carum (carvi). Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 378. — Flor. lappon. 105. — Flor. suec. 247, 260. — Mater. medic. 85. — Hort. Cliff. 106. — Roy. Lugd. Bat. 116. — Haller, Helv. n° 389. — Riv. tab. 54. — Camer. Epiton. 516. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 220. — Miller, Dict. n° 1. — Jacq. Flor. Austr. tab. 393. — Pollich, Pal. n° 304. — Blackw. tab. 529. — Hoffm. Germ. 106. — Gztn. de Fruct. & Sem. Centur. 1. tab. 23. fig. 7.

Carum (carvi), caule ramofo, vaginis foliorum ventricosiss. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1470. n° 1.

Apium (carvi officinarum), pinnis conjugatis, pinnis circa costam sese decussantibus. Crantz. Austr. pag. 218.

Seseli carum. Scopol. Carn. edit. 2. n° 361.

Ligusticum carvi. Roth. Germ. vol. I. pag. 124. — II pag. 324.

Carum pratense, carvi officinarum. C. Bauh. Pitt. 158.

Carum. Dodon. Pempt. 299.

Carvi Casalp. Tourn. Inst. R. Herb. 306.

Caros. J. Bauh. Hill. 3. pars 2. pag. 69.

On a jusqu'aujourd'hui fait de cette plante un genre particulier, d'après l'autorité de Linné, fondé sur cet unique caractère, que les ombelles universelles ont une collerette qui manque dans les ombelles partielles, tandis que le contraire a lieu assez généralement dans les *Seseli*, parmi lesquels cependant on trouve plusieurs espèces munies de quelquefois d'une collerette universelle. Ce caractère est sans doute trop faible pour l'établissement d'un genre, lorsque d'ailleurs toutes les autres parties de la fructification n'offrent aucune différence, comme il arrive ici. Ce sont ces considérations qui ont déterminé M. Lamarck à réunir ces deux genres.

Ses racines sont épaisses, charnues, pivotantes; ses tiges droites, fortes, glabres, cylindriques, très-lisses, fortement striées, rameuses, hautes de deux pieds & plus; les rameaux assez nombreux, longs, égaux, d'un vert jaunâtre; les feuilles sont amples, allongées, deux fois ailées, très-glabres, pétioles, alternes, composées de pinnules lancéolées, opposées, dont les folioles sont pinnatifides, à découpures linéaires, étroites, inégales, un peu aiguës, confluentes, opposées, plus nombreuses, & presque fasciculées à la base des pinnules; les feuilles supérieures un peu moins composées; les folioles beaucoup plus fines, presque filiformes; les pétioles membranés, en paine allongée, entière, striée, ventrue, scarieuse & blanchâtre à ses bords.

Les

Les fleurs sont blanches, petites, terminales & latérales; l'ombelle universelle lâche, étalée, composée de huit à dix rayons inégaux, alongés, roides, droites; garnie d'une colletette à une seule foliole, longue, sétacée, très-fine; les ombelles partielles courtes, ramassées, dépourvues de colletette; les pétales un peu échancrés à leur sommet; les fruits ovales, glabres, striés.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Europe, dans les prairies sèches des lieux élevés. (V. v.)

Ses semences sont stomachiques, carminatives, diuétiques, incisives & fébrifuges; elles contiennent une assez grande quantité d'huile essentielle: leur infusion avec le miel soulage les malades dans les affections séreuses des poudrons; elles ont réussi à guérir des fièvres intermittentes. Bouillies avec de la mie de pain & du vin, elles sont recommandées en cataplasme pour dissiper les coliques venterques: on les donne aussi intérieurement pour les mêmes incommodités; mais elles produisent peut-être autant d'air qu'elles en font rendre, & sont pernicieuses dans les coliques inflammatoires. Les racines se mangent dans le Nord: on en mêle les semences avec le pain & le fromage; on s'en sert aussi pour aromatiser l'esprit-de-vin: c'est à elles que l'huile de Venus doit son parfum. Toute la plante fournit un excellent fourrage. (Dorand.)

14. *SESELI* à feuilles de fenouil. *Seseli feniculifolium*.

Seseli foliis tripinnatis, radicalibus linearibus, caulinis setaceis, stipularibus longioribus.

Sison ammi. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 696. n°. 4. — Mart. medic. pag. 81. — Jacq. Hort. tab. 200. — Gouan, Illustr. 17. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1437. n°. 4. (Excluse synonymon Tournefortii.)

Sison foliis caulinis, subcapillaribus. Hort. Upl. 63.

Ammi lacinulosis foliorum caulis capillaribus. Hort. Cliffort. 81. — Royen, Lugd. Bat. 96.

Ammi parvum, foliis feniculi. C. Bauh. Pin. 159.

Ammi creticum, aromaticum. Lobel. Icon. 724. Icon. rudiore. ex Gouan.

M. Lamarck, qui a, dans cet ouvrage, réuni les sison aux fiam, à l'article BERLE, en a exclu le *sison ammi* de Linné, qu'il a renvoyé dans ce genre, comme lui appartenant davantage, d'après le caractère de sa fructification.

Ses tiges sont droites, cylindriques, striées, divisées en rameaux alternes, peu nombreux, étalés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées; les feuilles radicales longues, deux fois ailées, un

Botanique. Tome VII.

peu étroites, planes, linéaires, composées de folioles filiformes, nombreux, très-rapprochés, presque imbriqués, glabres, étroites, aiguës; les folioles supérieures moins composées, à folioles sétacées, très-fines, semblables à celles du fenouil; les pétioles élargis en gaine.

Les fleurs sont blanches, disposées en ombelles terminales; les rayons de l'ombelle universelle égaux, peu étalés, supportant de petites ombellules serrées; les colletettes partielles sont composées de quelques folioles étroites, aiguës. Les semences sont ovales, convexes en dehors, glabres, striées, d'une saveur aromatique.

Cette plante croît dans le Portugal & dans l'île de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

15. *SESELI* à tiges très-simples. *Seseli simplex*.

Seseli caule simplicissimo, vaginis foliorum adpressis; involucri partiali polyphylo.

Carum simplex. Sieph. in litt. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1470. n°. 2.

Cette plante diffère du *seseli carvi* par ses tiges simples, par ses feuilles plus petites, par ses fleurs dépourvues de colletette universelle; elle lui ressemble d'ailleurs presque dans toutes les autres parties.

Ses tiges sont droites, cylindriques, glabres, hautes de huit à dix pouces, sans aucune ramification; elles se terminent par une ombelle solitaire, divisée en ombellules petites, presque ramassées en tête, munies à leur base d'une colletette composée de plusieurs folioles sétacées, inégales, nombreuses. La corolle est blanche, fort petite. L'ombelle universelle est composée de treize à quinze rayons inégaux. Les feuilles ressemblent parfaitement à celles du *carvi*, mais plus petites, plus étroites; leur gaine moins ventrue, moins élargie, mais serrée contre la tige, striée, à peine membraneuse à ses bords.

Cette espèce croît dans la Sibérie. (Descript. ex Willd.)

* Espèces moins connues.

* *Seseli (filifolium), foliis filiformibus, caule flexuoso, erecto*. Thunb. Prodr. pag. 51.

Ses tiges sont droites, flexueuses, garnies de feuilles aussi délicates qu'un fil. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Seseli (striatum), petiolis rameis, membranaceis, emarginatis; caule striato; pinnulis subulatis, falcatis*. Thunb. Prodr. pag. 51.

Cette plante, qui se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, a des tiges droites, fortement striées,

S

garnies de feuilles ailées, dont les pinnules sont composées de folioles simples, traversées par un filon. Les pétioles sont membraneux, échancrés à leur sommet; les rameaux sortent de leurs aisselles.

* *Seseli* (chizrophylloides), *petiolis rameis*, *mem ranacis*, *ventricosis*, *integris*; *caule dichotomo*, *paniculato*; *foliis supra decompositis*, *glabris*. Thunb. Prodr. pag. 51.

Ses tiges sont glabres, droites; elles se divisent en rameaux dichotomes, paniculés. Les feuilles sont amples, pétiolées, plusieurs fois ailées, glabres à leurs deux faces, assez semblables à celles du cerfeuil. Les pétioles des feuilles, qui accompagnent les rameaux à leur base, sont membraneux, ventrus, entiers à leur sommet. Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

* *Seseli* (fragile), *foliis articulatis*, *fragilibus*; *foliis linearis-integris binatisque*; *vaginis bilobis*. Gouan, Illustr. Botan.

* *Seseli* (curvisolium), *foliis bipinnatis*, *lacinia dissectis*, *linearibus*; *ramis erectis*, *feminibus levibus*. Villars, Dauph. vol. 2. pag. 586.

SESLÈRE. *Sesleria*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *cynefurus* & les *daulylia*, & qui renferme des herbes indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont disposées en épis, munis ordinairement à leur base d'un involucre d'une à trois folioles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux valves, de deux à trois fleurs, quelquefois plus; une corolle à deux valves; l'extérieure à trois dents; trois étamines; deux styles.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice formé par une balle à deux valves, renfermant deux ou trois fleurs, quelquefois quatre ou cinq; les valves acuminées, presque égales.

2°. Une corolle bivalve; la valve extérieure plus grande, concave, à trois dents mucronées à leur sommet; l'intérieure plus petite, terminée par deux dents.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, les anthers oblongues, vacillantes, biniées à leurs deux extrémités.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, fort petit, surmonté de deux styles velus, terminé par des stigmates simples.

Une seule semence oblongue, renfermée dans la corolle.

Observations. Ce genre avoit été confondu par Linné avec les *Cynefurus*, dont il est essentiellement différent par le port des espèces, par les fleurs, dépourvus de bractées foliacées ou pectinées; par les valves de la corolle, dentées à leur sommet; enfin, en ce que les calices renferment assez généralement bien moins de fleurs.

Nota. Le *Sesleria echinata* de M. Lamarck, Illustr. Gener. tab. 47. fig. 2, est le *daulylia pungens* de M. Desfontaines (*Eleocharis montana*). Il en sera fait mention dans le Supplément, à l'article DAC, TYLE.

E S P È C E S.

1. *SESLÈRE* bleuâtre. *Sesleria caerulea*. Lam.

Sesleria spica ovato-cylindrica, *spiculis subtrifloris*, *breviter aristatis*. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 198. n°. 1095. tab. 47. fig. 1.

Cynefurus caeruleus, *bracteis integris*. Linn. Syst. veget. pag. 17. n°. 6. — Hort. Cliffort. 495. — Flor. suec. 82. 89. — Royen, Lugd. Bat. 64. — Gouan, Illustr. 4. — Hoffm. Germ. 32. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 53. — Il. 156. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 619. n°. 1185.

Cynefurus bracteis integris, *subdematis*; *corollis mucronatis*, *spica oblonga*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 414. n°. 10.

Cynefurus bracteis integris, *lacero-crenatis*; *spica oblonga*, *ovata*. Jacq. Icon. Rat. 1. tab. 21. — Miscell. 2. pag. 66.

Aira (varia), *foliis planis*, *spica subovata*, *densa*. Jacq. Vind. 15.

Sesleria (caerulea), *culmo simpliciter*, *spica subcylindrica*. Arduin, Spec. 2. pag. 18. tab. 6. fig. 3. 4, 5.

Sesleria locustis uniflora, *imbricatis*; *strobis tricornis*. Haller, Helv. n°. 1446.

Sesleria caerulea. Scopul. Carn. edit. 2. n°. 90.

Gramen glumis variis. C. Bauh. Pin. 10, & Prodr. 21. — Scheuch. Gram. 83. tab. 2. fig. 9. A. B. — Tournef. Inst. R. Herb. 519.

Gramen versicolor. J. Bauh. Hist. 2. pag. 466.

Gramen phalaroides montanum, *spica versicolore*. Mantiss. Prodrum. 48. — Seguier, Plant. veron. Append. 153.

Peire graminée, remarquable par un épi grêle, allongé, de couleur bleuâtre dans la jeunesse. Les racines sont fibreuses, blanchâtres, presque capillaires; il s'en élève plusieurs tiges grêles, cylindriques, nombreuses, assés droites, très-glabres, à peine feuillées, médiocrement articulées, hautes de trois à quatre pouces. Les feuilles inférieures sont disposées en gazons plans, les unes

courtes, d'autres presque aussi longues que les chaumes, larges au moins de deux lignes, glabres, striées, tudes ou légèrement denticulées à leurs bords. Les feuilles culinaires sont courtes ; elles ne forment souvent que quelques gaines allongées, cylindriques, glabres, striées.

Les fleurs sont disposées en un épi terminal, étroit, allongé, un peu comprimé, d'abord d'un bleu assez agréable, d'un blanc-cendré quand la plante est plus avancée ; composé d'épillettes alternes, rapprochés ou un peu distans, presque sessiles, contenant deux ou trois fleurs, dont les valves calicinales sont aiguës, celles de la corolle dentées à leur sommet, l'extérieure à trois dents, l'intérieure à deux dents.

Cette plante croît dans les Alpes & les Pyrénées, sur les pelouses, aux lieux montueux. On la rencontre également aux environs de Paris, à Fontainebleau. 2 (V. v.)

2. Sessile à tête ronde. *Sesleria spharocephala*.

Sesleria spica subrotundā, inermi, involucriatā ; spicatis subbifloris. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 198. n°. 1096.

Sesleria (spharocephala), caule simpliciter, nudo ; spica subrotundā, involucriatā. Arduin, Spec. 20. tab. 2.

Cynosurus (spharocephalus), bracteis integris, lacero-dentatis ; spicis globosis. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 20. — Miscell. 2. pag. 71. — Linn. Syst. veg. pag. 117. n°. 5.

Cynosurus bracteis integris, subdentatis ; corollis aristatis, spica globosa. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 414. n°. 9.

Cynosurus microcephalus. Hoffm. Germ. 3. p. 49.

3. *Cynosurus spharocephalus*. Hoffm. Germ. 3. pag. 49.

Ses tiges sont droites, courtes, sans feuilles, excepté à leur partie inférieure ; grêles, simples, hautes de quatre à six pouces au plus, sans articulations, ou une seule vers la base. Les feuilles radicales sont glabres, un peu étroites ; celles de la base des chaumes les environnent par une longue gaine cylindrique, garnie à son orifice d'une membrane bifide.

Les fleurs sont disposées en une petite tête un peu arrondie, terminale, de couleur bleuâtre ; ces épillettes sessiles, agglomérées, composées ordinairement de trois fleurs ; les valves de la corolle légèrement pubescentes ; l'extérieure terminée à cinq longues dents roides & subulées ; l'intérieure n'en a que deux.

La plante se distingue, par Hoffman, comme une espèce différente, remarquable par ses épis

formés en une tête plus arrondie, plus grosse, point obovate, par les valves de la corolle, l'extérieure n'en ayant que trois petites, courtes ; l'intérieure entière, aiguë.

Cette espèce croît aux Alpes & dans les départements méridionaux de la France, sur les hautes montagnes du Dauphiné. (V. f.)

La plante se rencontre en Allemagne, sur les hauteurs.

SESOT. *Pharmacum sagueri*. *Chab saguer*. Rumphius, Herb. Amb. vol. 2. pag. 136. tab. 44.

C'est un grand arbre de l'île d'Amboine, dont la fructification ne nous est pas encore entièrement connue. Il porte une cime ample, touffue, élégante. Son tronc est très gros, & pourroit à peine être embrassé par les bras d'un homme ; il se divise en branches nombreuses, & en rameaux droits, opposés, garnis de feuilles pétioles, opposées, aîslées, sans impaire ; composées de dix à douze folioles opposées, médiocrement pétioles, ovales-lancéolées, très-entières à leurs bords, acuminées, glabres, un peu rudes, luisantes. Les fleurs n'ont point été observées. Les fruits sont rares ; ils ont la forme d'une vessie ovale, aiguë ou conique à son extrémité, ventrue, un peu comprimée, longue d'environ deux pouces, verte, molle, dont l'intérieur contient une pulpe tendre, jaunâtre, huileuse, dans laquelle se trouve un osselet ovale, ombiliqué à un de ses côtés, relevé en bosse, presque semblable à une fève. Entre la pulpe & l'écorce exille une liqueur visqueuse, un peu transparente, approchant de la carabenthine. Ces fruits passent insensiblement de la couleur verte à une teinte jaunâtre, surtout à leur partie inférieure.

Cet arbre croît à l'île d'Amboine, sur les montagnes, parmi les arbres des grandes forêts, à une assez grande distance de la mer. Les insulaires emploient ses racines pour faire une sorte de boisson vineuse ; en les faisant fermenter dans une certaine quantité d'eau, après les avoir coupées en petits morceaux. Elle est douce, assez agréable lorsqu'elle est nouvelle, mais elle devient nuisible si l'on en fait un usage immodéré.

SPSSÉE. *Sissia*. Genre de plantes dicorpylées, à fleurs complètes, monopétales, qui renferme des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, entières, quelquefois stipulacées, & les fleurs disposées en grappes terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à cinq angles ; une corolle en entonnoir ; cinq étamines ; un stigmate à deux lobes ; une capsule à une seule loge, à deux valves bifides.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* inférieur, persistant, tubulé, à cinq angles, terminés par cinq dents ovales.

2°. Une *corolle* en forme d'entonnoir, dont le tube est une fois plus long que le calice ; l'orifice globuleux ; le limbe plissé, à cinq découpures droites, ovales, roulées à leurs bords.

3°. Cinq *étamines*, dont les filaments sont filiformes, insérés vers le milieu du tube, courbés & velus à leur base, de la longueur du tube, terminés par des anthères ovales, à deux loges.

4°. Un *ovaire* supérieur, oblong, petit, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate à deux lobes inégaux.

Le *fruit* est une capsule cylindrique, un peu arquée, une fois plus longue que le calice, à une seule loge, à deux valves biffées.

Les *semences* sont nombreuses, imbriquées, oblongues, comprimées, environnées d'un rebord membraneux.

Observations. Ce genre a été dédié, par Ruiz & Pavon, à Martin Sessé, directeur du Jardin royal de Botanique du Mexique.

ESPÈCES.

1. *SESSÉE stipulée.* *Sesfia stipulata.* Ruiz & Pav.

Sesfia foliis lanceolatis cordatisque racemis paniculatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 9. tab. 115. fig. B.

Arbrisseau d'une odeur fétide, qui s'élève à la hauteur de cinq à six pieds, & présente le port d'un *cestrum*. Ses tiges sont droites, raueuses, cylindriques ; les rameaux droits, alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, la plupart lancéolées, échancrées en cœur à leur base ; d'autres, surtout les supérieures, plus étroites, ovales, oblongues, très-entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de trois à cinq pouces & plus, larges d'un ou deux pouces, globées à leur face supérieure, blanchâtres & lanugineuses en dessous, munies de stipules axillaires, assez grandes, opposées, ovales, obtuses, sessiles, un peu échancrées en cœur à leur base, rabattues sur les côtes, caduques, de la longueur des pétioles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en une sorte de panicule composée de grappes droites, lanugineuses, les unes axillaires, d'autres terminales, dont les pédoncules sont presque ramifiés en corymbe, supportant plusieurs fleurs non pédonculées, munies de petites bractées caduques & tubuleuses. Le calice

est tubulé, lanugineux, terminé par cinq dents courtes, obtuses. La corolle est jaune, velue, tubulée, une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît sur les montagnes du Pérou, dans les lieux frais ; elle fleurit dans les mois de juin & de juillet. *(Description, ex Ruiz & Pav.)*

2. *SESSÉE à grappes pendantes.* *Sesfia dependens.* Ruiz & Pav.

Sesfia foliis cordato-oblongis ; racemis longissimis, pendulis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 9. tab. 116.

Cette plante, qui a beaucoup de rapports avec la précédente, en diffère par ses grappes longues & pendantes.

C'est d'ailleurs un arbre assez élevé, qui parvient à la hauteur de vingt-cinq à trente pieds, sur un tronc droit, revêtu d'une écorce cendrée, dont les rameaux sont cylindriques, pendans, les plus jeunes flexueux, garnis de feuilles alternes, éparlées, pétiolées, assez semblables à celles de l'espèce précédente ; lancéolées, oblongues, échancrées en cœur à leur base, très-entières, aiguës, fortement pulvérolentes à leur face inférieure, marquées de nervures simples, souvent confluentes vers les bords, veinées, longues d'environ trois à quatre pouces, sur un ou deux pouces de large ; dépourvues de stipules, soutenues par des pétioles longs au moins d'un pouce, sillonnés, pulvérolents en dessus.

Les fleurs sont disposées en très-longues grappes simples, terminales, pendantes, légèrement flexueuses : ces fleurs sont ordinairement réunies trois par trois, en paquets alternes, sessiles. Les calices sont tubulés, droits, pulvérolents ; la corolle presque deux fois plus longue que le calice. Son tube est noir ; son limbe jaunâtre, pubescent en dehors ; les capsules noires.

Cette plante croît le long des rivages au Pérou ; elle fleurit dans les mois de novembre, décembre & janvier. *(Description, ex Ruiz & Pav.)*

Ces deux plantes passent pour émoullientes & anodines.

SESSILES (Feuilles). *Sesfia folia.* On donne ce nom aux feuilles lorsqu'elles reposent immédiatement sur la tige ou sur les rameaux, c'est-à-dire, lorsqu'elles n'ont point de pétiole ou de queue. Ce même nom a lieu pour toutes les autres parties des plantes qui manquent d'un support particulier ; ainsi les fleurs, les fruits, sont sessiles quand ils n'ont point de pedoncule ; les stigmates, quand ils manquent de style & qu'ils reposent sur l'ovaire, comme dans le pavot ; l'anthère, quand il n'y a point de filament, &c.

ou six loges, plus souvent cinq, contenant des semences r:iformes, no:irâtres, revêtues d'une enveloppe propre, blanchâtre & très-mince.

Cette plante croît à l'île de Cuba : elle est cultivée dans le Jardin royal des Plantes de Madrid, où elle fleurit dans le courant du mois d'août. (*Descript. ex Orteg.*)

SÉTACÉES (Feuilles). *Setacea folia*. On donne ce nom aux feuilles lorsqu'elles sont aussi menues qu'un cheveu ou qu'un fil de soie. Elles portent aussi le nom de *capillaires*. Cette dénomination s'applique également aux pédoncules, aux pétioles, même aux tiges, lorsqu'elles ont les mêmes caractères. Le *figuier ovina*, l'asperge, ont des feuilles sétacées.

SÈVE ou **LYMPHE**. C'est cette liqueur presque simple, sans couleur, sans odeur, & peu différente de l'eau, qu'il ne faut pas confondre avec le **SUC PROPRE** des plantes (*voyez* ce mot), & qui existe dans tous les végétaux en plus ou moins grande abondance, qu'on peut retirer, au renouvellement de la saison, de plusieurs espèces d'arbres, particulièrement de l'érable, du bouleau, du noyer, du charme. C'est au moment où le soleil commence à réchauffer le sein de la terre, & où la nature bienfaisante se dispose à nous prodiguer ses dons, que ce suc vivifiant coule à grands flots dans le tissu interne du végétal, que les ceps de la vigne répandent beaucoup de sève lorsqu'on les coupe, que la vigne *pleure*, selon l'expression des cultivateurs.

La sève ne coule pas aussi abondamment dans toutes les saisons. Si on coupe l'extrémité d'un sarment, en hiver, lorsque la vigne est dépouillée de ses feuilles, ou en été lorsqu'elle en est garnie, on ne voit sortir aucune liqueur. Le cours de la sève paraît même interrompu sur la fin du printemps. En effet, si l'on presse alors avec force un sarment coupé transversalement, la liqueur ne tardera pas à suinter; mais elle rentrera dans les vaisseaux aussitôt que la pression n'aura plus lieu.

Quoique la sève ne se manifeste d'une manière sensible qu'au commencement du printemps, quoiqu'elle ne paroisse être en mouvement qu'à cette époque, néanmoins il est certain qu'elle est balancée avec plus ou moins de vitesse dans le végétal durant toutes les autres saisons de l'année. Pendant l'été, les transpirations abondantes, occasionnées par les chaleurs, ralentissent son mouvement, & ne laissent dans l'individu que la quantité de sève nécessaire à sa nourriture. Pendant l'automne, les transpirations sont moins fortes; aussi son mouvement est plus apparent. Pendant l'hiver, il paraît suspendu; mais on ne sauroit révoquer en doute son existence, puisque les boutons prennent alors de l'accroissement. On ne doit

pas être surpris que le mouvement de la sève soit moins sensible durant les trois saisons dont nous venons de parler, puisque la sève change alors de nature. Elle étoit sans couleur, sans odeur, & semblable à l'eau dans le commencement du printemps, tandis que dans les autres saisons elle contracte un goût herbacé assez désagréable; elle s'épaissit, & devient, dans les pluies, assez semblable à de la gelée. Si ce nouvel état n'est pas propre à faciliter son effusion, il est certain que c'est du moins celui qui paroît le plus favorable aux productions du végétal.

Duhamel voulant éprouver si les ceps de vigne étoient sensiblement fatigués de l'écoulement forcé de la sève, choisit pour cet effet plusieurs ceps à peu près égaux, & retira le plus de lymphes qu'il lui fut possible de la moitié de ces ceps. Il ne remarqua aucune différence, pendant le cours de l'été & de l'automne, entre les ceps dont l'écoulement avoit été forcé, & ceux dont l'écoulement avoit été naturel, soit dans la production du bois, soit dans celle des fruits. Ainsi, il ne paroît pas que l'effusion de la sève produise un effet sensible sur les plantes.

Le même physicien a observé que l'effusion de la sève étoit subordonnée à quelques circonstances. 1°. Si l'on n'entame que l'écorce, sans pénétrer dans le bois, on n'aura point ou presque point de liqueur. 2°. La lymphes ne coule jamais plus abondamment que lorsqu'après une forte gelée il survient un dégel. C'est aussi dans ce tems favorable, qu'on retire, en Amérique, le suc des érables. 3°. Dans le tems que le suc coule abondamment, l'écorce est adhérente au bois, & les boutons n'ont pris aucun accroissement. Quand les boutons commencent à s'ouvrir, la lymphes coule alors avec moins d'abondance, & elle change de nature; enfin, lorsque les feuilles se déroulent & commencent à paroître, l'effusion cesse totalement. 4°. La lymphes ne transsude point ou presque point des vaisseaux de l'écorce; elle ne s'écoule pas non plus de la partie située entre le bois & l'écorce, mais elle s'échappe du corps ligneux, & l'effusion paroît proportionnée à la profondeur de l'entaille dans le bois. A la vérité, sous la zone torride, les palmiers donnent leur sève pendant toute l'année, quoique les incisions soient peu profondes; mais il faut observer que la liqueur qui s'écoule, n'est pas une lymphes pure, puisqu'elle passe facilement à la fermentation.

Une des questions les plus importantes que présente la sève, est celle qui concerne les mouvements de cette liqueur. Plusieurs physiciens ont prétendu que ce mouvement de la sève n'exigeoit pas qu'elle fût contenue dans des vaisseaux particuliers: un grand nombre d'expériences prouve incontestablement, selon eux, que les bois, même les plus durs, peuvent être traversés par les liqueurs, suivant la direction de leurs fibres. 1°. L'ef-

prit-de-vin s'évapore très promptement quand on le met dans un étai de bois, quoique néanmoins cet étai soit exactement fermé. 2°. Camus, de l'Académie des Sciences, ayant fait aboutir un tuyau de trois cents pieds de longueur & rempli d'eau, à un gros bloc d'orme, dont le bois étoit très-fin, la charge de cette colonne d'eau la fit passer à travers les fibres, comme si elle fût sortie d'un arrosoir. 3°. Si l'on place un vase de bois, dans le quel on aura mis du mercure, sous le récipient d'une machine pneumatique, dès que l'on aura assez pompé l'air pour que le poids de l'atmosphère exerce sa pression sur le mercure, on verra bientôt un fluide métallique tomber en forme de pluie dans le récipient. Il est donc incontestable, selon ces physiciens, que les liqueurs traversent la substance du bois quand elles y sont déterminées par une pression assez forte; ainsi, les fibres doivent être comparées plutôt à des mèches de coton, qu'à des filets creux.

Les physiciens, qui croient que les fibres des plantes sont filuleuses, s'appuient sur les observations suivantes: 1°. ils ont remarqué que les sucs nourriciers doivent être portés avec force vers certaines parties, & suivant certaines directions, & que par conséquent des vaisseaux sont bien plus propres à remplir ces fonctions, qu'un simple parenchyme ou une substance coroneuse; 2°. il y a dans le corps ligneux, dans l'écorce, dans les feuilles, dans les fleurs, &c. des liqueurs fort différentes les unes des autres; mais comme ces liqueurs ne doivent ni se mêler ni se confondre, il paroit très-raisonnable d'en conclure que des vaisseaux seuls sont propres à opérer cette séparation; 3°. la chair d'un coing ou d'une poire caissée ne répand point son eau quand on coupe ces fruits: cette chair paroit même assez sèche; cependant elle fournit beaucoup de liqueur quand on la rape ou lorsqu'on la pile, parce qu'alors on a rompu ou déchiré les vaisseaux qui contenoient la liqueur. Il faut donc conclure, selon ces physiciens, que les liqueurs circulent dans les fibres filuleuses ou dans des vaisseaux.

Duhamel, après avoir rappelé les preuves qui peuvent être favorables aux deux opinions qui viennent d'être exposées, n'a point osé décider une question qui a partagé jusqu'à présent les physiciens. Il croit néanmoins qu'il y a dans les plantes, ou de véritables vaisseaux, ou des organes qui en font les fonctions. (*Voyez l'article PLANTE*, pag. 410.)

La sève a un double mouvement qu'il n'est pas possible de révoquer en doute; savoir: le mouvement d'ascension, & le mouvement de descension.

Le mouvement d'ascension est démontré par la force énorme d'effusion dont toutes les parties des végétaux sont douées. Haller fit fouiller, dans le mois d'août d'une année fort sèche, le pied d'un

poirier; il coupa le bout d'une de ses racines, qui avoit un demi-pouce de diamètre, & il l'introduisit dans un tuyau d'un pouce de diamètre, & de huit pouces de longueur; il joignit à ce premier tuyau un autre de dix-huit pouces de longueur, & d'un quart de pouce de diamètre; il tourna en haut l'extrémité inférieure de ce dernier tuyau; il le remplît d'eau, puis il le remit dans la première situation, en sorte que son extrémité se trouva dans le mercure qui étoit dans un vase. L'eau ne tira l'eau avec tant de vigueur, qu'elle fit écouler le mercure éroit nommé à la hauteur de huit pouces. Le mercure avoit donc remplacé les huit pouces d'eau aspirée par la racine.

Le même physicien coupa des branches de poirier, de pommier, de cognassier, d'un pouce de diamètre & de trois ou six pieds de longueur; il arracha les feuilles de quelques unes de ces branches, & il conserva les autres. Il plaça chacune des branches, & il les fit ensuite tremper par leur gros bout dans un vase où il y avoit une quantité d'eau commune: les branches, garnies de leurs feuilles, tirèrent, dans l'espace de douze heures, depuis quinze onces d'eau jusqu'à trente, suivant qu'elles avoient plus ou moins de feuilles. Les branches entièrement défeuillées ne tiraient qu'une once d'eau. La force avec laquelle les pleurs de la vigne s'élevaient quand ils furent retenus dans des tuyaux que l'on adapte aux ceps, est aussi une preuve convaincante de l'ascension de la sève dans les rameaux.

Bonnet a fait aussi des expériences qui prouvent que les feuilles ont une grande force pour attirer la sève. Ayant mis des feuilles d'abricotier, détachées de l'arbre, tremper par leur pétiole, les unes dans de l'eau commune, d'autres dans du vin rouge & dans de l'eau d'olive, les feuilles attirèrent ces différentes liqueurs dans des proportions différentes.

On ne peut donc douter que les liqueurs ne soient fortement attirées par les racines, par les branches, par les feuilles, & que la sève ne soit portée à la cime des arbres par une force expresse qui confirme leur vie. Mais, comme l'observe Duhamel, tout ce que l'on avance pour expliquer la cause qui détermine la sève à s'élever, ne doit être regardé que comme de simples conjectures. Le desir de parvenir à cette découverte a depuis longtemps excité les physiciens à chercher s'il pouvoit y avoir quelque cause extérieure de son mouvement, & M. Lamarck en particulier pensoit qu'il la faut chercher dans les vicissitudes de l'atmosphère.

Il seroit curieux de connaître la route que suit la sève en s'élevant dans les plantes. Les anatomistes sont parvenus à acquérir des connaissances certaines sur la distribution des vaisseaux, en introduisant dans les veines & les artères des ani-

maux, des cires & des liqueurs colorées. Avec le secours de ces injections, ils ont reconnu que des parties qu'on ne soupçonnoit pas d'être vasculaires, n'étoient cependant qu'un tissu de vaisseaux. Cette industrie, si utile aux anatomistes, ne peut être employée avec le même succès sur les végétaux, puisqu'il n'est pas possible d'ajuster des tuyaux à l'extrémité des vaisseaux des plantes. Il étoit donc nécessaire d'avoir recours à d'autres moyens, & ces moyens ont été fournis par la force de succion dont les différentes parties des plantes sont douées.

Bonnet, Duhamel & plusieurs autres physiciens ont laissé tremper, pendant quelques jours, dans une infusion d'encre, des branches de sureau & de figuier. Après avoir coupé l'extrémité qui avoit plongé dans la liqueur, ils ont remarqué, 1°. qu'on n'appercevoit aucun trait noir dans l'écorce; 2°. que le bois seul étoit coloré, surtout vers le bas, & que la couleur sembloit s'être rassemblée vers les nœuds en plus grande quantité qu'ailleurs; 3°. que la moëlle ne paroïssoit point avoir été traitée par l'encre.

Les mêmes physiciens, après avoir plongé diverses espèces de branches d'arbres dans d'autres infusions, ont toujours eu à peu près les mêmes résultats: d'où ils ont conclu que la sève ne s'élevait que par les vaisseaux du corps ligneux, qu'elle ne s'élevait point par l'écorce, & qu'il en montait fort peu entre le bois & l'écorce.

En vain, pour combattre cette vérité, objecteroit-on qu'on trouve de vieux ormes & de vieux saules qui, réduits en rameaux vigoureux quoique ces arbres soient creux dans leur intérieur, ou quoique le bois de leur tronc soit pourri: ce qui sembleroit démontrer que la sève s'élève presque totalement par l'écorce. Cette observation n'a aucune solidité; & si l'on examine avec attention les arbres qui sont dans cet état, on trouvera entre le bois pourri de leur tronc & l'écorce, plusieurs couches ligneuses, par lesquelles la sève peut être portée aux rameaux qui se développent. De plus, il est de fait que de gros chênes écorcés, & que l'on tient à couvert des ardeurs du soleil, subsistent pendant plusieurs années, & reproduisent une nouvelle écorce; mais comment ces arbres ainsi mutilés pourroient-ils vivre, se couvrir de feuilles, le revêtir d'une nouvelle écorce, si la sève ou le suc nourricier ne s'élevait par les fibres du bois?

M. Coulomb a présenté à l'Institut national des observations neuves sur cette question. Les expériences de ce célèbre physicien le portent à croire que la sève s'élève dans les végétaux par l'intermédiaire de la moëlle. En effet, ayant pécé au printemps quelques arbres, comme des peupliers & autres, les suc sèveux ne commencèrent à sortir qu'au moment où la tarière eut pénétré jusqu'à la moëlle ou dans son voisinage; il s'échappa en

même temps une grande quantité de bulles d'air ou de quelques gaz qui se précipitoient en faisant un bruit considérable.

Que la sève monte dans les plantes par une pression quelconque, ou par le moyen des vaisseaux du corps ligneux, ou par l'intermédiaire de la moëlle, toujours est-il certain qu'elle a un mouvement réel d'ascension; mais ce mouvement est-il le seul qui existe dans la sève? Et doit-on penser qu'elle puisse uniquement s'élever, & qu'à l'exception des parties vraiment nourricières qui se heurtent dans la plante, qui s'assimilent aux différents organes qu'elles arrosent, toutes les autres parties soient inutiles, ou se dissipent par la transpiration? Un grand nombre de faits & d'expériences prouve qu'une partie de cette sève s'écoule des branches jusqu'aux racines, ou, ce qui revient au même, que la sève a encore un mouvement de descension.

Duhamel, ayant greffé un jeune orme par son extrémité supérieure sur le milieu de la tige d'un autre orme plus gros qui étoit près de lui, coupa, quand l'union fut bien formée, le plus petit de ces deux ormes tout près de la terre: celui-ci, loin de périr, continua pendant plusieurs années à pousser des feuilles sur les rameaux, & même il acquit de la grosseur. Mais comment le jeune arbre, qui ne recevoit plus de nourriture par ses racines, puisqu'il en étoit séparé, pouvoit-il végéter, à moins qu'on ne suppose qu'il ne fût nourri que par la sève descendante? Cependant ce que dit ici Duhamel ne me paroît pas être sans quelques difficultés, quoique je sois parfaitement de son avis sur la sève descendante. Il me semble en effet qu'on pourroit objecter que la sève, qui arrivoit dans cette greffe, venoit directement des racines, & qu'en montant elle se détournoit en partie pour passer dans le jeune arbre, dans les organes duquel elle continuoît à couler par une courbure ascendante, & qu'elle ne faisoit là que ce qu'elle fait habituellement pour les branches courbées en divers sens.

Si l'on fait une entaille sur un tronc, l'humidité qui borde les lèvres de la partie supérieure de la plaie, ne prouve-t-elle pas le mouvement descendante de la sève? Qu'on fasse une forte ligature à une jeune tige, il s'établira deux bourrelets, l'un au dessus de la ligature, & l'autre au dessous: le bourrelet supérieur sera même plus gros que l'inférieur, parce que le volume de la sève qui s'étoit élevée, a été augmenté par les suc aspirés par les feuilles; mais comment concevoir la formation de ces deux bourrelets, à moins qu'on ne suppose dans la sève le double mouvement d'ascension & de descension? Si on plie une branche, & qu'on en fasse tremper l'extrémité supérieure dans l'eau, la succion ne tardera pas à s'établir, & l'on verra diminuer la quantité d'eau contenue dans le vase.

La sève suit-elle la même route dans son double mouvement?

mouvement ? Nous avons vu que la sève ascendante s'élevait, ou par les fibres ligneuses, ou par la moëlle : il est probable que la sève descendante s'écoule par les fibres corallales les plus voisines du bois. En effet, dans l'expérience des injections, la liqueur colorée s'étant élevée le long des fibres ligneuses, commençoit à redescendre par l'écorce, ou, ce qui revient au même, la coloration du bois commençoit par le bas, & celle de l'écorce commençoit à se manifester par le haut.

Il est plus facile de démontrer le double mouvement de la sève, que de découvrir la manière dont il s'opère, & quelle peut en être la cause. Toutes les opinions sur cette matière peuvent se réduire à deux. Parmi les physiciens, les uns admettent la circulation de la sève, & les autres la rejettent, quoique ceux-ci reconnoissent que les liquides des végétaux ont divers mouvemens, selon différentes directions qu'ils expliquent chacun à leur manière.

Les physiciens qui admettent la circulation de la sève, prétendent que l'humidité dont les plantes sont nourries, monte, au sortir des racines, dans la tige, dans les branches, dans les feuilles, dans les fruits, &c. où elle dépose ce qu'elle a de propre pour la nourriture & pour l'accroissement de ces organes. La partie surabondante ou inutile de cette humidité descend dans les racines pour y recevoir une nouvelle coction & une nouvelle préparation ; elle s'unit aux nouveaux sucres que les racines ont tirés de la terre, & elle remonte avec eux dans les parties supérieures des plantes.

Les physiciens, qui nient la circulation de la sève, conviennent néanmoins qu'elle est tantôt ascendante, tantôt descendante ; mais, en admettant l'existence de ce double mouvement, ils ne l'attribuent pas à la même cause.

Dodart pensoit que la sève ascendante étoit différente de celle qui retournoit vers les racines, & que ces deux espèces de sève étoient contenues dans des vaisseaux de différente structure ; ainsi il ne lui manquoit plus, comme l'observe Duhamel, pour admettre la circulation de la sève, que de convenir qu'il y avoit quelque communication entre ces deux sortes de vaisseaux.

Bonnet, dont les sublimes découvertes ont éclairci tant de points obscurs de la physique végétale, pense que le double mouvement de la lymphe, dans les végétaux, doit se faire d'une manière plus simple, & exiger moins de préparations que la circulation du sang dans les animaux. C'est une vérité, dit ce célèbre naturaliste, prouvée par l'inspection des organes. En effet, les plantes n'ont point de parties qui répondent, par leur structure ou par leur jeu, à celles qui opèrent la circulation du sang dans les grands animaux ; elles n'ont ni cœur, ni artères, ni veines, leur struc-

Botanique. Tome VII.

ture est simple & uniforme ; les fibres ligneuses, les utricules, les vaisseaux propres, les trachées, composent le système eniet de leurs viscères, & ces viscères sont répandus universellement dans tout le corps de la plante : on les retrouve jusque dans les moindres parties. Les vaisseaux sèveux n'ont point de valvules destinées à favoriser l'ascension de la sève, & à en empêcher la rétrogradation. Quand les valvules échapperoient au microscope, l'expérience prouveroit assez qu'elles n'existent pas, puisque les plantes que l'on plonge dans l'eau, ou que l'on met en terre par leur extrémité supérieure, ne laissent pas de végéter.

Il est si vrai que la sève monte & descend librement par les mêmes vaisseaux, que si, après avoir coupé dans une belle saison une branche, on adapte au tronçon un tube de verre qui contienne du mercure, on verra la sève élever le mercure pendant le jour, & le laisser tomber à l'approche de la nuit. La marche de la sève, dans la belle saison, ressemble donc assez à la liqueur d'un thermomètre ; l'une & l'autre dépend également des alternatives du chaud & du froid.

Enfin, les divers phénomènes de la végétation, qu'on a regardés comme de fortes preuves de la circulation de la sève, ne la supposent point nécessairement. Tous ces phénomènes s'expliquent de la manière la plus heureuse, par un principe fort simple, fondé sur l'observation : c'est qu'il y a une étroite communication entre toutes les parties d'une plante ; elles sont toutes, à l'égard les unes des autres, dans un état de fusion. La nourriture que prend une de ces parties, se transmet aux autres ; les feuilles se nourrissent réciproquement ; la racine pompe le suc de la tige, la tige pompe le suc de la racine ; ainsi, du commerce mutuel qui est entre le sujet & la greffe, résulte cette communication réciproque de leurs bonnes ou mauvaises qualités qu'on allègue en preuve de la circulation : le suc nourricier passe alternativement du sujet dans la greffe, & de la greffe dans le sujet.

On ne peut disconvenir qu'il n'y ait des rapports entre les plantes & les animaux ; mais ces rapports ont leurs limites, & on ne doit user de l'analogie qu'avec une extrême sobriété. Si la nature a prodigieusement varié les formes extérieures des corps organisés, elle n'a pas moins varié les moyens qu'elle a choisis pour les faire vivre, croître, multiplier. Parmi les animaux mêmes, combien en est-il dans lesquels la circulation ne suit pas les mêmes lois qu'elle observe dans l'homme ? N'y a-t-il pas encore des animaux dans lesquels on ne découvre point de circulation ? N'en existe-t-il pas même dans lesquels les aliments paroissent simplement ballottés de haut en bas, & de bas en haut ?

Une partie du suc nourricier qui s'élève par les

T

fibres ligneuses, passe par les feuilles & les fleurs dans l'écorce, de là dans la racine; une autre partie de ce suc retourne par les mêmes vaisseaux vers la racine, d'où elle repasse encore dans la tige. Par ce balancement, qui se répète plus ou moins, le suc grossier reçoit déjà une sorte de préparation; il se perfectionne dans des vaisseaux plus déliés, & dans des utricles; le superflu s'échappe par les feuilles. (Voyez Bonner, Hales, Dubamel, Ventenat, Règne végétal, &c.)

SÉVOLE. *Scavola*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des campanulacées, qui a quelques rapports avec les *phyteuma*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont un peu grasses, les fleurs disposées en corymbes axillaires, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice à cinq découpures; une corolle irrégulière, infundibuliforme; le tube fendu d'un côté longitudinalement; le limbe latéral, à cinq divisions; cinq étamines; un style; un stigmate velu; un drupe inférieur; un noyau à deux loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, très-court, persistant, à cinq divisions.

2°. Une corolle irrégulière, monopétale, infundibuliforme, dont le tube est long, fendu longitudinalement à un de ses côtés; le limbe latéral, à cinq découpures ovales-lancéolées, membraneuses à leurs bords.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont courts, capillaires, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthers oblongues, droites, point réunies.

4°. Un ovaire inférieur, ovale, surmonté d'un style filiforme, épaissi à sa partie supérieure, plus long que les étamines, forçant par la fente du tube & courbé vers le limbe, terminé par un stigmate aplati & velu.

Le fruit est un drupe arrondi, ombiliqué, à une seule loge, renfermant un noyau tuberculeux, ridé, ovale, à deux loges, à deux semences; les semences un peu ovales, foliaires.

ESPÈCES.

1. SÉVOLE de Plumier. *Scavola Plumieri*. Lam.

Scavola foliis obovatis, integerrimis; calice deciduo, drupis levibus. Lam. Illustr. Genet. vol. 2 pag. 70. n°. 2594. tab. 114. fig. 1.

Scavola (lobelia), foliis obovatis, glabris, integerrimis. Linn. Syst. veget. pag. 213. — Vahl, Symb. 2. pag. 36. — Swartz, Oberv. 70. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 955. n°. 1.

Lobelia (Plumieri), frutescens; foliis ovali-oblongis, integerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1317. — Flor. zeyl. 313. — Osb. Iter, 275. — Jacq. Amer. pag. 219. tab. 179. fig. 88. & Picur. pag. 36. tab. 199.

Lobelia frutescens, portulaca folio. Plum. Gener. Amer. pag. 21. & Burm. Amer. Icon. 165. fig. 1. — Catesb. Catal. pag. 79. tab. 79.

Lobelia frutescens. Miller, Dict.

Buglossum littoreum. Rumph. Amb. vol. 4. pag. 116. tab. 54.

C'est un petit arbrisseau, dont les tiges, non laiteuses, sont cylindriques, glabres, médiocrement épaisses, munies de rameaux alternes, tuberculeux par l'impression des anciennes feuilles. Les feuilles sont nombreuses, alternes, presque épaisses, presque sessiles, un peu grasses, ovales-oblongues, très-entières à leurs bords, élargies & arrondies à leur sommet, rétrécies en pétiole court à leur base, glabres à leurs deux faces, munies dans leurs aisselles de touffes de poils lanugineux.

Les fleurs sont disposées en grappes latérales dichotomes; les divisions du pédoncule également dichotomes; une fleur sessile dans chaque bifurcation; les autres pédonculées. A la base de chaque division, & sous les calices, sont situées des bractées sessiles, opposées, subulées, velues intérieurement dans leur aisselle. Toutes les parties de chaque fleur ont éminemment le caractère du genre. La corolle est velue intérieurement. Les fruits sont glabres, point anguleux, ni toruleux, ni couronnés par le calice.

Cette plante croit également dans les contrées méridionales & chaudes de l'Amérique, & dans les Indes orientales, mais avec de légères différences. Dans celle de l'Amérique, le calice est supérieur; ses bords sont entiers, à peine légèrement dentés; deux bractées à la base de l'ovaire. Dans la plante des Indes, le calice est muni à ses bords de cinq dents obtuses. M. Ledru m'en a communiqué un exemplaire qu'il a recueilli à Porto-Ricco. (V. f.)

2. SÉVOLE des Indes. *Scavola Koenigii*. Vahl.

Scavola foliis obovatis, superne crenato-repandis; calice persistente; drupis torosis. Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 70. n°. 2595. tab. 124. fig. 2.

Scavola foliis obovatis, glabris, superne densato-fimbriandis; calice quinque-dentato. Vahl, Symb. 1. pag. 36. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 956. n°. 2.

Lobelia taccada. Gærtner, de Fruct. & Sem. tab. 25.

On distingue cette espèce de la précédente, à ses fruits toruleux, couronnés par le calice; aux fleurs des dichotomies pédicellées; aux feuilles sinuées, presque crénelées à leur partie supérieure.

C'est un arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, lisses, très-glabres, longs d'environ trois poices, ovales, rétrécies & enfoncées à leur partie inférieure, élargies, sinuées & dentées à leur partie supérieure, sans nervures sensibles, garnies dans leurs aisselles d'une touffe de poils lanugineux.

Les fleurs sont axillaires, pédonculées, disposées en corymbes; les pédoncules longs d'environ un poice, dichotomes à leur sommet; les fleurs de la dichotomie pédicellées; les autres opposées, munies, à la base des divisions du pédoncule, de bractées lancéolées, plus courtes que les pédoncules partiels, lanugineuses dans leurs aisselles; les calices divisés en cinq découpures subulées à leur sommet; la corolle glabre, longue d'un poice; le tube fendu, presque jusqu'à sa base, à un de ses côtés, un peu velu intérieurement à sa partie inférieure; les découpures du limbe, glabres & lancéolées; les filamens de moitié plus courts que le tube de la corolle; les anthères séparées; le style velu à sa base; le stigmate en forme de coupe, dont l'intérieur est garni de poils blancs très-abondans; le fruit glabre, toruleux, à cinq côtes peu élevées, couronné par le calice.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h*

3. SÉVOLE soyeuse. *Scavola sericea*. Forst.

Scavola foliis obovatis, villosis, mollissimis, supernè dentatis. Vahl, Symb. 2. pag. 37. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 956. n°. 3.

Scavola sericea. Forst. Prodr. n°. 504.

Cette espèce a des rapports avec le *Scavola Koenigii*; elle s'en distingue par ses feuilles molles & velues, & par quelques autres caractères dans les parties de sa fructification.

Ses tiges sont ligneuses; elles se divisent en rameaux velus, de couleur brune, hérissés d'aspérités par l'impression des feuilles après leur chute. Celles-ci sont éparies, presque sessiles, en ovale renversé, rétrécies presque en pétiole à leur base, obtuses & dentées à leur partie supérieure, molles, velues, vertes à leurs deux faces; les pétioles très-courts, barbus dans leur aisselle.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires, rameux; les ramifications opposées, munies de bractées lancéolées, opposées, un peu recour-

bées, situées à la base des pédoncules partiels. Le calice est supérieur, divisé en cinq découpures profondes, lancéolées. La corolle est velue extrêmement; son tube un peu coriace, long d'environ un poice; les découpures du limbe, latérales, obtuses, munies d'une membrane mince; les filamens filiformes, insérés sur le tube de la corolle, de la longueur du style; les anthères oblongues, légèrement adhérentes ou rapprochées sous le stigmate, transverses & arrondies à leur base. Le style est long d'un poice, linéaire, trois fois plus épais que les filamens; le stigmate en forme de coupe, vert, trois fois plus large que le style, transparent & légèrement denticulé à ses bords. Le fruit est un drupe globuleux, velu, de la grosseur d'un pois, couronné par le calice.

Cette plante croît dans l'Inde. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

SEX. des plantes. Quelle heureuse & brillante découverte, que celle de l'existence des sexes dans les plantes! Elle nous fait connoître de plus en plus la simplicité des lois de la nature, multiplie les rapports entre les animaux & les végétaux, & nous apprend la destination de plusieurs organes particuliers que les Anciens avoient bien reconnus en partie dans les végétaux, mais dont ils ignoroient l'usage. La possibilité de ces organes, souvent peu apparens, les faisoit négliger; on se bornoit presque à n'en rien dire, ou à les regarder comme destinés à quelques sécrétions particulières. Les organes mâles sont construits par les étamines, & les organes femelles par les pistils. (*Voyez les mots ÉTAMINES, PISTILS, FÉCONDATION.*)

La manière dont s'opère la fécondation des plantes, dit M. Ventenat, au moyen de leurs différentes parties sexuelles, est une de ces belles opérations de la nature, qu'on est surpris d'avoir été si long-temps à connoître, & que nous ne connoîtrions peut être encore qu'imparfaitement sans les travaux de Linnæus, l'un des plus étonnans génies qui aient traité jusqu'à présent l'Histoire naturelle. Il seroit très-difficile de dire quel est celui qui a découvert le sexe des plantes. Plusieurs aperçus, peu importants d'abord, ont conduit probablement à cette grande découverte.

Ce fut sur la fin de l'avant-dernier siècle qu'on soupçonna la véritable fonction des étamines & des pistils, & qu'on commença à croire que ces organes étoient réellement les parties sexuelles des végétaux. Nous voyons à la vérité les plantes distinguées, par les Anciens, en mâles & femelles; mais cette distinction n'est fondée sur aucune disposition organique relative aux sexes, & l'on se bornoit à regarder comme plantes femelles, celles qui sont plus délicates & de plus petite taille, & comme plantes mâles, celles qui sont plus hautes & plus vigoureuses.

Quoique Théophraste ait distingué les palmiers en mâles & en femelles, parce que les uns portent des fruits & que les autres sont stériles; quoiqu'il dise expressément que les fruits du palmier *coulent* si l'on n'a pas l'attention de secouer sur les embryons les poussières des étamines, néanmoins cet auteur retombe dans la distinction abusive dont nous venons de parler, & il appelle mâles ou femelles des arbres qui sont incontestablement hermaphrodites. Il en est de même de Plin, de Dioscoride, de Galien & de leurs commentateurs.

Grew rapporte, dans son *Anatomie des Plantes*, que Millington, professeur de botanique à Oxford, lui dit, en parlant de la manière dont les plantes se fécondent, qu'il pensoit qu'au moment où les capsules des sommets (les anthères) s'ouvrent, les poussières qu'elles contiennent, tombent sur les embryons & sur les pistils, & qu'elles fécondent les fruits, non en s'introduisant dans les semences, mais par la communication d'une exhalaison subtile & vivifiante. J'ai adopté ce sentiment. Camerarius, professeur de botanique à Tubinge, a fait un discours dans lequel il cherche à prouver que la génération des plantes s'opère par des moyens sensibles à ceux qui produisent la génération des animaux. Les graines de mercuriale & de pois, dit-il, ne mûrissent point lorsqu'on enlève les fleurs à étamines. Néanmoins Tournefort & plusieurs autres botanistes regardent les étamines & les pistils comme des organes excrétoires, dont la fonction se réduiroit à faciliter quelques sécrétions, à débarrasser les plantes d'un excrément de la même manière à peu près que les reins des animaux séparent l'urine de la masse du sang; mais l'autorité du botaniste français n'entraîne point les suffrages.

Geoffroy reconnut l'existence du sexe des plantes, & Vaillant allégué plusieurs preuves, en faveur de cette vérité, dans son *Discours sur la structure des fleurs*. Il existe une *Lettre de Burckard à Leibnitz*, écrite au commencement du siècle dernier, où non-seulement l'auteur parle du sexe des plantes, mais où il trace encore une méthode pour classer les végétaux d'après les divers caractères fournis par les organes sexuels. Malheureusement la mort enleva Burckard au printemps de ses jours, & le plan qu'il avoit conçu resta sans exécution.

Il étoit réservé à Linnæus de le créer de nouveau, & de lui donner toute la perfection dont il étoit susceptible. Ce célèbre naturaliste, après avoir prouvé, par une longue suite d'expériences, dans la Dissertation qu'il a pour titre *Sponsalia Plantarum* (Amoen. Acad. vol. 1), que les étamines & les pistils étoient les organes sexuels des plantes, établit sur cette base un système peut-être plus ingénieux que solide, dans lequel tous les végétaux viennent aisément se placer. Dès-lors tous les botanistes furent convaincus de l'existence

du sexe dans les plantes. Ponteder, Spallanzani & Aliton furent les seuls qui entreprirent de le combattre; mais, comme l'observe Smith, les raisons qu'ils ont alléguées contre le sentiment de Linnæus, prouvent en sa faveur. Le botaniste suédois est donc le premier qui ait démontré, d'une manière victorieuse, le sexe des plantes, & qui ait mis cette vérité dans tout son jour. Il n'est donc pas étonnant qu'on lui attribue la gloire de cette découverte, de même que Harvey est regardé comme l'auteur de celle de la circulation du sang qu'il a démontrée, quoiqu'on en eût parlé avant lui.

Les organes sexuels, en raison de leur universalité, & surtout en raison de l'importance des fonctions qu'ils remplissent, fournissent des caractères de plus grande valeur que le calice & la corolle, qui ne sont que des organes accessoires. (Ventenat, *Règne végétal*.)

SHAWIA. *Shawia*. Forster, Nov. Gener. p. 48. — Schreb. Gener. Plant. n.º. 1359. — Juss. Gener. Plant. pag. 180.

Genre de plantes établi par Forster, à fleurs composées, de la famille des corymbifères; qui paroît avoir des rapports avec les *serpium*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont disposées en panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice imbriqué & cylindrique; une corolle à cinq découpures; cinq étamines syncinées; un stigmate bifide; le réceptacle nu; une femelle oblongue, surmontée d'une aigrette pileuse, pubescente à sa base.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1.º. Un calice imbriqué, cylindrique, composé de cinq ou six écailles oblongues, trois intérieures plus longues, presque égales.

2.º. Une corolle monopétale, en forme d'entonnoir, courte, dont le limbe est divisé en cinq découpures linéaires, ouvertes.

3.º. Cinq étamines, dont les filaments sont capillaires, terminés par des anthères réunies en cylindre.

4.º. Un ovaire oblong, surmonté d'un style sififorme, plus long que la corolle, terminé par un stigmate bifide, ouvert.

Les semences sont solitaires, oblongues, surmontées d'une aigrette capillaire, pubescente à sa base; renfermées dans le calice persistant.

Le réceptacle est nu.

Cette plante, sur laquelle nous n'avons pas

d'autres détails, croît dans les îles de l'Amérique de la mer du Sud.

SHEFFIELDIE rampante. *Sheffieldia repens*. Linn. f. Suppl. pag. 18 & 135. — Forst. Gener. pag. 18. tab. 9. — Idem, Prodr. n°. 67. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 833. — Jussieu, Gener. Plant. 96.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des limnathes, qui a des rapports avec les *coris*, & qui ne comprend qu'une seule espèce fort petite, dont les tiges sont rampantes; semblable entièrement, par son port, à la forme, la grandeur & la disposition de ses feuilles, au *peplis portula*, dont elle n'est distinguée que par sa fructification, qui en est très-différente.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq découpures; une corolle campanulée, à cinq lobes; dix filamens, dont cinq stériles; un stigmate en tête; une capsule uniloculaire, à cinq valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, persistant, à cinq divisions aiguës.

2°. Une corolle monopétale, campanulée, plus longue que le calice, dont le limbe est divisé en cinq découpures ovales, rétrécies.

3°. Dix étamines, dont les filamens sont tubulés, insérés sur le tube de la corolle; cinq fertiles, opposés aux découpures du limbe; cinq stériles, sans anthères. Celles-ci sont acuminées, échan-crées en cœur.

4°. L'ovaire est oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple, en tête.

Le fruit est une capsule conique, à une seule loge, s'ouvrant en cinq valves, renfermant des semences nombreuses, globuleuses, attachées à un réceptacle central.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande & dans les îles de Pâques. x

Notz. M. Labillardière vient de publier, dans ses *Plantes de la Nouvelle-Hollande*, une nouvelle espèce de *Sheffieldia*, que je joins ici.

SHEFFIELDIE blanche. *Sheffieldia incana*. Labill.

Sheffieldia caulibus erectis. Labill. Nov. Holl. Plant. Specim. pag. 40. tab. 54.

Cette plante a des tiges droites, blanchâtres, ainsi que toutes ses parties, chargées de plus de

pores nombreux & de glandes saillantes. Les feuilles sont alternes, épaisses, oblongues, acuminées, rétrécies à leur partie inférieure.

Les fleurs sont pédonculées, axillaires, terminales. Le calice est persistant, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle presque campanulée; son limbe divisé en cinq lobes presque orbiculaires; les filamens des étamines au nombre de dix, subulés, cinq alternes, stériles; les anthères haillées. L'ovaire est ovale, à demi-inférieur, à une seule loge, s'ouvrant à son sommet en cinq valves opposées aux découpures du calice, renfermant plusieurs semences oblongues, arquées, noires, insérées sur un réceptacle central, tubiné.

Cette plante croît au Cap Diemen, dans la Nouvelle-Hollande. (*Descript. ex Labill.*)

SIALITE. *Dillenia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, affilées à la famille des magnolières, qui a quelques rapports avec les *ochna*, & qui renferme des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont grandes & coriaces, les fleurs belles & très-grandes pour la plupart, axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles; cinq pétales; des étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle; des stigmates sessiles; des capsules nombreuses, conniventes, pulpeuses intérieurement, & polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq folioles grandes, coriaces, concaves, oblongues ou presque rondes, persistantes, souvent velues en dehors.

2°. Une corolle composée de cinq pétales, souvent très-grands, presque coriaces, en ovale renversé, arrondis à leur sommet, rétrécis à leur base, souvent un peu crénelés, caducs.

3°. Des étamines nombreuses, affectant par leur réunion une forme sphérique, dont les filamens sont extrêmement courts, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthères droites, oblongues, adnées aux filamens, plus courtes que la corolle.

4°. Vingt ovaires environ, ovales-oblongs, acuminés, comprimés, réunis par leur côté intérieur, surmontés de styles droits, plus longs que les anthères, terminés par des stigmates simples.

Le fruit consiste en autant de capsules qu'il y a d'ovaires, oblongues, à côtes, & sillonnées en dehors, attachées par leur côté intérieur en un réceptacle central & pulpeux, qui reçoit également des semences nombreuses, petites, enrou-

rées d'une substance pulpeuse, & recouvertes par les capsules.

ESPÈCES.

1. *SIALITE* à grands fleurs. *Dillenia speciosa*. Thunb.

Dillenia foliis oblongis, rotundato-acutis, denticulatis; pedunculis unifloris. Thunb. A.Q. Soc. Linn. Lond. t. pag. 200. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1251. n° 3.

Dillenia indica. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 745. — Hort. Cliff. 231.

Syalita. Rheed. Malab. vol. 3. pag. 39. tab. 38. 39. — Rai, Hist. 1707.

Malva-rosea, syalita dista. Pluken. Mantiff. 124. — Burm. Flor. ind. 124.

C'est un grand & bel arbre qui s'élève à une hauteur assez considérable, dont les rameaux sont diffus, épais, fortement ridés, glabres, de couleur cendrée, garnis de feuilles pétiolées, alternes oblongues, arrondies à leur partie supérieure, obtuses à leur sommet, terminées par une pointe particulière, ondulées & légèrement denticulées à leur contour, glabres, verdâtres à leur face supérieure, sombres, de couleur brune en dessous, longues de près d'un pied, larges de trois à quatre pouces, supportées par un pétiole court, épais, à peine long d'un pouce.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des rameaux, soutenus par un long pédoncule simple, solitaire, uniflore. Le calice est ample, glabre, divisé profondément en cinq découpures oblongues, concaves, obtuses. La corolle est grande, un peu membraneuse, d'une belle couleur de rose; les pétales légèrement arrondis, concaves; les étamines très nombreuses, beaucoup plus courtes que les pétales, formant dans le centre de la corolle une tête presque globuleuse. Les capsules sont glabres, ovales-oblongues, sillonnées, pulpeuses dans leur intérieur.

Cet arbre croît à l'île de Java & sur la côte du Malabar. \mathfrak{H}

2. *SIALITE* à feuilles entières. *Dillenia integra*. Thunb.

Dillenia foliis oblongo-ovatis, obtusis, subserrulatis; pedunculis unifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1251. n° 2. — Lam. Illust. Gener. tab. 492. fig. 1.

Dillenia (integra), foliis obovatis, obtusis, subserratis; pedunculis unifloris. Thunb. A.Q. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 199. tab. 18.

Cet arbre a ses rameaux glabres, alternes, ridés, de couleur brune, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales-oblongues, obtuses à leur

sommet, légèrement & à peine dentées depuis leur milieu jusqu'à leur sommet, entières à leur partie inférieure, glabres à leurs deux faces, coriaces, vettes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, longues d'environ six à sept pouces, larges au moins de trois, rétrécies, presque aiguës à leur base, veinées, réticulées, munies de nervures simples, latérales, alternes; les pétioles à demi-cylindriques, canaliculés en dessus, longs d'un pouce, velus principalement à leur base.

Les fleurs naissent sur les derniers rameaux vers leur extrémité : elles font presque solitaires, pédonculées; les pédoncules allongés, cylindriques, simples, uniflores. Le calice est glabre, à cinq découpures profondes, oblongues, concaves, obtuses; la corolle grande; les pétales ovales, presque ronds, obtus à leur sommet, ouverts, marqués de lignes longitudinales.

Cette plante croît à l'île de Ceilan. \mathfrak{H}

3. *SIALITE* à cinq styles. *Dillenia pentagyna*. Roxb.

Dillenia foliis oblongis, utrinque acutis, serratis; pedunculis unifloris, aggregatis, lateralibus; floribus pentagynis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1252. n° 6.

Dillenia pentagyna. Roxb. Coromand. vol. 1. pag. 21. tab. 20.

C'est un arbre dont les rameaux sont garnis de feuilles pétiolées, alternes, oblongues, aiguës à leur deux extrémités, finement dentées à leurs bords, longues d'un pied & plus, larges de six pouces, glabres à leurs deux faces, veinées; les veines presque opposées, parallèles. Les pétioles ont deux pouces de long; ils sont dilatés à leur base, & canaliculés à leur face supérieure.

Les fleurs naissent sur les rameaux de l'année précédente. Il sort, des bourgeons latéraux, quatre, six & même neuf pédoncules agrégés, simples, uniflores. Le calice est formé par cinq folioles un peu arrondies, obtuses, une fois plus courtes que la corolle. Celle-ci est jaune, l'une des plus petites parmi les espèces de ce genre, de la grandeur de celle du *caltha palustris*. Les pétales sont lancéolés; les étamines nombreuses, parmi lesquelles dix sont quatre fois plus longues que les autres. Il n'y a que cinq styles.

Cette plante croît sur les montagnes du Coromandel. \mathfrak{H} (Descript. ex Willd.)

4. *SIALITE* sarmenteuse. *Dillenia scandens*. Willd.

Dillenia foliis lanceolatis, integerrimis, mucronatis; caule scandente. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1251. n° 1.

Dillenia humilis. Donn. Catal. Hort. Cant. 64.

Arbrisseau dont les tiges sont grimpantes, hautes de quatre pieds, munies de rameaux cylindriques, pubescens dans leur jeunesse, garnis de feuilles pétiolées, alternes, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, très-entières à leur contour, mucronées à leur sommet, veinées, glabres à leur face supérieure, chargées en dessous de poils épars.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux, presque sessiles, amples, presque aussi grandes que celles du *magnolia glauca*. Les calices sont composés de cinq grandes folioles ovales-lancéolées, chargées de poils soyeux.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. On la cultive dans les serres du Jardin des Plantes de Paris. *h* (*Descript. ex Willd.*)

5. SIALITE émouffée. *Dillenia retusa*. Thunb.

Dillenia foliis obovatis, remotè dentatis, apice truncatis; pedunculis unifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1253. n°. 7.

Dillenia (retusa), *foliis obovatis, truncatis, serratis; pedunculis unifloris*. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 200. tab. 19. — Lam. Illustr. Gener. tab. 492. fig. 2.

Cette espèce est remarquable par la forme de ses feuilles, la plupart émouffées & comme tronquées à leur sommet; par ses fleurs d'une grande médiocrité.

Son tronc se divise en rameaux alternes, glabres, ridés, de couleur brune, garnis de feuilles alternes, pétiolées, très-rapprochées, en ovale renversé, glabres à leurs deux faces, rétrécies & presque entières à leur base, dentées presque en scie à leur partie supérieure; les dentelures distantes, courtes, obtuses & tronquées la plupart à leur sommet, coriaces, marquées de nervures latérales, simples, alternes, parallèles, un peu arquées à leur sommet, l'intervalle rempli par des veines réticulées, longues de six à sept pouces sur trois pouces de large, supportées par des pétioles à demi-cylindriques, canaliculés, longs à peine d'un pouce, velus à leur base.

Les fleurs sont solitaires, terminales, pédonculées; les pédoncules simples, allongés, cylindriques, uniflores; le calice divisé en cinq folioles ovales, obtuses; la corolle d'une grandeur médiocre; les pétales ovales, rétrécis à leur base, mais sans onglet, obtus à leur sommet, à peine d'un tiers plus longs que le calice.

Cet arbre se rencontre dans les forêts de l'île de Ceilan. *h*

6. SIALITE dentée. *Dillenia dentata*. Thunb.

Dillenia foliis subrotundis, repando-dentatis; pe-

dunculis multifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1252. n°. 9.

Dillenia (dentata), *foliis ovatis, revulsis, dentatis; pedunculis trifloris*. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 201. tab. 20. — Vahl, Symb. 3. pag. 72.

Wormia (triquetra), *petiolis triquetris, alternis, latere superiore transversim striatis*. Roerb. in Nov. Act. Hoffm. 2. pag. 532. tab. 3.

Arbor zeylanica, fructu acido. Burm. Zeylan. pag. 30.

Ghodhagara. Herm. Zeylan. 49. — Linn. Flor. zeyl. n°. 612.

Cet arbre se divise en rameaux alternes, ridés, glabres, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales ou un peu arrondies, très-obtus ou tronquées avec une échancrure, très-entières à leur partie inférieure, finues & dentées à leur partie supérieure, vers leur sommet, coriaces, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, d'un vert plus sombre à leur face inférieure, longues de trois à quatre pouces, marquées de nervures presque opposées, parallèles, dirigées vers le sommet; les pétioles sont glabres, anguleux, canaliculés en dessus, presque aussi longs que les feuilles.

Les fleurs sont grandes, disposées en petites grappes à l'extrémité des rameaux, environ au nombre de trois sur chaque grappe, soutenues par des pédoncules partiels, glabres, alternes, longs à peu près d'un demi-pouce; les pétales ovales, très-obtus, rétrécis vers leur base, une fois plus longs que les calices; ceux-ci sont composés de cinq folioles concaves, lancéolées, un peu aiguës.

Cette plante croît dans l'île de Ceilan. *h*

7. SIALITE elliptique. *Dillenia elliptica*. Thunb.

Dillenia foliis elliptico-ovatis, acutis, serratis; pedunculis unifloris. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 200. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1252. n°. 4.

Songium. Rumph. Amb. vol. 2. p. 140. tab. 45.

C'est un arbre dont les rameaux sont garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, elliptiques, à peine dentées en scie à leurs bords, aiguës & même acuminées à leur sommet, garnies de nervures opposées, parallèles. Les fleurs sont placées à l'extrémité des rameaux, sur des pédoncules simples, uniflores.

Cette plante croît dans les Indes, dans les îles d'Amboine & des Célèbes. *h*

8. SIALITE fangi. *Dillenia serrata*. Thunb.

Dillenia foliis elliptico-ovatis, acutis, serratis;

pedunculis trifloris. Thuob. Aët. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 201. — Willd. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1252. n°. 5.

Sanguis. Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 142. tab. 46.

On distingue cette espèce à ses fleurs supportées par des péduncules latéraux, sur lesquels elles sont réunies au nombre de trois, chacune d'elles légèrement pédicellée. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ovales, elliptiques, finement dentées à leur contour, aiguës à leur sommet, marquées de nervures presque opposées ou alternes, latérales & parallèles.

Cette plante croît dans les îles de Java & des Célèbes. h

SIBBALDE. *Sibbaldia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des rotacées, division des pimprenelles (*sanguiflorae*), qui a des rapports avec les *alchimilla*, & qui renferme des herbes la plupart indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont souvent ternées, à folioles simples, dentées ou découpées; les fleurs sont axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à dix découpures, alternativement plus étroites; cinq pétales; cinq étamines; cinq ovaires, autant de styles, de stigmates & de semences renfermées dans le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, droit à sa base, à demi-divisé à son limbe en dix découpures à demi-lancéolées, très-ouvertes, de même longueur, alternativement plus étroites, persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ovales, insérés sur le calice.

3°. Cinq étamines dont les filaments sont capillaires, plus courts que la corolle, insérés sur le calice, terminés par des anthères petites, obtuses.

4°. Cinq ovaires très-courts, ovales; autant de styles de la longueur des étamines, situés latéralement vers le milieu des ovaires, terminés par des stigmates simples, en tête; quelquefois les pistils se doublent & sont au nombre de dix.

Les semences, au nombre de cinq, sont nues, oblongues, renfermées dans le calice persistant & presque fermé.

ESPÈCES.

1. **SIBBALDE couchée.** *Sibbaldia procumbens*. Linn.

Sibbaldia foliis ternatis; foliolis tridentatis, subvillosis, cuneiformibus. (N.)

Sibbaldia procumbens, foliis tridentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 406. — Flor. lappon. 111. — Flor. suec. 260, 275. — Royen. Lugd. Bat. 176. — Cæder. Flor. dan. 32. — Mill. Dict. n°. 1. — Lam. Illustr. franç. vol. 3. pag. 644. n°. 1116. — Idem. Illustr. Gener. tab. 211. fig. 1. — Gærtn. de Fruct. & Sem. tab. 73.

Fragaria foliis ternatis, reusii, tridentatis; flore calici aequali, pentastemone. Hall. Helv. n°. 1116.

Fragaria silvestris, affinis planta; flore luteo. Sibbald. Scot. 2. pag. 15. tab. 6. fig. 1.

Fragaria affinis, sericea incana. C. Bath. Pin. 327. — Idem, Prodr. 137.

Pentaphylloides fruticosum, minimum, procumbens; flore luteo. Pluk. Almag. pag. 284. tab. 212. fig. 3.

Cette plante a tellement le port & les feuilles du *potentilla subcaudis*, qu'il est facile de les prendre l'un pour l'autre lorsqu'on ne fait pas attention aux parties de la fructification.

C'est une fort petite plante, dont la racine se divise en plusieurs fouches garnies d'écaillés brunes, & qui produisent des tiges courtes, feuillées, légèrement velues, foibles, simples, très-grêles, longues de deux à quatre pouces. Les feuilles radicales sont longuement pétiolées, ternées, composées de trois folioles presque fusiformes ou pédicellées, surtout la terminale; cuneiformes, un peu ovales, tronquées à leur sommet, un peu velues & légèrement foveolées, surtout pendant leur jeunesse; terminées par trois dents courtes, aiguës; les feuilles caulinaires sont en petit nombre, presque sessiles, plus petites, garnies très-souvent à leur base de deux petites stipules courtes, lancéolées, velues.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges, au nombre de trois ou quatre, quelques-unes axillaires, assez petites, pédonculées; les pédoncules simples, filiformes, pubescens. Le calice est divisé en dix découpures aiguës, alternativement plus étroites, toutes d'égale grandeur; la corolle est jaune, petite, aussi longue que le calice; cinq étamines plus courtes que la corolle; cinq ovaires qui se convertissent en cinq semences nues, renfermées dans le calice.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suisse, dans la Lapponie, l'Ecosse, la Sibérie. On la rencontre aussi dans les départements méridionaux de la France, sur les montagnes du ci-devant Dauphiné. 2 (V. f.)

2. **SIBBALDE à tige droite.** *Sibbaldia erecta*. Linn.

Sibbaldia

Sibbaldia erecta, foliis linearibus, multifidis. Linn. Syst. veget. pag. 308. n°. 2. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 186. — Lam. Illustr. Gener. tab. 221. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1567. n°. 2.

Pentstemonoides foliis tenuissimis laciniatis, bifloris carnosis. Amm. Ruth. pag. 112. tab. 15.

Cette espèce a des tiges droites, grêles, cylindriques, un peu velues, rameuses, surtout à leur partie supérieure. Les feuilles sont alternes, presque sessiles, allongées; les folioles divisées jusqu'à leur base en découpures linéaires, très-étroites, plus ou moins nombreuses, un peu inégales, très-entières, aiguës, légèrement velues. Les feuilles supérieures, & celles qui accompagnent la base des rameaux, sont sessiles; les folioles simples, linéaires, au nombre de trois, quelquefois plus.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux & des tiges, en petits corymbes, dont l'ensemble forme une sorte de panicule étalée. Les pédoncules sont pubescents, filiformes, médiocrement rameux ou simples; chaque ramification terminée souvent par trois fleurs pédicellées, munies, à la base des divisions, de petites bractées foliolées. Les calices sont un peu hispides, à dix découpures, les alternes plus étroites & un peu plus courtes. La corolle est petite, à peine aussi longue que le calice, de couleur de chair; les pétales arrondis, ongiculés.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie.

3. *SIBBALDIA altaïque. Sibbaldia altaica.* Linn. f.

Sibbaldia erecta, foliis linearifoliformibus, tripartitis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1567. n°. 3.

Sibbaldia foliis tricaespitatis, floribus singularibus. Linn. f. Suppl. pag. 191.

Sibbaldia foliorum, apicibus tripartitis, calicibus quinquefidis, petalis reclusis. Pall. Act. Petrop. 1775. pag. 326. tab. 18. fig. 2.

Cette plante, très-différente de la précédente par son port, quoiqu'elle lui ressemble par la finité de ses folioles, a des tiges très-simples, hautes d'un ponce & un peu plus, presque nues, terminées par une seule fleur, ou quelquefois par trois, ou cinq, disposées en un petit corymbe. Les calices sont cylindriques, à cinq découpures; la corolle de couleur purpurine; les pétales courts, émonnés à leur sommet. Les feuilles sont filiformes, linéaires, divisées en trois découpures fort étroites, aiguës.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Sibérie. x

SIBTORPE. *Sibthorpia.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs corollées, monopétales, de Botanique. Tome VIII.

la famille des pédiculaires, qui a de grands rapports avec les *disandra*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, dont les tiges sont rampantes & radicantes, les feuilles alternes, les fleurs axillaires, pédonculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle tubulée, à cinq lobes égaux; quatre étamines à peine adhérentes un stigmate en tête; une capsule comprimée, orbiculaire, à deux loges, s'ouvrant par son sommet.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, turbiné, divisé en cinq découpures profondes, ouvertes, ovales, persistants.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, régulière, ouverte, de la longueur du calice; le tube très-court; le limbe divisé en cinq découpures arrondies.

3°. Quatre étamines à peine diadelphes, dont les filaments sont capillaires, rapprochés par leurs bases, surmontés d'anthères oblongues, ou cœux.

4°. Un ovaire supérieur, presque rond, comprimé, surmonté d'un style cylindrique, plus épais que les filaments, de la longueur de la corolle, surmonté d'un stigmate simple, comprimé, en tête.

Le fruit est une capsule comprimée, orbiculaire, ventrue à ses deux faces, aiguë à ses côtés, à deux valves, à deux loges, s'ouvrant par leur sommet, contenant plusieurs semences oblongues, un peu arrondies, convexes d'un côté, planes de l'autre.

Observations. Il existe, entre ce genre & celui des *disandra*, de tels rapprochemens, qu'on auroit pu rigoureusement les réunir en un seul, quoiqu'ils se trouvent, dans le système sexuel de Linné, dans deux classes différentes & très-éloignées l'une de l'autre. Les *disandra* varient dans le nombre des divisions des parties de la fructification, qui sont de cinq à huit, mais plus ordinairement fixées au nombre de sept; les étamines de cinq à sept. Il n'y en a jamais que quatre dans les *sibthorpia*, & les divisions des autres parties sont constamment fixées à cinq. D'un autre côté, les espèces de ces deux genres ont absolument le même port.

E S P È C E.

SINTORPE d'Europe. *Sibthorpia europæa.* Linn.

Sibthorpia foliis reniformi-fusculatis, erectis. Linn. Syst. veget. pag. 572. — Amœn. Acad. vol. 3. pag. 22. — Loefl. Iter, 150. — Mill. Dict. n°. 1. Icon. tab. 312. — Lam. Illustr. Gen. tab. 535.

Chrysosplenium cornubiense. Petiv. Herb. tab. 6. fig. 11.

Alfne spuria, *puffula*, *repens*; *foliis saxifragia aurea*. Rai, Angl. 3. pag. 352. — Pluken. Almag. pag. 23. tab. 7. fig. 6.

C'est une petite plante rampante, qui pousse des racines fibreuses, capillaires, & des tiges grêles, étendues sur la terre, nombreuses, filiformes, lâches, longues d'environ un pied, velues, cylindriques, & qui sont garnies, à l'insertion des pétioles, de petites racines courtes. Les feuilles sont alternes, pétiolées, assez semblables à celles du *chrysosplenium*, orbiculaires, presque pétiolées, de trois à quatre lignes de diamètre, horizontales, divisées à leur contour en sept lobes courts, obtus; les latéraux plus petits; couvertes de poils courts, fins, très-simples. Les pétioles sont droits, alongés.

De l'aisselle des feuilles s'élèvent des pédoncules droits, courts, foliaires, uniflores, de la longueur des fleurs, penchés après la floraison. Les calices sont velus, à cinq découpures profondes, lancéolées, aiguës. La corolle est petite, purpurine, d'une couleur plus foncée dans l'intérieur du tube; à peine plus longue que le calice; le tube court; le limbe divisé en cinq lobes arrondis; trois supérieurs; un inférieur un peu rabattu; quatre étamines presque égales par leur insertion sur le tube; les deux supérieures un peu plus longues.

Cette plante croît dans la Cornouaille & le Portugal. ✕

Observations. Le *sibthorpia africana* de Linné a été reconnu depuis pour appartenir au *difandra*.

Linné fils cite une autre espèce de *sibthorpia* sous le nom de *sibthorpia involucrea*, dont les feuilles sont réniformes, entières, tomenteuses en dessous, alternes, pétiolées; les tiges herbacées, rampantes & cylindriques; les fleurs extrêmement petites, axillaires, semblables à celles de l'espèce précédente; mais les autres parties de la fructification n'ayant pas été suffisamment observées, le genre de cette plante est encore douteux. Elle croît à la Nouvelle-Grenade.

SICOTE. *Sicyos*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monoïques, de la famille des cucurbitacées, qui a des rapports avec les *bryonia* & les *grunovia*; qui renferme des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ordinairement alternes, anguleuses ou laciniées; les fleurs axillaires; les pédoncules chargés de plusieurs fleurs.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques; dans les fleurs mâles un calice à cinq dents; une corolle à cinq découpures;

trois étamines réunies à leur base; dans les fleurs femelles, un style à trois divisions; une baie ovale, hérissée.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques; les mâles & les femelles sur le même pied.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, à cinq dents subulées.

2°. Une corolle campanulée, à cinq divisions ovales; adnée au calice.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont réunis, surtout à leur partie inférieure; un des filaments terminé par une seule anthère; les deux autres supportant chacun deux anthères.

Les fleurs femelles, situées sur la même plante, offrent :

1°. Un calice supérieur & caduc, semblable à celui des fleurs mâles.

2°. Une corolle comme dans les fleurs mâles.

3°. Un ovaire ovale, inférieur, surmonté d'un style cylindrique, terminé par un stigmate épais, trifide.

Le fruit est une baie ovale, petite, à une seule loge, environnée de pointes presque épineuses, ne renfermant qu'une seule semence.

ESPÈCES.

1. *SICYOTE anguleuse*. *Sicyos angulata*. Linn.

Sicyos foliis angulatis, baccis sessilibus, aggregatis, echinatis. (N.)

Sicyos foliis angulatis. Linn. Syst. veget. pag. 870. n°. 1. — Hort. Cliff. 412. — Hort. Ups. 121. — Roy. Lugd. Bat. 267. — Miller. Dict. n°. 1. — Sabbat. Hort. 1. tab. 60. — Berg. Plant. Cap. pag. 352. — Lam. Illustr. Gener. tab. 796.

Cucumis bryonioides, hispida; fructu parvo, flore calice muricato. Pluken. Almag. pag. 123. tab. 16. fig. 4.

Bryonioides flore & fructu minore. Dillen. Elkh. pag. 58. tab. 51. fig. 59.

Cucumis africanus, fructu echinato. Herm. African. 8.

Sicyos (angulata), ramis, petiolis pedunculisque lacosis; foliis sublobato-angulatis; fructibus capitatis, hispida. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2, pag. 217.

2. *Cucumis condensis, monohermos; fructu echinato*. Herm. Paradis. pag. 108. tab. 133.

Cette plante a des tiges grêles, longues, herbacées, grimpantes, rudes, chargées de poils très-courts, un peu velus à leurs nœuds, munies de vrilles axillaires, filiformes, ramifiées, crépues, opposées aux pédoncules, garnies de feuilles alternes, distantes, pétiolées, rudes à leurs deux faces, échancrées en cœur à leur base, divisées à leur contour en cinq lobes anguleux, acuminés, bordés de cils très-courts; les pétioles plus courts que les feuilles, velus, presque lanugineux.

Les fleurs sont disposées, en grappes solitaires, dans l'aisselle des feuilles supérieures, plus longues que ces mêmes feuilles; les fleurs mâles supportées par de longs pédoncules velus; chacune d'elles pédicellée; les fleurs femelles sessiles, réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule au moins une fois plus court que celui des fleurs mâles, & portant souvent de l'aisselle des vrilles. Les corolles sont blanchâtres, petites. Les fruits sont des drupes ou des baies ovales, oblongues, assez petites, hérissées de poils fins, un peu épineux.

Cette plante croît au Canada, dans la Caroline, au Mexique, & même au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (P. v.)

2. STICTOTE laciniée. *Sicyos laciniata*. Linn.

Sicyos foliis laciniatis. Linn. Syst. veget. pag. 870. n. 2.

Sicyos fructu echinato, foliis laciniatis. Plumier, Spec. Plant. Amer. 3. & Burm. Icon. 243.

C'est une plante grimpante, dont les tiges sont grêles, presque filiformes, glabres, tortueuses comme celles des lianes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, larges, échancrées fortement en cœur à leur base, presque palmées, glabres à leur face supérieure, rudes & hérissées de poils ronds en dessous, divisées en plusieurs lobes très-profonds, irréguliers, chacun d'eux irrégulièrement lobé ou incisé à son contour; ces lobes, ou anguleux, ou arrondis & aigus. Les vrilles sortent de l'aisselle des feuilles; elles se divisent à leur sommet en trois parties; celle du milieu beaucoup plus longue que les deux autres. Les fleurs sont sessiles, aggrégées & axillaires; les fruits également aggrégés, charnus, arrondis, d'une grosseur médiocre, hérissés de pointes nombreuses.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique.

3. STICTOTE lobée. *Sicyos lobata*. Mich.

Sicyos glabra, foliis semiquinquedolobatis; lobis acutis; fructibus solitariis, hispida. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 217.

Cette plante a de très-grands rapports avec le

Sicyos angulata. On l'en distingue en ce qu'elle est parfaitement glabre presque dans toutes les parties. Ses feuilles sont découpées, jusque vers leur milieu, en cinq lobes très-aigus, glabres à leurs deux faces. Les fruits sont hispides, solitaires & non aggrégés, une fois plus gros que ceux de l'espèce précédente.

Cette plante a été observée, par Michaux, sur le bord du fleuve de l'Ohio, dans les contrées occidentales de la Pensilvanie.

4. STICTOTE de Ceilan. *Sicyos Garcini*. Linn.

Sicyos foliis quinquematis, erectis, dentatis; fructibus ciliatis. Linn. Syst. veget. pag. 870. n. 3. — Mamiff. 197.

Sicyos foliis quinquematis, laciniis cuculiformibus, semiquinquedolobatis; fructu ciliato. Burm. Flor. ind. pag. 311. tab. 57. fig. 3.

Cette espèce a de longues tiges grêles, grimpantes, presque glabres, garnies de feuilles alternes, pétiolées, un peu arrondies, profondément divisées en trois ou plus souvent en cinq lobes principaux, cuculiformes vers leur base, élargis à leur partie supérieure, crénelés ou divisés à leur contour en angles irréguliers, très-aigus; les pétioles plus longs que les feuilles, & à la base dequels est située une vrille simple, roulée en spirale. Les fruits sont petits, presque sessiles, foliaires, axillaires, hérissés de pointes nombreuses.

Cette plante croît dans l'île de Ceilan.

5. STICTOTE glanduleuse. *Sicyos glandulosa*.

Sicyos foliis oppositis, subterlobatis, lobis tri seu multifidis; caule petiolisque pilosis, glandulosis; pedunculis axillaribus, multifloris. (N.)

Cette espèce a des tiges grêles, très-foibles, grimpantes, striées, munies de poils épars, glanduleux à leur sommet; garnies de feuilles opposées, longuement pétiolées, distantes, en forme de cœur, échancrées à leur base, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, chargées de quelques poils rares, simples ou en petites touffes étroites; divisées en trois lobes principaux; chaque lobe terminé par une petite pointe courte, & subdivisé en trois ou plusieurs autres lobes courts, innéaux. Les pétioles sont très-longs, grêles, hérissés de poils épars & glanduleux.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes au moins de moitié plus courtes que les pétioles. Les pédoncules sont droits, filiformes, velus, glanduleux, simples, sortant à leur sommet quelques fleurs; les uns sessiles, d'autres à peine pédonculés, petites, blanchâtres. Les fruits sont fort petits, ovales.

hérissés sur leurs angles de pointes d'étoiles, aiguës. Je ne connois ni les échantillons ni les papiers.

Cette plante m'a été communiquée par M. l'edru, qui l'a recueillie dans l'île de Ténériffe. (V. f.)

6. *SICOTIS* comestible. *Sicyos edulis*. Jacq.

Sicyos foliis angulatis, basi cordatis, lobatis; fructu oblongo-cylindrico. Jacq. Stirp. Amer. tab. 163. — Gmel. Syll. Nat. vol. 1. pag. 104.

Cette plante offre, dans les parties de sa fructification, des différences assez frappantes pour faire douter qu'elle puisse appartenir à ce genre. Le limbe de la corolle est muni de dix folioles. Les étamines sont au nombre de cinq, bien distinctes, ainsi que les anthers. Le stigmate est à cinq ovifères; les fruits plus gros qu'un œuf d'oiseau, marqués de cinq sillons, hérissés de poils mous, à une loge, renfermant une seule semence.

C'est d'ailleurs une plante grimpante, garnie de vrilles, dont les feuilles sont amples, alternes, pétiolées, échancrées en cœur à leur base, divisées à leur contour en lobes anguleux, un peu rudes à leurs deux faces; les angles aigus & dentés; les pétioles glabres. Les fleurs sont petites, inodores, de couleur jaune; les fleurs mâles souterraines par des pédoncules axillaires & multiflores; les femelles également axillaires, mais dans les pédoncules ne supportant qu'une ou deux fleurs. Le fruit est gros, variable dans sa forme, d'un vert-luisant en dehors, charnu & blanchâtre en dedans. Les semences sont solitaires, vertes, souvent longues d'un pouce, situées vers le sommet du fruit, qui s'entr'ouvre à cette partie pour livrer passage à une portion de la semence, qui pousse souvent de petites racines avant sa chute, & même une première feuille à mesure que la partie charnue du fruit se pourrit.

Cette plante croit en Amérique, dans l'île de Cuba. ○

Les habitants du pays se servent des fruits de cette plante, qu'ils mangent dans leurs ragouts. On en distingue d'un variétés; une très-commune, dont les fruits font longs de trois ou quatre pouces, armés de poils mous de pointes molles plus ou moins nombreuses; l'autre bien moins commune, dont les fruits sont entièrement glabres & de la grosseur d'un œuf de poule. Les fleurs & les fruits paroissent dans le mois de décembre. Serait-ce le *Sichium* de Browne? (Voyez SICH.)

SICKI. *Sichium*. Rumph. Herb. Amboin. vol. 3. pag. 40. tab. 21, 22.

Il est difficile de pouvoir rapporter à aucun des genres que nous connoissons, les plantes dont parle Rumphius sous le nom de *Sicki*, cet auteur ne don-

nant, sur leur fructification, que des notions incomplètes. Ce sont d'ailleurs grands arbres d'environ vingt pieds de haut, dont il distingue deux espèces; l'une qu'il appelle *SICKI* mâle, *Sichium mas*, seu *angustifolia*; *Sicki* aye; l'autre, qu'il nomme *SICKI* femelle, quoique tous deux portent des fruits: *Sichium femina*, seu *laevifolia*; *Sicki* poti.

Le premier a un bois très-dur, une écorce épaisse, brune, un tronc droit, plus élevé que celui du *Sicki* femelle, dont les rameaux sont garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, entières, élargies & un peu mucronées à leur sommet, médiocrement rétrécies à leur base, longues de quatre pouces sur environ un pouce & demi de large, glabres, épaisses, d'un vert foncé en dessus, jaunâtres & finement veinées à leur face inférieure. Les fleurs sont disposées en longues grappes; elles sont blanches, à cinq pétales ouverts en étoile. Il leur succède pour fruits de longues baies un peu plus petites que les olives, qui restent très-long-temps vertes, & qui deviennent d'un jaune-foncé à l'époque de leur maturité.

Le *Sicki* femelle a le tronc plus épais, l'écorce plus lisse, les feuilles plus larges & au moins une fois plus grandes, des nervures plus fortes, un peu molles, d'un vert gai, élargies à leur partie supérieure. Les fleurs & les fruits sont disposés comme ceux de l'espèce précédente; mais les fruits sont un peu plus gros, moins allongés, presque à quatre faces, rougeâtres à leurs bords.

Ces arbres croissent partout, dans les forêts à l'île d'Amboine. Le bois récemment coupé prend une couleur rouge-purpurine; il jaunit en sechant, & finit par une couleur cendrée. Il est léger, peu durable, se fend aisément, mais il résiste à la scie. Celui du *Sicki* femelle, d'un jaune-citron, est plus facile à travailler, & prend, le résidu il est travaillé & poli, un aspect soyeux & luisant. On en fait des meubles, des ustensiles; il est aussi employé dans les constructions.

SIGESBÉQUE. *Sigesbeckia* ou *Sigesbeckia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *Millettia* & les *Phaseoli*, & qui renferme des herbes exotiques à l'Europe, dont les ramifications & les feuilles sont opposées; les fleurs terminales & axillaires longuement pédunculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Les fleurs à demi radiées; un calice double; l'entée à cinq folioles longues, très-ouvertes; les semences anguleuses, enveloppées par les paillettes du réceptacle.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont à demi-radiées; elles n'ont qu'un petit nombre de demi-rayons à leur circonférence,

fruits d'un seul côté, tous femelles, & des fleurs hermaphrodites dans le centre.

Chaque fleur offre :

1°. Un double calice commun ; l'extérieur composé de cinq grandes folioles linéaires, très-ouvertes, plus longues que les fleurs, persistantes ; l'intérieur presque à cinq angles, composé de plusieurs folioles ovales, concaves, égales, obtuses.

2°. Une corolle à demi-radiée, formée par des fileurs hermaphrodites dans le centre, tubuleux, inlinduliformes, un peu plus longs que le calice intérieur, terminés par cinq dents ; des demi-fleurs femelles, qui n'occupent guère que la moitié de la circonférence, dont le tube étroit est terminé par une languette élargie, très-courte, munie de trois dents à son sommet.

3°. Cinq *stamines* synergées dans leurs fleurs hermaphrodites, dont les filaments sont très-courts ; les anthères tubuleuses, réunies en cylindre.

4°. Dans les fleurs, tant hermaphrodites que femelles, un ovaire oblong, courbé, de la longueur du calice intérieur, surmonté d'un style filiforme, aussi long que les étamines, terminé par un stigmate bidenté.

Le calice persistant s'est lieu de péricarpe, & renferme des semences solitaires, oblongues, obscurément tetrangones ou anguleuses, nues, plus épaissies à leur partie supérieure, obtuses, point aiguëtes.

Le réceptacle est garni de paillettes concaves, semblables aux écailles du calice intérieur, caduques, enveloppant les semences à une de leurs faces.

Observations. Ce genre est distingué des *phacusa* & des *milleria* par son double calice, par les demi-fleurs de la circonférence, plus nombreux que dans les *phacusa*, mais qui cependant n'en occupent très-souvent qu'une partie. Le *sigesbeckia occidentalis* de Linné, ayant la caractéristique des *verbesina*, doit être rangé dans ce dernier genre.

E S P È C E S.

1. *SIGESBÈQUE orientale. Sigesbeckia orientalis.* Linn.

Sigesbeckia foliis petiolatis, ovatis, inaequaliter dentatis, basi subtriangularibus, subincisis ; calice exteriori, interiore longiore. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2210. n°. 1.

Sigesbeckia petiolis sessilibus ; calicibus exterioribus linearibus, majoribus persistentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1269. — Mill. Dict. n°. 1. — Kniph. Cent. 2. n°. 87.

Sigesbeckia. Hort. Cliff. 412. tab. 23. — Hort.

Upsal. 167. — Lam. Illustr. Gener. tab. 637. — Gærm. de Fruct. & Sem. tab. 118.

Sigesbeckia (triangularis). *foliis oppositis, subtriangularibus, inaequaliter dentatis.* Cavan. Icon. Rac. vol. 3. pag. 27. tab. 233.

Cette plante s'élève sur une tige droite, haute de quatre à cinq pieds, un peu herbacée, d'un brun rougeâtre, filice, rude au toucher, hérissée de poils très-courts, divisée en rameaux opposés, érales, axillaires. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, vertes à leurs deux faces, un peu tomentueuses & douces à leur face inférieure, profondément crénelées à leurs bords ; les crénelures inégales, obtuses, longues de quatre à cinq pouces, larges de trois, acuminées, obtuses à leur sommet, triangulaires particulièrement à leur base, presque incisées à leur partie inférieure, décurrentes sur leur pétiole ; les feuilles supérieures plus régulièrement ovales ; les inférieures triangulaires, beaucoup plus grandes.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux & dans l'aisselle des feuilles, disposées en une panicule lâche, composée de petits corymbes soutenus par de longs pédoncules communs, axillaires, opposés, dont les ramifications sont terminales, courtes, inégales, opposées, pubescentes, un peu blanchâtres, garnies de bractées presque linéaires, courtes, lanceolées, un peu filicées ou dentées.

Le calice extérieur est composé de cinq folioles plus longues que les fleurs, linéaires, presque spatulées, retrécies à leur base, obtuses à leur sommet, ouvertes, ciliées à leur contour. Le calice intérieur est formé par plusieurs petites folioles droites, égales, un peu concaves, presque aiguës. La corolle est jaune, petite, un peu plus longue que le calice intérieur ; les demi-fleurs n'occupent guère que la moitié de la circonférence ; ils sont fort courts, tridentés. Les semences sont glabres, anguleuses, aiguës à leur base, épaissies & obtuses à leur sommet, un peu courbées, enveloppées de paillettes coriaces, concaves, aussi longues qu'elles.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à la Chine ; on la rencontre également au Mexique. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

2. *SIGESBÈQUE d'Ibérie. Sigesbeckia ibérica.* Willd.

Sigesbeckia foliis petiolatis, ovatis, obtusè dentatis, basi rotundatis ; calice exteriori longioribus interioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2220. n°. 2.

Bidentis similis, foliis latissimis, serratis. Buxb. Cent. 3. pag. 29. tab. 52.

Quoique cette plante ait parfaitement le port de la précédente, & qu'elle lui ressemble encore par la disposition de ses fleurs & les parties essen-

tielles de la fructification, on y distingue néanmoins des traits qui lui sont propres, & en font une espèce très-distincte.

Ses feuilles sont à la vérité ovales, mais non rétrécies à leur base, découronnées sur le pétiole; elles n'ont jamais la forme triangulaire, & ne sont point inclinées vers leur partie inférieure; les dentelures sont plus courtes, obtuses. Le calice extérieur est de la même longueur que l'intérieur, tandis qu'il est beaucoup plus long dans l'espèce précédente.

Cette plante croît dans l'Ibérie. ○ (*Descript. ex Willd.*)

3. SIGESBÉQUE flosculeux. *Sigesbeckia flosculosa*. Lhéritier.

Sigesbeckia foliis sessilibus, ovatis, dentatis; flosculis disti tridentatis, triandris. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2220. n°. 3.

Sigesbeckia floribus flosculosis, tridentatis, hermaphroditis, triandris. Lhérit. Suppl. 37. tab. 19.

Cette espèce a bien le port des *Sigesbeckia*; elle s'en écarte par quelques-unes des parties de sa fructification, dont les fleurs sont toutes flosculeuses.

Ses tiges se divisent en rameaux rougeâtres, un peu flexueux, lisses, striés, garnis de quelques poils fins & courts. Les feuilles sont opposées, sessiles, ovales, légèrement denticulées en scie, quelques-unes très-entières, nerveuses, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous.

Les fleurs sont petites, disposées en une panicule ample, terminale, dont les pédoncules opposés & ramifiés sont filiformes, velus, glanduleux, un peu visqueux, ainsi que les calices, munis de bractées à chacune de leurs divisions. Le calice extérieur est presque de la même grandeur que l'intérieur: ses folioles sont courtes, linéaires, concaves, obtuses. La corolle est jaune, à peine plus longue que les calices, composée entièrement de fleurons tubulés, un peu ventrus, terminés à leur orifice par trois dents droites, aiguës; les hermaphrodites ne renferment que trois étamines; les paillettes sont de même longueur que les calices intérieurs; les semences nues, petites.

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (*P. v.*)

4. SIGESBÉQUE laciniée, *Sigesbeckia laciniata*.

Sigesbeckia foliis laciniato-pinnatifidis, superioribus lanceolatis, integris, suberectis; calice exterioris interioris, brevioris, floribus radiatis, radio maximo. (N.)

Quoique cette plante s'écarte des *Sigesbeckia* par la grandeur de ses fleurs, & qu'elles soient garnies de demi-fleurons dans tout le contour de leur circonférence, on ne peut cependant le dispenser de la rapporter à ce genre, en ayant d'ailleurs tous les autres caractères.

Ses tiges sont droites, cylindriques, striées, d'un brun-rougâtre, garnies de poils courts & rares, qui les rendent rugues au toucher, munies de rameaux opposés, alongés. Les feuilles inférieures sont amples, pétioleuses, presque pinnées, les deux folioles inférieures, pédicellées, opposées; les supérieures decurrentes sur le pétiole; les dernières confluentes, profondément laciniées, anguleuses, aiguës; les pétioles striés, plus longs que les feuilles; les feuilles supérieures opposées, acuminées, couchées à leur face supérieure d'un très-grand nombre de tubercules rudes & argentées, presque nues à leur face inférieure, longues de trois à quatre pouces, sur un pouce au plus de large; acuminées, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont grosses, terminales & axillaires, supportées par de très-longs pédoncules simples, ronds, très-droits, uniflores. Le calice extérieur est composé de cinq folioles lancéolées, presque égales, aiguës, plus courtes que le calice intérieur; celui-ci est composé de plusieurs folioles presque imbriquées, inégales, semblables à celles du calice extérieur, chargées de tubercules blanchâtres, tant à leur superficie qu'à leurs bords. La corolle est jaune, radiée; les demi-fleurons de la circonférence longs de plus d'un demi-pouce, ovales, presque linéaires, obtus, presque entiers à leur sommet; les fleurons du centre courts, tubulés, à cinq dents, à peine aussi longs que le calice intérieur; les semences nues, obtuses, aiguës à leur base, environnées de paillettes concaves, aiguës, nombreuses.

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été découverte par M. Bosc, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (*P. f.*)

SILÉNÉ. *Silene*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyépétalées, de la famille des carophyllées, qui a de grands rapports avec les *atacas* & les *eucubias*, qui renferme des herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs axillaires ou terminales, foliolaires ou supportées plusieurs ensemble sur un pédoncule commun.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, ventru, à cinq dents; cinq pétales ovales, munis chacun de deux dents à leur orifice; le lymbe souvent viscé; six étamines; trois styles; une capsule à trois loges.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, ventru, persistant, à cinq dents courtes.

2°. Une corolle à cinq pétales, dont les onglets sont étroits, de la longueur du calice ; le limbe plane, obtus, souvent bifide ; chaque pétale muni à son orifice de deux petites dents, dont l'ensemble forme une couronne.

3°. Dix étamines dont les filamens sont tubulés, insérés sur les onglets des pétales, terminés par des antères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, cylindrique, surmonté de trois styles simples, plus longs que les étamines, terminés par des stigmates aigus.

Le fruit est une capsule presque cylindrique, oblongue, environnée par le calice persistant à trois lobes, quelquefois à une seule loge, s'ouvrant à son sommet en cinq parties, renfermant plusieurs semences réunies.

Observations. Ce genre est très-voisin des *lychnis* & des *cucubalus* : ses rapports avec ce dernier genre sont tels, qu'il est souvent difficile de fixer les espèces qui appartiennent à l'un ou à l'autre. La seule différence consiste, pour les *silene*, dans de petites écailles dont les onglets sont munis à leur sommet, & qui forment par leur réunion & leur rapprochement une sorte de petite couronne dentée, qui n'existe point ou ne devoit pas exister dans les *cucubalus*. On la reconnoît cependant dans un assez grand nombre d'espèces, mais elle y est bien plus petite que dans les *silene*. C'est donc un caractère presque nul, & qui a déjà déterminé plusieurs botanistes à réunir ces deux genres, que d'autres ont conservé à cause du grand nombre des espèces qu'ils renferment respectivement. Quant à la forme du calice, elle ne peut être employée, quoiqu'elle soit souvent cylindrique dans les *silene*, ventru dans les *cucubalus*.

Les *lychnis*, très-rapprochés de ces deux genres, en diffèrent par leurs piliers, au nombre de cinq ; les *dianthus* on oeillets sont caractérisés d'une manière plus tranchée par les écailles coriaces qui environnent la base de leur calice, par leurs deux styles & leur capsule à une seule loge.

ESPÈCES.

* Fleurs solitaires & laérales.

1. SILÈNE de France. *Silene gallica*. Linn.

Silene floribus subspicatis, alternis, secundis ; petalis indivisis, fructibus erectis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 595. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 693. n°. 7.

Vifago foliis ellipticis ; calicibus lineatis, vifcidis ; petalis ovatis. Haller, Heiv. n°. 514.

Vifaga hirta, gallica ; flore purpureo, carneo ; petalis integris. Dillen. Hort. Eltham. pag. 419. tab. 310. fig. 399.

Silene hirsuta, foliis sessilibus, oblongo-cuneiformibus, obtusis ; calicibus hirsutis ; fructibus erectis, alternis. Dalib. Paris. 129.

Lychnis silvestris, hirsuta, annua, flore minora carnea. Vaill. Patif. pag. 121. tab. 16. fig. 12. — Tournef. Inst. R. Herb. 337. — Motif. Oxon. Hist. 2. pag. 541.

Cucubalus silvestris. Var. n°. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 28. n°. 675.

Ses racines sont dures, blanchâtres, presque simples, garnies du très-peu de fibres : il s'en élève une tige droite, à peine cylindrique, un peu comprimée, velue, visqueuse, haute d'environ un pied, rameuse, les feuilles sont opposées, sessiles, connées à leur base, oblongues, un peu spatulées, entières, obtuses, arrondies à leur sommet, tectées à leur base, velues, un peu tudes, visqueuses, longues d'environ un pouce.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, alternes, disposées presque en épi à l'extrémité des rameaux, supportées par des pedoncules plus courts que les feuilles, à peine aussi longs que les calices, très-simples, droits, serrés contre les tiges. Le calice est oblong, cylindrique ; il devient ovale & renflé à la maturité des capsules ; velu, strié, légèrement visqueux. La corolle est petite, d'une couleur du chair ou d'un pourpre très-clair. Les pétales ont des onglets étroits, de la longueur du calice ; le limbe est fort court, entier, ovale, un peu arrondi ; l'orifice muni d'une couronne de dents bifides. Les capsules sont ovales, de la longueur du calice qui persiste & se renfle avec elles ; elles s'ouvrent médiocrement à leur sommet en cinq dents courtes, aiguës, & contiennent, dans trois loges, de petites semences glabres, noirâtres, téniformes.

Cette plante se rencontre dans la Suisse, en France, aux environs de Paris : elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.) J'en possède un exemplaire qui a été recueilli dans la Virginie, & que M. Dupuis m'a communiqué.

2. SILÈNE d'Angleterre. *Silene anglica*. Linn.

Silene hirsuta, petalis integerrimis ; floribus erectis ; fructibus reflexis, pedunculatis, alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 594. — Hort. Uof. 113. — Kniph. Cent. 8. n°. 87. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 691. n°. 1. — Curt. Flor. lond. tab. 266.

Vicago cerastii foliis, vasculis pendulis, anglica. Dillen. Eltham. pag. 417. tab. 309. fig. 398.

Lychnis silvestris, hirsuta, annua; flore minore, albo. Vaill. Parif. pag. 121.

Lychnis flore albo, minimo. Rai, Hist. 1. pag. 996. n°. 13.

Cucubalus silvestris. Var. 2. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 28. n°. 675.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété du *silene gallica*; elle lui ressemble parfaitement par son port & la disposition de ses fleurs; elle offre cependant quelques différences assez remarquables. Ses feuilles inférieures sont lancéolées, en ovale renversé, ciliées vers leur base. Les fleurs sont d'abord fort droites, mais, à l'époque de la maturité, leurs pédoncules se courbent; ce qui n'arrive pas dans l'espèce précédente. Les calices ne sont pas velus, mais armés seulement, sur leurs angles, de très-petits aiguillons réfléchis, à peine sensibles. La corolle est blanche, fort petite; les pétales nës-entiers, marqués quelquefois de points noirs.

Cette espèce croît en France, en Angleterre, dans les terrains cultivés. On la rencontre aux environs de Paris. ○ (V. f.)

3. SILÉNÉ de Portugal. *Silene lusitanica*. Linn.

Silene hirsuta, petalis dentatis, indivisis; floribus erectis; fructibus divaricatis-reflexis, alternis. Linn. Syst. veger. pag. 420. n°. 2. — Hort. Upf. 113. — Hort. Cliff. 172. — Willden. Sp. c. Plant. vol. 2. pag. 691. n°. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. Pl. 347.

Silene floribus alternis, petalorum limbis integris, crenatis. Hort. Cliff. 172.

Vistago hirsuta, lusitanica; stellato flore. Dillen. Hort. Elrham. pag. 420. tab. 311. fig. 401.

Cette espèce, qui tient le milieu entre le *silene gallica* & le *silene quinquevulnera*, diffère de l'un & de l'autre par les pétales crénelés, par les pédoncules non réfléchis, mais écartés horizontalement & en angle droit des tiges à l'époque de la maturité des fruits.

Ses tiges sont droites, très-rameuses, cylindriques, hautes d'environ un pied, chargées de poils légèrement visqueux, très-ouverts, horizontaux; garnies de feuilles sessiles, opposées, oblongues, médiocrement rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet; les supérieures beaucoup plus étroites, un peu pubescentes & à peine ciliées à leur contour, vertes, un peu charnues ou molles.

Les fleurs sont axillaires, distantes, solitaires à l'extrémité des rameaux; les pédoncules épais, plus courts que les calices, velus, visqueux. Les calices sont rubulés, oblongs, striés; les filices vertes, hérissées de poils; la corolle d'un pourpre clair; les pétales petits, entiers, crénelés sur les

bords de leur limbe; les semences noires, un peu comprimées, fort petites, réniformes.

Cette plante croît dans le Portugal. M. Desfontaines l'a également observée sur les côtes de Barbarie, parmi les moissons. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

4. SILÉNÉ à cinq taches. *Silene quinquevulnera*. Linn.

Silene petalis integerrimis, subrotundis; fructibus erectis, alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 695. — Hort. Cliff. 171. — Hort. Upf. 113. — Roy. Lugd. Bat. 446. — Miller, Dict. n°. 1. — Hoffm. Germ. 151. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 691. n°. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 348. — Poirer, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 162.

Silene (quinquevulnera), hirsuta; foliis cuneato-oblongis, summis linearibus; petalis pusillis, rotundatis, integris; calicibus fructiferis, fastigiatis alternis, erectis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 272.

Cucubalus variegatus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 28. n°. 675.

Silene spica incurvâ, uno versu floridâ; foliis imis spatulatis. Sauv. Monsp. 146.

Lychnis vulnerata. Scop. Carn. edit. 2. n°. 514.

Lychnis silvestris, lamguinosa, minor. C. Bauh. Pin. 206.

Lychnis hirsuta, flore eleganter variegato. Rai, Hist. 997.

Lychnis hirsuta, minor; flore variegato. Dodart, Mem. 4. pag. 291. Icon.

Lychnis hirta, minor; flore variegato. Tournef. Inst. R. Herb. 338.

5. *Eadem, flore albo, immaculato.* Poirer, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 163.

On distingue aisément cette espèce aux cinq taches pourpre ou d'un rouge-sanguin que présente leur corolle; elle a d'ailleurs beaucoup de rapports avec le *silene lusitanica*.

Ses racines sont dures, presque ligneuses, épaisses, & produisent des tiges rameuses des leur base, hautes à peine d'un pied, quelquefois simples, cylindriques, velues, articulées, garnies de feuilles opposées, sessiles; les inférieures plus larges, oblongues, légèrement spatulées, obtuses, rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures connées, lancéolées, obtuses, légèrement velues ou un peu rudes au toucher, vertes à leurs deux faces.

Les fleurs sont solitaires, disposées, vers l'extrémité des tiges, en une sorte d'épi unilatéral; les fleurs supérieures sessiles; les inférieures souvent pédonculées; les pédoncules courts, droits, point

point rétréchi, très-velus, munis, chacun à leur base, d'une petite feuille ou bractée lancéolée, de la longueur des fleurs. Le calice est cylindrique, rubulé, marqué de dix stries, terminé par cinq petites dents aiguës, hérisse d'un grand nombre de poils longs & blanchâtres. La corolle est d'une grandeur médiocre; les pétales longuement onguiculés; leur limbe arrondi, entier ou légèrement crénelé, marqué, sur un fond blanc, d'une large tache sanguine ou d'un rouge-vif. Quelquefois ces pétales sont entièrement blancs ou lavés de rouge. Les capsules sont droites, ovales, enveloppées du calice renflé, ovale, renfermant des semences nombreuses, fort petites & ridées.

Cette plante est très-répandue. On la trouve en Espagne, en Portugal, en Italie, dans les contrées méridionales de la France, dans l'Amérique septentrionale, dans la Carniole & la Sibérie, plus particulièrement sur les côtes maritimes. Je l'ai recueillie en Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

5. SILÈNE cilié. *Silene ciliata*. Willd.

Silene petalis bipartita, oblonga; calicibus clavatis, pubescentibus, apice ciliosis, alternis, erectis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 692. n° 4.

Ses racines sont simples, filiformes, perpendiculaires: il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges rameuses, ascendantes, cylindriques, hautes de trois à quatre pouces, pubescentes. Les feuilles radicales sont un peu arrondies, spatulées, pubescentes; les feuilles caulinaires oblongues, aiguës, pubescentes.

Les fleurs sont disposées alternativement dans l'aisselle des feuilles supérieures, droites, médiocrement pédonculées; les pédoncules simples. Le calice est pubescent, en forme de clou, à dix stries, dont les dents sont pileuses, ciliées à leurs bords. La corolle est plus grande que celle du *silene quinquevulnera*; les pétales plus longs que les calices, profondément divisés en deux; les découpures en ovale renversé; les capsules elliptiques, pédicellées.

Cette plante croît dans l'île de Crète. (Desf. ex Willd.)

6. SILÈNE nocturne. *Silene nocturna*. Linn.

Silene floribus spicatis, alternis, secundis, sessilibus; petalis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 595. — Miller, Dict. n° 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 692. n° 6.

Silene foliis lanceolatis, caule ramoso & floribus secundis, erectis; calicibus hirsutis. Royen, Lugd. Bat. 447.

Vilcago hirta, noctiflora; floribus obsoletis, spicatis. Botanique, Tome VII.

caulis. Dillen. Hort. Eltham. pag. 420. tab. 310. fig. 400.

Lychnis silvestris, hirsuta, elatior; spica lini colore. Barlet. Icon. tab. 1027. fig. 1.

Lychnis silvestris, nocturna, pilosa; floribus anis ordinis, dilute purpureis. Cup. Cathol. 119. — Rai, Suppl. 480.

Lychnis segetum meridionalium, annua, hirta; floribus albis, uno versu dispositis. Morif. Oxon. Hill. 2. pag. 346. §. 5. tab. 36. fig. 7.

Cucubalus spicatus. Var. 4. Lam. Flor. Franç. vol. 3. pag. 34. n° 675.

Ce silène se reconnoît à ses fleurs disposées en longs épis droits, toutes tournées du même côté, dont les pétales sont bifides, les capsules oblongues. D'ailleurs, cette espèce a de grands rapports avec le *cucubalus reflexus*.

Ses tiges sont droites, fermes, cylindriques, velues, articulées, hautes d'un pied & plus, rameuses; les rameaux opposés, axillaires, élançés, surtout dans la plante cultivée. Les feuilles radicales sont ovales, oblongues, sessiles ou rétrécies en pétiole à leur base, élargies, presque spatulées à leur partie supérieure, entières, obovées, vertes à leurs deux faces, à peine pubescentes, rudes au toucher; les feuilles supérieures plus étroites, allongées, lancéolées, connées à leur base, un peu ciliées à leurs bords, longues d'environ deux pouces.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, un assez long épi unilatéral, roide, très-droit. Ces fleurs sont alternes, presque sessiles; les inférieures un peu pédonculées, droites, appliquées contre les tiges, jamais réfléchies, munies à leur base de deux petites feuilles ou bractées opposées, lancéolées. Les calices sont oblongs, cylindriques, striés, velus, terminés par cinq petites dents courtes, droites, presque obtuses. La corolle est d'une grandeur médiocre, de couleur blanche, un peu verdâtre en dessous, divisée en deux lobes à leur limbe; les lobes linéaires un peu écartés, obtus. Les capsules sont glabres, lisses, jaunâtres, très-droites, ovales-oblongues; les semences d'un brun-noirâtre, fort petites, réniformes.

Cette plante croît au milieu des champs, dans les départemens méridionaux de la France, en Espagne; on la rencontre aussi en Amérique, dans la Pensilvanie. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

7. SILÈNE coloré. *Silene colorata*. Poiret.

Silene foliis spatulatis, calicibus alternis, uno versu flexis, coloratis; petalis bipartitis. Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 163.

Silene (bipartita), foliis inferioribus spatulatis; X

floribus racemosis, secundis, nutantibus; petalis bipartitis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 352.

On distingue cette espèce à ses fleurs d'un beau rouge-vif, très-agréable, & aux calices ordinairement de la même couleur.

Ses racines sont grêles, blanchâtres, un peu fibreuses; elles produisent plusieurs tiges étalées sur le sable ou couchées seulement à leur base, redressées à leur partie supérieure, foibles, striées, d'un blanc-jaunâtre, noueuses, cylindriques, légèrement pubescentes, rameuses; les rameaux alternes, simples ou quelquefois dichotomes à leur sommet, avec une fleur solitaire, plus longuement pédonculée & droite dans la bifurcation. Les feuilles sont opposées; les inférieures ovales, un peu arrondies, spatulées, rétrécies à leur base en un pétiole alongé & plane; obtus à leur sommet, légèrement mucronées, vertes, pubescentes, ciliées sur le pétiole; les feuilles supérieures & caulinaires sessiles, plus étroites, lancéolées, munies à leur base d'une petite touffe de poils cotoneux.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, un épi plus ou moins alongé; elles sont toutes tournées du même côté, solitaires, rarement deux ensemble, distantes, médiocrement inclinées, soutenues par des pédoncules filiformes, très-courts, à peine de la moitié du calice, garnis de bractées petites, ovales, lancéolées, aiguës. Les calices sont tubulés, en forme de massue, rétrécis inférieurement, glabres, colorés, membraneux, marqués de dix sillons, terminés par cinq dents courtes & droites. La corolle, d'une grandeur médiocre, est d'un beau rouge ou couleur de rose. Les pétales ont leur limbe profondément divisé en deux découpures étroites, obtuses; les onglets garnis à leur orifice d'un double appendice. Les filamens sont étroits, comprimés; les anthères versatiles; les styles filiformes, saillans; l'ovaire ovale. Les capsules sont droites, glabres, ovales, pédonculées dans le calice, s'ouvrant à leur sommet en cinq valves, quelquefois plus, à trois loges; les semences brunes & réniformes.

J'ai recueilli cette espèce sur les côtes de Barbarie; elle croît dans le sable, sur le bord de la mer. Elle a été également observée, par M. Desfontaines, aux environs de Sibia, qu'il a décrit sous le nom de *Silene bipartita*, & qui est bien certainement la même espèce que celle que j'avais appelée *filice colorata*. (V. v.)

M. Desfontaines cite de cette plante une variété recueillie par M. Broussonnet, dans le royaume de Maroc; elle est plus petite, & ses calices sont velus.

8. *Silène céraiste.* *Silene ceratoides*. Linn.

Silene hirsuta, petalis emarginatis; fructificationibus erectis; calicibus subsessilibus, subulosis. Linn.

Spec. Plant. vol. 1. pag. 595. — *Willd. Spec. Plant.* vol. 2. pag. 693. n.º 8.

Lychnis ceratoides. Scop. Carn. edit. 2. n.º 522.

Silene hirsuta, petalis emarginatis; fructibus erectis, alternis, hirsutis, sessilibus. Linn. *Spec. Plant.* edit. 1. pag. 417.

Silene rigidula. Amoen. Acad. vol. 4. pag. 313.

Vilago cerastii foliis, vasis erectis, sessilibus. Dillen. Hort. Elth. pag. 416. tab. 309. fig. 307.

Cette espèce, très-voisine des précédentes par son port, par la forme de ses feuilles, par la disposition de ses fleurs, en est bien distinguée par ses pétales échancrés à leur sommet.

Ses tiges sont droites, cylindriques, velues, rameuses, garnies de feuilles oblongues, presque sessiles, entières, vertes à leurs deux faces, à peine velues; les inférieures un peu rétrécies en pétiole à leur base, plus élargies; les supérieures connées, sessiles, plus étroites, lancéolées, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures, à peine pédonculées; les pédoncules très-courts, velus, droits, même à l'époque de la maturité des fruits. Le calice est tubulé, oblong, hérissé de quelques poils courts; il devient ovale à mesure que la capsule grossit. La corolle est d'une grandeur médiocre; les pétales onguiculés; leur limbe obtus, échancré à son sommet.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

9. *Silène crépu.* *Silene crispa*.

Silene floribus subsolitariis, petalis emarginatis; calicibus hirsutis, subclavatis; foliis oblongis, linearibus, obtusis, margine crispato-spinulosis; caule hirsuto. (N.)

Cette espèce, que j'ai oubliée de mentionner dans mon *Voyage en Barbarie*, a cependant des caractères très-saillans, surtout dans les cils courts, blanchâtres, & semblables à de petites épines crochues, situées sur le bord des feuilles.

Ses racines sont grêles, droites, simples, un peu charnues; elles produisent une tige droite, presque simple, hérissée de poils blanchâtres, haute de cinq pouces, garnie de feuilles opposées, sessiles, connées à leur base, distantes, longues d'environ deux pouces, sur près d'un demi-pouce de large, linéaires, très-obtuses à leur sommet, presque glabres à leurs deux faces, un peu ondulées à leurs bords, munies de cils très-petits, distans, spinuliformes, la plupart recourbés & transparents; les feuilles inférieures un peu rétrécies à leur base; les supérieures elliptiques, un peu pubescentes.

Les fleurs sont solitaires, axillaires vers l'extrémité des tiges, inégalement pédonculées, très-rapprochées & presque fasciculées par leur ensemble; les pédoncules droits, pubescens; les calices tubulés, en forme de clou, velus, triés, souvent colorés en rouge, terminés par cinq dents très-courtes, obtuses, ciliées. La corolle, d'une grandeur médiocre, est rougeâtre ou purpurine; les pétales bifides à leur limbe; les capslules ovales, un peu pédonculées.

J'ai découvert cette espèce sur les côtes de Barbarie, dans les terrains sablonneux, aux environs d'Hyppone. (V. u.)

Nota. Comme je ne possède qu'un individu de cette plante, & qu'une grande partie des fleurs n'est pas entièrement développée, il est possible que le port de cette espèce & la disposition des fleurs s'offrent sous un aspect un peu différent, & que les tiges soient plus élevées & rameuses.

10. SILENÉ foveux. *Silene sericea*. Allion.

Silene petalis bifida, floribus oppositis, pedunculatis, erectis; foliis oblongo-spathulatis, sericeo-incanis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 692. n°. 5.

Silene foliis acuminatis, succulentis, hirsutis, laevis; flore carneo. Allion. Flor. pedem. n°. 1573. tab. 79. fig. 3.

Ses racines sont blanchâtres, cylindriques, médiocrement fibreuses; elles produisent plusieurs tiges éralées, tombantes, presque simples, renflées à leurs articulations, revêtues d'un duvet blanchâtre & foveux, garnies de feuilles opposées, sessiles, amplexicaules, conniventes à leur base, succulentes, épaisses, linéolées, presque elliptiques, entières à leurs bords, obovées à leur sommet, ciliées à leur partie inférieure.

Les fleurs sont solitaires, situées, vers l'extrémité des tiges, dans les aisselles des feuilles sur de longs pédoncules simples, opposés. Le calice est en masse, alongé, anguleux, à dix ltries, mince, blanchâtre, renflé à sa base, resserré vers son orifice, & dont les cinq angles les plus saillans se terminent par cinq dents aiguës. La corolle est d'un rose-clair, un peu verdâtre en dessous; les onglets étroits, linéaires, luisans, plus longs que le calice; le limbe en cœur, à deux lobes légèrement arrondis; l'orifice garni d'écaillés droites, aiguës; trois styles droits, filiformes, jaunâtres. Le réceptacle est velu, & le calice s'agrandit avec le fruit.

Cette plante croît dans le sable, sur les bords de la mer, entre Oneglia & le port Maurice. (O. Descript. ex Allion.)

*** Fleurs latérales & ramassées.*

11. SILENÉ changeant. *Silene myabilis*. Linn.

Silene petalis bifida, calicibus angulatis, pedunculatis; foliis lanceolato-linearibus. Linn. Syst. veg. pag. 420. n°. 8. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 314. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 694. n°. 9.

Lychnis flore albo, minima. Rai, Hist. 906.

Lychnis arvensis, minor, anglica. Rai, Hist. 1004.

Il existe entre cette plante & le *cucubalus reiflexus*, de tels rapports, qu'il est fort douter qu'elle n'en soit pas une simple variété; elle a aussi beaucoup de ressemblance avec le *silene notturnum*; elle diffère de ce dernier par ses fleurs pédonculées, réunies plusieurs ensemble dans l'aisselle des feuilles, & du premier par ses pétales plus profondément bifides, ses épis droits & les pédoncules plus alongés, ainsi que par son orifice muni d'une couronne dentée.

Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques, hautes à peine d'un pied, légèrement velues, garnies de feuilles opposées, linéaires, lancéolées, sessiles, très-entières, connées à leur base, obtus à leur sommet, un peu pubescentes. Les fleurs sont disposées en épis terminaux, ordinairement réunies plusieurs ensemble dans les aisselles des feuilles, supportées par des pédoncules courts, inégaux. Les calices sont anguleux, à peine velus; la corolle blanche, fort petite; les pétales obovés, bifides à leur sommet.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. (O)

12. SILENÉ à fleurs herbacées. *Silene chloranthus*. Willd.

Silene petalis linearibus, bifidis; floribus lateralibus, secundis, cernuis; foliis radicalibus margine scabris. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 694. n°. 10.

Silene (chloranthus), radice perenni; foliis oblongis, acutis, glabris, margine scabris; radicalibus petiolatis; panicula elongata, nuntante; calice cylindrico, glabro; laciniis obtusiusculis; petalis linearibus, bifidis; capsula thecaporo longiore. Ehrh. Beytr. 7. pag. 145.

Viscago nocturna, non viscosa, herbaceo flore. Dill. Hort. Eltham. pag. 425. tab. 316. fig. 408.

Lychnis filicifris, sesamoides, major; flore obfolato, viridi. Menz. Pug. tab. 2. fig. 1. Mala.

Cucubalus (chloranthus), scapis subapophyllis; floribus secundis; petalis linearibus, bifidis; foliis radicalibus petiolatis, oblongis, acutis. Willd. Prodr. Flor. berol. n°. 477. tab. 1. fig. 9. — Hoffm. Germ. 150. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 193. — vol. II. pag. 492.

Ses tiges sont droites, presque simples, à peine

feuillées, point visqueuses. Les feuilles radicales sont pétiolées, oblongues, tres-entières, glabres à leurs deux faces, rudes à leurs bords, aiguës à leur sommet. Ses fleurs sont latérales, toutes tournées du même côté, réunies plusieurs ensemble au même point d'inflection, & forment une panicule allongée, un peu penchée. Les calices sont glabres, cylindriques, terminés par cinq petites dents un peu obtuses. La corolle est d'un blanc-verdâtre ou herbacée ; les pétales onguiculés ; leur limbe linéaire, divisé en deux lobes ; la capsule plus longue que le calice, persistant avec elle.

Cette plante se rencontre dans l'Allemagne ; elle a quelques rapports avec le *Silene nutans*. ♀

13. *SILÈNE à fleurs penchées. Silene nutans. Linn.*

Silene petalis bifida, floribus lateralibus, secundis, cernuis ; panicula nutante. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 596. — Oeder. Flor. dan. tab. 142. (*Petala male expressa.* Desf.) — Pollich. Pal. n°. 417. — Reyss. Ged. 2. pag. 84. — Gunn. Norv. n°. 1109. — Gmel. Sibit. vol. 4. pag. 138. — Leets, Herb. n°. 333. — Hoffm. Germ. 151. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 192. — vol. II. pag. 494. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 349. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 694. n°. 11.

Viscago foliis lanceolatis, hirsutis ; floribus paniculatis, nutantibus. Haller, Helv. n°. 915.

Cucubalus nutans. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 33. n°. 675.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calice striato, corollâ involutâ. Hort. Cliff. 171. — Flor. suec. 366. 388.

Lychnis nutans. Scop. Catn. edit. 2. n°. 515.

Lychnis montana, viscosa, alba, latifolia. C. Bauh. Pin. 105. — Tournef. Inst. R. Herb. 335. — Moench. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 20. fig. 4.

Lychnis silvestris nona. Clus. Hist. 291. Ic. Bona. — Gerdard, Hist. 470. Icon. — Parkinson, Theatr. 631. Icon.

Lychnis silvestris, albo flore. Tabern. 193. Icon. — Clus. Sicut. Pann. 328. Icon.

Polemonium petraum Gesneri. J. Bauh. Hist. 3. pag. 351. Icon. Mala. — Gessn. Icon. Lign. tab. 28. fig. 155.

Lychnis silvestris, viscosa, foliis obtusis. Lœf. Ptuif. 150. Icon.

Cette espèce est remarquable par la disposition de ses fleurs, qui forment une panicule très-étalée, & dont la plupart pendantes, après la floraison, à l'extrémité de leur pédoncule.

Ses racines sont dures, presque ligneuses, mé-

diocrement fibreuses ; elles poussent des tiges droites, cylindriques, pubescentes, géniculées, quelquefois coudées à leurs articulations inférieures, simples ou médiocrement rameuses, hautes au moins d'un pied, un peu visqueuses vers leur sommet. Les feuilles sont pubescentes, vertes à leurs deux faces ; les radicales nombreuses, pétiolées, ovales, presque spatulées, rétrécies & décurren-tes à leur base sur leur pétiole ; les feuilles caulinaires distantes, sessiles, opposées, connées à leur base, lancéolées, un peu aiguës.

Les fleurs sont disposées en une panicule latérale, très-lâche, dont les ramifications sont opposées, grêles, d'abord redressées, puis pendantes. Les pédoncules sont dichotomes ou ténés, plus longs que les fleurs, filiformes, velus, visqueux, tournés du même côté, inclinés, presque articulés à leur sommet ; ils restent souvent dans une position horizontale avec les tiges, & les fleurs font tout-à-fait pendantes. Le calice est tubulé, presque en forme de clou, tendu à sa partie supérieure, souvent de couleur purpurine, un peu velu, marqué de dix stries : il devient ovale à la maturité des fruits, rétréci à sa base. La corolle est blanche, assez grande, longuement onguiculée ; le limbe fendu profondément en deux lobes linéaires, obtus, munis, à leur base intérieure, d'une double dent. Les étamines sont plus longues que la corolle ; l'ovaire surmonté de trois styles de la longueur des étamines. La capsule est ovale, à trois loges, s'ouvrant à son sommet en six dents courtes ; les semences petites & ridées.

Cette plante croît en Europe, dans les prés secs & les clairières des bois. M. Desfontaines l'a observée en Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀

14. *SILÈNE à bractées membraneuses. Silene membranacea.*

Silene petalis bifida ; floribus secundis, horizontalibus ; bracteis membranaceis, panicula erecta. (N.)

Cette plante a beaucoup de rapports avec le *Silene nutans* ; elle en diffère par la disposition de ses fleurs presque sessiles, par sa panicule droite, par ses bractées blanchâtres & membraneuses.

Ses tiges sont cylindriques, droites, noueuses, pubescentes, hautes d'environ deux pieds, munies de rameaux akernes ; les supérieurs souvent opposés, garnis de feuilles opposées, lancéolées, longues d'environ deux pouces, rétrécies en pétiole à leur base, emières, acuminées à leur sommet, molles, vertes, presque glabres, un peu velues & ciliées à leur base ; les feuilles supérieures ou florales bien plus étroites, linéaires, aiguës.

Les fleurs forment, à l'extrémité de chaque rameau, avant d'épis droits, dont l'ensemble présente une panicule ample, étalée. Ces fleurs sont

seffiles, solitaires ou réunies deux ou trois, unilatérales, horizontales, munies à leur base de deux petites bractées opposées, linéaires, d'abord un peu verdâtres, puis blanchâtres, transparentes & membraneuses, obtuses, très-étroites. Le calice est tubulé, oblong, strié, verdâtre, hérissé de poils courts, terminé par cinq dents courtes, subulées. La corolle est blanche, assez semblable à celle du *silene nutans*; les pétales bifides à leur limbe; les étamines & les pistils droits, setacés, plus longs que la corolle; les capsules ovales, allongées, glabres, seffiles.

Cette plante, dont j'ignore le lieu natal, a été cultivée, il y a quelques années, au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.) Elle a encore quelques rapports avec le *silene amara*.

15. SILENÉ cendré. *Silene cinerea*. Desfont.

Silene foliis inferioribus ovatis; floribus racemosis, subsessilibus, solitariis, binis aut ternis; calice pubescente, decemfido; petalis bifidis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 355.

Ce siléné a le port du *silene nocturna*, auquel il ressemble dans le plus grand nombre de ses parties: il en diffère particulièrement par ses fleurs réunies deux ou trois ensemble, quoique plusieurs soient solitaires.

Ses tiges sont droites, cylindriques, striées, pubescentes ou recouvertes par un duvet lanugineux très-court, hautes d'un à deux pieds, rameuses. Les feuilles sont opposées; les inférieures ovales, seffiles; les supérieures plus étroites, lancéolées, distantes les unes des autres, connées à leur base.

Les fleurs sont disposées en une grappe allongée, terminale, presque en épi, presque seffiles; les fleurs inférieures ordinairement trois ensemble dans la même aisselle, les supérieures solitaires. Le calice est cylindrique, pubescent, marqué de dix sillons; il devient ovale à la maturité des fruits, & se rétrécit à sa base. Il est terminé par cinq petites dents aiguës, foyeuses. La corolle est blanche; les pétales un peu plus longs que le calice, divisés à leur limbe en deux lobes étroits, linéaires; la capsule ovale, pédicellée dans le calice. Il existe une fleur seffile & légèrement pédonculée dans la bifurcation des rameaux.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans les campagnes des environs d'Alger.

16. SILENÉ élégant. *Silene amara*. Linn.

Silene petalis bifidis, coronula subcoadunata; floribus secundis; pedunculis oppositis, trifloris; ramis alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 596. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 694. n°. 12.

Silene petalis bifidis, coronatis; corollâ coadunata; calicibus erectis, raris, pilosis. Hort. Upf. 114.

Cette plante pousse des mêmes racines plusieurs tiges étalées, un peu courbées ou couchées à leurs articulations inférieures, ascendantes à leur partie supérieure, presque lisses, munies de rameaux courts, alternes, écartés, dissés. Les feuilles sont ovales, oblongues, opposées; les supérieures & caulinaires connées à leur base, plus étroites, pubescentes ou légèrement velues en dessous, glabres à leur face supérieure.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes latérales, dont les pédoncules sont opposés, soutenant chacun trois fleurs pédicellées, droites. Le calice est cylindrique, oblong, muni de dix angles de couleur purpurine, légèrement velus. La corolle est blanche, d'une grandeur médiocre; les onglets de la longueur du calice; le limbe divisé jusque vers sa moitié, en deux lobes linéaires, obtus. L'orifice est garni d'une couronne saillante, formée par les écailles bifides des pétales, marquées d'une strie blanche, & presque réunies en un seul corps.

Cette plante se rencontre dans la Tartarie. x

17. SILENÉ odorant. *Silene paradoxa*. Linn.

Silene floribus racemosis; calicibus decem sulcatis, viscidis; floribus, aliis flaminibus exsertis, aliis inclusis. Linn. Spec. Plant. pag. 1673. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 695. n°. 14.

Lychnis viscaria, peregrina, noctiflora, odorata. Zanon, Hist. tab. 109.

Ce siléné, qui a quelques rapports avec le *silene nutans*, est quatre fois plus grand, & en diffère encore par ses feuilles linéaires, allongées.

Ses tiges sont droites, cylindriques, grêles, striées, vertes ou un peu blanchâtres, glabres, hautes d'un pied & demi à deux pieds, & souvent davantage, rameuses; les unes fertiles, plus longues; d'autres stériles, plus courtes, & dont la fructification ne paraît que l'année suivante. Les feuilles caulinaires sont opposées, linéaires, longues, étroites, lancéolées, canaliculées, connées à leur base, glabres à leurs deux faces, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont odorantes, & forment une panicule très-lâche, étalée, sur laquelle les fleurs sont réunies en petites grappes: les pédoncules latéraux supportent trois fleurs. Les calices sont visqueux, médiocrement cylindriques, allongés, renflés en tête de clou à leur partie supérieure, marqués de dix stries anguleuses. La corolle est purpurine, quelquefois blanche, ne s'ouvre que pendant la nuit, & répand une odeur assez agréable. Les pétales sont bifides, légèrement crénelés; leur orifice garni d'une couronne aiguë, un peu den-

tée. Dans certaines fleurs, les pistils & les étamines sont saillans hors de la corolle; dans d'autres, ils restent renfermés dans le tube.

Cette plante se rencontre dans l'Italie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (V. v.)

18. SILÉNÉ arbrisseau. *Silene fruticosa*, Linn.

Silene petalis bifida, caule fruticoso, foliis lanceolatis, panicula trichotoma. Linn. Syst. veget. pag. 420. n°. 12. — Mill. Dict. n°. 4. — Kniph. Cent. 5. n°. 84.

Silene caule folioso, fruticosa; foliis lineari-lanceolatis, acutis, glabris; capsulis ovatis. Virid. Cliff. 38. — Hort. Cliff. 171. n°. 4. — Hort. Upf. Roy. Lugd. Bat. 446.

Lychnis myrsifolia, behen albo similis. C. Bauh. Pin. 205. — Tourn. Inst. R. Herb. 335.

Ozymoides fruticosum. Camer. Hort. tab. 33.

Saponaria frutescens, acutis foliis, ex Siciliâ. Boec. Sic. pag. 58. tab. 30.

Saponaria altera, fruticosa, ex Siciliâ. Cæsalp. 256.

Behen albo officinarum, similis planta, semper-virens. J. Bauh. Hilt. 3. pag. 357. Sine icon.

On distingue cette espèce à ses tiges dures, presque ligneuses, cylindriques & un peu anguleuses, articulées, droites, hérissées de poils très-courts, un peu cendrées, hautes d'environ un pied & demi, rameuses près de leur base, ou sortant plusieurs ensemble des mêmes racines. Les feuilles radicales sont pétiolées, ovales, élargies, un peu épaisses, pubescentes & même velues dans leur jeunesse, rétrécies sur leur pétiole, aiguës à leur sommet, longues de deux à trois pouces sur presque un pouce de large; les feuilles caulinaires supérieures sessiles, connées, étroites, lancéolées, aiguës.

Les fleurs forment une panicule étalée, terminale, assez touffue, dont les ramifications principales sont simples, axillaires, opposées, terminées par trois longues fleurs pédonculées; les pédoncules courts, munis à leur base de deux bractées lancéolées, oblongues; quelquefois une fleur solitaire dans la bifurcation des rameaux supérieurs. Les calices sont longs de plus d'un pouce, droits, quelques-uns rétrécis, cylindriques, un peu coniques, striés, pubescens. La corolle est blanchâtre, assez grande; les onglets un peu plus longs que le calice; le limbe divisé en deux lobes linéaires, obtus; les étamines quelquefois un peu saillantes hors de la corolle, toujours plus longues que les onglets. Les capsules sont ovales, pédonculées. Les calices prennent la même forme à leur partie supérieure; l'inférieure rétrécie & enveloppante le

pédoncule de la capsule, qui se courbe quelquefois avec la portion du calice qui l'entoure.

Cette plante croît en Sicile. Je l'ai recueillie aux environs de Marseille, sur les côtes maritimes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (V. v.)

19. SILÉNÉ à feuilles de buplèvre. *Silene buplévroides*, Linn.

Silene petalis bifida; floribus pedunculatis, oppositis, bracteis brevioribus; foliis lanceolatis, acutis, glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 558. — Mill. Dict. n°. 17. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 696. n°. 15. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 351.

Silene caule folioso, herbaceo; foliis lanceolatis, acutis, glabris; calicibus erectis. Hort. Cliff. 171. — Roy. Lugd. Bat. 446.

Lychnis orientalis, buplévi folio. Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. 24. — Iter, vol. 2. pag. 139. tab. 154.

Cette plante a des rapports par la forme, la grandeur & la disposition de ses fleurs, avec le *Silene fruticosa*; mais elle en diffère par ses tiges herbacées, par ses feuilles étroites, allongées. D'ailleurs, elle est glabre dans toutes les parties.

Ses tiges sont droites, cylindriques, lisses, point striées, vertes ou légèrement purpurines, couchées à leur base, hautes à peine d'un pied; elles parviennent par la culture, à la hauteur de deux ou trois pieds, divisées en rameaux opposés, grêles, élancés, nombreux, paniculés. Les feuilles sont opposées, sessiles, étroites, lancéolées, très-lisses, glabres à leurs deux faces, vertes; les inférieures décurrent sur les pétioles, longues de trois à quatre pouces; les supérieures plus courtes, sessiles.

Les fleurs forment, par leur ensemble à l'extrémité des rameaux, une panicule étalée. Les pédoncules sont axillaires, opposés, munis d'une, de deux ou de trois fleurs pédicellées, garnies chacune de bractées étroites, lancéolées, très-aiguës. Les calices sont glabres, très-lisses, tubuleux, verdâtres, quelquefois violets, longs de plus d'un pouce, terminés par cinq dents ovales, aiguës. La corolle est grande, ouverte, blanche, d'un violet-pâle en dessous; les pétales munis d'onglets un peu plus longs que les calices, bidentés à leur orifice, divisés à leur limbe en deux lobes profonds, écartés, obtus; les étamines saillantes hors du tube; les capsules sont oblongues, ovales, pédicellées dans le calice.

Cette plante croît dans la Perse, le Levant; elle a été observée sur le mont Atlas par M. Desfontaines. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (V. v.)

20. SILÉNÉ à longs pétales. *Silene longipetala*. Vent.

Silene viscosa, foliis lanceolatis, scabrisculis; pedunculis elongatis, dichotomis; petalis bifidis, retroflexis, calice longioribus. Vent. Jard. Cels. p. 83. tab. 83.

Cette plante, qui a des rapports avec le *silene huplevroides*, s'en distingue par sa tige visqueuse, par sa panicule étalée, par les pedoncules dichotomes & par ses fleurs, dont les pétales réfléchis sont plus longs que le calice; elle a aussi des rapports avec le *silene patula* Desfont. Elle en diffère par ses feuilles tudes au toucher, par les pedoncules dichotomes, par ses fleurs sans odeur, & dont celle du milieu de la bifurcation est constamment pendante; par les bractées lancéolées, & par la direction de ses pétales.

Ses racines sont rampantes, jaunâtres, fibreuses; ses tiges droites, cylindriques, noueuses, glabres, simples, visqueuses, d'un vert-pâle, hautes d'environ deux pieds & demi, garnies de feuilles opposées, presque droites, lancéolées, bordées de cils cartilagineux & peu apparens, rudes au toucher, un peu épaissies, d'un vert-cendré; les inférieures tétées en pétioles, plus longues que les entre-nœuds; les supérieures réunies à leur base, insensiblement plus courtes.

Les fleurs sont disposées en une panicule étalée, allongée, très-ouverte; ses ramifications axillaires, opposées, en croix, dichotomes, munies de deux bractées à leur sommet, visqueuses; les pedoncules propres terminaux, celui du milieu ou du centre de la bifurcation recourbé, uniflore; les deux latéraux plus longs, droits, ordinairement à deux ou trois fleurs; les bractées sont opposées, concaves, lancéolées, aiguës, membraneuses à leurs bords, munies de cils peu apparens. Le calice est rubulé, rétréci à sa base, à dix nervures, glabre, à cinq dents droites, ovales, aiguës, membraneuses à leurs bords. La corolle est d'un blanc-sale en dedans, couleur de lie de vin en dehors, s'ouvrant l'après-midi, point odorante; les pétales inférieurs sous l'ovaire; les onglets linéaires, pubescens, munis à leur sommet de deux appendices en forme de dents; le limbe réfléchi, à deux découpures profondes, linéaires, obtuses, plus longues que le calice; dix étamines; cinq inférées sous l'ovaire, cinq autres alternes, attachées à la base de l'onglet des pétales; les filamens inférieurement pubescens, inégaux; les anthers ovales, verdâtres; l'ovaire est ovale, oblong, pédonculé; les styles plus courts que les plus longues étamines, droits, pubescens, verdâtres; les stigmates linéaires, obus, recourbés, garnis de petites glandes purpurines, étant vus à la loupe; les capsules sont ovales, une fois plus longues que le calice, à une seule loge dans leur moitié supérieure, à trois loges dans leur partie inférieure,

s'ouvrant à leur sommet en six dents; les semences sont chagrinées, d'un jaune-pâle, réniformes, attachées à un placenta hémicé de filamens qui soutiennent chacun une femelle.

Cette plante croît aux environs d'Alep, d'où elle a été rapportée par MM. Bruguières & Olivier. Elle fleurit à la fin du printemps. ☉ (*Descript. ex Veneust.*)

21. SILÉNÉ à longues fleurs. *Silene longiflora*. Willd.

Silene petalis bifidis; floribus paniculatis, erectis; pedunculis oppositis, bracteis longioribus; calicibus longissimis, glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 696. n°. 16.

Silene (longiflora), radice perenni; foliis lanceolato-linearibus, glabris; caulis paniculatis, glabris; pedunculis calice brevioribus; calice subelevato, glabro, basi extenso; petalis bifidis, capsula thesaphora breviora. Ehrh. Beytr. 7. pag. 144.

Silene (juncea), petalis bipartitis, integris; laciniis divaricatis; fructibus oppositis, clavatis, erectis. Roth. Catal. 1. pag. 54.

Ses tiges sont grêles, élançées, parfaitement glabres, cylindriques, divisées en rameaux lâchement paniculés; les feuilles sont opposées, linéaires, lancéolées, connées à leur base, glabres à leurs deux faces, entières. Les fleurs sont disposées en une panicule droite; les ramifications opposées, supportées chacune par un pedoncule plus court que le calice, muni à sa base de bractées moins longues que le pedoncule. Le calice est glabre, strié, en forme de clou, constamment droit, très-long. La corolle est allongée; les pétales divisés à leur limbe en deux lobes; la capsule plus courte que le calice persistant qui l'enveloppe.

Cette plante croît dans la Hongrie. ☿

22. SILÉNÉ gigantesque. *Silene gigantea*. Linn.

Silene petalis bifidis, foliis radicalibus cochleariformibus, obtusissimis; floribus subverticillatis. Linn. Syst. veget. pag. 421. n°. 14. — Mill. Dict. n°. 13. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 696. n°. 17.

Silene foliis obversis ovatis, crassis; limbis corollae bifidis, à fovea revolutis. Wachs. Ultr. 391.

Lychnis graca, fedi arborecentis folio & fute; flore albo. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 23. — Walth. Hort. 32. tab. 11.

Cette plante est remarquable par la disposition de ses fleurs, qui forment, à l'extrémité des pedoncules communs, des paquets presque verticillés. La presque nullité de la couronne, dans la corolle, la rapproche beaucoup du genre des cucubales.

Ses tiges croissent pendant deux ans ; elles parviennent , la seconde année , à deux ou trois pieds de hauteur : elles font droites , un peu rudes , cylindriques , vertes , lisses , articulées ; les articulations inférieures courtes & velues ; les supérieures très-longues , effilées , presque sans feuilles , glutineuses ; les rameaux élançés . Les feuilles sont ovales , oblongues , épaisses , cassantes , très-rapprochées , sessiles , rétrécies à leur base , connées , obtuses à leur sommet , un peu concaves , rudes , pubescentes ; celles de la première année très-grandes , cassantes ; les feuilles caulinares supérieures petites , étroites , lancéolées , aiguës , situées à la base des pédoncules communs .

Ces derniers sont courts , opposés , presque horizontaux , axillaires , dichotomes ou plus ordinairement terminés par un gros paquet de fleurs serrées , presque verticillées ; les unes sessiles , d'autres pédicellées , munies à leur base de bractées opposées , petites , lancéolées . Les calices sont droits , cylindriques , un peu renflés dans leur milieu , lisses , pubescens . La corolle est verte , d'une grandeur médiocre , ne s'ouvrant que la nuit ; les pétales bifides ; l'orifice muni d'une couronne à peine sensible ; les étamines un peu plus longues que la corolle .

Cette plante croît en Grèce & dans l'Afrique . On la cultive au Jardin des Plantes de Paris . ♂ (V. v.)

23. SILÉNÉ à feuilles grasses . *Silene crassifolia* . Linn.

Silene petalis emarginatis , foliis suborbiculatis , carnosis , hirsutis ; racemo secundo . Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 597. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 697. n°. 18.

Cette espèce est très-distincte par la forme & la substance de ses feuilles . Ses tiges sont fermes , hautes de deux pieds , cylindriques , hérissées de poils , munies de rameaux alternes . Ses feuilles ressemblent un peu à celles du pourpier ; elles sont grasses , épaisses , orbiculaires ou un peu ovales , opposées , assez petites , pileuses à leurs deux faces , entières à leurs bords , obtuses à leur sommet .

Les fleurs sont réunies , au nombre de huit à douze , en une grappe unilatérale à l'extrémité des rameaux ; les pédoncules garnis à leur inflexion , de bractées ovales . Les calices sont velus ; la corolle d'une couleur sombre ; les pétales échancrés à leur limbe , munis à leur orifice d'une couronne dentée .

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance . ♂ (Description en Linn.)

24. SILÉNÉ à fleurs vertes . *Silene viridiflora* . Linn.

Silene petalis semibifidis , foliis ovatis , scabris-fculis , acutis ; panicula elongata , subaphylla . Linn. Syst. veg. pag. 421. n°. 16. — Miller , Dict. n°. 5. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 142. — Kniph. Cent. 12. n°. 89. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 697. n°. 19.

Silene foliis lanceolatis , caule paniculato-nudo , floribus erectis . Hort. Cliff. 171. — Royen , Lugd. Bat. 446.

Lychnis acymastri facie , flore viridi . Herm. Parad. pag. 199. Icon. 199. — Tournef. Inst. R. Herb. 336.

On distingue cette espèce à ses feuilles larges & ovales , à sa panicule lèche , à ses fleurs d'un blanc-verdâtre .

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un à deux pieds ; elles sont droites , cylindriques , visqueuses , pubescentes , articulées ; les articulations renflées , divisées en rameaux élançés , alternes , axillaires , quelquefois opposés , mais l'un des deux reste sans développement ; peu garnis de feuilles , particulièrement à leur partie supérieure . Les feuilles sont opposées , presque sessiles , connées , larges , ovales , fermes , pubescentes , vertes & un peu blanchâtres à leurs deux faces , aiguës à leur sommet , rétrécies médiocrement à leur base ; les supérieures plus petites , de même forme ; les terminales lancéolées , aiguës .

Les fleurs sont peu nombreuses , disposées en une panicule lèche ; les ramifications axillaires , opposées , presque dichotomes à leur sommet , velues & visqueuses , étalées ; les pédoncules un peu inégaux , munis à leur base de bractées opposées , lancéolées , aiguës , plus courtes que les pédoncules . Les calices sont cylindriques , allongés , pendans , à dix angles velus , très-visqueux . La corolle est d'un vert-blanchâtre , d'une grandeur médiocre ; les pétales divisés en deux lobes à leur limbe ; les lobes linéaires , recourbés ; les étamines de la longueur du tube , & les pistils aussi longs que les pétales ; les capsules ovales , un peu pédicellées .

Cette plante croît dans le Portugal & en France , dans les Alpes . On la cultive au Jardin des Plantes de Paris . ♂ (V. v.)

25. SILÉNÉ à larges feuilles . *Silene latifolia* . Poir.

Silene foliis ovatis , acuminatis , levibus ; calicibus subclavatis , oblongis ; petalis bifidis . Poirer , Voyage en Barbarie , vol. 2. pag. 165. — Desf. Flor. atlant. vol. 2. Suppl. pag. 449.

Cette espèce a les feuilles & presque le port du *cucubalus bacciferus* . Ses tiges sont grêles , un peu jaunâtres , cylindriques , fistuleuses , légèrement velues , lisses , à peine lisses , hautes de trois à quatre

pieds ,

piés, rameux; les rameaux alternes, élançés, presque dichotomes à leur sommet. Les feuilles caulinaires & supérieures sont sessiles, opposées, très-écartées, souvent distantes de six à huit pouces & plus, assez larges, ovales, réunies à leur base, aiguës, acuminées à leur sommet, vertes, glabres à leurs deux faces; les dernières un peu lancéolées, plus étroites, ciliées à leurs bords, ainsi que les bractées.

Les fleurs sont, ou latérales, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, ou terminales, réunies deux ou trois ensemble, toutes pédonculées; les pédoncules inégaux, à peu près de la longueur du calice; filiformes, velus, un peu visqueux; les pédoncules terminaux & multiflores, très-longs & droits; les calices rubulés, longs d'environ un pouce, un peu rétrécis à leur base, à peine striés, velus, droits, terminés par cinq dents ovales, acuminées. La corolle est blanche, d'une grandeur médiocre; les pétales bifides à leur limbe; les capules ovales, oblongues, un peu pédonculées.

J'ai recueilli cette espèce sur les côtes de Barbarie, dans le pays des Nadis & ailleurs, parmi les haies & les buissons. (F. v.)

16. SILÈNE velu. *Silene hisfuta*. Poir.

Silene floribus subsessilis, secundis; calicibus alternis, hisfutissimis, sessilibus; petalis emarginatis. Poir. Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 163.

Silene (hisfuta), *floribus racemosis, confertis, secundis; calicibus hisfutissimis, petalis bifidis*. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 348.

C'est une très-belle espèce, dont les tiges s'élèvent depuis deux jusqu'à cinq & six pieds de haut. Elles sont droites, articulées, presque cylindriques, un peu comprimées inférieurement, presque quadrangulaires & striées à leur partie supérieure, garnies de poils fins & distans, simples ou médiocrement rameux. Les feuilles inférieures sont oblongues, ovales, presque spatulées, rétrécies en pétiole à leur base, élargies, obtuses; les supérieures sessiles, opposées, lancéolées, aiguës, vertes, un peu molles, garnies de poils rares, longs & blanchâtres, particulièrement vers leurs bords.

Les fleurs sont disposées, presque en épis, à l'extrémité de longs pédoncules, qui se bifurquent souvent à leur sommet, & portent deux épis de fleurs nombreuses, sessiles, toutes tournées du même côté, dans une position horizontale, très-rapprochées, alternes, monies chacune à leur base d'une bractée étroite, velue, sessile, aiguë, beaucoup plus courte que le calice. Les calices sont rubulés, longs d'un pouce, un peu rétrécis à leur base, striés, chargés de poils longs, très-nombreux, terminés par cinq dents aiguës. Les fleurs sont blanches, d'une grandeur médiocre; les pé-

Botanique. Tome VII.

tales divisés en deux lobes; les capules ovales, glabres, un peu pédonculées, enveloppées entièrement par le calice, qui prend une forme ovale & se rétrécit à sa base. Les pétales sont droits, ouverts, plus longs que le tube; les étamines plus courtes que la corolle.

J'ai rencontré cette plante dans les bois sur les côtes de Barbarie, à quelque distance du Balton de France. M. Desfontaines l'a également recueillie dans le mont Atlas. (F. v.)

27. SILÈNE imbriqué. *Silene imbricata*. Desf.

Silene caule inferni piloso, foliis lanceolatis; floribus sessilibus, secundis, striatis, longe racemosis, imbricatis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 349.

Ses tiges sont denses, hautes d'environ deux pieds, velues à leur partie inférieure, divisées en rameaux grêles, élançés. Les feuilles sont opposées, velues; les inférieures oblongues, lancéolées, obtuses, un peu élargies; les supérieures plus étroites, lancéolées, aiguës à leur sommet, sessiles, connées à leur base.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, presque disposées en un épi simple, allongé, toutes tournées du même côté, droites, rapprochées par imbrication, appliquées contre les tiges, presque sessiles ou légèrement pédonculées; les inférieures plus écartées, garnies à leur base de bractées fort petites, aiguës, subulées. Le calice est tubulé, glabre, marqué de dix ftries, terminé par cinq dents droites, aiguës. La corolle est blanche; les pétales divisés en deux lobes courts, obtus. La capsule est glabre, ovale-oblongue, légèrement pédonculée dans le calice.

Cette plante croît sur les côtes de Barbarie, dans les campagnes, aux environs de Mascara, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. (Desf. ex Desfont.)

28. SILÈNE tridenté. *Silene tridentata*. Desf.

Silene hisfuta, foliis angulo-lanceolatis; floribus racemosis, distentis, sessilibus; dentibus calicinis subulatis; capsulis acuminatis, erectis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 349.

Lychnis silvestris sexta. Clus. Hist. 290. Icon.

Lychnis silvestris, lanuginosa, minor. C. Bauh. Pin. 206.

Lychnis parva. J. Bauh. Hist. 3. pag. 352.

Lychnis silvestris, hirta, minima. Lobel. Icon. 339.

Lychnis silvestris, minima. Tabern. Icon. 297.

Ses tiges sont droites, cylindriques, velues, hautes d'environ un pied, rameuses; les rameaux grêles, droits, opposés. Les feuilles sont velues &

Y

les radicales en ovale renversé ou spatulées, rétrécies à leur base; les feuilles caulinales inférieures, ainsi que celles du milieu, étroites, linéolées, sessiles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes lâches; elles sont alternes, sessiles ou légèrement pédonculées, situées dans les aisselles des feuilles supérieures, qui sont linéaires, subulées; les inférieures plus longues que les supérieures. Le calice est velu, tubuleux, coulantement droit, ovale ou un peu arrondi à la maturité des fruits, marqué de dix stries, divisé à son orifice en cinq dents allongées & subulées. La corolle est de couleur de rose, un peu plus grande que le calice; leur limbe divisé très-ordinairement en trois dents. La capsule est lisse, ovale, acuminée, s'ouvrant par son sommet, presque sessile dans le calice.

Cette plante croît dans les campagnes, aux environs d'Alger, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. (Désfont. ex Desfont.)

29. SILÈNE RÉTICULÉ. *Silene reticulata*. Desfont.

Silene glabra, viscosa; foliis angustis-lanceolatis, pedunculis subsessilibus, calice clavato-reticulato; petalis linearibus, emarginatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 350. tab. 99.

Cette plante a des tiges glabres, droites, visqueuses, cylindriques, très-lisses, hautes d'un à deux pieds & plus, rameuses, garnies de feuilles très-glabres, sessiles, opposées, étroites, linéolées, connées à leur base, aiguës à leur sommet, longues de quatre à cinq lignes.

Les fleurs forment une panicule terminale, soutenues par des pédoncules filiformes, uniflores, plus ordinairement terminés par deux ou trois fleurs, celle du milieu sessile ou légèrement pédicellée, munies à la base des pédicelles de deux folioles ou bractées subulées. Le calice est étroit, en forme de tête de clou vers son sommet, persistant, marqué légèrement de dix stries, réticulé par des veines purpurines, divisé à son orifice en cinq dents ovales, aiguës. La corolle est petite, couleur de rose; les pétales ont leur limbe linéaire, étroit, échancré à son sommet. L'onglet est étroit, de la longueur du calice, garni à son orifice d'un double appendice. Les étamines ont leurs filaments filiformes; l'ovaire surmonté de trois styles. La capsule est lisse, ovale, oblongue, longuement pédicellée, à peine plus longue que le calice, s'ouvrant à son sommet, à trois loges, renfermant des semences non breuses, fort petites, brunes, prégnantes reniformes, ridées, insérées sur un réceptacle central, allongé, rameux.

Cette espèce croît dans les environs d'Alger, où elle a été découverte par M. Desfontaines. (Désfont. ex Desfont.)

30. SILÈNE à réseau. *Silene pisa*. Hort. Paris.

Silene glabra, caule dichotomo, foliis linearibus, apiculis subulatis, calice clavato; petalis venosis, nervisque rucis, reticulatis. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 458. n° 53.

Silene bicolor. Thore.

Cette plante est très-voisine du *silene reticulata* Desfont., mais elle n'est point ou presque point visqueuse. Ses fleurs ne sont point paniculées, mais ordinairement solitaires à l'extrémité des rameaux.

Ses tiges sont glabres, dichotomes, cylindriques, vertes, quelquefois un peu purpurines; les feuilles étroites, sessiles, opposées, les inférieures linéaires, un peu aiguës, très-glabres; les supérieures bien plus étroites, presque filicées, longues de plus d'un pouce; il en sort plusieurs autres de leurs aisselles.

Les fleurs sont terminales, presque solitaires, soutenues, à l'extrémité des rameaux, par des pédoncules courts, filiformes. Les calices sont oblongs, glabres, très-lisses, en forme de clou, à stries d'une couleur verte, purpurine, sur un fond d'un blanc jaunâtre. La corolle est d'un blanc lavé de rouge, traversée de veines élégamment réticulées d'un rouge vif. Les capsules sont ovales, oblongues, pédicellées dans le calice.

Cette plante croît en France, aux environs de Dax, département des Landes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

31. SILÈNE rugueux. *Silene rugosa*. Pers.

Silene caule dichotomo, foliis linearibus-lanceolatis, calicibus clavatis; nervis crenato-rugosis, subsessilibus. Pers. Synops. Plant. pag. 498. n° 34. — Just. Herb.

Cette espèce ressemble beaucoup au *silene pisa*; elle en diffère par les calices dont les nervures sailantes sont nues, crénelées, chargées d'aspérités. Les tiges sont glabres, dichotomes; les feuilles sessiles, opposées, linéaires-lancéolées, aiguës; les fleurs terminales, presque solitaires, ou quelquefois un peu paniculées; les calices oblongs, en forme de clou; les capsules pédicellées.

Cette plante a été observée dans l'herbier de M. de Jussieu. Son lieu natal ne m'est pas connu. (V. f. in herb. Juss.)

*** Fleurs dans la bifurcation des tiges.

32. SILÈNE à gros fruits. *Silene conoidea*. Linn.

Silene calicibus fructibus globosis, acuminatis; stria triginta, foliis glabris, petalis integris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 598. — Hort. Ups. 110. — Sauvag. Monsp. 146. — Mül. Dict. n° 6. — Hoff. Germ. 151. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 193. — vol. II. pag. 494. — Willd. Spec. Plant. vol. 2.

pag. 698. n°. 10. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 351.

Cucubalus colicibus conica, *striatis*. Hort. Clif. 71. — Roy. Lugd. Bar. 448.

Lychnis silvestris, *latifolia*; *colicibus turgidis*, *striatis*. C. Bauh. Pin. 205. — Tourn. Inst. R. Herb. 337.

Lychnis silvestris, *secunda*. Cluf. Hist. 1. p. 595.

Muscipula major, *calice turgido*, *ventricoso*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 149. Icon.

Lychnis silvestris, *tertia Clusii*; *caliculis striatis*. Lobel. Icon. 339. — Tabern. Icon. 295. — Dalech. Hist. 1. pag. 818.

Lychnis caliculis striatis, *secunda Clusii*. Gerard, Hist. 470. Icon. — Parkinson, Hist. 631. Icon.

Lychnis silvestris, *caliculis striatis*, *turgidis*, *major*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 21. fig. 33.

Cette plante, qui a des rapports avec le *Silene conica*, en diffère par ses feuilles plus larges, & par ses capsules globuleuses, hautes de huit à dix

Ses tiges sont droites, nœuds de huit à dix pouces, cylindriques, striées, pubescentes, rameuses; les rameaux dichotomes à leur sommet. Les feuilles sont opposées, sessiles, lancéolées, connées à leur base, longues d'environ deux pouces sur un demi-pouce de largeur, vertes, un peu molles, légèrement pubescentes, aiguës à leur sommet, plus longues que les entre-nœuds.

Les fleurs sont droites, terminales, pédonculées; les pédoncules pubescents, visqueux, courts, uniflores, formant par leur ensemble une sorte de corymbe. Le calice est pubescent, verdâtre, marqué de trente stries, allongé, ovale, cylindrique dans la jeunesse, bien plus grand, renflé, globuleux, acuminé à la maturité des fruits, terminé par cinq dents subulées. La corolle est petite, couleur de rose; les pétales longuement onguiculés, entiers à leur limbe. Les capsules sont sessiles dans le calice, globuleuses, assez grosses, surmontées par le rétrécissement du calice; ce qui leur donne presque la forme d'une bouteille ou celle du *eucubaria lugensia*.

Cette plante croît en Europe parmi les moissons, dans les lieux cultivés aux environs de Paris. M. Desfontaines l'a observée dans la Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.)

33. SILÉNÉ à fruits coniques. *Silene conica*. Linn.

Silene calicibus fructibus conicis, *striatis triginta*, *foliis mollibus*, *petalis bifidis*. Linn. Spec. Plant. 598. — Hort. Upf. 110. — Jacq. Vind. 77. — Oberv. 38. — Idem, Flor. austr. vol. 3. tab. 253. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 511. — Pollich. Pal. n°. 418.

— Hoffm. Germ. 151. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 191. — vol. II. pag. 495. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 351.

Cucubalus conicus. Lam. Flor. franc. vol. 3. p. 33. n°. 675.

Lychnis silvestris, *altera*, *ineana*; *caliculis striatis*. Lobel. Icon. 338.

Lychnis silvestris, *angustifolia*; *calicibus turgidis*, *striatis*. C. Bauh. Pin. 205. — Tourn. Inst. R. Herb. 337. — Schaw. Specim. 401. — Zan. Ilor. t. b. 118.

Ce siléné, très-voisin du *Silene corioides*, s'en distingue aisément à ses feuilles beaucoup plus étroites, & à ses capsules ovales, moins renflées, & point terminées par une longue pointe, comme celles de l'espèce précédente.

Ses tiges sont droites, hautes de huit à dix pouces, cylindriques, obscurément anguleuses, vertes ou quelquefois d'un pourpre-rougeâtre, pubescentes, noueuses, presque simples ou munies de quelques rameaux alternes, plus ordinairement ramifiés à leur base, ou divisées dès leurs racines en plusieurs tiges. Ces racines sont dures, jaunâtres, presque simples. Les feuilles sont sessiles, allongées, étroites, linéaires, un peu lanecolées, aiguës, molles & chargées d'un duvet fort court, un peu blanchâtre, connées aux articulations renflées, plus longues que les entre-nœuds, acuminées, très-aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en une sorte de panicule ou de corymbe, ordinairement d'un tois dichotome; les premières divisions ouvertes, allongées; les autres plus courtes, un peu inclinées; une fleur solitaire, plus longuement pédonculée dans le milieu des bifurcations; & quelques autres plus inférieures, axillaires, solitaires; chaque bifurcation munie de deux bractées opposées, sessiles, subulées, allongées. Les calices sont ovales, oblongs dans leur jeunesse, renflés, presque coniques à la maturité des fruits, à peine pubescents, un peu rudes au toucher, verdâtres, marqués de trente stries, terminés par cinq dents aiguës, allongées. La corolle est rouge, à peine plus longue que le calice; les pétales entiers. Les capsules sont sessiles, ovales, renflées, coniques, surmontées par les dents du calice ouvert, & point connivent.

Cette espèce croît en France, en Espagne, dans l'Allemagne, aux environs de Paris, dans les terrains secs & sablonneux; elle a été observée sur les côtes de Barbarie par M. D. Montfries. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.)

34. SILÉNÉ à feuilles de bellis. *Silene bellidifolia*. Linn.

Silene calicibus cylindraceo-conicis, *pubescentibus*, *erectis*, *petalis bifidis*, *racemis geminis*, *terminalibus*, *secundis*; *flore intermedio pedunculato*; *foliis*

lanceolata, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 698. n°. 22.

Silene calceibus fructibus ovatis, villosis; foliis pilosis, subsuperis; petalis bifidis. Linn. Syst. veget. pag. 421. — Jacq. Hort. 3. tab. 81.

Cette plante a des tiges velues, cylindriques, striées, articulées, rameuses, garnies de feuilles opposées; les intérieures pétiolées, ovales, presque spatulées, assez larges, obtuses, rétrécies vers leur base; les supérieures sessiles, connées à leur base, ovales lancéolées, pubescentes, un peu ciliées à leur contour.

Les fleurs forment de petites grappes terminales, dont les pédoncules sont filiformes, velus, axillaires; les intérieures souvent solitaires, unilatérales; les grappes ordinairement geminées vers l'extrémité, toutes deux du même côté, quelquefois une fleur intermédiaire pédonculée. Les calices sont droits, cylindriques, un peu coniques, pubescents, verdâtres ou légèrement pourpres. La corolle est blanchâtre ou purpurine; les pétales filiformes, les capsules ovales, sessiles dans le calice qui les enveloppe, & qui est un peu plus long.

On ignore le lieu natal de cette plante. ○

35. *Silène dichotome*. *Silene dichotoma*. Willd.

Silene calceibus ovatis, viscoso-pilosis, erectis; petalis bifidis; racemie geminatis, terminalibus, secundis; flore intermedio pedunculato; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, basi ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 699. n°. 23.

Silene foliis ellipticis subquinque nerviis, petiolatis, scabris; caule dichotomo, deorsum pubescente; flore primario ex dichotomia; reliquis spicato racemosis, foliaceis, secundis, mutatis; calice deangulati, scabro; petalis bifidis, erenatis; capsulis crebris, thecaphoro longior. Ehr. Beytr. 7. pag. 144.

Ses tiges sont droites, cylindriques, pubescentes, dichotomes, garnies de feuilles pétiolées, opposées, ovales-lancéolées, ciliées à leur base, quelquefois presque elliptiques, un peu tudes au toucher, marquées de cinq nervures.

Les fleurs sont unilatérales, disposées en grappes terminales ou en une sorte d'épi geminée; une fleur solitaire, pédonculée dans la bifurcation des deux épis. Le calice est droit, ovale, visqueux, un peu velu, à dix angles, rude sur ses angles. Les pétales sont bifides, quelquefois légèrement crénelés à leurs bords. La capsule est ovale, oblongue, dépassant le calice persistant qui l'enveloppe.

Cette plante croît dans la Hongrie. ○

36. *Silène du crépuscule*. *Silene vespertina*. Retz.

Silene calceibus clavatis, pubescentibus, erectis; petalis bifidis; coronâ connatis; racemie geminatis, terminalibus, secundis; flore intermedio, pedunculato; foliis ovato-lanceolatis, basi ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 699. n°. 24.

Silene petalis bifidis; nectario connato; floribus atropis. Retz. Observ. Botan. 3. pag. 31.

Plante entièrement velue, mais point visqueuse, annuelle, haute d'environ un pied & demi, dont les tiges sont droites, divisées en rameaux, la plupart alternes. Les feuilles inférieures sont ovales; les supérieures ovales-lancéolées, très-entières, opposées, sessiles, velues, ciliées à leur base.

Les fleurs sont terminales, disposées en grappes unilatérales, dichotomes; une fleur solitaire, pédicellée dans le milieu de la bifurcation, & sur chaque rambeau de la bifurcation trois ou quatre fleurs alternes, médiocrement pédonculées, munies à leur base de deux folioles linéaires; quelquefois la grappe de fleurs est simple. Le calice est oblong, presque en forme de clou, pileux, à dix fibres verdâtres. La corolle est de couleur de chair, & ne s'ouvre que le soir. Les pétales sont bifides, munis d'un appendice en couronne; dix étamines, dont cinq de la longueur de la corolle, cinq plus courtes. L'ovaire est oblong; les styles de la longueur des plus courtes étamines, terminées par des stigmates simples. La capsule est ovale, presque à trois faces, longuement pédonculée dans le calice, s'ouvrant à son sommet en six dents; à plusieurs semences fort petites, réniformes, sillonnées sur leur dos.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. ○ (*Descript. ex Retz.*)

37. *Silène faux behen*. *Silene behen*. Lion.

Silene calceibus glabris, ovatis, venoso-reticulatis; capsulis trilocularibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 599. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 699. n°. 25.

Lychnis vesicaria, cretica; parvo flore purpurascens. Dillen. Hort. Eltham. pag. 427. tab. 317. fig. 409.

Lychnis cretica, parvo flore; calice striato, purpurascens. Tournet. Inst. R. Herb. Coroll. 24.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *cuculatus behen*, dont elle diffère par ses fleurs plus petites & purpurines, par l'appendice en forme de couronne, dont l'orifice de la corolle est garni.

Ses racines sont presque simples, dures, jaunâtres, annuelles; ses tiges, droites, hautes d'environ un pied & plus, rameuses, cylindriques, un peu striées, glabres, lisses, garnies de feuilles opposées, ovales-lancéolées, sessiles, glabres, connées à leur base.

Les fleurs sont penchées, & forment une sorte de panicule lâche, étalée; une fleur solitaire dans la bifurcation des ramifications, dont le pédoncule est plus court que la corolle. Les calices sont ovales, renflés, ventrus, parfaitement glabres, striés, veinés, réticulés, obtus, terminés par cinq dents courtes, souvent de couleur un peu purpurine. La corolle est petite, purpurine, à peine d'un tiers plus longue que le calice; les pétales divisés à leur limbe en deux lobes obtus; les anthères blanches; les capsules ovales, très-glabres.

Cette plante croît dans l'île de Crète: on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. f.)

38. SILÈNE à fleurs serrées. *Silene frida*. Linn.

Silene petalis emarginatis; calicibus glabris, reticulato-venosis; uccuinatis; pedunculo longioribus; caule dichotomo, fruticosa. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 599. — Anacrit. Acad. vol. 4. pag. 314. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 699. n°. 26.

Silene caule subdichotomo; floribus erectis, subsessilibus; foliis lanceolatis, piloso-viscidis. Anacrit. Acad. vol. 1. pag. 158.

Cette plante a des tiges grêles, peu élevées, très-glabres, striées, cylindriques, hautes de huit à dix pouces & un peu plus, dichotomes à leur sommet, munies de quelques rameaux alternes, menus, allongés, diffus, axillaires. Les feuilles sont opposées, parfaitement glabres à leurs deux faces dans l'état de culture, vertes, un peu molles; les inférieures ovales, presque spatulées, rétrécies en pétiole à leur base, obtuses, arrondies à leur sommet; les feuilles supérieures connées, sessiles, lancéolées, arêtes, longues d'un pouce & plus, sur cinq à six lignes de large.

Les fleurs sont disposées en petits bouquets ou corymbes terminaux, très-droits, un peu serrés, peu nombreuses, supportées par des pédoncules courts, inégaux, filiformes, munis à leur base de bractées lancéolées, aiguës; une fleur solitaire dans la bifurcation supérieure des tiges, plus longuement pédonculée. Les calices sont droits, très-glabres, tubuleux, un peu ovales, légèrement striés, veinés, réticulés, quelquefois un peu colorés en rouge, terminés par cinq dents courtes. La corolle est petite, rougeâtre ou purpurine, un peu plus longue que le calice; les pétales divisés en deux lobes à leur limbe; les étamines & les pistils renfermés dans le tube de la corolle; les capsules sessiles, ovales, un peu allongées; les semences fort petites, noires, réniformes.

Cette plante croît en Espagne: on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

39. SILÈNE à fruits pendans. *Silene pendula*. Linn.

Silene calicibus fructiferis pendulis, inflatis; an-

gulis decem; scabris. Linn. Syst. veget. pag. 421. n°. 22. — Hort. Upsal. 169. — Mill. Dict. n°. 7. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 700. n°. 27.

Cucubalus, floribus trigynis, erectis; calicibus pendulis; calicibus striis decem, crispis. Hort. Cliff. 170.

Cucubalus floribus trigynis, erectis; calicibus fructibus pendulis, angulosis. Hort. Cliff. 171.

Vifago hirsuta, scula, lychnidis aquatica facie, supina. Dillen. Hort. Eitham. pag. 421. tab. 312. fig. 404.

On distingue cette espèce à ses fruits presque solitaires, très-renflés, pendans, enveloppés par le calice persistant, presque vésiculeux.

Ses tiges sont hautes d'environ deux pieds, foibles, herbacées, presque filiformes, striées, légèrement velues, verdâtres, très-ranueuses; les rameaux alternes, élancés, dichotomes à leur sommet. Les feuilles sont opposées, un peu molles, légèrement velues, vertes; les inférieures ovales, médiocrement élargies, rétrécies en pétiole à leur base, un peu aiguës à leur sommet; les supérieures un peu plus étroites, ovales lancéolées, connées à leur base, aiguës.

Les fleurs sont presque solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures, les terminales réunies au nombre de deux ou trois; les pédoncules courts, filiformes, velus; accompagnés de deux petites feuilles opposées, souvent inégales, qui tiennent lieu de bractées. Les calices sont droits, tubuleux avant & pendant la floraison, tout-à-fait pendans, renflés, presque vésiculeux à l'époque de la maturité, marqués de dix stries un peu saillantes, rudes, velues. La corolle est d'une grandeur médiocre, légèrement purpurine; les pétales bifides; les étamines & les pistils saillans hors du tube de la corolle; les capsules assez grosses, ovales, légèrement pédonculées dans le calice, pendantes.

Cette plante croît dans l'île de Crète & en Sicile. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

40. SILÈNE maritime. *Silene maritima*. Willd.

Silene calicibus fructiferis, erectis, inflatis, revolutis; petalis bifidis, caule repente. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 700. n°. 29.

Silene (uniflora), petalis bifidis, crenatis; calicibus inflatis, revolutis, glabris; venoso-reticulatis; pedunculis terminalibus, solitariis, unifloris. Roth. Catal. 1. pag. 50.

Silene amara. Hudf. Angl. 188.

Cucubalus (littoralis), caule decumbente; foliis lanceolato-linearibus; floribus subsessilibus; calicibus glabris, reticulato-venosis; petalis coronatis. Smith,

Flor. britan. vol. 2. pag. 463. — Perfoon, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 496.

Cucubalus maritimus. Lam. Dict. vol. 2. p. 220.

Cucubalus littoralis. Donn. Ind. Hort. Cantabr. pag. 51.

Cucubalus behen. Var. β . Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 591. — Flor. dan. tab. 857. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 32. n^o. 675.

Lychnis maritima, *repens*. C. Bauh. Pin. 225. — Iter, Godl. 192. — Tourn. Inst. R. Herb. 335.

Lychnis maritima, *anglicana*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 357.

Lychnis perennis, *angustifolia*, *marina*, *anglica*, *procumbens*. Morif. Hist. 2. pag. 555. \S . 5. tab. 20. fig. 2.

Lychnis marina, *anglica*. Lobel. Icon. 337.

β . *Cucubalus alpinus*. Lam. Dict. vol. 2. p. 220.

Il existe tant de rapports entre cette espèce & le *Cucubalus behen*, que Linné, & d'autres botanistes près lui, n'ont fait qu'une simple variété de cette dernière plante. Plusieurs autres botanistes plus modernes n'ont pas été de cet avis; ils y ont reconnu des différences assez marquées pour la regarder comme une espèce distincte, & plus rapprochée, par ses caractères extérieurs, des *Silene* que des *Cucubus*; par ses feuilles plus longues, très-étroites à la base; par les fleurs souvent solitaires & terminales.

Ses tiges sont grêles, très-glabres, lisses, couchées, très-peu élevées, médiocrement rameuses, garnies de feuilles glabres, opposées, ovales-lancéolées, étroites, longues d'environ trois pouces, d'un vert glauque. Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux; elles sont souvent solitaires, pédonculées; d'autres fois trois ensemble; une fleur pédonculée dans la bifurcation des tiges. Les calices sont droits, roides, un peu ovales, très-glabres, striés, veinés, réticulés, point visqueux. La corolle est blanche, plus grande que celle du *Cucubalus behen*; le limbe bifide; l'orifice muni d'un appendice en couronne, très-court; le nombre des styles varie de quatre à cinq.

Cette plante croît sur les côtes maritimes, en France, en Angleterre, dans la Norvège, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (V. v.)

Je crois qu'il faut joindre à cette espèce, comme une simple variété, le *Cucubalus alpinus* (Lamarck), qui en diffère à peine par ses fleurs plus grosses, constamment solitaires, & par ses feuilles glauques, très-glabres.

41. SILÈNE couché. *Silene procumbens*. Willd.

Silene colicibus inflatis, *subdecem angularibus*, *scabris*; *petalis emarginatis*; *caule procumbente*; *foliis sessilibus*, *linearis-lanceolatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 701. n^o. 30.

Silene colicibus ovatis, *inflatis*, *erectis*, *absoletè decem angularibus*; *petalis subauriculatis*, *bifidis*; *caule procumbente*. Murr. Comment. Goett. 1784 & 1785. pag. 83. tab. 2.

Silene petalis emarginatis, *colicibus inflatis*, *angularibus*, *rugosis*, *scabris*; *pedunculis terminalibus*. Roth. Catal. Botan. 1. pag. 55.

Cette espèce est très-voisine, surtout par son port & par la forme de ses calices tendus, du *Silene maritima*. Ses tiges sont glabres, cylindriques, couchées sur la terre ou fortement inclinées, rameuses, garnies de feuilles opposées, sessiles, étroites, linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, connées à leur base.

Les fleurs sont terminales, pédonculées; les inférieures solitaires, alternes, sessiles; les supérieures plusieurs ensemble; leurs pédoncules presque dichotomes. Les calices sont droits, tendus, presque visqueux, marqués de dix angles un peu saillans & rudes au toucher; les pétales divitiés en deux lobes à leur limbe.

Cette plante croît naturellement dans la Sibérie. γ

42. SILÈNE de Nice. *Silene Nicaensis*. Allion.

Silene viscosa, *villosa*; *foliis linearibus*, *obtusis*; *petalis semibifidis*, *capsulis ovatis*, *calicibus decemfidiis*. Allion. Flor. pedem. tab. 44. fig. 2.

Ses tiges sont foibles, à peine redressées, diviées en rameaux opposés, presque simples, velus, visqueux, garnis de feuilles sessiles, opposées, linéaires, un peu épaisses, velues, très-visqueuses, connées à leur base, obtuses à leur sommet ou un peu aiguës.

Les fleurs sont placées, à l'extrémité des rameaux, sur des pédoncules dichotomes, terminés par plusieurs fleurs pédicellées. Le calice est tubulé, non tendu, visqueux, marqué de dix ftries verdâtres. La corolle est blanche en dedans, d'un jaune-pâle ou un peu purpurine en dehors, fermée pendant le jour; les pétales à demi-bifides, couronnés par cinq écailles arrondies; les onglets d'un blanc-jaunâtre; les anthères à deux loges, d'un jaune-verdâtre; trois styles velus, ainsi que les stigmates. Le fruit est une capsule ovale, à trois lobes, s'ouvrant à son sommet en six ou sept parties.

Cette plante croît dans les environs de Nice, sur les bords du Var. \odot (*Descript. ex Allion.*)

43. SILÈNE noctiflora. *Silene noctiflora*. Linn.

Silene calicibus decemangularibus, dentibus tubum aequantibus; caule aichotomo, petalis bifidis. Linn. Syst. veget. pag. 421. n°. 13. — Mill. Dict. n°. 8. — Pollich. Pal. n°. 419. — Hoffm. Germ. 151. — Roth. Germ. vol. I. pag. 193. — vol. II. pag. 495. — Lam. Illustr. Genet. tab. 377. fig. 2.

Vifcago foliis ovato-lanceolatis, hirsutis; caule brachiato, calicibus venosis. Hall. Helv. n°. 911.

Cucubalus calicibus fructibus ovatis, erectis; annullis decem, alternis, venosis. Hort. Upf. 109. — Flor. suec. edit. 2. n°. 189. — Sauvages. Monsp. 146.

Cucubalus nodiflorus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 35. n°. 675.

Lychnis nodiflora. Schreb. Spicil. pag. 31. — C. Bauh. Pin. 205. — Rai, Hist. 994. — Tournof. Inst. R. Herb. 335.

Ocymoides nodiflorum. Cam. Hort. 109. tab. 34.

Ocymoides non speciosum. J. Bauh. Hist. 3. pag. 344.

On reconnoît dans cette plante des caractères qui la font aisément distinguer de ses congénères; elle est remarquable par ses riges tres-velues, ainsi que ses calices, dont les dents sont tres-longues, droites, visqueuses; par ses feuilles assez grandes, lanceolées, acuminées; par ses fleurs qui ne s'ouvrent qu'après le coucher du soleil.

Ses riges sont assez fortes, cylindriques, hautes d'un à deux pieds, souvent beaucoup plus élevées, surtout dans les jardins, chargées de poils roides, nombreux; munies de rameaux alternes, très-étalés, dichotomes à leur sommet. Les feuilles sont opposées, pubescentes, presque velues, ciliées à leurs bords; les inférieures un peu spatulées, rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures ovales-lanceolées, longues au moins de trois pouces, larges d'un pouce, molles, plus étroites à leur base, sessiles, connées, acuminées à leur sommet, marquées de nervures alternes, peu sensibles, dirigées vers le sommet des feuilles.

Les fleurs sont situées à l'extrémité de la bifurcation des rameaux, supportées par des pédoncules opposés ou alternes, inégaux, droits, alongés, très-velus, munis à leur base de bractées opposées, étroites, linéaires; une fleur solitaire, &c. plus longuement pédunculée dans la dichotomie des rameaux. Les calices sont alongés, tubulés, un peu ovales, très-visqueux, velus, marqués de dix nervures, terminés par cinq dents droites, longues, subulées. La corolle est blanchâtre, d'une grandeur médiocre; les pétales à très-longues ongles; leur limbe divisé en deux lobes écartés, obtus. La capsule est grosse, ovale, très-lisse, au moins aussi longue que le calice, qui persiste &c. grossit avec elle; les éramines &c. les pistils à peine saillans hors du tube de la corolle.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France, en Suisse, en Allemagne, en Suède, dans les Alpes, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.)

44. SILÈNE ondulé. *Silene undulata.* Aiton.

Silene calicibus fructibus clavato-cylindricis, pilosius petalis bifidis; foliis lanceolatis, pubescentibus, undulatis; caule ascendente. Att. Hort. Kew. vol. 2. pag. 96. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 702. n°. 33.

Ses riges sont cylindriques, striées, un peu velues ou pubescentes, courbées inférieurement, redressées, ascendantes à leur partie supérieure, médiocrement rameuses, garnies de feuilles presque sessiles, opposées, lanceolées, rétrécies médiocrement à leur base, aiguës à leur sommet, pubescentes à leurs deux faces, un peu molles, ondulées à leurs bords. Les fleurs sont réunies en petit nombre, presque paniculées à l'extrémité des riges. Les calices sont cylindriques, tubulés, striés, chargés de poils courts sur les stries; ils deviennent, à l'époque de la maturité, tendres, &c. en forme de clou à leur partie supérieure. Les pétales sont bifides; les capsules ovales, pédunculées dans le calice.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. ☉

45. SILÈNE de Virginie. *Silene virginica.* Linn.

Silene calicibus floribus cylindricis, villosis; panicula dichotoma. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 600. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 702. n°. 33.

Silene (virginica), decumbens, tota viscido-pubens; foliis oblongis, margine asperis; foliis panicula dichotoma; petalis bifidis, saturate rubris, genitalibus exsertis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 172.

Lychnis flore simplicis, speciosa, coccineo; foliis oblongis, acuminatis, adversis; caule viscoso. Gron. Virg. 151.

Lychnis viscosa, virginiana; flore amplo, coccineo, seu mucipula regia. Pluken. Almag. pag. 231. tab. 203. fig. 1.

Cette plante est plutôt reconnoissable par les variétés &c. les formes différentes qu'elle offre, que par des caractères bien tranchés. Elle se rapproche assez ordinairement du *Lychnis aïoica*, dont elle est distinguée par ses caractères génériques, par ses fleurs constamment d'un rouge-foncé.

Ses riges sont presque couchées, quelquefois droites, tantôt hautes à peine de quatre à cinq pouces, très-simples; tantôt hautes au moins d'un pied, dichotomes à leur sommet, cylindriques, striées, visqueuses, pubescentes ou velues. Ses

feuilles sont opposées, sessiles, oblongues ou larges-lancéolées, quelquefois ovales, élargies, assez rapprochées de celles du *gomphrena globosa*, légèrement rudes à leurs bords, aiguës à leur sommet et les supérieures plus étroites.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une sorte de panicule trichotome, une fleur solitaire & longuement pédonculée dans la bifurcation des rameaux. Quelquefois cette panicule est reserrée & les fleurs fasciculées. Les calices sont droits, cylindriques, alonges, très-étroits, velus, visqueux, terminés par cinq dents courtes. La corolle est d'un rouge foncé; les pétales divisés en deux lobes à leur limbe; les étamines & les pistils un peu plus longs que la corolle.

Cette plante croît dans la Virginie, au pays des Illinois. (V. f.)

46. SILÉNÉ à fleurs sanguines. *Silene ornata*. Ait.

Silene calicibus fructibus oblongis, carinatis, pilosis; petalis bifidis; foliis lanceolatis, pubescentibus, viscoso, planis; caule viscido. Air. Hort. Kew. vol. 2. pag. 96. — Curt. Magaf. 382. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 702. n°. 32.

Cette espèce a des racines fibreuses, qui produisent des tiges droites, cylindriques, visqueuses, chargées de poils courts, rameuses surtout vers leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, sessiles, lancéolées, conniventes à leur base, entières à leurs bords, planes, pubescentes, visqueuses. Les fleurs naissent par bifurcation à l'extrémité des rameaux : leurs calices sont cylindriques, oblongs, un peu renflés à l'époque de la maturité des fruits, relevés en carène, pileux, visqueux. La corolle est d'un rouge de sang foncé; les pétales blanches, la capsule oblongue, s'ouvrant à son sommet en plusieurs parties.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

47. SILÉNÉ de Pensilvanie. *Silene pensilvanica*. Michaux.

Silene viscido-pubens; foliis cuneatis, caulinis lanceolatis, cauliculis in summitate paucifloris; petalis leviter emarginatis, subcarnatis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 272.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *silene virginica*. Ses tiges sont basses, simples, nombreuses, ou plutôt divisées à leur partie inférieure en plusieurs autres tiges ou rameaux grêles, peu élevés, visqueux, pubescents, garnis de feuilles sessiles, opposées; les inférieures rétrécies en forme de coin à leur base; les supérieures & caulinaires lancéolées. Les fleurs sont en petit nombre, ramassées vers l'extrémité des rameaux. Les calices sont glutineux, striés, légèrement velus sur leurs angles. La corolle est de couleur pur-

purine; les pétales médiocrement échancrés à leur sommet, un peu crénelés, obtus.

Cette plante croît dans la Pensilvanie. (Desf. ex Mich.)

48. SILÉNÉ à feuilles de linaria. *Silene antirrhina*. Linn.

Silene foliis lanceolatis, subulatis; pedunculis trifidis, petalis emarginatis, calicibus ovatis. Linn. Sylt. veget. pag. 421. n°. 35.

Silene petalis bilobis, coronatis; floribus erectis, foliis subulatis. Hort. Upf. 114.

Silene corymbo dichotoma; floribus pedunculatis; ramis alternis, erectis; foliis lanceolatis, integerrimis. Gronov. Virg. 50.

Vistago americana, nolliflora, antirrhini folio. Dill. Hort. Eltham. pag. 442. tab. 313. fig. 403.

Ce siléné a des tiges droites, cylindriques, striées, munies de rameaux alternes, redressés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, étroites, linéaires, lancéolées, très entières, un peu rétrécies à leur partie inférieure, aiguës à leur sommet, légèrement ciliées; les supérieures connées à leur base.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux. Leurs peduncules, d'abord dichotomes, se divisent à leur sommet en trois autres plus courts, inégaux. Les calices sont striés, rubulés, un peu ovales, divisés en cinq dents à leur orifice. La corolle ne s'ouvre qu'après le coucher du soleil; ses pétales sont divisés en deux lobes; leur orifice muni d'un appendice en forme de couronne; les capsules sont glabres, ovales, très-lisses.

Cette plante croît dans la Virginie & la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

49. SILÉNÉ à fleurs de giroflée. *Silene cheiranthoides*.

Silene foliis linearibus-oblongis, subulatis; floribus erectis; calicibus clavato-oblongis, hirtis; petalis integris, crenatis; caule subsimplici. (N.)

Cette espèce peut avoir des rapports avec le *silene antirrhina*; elle en est très-distincte par ses pétales entiers, crénelés à leur limbe.

Ses tiges sont grêles, faibles, droites, striées, cylindriques, légèrement velues, presque simples, hautes de six à huit pouces, garnies de feuilles opposées, alongées, linéaires, très-étroites; les radicales longuement pétioles, rétrécies à leur base, & décurrentes sur la partie supérieure du pétiole, celui-ci velu sur ses bords; les feuilles caulinaires & supérieures sessiles, connées à leur base, lancéolées, étroites, aiguës à leur sommet, glabres.

glabres à leurs deux faces, à peine pubescentes, ciliées légèrement à leurs bords.

La disposition des fleurs n'étant que médiocrement développée dans l'individu que je possède de cette plante, ne me permet pas d'en déterminer le caractère avec certitude. Ces fleurs sont les unes axillaires, d'autres terminales, réunies deux ou trois dans chaque aisselle, sur des pédoncules filiformes, plus courts que les feuilles, un peu pubescents, simples ou presque dichotomes à leur sommet; les pédoncules propres très-courts, inégaux. Les calices sont droits, de couleur purpurine, tubulés, rétrécis à leur partie intérieure, en tête de clou vers leur sommet, striés, un peu velus, terminés par cinq dents droites, courtes, obtuses. La corolle est grande, blanche ou légèrement purpurine; les pétales munis d'onglets plus longs que le calice; leur limbe ovale, entier, plane, crénelé à son contour, garni à l'orifice d'un appendice obtus, à deux lobes; les étamines & les pistils à peine plus longs que le tube de la corolle.

Cette plante croît dans la Virginie. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

50. SILÉNÉ des sables. *Silene arenaria*. Desfont.

Silene villosa-viscosa, foliis linearilanceolatis, obtusifolius; floribus laxè racemosis; petalis bifidis; capsulis intra calicem pedicellatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 354.

Lychnis maritima, gadensis, angustifolia. Tourn. Infl. R. Herb. 338. — Vaill. Herb. (Desfont.)

Ses racines sont dures, noueuses, épaisses, presque ligneuses; les nœuds un peu ruberculés & blanchâtres; elles se divisent en plusieurs couches rampantes, d'où s'élèvent plusieurs tiges droites ou un peu couchées, velues, très-visqueuses, hispides, fortement striées, grêles, hautes d'environ un pied au plus, rameuses; les rameaux alternes, axillaires, striés. Les feuilles sont opposées, sessiles, épaisses, glutineuses, velues à leurs deux faces, la plupart assez semblables à celles du *cerastium vulgatum* Linn.; les racines lancéolées ou un peu spatulées, rétrécies en pétiolo à leur base, obtuses; les feuilles caulinaires connées, plus étroites, linéaires-lancéolées, obtuses à leur sommet, longues d'environ un pouce, distantes.

Les fleurs sont disposées en une sorte d'épi ou de grappe lâche, allongée à l'extrémité des rameaux; les unes axillaires, les autres terminales, solitaires ou deux ou trois réunies, soutenues par des pédoncules simples, courts, inégaux, hispides, visqueux, filiformes. Le calice est droit, tubulé, un peu ovale, plus étroit à sa base, pubescent, marqué de dix stries, terminé par cinq dents droites, aiguës. La corolle est blanche, d'une grandeur médiocre; les pétales droits; leurs ou-

Botanique. Tome VII.

glets plus longs que le calice; leur limbe divisé en deux lobes obtus; les étamines & les pistils à peine plus longs que le tube de la corolle. Les capsules sont lisses, ovales, médiocrement pédonculées dans le calice, de même longueur que lui, s'ouvrant à leur sommet en cinq, quelquefois six dents aiguës; les semences sont très-petites, noirâtres, très-glabres, arrondies, comprimées, un peu échancrées en rein.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans le sable, le long des côtes de la Barbarie, au détroit de Gibraltar. Je l'ai recueillie dans les environs de Lacalle; elle n'a point été mentionnée, par oubli, dans mon *Voyage en Barbarie*. x (V. v.)

51. SILÉNÉ très-rameux. *Silene ramossissima*. Desfont.

Silene pubescens, viscosa, ramossissima, foliis angustilanceolatis, pedunculis uni ad trifloris; calicibus ovatis, petalis bifidis, capsulis intra calicem subjeffilibus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 354.

Lychnis minima, hispida, noctiflora. Magnol. Botan. Monspél. Append. 308. — Vaillant, Herb. (Desfont.)

Cette espèce a de grands rapports avec le *silene arenaria* Desfont.; elle en diffère par ses rameaux très-nombreux, par les feuilles inférieures bien moins velues, par ses capsules à peine pédonculées, par ses fleurs très-abondantes.

« C'est, dit M. Desfontaines, une plante très-visqueuse, couverte de poils très-courts, & ordinairement chargée d'un sable très-fin qui s'y agglutine. Les tiges sont droites, hautes à peine d'un pied, divisées en rameaux nombreux, paniculés, garnis de feuilles opposées, étroites, lancéolées.

« Les fleurs sont très-abondantes, supportées par des pédoncules axillaires, inégaux, garnis d'une à trois fleurs; chaque fleur droite & pédicellée. Les calices sont ovales, marqués de dix stries, terminés par cinq dents aiguës, fort petites. La corolle est blanche; les pétales petits, bifides à leur limbe; les capsules lisses, glabres, ovales, légèrement pédicellées dans l'intérieur du calice, s'ouvrant à leur sommet en cinq petites valves. »

Cette plante croît dans le sable, sur le bord de la mer, le long des côtes de la Barbarie, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. x (Descript. ex Desfont.)

52. SILÉNÉ arénaire. *Silene arenarioides*. Desf.

Silene pubescens, foliis angustilanceolatis, pedunculis uni ad trifloris; calicibus decemfidiis, villosis;
Z

petalis bifidis; capsulis trisetibus, pedicellatis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 355.

De la même racine s'élèvent plusieurs tiges en touffes, les unes droites, d'autres courbées, surtout à leur base, grêles, pubescentes, simples ou modérément ramifiées, hautes de huit à dix pouces, garnies de feuilles opposées, linéaires, très-étroites; les inférieures un peu rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet; les supérieures subulées, aiguës, connées, un peu ciliées à leur partie inférieure.

Les fleurs sont, les unes latérales & axillaires, d'autres terminales, soutenues par des pédoncules uniflores, quelquefois à deux ou trois fleurs pédicellées. Les calices sont tubulés, de couleur pourpre, velus, marqués de dix stries, rétrécis à leur base, presque ovales à l'époque de la maturité des fruits; terminés par cinq dents droites, petites, ovales, obtuses. Les pétales sont bifides; leurs onglets un peu plus longs que les calices. La capsule est hile, cylindrique, légèrement pédonculée dans la partie inférieure du calice, s'ouvrant à son sommet en cinq valves, divisées en trois loges.

Cette plante croît en Barbarie, dans les campagnes; elle y a été découverte par M. Desfontaines. (*Descript. ex Desfont.*)

53. SILÈNE apétale. *Silene apetala*. Willd.

Silene calicibus ovatis, pubescentibus; floribus apetalis; foliis lanceolatis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 703. n° 37.

Cette espèce est une des plus remarquables de ce genre, par le manque absolu de pétales. Ses tiges sont courtes, cylindriques, striées, pubescentes, hautes d'environ six à huit pouces, munies de rameaux très-simples & opposés, garnies de feuilles opposées; les inférieures ovales, lancéolées, rétrécies à leur partie inférieure, obtuses à leur sommet; les feuilles supérieures plus étroites, lancéolées, pubescentes, aiguës; les terminales linéaires.

Les fleurs sont disposées par bifurcation à l'extrémité des tiges; une fleur solitaire dans la bifurcation, dont le pédoncule est filiforme, à peine de la longueur du calice; celui-ci est droit, tubulé, ovale, oblong, marqué de dix stries un peu velues, terminé par cinq dents courtes. Les capsules sont glabres, ovales, légèrement pédonculées dans le calice, qui persiste avec elles, & se rétrécit à sa base.

On ignore le lieu natal de cette plante; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. ○

54. SILÈNE fermée. *Silene inaperta*. Linn.

Silene caule dichotomo, paniculato; calicibus levi-

bus; petalis brevissimis, emarginatis; foliis glabris, lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 600. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 703. n° 39.

Vifago levis, inaperta flore. Dillen. Hort. Elth. pag. 424. tab. 315. fig. 407.

Cucubulus inapertus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 31. n° 675.

On distingue cette espèce à ses fleurs fort petites, dont le limbe est à peine saillant hors du calice, & à ses panicules très-ouvertes.

Ses racines sont grêles, simples, blanchâtres, à peine fibreuses; ses tiges glabres, cylindriques, menues, presque simples, point striées, verdâtres, noueuses, hautes d'un pied & plus lorsqu'elles sont cultivées; beaucoup plus petites dans leur sol natal. Les feuilles sont opposées, distantes, peu nombreuses; les radicales & inférieures ovales, oblongues, obtuses, rétrécies en pétiole; les caulinaires supérieures étroites, lancéolées, aiguës, glabres à leurs deux faces, entières, sessiles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicule très-lâche, très-étalée, pauciflore, dichotome; les premières divisions très-ouvertes, très-longues, presque horizontales; les pédoncules un peu visqueux, garnis de deux bractées courtes, opposées, aiguës. Les calices sont glabres, droits, fort petits, striés; ils s'agrandissent & deviennent renflés, presque globuleux à l'époque de la maturité. La corolle est rugueuse, très-petite, à peine plus longue que le calice; les pétales échancrés à leur limbe, qui est très-court; la capsule un peu globuleuse, très-glabre, sessile, à peine saillante hors du calice. Les étamines varient de cinq à dix.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (*V. v.*)

55. SILÈNE paniculé. *Silene portensis*. Linn.

Silene caule dichotomo, paniculato; calicibus striatis, petalis bifidis, foliis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 600. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 704. n° 41.

C'est une petite plante haute de six à sept pieds, branchue, dichotome à son sommet, glabre; cylindrique, garnie de feuilles opposées, linéaires, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, entières; les inférieures rétrécies à leur base; les supérieures connées, sessiles.

Les fleurs sont disposées en panicule étalée, située vers l'extrémité des tiges, dont les pédoncules sont dichotomes, filiformes, très-longs, droits; une fleur solitaire pédonculée, dans la bifurcation des rameaux de la panicule. Les calices

font droits, alongés, rétrécis à leur base, tendus en tête de clou vers leur sommet, de couleur purpurine, marqués de dix ftries alternativement blanches & purpures. La corolle est de couleur rougeâtre, petite, un peu plus longue que le calice ; les pétales ont leur limbe divisé en deux lobes ; les capsules ovales, pédonculées dans le calice.

Cette plante croît dans le Portugal. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. ○ (P. v.)

56. SILENÉ clandestin. *Silene clandestina*. Jacq.

Silene calicibus ovatis, decem angulatis, pubescentibus ; petalis bifidis, cretici ; calice parum longioribus ; foliis oblongo-lanceolatis, ciliatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 703. n°. 40.

Silene clandestina. Jacq. Collect. Suppl. 111. tab. 3. fig. 3.

Cette espèce a de grands rapports avec le *silene apetala* & avec le *silene inaperta* ; elle diffère de tous deux par sa corolle plus longue que le calice, & du dernier par ses calices pubescens & ses feuilles ciliées.

Ses tiges sont droites, grêles, cylindriques, peu élevées, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, oblongues, lancéolées, vertes à leurs deux faces, ciliées à leurs bords ; les supérieures plus étroites, sessiles, connées à leur base, aiguës à leur sommet, plus étroites. Les fleurs sont situées en une panicule lâche, pauciflore, vers l'extrémité des tiges. Les pédoncules sont plus ou moins dichotomes. Le calice est droit, ovale, marqué de dix angles assez saillans, pubescens ; les pétales courts, cependant plus longs que le calice ; leur limbe divisé en deux lobes ; les capsules glabres, sessiles, ovales, un peu oblongues, s'ouvrant en cinq dents à leur sommet.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. ○

57. SILENÉ de Crète. *Silene cretica*. Linn.

Silene cretica, levis, calicibus cretici, decem angulatis ; petalis bifidis. Linn. Syst. veget. pag. 421. n°. 29. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. fig. 704. n°. 42.

Visago foliis inferioribus bellidis, superioribus ovatis ; calice striatissimo & turgidioribus. Dillen. Hort. Eltham. pag. 412. tab. 314. fig. 464. 405.

Lychnis viscaria, foliis inferioribus, bellidis similibus ; flore minimo, carneo, seu rubro. Magn. Hort. 126.

Il y a beaucoup de rapports entre cette espèce & le *silene inaperta* ; elle en diffère par sa corolle un peu plus grande, par ses panicules dont les rameaux sont bien moins ouverts, par ses feuilles

moins étroites, assez semblables à celles du *bellis*, surtout les inférieures.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, glabres, un peu rudes au toucher, cylindriques, divisées en rameaux à l'extrémité de ces tiges. Les feuilles sont opposées, les inférieures ovales, rétrécies en pétiole vers leur base, glabres à leurs deux faces, vertes, un peu rudes au toucher, obtuses à leur sommet, entières. Les supérieures sont plus étroites, linéaires, connées à leur base, sessiles, aiguës, longues d'environ deux pouces.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicule lâche, étalée, dichotome, dont les pédoncules sont filiformes, un peu visqueux, surtout à leurs articulations ; munis à leur base de bractées opposées, filuleuses. Le calice est droit, tubulé, glabre, un peu ovale, à cinq dents droites ; aigu, marqué de dix ftries saillantes. La corolle est d'une grandeur médiocre, d'une belle couleur pourpre, ouverte ; les pétales divisés en deux lobes à leur limbe. Les capsules sont ovales, un peu tendues, sessiles, à trois loges, contenant des semences fort petites, noirâtres, en forme de rein, finement tuberculées.

Cette plante croît dans l'île de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (P. v.)

58. SILENÉ attrape-mouche. *Silene muscipula*. Linn.

Silene petalis bifidis, enule dichotomis ; floribus axillaribus, sessilibus ; foliis glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 601. — Miller, Dict. n°. 1. — Pallas, Iter 2. pag. 110. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 704. n°. 43. — Desfont. Flot. atlant. vol. 1. pag. 353.

Silene floribus trifidis, foliis lanceolatis, sessilibus ; capsulis trilocularibus, floribus ternis. Sauvage. Monsp. 145.

Cucubalus dichotomus. Lam. Flot. franç. vol. 3. pag. 32. n°. 675.

Lychnis silvestris, viscosa, rubra, alterna. C. Bauh. Pin. 205. — Tournef. Inst. R. Herb. 337.

Lychnis silvestris, tercia. Clus. Hist. 1. pag. 289. Icon. — Tabern. Icon. 295. — Dalech. Hist. 818.

Muscipula viscaria, sive lychnidis species. J. Bauh. Hist. 3. pag. 349. Icon.

Viscaria, sive muscipula. Gerard, Hist. 601. Ic.

Ses tiges sont dures, blanchâtres, grêles, munies de quelques fibres. Ses tiges sont droites, hautes d'un à deux pieds, très-visqueuses, glabres, cylindriques, noueuses, striées, très-rameuses, garnies de feuilles opposées, très-glabres, lancéolées ; les inférieures élargies, obtuses à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base ; celles

du milieu féfiles, plus étroites, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités; les supérieures & terminales très-étroites, allongées, acuminées.

Les fleurs sont, les unes axillaires, presque sessiles; les autres, en plus grand nombre, disposées par bifurcation à l'extrémité des rameaux, garnies de bractées longues, subulées; la fleur du milieu de la bifurcation foliaire, presque sessile; les pédoncules courts, très-glutineux. Le calice est petit, allongé, tubulé, à cinq angles, terminé par cinq dents aiguës; la corolle petite, d'un rouge de rose; les pétales un peu plus longs que le calice; le limbe échancré à son sommet; les étamines & les pistils renfermés dans le tube de la corolle. Les capsules sont ovales, un peu coniques, légèrement pédonculées, aussi longues que le calice qui en prend la forme; il est un peu renfermé à sa base, & muni de cinq angles saillans. Les semences sont petites, roussâtres, ridées, en forme de rein.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, aux lieux secs & sablonneux; en Espagne, dans la Barbarie, aux environs d'Alger. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Cette espèce produit un suc visqueux, très-abondant, & tellement glutineux, que les mouches, les fourmis & autres petits insectes ne peuvent s'en dégager, & restent collés sur la plante lorsqu'ils s'y précipitent par imprudence.

59. SILÈNE fasciculé. *Silene polyphylla*, Linn.

Silene foliis fasciculatis, setaceis, ramorum florentium oppositis, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 601. — Royen, Lugd. Bat. pag. 447. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 705. n° 44.

Lychnis viscaria, plurimis foliolis simul junctis, C. Bauh. Pin. 205. — Tourn. Inst. R. Herb. 337.

Lychnis silvestris oßawa, Clus. Hist. 1. pag. 290.

Lychnis silvestris, foliis angustis & pluribus exangulatis singulis, Clus. t. in Hispan. 8. in Port. J. Bauh. Hist. 3. pag. 348. Icon. 349.

Lychnis silvestris, prima Classi, Lobel. Icon. 338. — Dalech. Hist. 1. pag. 817.

On distingue cette espèce à ses feuilles, qui sont presque disposées, par paquets fasciculés, à chaque articulation, & dont les tiges sont droites, hautes d'un à deux pieds, glabres, rudes, cylindriques, noueuses; les noeuds renflés & blanchâtres; très-rameuses; les rameaux presque filiformes; les feuilles opposées, sessiles, linéaires, très-longues, étroites; les inférieures rétrécies presque en pétiole à leur base, glabres à leurs deux faces, entières, presque obtuses; les supérieures plus étroites, aiguës. De l'aisselle de ces feuilles

il en sort plusieurs autres plus courtes, fines, presque setacées, aiguës.

Les fleurs sont nombreuses, petites, réunies presque en panicule ou en corymbe vers l'extrémité des tiges; les pédoncules dichotomes ou presque fasciculés, quelquefois un peu ombellés, simples ou médiocrement rameux, filiformes, droits, munis de petites bractées courtes, subulées, aiguës, opposées; les pédicelles fort courts. Le calice est glabre, ovale-oblong, à peine strié, verdâtre; la corolle un peu plus longue que le calice, de couleur rouge; les pétales bifides à leur limbe; les étamines & les pistils de la longueur du tube de la corolle. Les capsules sont petites, très-glabres, ovales-oblongues, à peine pédicellées, de la longueur du calice, s'ouvrant à leur sommet en cinq dents aiguës.

Cette plante croît dans l'Allemagne, l'Autriche & en Bohême. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

60. SILÈNE à feuilles de joubarbe. *Silene sedoides*, Poir.

Silene viscosa, humillima; caule dichotomo; floribus solitariis, pedunculatis, Poir., Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 164.

Silene pubescens, viscosa; caule procumbente, ramoso; foliis crassifolius, imis subspathulatis; petalis emarginatis, Desfont. Flor. atlant. vol. 2. adden. pag. 449.

Silene sedoides, Jacq. Collect. Suppl. 112. tab. 14. fig. 1.

Silene (sedoides), glanduloso-pilosa; calicibus clavatis; petalis emarginatis; foliis oblongo-ovatis, subcarnosis, Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 703. n° 36.

Silene (succulenta), floribus axillaribus, solitariis, pedunculatis; petalis bifidis; foliis carnosiss, ovalibus, villosis, sessilibus, subviscidis, confertis, patentissimis, Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 89. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 714. n° 6.

Lychnis omnium minima, à monte argentario, Boccon. Sic. pag. 24. tab. 12. fig. 4.

Lychnis cretica, maritima; minima, portulacæ silvestris folio, Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. 24.

C'est une fort petite plante, qui a presque le port d'une joubarbe, dont les tiges sont grêles, cylindriques, en partie couchées, noueuses, pubescentes & visqueuses, médiocrement rameuses, longues de quatre à six pouces, quelquefois plus; les rameaux alternes, chargés de poils courts, glanduleux. Les feuilles sont grasses, épaisses, fort petites; les radicales disposées en une petite rosette, pétiolées, ainsi que les inférieures; spatulées, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base;

les supérieures sessiles, opposées, linéaires, lan-
coles, pubescentes.

Les fleurs sont, les unes latérales, solitaires ;
d'autres terminales : ces dernières presque dichotomes, toutes pédonculées ; les pédoncules droits,
filiformes, de la longueur des fleurs, velus & glanduleux, uniflores. Les calices sont oblongs, cylindriques, un peu rétrécis vers leur base, visqueux, pubescents, terminés par cinq petites dents courtes & droites ; réfléchis à l'extrémité de leur pédoncule au moment de la maturité. La corolle est petite, couleur de rose ; les pétales ont leurs ongles de la longueur du calice, garnis à leur orifice d'un double appendice fort petit & blanchâtre. Le limbe est elliptique, échancré à son sommet. Les capsules sont cylindriques, un peu pédicellées, médiocrement rétrécies vers leur sommet, de la longueur du calice, à une seule loge, renfermant des semences fort petites, ridées, réunies, attachées à un réceptacle central, libre, grêle, rameux.

Cette plante croît sur les rochers, le long des bords de la mer, sur les côtes de Barbarie, aux environs de Lacalle, où je l'ai recueillie. On la trouve aussi dans le Levant, à l'île de Crète, en Sicile. (V. v.)

61. SILÈNE à feuilles de chlora. *Silene chlora-folia*. Smith.

Silene calicibus glabris, clavatis ; petalis semibifidis ; foliis glaucis ; inferioribus ovalibus, summis cordatis, amplexicaulis. Smith, Icon. incdit. vol. 1. pag. 13. tab. 13. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 707. n°. 50.

Lychnis orientalis, viscosa ; centaurei laei folio ; flore longissimo. Tournef. Coroll. 24.

Silene Smithii. Gmel. Syll. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. 12. & *Silene chlora-folia*, idem, n°. 51.

Ses tiges s'élèvent plusieurs ensemble des mêmes racines ; elles sont droites, hautes d'environ un pied, glabres, cylindriques, rameuses, dichotomes à l'extrémité des rameaux, garnies de feuilles opposées, glauques, un peu charnues, glabres à leurs deux faces, un peu rudes à leurs bords, mucronées à leur sommet ; les inférieures ovales, rétrécies à leur base en pétiole ; les supérieures connées, amplexicaules, en forme de cœur, plus larges & plus courtes.

Les fleurs sont droites ; les unes axillaires, latérales, solitaires ; les autres terminales, dichotomes, soutenues par des pédoncules très-longs, visqueux, uniflores, garnis de deux petites bractées courtes, lancéolées, aiguës. Le calice est en forme de clou, très-glabre, long, à dix stries, un peu courbé, à cinq dents aiguës, membranées à leurs bords ; la corolle assez grande ; les ongles

plus longs que le calice ; le limbe en cœur, divisé en deux lobes obtus ; l'appendice à deux divisions droites ; les éamines inégales ; cinq de la longueur de la corolle ; cinq autres plus courtes ; l'ovaire en cône renversé ; les styles plus longs que les éamines ; les stigmates roulés & pubescents. La capsule est droite, luisante, à trois lobes, s'ouvrant irrégulièrement à son sommet.

Cette plante a été observée, dans le Levant, par Tournefort. (Descript. ex Smith.)

62. SILÈNE incarnat. *Silene rubella*. Linn.

Silene erecta, levis ; calicibus subglobosis, glabris, venosis ; corollis inapertis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 600. — Hort. Upf. 112. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 355. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 703. n°. 38.

Lychnis silvestris, flosculo rubro, vix conspicuo. Griseb. Virid. — Schaw. Specim. n°. 403.

Viscago lusitana ; flore rubello, vix conspicuo. Dillen. Hort. Elham. pag. 423. tab. 314. fig. 406.

Ses racines produisent plusieurs tiges droites, un peu courbées vers leur base, glabres, rameuses, longues d'un pied & plus, articulées & feuillées à leur partie inférieure, nues & sans articulations à leur partie supérieure. Les feuilles radicales sont oblongues, un peu arrondies ; celles des tiges opposées, conniventes à leur base, lancéolées, plus étroites, entières, vertes, glabres à leurs deux faces, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont droites, terminales ; les pédoncules dichotomes, visqueux, cylindriques, soutenant plusieurs fleurs opposées, pédonculées ; le pédoncule du milieu ordinairement uniflore. Les calices sont glabres, globuleux, ventrus, striés, veinés, marqués de lignes verdâtres, élargies ; terminés par cinq dents courtes, aiguës. La corolle est fort petite, rougeâtre, consilamment fermée, composée de cinq pétales bifides à leur limbe ; les capsules presque globuleuses.

Cette plante croît dans le Portugal.

63. SILÈNE à fleurs nombreuses. *Silene multiflora*. Pers.

Silene petalis bifidis, caule simplicissimo ; corymbis multifloris, oppositis ; calicibus clavatis, striatis ; foliis scabris, coulis linearibus, radicalibus spatulatis. — Willden. Perfoon. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 497. n°. 13.

Cucubalus multiflorus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 687. n°. 7. — Idem, Plant. rar. Hungar. pag. 55. tab. 56.

Cucubalus (multiflorus), foliis scabris, radicalibus subspathulatis ; panicula elongata, contracta, striata ; floribus hermaphroditis ; calice clavato, decor-

sium pubescente; pedunculo longiore, petalis bifidis, capsula longiusculis thespis. Ehrh. Beytr. 7. p. 142.

On peut assez indifféremment ranger cette espèce parmi les *cucubulus* ou les *silene*, l'orifice étant tantôt muni, tantôt privé d'écailles disposées en couronne. On la reconnoît à ses tiges droites, très-simples, terminées par une ample panicule droite, allongée, de fleurs verricillées, composées de la réunion de plusieurs corymbes particuliers. Ces fleurs, très-nombreuses dans la plante cultivée, le sont bien moins dans les individus nés sans culture. Les feuilles sont opposées, rudes au toucher; les radicales & les inférieures plus larges, presque en forme de spatule, rétrécies vers leur base en une sorte de pétiole; les caulinaires sessiles, linéaires, conniventes. Les calices sont oblongs, renflés en massue vers leur sommet, scarés, liriés. La corolle a son cr.ice garni d'écailles courtes, quelquefois nulles. Les pétales sont divisés en deux lobes à leur limbe. La capsule est globuleuse, longuement pédonculée; le pédoncule presque de la longueur du calice.

Cette plante se rencontre dans la Hongrie. ♂

*** Fleurs terminales.

64. SILÈNE à bouquets. *Silene armeria*. Linn.

Silene floribus fasciculatis, fastigiatis; foliis superioribus cordatis, glabris; petalis integris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 601. — Hort. Ups. 110. — Edes. Flor. dan. tab. 159. — Mill. Dict. n. 12. — Kniph. Centr. 8. n. 88. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 193. — Il. pag. 496. — Hoffm. Germ. 151. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 705. n. 45.

Cucubalus fasciculatus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 27. n. 675.

Vifago foliis glabris, ovato-lanceolatis; floribus umbellatis. Hall. Helv. n. 916.

Silene foliis lanceolato-ovatis, glabris; floribus terminalibus fasciculatis, fastigiatis. Hort. Cliff. 172. — Roy. Lugd. Bat. 446. — Sauvag. Monsp. 153.

Lychnis viscosa, purpurea, latifolia, levis. C. Bauh. Pin. pag. 205. — Tourn. Infl. R. Herb. 335.

Armeria flos quatuor. Dod. Pempt. 176. Icon.

Centaurium minus, adulterinum quibusdam, lychnidis viscosa genus. J. Bauh. Hist. 3. pag. 355.

Lychnis silvestris, prima. Cluf. Hist. 188.

Lychnis viscosa, alba, latifolia, levis. C. Bauh. Pin. 205. — Tourn. Infl. R. Herb. 336.

Muscipula flore albo. Eyster.

Ce silène est assez connu, étant cultivé comme plante d'ornement, remarquable par ses fleurs purpurines, rougeâtres, presque fasciculées, &

par ses feuilles larges, très-glabres, un peu glauques.

Ses tiges sont droites, glabres, un peu fistuleuses, cylindriques, jaunâtres, hautes d'un pied & plus, munies de quelques rameaux alternes, grêles, visqueuses particulièrement à leurs noeuds, garnies de feuilles sessiles, opposées, larges, ovales; les supérieures ovales, lancéolées, très-glabres, un peu glauques, entières à leurs bords, longues d'environ deux pouces sur un pouce de large, marquées de quelques nervures fines, dirigées vers le sommet des feuilles.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, qui se bifurquent à leur sommet. Les pédoncules sont également bifurqués à leur première division; les autres divisions sont moins régulières; ils offrent souvent une sorte d'ombelle, & les fleurs, rapprochées & nombreuses, paroissent fasciculées, en bouquets. Ces pédoncules sont visqueux, filiformes, inégaux, garnis de petites bractées lancéolées, aiguës. Le calice est allongé, tubulé, rétréci à sa base, en forme de clou à son sommet, lirié, glabre, souvent coloré. La corolle est rougeâtre, purpurine, blanche dans la variété *p.*, alt. z petite; les pétales muns de longs onglets qui dépassent le calice; leur limbe entier, ovale, un peu arrondi; un appendice en couronne à l'orifice du tube; les éramines & les pistils saillants hors du tube de la corolle; les capsules ovales, oblongues, pédonculées dans le calice qui les recouvre dans toute leur longueur.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France, dans la Suisse, l'Angleterre, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, & dans beaucoup d'autres, pour l'ornement des parterres. O (V. v.)

65. SILÈNE atocion. *Silene atocion*. Linn.

Silene calicibus frutigeris, clavatis; petalis semibifidis; fasciculo florum terminali, dichotomo; foliis obovatis. Linn. Syst. veget. pag. 421. — Jacquin, Hort. 3. pag. 19. tab. 32.

Silene (orchidea), floribus fasciculatis, fastigiatis; petalis quadrifidis; foliis ovatis, glabris. Linn. f. Suppl. pag. 241.

Silene (orchidea), petalis bifidis, laminis basi utrinque processibus subulato-acutis; foliis levibus, inferioribus subrotundo-spatulatis; petiolis ciliatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 98. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 704. n. 46.

Lychnis graca, bellidis folio verna; flore parva, diluè purpurascens. Tourn. Infl. R. Herb. Coroll. 24.

Cette espèce est remarquable principalement par les divisions de ses pétales, qui paroissent presque

quadrifides à cause des deux petites dents situées à la base du limbe.

Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses à leur partie inférieure, dichotomes & légèrement visqueuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, un peu charnues ou pulpeuses, glabres à leurs deux faces; les feuilles inférieures ovales, presque spatulées, rétrécies en pétiole à leur base, glanduleuses, ciliées à leur contour; les supérieures ovales, un peu alongées, sessiles, connées à leur base.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges, disposées en un corymbe fasciculé, dont les ramifications sont dichotomes, surtout les inférieures; visqueuses; leurs divisions uniflores ou supportant quelques fleurs pédicellées, munies à leur base du bractée opposées, aiguës. Le calice est droit, tubulé, un peu rétréci à sa base, renflé en forme de clou, surtout à l'époque de la maturité des semences. La corolle est petite, d'une belle couleur purpurine, souvent marquée d'une raie blanche, garnie à son orifice d'un appendice en forme de couronne; les pétales onguiculés; leur limbe ovale, divisé en deux lobes, découpé à leur base en deux dents opposées. La capsule est glabre, ovale, pédicellée dans le calice.

Cette plante croît dans le Levant; on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V.v.)

66. *SILÈNE faux atocion. Silene pseudo-atocion*. Desfont.

Silene foliis imis obovatis; floribus fasciculatis, terminalibus; calicibus clavatis; petalis linearibus, integerrimis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 353.

Cette espèce a les plus grands rapports avec le *silene atocion*, dont elle n'est peut-être qu'une variété, & de laquelle elle ne diffère essentiellement que par les pétales entiers.

Elle pousse ordinairement des mêmes racines plusieurs tiges fasciculées, droites, rameuses, velues, rarement glabres, hautes de huit à dix pouces, garnies de feuilles opposées; les inférieures en ovale renversé, rétrécies à leur base & décurrentes sur leur pétiole, ciliées à leur partie inférieure. Les feuilles caulinaires, tant celles du milieu que les supérieures, sont sessiles ou presque sessiles, ovales, ordinairement acuminées, glabres à leurs deux faces, très-entières.

Les fleurs sont fasciculées, situées à l'extrémité des tiges, soutenues par des pédoncules velus, filiformes; les unes solitaires, d'autres au nombre de deux ou trois sur le pédoncule commun. Leur calice est alongé, tubulé, grêle, pubescent, renflé à l'époque de la maturité, & puis son milieu jusqu'à son sommet, terminé par cinq dents aiguës. La corolle est d'une belle couleur de rose; les pé-

tales linéaires, très-entiers, obtus, munis d'onglets un peu plus longs que le calice, garnis à leur orifice d'un double appendice. La capsule est ovale, à trois loges, & s'ouvre à son sommet en cinq petites valves.

Cette espèce a été découverte sur le mont Atlas par M. Desfontaines. ☉

67. *SILÈNE étalé. Silene patula*. Desfont.

Silene viscosa; ramis paniculato-patentibus; foliis inferioribus longè petiolatis, ovatis, acuminatis; pedunculis subtrijugis; calice elongato; petalis semibifidis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 356.

Ses tiges sont droites, rameuses, pubescentes à leur partie inférieure, rameuses, hautes d'un à trois pieds; les rameaux opposés, paniculés, très-ouverts, visqueux, souvent dichotomes ou trifides à leur sommet; les feuilles sont pubescentes, revêtues d'un duvet court, opposées; les inférieures en ovale renversé, décurrentes sur un long pétiole; les feuilles caulinaires, tant les supérieures que celles du milieu, étroites, lancéolées, distantes.

Les fleurs sont terminales, paniculées; les unes solitaires sur chaque pédoncule, d'autres réunies au nombre de deux ou trois; celle d'entre les bifurcations, solitaire & unidirectionnellement pédicellée. Les bractées sont opposées, ovoïdes, aiguës. Le calice est tubulé, alongé, glabre ou un peu pubescent, rétréci à sa partie inférieure, renflé & ovale depuis son milieu jusqu'à son sommet à l'époque de la maturité des fruits, marqué de dix fentes, terminé par cinq dents droites, petites & ovales. La corolle est blanche, de la grandeur de celle du *lychnis dioica* Linn.; le limbe des pétales divisé en deux lobes jusque vers son nœud; les onglets un peu plus longs que le calice, garnis de deux dents à leur orifice; les étamines saillantes hors de la corolle; une capsule ovale, pédicellée dans le calice. Les fleurs ne s'ouvrent qu'au coucher du soleil; elles répandent une odeur très-agréable.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans la Barbarie; elle croît dans les champs. ☉

68. *SILÈNE de Catesbi. Silene Catesbii*. Willd.

Silene calicibus cylindraceis; petalis quadrifidis, acutis; panicula terminali; foliis lanceolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 706. n° 48.

Silene (Catesbii), floribus magnis, purpureo-rubris; petalis laciniatis; calicibus cylindricis; panicula subtrichotoma; foliis tenuibus, lato-lanceolatis. Walter. Flor. carol. pag. 14.

Lychnis viscosa, virginiana; flore amplo, coccineo, seu multifida regia. Pink. n. Phytogr. tab. 203. fig. 1. — Catesb. Carol. vol. 2. pag. 54. tab. 54.

Ses tiges sont droites, cylindriques, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, lanceolées, un peu élargies, lisses à leurs deux faces, entières, aiguës à leur sommet; les supérieures plus étroites, connées à leur base. Les fleurs forment une panicule terminale, souvent trichotome. Les calices sont cylindriques, rubulés, terminés par cinq petites dents. La corolle est grande, d'un rouge de pourpre; les pétales profondément bifides, & garnis, à la base de leur limbe, de deux fortes dents opposées, ce qui les fait paroître quadrifides; les pédoncules & les calices, ainsi que les tiges, médiocrement visqueux.

Cette plante se rencontre dans la Caroline. ✕

69. SILÉNÉ laciniée. *Silene laciniata*. Cavan.

Silene foliis lanceolatis, fissilibus; petalis quadrifidis; capsulis unilocularibus. Cavan. vol. 6. pag. 44. n°. 648. tab. 564.

Melastera vulgô. Née, Heth. cum Icone.

Ses tiges sont herbacées, cylindriques, légèrement velues, hautes de trois à quatre pieds, munies de rameaux opposés, dichotomes, renflés à leurs articulations, garnis de feuilles opposées, lanceolées, très-entières, un peu velues, sessiles, connées à leur base; longues de deux à trois pouces, sur cinq ou huit lignes de large; les supérieures insensiblement plus petites.

Les fleurs sont terminales & solitaires, pédonculées; les pédoncules droits, pubescens, simples, uniflores; les calices tubulés, ventrus, à dix stries, velus, longs d'un pouce, terminés par cinq dents. La corolle est belle; les pétales ont des onglets longs, étroits, d'un blanc-verdâtre, de la longueur du calice; le limbe ouvert, de couleur écarlate, profondément lacinié en quatre découpures linéaires, aiguës; les deux extérieures plus courtes; l'appendice est une couronne blanche, à dix découpures très-courtes, ovales, à peine longues d'une ligne, insérées deux par deux à l'orifice de la corolle; les filamens subulés, élargis à leur base; les anthères obliques, bleuâtres; l'ovaire cylindrique, surmonté de trois styles plus longs que les étamines; les stigmates globuleux. La capsule est cylindrique, de la longueur du calice, à une seule loge, s'ouvrant en cinq loges à son sommet; les semences sont nombreuses, brunes, comprimées, un peu en forme de rein, attachées à un réceptacle central & cylindrique.

Cette plante croît en Amérique, à Pachuca & à Acapulco, où elle fleurit au mois d'octobre. (Description. ex Cavan.)

70. SILÉNÉ d'Égypte. *Silene aegyptiaca*. Linn. f.

Silene petalis emarginatis, utrinque denticatis; foliis subtomentosis. Linn. f. Suppl. pag. 241. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 706. n°. 47.

Ses tiges sont herbacées, rameuses, hautes de trois à quatre pouces, légèrement tomentueuses, garnies de feuilles opposées, en ovale renversé, rétrécies à leur base, un peu charnues, lisses à leurs deux faces, ou un peu tomentueuses, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont terminales, très-peu nombreuses, quelquefois d'une à deux, droites, pédonculées.

Leur calice est en tête de clou, rétréci à sa base, légèrement pubescent, terminé à son sommet par des dents courtes, aiguës. La corolle est de couleur incarnate, plus courte que le calice; les pétales en cœur renversé, ou divisés à leur sommet en deux lobes obtus, garnis, à la base de leur limbe, de deux dents opposées, aiguës; l'orifice muni d'un appendice en forme d'une petite couronne obtuse, échancrée; dix étamines renfermées dans le tube; trois styles obliques; une capsule ovale, médiocrement pédonculée dans le calice.

Cette plante se rencontre dans l'Égypte.

71. SILÉNÉ à feuilles en cœur. *Silene cordifolia*. Allion.

Silene calicibus pubescentibus, angulatis, cylindraceis, petalis bifidis, floribus terminalibus, foliis subrotundis, acutis, nervosis, pilosis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 706. n°. 49.

Silene (cordifolia), caule simplici; foliis ovatis, acutis; floribus subsessilibus, terminalibus; petalis semibifidis. Allion. Flor. pedem. n°. 1581. tab. 23. fig. 3.

Ses racines sont composées d'un grand nombre de fibres réunies en gazon; elles produisent plusieurs tiges filiformes, hautes de trois ou quatre pouces, garnies de feuilles sessiles, opposées, un peu arrondies ou ovales, un peu acuminées, vertes, légèrement velues; les feuilles du milieu un peu plus grandes que les inférieures & les supérieures; ces dernières plus petites, plus acuminées: elles sont quelquefois réunies, presque au nombre de cinq vers le même point d'insertion.

Les fleurs sont terminales, presque solitaires ou au nombre de deux, médiocrement pédonculées; leur calice est tubulé, enflé, à dix angles, à cinq dents, d'un vert-pâle ou rougeâtre; la corolle d'un blanc livé de rouge, un peu jaunâtre en dehors; les pétales bifides & obtus à leur limbe, munis à leur orifice d'un appendice en couronne courte, à dix dents; les étamines renfermées dans le tube de la corolle; les anthères cendrées; le fruit a une capsule ovale, oblongue, s'ouvrant à son sommet en quatre valves droites, bidentées.

Cette plante est visqueuse sur toutes ses parties. Elle croît dans le comté de Nice. ✕

72. SILÉNÉ

72. **SILÈNE** à quatre dents. *Silene alpestris*. Linn. f.

Silene petalis quadridentata, caule dichotomo, capsulis ovario-oblongis, foliis linearibus lanceolatis, glabris, erectis; pedunculis viscidis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 98. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 707. n° 51.

Silene alpestris. Jacq. Flor. austr. vol. 1. p. 60. tab. 96.

Lychnis (alpestris), petalis quadrifidis, coronatis; foliis recurvis. Linn. f. Suppl. pag. 244.

Lychnis quadrifida. Scopoli. Carn. n° 519.

Lychnis viscosa, alba, angustifolia, major. C. Bauh. Pin. 205.

Lychnis filifolia, decima. Clus. Hist. 1. p. 291.

Cucubalus saxatilis. Var. a. Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 30. n° 675.

Caryophyllus minimus, humilis, alter, exotici; flore candido, amano. Lobel. Icon. pag. 445.

On distingue cette plante à ses pétales terminés à leur sommet par quatre dents, caractère qui jusqu'alors n'appartient qu'à elle seule.

Ses racines sont dures, fibreuses, un peu rampantes, d'où s'élèvent plusieurs tiges droites, cylindriques, très-lisses, noueuses, hautes de six à sept pouces, presque simples, garnies de feuilles opposées, sessiles, linéaires-lanceolées, redressées, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet; les inférieures un peu rétrécies en poire à leur base; les supérieures connées, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, un peu recourbées en dehors.

Les fleurs sont peu nombreuses, terminales, disposées en une sorte de panicule lâche, dichotome à sa base; les ramifications & les péduncules visqueux, munis à leur base de bractées opposées, lanceolées, aiguës. Les calices sont droits, rubulés, lisses, oblongs, terminés à leur orifice par cinq petites dents ourlées. La corolle est blanche, un peu plus longue que les calices; les pétales onguleux, divisés, à l'extrémité de leur limbe, en quatre dents inégales, aiguës. La capsule est ovale, nisse, plus longue que le calice qui persiste avec elle.

Cette plante croît sur les rochers, dans les départements méridionaux de la France, sur les montagnes alpines, dans l'Autriche. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

73. **SILÈNE** des rochers. *Silene rupestris*. Linn.

Silene floribus erectis, petalis emarginatis, calicibus terribus, foliis lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 602. — Flor. suec. 367. 390. — Iter, Botanique. Tome VII.

W. Goth. 144. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 129. — Hoffm. Germ. 151. — Jacq. Coll. 2. pag. 87. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 415. n° 8. — Gouan, Monsp. 217.

Silene floribus erectis, laxè diftansibus; caule dichotomo. Flor. hupp. 183.

Cucubalus saxatilis. Var. b. Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 30. n° 675.

Viscago foliis lanceolatis, caulibus brochatis, calicibus infundibuliformibus; floribus laxè umbellatis, erectis. Haller, Helv. n° 917.

Alpine alpina, glabra. C. Bauh. Pin. 251. — Idem, Prodr. 118. — Wèder. Flor. dan. tab. 4. — Rai, Hist. 1003. 1031.

Lychnis saxatilis, alpina, glabra, fumida. Tourn. Inst. R. Herb. 338.

Auricula muris, alpina, glabra, sive lychnis glabra, minima, aut caryophylli minima species, flore albo. J. Bauh. Hist. 3. pag. 360. Icon.

Myosotis foliis peragustis, flore calicem excedente. Seguier, Plant. Veton. vol. 3. pag. 184.

Caryophylli minima species, flore albo. Botan. Monsp. 94.

β. *Caryophyllus holosteus, alpinus, gramineus*. C. Bauh. Pin. 210. — Idem, Prodr. 104. — Burf. XI. 117.

Cette plante est petite. Ses tiges sont grêles, filiformes, quelquefois un peu rougeâtres, très-glabres, médiocrement rameuses, bifurquées à leur sommet, hautes de quatre à cinq pouces au plus, garnies de feuilles opposées, sessiles, petites, lanceolées, vertes, glabres à leurs deux faces, entières, acuminées à leur sommet, connées à leur base, plus courtes que les entre-nœuds; les inférieures un peu rétrécies à leur partie inférieure. Elles sont linéaires dans la variété β.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges, en une sorte de corymbe un peu ombellé, peu chargé de fleurs, dichotome à ses divisions inférieures; les péduncules presque capillaires, inégaux, munis à leur base de petites bractées opposées, étroites, lanceolées, aiguës. Les calices sont droits, glabres, tubulés, courts, cylindriques, striés, terminés par cinq dents droites, aiguës. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice; les pétales échancrés en deux lobes à leur limbe; les capsules petites, un peu ovales.

On trouve cette plante sur les rochers, dans les montagnes élevées de la Suède, de la Suisse, & dans les départements méridionaux de la France. Elle m'a été communiquée par M. de Foucault. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

74. SILÉNÉ saxifrage. *Silene saxifraga*. Linn.

Silene caulibus subsuavis, pedunculis longitudine caulis; foliis glabris, floribus hermaphroditis semineis, petalis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 602. — Jacq. Coll. & 2. pag. 34.

Silene saxifraga, caulibus unisporis, pedunculis longitudine caulis. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 421. — Gerard. Flor. gall. Prodr. pag. 415. n° 9. — Gouan, Monsp. pag. 217. n° 10.

Lychnis floribus trigynis, erectis; capsulis trilobularibus, foliis linearibus. Scop. Carn. 1. pag. 503. n° 6. — edit. 2. n° 520.

Cucubalus saxifragus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 29. n° 675.

Caryophyllus saxifragus. C. Bauh. Pin. 211.

Lychnis minor, saxifraga. Tourn. l. fl. R. Herb. 338. — Garid. Atx. 298. — Sieguier, Plant. Ver. pag. 431. tab. 6. fig. 1.

Saxifraga antiquorum quibusdam. J. Bauh. Hist. 3. pag. 338.

Saxifraga magna Matthioli & Italorum. Lobel. Icon. 428. & Oberv. 233. Icon.

Ses racines sont dures, presque ligneuses, divisées en plusieurs ramifications un peu tortueuses, d'où s'élèvent un assez grand nombre de tiges hautes de quatre ou six pouces, grêles, filiformes, articulées, parfaitement glabres, à peine rameuses, excepté à leur base, garnies de feuilles sessiles, opposées, linéaires, très-étroites, peu distantes, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, munies quelquefois dans leurs aisselles d'autres feuilles plus courtes, plus étroites.

Il n'existe ordinairement qu'une seule fleur terminale, portée sur un pédoncule nu, très-grêle, filiforme, à peu près de la longueur des tiges, simple & droit; rarement une seconde fleur latérale. Le calice est glabre, tubulé, droit, en forme de clou, terminé par cinq petites dents. La corolle est petite, blanche, un peu rougeâtre en dehors; les pétales bifides; les capsules ovales, oblongues, pédonculées dans le calice.

Cette plante croît dans les lieux pierreux & sur les rochers, dans les départements méridionaux de la France, en Italie, dans la Carniole. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

75. SILÉNÉ campanulé. *Silene campanula*. Pers.

Silene caule erecto, gracili, bis triflora; floribus subernatis, petalis nudis, calice infundibuliformi. Persoon, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 500. n° 83.

Cette espèce appartient par ses calices au *silene*; elle peut également se ranger parmi les *cucubalus*,

ses corolles ayant leur orifice dépouvé de couronne. Elle se rapproche du *silene saxifraga*.

Ses tiges sont droites, grêles, presque simples, filiformes, hautes de six à huit pouces, garnies de feuilles sessiles, opposées, linéaires. Les fleurs sont situées, à l'extrémité des tiges, au nombre de deux ou trois, un peu penchées sur leur pédoncule. Le calice est alongé, presque en forme d'entonnoir; les pétales bifides à leur sommet, nus à leur orifice.

Cette espèce croît dans le Piémont, sur les montagnes alpines.

76. SILÉNÉ du Valais. *Silene valesia*. Linn.

Silene caulibus subsuavis, decumbentibus; foliis lanceolatis, tomentosis, longiuscule callosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Mill. Dict. n° 9. — Allion. Flor. pedem. n° 1574. tab. 11. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 763. n° 54.

Vifago foliis ovato lance-latis, tomentosis; caulibus unisporis. H. L. Helv. n° 910.

Lychnis pumila, saxatilis, alba; fore carnea; folio molli, cressi, tomentoso. ANON. ACAD. vol. 1. pag. 158. — Boccon. Mus. pag. 65. tab. 54.

h. *Lychnis maritima, pinguis à corolla*. Boccon. Mus. tab. 34. (*Folia breviora, latiora*.) Tournef. Inst. R. Herb. 339.

C'est particulièrement d'après un échantillon recueilli dans l'île de Corse, que je vais donner la description de cette plante, remarquable par ses feuilles un peu charnues, velues; par ses fleurs solitaires; par ses calices très-étroits après la floraison.

Ses tiges sont basses, rampantes, un peu relevées à leur partie supérieure, grêles, très-glabres, articulées, un peu courbées à leurs articulations, médiocrement rameuses, longues de quatre à cinq pouces, garnies de feuilles opposées, sessiles, courtes, presque fasciculées; les fascicules distants; longues de deux à trois lignes, lancéolées, spatulées, un peu ovales, aiguës à leur sommet, grasses, velues & glutineuses; les supérieures souvent un peu plus longues.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des tiges, soutenues par un pédoncule simple, visqueux, filiforme, à peine de la longueur des calices; unisporis, munies à leur base de deux folioles linéaires, très-étroites. Les calices sont droits, tubulés, lâches, presque scarieux, verdâtres, souvent un peu colorés, jaunâtres ou roussâtres, à dix lignes élevées, terminées par cinq dents fort petites, obtuses. La corolle est d'une grandeur médiocre, d'un blanc jaunâtre ou couleur de chair; le limbe garni à sa base de deux dents ou oreillettes opposées, bifide à son

fourmet ; la capsule ovale, oblongue, enveloppée par le calice considérablement renflé : & scarieux.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, parmi les pierres, dans les Alpes, le Valais & dans l'île de Corse. (V. f.)

La plante du Valais me paroît, du moins d'après la culture, différer de celle de Corse par ses tiges plus redressées, par ses feuilles bien moins velues & moins visqueuses, par les pédoncules un peu plus longs, par les fleurs souvent au nombre de deux ou trois.

77. *SILÈNE rampant.* *Silene repens.* Persoon.

Silene radice longo, repente; caule simpliciter ascendente, calice villosa, foliis linearibus. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 500. n.º 84.

Ses racines sont longues, rampantes : il s'en élève des tiges simples, un peu creuses à leur partie inférieure, ascendantes, garnies de feuilles sessiles, opposées, linéaires. Ses fleurs sont presque solitaires à l'extrémité des tiges. Les calices sont velus ; la corolle se ferme après l'heure de midi, en roulant ses pétales en dedans.

Cette plante a été recueillie, par M. Patrin, dans la Sibérie, proche le lac Baikal.

78. *SILÈNE pumilio.* *Silene pumilio.* Jacq.

Silene caulis unifloris, subdiphyllis; petalis repandis, foliis linearibus-lanceolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 709. n.º 55. — Lam. Illustr. Gener. tab. 377. fig. 1.

Silene (pumilio), caulis unifloris, floribus maximis, calice subcylindrico, ventricoso-campanulato, hirsuto. Wulf. in Jacq. Collect. 2. pag. 126. tab. 10. — Jacq. Flor. austr. 5. Append. tab. 2.

Cucubalus (pumilio), caulis unifloris, flore brevioribus. Linn. Mantid. 71.

Lychnis pumilio. Scopol. Catn. edit. 2. n.º 513.

Betonica coronaria. J. Bauh. Hist. 3. pag. 337.

Caryophyllus filifloris, septimus. Clus. Hist. 1. pag. 185.

On distingue cette espèce à ses tiges courtes, à ses grandes fleurs dont les pétales sont frangés ; les calices renflés, scarieux.

Ses tiges sont fort courtes, presque couchées à leur partie inférieure, d'où s'élèvent plusieurs rameaux droits, glabres, très-courts, simples, munis de deux ou trois articulations, à la base desquelles sont situées des feuilles presque fasciculées ou en gazon, sessiles, très-étroites, linéaires, obtuses, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, supportées par un pédoncule plus

court que le calice, filiforme, un peu velu, muni à sa base de deux soies ou bractées lanceolées, légèrement ciliées, sessiles, opposées. Le calice est tubuleux, renflé, venru, un peu coriace, pubescent, strié, terminé par cinq dents courtes, aiguës. La corolle est grande ; les pétales entiers ; leurs onglets plus longs que le calice ; le limbe ovale, un peu arrondi, frangé à ses bords ou sinué ; les étamines saillantes, inégales ; les pistils filices, plus courts que les étamines.

Cette plante croît sur les montagnes alpines, en Italie, dans la Carniole, la Moravie, &c. &c.

79. *SILÈNE hérissée.* *Silene hirta.* Willd.

Silene patula bipartitis, obtusa; floribus foliatis, terminalibus; calicibus clavatis, decemfidiis, foliis lanceolatis, basi ciliatis. Willd. Hort. Berol. Fascicul. 2. pag. 13. Icon. 23.

Cette espèce, qui paroît avoir des rapports avec le *Silene acaulis*, en diffère par ses fleurs solitaires, terminales, non axillaires ; par ses tiges glabres, par ses calices point colorés à leur fourmet, & dont les découpures ne sont que légèrement ciliées.

Ses racines sont grêles, simples, perpendiculaires, garnies de quelques filaments fibreux ; ses tiges sont droites, ascendantes, presque glabres, hautes de huit à dix pouces, cylindriques, divisées en rameaux opposés, dressés, alongés, garnis de feuilles opposées ; les racines ovales, lanceolées, très-ouvertes, ciliées à leur partie inférieure ; les culminaires conniventes à leur base, lanceolées, glabres, rétrécies en patiole, & ciliées à leurs bords, vers leur base.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité de chaque rameau. Le pédoncule est simple, court, presque cilié ; le calice d'une seule pièce, en tête de clou, à dix stries, hérissée, à cinq dents ovales, légèrement ciliées à leurs bords. La corolle est d'une belle couleur rougeâtre, purpurine ; les pétales divisés en deux lobes obtus à leur fourmet ; leur onglet plus long que le calice ; l'orifice garni d'une couronne composée d'écaillés à deux lobes.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. On la cultive au Jardin des Plantes de Berlin, où elle fleurit en pleine terre en juin et juillet. (Description de Willd.)

80. *SILÈNE sans tige.* *Silene acaulis.* Linn.

Silene acaulis, depressa, petalis emarginatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Flor. lappon. 184. — Flor. suec. 368. 387. — Wulf. Flor. dan. tab. 21. — Hoffm. Germ. 151. — Allion. Flor. pedem. n.º 181. tab. 79. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 709. n.º 56.

Viscago foliis graminis; caule brevissimo, unifloro. Hall. Helv. n°. 979.

Cucubalus muscosus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 30. n°. 675.

Lychnis acaulis. Scopol. Carn. edit. 2. n°. 516.

Cucubalus acaulis. Gunn. Norv. n°. 117.

Lychnis alpina, pumila, folio gramineo. C. Bauh. Pin. 206. — Dillen. Hort. Ekham. pag. 206. tab. 167. fig. 106.

Mafcus alpinus, lychnioides flore. J. Bauh. Hist. 3. pag. 767.

Lychnis alpina pumila, folio gramineo, sive mafcus alpinus, lychnioides flore. Tourn. Inst. R. Herb. pag. 337.

Caryophyllus pumilus, alpinus, sepimus. Clus. Pann. pag. 329.

Lychnis oxymoides, muscosa, strilliere & latiore folio. Bartel. Icon. 379. 380.

Oxymoides muscosa, alpino. Pan. Ital. bald. 199.

1. *Silene (excapa), flore sessili, frutibus subrotundis.* Allion. Flor. p. dem. n°. 1584. tab. 79. fig. 2.

2. *Silene (norvegica), foliis linearibus, magis spatulis; caule sessuloso.* Pers. Synopl. pl. vol. 1. pag. 300.

Cette plante a l'aspect d'une petite mouffe, & ressemble beaucoup à un *trium* par la forme & la disposition de ses feuilles ramassées en un gazon dense, épais; elles sont courtes, linéaires, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, étroites, sessiles. Les tiges ont à peine un demi-pouce de long; elles sont filiformes, glabres, simples, cylindriques, munies à leur dernière articulation de deux feuilles opposées, fort petites, terminées par un pédoncule droit, foliétaire, filiforme, long de cinq à six lignes, supportant une seule fleur droite, dont le calice est ovale, glabre, divisé à son orifice en cinq dents presque obtuses. La corolle est rougeâtre, un peu plus longue que le calice; les pétales échancrés à leur limbe; les capsules ovales, obtuses, sessiles.

La plante a tous les caractères de la précédente, mais elle est plus petite: ses tiges sont presque nulles; les fleurs sessiles, enfoncées dans le gazon que forment les feuilles; les capsules plus courtes, plutôt arrondies qu'ovales.

La plante 2 est une autre variété, dont les tiges très-basses sont munies de deux folioles; les feuilles intérieures ou radicales linéaires, plus écartées. Elle se rencontre dans la Norvège.

Ces plantes croissent sur les montagnes alpines,

en Suisse, en Autriche, dans les Pyrénées & la Laponie. On les rencontre aussi dans les départements méridionaux de la France. La première est cultivée au Jardin des Plantes de Paris, 2 (V. f.)

* *Especies moins connues.*

* *Silene (villosa), petalis bifidis, oblongis, basi subgermine in tubum connatis.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 88. n°. 71.

Silene hirsuta, petalis bifidis, oblongis, basi connatis; foliis lanceolatis, sessilibus. Gmel. Syst. natur. vol. 1. pag. 714. n°. 4.

Ses tiges sont hautes d'un pied, diffuses; les ramifications opposées, cylindriques, velues; les feuilles sessiles, lancéolées, longues d'un travers de doigt; les pédoncules axillaires, solitaires, de la longueur du calice; celui-ci en forme de cloû, rétréci à sa base; la corolle violâtre, plus longue que le calice; les pétales divisés en deux découpures oblongues, obtuses; la capsule pédonculée, presque de la longueur de la moitié du calice. Cette plante croît en Egypte, & ressemble, par ses feuilles, au *bellis annua*.

* *Silene (cuneifolia), villosa, petalis integris, crenulatis; foliis cuneiformibus, basi crenulatis.* Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 714. n°. 5.

Silene (villosa), foliis cuneiformibus, basi ciliatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. Suppl. pag. 210. n°. 47.

Quelque Forskhal ait présenté la plante précédente sous la même dénomination, c'est par erreur sans doute, & celle-ci en est très-différente. Elle est velue dans toutes ses parties; ses feuilles sont en forme de coin, ciliées à leur base par quelques soies; les fleurs sont solitaires & violettes; les pétales entiers, un peu crénelés à leur contour; les fruits axillaires, unilatéraux, sessiles, enveloppés par le calice marqué de dix frises sailantes. On rencontre cette plante dans les environs de Constantinople.

* *Silene (involuta), foliis lanceolato-linearibus, sessilibus, ciliatis, subius tomentosis.* Forskhal. Flor. ægypt.-arab. Suppl. pag. 210. n°. 47.

Ses tiges sont un peu ligneuses, cylindriques, épaisses, velues; les feuilles sessiles, linéaires, lancéolées, ciliées à leurs bords, tomenteuses à leur face inférieure; les fleurs opposées, axillaires, pédonculées; les calices visqueux & anguleux; les pétales roulés sur eux-mêmes, d'un vert d'olive, bifides à leur sommet. Souvent ces fleurs sont réunies plusieurs ensemble dans les aisselles des fleurs, surtout vers l'extrémité des tiges. Cette plante croît aux Dardanelles, dans les campagnes,

* *Silene* (elongata), petalis emarginatis; calicibus suaeptiformibus; foliis linearibus; caule unifloro. Bellard. Observ. Botan.

* *Silene* (oppositifolia), procumbens; foliis oppositis; calicibus hirsutis; venafo-reticulatis, supra inaequalis, petalis bifidis. S. G. Gmel. Iter 3, pag. 306. tab. 32. fig. 2. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1, pag. 717. n°. 47.

SILICULE. (*Silicula*.) C'est le nom que porte la filique lorsque sa longueur est égale à sa largeur, ou ne la surpasse que de très peu. Les *lepidium*, les *myagrum*, les *draba*, les *alysium*, &c. n'ont que des silicules ou petites filiqués. (Voyez **SILIQUE**.)

SILIQUE. (*Silique*.) C'est une espèce de péricarpe à deux valves, ou composé de deux panneaux réunis par des sutures longitudinales. Les semences sont attachées à l'une & à l'autre de ces sutures, à l'aide d'un fillet qui fait l'office d'un cordon ombilical. C'est le fruit des plantes cruciformes, qui conserve le nom de *silique* proprement dite lorsque la longueur surpasse sensiblement, c'est-à-dire, une fois au moins sa largeur; autrement on l'appelle *silicule*. (Voyez ce mot.)

Tantôt on considère la figure de la filique, & alors on dit qu'elle est

Articulée (*articulata*), lorsqu'elle est rétrécie & renflée alternativement, comme celle du *raphanus*;

Comprimée (*compressa*), lorsqu'elle est aplatie, & que les bords sont minces & tranchans; telle est celle du *thlaspi*;

Tétragone (*tetragona*), lorsqu'elle a quatre angles & quatre faces opposées deux à deux, l'*erysimum*;

Arrondie (*subrotunda*), le *bunias*; lancéolée (*lanceolata*), l'*isatis*; lobée (*lobata*), le *biscutella*; orbiculée (*orbiculata*), le *elypsoides*; un peu en cœur (*obcordata*), le *lepidium*, &c.

Tantôt on considère la position de la cloison à l'égard des panneaux, & on dit de cette cloison qu'elle est

Parallèle (*dissepimentum parallelum*), lorsque ses deux côtes tranchans s'insèrent dans les sutures du panneau, comme dans les *lunaria*, *draba*, *alysium*, &c.

Transversale (*dissepimentum transversum*), lorsque ses deux côtes tranchans courent longitudinalement les panneaux par le milieu, comme dans les *thlaspi*, les *lepidium*, &c.

SILLONNÉE (Tige). (*Caulis sulcatus*.) On dit que les tiges sont sillonnées, lorsque les excavations longitudinales de leur superficie sont un

peu profondes, un peu élargies, & imitent des sillons.

SILPHIE. *Silphium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, radiales, de la famille des coymbifères, qui a des rapports avec les *helianthus* & les *zinnia*; il comprend des herbes exotiques à l'Europe, originaires de l'Amérique, dont les tiges sont très-élevées, les feuilles très-souvent opposées ou verticillées, rarement alternes; les fleurs solitaires, axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice imbriqué, scarieux, composé de larges écailles; des fleurs radiales; les fleurs mâles, les demi-fleurs femelles; des semences ovales, larges, comprimées, à deux cornes ou échancrées à leur sommet; un réceptacle garni de paillettes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont composées de fleurs mâles dans le centre, & de demi-fleurs femelles à la circonférence; elles offrent :

1°. Un calice commun, large, ovale, imbriqué, scarieux, composé d'écailles élargies, ovales-oblongues, souvent réfléchies en dehors, depuis leur milieu jusqu'à leur sommet, faillantes, persistantes.

2°. Une corolle radiale; les fleurs du centre mâles, infundibuliformes, le tube presque aussi élargi que le limbe; terminés par cinq dents aiguës; les demi-fleurs de la circonférence, femelles, terminés par une languette lancéolée, très-longue, divisée en cinq dents à son sommet.

3°. Cinq étamines syngénèses dans les fleurs mâles, dont les filamens sont capillaires, très-courts; les anthères cylindriques, tubuleuses.

4°. Des ovaires grêles, cylindriques dans les fleurs femelles, surmontés d'un style filiforme, simple, terminé par deux stigmates sétacés, de la longueur du style; celui-ci est simple & stérile dans les fleurs mâles.

Les semences sont solitaires, planes, presque membraneuses, assez grandes, comprimées, un peu en cœur, terminées par deux cornes.

Le réceptacle est garni de paillettes linéaires.

Observations. La plupart des espèces qui composent ce genre se rapprochent beaucoup des *helianthus* par la hauteur de leurs tiges, par leurs feuilles rudes, & même par la grandeur de leurs fleurs, quoiqu'elles généralement plus petites que celles des *helianthus*. Dans ces dernières, les demi-fleurs sont femelles & stériles, & n'ont qu'un ovaire fort petit, sans style ni stigmates, tandis que les fleurs du centre sont tous hermaphrodites &

fertiles. Les semences sont tétragones, anguleuses, & situées dans le centre des fleurs : c'est le contraire dans les *Silphium*. Celles du centre avortent : il n'y a de fertiles que les semences de la circonférence, & les demi-fleurons sont munis de piliers & de stigmates. Ce sont presque toutes plantes d'ornement.

ES P È C E S.

1. *STELPHIE* perfolié. *Silphium perfoliatum*. Linn.

Silphium foliis oppositis, deltoideis, petiolatis; caule tetragono. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1301. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2331. n°. 4. — Jungh. Plant. Icon. Centur. 1. n°. 33.

Silphium foliis radicalibus cordato-ovatis, inaequaliter dentatis; caulibus subintegerrimis. Gouan, Hort. Monpel. pag. 462.

Ses tiges sont droites, lisses, médiocrement tétragones, un peu fistuleuses, épaisses, fortement striées ou cannelées, d'un vert-jaunâtre, quelquefois un peu rougeâtres, hautes d'environ cinq à six pieds. Les feuilles sont opposées, ovales ou presque deltoïdes; les inférieures & radicales pétiolées, sinuées & dentées, rudes, échanquées en cœur, fermes, épaisses, finement réticulées, & d'un vert-olive en dessous; décurrentes sur les pétioles, & réunies à leur base; ces pétioles canaliculés en dessus, rudes, striés; les feuilles supérieures sessiles, grandes, presque lancéolées, acuminées, réunies & pétiolées, point sinuées & bien moins dentées; les dentelures dilantes, fort petites, aiguës.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, presque en corymbe à leur sommet : cette panicule se divise à sa base en une bifurcation, dans le milieu de laquelle se trouve une fleur solitaire, longuement pédonculée; chaque branche principale trichotome, terminée par une ou plusieurs fleurs inégalement pédonculées. Les pédoncules glabres, striés, un peu comprimés & anguleux, inclinés à leur partie supérieure. Le calice est glabre, composé d'écaillés larges, minces, imbriquées, inégales, ovales; les extérieures obtuses, les intérieures un peu plus longues, médiocrement rétrécies & presque obtuses. La corolle est jaune, composée à sa circonférence d'environ vingt-quatre demi-fleurons, dont le limbe est étroit, linéaire, de la longueur des calices, composé de styles bifides. Les fleurons du centre sont courts, à cinq dents, stériles; les styles simples, allongés; les semences planes, larges, ovales, membraneuses & presque ailées à leur contour, échanquées à leur sommet, & terminées par deux petites pointes; le réceptacle garni de paillettes à peine de la longueur des semences.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique sep-

tentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

2. *STELPHIE* à feuilles réunies. *Silphium connatum*. Linn.

Silphium foliis oppositis, sessilibus, perfoliatis; caule tereti, scabro. Linn. Mantill. pag. 574. — Syst. veget. pag. 789. n°. 4. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2332. n°. 5. — Jungh. Plant. Icon. Centur. 1. n°. 26.

Silphium (connatum), foliis sessilibus aut quasi petiolatis connatis, subovalibus; caule glabro. Mich. Flor. boreal. Amer. voi. 2. pag. 146.

Cette espèce a les plus grands rapproches avec la *Silphium perfoliatum*; elle n'en est même qu'une simple variété, selon Michaux. Cependant elle offre quelques caractères qui ont paru aux autres botanistes, suffisants pour l'en distinguer : celles sont des tiges rudes, cylindriques & non glabres, tétragones; les feuilles supérieures pétiolées, & nullement pétiolées; les demi-fleurons bien moins nombreux.

Les tiges sont hautes de quatre à cinq pieds, droites, très-simples, de la grosseur du pouce, un peu tétragones à leur partie inférieure, cylindriques & rudes à leur partie supérieure, chargées de poils courts & couchés. Les feuilles sont opposées, réunies à leur base & pétiolées, sessiles, concaves à la portion qui embrasse la tige, comme celles du *dissectus laciniatus*; rudes au toucher, longues de cinq à six lignes, dentées en scie à leur contour, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicule dichotome, dans la bifurcation de laquelle est une fleur solitaire, dont le pédoncule est de la longueur des entre-nœuds. Le calice est scarieux, composé d'écaillés ovales, imbriquées, lisses, un peu obtuses à leur sommet; leur partie supérieure plane & réfléchie en dehors. La corolle est de couleur jaune, rasée; les demi-fleurons de la circonférence femelles, fertiles, allongés, environ au nombre de douze, renfermant un style bifide, plus court que les corolles; les fleurons du centre nombreux, hermaphrodites, stériles, munis d'un style simple & faillant.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

3. *STELPHIE* à feuilles entières. *Silphium integrifolium*. Mich.

Silphium foliis oblongis, oppositis, sessilibus, integerrimis, scabris; caule tetragono, aspero. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2332. n°. 8.

Silphium (integrifolium), caule quadrangulato, aspero; foliis omnibus uniformibus, oppositis, sessi-

libus, erectis, oblongo-ovalibus, supra scaberrimis; floribus paucioribus, breviter pedunculatis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Cette espèce a des tiges droites, rudes au toucher, à quatre faces anguleuses, garnies de feuilles sessiles, opposées, toutes de même forme, redressées, ovales-oblongues, extrêmement rudes à leur face supérieure, très-entières à leurs bords. Les fleurs sont peu nombreuses, soutenues par des pédoncules courts.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, au pays des Illinois, où elle a été découverte par M. Michaux. \times (*Descript. ex Mich.*)

4. SILPHIE étoilée. *Silphium asteriscus*. Linn.

Silphium foliis oppositis alternisve, sessilibus, oblongis, hirsutis, inferioribus serratis; caule tereti, hispido. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2332. n° 6.

Silphium foliis oppositis, sessilibus, indivisis; inferioribus alternis. Linn. Soc. Plant. vol. 2. p. 1302. — Mill. Dict. n° 2. — Fabric. Helmst. pag. 141. — Lam. Illustr. Gener. tab. 707. fig. 1.

Silphium (asteriscus), caule pedunculisque hispida; foliis oppositis alternisve, sessilibus, ovali-lanceolatis, serratis vel crenatis, utrinque hirsutis; calicibus ciliatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Silphium foliis oppositis. Roy. Lugd. Bat. t. 81. — Gronov. Virg. t. 33.

Silphium. Hort. Cliff. 494.

Asteriscus corona foliis folio & facie. Dill. Hort. Eltham. pag. 42. tab. 37. fig. 41.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de quatre à cinq pieds, solides, épaisses, simples, marquées quelquefois de plusieurs taches purpurines, hérissées de poils courts & piquans, garnies de feuilles sessiles, ovales-oblongues, lancéolées; les unes sinuées ou crénelées à leur contour, d'autres légèrement dentées en scie, rudes, hispides & velues à leurs deux faces, un peu ciliées à leurs bords; les inférieures & celles du milieu alternes, sessiles; les supérieures opposées, acuminées à leur sommet, longues de deux à trois pouces sur un pouce de large.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges; les unes solitaires, alternes, sortant de l'aisselle des feuilles; les autres terminales. Les pédoncules sont très-longs, cylindriques, hérissés de poils courts & roides. Les calices sont très-ouverts, composés de plusieurs rangs d'échailles imbriquées, inégales, ovales-oblongues, presque obtuses, planes, ciliées à leurs bords, presque obtuses à leur sommet. La corolle est grande, radiale, de couleur jaune; les demi-fleurs ouverts en étoile, ordinairement au nombre de neuf, lancéolés, un peu

élargis, obtus; divisés à leur sommet en trois petites dents; tous femelles & fertiles.

Cette plante croît dans la Virginie & la Caroline. \times (*V. f.*)

5. SILPHIE à feuilles en cœur. *Silphium terebinthinaceum*. Linn.

Silphium foliis alternis, ovatis, serratis, scabris, radicalibus cordatis. Linn. f. Suppl. pag. 381. — Jacq. Hort. 1. pag. 162. tab. 45. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2331. n° 3. — Lam. Illustr. Gener. tab. 707. fig. 2. — Germ. de Fruct. & Sem. tab. 171.

Silphium foliis radicalibus amplis, cordatis; caulibus alternis, ovatis, supremis canaliculatis; caule levi, panicula laxa. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 145.

On distingue cette espèce à ses grandes feuilles alternes, entières, échancrées en cœur à leur base, dentées en scie à leur contour.

Ses tiges sont droites, très-élevées, fermes, cylindriques, glabres, striées, paniculées à leur sommet, garnies de feuilles pétiolées, alternes, très-amplies; les inférieures & radicales longuement pétiolées, fortement échancrées à leur base, ovales, rétrécies à leur sommet, obtus, très-rudes, chagrinées à leurs deux faces, épaisses, sinuées, dentées en scie à leur contour; les dentelures fines, inégales, aiguës, traversées par une forte côte saillante & par des nervures latérales, un peu jaunâtres, rameuses à leur sommet. Les pétioles sont plus longs que les feuilles, roides, presque cylindriques, fortement striés, un peu rougeâtres; les feuilles caulinaires moins pétiolées, ovales, elliptiques, obtuses & arrondies à leur sommet; les supérieures & dernières bien plus petites, sessiles, canaliculées, un peu lancéolées.

Les fleurs forment une sorte de corymbe terminal, rameux; elles sont supportées par des pédoncules grêles, cylindriques, lisses, striés, allongés, inégaux. Le calice est un peu globuleux, composé d'échailles membraneuses, imbriquées, très-glabres; les extérieures ovales, un peu arrondies, très-obtuses; les intérieures plus grandes, presque lancéolées, acuminées. La corolle est jaune, radiale; les demi-fleurs nombreux, linéaires, allongés, ouverts, obtus, presque entières à leur sommet, plus longs que les calices; les fleurons d'un jaune-pâle, courts, tubulés, terminés par cinq petites dents, séparés par de petites paillottes linéaires; les semences planes, ovales, échancrées à leur sommet, & terminées par deux petites cornes.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, au pays des Illinois. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. \times (*V. v.*)

6. SILPHIE laciniée. *Silphium laciniatum*. Linn.

Silphium foliis radicalibus caulinisque pinnatifidis; caule hirsuto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2330. n°. 1.

Silphium foliis alternis, pinnato-finuatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1301. — Linn. f. Fasc. 1. pag. 5. tab. 3.

Silphium foliis radicalibus caulinisque pinnatifidis; laciniis lanceolatis; caule superne hispido; calcebus magnis, hirsutis; foliis amplex, subcordatis, acuminatis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 145.

Ses tiges sont droites, cylindriques, très-simples, épaisses, cannelées, hautes de huit à dix pieds & plus, lisses à leur partie inférieure, de l'épaisseur du pouce, chargées à leur partie supérieure de tubercules de couleur brune, & hérissées de poils rudes, blanchâtres, étalés. Les feuilles sont alternes, pétiolées, de deux pieds de longueur, larges d'un pied, laciniées ou pinnatifides; les pinnules décurrentes, au nombre de quatre ou cinq de chaque côté, distantes, étroites, oblongues, sinuées & dentées à leurs bords, très-fermes, rudes à leurs deux faces, traversées par une côte saillante des deux côtés & les pétioles velus, amplexicaux; les feuilles supérieures presque sessiles, souvent de couleur purpurine à leur contour.

Les fleurs sont alternes, situées dans l'aisselle des feuilles à l'extrémité des tiges. Les calices sont amples, composés d'environ dix écailles imbriquées, grandes, presque en cœur, un peu concaves à leur partie inférieure, réfléchies à leur partie supérieure, très-rudes, hérissées de poils courts, acuminées, tubulées à leur sommet. La corolle est jaune, garnie à sa circonférence d'environ trente demi-fleurons au moins de la longueur du calice. Le style est grêle & biffé; les fleurons du centre nombreux, jaunâtres, séparés par autant de palettes linéaires; ils sont munis d'un style simple & stérile. Les semences de la circonférence sont ovales, membranées, échancrées à leur sommet, terminées par deux petites pointes; celles du centre sont oblongues, tétragones, stériles.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, au Mississippi, dans le pays des Illinois. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

7. SILPHIE composé. *Silphium compositum*. Linn.

Silphium foliis caulinis sinuato-pinnatifidis, radicalibus serratis, sinuato-multifidis, caule levi. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2331. n°. 2.

Silphium (laciniatum), *foliis alternis, remotis, petiolatis, pinnato-finuatis*. Walter. Carol. p. 217.

Silphium (compositum), *foliis radicalibus trifoliatis; foliolis petiolatis, inaequaliter sinuato-multifidis*.

filis; caule levi; floribus porvis, paniculatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 145.

Cette plante a des tiges droites, lisses, striées, élevées, garnies de feuilles alternes, distantes, pétiolées; les racines divisées en trois folioles pétiolées, sinuées, & à plusieurs divisions à leur contour; les feuilles caulinaires sinuées, pinnatifides, distantes. Les fleurs sont jaunes & terminales.

Cette plante croît dans les forêts maritimes de la Caroline & de la Floride. (Descript. ex Mich.)

8. SILPHIE arbrisseau. *Silphium arborescens*. Mill.

Silphium foliis lanceolatis, alternis, scabris, obsoletè serratis; caule fruticoso. Miller, Dict. n°. 4.

Corono folia americana, arborescens; flore parvo, lato; semine alato. Honl. Mill.

Miller range cette espèce parmi les *Silphium*, & malgré le peu de détails qu'il nous donne sur sa fructification, on peut presumer qu'elle y convient en effet d'après ses semences ailées.

Ses tiges sont droites, presque ligneuses, hautes de huit à dix pieds, rameuses, garnies de feuilles lancéolées, alternes, longues de quatre pouces, sur un pouce & demi de large, rétrécies à leur base, terminées en une pointe aiguë, rudes à leur face supérieure, médiocrement dentées en scie à leur contour.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges; les unes solitaires & axillaires, les autres réunies au nombre de deux ou trois, supportées sur des pedoncules grêles & inégaux. Les calices sont courts, composés d'écailles imbriquées. La corolle est d'un jaune foncé, radiale, de médiocre grandeur; les demi-fleurons courts; les fleurons très-reunies à leur tube; les semences environnées d'une membrane mince en forme d'aile.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Espagne, à la Vera-Cruz. (Descript. ex Miller.)

9. SILPHIE à feuilles scabres. *Silphium scabrum*. Walter.

Silphium foliis alternis, lato-lanceolatis, serratis, scabris, ciliatis, subsessilibus; pedunculis levibus. Walter. Flor. carol. pag. 216.

Ses tiges sont glabres, hautes de deux pieds, presque point ramues, garnies de feuilles alternes, à peine pétiolées, lancéolées, claires, dentées en scie à leur contour, très-rudes à leurs deux faces, plus pâles en dessous, fermes, ciliées à leurs bords. Les pétioles sont très-courts. Les fleurs sont jaunes, grandes, solitaires, axillaires & terminales, soutenues par des pedoncules lisses, simples.

Cette

Cette plante croît dans la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀

10. SILPHIE à tige basse. *Silphium pumilum*. Michaux.

Silphium foliis ovalibus, obtusis, leviter dentatis, subtomentosis; caule tenuiter tomentoso. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 2332. n° 7.

Silphium (pumilum), caule pumilo, tenuiter tomentoso; foliis ovalibus, obtusis, leviter dentatis, f. tomentosis. Mich. Flot. boreal. Amer. vol. 2. pag. 146.

C'est une espèce très-remarquable parmi celles de ce genre, à cause de ses tiges basses, légèrement tomenteuses, garnies de feuilles opposées, ovales presque tomenteuses, légèrement denticulées à leurs bords, obtuses à leur sommet.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, où elle a été observée par M. Michaux, qui l'a recueillie dans la Floride. ♀ (Descript. ex Mich.)

11. SILPHIE à feuilles ternées. *Silphium trifoliatum*. Linn.

Silphium caulibus sexangulis; foliis ternis, ovatis, dentatis; panicula trichotoma. Retz. in Litt.—Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2333. n° 9.

Silphium foliis ternis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1302.—Roen, Lugd. Bat. 181.—Gronov. Virgin. 133.—Millet, Dict. n° 1.

Silphium (ternifolium), foliis ternis-verticillatis, lanceolatis; caule levit., panicula multiflora. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 146.

Chrysanthemum virginianum, foliis oppositis, tribus seu quaternis ad geniculat. fissis. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 24. §. 6. tab. 3. fig. 68.—Rai, Suppl. 211.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles ternées & disposées par verticilles, & par les panicules trichotomes, à fleurs assez nombreuses.

Ses tiges sont droites, lisses, cannelées, ordinairement à six angles, divisées à leur extrémité en quelques rameaux paniculés, hautes de quatre à cinq pieds & plus. Les feuilles sont réunies, trois par trois, en forme de verticille à chaque nœud; les inférieures pétiolées, embrassant les tiges par leur pétiole; les supérieures sessiles ou presque sessiles, rudées à leurs deux faces, épaisses, inégalement dentées en scie à leurs bords. Les feuilles du milieu sont ovales, lancéolées, tandis que les inférieures & les supérieures sont plus étroites, allongées, lancéolées, longues d'environ trois à quatre pouces.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicule trichotome, étalée; sup.

Botanique. Tome VII.

portées par de longs pédoncules striés, glabres, munis à leur base de bractées lanceolées, aiguës. Les calices sont glabres, imbriqués presque sur trois rangs, d'écaillés larges, ovales; les extérieures plus courtes, réfléchies en dehors; les intérieures un peu lancéolées. La corolle est jaune rosée; les demi-fleurs étroites, au moins aussi longs que les calices, linéaires, divisés en trois dents à leur sommet; les fleurons du centre très-nombreux, courts, tubulés, à cinq petites dents; les étamines saillantes hors du tube; les piliers plus longs que les étamines.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, sur les montagnes de la Caroline & de la Virginie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

12. SILPHIE à trois feuilles. *Silphium ternatum*. Retzius.

Silphium caulibus teretibus, foliis ternis, subdenticulatis; panicula dichotoma. Retz. in Litt.—Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2333. n° 3.

Cette espèce, très-voisine du *Silphium trifoliatum*, en diffère par plusieurs caractères qui lui sont particuliers, par la disposition de ses feuilles, par les écaillés du calice, ciliées & disposées par quatre rangs; par les demi-fleurs plus larges.

Les tiges sont cylindriques & non anguleuses, droites, lisses, hautes de quatre pieds; les feuilles inférieures & supérieures éparfes; celles du milieu des tiges rangées trois par trois en verticilles; celles des rameaux de la panicule deux par deux, & sessiles; les feuilles caulinaires pétiolées: toutes sont lancéolées, un peu rudées, lâchement denticulées, rétrécies à leur sommet, ciliées à leurs bords, particulièrement vers la base.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicule dichotome; les calices imbriqués, composés de folioles ciliées à leur contour, placées par quatre rangs; la corolle jaune, radiale; les demi-fleurs de la circonférence assez larges; les fleurons du centre très-courts.

Cette plante croît naturellement dans l'Amérique septentrionale. ♀ (Descript. ex Retz.)

13. SILPHIE à tiges pourpres. *Silphium atropurpureum*. Retzius.

Silphium caulibus teretibus, foliis subquaternis, denticulatis; panicula dichotoma. Retz. in Litt.—Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2334. n° 11.

Ses tiges sont lisses, droites, striées, cylindriques, très-feuillées, ordinairement d'un pourpre foncé ou noirâtre, hautes de trois à quatre pieds; les feuilles inférieures pétiolées, alternes; celles qui suivent, ternées; les supérieures quaternées, presque verticillées, presque sessiles, épaisses, lan-

EB

céolées, oblongues, rudes à leurs deux faces, un peu rétrécies & légèrement amplexicaules à leur base, aiguës, acuminées à leur sommet, un peu ciliées & dentées en scie à leur contour; les dentelures distantes, fort courtes, presque tuberculées à leur face supérieure, finement réticulées en dessous, longues de trois à quatre pouces; la côte du milieu souvent purpurine.

Les riges se bifurquent à leur sommet; chaque branche supporte une panicule dont les ramifications sont inégales, ouvertes, munies à leur base de deux folioles opposées, sessiles, très-aiguës, & aux sous-divisions, de bractées solitaires, étroites, lancéolées, ciliées; les pédoncules propres courts, uniflores, grêles, cylindriques, très-glabres; les calices glabres, composés, presque sur trois rangs, de folioles élargies, entières, ovales-lancéolées, un peu obtusés; les extérieures recourbées en dehors. La corolle est jaune; les demi-fleurons allongés, linéaires, très-étroits; les fleurons du centre courts, à cinq dents.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. Je l'ai recueillie vivante dans le jardin de M. Latournerie, auprès de Soissons. (V. v.)

SIMABE. *Simaba*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des térbenthacées, qui a des rapports avec les *spondias* & les *aylantus*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ternées ou ailées avec une impaire; les fleurs axillaires, quelquefois disposées en corymbe; une écaille à la base des pédoncules propres.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre ou cinq divisions; quatre ou cinq pétales; dix étamines; les filamens élargis & velus à leur base; un style; quatre ou cinq capsules coriaces, insérées sur un réceptacle charnu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à quatre ou cinq découpures aiguës, assez profondes.

2°. Une corolle à quatre ou cinq pétales ovales, attachés autour d'un disque verdâtre.

3°. Huit ou dix étamines dont les filamens sont insérés sur le disque, élargis à leur partie inférieure, velus à leur base, subulés, terminés par des anthères ovales, pendantes, à deux loges.

4°. Quatre ou cinq ovaires réunis, convexes en dehors, surmontés d'un seul style. Jongé, à quatre ou cinq flures, terminée par un stigmate divisé en quatre ou cinq rayons.

Le fruit consiste en quatre ou cinq capsules

ovoides ou ovales, coriaces, séparées les unes des autres, réunies seulement à leur base, à une seule loge, insérées sur un disque charnu, contenant chacune une semence foliaire.

ES P È C E.

SIMABE de Guinée. *Simaba guianensis*. Aubl.

Simaba foliis ternatis, semipari-pinnatis; floribus axillaribus, subcorymbofis. (N.)

Simaba guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 400. tab. 153. — Juss. Gener. Plant. pag. 373.

Swingera amara. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 569. — Schreb. Gener. Plant. n°. 1752.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de sept à huit pieds, dont les riges sont droites, cylindriques, revêtues d'une écorce ridée, divisées un peu au dessus de leur base en rameaux étalés, garnis de feuilles pétioles, alternes, ternées ou ailées avec une impaire, composées alors de quatre ou six folioles opposées, fermes, lisses, vertes, ovales-oblongues, entières à leur contour, acuminées à leur sommet, longues d'environ trois pouces & demi sur un pouce & plus de largeur; la foliole impaire un peu pédonculée.

Les fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles, réunies au nombre de cinq à six en petit corymbe; les pédoncules courts, inégaux, munis à leur base d'une petite bractée en forme d'écaille. Le calice est d'une couleur verte, glabre, à quatre ou cinq découpures profondes, aiguës. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice, à quatre ou cinq pétales ovales, étroits, obtus. Le fruit est composé de quatre ou cinq capsules jaunâtres, ovoides, revêtues d'une écorce mince, coriace, verte, & d'une saveur amère.

Cet arbrisseau croît dans la Guinée; on le rencontre dans les forêts d'Orapa, sur les terrains découverts. Il fleurit & fructifie dans le mois de juin. (Descript. ex Aubl.)

SIMBULET d'Arabie. *Simbuleta arabica*. Forsk.

Simbuleta foliis alternis, linearibus, sparsis; floribus terminalibus, racemosis. (N.)

Simbuleta. Forsk. Flor. aegypt.-arab. pag. 115. n°. 54. — Juss. Gener. Plant. pag. 418.

C'est une plante herbacée, découverte & décrite par Forskhal, qui forme un genre particulier, dont la famille & les rapports ne sont pas encore parfaitement bien déterminés, qui a une très-grande affinité avec les pédiculaires, & qui paroît rapprochée des véroniques ou des pérépères; elle ressemble, par son port, aux *polygala*, & par le caractère de ses fleurs, aux *columnna*.

Ses tiges sont herbacées, annuelles, hautes

d'environ un pied, simples, grêles, droites, cylindriques, anguleuses, garnies de feuilles épaves, alternes, rapprochées, linéaires, presque filiformes; les supérieures très-simples, longues d'environ un demi-pouce; les inférieures partagées en deux, glabres, acuminées, longues d'un pouce. Les filus sont blanches, & forment une grappe terminale, longue de quatre pouces, garnie de fleurs solitaires, penchées, médiocrement pédonculées, munies à la base de chaque pédoncule d'une bractée linéaire, semblable aux feuilles.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, persistant, à cinq découpures linéaires, égales.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, campanulée, divisée à son orifice en deux lèvres; la supérieure bise & réfléchie; l'inférieure droite, plus longue, divisée en trois lobes; celui du milieu un peu recourbé.

3°. Quatre étamines didynames, dont les filaments sont insérés sur la corolle, deux plus longs, terminés par des anthères noirâtres, réunies, & formant un seul corps un peu comprimé, quadrangulaire.

4°. Un ovaire ovale, supérieur, surmonté d'un seul style filiforme, terminé par un stigmate en forme de tête, ovale ou globuleux, oblique.

Le fruit n'a pas encore été observé.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice campanulé, à cinq divisions; une corolle campanulée, à deux lèvres; quatre étamines didynames; les anthères réunies; un style; un stigmate capité.

Cette plante croît dans l'Arabie, sur la montagne de Kurma. (Description, ex Forsk.)

SIMIRE. *Simira*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des rubiacées, qui a de très-grands rapports avec les *Physothria*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont fort petites, disposées en un corymbe terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice très-petit, à cinq dents; une corolle petite, tubulée, à cinq lobes, cinq étamines insérées à l'orifice du tube; une baie petite, à deux loges, à deux semences, couronnée par le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice tarbiné, d'une seule pièce, à cinq dents.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, attachée sur l'ovaire autour d'un disque; son tube allongé; son limbe divisé en cinq lobes artondis.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont insérés sur le tube de la corolle, terminé par des anthères à deux loges.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un long style, quelquefois bifide à son sommet, terminé par deux stigmates obtus.

Le fruit est une baie ovale, petite, à deux loges, couronnée par les dents du calice, à deux loges, à deux semences.

Observations. Le port des espèces dont ce genre est composé, & qui forment tous, ou des arbres, ou des grands arbrisseaux, quelques légères différences dans les parties de la fructification, m'avoient fait adopter l'opinion de plusieurs botanistes, qui le regardent comme un genre distinct des *Physothria*; un examen plus attentif m'a ramené à l'opinion de ceux qui de ces deux genres n'en font qu'un seul, & je ne présente ici les *Simira* séparés des *Physothria*, que parce que je n'en ai point parlé en traitant ce dernier genre.

E S P È C E S.

1. **SIMIRE des teinturiers.** *Simira tinctoria*. Aubl.

Simira foliis elliptico-ovatis, acuminatis, parallelis-venosis; paniculis erectis; baseis ovalibus; stipulis ovatis, caespitatis, deciduis. (N.)

Simira tinctoria. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 170. tab. 65.

Physothria parviflora. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 962. n°. 5.

C'est un arbre dont le tronc s'élève à la hauteur de dix à douze pieds sur environ dix pouces de diamètre, dont l'écorce est épaisse, roussâtre en dehors, rouge intérieurement. Le bois est blanchâtre. Il se divise à son sommet en plusieurs branches, les unes droites, d'autres inclinées, étendues en tout sens. Les rameaux sont opposés, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, molles, ovales, elliptiques, entières, vertes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, acuminées à leur sommet, longues d'environ quatre pouces, sur six de large; marquées, à leur face inférieure, de nervures rougeâtres & sailantes, munies à la base des pétioles de deux stipules opposées, très-caduques, ovales, aiguës.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une panicule ample, rousse, dont les ramifications sont opposées; les pédoncules courts,

inégaux; le calice est court, d'une seule pièce, terminé par cinq petites dents. La corolle est blanche, monopétale, infundibuliforme; le tube au moins une fois plus long que le calice; le limbe à cinq découpures un peu arrondies; les étamines plus longues que le tube; le pistil plus long que les étamines. Le fruit est une petite baie à deux loges, à deux semences, couronnée par les dents du calice.

Cet arbre croît dans les grandes forêts d'Orapu, & surtout dans les lieux humides, à la Guiane. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

L'écorce de cet arbre, trempée dans l'eau, lui communique bientôt une couleur d'un très-beau rouge; ce qui fait présumer qu'elle pourroit être employée utilement dans la teinture. Les essais qu'on en a faits à Cayenne, donnent lieu de croire qu'elle seroit très-avantageuse pour teindre en rouge-vif la soie & le coton.

2. SIMIRE luisante. *Simiro nitida*.

Simiro foliis subrotundo-ovatis, acuminatis; panicula terminali, corolla limbo tubo longiore; stipulis subrotundis, deciduis. (N.)

Mapouria guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 175. tab. 167.

Phycothria nitida. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 963. n°. 9.

Cet arbrisseau pousse des mêmes racines plusieurs tiges molles, cassantes, rameuses, hautes de sept à huit pieds, revêtues d'une écorce verdâtre, & dont les rameaux sont garnis de feuilles opposées, pétioles, larges, ovales, un peu arrondies, tendres, vertes, luisantes, entières à leurs bords, un peu aiguës à leur base, acuminées à leur sommet, longues d'environ huit pouces, sur quatre ou cinq de large, marquées de nervures faillantes, latérales, parallèles, un peu confuées à leur sommet; les pétioles sont longs d'environ un pouce, à demi-cylindriques, planes en dessus, garnis à leur base de deux stipules ovales, opposées, très-caducues.

Les fleurs sont disposées en une ample panicule terminale, dont les ramifications sont opposées, munies chacune à leur inflexion d'une petite bractée caduque. Le calice est d'une seule pièce, évasé, divisé en cinq dents qui se terminent par une petite pointe noire. La corolle est blanche, monopétale, en forme d'entonnoir; son tube est court; son limbe divisé en cinq découpures obtuses; les étamines insérées sur le tube, & de la longueur de la corolle; le style terminé par un stigmate divisé en deux lames.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane, sur les bords de la rivière de Sinemari; il fleurit dans le mois de septembre. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

Les Galibis ont donné à cet arbrisseau le nom de *mappouri-crohi*, à cause que les mappouris ou vaches sauvages se nourrissent volontiers de ses feuilles & de ses rameaux.

3. SIMIRE palicourier. *Simiro palicourea*.

Simiro foliis lato-ovatis, utrinque acuminatis; panicula erecta; corolla cylindracea, ventricosa, subcurvis, extus farinosa; stipulis bilobis.

Palicourea guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 173. tab. 66.

Phycothria palicourea. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 433. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 971. n°. 37.

Stephanium. Schreb. Gener. Plant. n°. 308.

Arbrisseau dont le tronc s'élève à la hauteur de sept à huit pieds, revêtu d'une écorce lisse & verdâtre, & dont le bois est blanc, dur, cassant. Les branches sont opposées, & forment, avec les rameaux, une tête pyramidale. Les feuilles sont pétioles, opposées, assez larges, ovales, fermes, lisses à leurs deux faces, entières à leurs bords, aiguës à leur base, acuminées à leur sommet, longues d'un pied & plus, larges de cinq à six pouces, traversées dans leur milieu par une côte failante, d'où partent des nervures latérales, simples, alternes, avec des veinules réticulées; la pétiole est long d'environ un pouce, muni à sa base de deux stipules larges, allongées, aiguës, presque en gaine & adhérentes à leur base.

Les fleurs ont une odeur agréable, & forment, à l'extrémité des rameaux, une panicule très-étalée, d'un rouge écarlate; leur partie inférieure de couleur orangée. Le calice est fort petit, garni de cinq dents courtes, très-aiguës. La corolle est en forme d'entonnoir, de couleur écarlate; son tube est long, cylindrique, un peu renflé à la partie supérieure, légèrement courbé, divisé à son limbe en cinq dents ovales, aiguës, un peu inégales. Les étamines sont de la longueur du tube; le style aussi long que la corolle, divisé à son sommet en deux stigmates comprimés, élargis. Les fruits sont de petites baies à deux loges.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane, dans les forêts de Caux, où il fleurit au mois de février. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

SIMPLE. Ce mot, en botanique, a différentes significations; tantôt il est employé pour désigner un organe qui n'est point divisé, & l'on dit dans ce sens une *tige simple* ou *sans rameaux*, un *style simple* ou *sans divisions*, &c.; tantôt il est employé par opposition à *composé*. C'est ainsi que, par *feuilles simples*, on entend celles dont la pétiole ne porte qu'une feuille, qui n'est point divisée en folioles; par *calice simple*, celui qui n'est

formé que d'une seule enveloppe ; par ombelle simple, celle qui ne se divise point en ombellules ; par fleur simple, celle dont le pédoncule ne porte qu'une seule fleur ; tantôt il est employé par opposition à double. Par exemple, la fleur simple est celle dont les étamines ne sont point converties en pétales.

SIMPLES. C'est le nom que l'on donne aux plantes à feuilles, c'est-à-dire, qui sont en usage en médecine.

SINAPI. *Cordilocarpus.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des crucifères, qui a des rapports avec les *raphanus*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont presque entières, ou en lyre, ou pinnatifides ; les fleurs en grappes terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice presque fermé ; une filique cylindrique, articulée ; la dernière articulation renflée, globuleuse, armée de pointes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles linéaires, médiocrement serrées, caduques.

2°. Une corolle à quatre pétales, cruciformes, ouverts ; les onglets de la longueur du calice ; leur limbe ovale, très-entier.

3°. Six étamines tétradinames, dont les filaments sont droits, filiformes ; deux latéraux plus courts, terminés par des anthères presque droites, petites, ovales.

4°. Un ovaire supérieur, droit, cylindrique, renflé à sa partie supérieure, surmonté d'un style court, presque nul, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une filique allongée, cylindrique, articulée ; la dernière articulation globuleuse, renflée en massue, armée de pointes presque épineuses, terminée par le style subsist, persistant ; elle renferme plusieurs semences distantes, solitaires dans chaque articulation, convexes, un peu comprimées, oblongues.

Observations. Ce genre, établi par M. Desfontaines, se distingue des *raphanus*, principalement par la forme de ses filiques articulées & renflées en massue, presque épineuses. Son nom est composé de deux mots grecs, *cordale*, massue, & *carpos*, fruit, c'est-à-dire, fruit en massue.

ESPÈCES.

1. **SINAPI à fruits épineux.** *Cordilocarpus muricatus.* Desfont.

Cordilocarpus caule inferni hispido, scabro ; foliis glabris, oblongis ; siliquis patentibus, apice echinatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2, pag. 79. tab. 172.

Cordilocarpus siliquis levibus, unilocularibus, patentibus ; articulo terminali muricato, foliis sublyratis. Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 563, n°. 1.

Cette plante a des tiges droites, hautes d'environ deux pieds, rudes, pileuses, particulièrement à leur partie inférieure, légèrement striées, rameuses ; les rameaux al ternes, axillaires. Les feuilles sont glabres ou chargées de quelques poils rares ; les inférieures ovales, oblongues ou elliptiques ; les unes très-entières, d'autres échan-crées en lyre à leurs bords, décurrentes sur les pétioles, longues de quatre à cinq pouces, sur environ un pouce ou un pouce & demi de large ; les supérieures lanceolées, presque entières, al ternes, ou légèrement sinuées, ou un peu dentées.

Les fleurs sont al ternes, solitaires, disposées, à l'extrémité des rameaux, en une grappe allongée ; presque sessiles ou légèrement pédonculées. Leur calice est glabre ou un peu velu, à quatre folioles caduques, colorées, linéaires, elliptiques. La corolle est cruciforme, d'un jaune-pâle, de la grandeur de celle du *sinapis arvensis*. Le limbe est très-entier, en ovale renversé ; les onglets de la longueur du calice. Les filiques sont écartées presque horizontalement des tiges, médiocrement pédonculées, en forme de massue, allongées, glabres ou un peu velues, étroites, cylindriques, à une seule loge, terminées par une articulation globuleuse, hérissée de pointes, surmontée d'un style conique, persistant, roide, strié. Les semences, au nombre de quatre ou cinq, sont comprimées, oblongues, distantes, saillantes en dehors.

Cette plante a été découverte, par M. Desfontaines, dans les environs de Mayne, au royaume d'Alger. O (*Descript. ex Desfont.*)

2. **SINAPI à fruits lisses.** *Cordilocarpus lavigatus.* Willden.

Cordilocarpus siliquis levibus, bilocularibus, adpressis ; articulo terminali, glabro ; foliis pinnatifidis. Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 563, n°. 2.

Erucaria aleppica. Gærtn. de Fruct. & Sem. pag. 298. tab. 143. fig. 9. — Venten. Jard. de Cels. tab. 64.

Sinapi gracum, maritimum, tenuissimè laciniatum, flore purpurascens. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 17. — Lin. vol. 1, pag. 598. tab. 35.

Cette espèce diffère de la précédente par ses filiques à deux loges, la dernière articulation glabre & non hérissée de pointes ; les feuilles pinnatifides.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied, très-

glabres, divisées en rameaux alternes, diffus, étalés, garnis de feuilles ailées ou pinnatifides, un peu charnues, comme celles du *coronopus*; glabres, alternes, pétiolées; les découpures linéaires, très-entières, canaliculées. Les fleurs sont disposées en grappes longues, droites, terminales, plus allongées à l'époque de la maturité des fruits. La corolle est rouge, cruciforme; les filiques médiocrement pédonculées, très-fermées contre les tiges, glabres dans toute leur longueur, cylindriques, articulées, à deux loges; la dernière articulation renflée, glabre, ovale, renfermant une semence.

Cette plante se rencontre dans les îles de l'Archipel, où elle a été découverte par Tournefort. (*Descript. ex Willd.*)

SINGANE. *Singana*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des guaiers, qui a des rapports avec les *mesa*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges sont noueuses, farmenteuses & grimpantes; les feuilles grandes, presque opposées, pétiolées; les fleurs petites, éparées, axillaires ou latérales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à trois ou cinq divisions; trois ou cinq pétales; des étamines nombreuses; un style; une capsule cylindrique, allongée, à une seule loge; des semences imbriquées, environnées d'une substance pulpeuse.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, divisé en trois ou cinq folioles concaves, un peu arrondies, aiguës.

2°. Une corolle à cinq pétales ou trois, dont les angles sont étroits & courts, le limbe un peu arrondi & denticulé.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filaments sont insérés sur le réceptacle, terminés par des anthères arrondies, à deux loges.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style allongé, courbé à son sommet, & terminé par un stigmate concave, en tête.

Le fruit est une capsule allongée, cylindrique, fragile, à une seule loge, contenant plusieurs grosses semences, couchées les unes sur les autres, enveloppées d'une substance pulpeuse, & attachées à trois réceptacles latéraux.

E S P È C E.

SINGANE de la Guiane. *Singana guianensis*. Aublet.

Singana foliis ellipticis, integerimis, glabris; pedunculis brevissimis, lateralibus, multifloris. (N.) Lam. Illustr. Gen. tab. 460.

Singana guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 574. tab. 230. — Juss. Gener. Plant. pag. 257.

Sterbeckia lateriflora. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1177. — Schreb. Gener. Plant. n°. 909.

C'est un arbrisseau grimpant & farmenteux, dont les principales tiges se roulent autour des troncs des plus grands arbres, sur la cime desquels elles répandent un nombre prodigieux de branches & de rameaux noueux, revêtus d'une écorce verte, marquée de taches blanches. Le bois est dur, compacte, jaunâtre. Les feuilles sont placées deux à deux à chaque nœud, & presque opposées, pétiolées, grandes, ovales, elliptiques, très-entières, glabres à leurs deux faces, minces, vertes, acuminées à leur sommet, longues de six à sept pouces, sur au moins trois de largeur; nerveuses, veinées, réticulées, soutenues par des pétioles longs d'environ un pouce.

Les fleurs sont latérales, axillaires, presque fasciculées, supportées par des pédoncules courts, inégaux. Leur calice est verdâtre, à trois ou cinq folioles concaves, arrondies. La corolle est blanche, petite, composée de trois ou cinq pétales dentelés à leurs bords. Les étamines sont nombreuses, attachées sur le réceptacle, plus courtes que les pétales. Les fruits sont des capsules de couleur grisâtre, longues de six à dix pouces, sur un ou deux pouces de diamètre, relevées en bosse & soutenues par un long pédoncule ligneux. Leur écorce est ferme, cassante, épaisse. Les semences, renfermées dans une seule loge, sont de la grosseur d'une châtaigne ordinaire, contenant, dans une membrane coriace & blanchâtre, une amande blanche, légèrement amère. Ces semences sont placées les unes sur les autres, enveloppées d'une substance blanche, pulpeuse, douceâtre, dont l'odeur approche de celle de la citrouille.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane. On le rencontre dans les forêts qu'on traverse en allant d'Orapu à Caux. Il fleurit & donne des fruits dans le mois de septembre. *h* (*Descript. ex Aublet.*)

SINEES (Feuilles). *Sinuata folia*. On donne ce nom aux feuilles dont les côtes ou les bords sont remarquables par plusieurs sinuosités ou échancrures arrondies, très-ouvertes, un peu profondes, comme dans l'*Physiculus niger*, le *Statis sinuata*, l'*Onopordum aianthum*, &c. Lorsque ces échancrures sont moins profondes, légères, la feuille est alors appelée gaudronnée (*repanda*); laciniées ou déchiquetées lorsque les échancrures sont une ou plusieurs fois divisées.

SINUS. Ce sont des échancrures assez profondes, que l'on observe souvent sur les bords d'une

feuille, d'où il résulte des portions saillantes appelées lobes.

SIPANE. *Sipanea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des rubiacées, qui a de grands rapports avec les *mussaenda*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont petites, entières; les fleurs sont disposées en un petit corymbe terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une calice à cinq découpures; une corolle en entonnoir; le limbe divisé en cinq lobes; cinq étamines; un style; une capsule surmontée, à deux loges, polysperme, se partageant en deux.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, persistant, divisé en cinq folioles droites, égales, tubulées, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, en forme d'entonnoir, dont le tube est long, inséré sur le disque qui couronne l'ovaire, venu à son orifice; le limbe ouvert, divisé en cinq lobes égaux.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont courts, insérés sur le tube, terminés par des anthères oblongues, à deux loges.

4°. Un ovaire renfermé dans le fond du calice, couronné par un disque charnu, du centre duquel s'élève un style long, filiforme, terminé par deux stigmates.

Le fruit est une capsule sèche, orbiculaire, striée, à deux loges, couronnée par les divisions du calice; chaque loge bivalve; les valves opposées aux cloisons, renfermant plusieurs semences fort petites.

E S P È C E.

SIPANE des prés. *Sipanea pratensis*. Aublet.

Sipanea foliis ovato-lanceolatis, inferius ciliatis; caule tereti, villosa. (N.)

Sipanea pratensis. Aubl. Guian. vol. 3. pag. 147. tab. 56. — Lam. Illustr. Gener. tab. 151.

Cette plante a des racines fibreuses, divisées en plusieurs ramifications, & qui produisent des tiges nombreuses, cylindriques, un peu velues, noueuses, très-rameuses, longues de deux pieds & plus, & dont les ramifications sont la plupart couchées & radicantes à leurs nœuds, garnies de feuilles opposées, presque sessiles, ovales-lancéolées, entières, un peu rudes, ciliées à leur partie inférieure, aiguës à leur sommet, munies à leur base de deux stipules opposées, caduques.

Les fleurs naissent à l'extrémité des tiges & des rameaux, & forment de petits corymbes de six ou huit fleurs, portées chacune sur un pédoncule court. Le calice est strié, arrondi à sa base, resserré à son orifice, où il se divise en cinq découpures longues, étroites, aiguës, avec un poil assez long dans l'échancrure de chaque division. La corolle est tubulée, rougeâtre ou couleur de rose, divisée à son limbe en cinq lobes égaux.

Cette plante croît en abondance dans les savannes qui sont autour de la ville de Cayenne; elle est presque toujours en fleurs & en fruits. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis.

On emploie la sipane dans les tisanes astringentes & contre la gonorrhée. On se sert de sa décoction pour laver les plaies & les ulcères.

SIPAROUNIER. *Siparuna*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, moniques, dont la famille & les rapports naturels ne sont pas encore déterminés, les parties de la fructification n'étant pas encore toutes connues; il renferme des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs fort petites, axillaires, presque en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs moniques; un calice à quatre divisions; point de corolle; de quatre à dix étamines dans les fleurs mâles, insérées sur le disque du calice; un ovaire supérieur dans les fleurs femelles; un style oblong, strié; cinq stigmates. Le fruit...

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont moniques.

* Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à quatre découpures arrondies.

2°. Point de corolle.

3°. Depuis quatre jusqu'à dix étamines, dont les filaments sont insérés sur un disque velu, placé dans le fond du calice. Les anthères sont à deux loges.

* Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice semblable à celui des fleurs mâles.

2°. Point de corolle ni d'étamines.

3°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un style oblong, strié, terminé par cinq stigmates capillaires.

Le fruit n'est pas encore connu.

E S P È C E.

SIPAROUNIER de la Guiane. *Siparuna guianensis*. Aubl.

Siporuna foliis oppositis, ovato-oblongis, subsessilibus; floribus axillaribus, subcorymbofis. (N.)

Siporuna guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. p. 865. tab. 333.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, hautes de sept à huit pieds, divitiées presque des leur base en branches grêles, droites, allongées, munies de rameaux opposés, lisses, verdâtres, noueux, garnis à chaque nœud de deux feuilles opposées, ovales, oblongues, très-entières, acuminées à leur sommet, vertes, lisses à leurs deux faces, longues d'environ cinq pouces sur deux de large, supportées par un pédoncule très-court.

Les fleurs sont petites, verdâtres, les unes mâles, les autres femelles, situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en petits corymbes très-courts, peu garnis.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane, sur le bord des cours d'eau douce, dans le quartier d'Oyac. Il fleurit au mois d'août. h

SIPHONANTE. *Siphonanthus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, affilié à la famille des boraginées, qui a des rapports avec les *clerodendrum* ou les *volvum*, &c qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ternées, presque verticillées; les fleurs disposées en corymbes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice ample, à cinq divisions; une corolle infundibuliforme, très-longue; le limbe petit, à quatre découpures; quatre étamines; un style; quatre baies monospermes, renfermées dans le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, ample, partagé en cinq découpures persillantes.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est filiforme, très-long, fort étroit; le limbe petit, ouvert, à quatre divisions.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont plus longs que le limbe de la corolle, terminés par des anthères oblongues, triangulaires.

4°. Un ovaire supérieur très-court, à quatre lobes, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, recourbé à son sommet, terminé par un stigmate simple.

Le fruit consiste en quatre baies arrondies, situées dans un calice ouvert, contenant chacune une seule semence arrondie.

SIPHONANTE des Indes. *Siphonanthus indica.* Linn.

Siphonanthus foliis lineari-lanceolatis, subternatis; floribus axillaribus, subumbellatis, ternis. (N.)

Siphonanthus indica. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 159. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 318. n°. 1582. tab. 79. fig. 1.

Siphonanthus (indica), limbo corollae potente, stigmate indiviso. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 606. n°. 1.

Siphonanthus foliis folio, flore flavescente. Amm. Act. Petrop. 1736. pag. 214. tab. 15.

Lismachii species. Pison. Bont. 159.

8. *Siphonanthus angustifolia, limbo corollae bilabiato, stigmate bifido.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 606. n°. 2. — Lam. Illustr. Gener. pag. 318. n°. 1582. tab. 79. fig. 2.

C'est une plante herbacée, dont les tiges sont droites, très-simples, glabres, garnies de feuilles sessiles, opposées, plus ordinairement ternées, linéaires, lancéolées, allongées, rétrécies presque en pétiole à leur base, entières à leur contour, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures latérales, simples, presque opposées, réunies &c conniventes vers le bord des feuilles.

Les fleurs sont disposées en petits corymbes opposés, situés dans l'aisselle des feuilles supérieures, portés sur un pédoncule commun assez court, divisé à son sommet en trois autres plus courts, presque ombellés, uniflores. Le calice est glabre, un peu ouvert, à cinq découpures aiguës. La corolle est jaunâtre, en forme d'entonnoir, muni d'un tube grêle, très-long, divisé à son limbe en quatre petites découpures obtuses, étroites, planes, un peu recourbées. Les étamines ainsi que le pistil sont saillans hors de la corolle. Le fruit est composé de quatre baies arrondies, assez petites, insérées sur le calice ouvert, élargi : elles renferment chacune une semence un peu ovale.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

Observations. M. Lamarck, dans les *Illustrations des Genres*, a rapporté deux figures de cette plante, qui offrent assez de différences entr'elles, pour faire soupçonner qu'elles appartiennent à deux espèces distinctes; mais ce célèbre botaniste n'a pas osé prononcer; il est porté à croire que la figure première n'est pas très-exacte; que la seconde exprime avec plus de vérité le caractère de cette plante. Nous ne nous permettrons pas non plus de prononcer jusqu'à ce que ces deux plantes aient été reconnues exister réellement dans la nature.

SISON.

SISON. *Sison*. Linn. Ce genre est si peu différent de celui des *sum*, que M. Lamarck les a réunis à l'article **BERLE**. (Voyez ce mot.) En effet, le seul caractère qui distingue ces deux genres, consiste uniquement dans les pétales lancéolés, entiers pour les *sison*, & dans des pétales échancrés en cœur à leur sommet pour les *sum* ou *berles*. Les semences & les autres parties de la fructification sont parfaitement les mêmes pour les deux genres.

Il faudra joindre à l'article **BERLE** quelques espèces nouvelles découvertes par Michaux, & qu'il a décrites dans la *Flore de l'Amérique septentrionale*, telles que son *sum lineare*, *sison pusillum*, *sison trifoliatum*, *sison marginatum*, *sison bulbosum*. Plusieurs de ces espèces offrent dans leurs semences quelques caractères particuliers qui pourroient bien déterminer les botanistes, ou à les ranger dans d'autres genres, ou à en établir de nouveaux.

SISYMBRE. *Sisymbrium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des crucifères, qui a de grands rapports avec les *erysimum* & les *cardamine*, & qui comprend des herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont simples, ou pinnatifides, ou ailées; les fleurs disposées en épi ou en panicule, quelquefois solitaires & axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Le calice & les pétales ouverts; six étamines tétradynames; une silique alongée, cylindrique; les valves droites, point élastiques en s'ouvrant; la cloison un peu plus longue que les valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles lancéolées, linéaires, souvent colorées, ouvertes, caduques.

2°. Une corolle cruciforme, à quatre pétales oblongs, ouverts, souvent un peu plus courts que le calice; les onglets très-petits.

3°. Six étamines tétradynames, dont les filaments sont plus longs que le calice, deux opposés & latéraux plus courts que les autres, surmontés par des anthères simples.

4°. Un ovaire oblong, filiforme, supérieur, dont le style est presque nul, le stigmate obru.

Le fruit est une silique alongée, cylindrique, un peu courbée, légèrement relevée en bosse, à deux loges, à deux valves; ces valves restent droites & ne s'ouvrent point avec élasticité; la cloison un peu plus longue que les valves; elles renferment plusieurs semences fort petites.

Botanique. Tome VII.

Observations. On pourroit presque établir en principe, que plus les familles sont naturelles, plus les genres qui les composent sont arbitraires; il en est très-peu de naturels dans ces familles, & l'on voit beaucoup d'espèces passer successivement d'un genre dans un autre, selon les rapports sous lesquels chaque botaniste les considère. Celui dont il est ici question en offre un exemple, & a été soumis aux mêmes changements.

M. Lamarck a fait passer la plupart des espèces de la première division à *siliques courtes & inclinées* dans plusieurs autres genres. Le *sisymbrium nasturtium* est le *cardamine fontana*. (Lamarck.) (Voyez **CRESSON** de fontaine.) Cette espèce, à la vérité, a parfaitement le port des cressons, mais elle n'en a point le principal caractère générique, qui consiste dans l'élasticité des valves au moment où elles s'ouvrent pour lancer leurs semences. Ces espèces moyennes, qui appartiennent autant à un genre qu'à un autre, jettent beaucoup de confusion & d'embarras dans les distributions méthodiques. On ne peut pas blâmer les botanistes qui les changent de place, étant également fondés en raison. Je crois cependant que, lorsqu'il y a parité de raisons, il vaut mieux laisser ces espèces dans le genre qui leur a d'abord été assigné, ne seroit-ce que pour éviter les inconvénients d'un déplacement au moins inutile & presque arbitraire. Il vaudroit mieux en former un genre nouveau si l'on pouvoit l'établir solidement.

Le *sisymbrium amphibium* a été réuni, par le même auteur, aux *myagrum*. (Voyez **CAMELINE** aquatique.) Il étoit en effet bien difficile de conserver, parmi les *sisymbrium*, une plante dont les siliques sont très-courtes, & qui devoient la faire ranger, d'après le système de Linné, dans la tétradynamie filiculeuse; mais aussi elle a trop de rapport avec le *sisymbrium silvestre*, pour en être séparée & rangée dans un autre genre.

Les autres espèces de cette même division seroient peut-être susceptibles de quelque déplacement; mais comme elles offrent, plus que celles dont je viens de parler, le caractère des *sisymbrium*, je les y ai conservées, & même j'y ai rattaché quelques-unes qui en avoient été retranchées par M. Lamarck, & d'autres qu'il avoit placées parmi les *hesperis* & les *arabis* (les julienues & les arabettes). Il étoit bien difficile de tenir ces espèces séparées de plusieurs autres qui ont avec elles de très-grands rapports. Peut-être seroit-il aussi convenable d'y rapporter plusieurs espèces du genre *erysimum* de Linné, qui seroient mieux placées dans celui-ci.

ESPÈCES.

* *Siliques courtes & inclinées.*

1. **SISYMBRE SAUVAGE.** *Sisymbrium silvestre*. Linn.

C c

S. Symbrium filiquis declinatis, foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 916. — Hort. Cliff. 336. — Flor. suec. edit. 2. n°. 594. — Roym. Lugd. Bat. 341. — Dalib. Parif. 204. — Sauv. Monp. 228. — Cæder. Flor. dan. tab. 931. — Gort. Gerl. 399. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 268. — Crantz. Austr. 47. — Scopol. Carn. n°. 802. — Kniph. Centur. 12. n°. 93. — Hoffm. Germ. 234. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 290. — Il. pag. 125. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 519. n°. 335. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 489. n°. 2.

Symbrium foliis pinnatis; pinnis dentatis, diffusis. Haller, Helv. n°. 485.

Brachiolobus silvestris. Allion. Flor. pedem. n°. 1012. tab. 56. fig. 2.

Eruca palustris, nasturtii folio, siliquâ oblongâ. C. Bauh. Pin. 98.

Eruca quibusdam silvestris, repens; flosculo luteo. J. Bauh. Hist. 2. pag. 866.

Eruca silvestris, minor; luteo parvoque flore. C. Bauh. Pin. 98.

Eruca palustris, minor. Tabern. 447. Icon.

Eruca silvestris. Fuchs, Hist. 263.

Symbrium palustre, repens, nasturtii folio. Tournef. Inst. R. Herb. 226.

Radicula pinnata. Mœnch. Method. 263.

β. *Symbrium (bippizense), filiquis declinatis, brevibus; foliis inferioribus pinnatis, summis inferioribusque foliolis integerrimis.* Wulf. in Jacq. Coll. 2. pag. 61. — Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 505.

Erysinum verum. Dalech. Hist. vol. 1. pag. 653. Icon.

Cette plante a des racines rampantes, des tiges grêles, striées, rameuses, longues d'environ un pied, couchées à leur base, droites ou renversées, presque couchées, glabres, garnies de feuilles alternes, lanceolées, petiolées, ailées; les folioles linéaires, étroites, aiguës, vertes, glabres à leurs deux faces, irrégulièrement crénelées ou dentées à leurs bords; les dents écartées, distantes, aiguës, plus ou moins fortes. Ces folioles sont entières à l'extrémité des feuilles supérieures dans la variété β; elles offrent d'ailleurs quelques autres variétés dans leur forme & leurs dentelures.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux & des tiges, en une grappe simple, droite, nue, plus ou moins lâche, selon son développement. Les calices sont glabres, caducs, d'un vert jaunâtre; la corolle jaune, petite, un peu plus grande que le calice. Les filiques sont linéaires, un peu aplaties, légèrement arquées, longues d'environ six lignes & plus, larges d'une ligne, très-

glabres, supportées par des pédoncules filiformes, glabres, très-ouverts, de moitié plus courts que les filiques.

Cette plante croît parmi les décombres, sur le bord des rivières, dans les marais, en France, en Allemagne, en Suisse. ☉ (V. v.)

2. *SYSYMBRE* des marais. *Sisymbrium palustre.* Willden.

Sisymbrium filiquis declinatis, oblongis, ovatis; foliis pinnatifidis, serratis; petalis calice brevioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 490. n°. 3. — Leyff. Hal. n°. 679. — Hoffm. Germ. 234. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 290. — Il. pag. 127. — Pollich. Palat. n°. 625.

Sisymbrium (terrestre), filiquis declinatis, turgidis; foliis pinnatifidis, inæqualiter dentatis; radice simplicis; petalis calice brevioribus. Smith, Flor. brit. vol. 2. pag. 701. — Curris, Lond. tab. 49.

Sisymbrium islandicum. Cæder. Flor. dan. tab. 409.

Sisymbrium amphibium. Var. α. Hudf. Angl. 296.

Myagrum palustre. Lam. Dict. vol. 1. pag. 572.

Myagrum aquaticum. Var. α. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 483.

Radicula foliis pinnatis, pinnis dentatis, petalis calice brevioribus. Hall. Helv. n°. 487.

Sisymbrium foliis pinnatifidis, serratis. Flor. suec. 551.

Sisymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinas divisis. Tournef. Inst. R. Herb. 226. — Flor. lapp. 262.

Sisymbrium palustre, repens, parvo flore. Vaill. Parif. pag. 186. n°. 6.

Radicula silvestris, sive palustris. J. Bauh. Hist. 2. pag. 866. Icon.

Raphanus aquaticus, foliis in profundas lacinas divisis. C. Bauh. Pin. 97. — Prodr. 38.

Radicula palustris. Mœnch. Meth. 263.

β. *Sisymbrium (hybridum), glabrisculum, diffusum patulum, vel procumbens; foliis pinnatifidis; lobis ovalibus, crenatis; spicis subsessilibus; filiquis crebris, petalis ovato-oblongis.* Thuill. Paris, édit. 2. pag. 331. n°. 3.

γ. *Sisymbrium (pusillum), caulibus prostratis; foliis pinnatis, bijugis, obliquis, glandulatis; filiquis torulosis, incurvis, brevissimis.* Thuill. Paris, édit. 2. pag. 332. n°. 5. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 341. tab. 39.

Il y a beaucoup de rapports entre cette espèce & le *Sisymbrium silvestre*, avec lequel elle paroît avoir été d'abord confondue, & qui n'en est peut

être qu'une variété, distinguée par ses filiques plus courtes, plus renflées; par ses corolles plus petites.

Ses racines sont droites, simples, fusiformes, point rampantes; ses tiges nombreuses, ordinairement couchées, étalées sur terre en gazon, quelquefois redressées, glabres, verticillées, rameuses, striées, garnies de feuilles alternes, glabres à leurs deux faces, vertes, allongées, ailées; les inférieures grandes, élargies, composées de folioles ovales-lancéolées, plus ou moins profondément incisées à leur contour; les lobes inégaux, la plupart obtus; les folioles des feuilles supérieures beaucoup plus étroites, linéaires, aiguës, à peine denticulées ou médiocrement incisées.

Les fleurs sont nombreuses, disposées en grappes axillaires & terminales, formant par leur ensemble une panicle étalée. Les calices sont glabres, petits, colorés, obtus, un peu ouverts, caducs; la corolle jaune, à peine plus longue que le calice; les filiques courtes, longues de trois à quatre lignes, un peu renflées, courbées en arc, soutenues par des pédoncules glabres, filiformes, très-ouverts, presque aussi longs que les filiques. La plante se parait être qu'une variété de celle-ci, dont les feuilles sont pinnatifides, les lobes ovales, crénelés. La variété y est beaucoup plus petite; ses feuilles composées de deux ou trois paires de folioles ovales, irrégulières, dentées; les fleurs fort petites; les filiques relevées en bosse; les semences brunes, très-petites.

Cette plante croît dans les lieux humides, sur le bord des rivières, en France, en Allemagne, dans la Hongrie, l'Islande, la Lapponie, &c. (V. v.)

3. SISYMBRE cératophylle. *Sisymbrium ceratophyllum*. Desfont.

Sisymbrium foliis linearis-subulatis, dentibus remotis, inaequalibus, longiusculis; siliquis patentibus, pedicello brevioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 82. tab. 155.

Sisymbrium foliis ellipticis, foliis linearis-subulatis, pinnatifido-dentatis; caule ascendente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 491. n°. 7.

Il existe des rapports entre cette plante & le *Sisymbrium coronopifolium*; elle en diffère par ses feuilles linéaires deux & trois fois plus étroites, & par ses tiges plus garnies de feuilles.

Ses racines sont grêles, médiocrement rameuses, munies de quelques fibres: il s'en élève plusieurs tiges, hautes à peine d'un pied, couchées plus ou moins à leur base, ascendantes ou droites, grêles, pubescentes, rameuses à leur partie inférieure. Les feuilles sont alternes, très-étroites, glabres ou légèrement pubescentes, linéaires, longues d'en-

viron deux pouces & plus, larges de deux lignes; les inférieures dentées; les dents inégales, distantes, ouvertes, assez longues; les feuilles supérieures très-entières.

Les fleurs forment une grappe simple, terminale. Leur calice est petit, coloré; la corolle jaune, une fois plus longue que le calice; le limbe des pétales, ovale, très-entier; les filiques glabres, grêles, un peu comprimées, longues de trois à quatre lignes, lâches, distantes, ouvertes, soutenues par des pédoncules filiformes, une fois plus longs que la filique. Le style est très-court; la stigmate épais. Les semences sont fort petites, roussâtres, au nombre de quatre, cinq ou six.

Cette plante croît dans la Barbarie, aux environs de Casfa, aux lieux sablonneux, où elle a été découverte par M. Desfontaines. (Description. ex Desfont.)

4. SISYMBRE en corne de cerf. *Sisymbrium coronopifolium*. Desfont.

Sisymbrium foliis pubescentibus, pinnatifido-dentatis; laciniis distinctis, linearibus, obtusiusculis; siliquis patentibus, pedicellatis. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 82. tab. 154.

Sisymbrium foliis linearibus, incurvatis; foliis lanceolatis, pinnatifido-dentatis, pubescentibus; caule ascendente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 492. n°. 8.

Ses tiges s'élèvent, en touffe gazonneuse, d'une racine commune; elles sont simples ou à peine rameuses, longues d'environ un pied, diffuses, un peu couchées à leur base, velues, légèrement striées, point feuillées à leur partie supérieure. Ses feuilles sont très-rapprochées de celles du *plantago coronopifolium*, allongées, lancéolées, pubescentes, longues de quatre à cinq pouces, larges d'environ un demi-pouce, dentées, presque pinnatifides; les dents écartées, linéaires, entières, pinnées, toutes semblables, obtuses.

Les fleurs sont disposées en une grappe lâche, terminale, nue. Le calice est pubescent, un peu lâche, coloré, caduc. Ses folioles sont elliptiques, obtuses. La corolle est jaune, deux & trois fois plus longue que le calice. Les pétales ont leur limbe très-entier, en ovale renversé. Le style est nul; le stigmate obtus; les filiques grêles, ouvertes, un peu arquées, glabres, longues d'environ un demi-pouce, un peu comprimées, soutenues par des pédoncules simples, filiformes, pubescents, à peine plus longs que les filiques.

Cette plante croît en Barbarie, dans les sables du désert, proche Casfa, où elle a été découverte par M. Desfontaines. Elle fleurit pendant l'hiver. (Description. ex Desfont.)

5. *SISYMBRE* des Pyrénées. *Sisymbrium pyrenaicum*. Linn.

Sisymbrium filiquis subovatis; foliis inferioribus byratis, superioribus bipinnatifidis, amplexicaulibus; stylis filiformibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 916. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 341. tab. 348. ? Mala. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 491.

Sisymbrium foliis pinnatis, imorum pinnis oblongis, superiorum linearibus, integris; filiquis ovalibus, oligospermis. De Lachenal, Act. helv. 4. pag. 488. tab. 15. Bona.

Brachiolobus pyrenaicus. Allion. Flor. pedem. n°. 1013. tab. 18. fig. 1.

Allysum foliis imis subrotundis; caulinis pinnatis, filiformibus, amplexicaulibus. Haller, Helv. n°. 488.

Raphanus minimus, repens, luteus; foliis tenuiter divisis. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 236. §. 3. tab. 7. fig. 1. ? — Rai, Hist. 809.

Allysum foliis pinnatis, multifloribus; floribus racemosis, luteis. Allion. Spec. pedem. 40. tab. 7.

Myrrum pyrenaicum. Var. g. Lam. Dict. 1. pag. 571.

Ses racines sont longues, composées de plusieurs fibres blanchâtres, presque capillaires, en touffes gazeuses : il s'en élève plusieurs tiges droites ou couchées à leur partie inférieure, glabres, cylindriques, striées, un peu rameuses. Les feuilles sont très-variées; celles du bas & les radicales oblongues, échanquées en lyre à leur contour, ou pinnatifides vers leur base; le lobe terminal arrondi ou un peu ovale, entier ou crénelé vers son sommet; les feuilles caulinaires & supérieures deux fois ailées, embrassant les tiges par la base de leur pétiole; les pinnules presque opposées, alongées; les folioles très-étroites, linéaires, quelquefois presque filiformes, entières ou dentées irrégulièrement, vertes, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en une grappe lâche, terminale, quelquefois un peu rameuse ou latérale, presque paniculée. Les pédoncules sont épars, alternes, glabres, filiformes, très-ouverts, presque de la longueur des siliques; les calices glabres, un peu colorés, obtus, médiocrement ouverts, ca. luec. La corolle est jaune, petite; les pétales onguiculés, plus longs que les calices; l'ovaire est grêle, filiforme, surmonté d'un style capillaire; les siliques très-glabres, redressées, oblongues, un peu ovales, à peine arquées, contenant plusieurs semences fort petites.

Cette plante croît dans les Pyrénées, en Suisse, dans les Alpes, & dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

6. *SISYMBRE* à feuilles de tanaïse. *Sisymbrium tanacetifolium*. Linn.

Sisymbrium foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, inciso-pinnatis, eximis confluentibus. Linn. Sp. c. Plant. vol. 2. pag. 916. — Royen, Lugd. Bat. 659. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 348. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 492. n°. 6.

Eruca foliis pinnatis, pinnis acutissimè serratis. Haller, Helv. n°. 460.

Eruca tanacetii folio. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 231. §. 3. tab. 6. fig. 19.

Eruca fraticosa, foliis tanacetii indica. Lann. Hill. pag. 86. tab. 33.

Ses tiges sont droites, lisses, cylindriques, finement striées, presque simples, un peu fistuleuses, garnies de poils courts & rares, & de feuilles alternes, pétioles, molles, pinnatifides; les pinnules alternes, profondes, un peu décurrentes à leur base, distantes, élargies, lanceolées, fortement incisées; les découpages aiguës; les pinnules supérieures terminales, plus étroites, à peine velues, confluentes, d'un vert-tendre, ayant quelque ressemblance avec celles de la tanaïse.

Les fleurs sont disposées en grappes courtes, situées à l'extrémité des rameaux, un peu rameuses. Les pédoncules sont glabres, ouverts, filiformes, plus courts que les siliques. Le calice est petit, glabre, composé de quatre folioles un peu colorées, très-caduques. La corolle est d'un beau jaune, petite, un peu plus longue que le calice; les pétales entiers, arrondis, un peu ovales, entiers à leur limbe; les siliques sont redressées, très-glabres, grêles, alongées, droites, aiguës, longues de trois à quatre lignes, un peu renflées, légèrement comprimées, rétrécies à leur base.

Cette plante se rencontre en Suisse, dans la Servie & dans les départements méridionaux de la France; elle m'a été communiquée par M. Desfoucault, qui l'a recueillie aux environs de Grenoble. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

7. *SISYMBRE* fausse roquette. *Sisymbrium tenuifolium*. Linn.

Sisymbrium filiquis erectis; foliis glabris, subintegerrimis, pinnatifidis bipinnatifidis, supremis integris. Smith, Flor. britan. vol. 2. pag. 703. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 493. n°. 9.

Sisymbrium foliis integerrimis, infimis tripinatifidis, supremis integris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 917. — Guettard, Stimp. 150. — Dalibart, Paris. 204. — Pollich. Palar. n°. 627. — Hoffm. Germ. 235. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 290. — vol. II. pag. 128.

Sisymbrium acre. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 320. n°. 535.

Brassica muralis. Hudf. Angl. 290. — Curtis, Lond.

Eruca foliis glabris, pinnatis; pinnis linearibus, difformibus. Haller, Helv. n°. 461.

Eruca foliis sinuato-dentatis, caule nodosulo, radice perenni. Gérard, Flor. gall. Prov. p. 369.

Sinapi erucifolia. C. Bauh. Pin. 99.

Eruca tenuifolia, perennis. J. Bauh. Hist. 2. pag. 861. Icon. — Vail. Parif. pag. 50. — Tourn. Inst. R. Herb. 227. — Garid. Aix, 161.

Eruca sativa. Fuchs, pag. 262. Icon.

Sinapi silvestre. Dodon. Pempt. pag. 707. Ic.

Eruca silvestris. Blackw. tab. 266.

Cette espèce a non-seulement la saveur piquante de la roquette, elle en a encore le port & les feuilles; mais celles-ci sont plus découpées.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, hautes d'un à deux pieds, rameuses, diffusées, très-lisses, garnies de feuilles alternes, un peu grasses, alongées, rétrécies en pétiole à leur base, pinnatifides à leur contour; les découpures irrégulières, distantes, un peu étroites & dirigées vers le sommet des feuilles, glabres, très-lisses, d'un vert un peu glauque, très-entières ou quelquefois un peu incisées; les feuilles supérieures sont entières, oblongues.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges & des rameaux, des grappes droites, alongées; les pédoncules sont alternes, filiformes, très-glabres, plus courts que les filiques. La corolle est assez grande, de couleur jaune; les pétales entiers. Les filiques sont droites, presque cylindriques, longues d'un pouce & plus, très-glabres.

Cette plante croît en France, en Allemagne, en Suisse, &c. sur les vieux murs & dans les lieux incultes & sablonneux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris: son odeur est très-désagréable, & sa saveur âcre & brûlante. (P. f.)

8. SISYMBRE de Buenos-Ayres. *Sisymbrium bonariense*.

Sisymbrium racemosissimum; foliis subpinnatis, glabris; pinnulis linearibus, remotis; siliculis brevibus, suberectis. (N.)

Ses racines se divisent en plusieurs fibres droites, grêles, blanchâtres; elles produisent une tige glabre, un peu tortueuse, divisée presque dès sa base en rameaux nombreux, diffus, étalés, très-ouverts. Les feuilles sont alongées, pétiolées, alternes, presque ailées, très-étroites, dont les pinnules sont distantes, inégales, opposées ou alter-

nes, presque horizontales & parallèles, fort étroites; linéaires, glabres, entières ou munies de quelques dents rares, obtuses; la pinnule terminale un peu plus large, & souvent légèrement incisée ou dentée.

Les fleurs sont terminales, d'un blanc jaunâtre, disposées en grappes très-lâches, alongées, situées à l'extrémité des tiges & des rameaux. Le calice est composé de quatre petites folioles un peu colorées, glabres, ouvertes. La corolle est à peine plus longue que le calice; les pétales ovales, oblongs, entiers, obtus; les filiques sont courtes, longues à peine d'un demi-pouce, comprimées, linéaires, médiocrement redressées, très-glabres, soutenues par des pédoncules presque de la même longueur, étalés, presque horizontaux, filiformes.

Cette plante croît à Buenos-Ayres, où elle a été observée par Commerson. (P. f. in herb. Justic.)

9. SISYMBRE amplexicaule. *Sisymbrium amplexicaule*. Desfont.

Sisymbrium foliis glabris, subdentatis, amplexicaulis; radicalibus obovatis; siliculis patentibus, mucronatis, pedicello brevioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 81. tab. 173.

Sisymbrium glabrum, filiculis compressis, erectis; foliis dentatis, radicalibus obovatis; caulinis oblongis, cordatis, amplexicaulis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 493. n°. 11.

Cette espèce est très-rapprochée du *Sisymbrium sagittatum*. Elle en diffère par ses tiges & ses feuilles glabres, par ses filiques droites, par ses feuilles amplexicaules & non sagittées.

Ses tiges sont droites, lisses, hautes d'environ un pied & plus, très-glabres, cylindriques, légèrement striées, rameuses, garnies à leur base de quelques poils rares & courts, divisées en rameaux alternes, axillaires, droits, très-ouverts. Toutes les feuilles sont glabres; les radicales & les inférieures en ovale renversé ou un peu cunéiformes, rétrécies à leur base & décurrentes sur un pétiole court, légèrement sinuées ou dentées à leur contour; les feuilles caulinaires & supérieures alternes, en petit nombre, sessiles, distantes, amplexicaules, lancéolées, échancrées en cœur & arrondies à leur base, entières ou dentées en scie à leurs bords.

Les fleurs forment une grappe simple & terminale, lâche. Les pédoncules sont simples, alternes, capillaires, ouverts, une fois plus longs au moins que les filiques. Le calice est petit, à quatre folioles elliptiques, colorées. Les pétales sont jaunes, deux & trois fois plus longs que les calices; leur limbe ovale, très-entier; le style court, rigide,

perflant. Les filiques sont droites, petites, légèrement comprimées, un peu élargies, aiguës à leurs deux extrémités, longues de quatre à cinq lignes, mucronées à leur sommet; elles renferment plusieurs semences fort petites, de couleur brune.

Cette plante croît sur les collines, aux environs d'Alger, où elle a été découverte par M. Desfontaines. O

10. SISYMBRE sagitté. *Sisymbrium sagittatum*. Willd.

Sisymbrium pubescens, filiquis cylindraceis, declinatis; foliis obovato-oblongis, dentatis; radicalibus hastatis; caulinis sagittatis, amplexicaulis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 493. n°. 10.

Sisymbrium (sagittatum), pubescens, filiquis declinatis, subcylindraceis, recurvis; foliis obovato-oblongis, sagittatis, dentatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 390.

Sisymbrium (molle), filiquis declinatis, brevibus, subcylindricis; foliis mollibus, denticulatis; caulinis hastatis, oblongis. Jacq. Icon. rar. vol. 1. tab. 122. — Idem, Collect. vol. 1. pag. 68.

Cette plante a des rapports avec le *Sisymbrium amplexicaule*; elle en diffère par ses tiges pubescentes, par la forme de ses feuilles hautes ou sagittées à leur base, par les filiques inclinées.

Ses tiges sont droites, cylindriques, médiocrement rameuses, pubescentes, garnies de feuilles alternes, molles, sessiles, ovales-oblongues, dentées ou rongées à leur contour; les radicales pétiolées, hautes, les caulinaires & supérieures amplexicaules, sagittées à leur base, denticulées à leurs bords. Les fleurs forment une grappe droite, lâche, terminale. La corolle est jaune, les pétales entiers, les filiques pédonculées, cylindriques, inclinées.

Cette plante croît dans la Sibérie. ♀

* * *Silques sessiles, axillaires.*

11. SISYMBRE couché. *Sisymbrium supinum*. Linn.

Sisymbrium filiquis axillaribus, subsessilibus, solitariis; foliis dentato-sinuatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 917. — Hort. Upf. 192. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 494. n°. 12.

Arabis supina. Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 512. n°. 532.

Erysimum caule decumbente; filiquis laterali, subsessili. Roy. Lugd. Bat p. 343. — Dalib. Parif. 201.

Eraca supina, alba; filiquis singulari, & foliorum alis crumpeute. Linard, Act. 1724. pag. 295. tab. 18.

Sisymbrium palustre, album, eruca folio, filiquis in foliorum alis. Vaill. Parif. 186.

Eraca procumbens, alba, alis foliorum florescent. Vaill. Parif. 30. n°. 5.

Cette espèce se rapproche des *arabis*, mais elle convient davantage aux *sisymbrium* par ses caractères génériques, & même en général par son port.

Ses racines sont épaisses, allongées, blanchâtres, garnies de quelques fibres filiformes; il s'en élève plusieurs tiges tendues sur la terre, où elles forment des gazons assez épais; elles sont longues d'environ un pied, grêles, cylindriques, striées, solides, verdâtres, quelquefois purpurines, légèrement pubescentes & rameuses, garnies de feuilles alternes, allongées, en forme de lyre, ou pinnatifides dans toute leur longueur, d'un vert-pâle; la découpeure terminale plus grande, plus élargie que les autres.

Ses fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, solitaires ou quelquefois deux à deux, sessiles ou à peine pédicellées. Le calice est fort petit, de couleur verte, hérissé de quelques petits poils blancs; la corolle blanche, petite; les filiques un peu courbées, longues d'environ un pouce, tubulées à leur sommet, plus épaisses à leur base, renfermant un grand nombre de semences brunes, ovales, fort petites.

Cette plante croît dans les champs, en France, en Espagne, aux environs de Paris, le long de la rivière, dans les sols sablonneux. O (V. v.)

12. SISYMBRE à filiques nombreuses. *Sisymbrium polyceratum*. Linn.

Sisymbrium filiquis axillaribus, sessilibus, subulatis, aggregatis; foliis repando-dentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 918. — Hort. Upf. 193. — Sauvag. Montp. 283. — Mill. Dict. n°. 5. — Jacq. Hort. tab. 99. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 359. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 494.

Sisymbrium corniculatum. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 520. n°. 533.

Sisymbrium filiquis sessilibus, extrorsum recurvis. Hall. Helv. n°. 483.

Erysimum filiquis in alis foliorum sessilibus. Hort. Clif. 337.

Erysimum polyceratum, seu corniculatum. C. Bauh. Piu. 101. — Tourn. Inst. R. Herb. 128. — Garid. Aix, pag. 64.

Erysimum alterum Matthioli, filiquis parvis, quibusdam dentatis. J. Bauh. Hist. 2. pag. 864.

Erysimum alterum. Lobel. Icon. 206.

Iris altera Matthioli. Dalech. Hist. 1. pag. 653. Icon.

Elle a de grands rapports avec le *Sisymbrium irio* : elle en diffère par ses filiques nombreuses, presque fasciculées dans les aisselles des feuilles, & par les dentelures des feuilles plus aiguës.

Ses racines sont dures, grêles, simples, blanchâtres, allongées, garnies de quelques fibres. Ses tiges sont couchées, étalées, nombreuses, longues de huit à dix pouces, roides, cylindriques, d'un vert-blanchâtre, finement glabres, feuillées dans toute leur longueur. Les feuilles sont alternes, pétiolées, allongées, glabres & vertes à leurs deux faces, muées ou un peu échanquées en lyre, dentées; les dents très-aiguës, presque triangulaires, aiguës à leur sommet; les supérieures plus petites, presque sessiles.

Les fleurs sont petites, axillaires, sessiles, réunies plusieurs ensemble par paquets, surtout aux aisselles des feuilles supérieures. Leur calice est verdâtre, glabre, fort petit; la corolle d'un jaunepâle, un peu plus longue que les calices. Les filiques sont glabres, subulées, saillantes en dehors, médiocrement renflées à leur partie inférieure, cylindriques, saillantes & courbées en forme de corne, comme articulées par la saillie des semences, qui sont fort petites & renflées. Ces filiques occupent presque toute la longueur de la plante.

Cette plante croît en Suisse, dans l'Italie, dans les départements méridionaux de la France, aux environs d'Aix & de Marseille, où je l'ai recueillie dans les terrains incultes, arides, & sur les vieux murs. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.) Elle passe pour diurétique & favorable dans les maladies de la vessie.

13. SISYMBRE à feuilles de tabouret. *Sisymbrium busifolium*. Linn.

Sisymbrium racemo flexuoso, foliis lyratis; caule erecto, folioso. Linn. Spec. Plant. pag. 918. — Amœn. Acad. vol. 4. pag. 323. — Gouan, Illustr. 42. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 495. — Bergeret, Phytogr.

Arabis busifolia. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 511. n°. 552.

Hesperis flore albo, minimo; siliqua longa, folio profunde dentato. Boerh. Lugd. Bar. 2. pag. 20. — Dilh. Hort. Eltham. pag. 179. tab. 148. fig. 177.?

Draba palustris, siliquosa, major, alba, bursa pastoris folio. Cup. Sic. 3.

Hesperis (dentata), foliis dentato-pinnatifidis, caule levi. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 918.?

Cette espèce se distingue à ses fleurs blanches, fort petites, qui forment, par leur disposition dans les aisselles des feuilles supérieures, une sorte de grappe flexueuse; à ses feuilles pinnatifides, en forme de lyre; à ses filiques grêles, très-longues.

Ses tiges sont droites, glabres, filées, cylindriques, médiocrement rameuses, un peu anguleuses, longues d'environ un pied & plus, feuillées dans toute leur longueur, un peu flexueuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles allongées, lancéolées, alternes, pétiolées; les radicales ovales-oblongues, pétiolées, profondément dentées ou un peu échanquées en lyre; les caulinaires, & surtout les supérieures, pinnatifides dans leur moitié supérieure, rétrécies en pétiole à leur base; les pinnules linéaires; la terminale plus grande que les autres, vertes, glabres à tous deux faces, assez semblables à celles du mouret bontie à berger, quelquefois presque linéaires, entières.

Les fleurs sont situées à l'extrémité supérieure & souvent flexueuse des tiges, dans les aisselles des feuilles; les supérieures presque point axillaires, formant une sorte de grappe terminale; elles sont presque sessiles. Le calice est glabre, verdâtre, à quatre petites folioles caduques, glabres, obtuses. La corolle est petite, blanche, un peu plus longue que le calice; les pétales entiers; les filiques grêles, allongées, redressées, très-glabres, cylindriques, aiguës, longues d'environ deux pouces & plus.

Cette plante croît dans la Sicile, l'Italie, en Suisse, dans les Pyrénées, & dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

14. SISYMBRE dentée. *Sisymbrium dentatum*. All.

Sisymbrium foliis angustissimis, subpinnatis, puberulis; pinnis minimis, linearibus, extremâ majore. (N.)

Sisymbrium foliis radicalibus ovatis, dentatis; caulinis pinnatis; pinnis linearibus, extremâ maximâ. Haller, Hiciv. n°. 681.

Sisymbrium busifolium. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 354.

Cardamine rancinata. Pourr. Aq. rab. 3. pag. 310.

Arabis pinnatifida. Lam. Dict. 1. pag. 227.

Sisymbrium dentatum. Allion. Flor. pedem. n°. 1001. tab. 57. fig. 3.

Hesperis foliis multifidis. Royen, Lugd. Bat. 338.?

Cette plante ne doit pas être confondue avec le *Sisymbrium busifolium*, dont elle est très-différente, non-seulement par sa petitesse, mais encore par la forme de ses feuilles.

Ses racines sont grêles, dures, filiformes, à peine fibreuses; il s'en élève des tiges en touffes gazeuses, droites ou inclinées, ou presque couchées, grêles, pubescentes, ou presque filiformes, hautes de trois à quatre pouces, simples, feuillées

les feuilles sont petites, pinnatifides; les radicales ovales, entières, très-courtes, simplement dentées à leurs bords, obtuses, rétrécies en pétioles à leur base; les autres, tant intérieures que supérieures, divisées en pinnales courtes, profondes; très-étroites, parallèles, simples, &c qui paroissent n'être que des dents profondes, linéaires; la pinnales terminale plus grande, ovale, glabre ou légèrement pubescente, un peu velue sur les pétioles.

Les fleurs forment une petite grappe droite, terminale. Les calices sont glabres, colorés, à quatre petites folioles obtuses, médiocrement ouvertes. La corolle est blanche, petite, mais plus longue que le calice; les pétales entiers; les filiques grêles, droites, longues, comprimées, glabres, soutenues par des pédoncules courts, pubescens; les semences très-petites, nombreuses, un peu faillantes.

Cette plante croît dans les montagnes alpines des départements méridionaux de la France, dans le Piémont. ○ (V. f.)

15. SISYMBRE à feuilles filiformes. *Sisymbrium filiforme*. Willd.

Sisymbrium filiforme axillaribus, subsessilibus, compressis; foliis linearibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 495. n°. 14.

C'est une plante fort petite, dont les tiges ont à peine deux ou trois pouces de haut. Elles sont garnies de feuilles alternes, simples, presque sessiles, longues d'un pouce, très-étroites, linéaires, presque filiformes, entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet, presque glabres à leurs deux faces; les supérieures quelquefois bidentées. Les fleurs sont fort petites, axillaires, presque sessiles; la corolle blanche; les pétales linéaires, obtus à l'extrémité de leur limbe, un peu plus longs que les calices; les filiques linéaires, comprimées, presque sessiles, un peu rudes, obtuses.

Cette plante croît dans la Sibérie, sur les bords du fleuve Kuma. ○ (Desfont. ex Willd.)

16. SISYMBRE toruleux. *Sisymbrium torulosum*. Desfont.

Sisymbrium ramis potulis; caule hirsuto; foliis lanceolatis, dentatis; filiquis erectis, sessilibus, subulatis, torulosis, pubescentibus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 84. tab. 159.

Sisymbrium racemo erecto; filiquis sessilibus, pubescentibus; foliis lanceolatis, dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 495. n°. 16.

Ses tiges sont droites, rameuses, hautes de huit à dix pouces, divisées des leur base en rameaux étalés, roides, cylindriques, hérissés de poils courts, garnis de feuilles alternes, rétrécies

en pétiole à leur base, lancéolées, pubescentes, dentées à leur contour, aiguës ou un peu obtuses à leur sommet, longues d'environ deux pouces &c plus, larges de trois à quatre lignes.

Les fleurs sont disposées ordinairement en grappes courtes, terminales; quelques-unes sortent immédiatement du collet de la racine, & sont dépourvues de feuilles. Le calice est velu, coloré, composé de quatre folioles linéaires; la corolle petite; les pétales blancs, un peu plus longs que le calice; leur limbe ovale, très-entier; le stigmate épais. Les filiques sont grêles, subulées, cylindriques, toruleuses, droites, velues, longues d'un pouce, contenant des semences nombreuses, fort petites.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans le royaume de Tunis, aux environs de Siba, dans les terrains incultes. Elle fleurit dans les premiers jours du printemps. (Desfont. ex Desfont.)

*** Tiges nues.

17. SISYMBRE des murs. *Sisymbrium murale*. Linn.

Sisymbrium foliis lanceolatis, fructuatis, duplicatodentatis; scapo ascendente; filiquis linearibus, compressis, erectis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. p. 84.

Sisymbrium subacule, foliis lanceolatis, sinuato-ferratis, leviusculis; scapis subcylindricis, ascendenti-bus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 918. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 351. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 496. n°. 17. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 535.

Sisymbrium foliis lanceolatis, sinuato-ferratis; caule subnudo, erectiusculo. Hort. Cliff. 317. — Royen, Lugd. Bat. 341. — Dalib. Parif. 204.

Eruca viminea, iberidis folio; flore lutea. Barrel. Icon. Rat. n°. 421. tab. 131.

Eruca decumbens. Manch. Method. 157.

1. *Sisymbrium (erucastrum), subacule; foliis lyrato-runcinatis, levibus; caule hispida*. Gouan, illustr. 42. tab. 20.

Cette espèce diffère peu du *Sisymbrium monense*: on l'en distingue à ses feuilles seulement sinuées & non pinnatifides; les lobes à double dentelure: elle est annuelle, & l'autre bisannuelle.

Ses tiges sont médiocrement couchées à leur base, hautes de six à huit pouces, un peu rudes, hérissées de quelques poils rares, feuillées seulement dans leur partie inférieure, nombreuses, médiocrement rameuses, & dont les racines sont dures, grêles, presque simples, blanchâtres, presque horizontales. Les feuilles radicales sont nombreuses, pétioles, oblongues, lancéolées, sinuées

finuées & lâchement dentées à leur contour ; les dents denticulées inégalement, obtuses ou aiguës, élargies presque en spatule vers leur sommet, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure, un peu pulpeuses, vertes à leurs deux faces, glabres ou munies en dessous de quelques poils rares.

Les fleurs sont disposées en une grappe nue, terminale, redressée ; les pédoncules sont alternes, distans, glabres, filiformes, au moins de moitié plus courts que les filiques, ouverts ; le calice petit, coloré, médiocrement ouvert, obtus, garni de quelques poils rares & courts. La corolle est jaune, d'une grandeur médiocre ; les pétales très-obtus. Les filiques sont droites, longues d'un pouce & plus, linéaires, comprimées, glabres, surmontées d'un stigmate obtus & persistant, contenant de petites semences nombreuses, roussâtres, saillantes en dehors.

Cette plante croît sur les murs ou dans les lieux pierreux, en France, aux environs de Paris. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Dans la variété β , les feuilles sont parfaitement glabres, roncées ou presque découpées en lyre à leurs bords. Elle croît dans les départemens méridionaux de la France.

18. SISYMBRE de Mona. *Sisymbrium monense*. Linn.

Sisymbrium acaule, foliis pinnato-dentatis, sub-pilosis; scapis levibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 918. — Lightf. Scot. 1. pag. 152. tab. 15. fig. 1. Bona. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 496. n°. 18. — Lam. Illustr. Gener. tab. 565. fig. 2.

Eruca monensis, laciniata; flore luteo, majore. Dillen. Eltham. tab. 111. fig. 135.

Les caractères qui séparent cette plante du *Sisymbrium murale*, sont si faibles, que peut-être pourroit-on l'y réunir comme variété.

Ses racines sont vivaces ; ses tiges longues de six à huit pouces, un peu couchées à leur base, glabres, très-lisses, garnies quelquefois d'une ou deux feuilles ; les autres sont toutes radicales, nombreuses, disposées en gazon, oblongues, lancéolées, étroites, pinnatifides, pétioles ; les découpures courtes, presque linéaires ou ovales, obtuses, médiocrement confluentes à leur base, munies à leur face inférieure, de quelques poils rares ; les feuilles caulinaires à pinnules plus étroites, linéaires, au nombre de trois ou cinq ; la terminale lancéolée, aiguë.

Les fleurs sont réunies en grappes lâches, terminales, droites, très-lisses. Les calices sont glabres, cylindriques, à peine ouverts, à quatre folioles un peu concaves, obtuses. La corolle est jaune, assez grande ; le limbe des pétales ovale ou

Botanique, Tome VII.

arrondi, obtus ; les filiques un peu cylindriques, alongées, presque point comprimées, longues de plus d'un pouce, soutenues par des pédoncules courts, filiformes, glabres, redressés ainsi que les filiques.

Cette plante croît en Angleterre, dans l'île de Mona & dans la Hongrie. \times

19. SISYMBRE sinué. *Sisymbrium repandum*. Willd.

Sisymbrium acaule, foliis oblongis, repando-finnatis scapisque glabris; filiquis compresso-tetragonis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 497. n°. 17.

Sisymbrium (monense). Villars, Plante du Dauph. vol. 3. pag. 350. tab. 39. — Allion. Flor. pedem. n°. 1003.

Sisymbrium sinuato-pinnatis, caulibus nudis, simplicibus. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 360.

Eruca perennis & saxatilis, radice crassa eruca victoria. Tourn. Schol. Botan. 81. — Gard. Aix, pag. 162.

Cette plante, confondue d'abord avec le *Sisymbrium monense*, en a été distinguée par Willdenow : elle s'en distingue par ses feuilles, qui ne sont point pinnatifides, mais simplement sinuées & même quelquefois très-entières & parfaitement glabres. Les racines sont fortes & grosses, les tiges simples, nues, un peu couchées à leur base, longues de trois à quatre pouces. Les fleurs sont réunies en grappes courtes, lâches à l'extrémité des tiges. La corolle est jaune, assez grande ; les filiques médiocrement pédonculées, très-longues, presque tétragones, ou relevées par une suture dans leur longueur.

Cette plante croît dans le Piémont & dans les départemens méridionaux de la France : je l'ai recueillie sur le mont Viso, aux environs d'Aix. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. \times

20. SISYMBRE de Tillier. *Sisymbrium Tillieri*. Willd.

Sisymbrium caule subnudo, paniculato; foliis glabris, radicalibus runcinato-sublyratis, caulinis basi pinnatifidis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 377. n°. 19.

Sisymbrium Tillieri. Bellard. Append. alter. à Flor. pedem.

Ses tiges sont droites, glabres, paniculées par les trois ou quatre grappes de fleurs qui les terminent, un peu feuillées. Les feuilles radicales sont glabres, pétiolées, longues d'un pouce & plus, rangées, presque pinnatifides ou en forme de lyre à leur contour ; le lobe terminal un peu arrondi, presque à cinq angles, un peu plus grand que les autres ; les feuilles caulinaires alternes,

D 4

oblongues ; les inférieures rongées, pinnatifides à leur partie inférieure ; les supérieures allongées, dentées, légèrement pinnatifides à leur base, obtusifs ; les fleurs sont jaunes, réunies en plusieurs grappes terminales.

Cette plante croît dans le Piémont, & se trouve dans la vallée d'Aoste. (Descript. ex Willd.)

21. SISYMBRE des vignes. *Sisymbrium viminalis*. Linn.

Sisymbrium acule, foliis lyratis, levibus ; scapis adscendentibus, floribus minutis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 919. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 497. n°. 21.

Sisymbrium pumilum. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 516. n°. 535.

Erica pumila, fœcula, bursa pastoris folio. Boccon. Sic. pag. 19. tab. 10.

Erica minima flore, Montpelienfis. J. Bauh. Hist. 2. pag. 861. Icon.

Erica vinealis, parvis luteis floribus. Morif. Blaz. pag. 263.

C'est une fort petite plante, dont les racines sont fibreuses & presque aussi longues que toute la plante ; elles produisent plusieurs tiges nues, glabres, cylindriques, hautes de trois à quatre pouces, souvent moins, très-grêles, la plupart inclinées à leur base, redressées à leur partie supérieure. Les feuilles sont toutes radicales, étendues en rosette sur la terre, étroites, allongées, glabres à leurs deux faces, échancrées en lyre à leur contour, obtuses à leur sommet, longues d'environ un pouce.

Les fleurs sont peu nombreuses, réunies en une grappe lâche à l'extrémité des tiges, médiocrement pédonculées ; les pédoncules glabres, simples, filiformes, de moitié au moins plus courts que les filiques. Le calice est court, à quatre folioles glabres, obtuses, médiocrement ouvertes ; la corolle est petite, de couleur jaune ; les pétales entiers, un peu plus longs que les calices. Les filiques sont courtes, glabres, cylindriques, à peine comprimées, droites, longues de six à huit lignes.

Cette plante croît dans les lieux acides & sablonneux, parmi les vignes, sur les vieux murs, en France, en Italie, dans la Sicile, aux environs de Paris. O (V. v.)

22. SISYMBRE de Barrelier. *Sisymbrium Barrelieri*. Linn.

Sisymbrium caule subnudo, ramofo ; foliis radicalibus, runcinatis, dentatis, hispida. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 919. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 498. n°. 22.

Sisymbrium minus. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 517. n°. 535.

Erica silvestris, minor, lutea, bursa pastoris minor, italica. Barrelier. Icon. rar. tab. 1016. Icon. Bona. (Non ad raphanum erucoidem. Linn. f.) — Tourn. Inst. R. Herb. pag. 227. — C. Bauh. Pin. 98. & Prodr. 39.

Cette espèce se rapproche un peu du *Sisymbrium viminalis* ; elle en est distinguée par ses tiges plus élevées, médiocrement rameuses, un peu feuillées : elles sont droites, cylindriques, grêles, hautes de cinq à six pouces, glabres, munies de quelques petits poils rares & courts, vertes, produites par une racine grêle, dure, blanchâtre, simple, allongée. Les feuilles radicales sont couchées sur la terre, & disposées en rond autour de la tige, un peu allongées, lancéolées, obtuses, déchiquetées & dentées à leur contour à peu près comme celles du pissenlit, chargées de quelques poils. A la base de chaque rameau, au dessous du point de leur insertion, est une petite feuille étroite, entière, sessile, linéaire, aiguë.

Les fleurs sont disposées en une petite grappe courte & souvent un peu inclinée à l'extrémité de chaque rameau & des tiges, médiocrement pédonculées. Les calices sont cylindriques, un peu courts, glabres, quelquefois un peu velus dans leur jeunesse ; la corolle d'une grandeur médiocre, de couleur jaune ; les pétales oblongs, entiers, obtus & arrondis à leur sommet ; les filiques glabres, oblongues, un peu toruleuses à l'endroit des semences.

Cette plante croît en Italie, en Espagne, dans les départements méridionaux de la France, & même aux environs de Paris, dans les endroits cultivés & caillouteux, selon M. Thuillier. O (V. v.)

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. La culture la rend presque méconnaissable par le développement qu'elle lui donne.

23. SISYMBRE des sables. *Sisymbrium arenosum*. Linn.

Sisymbrium caule subfolioso, ramofo ; foliis lyratis, reticulato-dentatis, hispida ; piliis ramofo. Linn. Spec. Plant. vol. 3. pag. 919. — Flor. suec. edit. 2. n°. 597. — Crantz. Austr. 47. — Hoffm. Germ. 235. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 498. n°. 23.

Erica foliis scabris, semipinnatis ; pinnis reticulatis, rariter dentatis. Haller, Helv. n°. 462.

Arabis arenosa. Scop. Carn. n°. 837. tab. 40. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 285. — vol. II. pag. 111. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 512. n°. 532. — Idem, Dict. vol. 1. pag. 222.

Eruc. silvestris, major minorque; foliis subsuperis, in orbem sp. su. Loef. Pruss. 68. tab. 13.

Eruc. carulea, in arenosis proveniens. C. Bauh. Pin. pag. 499.

β. Erysimum praeox, flore carneo. Bartel. Icon. Rar. tab. 136.

Cette plante, par ses corolles bleuâtres ou de couleur de chair dans la variété *β*, par ses calices fermés, par son port, a plus de ressemblance avec les *Asperis* & les *arabiz*, qu'avec les *Sisymbrium*; ce qui a déterminé plusieurs auteurs, & M. Lamarck en particulier, à la ranger parmi les *arabettes*. Cependant, comme cette réforme devoit entraîner aussi quelques autres espèces qui militent entre les *arabiz* & ce genre, dans lequel elles sont restées, j'ai cru devoir y rattacher également cette espèce. (Voyez, pour la description, dans cet ouvrage, l'article ARABETTE des sables, vol. 1. pag. 222.)

24. SISYMBRE de Valence. *Sisymbrium valentinum.* Linn.

Sisymbrium caule simpliciter, erecto, superne glabro; foliis lanceolatis, aspidatis, antorsum dentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 920. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 458. n° 24.

Erucula hirsuta, floribus albis. Bartel. Icon. Rar. n° 423. tab. 195. fig. 1.

Plante grêle, dont les tiges s'élèvent à peine à la hauteur de neuf à dix pouces, quelquefois un peu plus, & qui sont droites, cylindriques, à peine ramelées, munies vers leur base de poils rares & courts, parfaitement lisses à leur partie supérieure, presque point feuillées. Les feuilles radicales sont étroites, lancéolées, pinnatifides ou profondément dentées, rétrécies à leur base en un long pétiole, hérissées, tant à leurs faces qu'à leur contour, de poils blancs, roides, assez longs, inciaux. Les feuilles caulinaires sont rares, petites, sessiles, alternes, linéaires-lancéolées, point dentées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une grappe droite, glabre. Les pédoncules sont siliques, à peine pubescents, droits, ouverts, plus longs que les siliques. Les calices, un peu pubescents, sont courts, cylindriques, à quatre folioles presque aiguës; la corolle blanche, d'une grandeur médiocre; les pétales oblongs, obtus.

Cette plante se rencontre dans le royaume de Valence & à Madrid. ○

*** Feuilles ailes.

25. SISYMBRE de Parra. *Sisymbrium parra.* Linn.

Sisymbrium caulescens, foliis runcinatis, murica-

tis. Linn. Syst. veget. pag. 555. n°. 17. — Martell. pag. 255. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 499. n°. 25.

Ses tiges sont, les unes sans feuilles, droites, lisses, hautes d'un pied, terminées par des grappes de fleurs en panicule; les autres un peu feuillées, qui ne paroissent que la seconde année, tandis que les autres se montrent la première. Les feuilles radicales sont très-nombreuses, étalées en-rose sur la terre; les intérieures plus courtes, longues de six à sept pouces, lancéolées, rongées, presque pinnatifides à leur contour, assez semblables à celles du *thlopsi bursa pastoris*, hérissées à leur face supérieure, particulièrement à leurs bords, de verrues ou tubercules épars, mucronés; la plupart de ces tubercules disparaissent avec l'âge; la face inférieure rude au toucher. Les découperures sont oppoies, plus larges à leur base, dentées, rapprochées par paires à la partie inférieure des feuilles.

Les fleurs sont disposées en grappes paniculées & terminales. Les pédoncules sont roides, & dans plus longs que les siliques, recourbés un ou deux jours avant la floraison, redressés ensuite. Le calice est d'un vert-pâle, fermé, à quatre folioles lisses, tendres & baillantes à leur base. La corolle est jaune; les pétales ovales, obtus, écartés, très-entiers, une fois plus longs que le calice; le réceptacle muni de quatre glandes, dont deux opposées, subulées, bien plus longues que dans les autres espèces de ce genre, situées entre les plus longues éramines & les folioles intérieures du calice, dont elles occasionnent le rebatement; quatre étamines de la longueur du tube de la corolle; deux aussi longues que le calice; un ovaire cylindrique; le style subulé; le stigmate presque en tête, de la longueur des étamines; les siliques lisses, cylindriques, toruleuses à l'endroit des semences.

Cette plante croît à Parra. ○ ♂ (Descript. de Linn.)

26. SISYMBRE à siliques rudes. *Sisymbrium asperum.* Linn.

Sisymbrium siliquis scabris, foliis pinnatifidis; pinnis linearilanceolatis, subdentatis; corollis calice longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 920. — Sauvag. Monsp. 283. — Gouan, Monsp. pag. 326. n°. 6. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 522. n°. 535. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. n°. 26.

Sisymbrium foliis pinnatifidis, raro dentatis, angustissimis. Sauvag. 255.

Sisymbrium foliis pinnatifidis, foliolis inaequaliter laciniatis, siliquis scabris. Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 360. n°. 10.

Sisymbrium foetorum pinnis linearilanceolatis, Dd 2

raro densatis; corollis laevis, calice majoribus. Sauv. 243.

Sinapi parvum, siliquâ asperâ. J. C. Bauh. Pin. 499. & Prodr. 41.

Sisymbrium palustre, minus, siliquâ asperâ. Tourn. Hist. R. Herb. 226.

Sinapi monspeliensis, siliquâ asperâ, hispida. J. Bauh. Hist. 2. pag. 838. Icon. Bona.

Plante haute de trois à quatre pouces au plus, remarquable par ses filiques hérissées d'aspérités, & par les feuilles pinnatifides.

Ses tiges sont grêles, simples, dures, alongées, garnies de quelques fibres courtes; elles produisent plusieurs tiges droites, verdâtres, presqu'égales, médiocrement feuillées, un peu rametées à leur sommet. Les feuilles radicales sont alongées, lancéolées, très-nombreuses, profondément pinnatifides ou échancrées à leur contour, étendues sur la terre, où elles forment une rosette; les pinnules nombreuses, parallèles, rapprochées, linéaires-lancéolées, inégales, quelquefois un peu dentées, obtuses à leur sommet, médiocrement pétioles; les feuilles caulinaires alternes, sessiles, distantes, plus petites.

Les fleurs sont réunies en une grappe droite, terminale, soutenues par des pédoncules courts, ouverts, beaucoup plus courts que les filiques. Les fleurs sont jaunes, au moins une fois plus grandes que les calices; les pétales entiers, oblongs. Les filiques sont à peine longues d'un pouce, grêles, cylindriques, subulées, chargées d'aspérités formées par de petits points blanchâtres, rudes & presque imperceptibles.

Cette plante croît aux lieux humides, dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Montpellier, & en Espagne. ○ (V. f.)

27. SISYMBRE à filiques glabres. *Sisymbrium levigatum.* Willden.

Sisymbrium filiquis levibus, foliis pinnatis; pinnulis inferiorum densatis, superiorum foliorum linearibus, integerrimis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. n°. 27.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Sisymbrium asperum*; elle en diffère particulièrement par ses filiques très-glabres & plus longues. Ses feuilles radicales & inférieures sont ailées; les pinnules linéaires, munies de dents fortes, élargies. Les feuilles caulinaires supérieures, également ailées, ont leurs pinnules linéaires, très-entières, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont jaunes; les filiques glabres, longues d'un pouce & demi.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. ○ (Description, ex Willden.)

28. SISYMBRE millefeuille. *Sisymbrium millefolium.* Aiton.

Sisymbrium foliis supra decompositis, tomentosis; petalis caute majoribus. Aiton. Hort. Kew. vol. 2. pag. 391. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. n°. 28.

Sinapis (millefolia), foliis bipinnatis; pinnulis ovatis, serratis. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 127. — Idem, Collect. 1. pag. 41. — Encyclop. botan. vol. 4.

J'ai déjà décrit cette plante à l'article MOUTARDE; mais elle a tant de rapport avec les *Sisymbres*, surtout avec le *Sisymbrium sophia*, qu'elle doit être rapportée à ce genre; ce qui m'a déterminé à la mentionner ici. On en trouvera la description à l'article cité plus haut.

Elle ne diffère d'ailleurs du *Sisymbrium sophia* que par ses tiges presque ligneuses, par ses feuilles blanchâtres, ses folioles plus alongées, & par ses pétales plus grands que les calices.

29. SISYMBRE à petites fleurs. *Sisymbrium sophia.* Linn.

Sisymbrium petalis calice minoribus, foliis decompositis-pinnatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 922. — Flor. suec. 553-555. — Dalib. Paris. 204. — Mater. medic. 161. — Crantz. Austr. pag. 52. — Scop. Carn. 821. — Pollich. Pal. n°. 629. — Oeder. Flor. dan. tab. 528. — Ludw. Ect. tab. 75. — Blackw. tab. 440. — Kniph. Cent. 6. n°. 86. — Hoffm. Germ. 235. — Roth. Germ. vol. 1. p. 291. — vol. II. pag. 130. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. n°. 29.

Sisymbrium parviflorum. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 519. n°. 535.

Sophia pinnis & pinnulis pinnatis; laciniis linearibus, subhispidis. Hall. Helv. n°. 484.

Sisymbrium corollæ calice minore; foliis multifidis, linearibus. Flor. lapp. 261. — Roy. Lund. Bai. 341.

Deffense. Guettard, Stamp. vol. 2. pag. 164.

Nasturtium silvestre, tenuissimè divisum. C. Bauh. Pin. 105.

Sisymbrium annuum, abstinii minoris folio. Tourn. Hist. R. Herb. 226.

Sophia chirurgorum. Lobel. Icon. tab. 378.

Seriphium germanicum, sive sophia quilibet. J. Bauh. Hist. 2. pag. 886. Icon. ?

Seriphium abstinium. Fuchs, Hist. 2. Icon.

Vulgairement gâsse des chirurgiens, *thalitron*.

On distingue cette plante à la petitesse de ses fleurs, aux folioles petites & nombreuses de ses

feuilles, à ses filiques grêles, cylindriques, redressées.

Ses racines sont blanches, dures, presque simples, médiocrement fibreuses; elles pouillent des tiges droites, hautes d'environ un pied & demi, fermes, cylindriques, rameuses, verticillées, un peu pubescentes. Ses feuilles sont alternes, d'un vert-blanchâtre, légèrement pubescentes, assez semblables à celles de la petite absinthe, deux fois ailées, très-finement découpées, dont les folioles sont courtes, menues, entières, aiguës.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges & des rameaux, des grappes droites, allongées, dont les pédoncules sont nombreux, épars, ouverts, filiformes, plus courts que les filiques. Le calice est glabre, petit, un peu coloré ou verdâtre. La corolle est fort petite, presque plus courte que le calice, de couleur jaune. Les filiques sont longues de près d'un pouce, grêles, cylindriques, aiguës.

Cette plante croit en Europe, en France sur les vieux murs, parmi les décombres, dans les lieux incultes, où elle est assez commune. ○ (P.v.)

Elle passe pour vulnéraire, détersive, astringente, scabreuse & vermifuge. Elle a une saveur acre, astringente. On donne ses semences, à la dose d'un gros, dans un potage ou du vin, pour arrêter le cours de venre. Le suc, la conserve & l'extrait de ses feuilles & de ses fleurs sont favorables dans le crachement de sang, pour les fleurs blanches & le flux immodéré des hémorrhoides. Toute la plante, pilée & appliquée sur les blessures & les ulcères, les guérit, dit-on, en très-peu de tems. Ses propriétés, long-tems en grande réputation, sont aujourd'hui très-douteuses: on ne l'emploie presque plus. Les moutons, les vaches, quelque fois les chèvres & les chevaux la mangent: les cochons n'en veulent point.

30. SISYMBRE blanc. *Sisymbrium album*. Pall.

Sisymbrium foliis albidis pubescentibus, pinnatis; foliis obtusis, basi attenuatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 501. n°. 30.

Sisymbrium foliis pinnatis; pinnis integerrimis, confluentibus; filiquis brevioribus. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 269.

Sisymbrium album. Pallas, Iter 3. Append. n°. 102. tab. U.

Ses tiges sont hautes de six à sept pouces, droites, légèrement tomenteuses, produites plusieurs ensemble par une racine ligneuse. Les feuilles sont blanchâtres, pubescentes; les radicales ailées, divisées en pinnules ovales, quelquefois bifides; les folioles supérieures confluentes; les feuilles caulinaires ailées, composées de folioles lancéolées, très-entières, rétrécies à leur base, obtuses à leur

sommet; les terminales confluentes. La corolle est blanche; les pétales plus grands que le calice; les filiques lisses, linéaires, cylindriques, droites, aiguës.

Cette plante croit dans la Sibirie, sur les bords du lac Baikal. x (Descript. ex Willd.)

31. SISYMBRE cendré. *Sisymbrium elaeagnum*. Desfont.

Sisymbrium foliis angustis, pubescentibus, inaequaliter pinnatis; foliis apiculatis, crassifolia; filiquis compressis, laxis, linearibus, pedicello longioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 83. tab. 157.

Sisymbrium foliis pubescentibus, subernosis; pinnatis, pinnis linearifolioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 501. n°. 31.

Plante remarquable par la couleur cendrée répandue sur toutes ses parties; par ses feuilles irrégulièrement ailées, à pinnules étroites, grasses, obtuses.

Ses racines sont droites, simples, grêles, garnies de quelques fibres: il s'en élève plusieurs tiges droites, rameuses, hautes d'environ un pied, légèrement pubescentes, feuillées, divisées en rameaux alternes, étalés, presque filiformes, paniculés. Les feuilles sont pétiolées, alternes, étroites, linéaires, un peu charnues, ailées, les folioles distantes, inégales, linéaires, entières, obtuses, quelquefois munies de quelques dents écartées, obtuses.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes courtes, très-lâches, formant par leur ensemble une sorte de panicule. Le calice est petit, caduc, pubescent, divisé en quatre folioles elliptiques, linéaires, obtuses. La corolle est d'un violet-clair, une fois plus longue que les calices. Les pétales ont leur limbe ovale-oblong, très-entier, obtus; le style manque. Le stigmate est épais, obtus; les filiques pubescentes, linéaires, très-étroites, comprimées, distantes, redressées, longues au moins d'un pouce, renfermant des semences nombreuses, fort petites, saillantes en dehors. Les pédoncules sont filiformes, ouverts, plus courts que les filiques.

Cette espèce a été recueillie par M. Desfontaines, dans les sables proche Casia dans la Barbarie. ○ (Descript. ex Desfont.)

32. SISYMBRE élevé. *Sisymbrium altissimum*. Linn.

Sisymbrium foliis runcinatis, flaccidis; foliis sublinearibus, integerrimis; pedunculis laxis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 920. — Hort. Upf. 1793. — Sauvag. Monsp. 229. — Mill. Dict. n°. 7. — Pallas, Iter 3. pag. 556. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 501. n°. 32.

Sisymbrium erysimifolium. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 521. n°. 535. var. 7.

Sisymbrium (Walteri), foliis hastato-pinnatis, subsessilibus; siliquis longissimis, striato-subquadrangulis; vultu glauco. Crantz. Austr. pag. 51. n°. 6.

Sisymbrium foliis pinnato-hastatis, flaccidis; foliolis sublinearibus, integerrimis; pedunculis laxis. Linn. Spec. Plant. 659. — Gouan, Monsp. p. 327. n°. 8.

Sisymbrium foliis pinnato-hastatis; siliquis longissimis, nutantibus, remotis. Var. 1. Getard, Flor. gall. Prov. pag. 361. n°. 12.

Erysimum filiquis laxis, foliis hastato-pinnatis. Hort. Cliff. 338. — Sauvag. Monsp. 184.

Erysimum foliis sinuatis; siliquis longissimis & stricissimis. Buxb. Cent. 5. pag. 26. tab. 51.

Erysimum monspessulanum, sinapios folio. Walter. Hort. 135. tab. 22.

Erysimum italicum, siliquis longissimis. C. Bauh. Pin. 95. ?

Cette espèce se rapproche beaucoup des *sinapis* par son calice très-ouvert; elle se distingue de ses congénères par la hauteur de ses tiges, par la longueur de ses siliques, par ses pédoncules très-lâches, & par ses feuilles ailées & presque en fer de pique.

Ses tiges sont droites, cylindriques, d'un vert presque glauque, à peine striées, glabres ou légèrement velues, feuillées, rameuses, hautes de deux à trois pieds; les rameaux alternes, étalés. Les feuilles sont alternes, pétiolées, distantes, molles, vertes à leurs deux faces, ordinairement très-glabres, quelquefois chargées, surtout les inférieures, de quelques poils rares & courts; les feuilles radicales & caulinaires inférieures & moyennes pinnatiles; les pinnules distantes, horizontales, parallèles, lancéolées, aiguës, entières ou un peu dentées, médiocrement élargies, confluentes à leur base; le lobe terminal triangulaire ou lancéolé en fer de pique; les feuilles supérieures & terminales la plupart entières, pétiolées, allongées, étroites, lancéolées, quelquefois un peu denticulées, longues de deux ou trois poices.

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale très-lâche; les pédoncules alternes, distans, au moins de moitié plus courts que les filiques; glabres, filiformes ou un peu pubescens. Les calices sont courts, obtus, d'un vert jaunâtre, chargés de quelques poils rares, très-fins. La corolle est petite, immitte, à peine plus longue que le calice; les filiques sont grêles, longues de deux ou trois poices & plus, comprimées, un peu arquées, à peine pubescentes, redressées & formant

un angle aigu avec la tige, contenant des semences fort petites, touffues.

Cette plante croît dans les lieux incultes en France, dans les départemens méridionaux; en Autriche, dans la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.)

33. SISYMBRE de Thuringe. *Sisymbrium echartsbergense*. Willd.

Sisymbrium foliis runcinatis, flaccidis, margine scabris, integerrimis; siliquis filiformibus, inflexo-patulis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 502. n°. 33.

Sisymbrium austriacum. Jacq. Flor. austr. tab. 262. ?

Willdenow rapporte au *Sisymbrium austriacum* de Jacquin cette espèce, qu'il désigne cependant sous un autre nom, celui que portoitent les semences qu'on lui a envoyées de cette espèce. Il la regarde comme très-voisine du *Sisymbrium altissimum*, mais dont cependant elle diffère par ses feuilles oncinées, molles, très-dures à leurs bords, & principalement par ses filiques beaucoup plus étroites, plus courtes, filiformes, étalées & réfléchies.

Cette plante paroît croître naturellement dans la Thuringe. ☉

34. SISYMBRE de Hongrie. *Sisymbrium pannonicum*. Jacq.

Sisymbrium foliis inferioribus runcinatis, dentatis, superioribus pinnatis; pinnis linearibus, integerrimis; siliquis rectangulis patentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 502. n°. 34.

Sisymbrium (pannonicum), foliis caulinis, superioribus pinnatis; pinnis linearibus, integerrimis; caulinis elongatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. p. 392. — Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 123. — Idem, Collect. 1. pag. 70.

Sisymbrium (linapios), foliis radicalibus runcinatis, dentatis; caulinis incisifs, linearibus, glabris; siliquis patentibus. Retz. Observ. botan. 3. p. 37.

Ses tiges sont droites, solitaires, hautes d'environ un pied & demi, cylindriques, rameuses à leur partie supérieure, velues particulièrement vers leur base, glabres à leur sommet, garnies de feuilles pétiolées, alternes; les inférieures oblongues, obtuses, rétrécies à leur base, un peu velues; les unes entières, denticulées ou dentées; les autres roncées ou pinnatiles vers leur base; les feuilles supérieures très-glabres, d'autant plus pinnatiles, qu'elles se rapprochent davantage du sommet; enfin les dernières ailées; les pinnules linéaires-lancéolées, aiguës, quelquefois un peu dentées, plus ordinairement entières.

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale très-lâche. Le calice est d'un vert-pâle, com-

posé de quatre folioles linéaires, obtuses, très-ouvertes, caduques; la corolle d'une grandeur médiocre, d'un jaune-pâle; les pétales obtus, oblongs; leurs onglets droits, de la longueur du calice. Les filiques sont glabres, linéaires, droites, très-étalées, très-longues, écartées des tiges en angle droit, très-médiocrement pédonculées.

Cette plante croît dans la Hongrie. ○ (*Descript. ex Jacq.*)

35. SISYMBRE à feuilles de vélar. *Sisymbrium erysimoides*. Desfont.

Sisymbrium erectum, foliis glabris, pinnatifidis, inaequaliter dentatis, loco terminali majore; siliquis subulatis, sessilibus, horizontalibus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 84. tab. 178.

Sisymbrium foliis runcinatis-lyratis, dentatis, glabris; siliquis subangulatis pennis, subpedunculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 502. n°. 55.

Cette plante est entièrement glabre; elle se rapproche, par la forme de ses feuilles, de l'*erysimum officinale*, &c. se distingue par ses filiques presque sessiles.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & demi ou deux pieds, fermes, glabres, légèrement striées, simples ou médiocrement rameuses. Ses feuilles sont amples, pinnatifides ou profondément échan-crées en lyre, longues d'environ six pouces sur trois de large. Les découpures, au nombre de cinq à sept, sont oblongues, presque lancéolées, élargies, confluentes à leur base, inégales, dentées à leur contour; les dents inégales, aiguës. Le lobe terminal, beaucoup plus grand que les autres, est souvent lobé, incisé ou denté. Les fleurs, fort petites, forment une grappe terminale, droite, lâche, longue de près d'un pied. Le calice est glabre, un peu ouvert, à quatre folioles linéaires. La corolle est blanche, de la longueur du calice; elle avorte quelquefois. Il n'y a point de style. Les filiques sont horizontales, sessiles ou presque sessiles, subulées, glabres, grêles, un peu comprimées, longues au moins d'un pouce, renfermant des semences petites, nombreuses, roussâtres, oblongues.

Cette espèce a été découverte par M. Desfontaines, dans les sables, aux environs de Kérouan, dans le royaume de Tunis. Elle fleurit dans l'hiver. (*Descript. ex Desfont.*)

36. SISYMBRE IRIU. *Sisymbrium irio*. Linn.

Sisymbrium foliis runcinatis, dentatis, nudis, caule levi, siliquis erectis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 921. — Flor. luec. 2. n°. 196. Amer. Acad. vol. 4. pag. 279. — Mill. Dict. n°. 8. — Pallas, iter 3. pag. 681. — Jacq. Flor. austr. tab. 322. — Vahl, Symb. 2. pag. 77. — Hoffm. Germ. 236. —

Roth. Germ. vol. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 503. n°. 56.

Sisymbrium erysimastrum. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 521. n°. 535. var. «

Sisymbrium (pinnatifidum), siliquis glabris, foliis lyrato-pinnatifidis. Forsk. Flon. Egypt. arab. pag. 118.

Erysimum foliis lyrato-pinnatis, extimo hastato. Flor. luec. 556. — Dalib. Paris. 201. — Sauvag. Moosf. 284.

Erysimum latifolium, majus, glabrum. C. Bauh. Pin. 101. — Tourm. Inst. R. Herb. 228.

Erysimum secundum. Tabern. Hist. Icon. 240.

Irio levis, apulus, eruca folio. Col. Exphr. 1. pag. 264. tab. 265.

Sinapi sylvestre, monspessulanum, lato folio; flosculo lateo, minimo; siliqua longissima. J. Bauh. Hist. 2. pag. 858. Icon.

Cette espèce, très-voisine du *sisymbrium altissimum*, en diffère par ses tiges moins élevées, par ses feuilles, dont les terminales sont semblables aux inférieures, &c. non divisées en longues découpures linéaires; elles sont d'ailleurs plus fortement dentées; les filiques sont bien plus rapprochées des tiges, &c. plus grêles: elle a encore beaucoup de rapports avec le *sisymbrium Colonus & Lasellii*: on l'en distingue par ses parties toutes très-glabres, à peine chargées quelquefois de quelques poils rares.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & demi environ, tendres, très-glabres, cylindriques, médiocrement rameuses, quelquefois légèrement chargées de poils très-fins & distans, feuilles dans toute leur longueur; un peu fistuleuses. Les feuilles ressemblent assez à celles du pissenlit; elles sont pétioleuses, alternes, glabres, assez nombreuses, pinnatifides ou roncées, lancéolées, élargies; les pinnules profondes, horizontales, parallèles, lancéolées, ordinairement aiguës, lâchement & irrégulièrement dentées; les denelures inégales, aiguës; les feuilles supérieures & terminales plus étroites, moins composées; la pinnule terminale plus allongée.

Les fleurs sont nombreuses, disposées en une grappe terminale, droite, allongée. Le calice est glabre, petit, un peu coloré; la corolle fort petite, d'un jaune-pâle; les filiques éparées, rapprochées, un peu serrées contre les tiges, glabres, très-grêles, presque filiformes, cylindriques, longues d'environ deux pouces, soutenues par des pédoncules à peine ouverts, filiformes, ayant à peine le quart de la longueur des filiques. Les semences sont fort petites, roussâtres, nombreuses.

Cette plante croît dans les terrains cultivés de

l'Europe. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

37. SISYMBRE de Columna. *Sisymbrium Columna*. Linn.

Sisymbrium foliis runcinatis, dentatis, & caule villosis, subincanis. Linn. Syst. veget. pag. 596. — Jacq. Flor. austr. tab. 323. — Hoffm. Germ. 236. — Roth. Germ. vol. II. pag. 133. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 503. n° 37.

Sisymbrium (irio), foliis lingani aut hasta forma pinnatis; filiquis longis striatis, hirsutis. Crantz. Stirp. Austr. pag. 49. n° 5.

Rapistrum montanum, irionis folio. Col. Ecphr. 1. pag. 266. tab. 268.

Il y a de très-grands rapports entre cette plante & le *Sisymbrium irio*, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Ses principales différences consistent dans ses feuilles & ses tiges pubescentes, un peu blanchâtres, & dans les fleurs d'un jaune très-pâle.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu striées, hautes d'un à deux pieds, munies de poils courts, cendrés; garnies de rameaux alternes, peu nombreux. Les feuilles sont pétiolées, alternes, molles, médiocrement pubescentes & un peu blanchâtres, quelquefois presque glabres, un peu velues sur leur pétiole, pinnatifides, lancéolées; les pinnules profondes, presque elliptiques, légèrement sinuées ou à peine denticulées à leurs bords; la foliole terminale plus longue, lancéolée.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une grappe droite, allongée. Les calices sont courts, d'un vert-blanchâtre, à peine pubescents. La corolle est fort petite, d'un blanc-jaunâtre ou un peu citron, ouverte; les filiques droites, filiformes, un peu glauques, pubescentes, longues de deux pouces & plus, obtuses, soutenues par un pédoncule court.

Cette plante croît en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie; dans les terrains secs. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

38. SISYMBRE de Loëfel. *Sisymbrium Loefelii*. Kinn.

Sisymbrium foliis runcinatis, acutis, hirsis; caule retrorsum hispido. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 921. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 322. — Reyg. Ged. t. pag. 167. n° 6. — Gouan. l'Instr. 42. — Pollich. Pal. n° 630. — Jacq. Flor. austr. tab. 324. — Kniph. Cent. 12. n° 91. — Hoffm. Germ. 236. — Roth. Germ. vol. I. pag. 291. — vol. II. pag. 133. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 504. n° 38.

Sisymbrium erysimifolium. Vat. p. Lam. Flor. fr. pag. 321. n° 333.

Sisymbrium (Loefelii), foliis hastato-pinnatis, saepe hirsis; caule ramisque pilis albis splendens; hispida. Crantz. Stirp. Austr. pag. 48. n° 4.

Erysimum angustifolium, majus. C. Bauh. Pin. 107. — Tournef. Inst. R. Herb. 228.

Sinapi erysimo trapi cognatum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 857. Icon.

Erysimum hirsutum, filiquæ eruca. Loëf. Pfuff. 69. tab. 4.

Erysimum foliis pinnatis, extima pinnâ triangulâ; petiolis longis, hirsutis. Haller, Goett. 248.

Rapistrum montanum, irionis folio, macroleptocorotum. Columna. Ecphr. 1. pag. 266. tab. 268.

Peu distinguée du *Sisymbrium Columna*, également rapprochée du *Sisymbrium irio*, cette plante ne diffère de tous deux que par les tiges non pubescentes, mais hérissées de poils un peu roides, la plupart recourbés; par les feuilles découpées profondément en pinnules presque triangulaires, & non horizontales & parallèles.

Ses racines sont grêles, blanchâtres, presque simples, un peu fibreuses: il s'en élève des tiges droites, hautes d'environ un pied & plus, cylindriques; verdâtres, striées, un peu purpurines à leur base, feuillées dans toute leur longueur, ordinairement simples ou rameuses à leur sommet, hérissées de poils courts, blanchâtres, rudes, horizontaux ou inclinés vers la terre. Les feuilles sont alternes, pétiolées, assez larges, aiguës, chargées plus ou moins de poils roides, divisées profondément en pinnules presque triangulaires, incisées ou dentées à leur contour; les inférieures souvent purpurines; les pétioles velus.

Les fleurs sont petites, disposées en grappes terminales, dont les rameaux sont blanchâtres, velus; les calices colorés, à quatre folioles en partie ouvertes, pileuses. La corolle est fort petite, de couleur jaune, ouverte; les pétales entiers. Les filiques sont longues, grêles, droites, quelquefois légèrement arquées, presque glabres, surmontées par le stigmate obtus & persistant, longues d'environ deux pouces, médiocrement pédonculées.

On trouve cette plante en France, en Allemagne, dans les environs de Paris; elle croît dans les lieux cultivés. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris: elle fleurit pendant tout l'été. ○ (V. v.)

39. SISYMBRE à angles obtus. *Sisymbrium obtusifolium*. Willden.

Sisymbrium foliis pinnatifidis, obtusis, dentatis, amplexicaulis; caule retrorsum hispido. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 504. n° 39.

Sisymbrium

Sisymbrium obtusangulum. Schleich. Cat. p. 48.

Sisymbrium jacobaeifolium. Berger. Phytogr. Ic.

Eruca caule hirsuto, foliis semipinnatis, pinnis subrotundo-dentatis. Haller, Helv. n°. 459.

Eruca inodora. J. Bauh. Hist. 2. pag. 862. Icon.

Cette espèce a beaucoup de rapports, par la forme de ses feuilles & par son port, avec le *Sisymbrium burffolium*; mais, outre des différences assez notables qui existent dans ces mêmes feuilles, on la distingue très-aisément en ce que ses filiques ne font pas axillaires, mais disposées en une grappe terminale.

Ses racines sont blanchâtres, dures, épaisses, presque simples, médiocrement fibreuses: il s'en élève des tiges droites, rameuses presque dès leur base, hautes d'un pied ou d'un pied & demi, striées, cannelées, presque anguleuses, chargées, principalement à leur partie inférieure, de poils rares, courts, leur pointe dirigée vers les racines. Les rameaux sont allongés, effilés, semblables aux tiges. Les feuilles sont alternes, vertes, presque glabres, ailées ou pinnatides; les pinnules très-angulaires & insensiblement plus petites en allant du sommet vers la base; les pinnules supérieures un peu confluentes à leur base, presque lancéolées, obtuses, divisées à leurs bords en lobes ou en dents larges, distantes, inégales, obovées; les pinnules inférieures, ou situées sur le pétiole, très-courtes, distantes, entières, ou un peu dentées; enfin la dernière paire de pinnules, tout-à-fait à la base du pétiole, embrasse la tige à demi, & ressemble à des stipules.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en une grappe droite, allongée, lâche, un peu pubescente. Les calices sont glabres, à quatre folioles colorées, concaves, un peu aiguës. La corolle est jaune, d'une grandeur médiocre; les filiques très-glabres, longues d'environ un pouce, grêles, droites, un peu tétragones, surmontées par le stigmate obtus & persistant; les pédoncules filiformes, ouverts, épars, de moitié plus courts que les filiques.

Cette plante croît en Suisse & dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. f.)

40. SISYMBRE d'Orient. *Sisymbrium orientale*. Linn.

Sisymbrium foliis runcinatis, tomentosis; caule levi. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 921. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 322. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 594. n°. 40.

Erysimum orientale, folio sonchi, flore sulphureo, filiquis longissimis. Boerh. Lugd. Bat. t. pag. 14. — Haller, Goetr. 148.

Botanique. Tome VII.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *Sisymbrium irio*, dont il diffère particulièrement par ses feuilles tomenteuses. Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses, feuillées, très-lisses, garnies de feuilles alternes, assez semblables à celles du laitron, presque pinnatides ou fortement déchiquetées, tomenteuses; les découpages profondes, irrégulières, la plupart hautes, aiguës. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, allongées. La corolle est d'un jaune de soufre; les filiques glabres, pédonculées, très-longues, presque filiformes, nombreuses.

Cette plante croît dans l'Orient. ○

41. SISYMBRE barbaree. *Sisymbrium barbarea*. Linn.

Sisymbrium foliis simplicibus, spathulato-ovatis, dentatis, amplexicaulis, nudis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 921. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 595. n°. 41.

Sisymbrium orientale, barbarea facie, plantaginifolio. Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. pag. 16.

Cette plante a le port & presque les feuilles de l'*Erysimum barbarea* Linn. Ses tiges sont droites, glabres, anguleuses, rameuses, hautes de deux pieds environ ou moins. Les feuilles radicales sont entières, ovales, en cœur; les caulinaires inférieures & intermédiaires alternes, pinnatides; les pinnules opposées, presque parallèles, glabres, entières, obtuses; la pinnule terminale très-grande, ovale, sinuée ou dentée à ses bords, obtuse, quelquefois médiocrement arrondie; les feuilles supérieures entières, presque lancéolées, fortement & irrégulièrement dentées à leur contour; les dentelures aiguës.

Les fleurs sont disposées en grappes nombreuses, droites, terminales. Le calice est glabre, coloré, obtus, médiocrement ouvert; la corolle blanchâtre ou un peu jaunâtre, petite, plus grande que le calice; les pétales entiers. Les filiques font un peu étalées, striées, longues de plus d'un pouce, un peu arquées, cylindriques, un peu comprimées, assez grosses, surmontées du stigmate persistant, soutenues par des pédoncules roides, épais, fort courts.

Cette plante croît dans l'Orient. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

42. SISYMBRE de Portugal. *Sisymbrium catholicum*. Linn.

Sisymbrium filiquis filiformibus, levibus; foliis pinnatis, denticulatis, caulinis. Linn. Syst. veget. pag. 597. — Mantiss. 93. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 5. n°. 43.

Ses tiges sont droites, hautes de huit à dix pouces ou d'un pied, très-lisses, garnies de feuilles

alternes, pétiolées, les radicales ainsi que les caulinaires lisses, tendres, ailées, composées de folioles oblongues, dentées en scie à leurs bords. Souvent confluantes à la partie supérieure du pétiole. Les fleurs sont longuement pédonculées, disposées à l'extrémité des tiges en une grappe allongée. Le calice est composé de quatre folioles très-lisses. La corolle est jaune, assez grande; les pétales entiers, en ovale renversé; les filiques grêles, filiformes, distantes, très-lisses.

Cette plante croît en Espagne & dans le Portugal.

43. SISYMBRE à feuilles en lyre. *Sisymbrium lyratum*.

Sisymbrium foliis inferioribus lyrato-runcinatis, superioribus lineari-lanceolatis, remotè dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 505. n°. 42.

Sisymbrium (lyratum), foliis inferioribus sublyratis, superioribus inciso-lanceolatis; siliculis linearibus, obusis-fusis. Burm. Flor. ind. 117.

Ses tiges sont droites, plus ou moins rameuses, glabres, garnies de feuilles alternes, presque pinnatifides; les inférieures déchiquetées ou échancrees en forme de lyre, irrégulièrement dentées; les feuilles caulinaires supérieures incisées, lacinées ou linéaires, lancéolées, grossièrement dentées; les dentelures distantes entr'elles. Les fleurs sont disposées en grappes terminales. Les calices sont glabres; la corolle jaune; les filiques linéaires, obtuses.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♀

44. SISYMBRE hétérophylle. *Sisymbrium heterophyllum*. Forster.

Sisymbrium foliis pinnatis; foliis reniformibus, subulobis; inferioris pinnatifidis, pilosis. Forst. Prodr. n°. 250. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 505. n°. 44.

Quoique Forster ne nous donne, sur cette plante qu'il a découverte, que très-peu de détails, les caractères qu'il lui attribue, sont assez particuliers pour qu'on puisse la distinguer aisément de ses congénères. Ses feuilles inférieures sont pileuses, pinnatifides; les feuilles supérieures alternes, ailées, composées de folioles en forme de coin, & presque divisées en trois lobes à leur contour.

Cette plante a été recueillie par Forster dans la Nouvelle-Zélande.

45. SISYMBRE des glaces. *Sisymbrium glaciale*. Forster.

Sisymbrium siliculis filiformibus, levibus; foliis pinnatis; foliis reniformibus, ciliatis. Forster in Comment. Goett. 9. pag. 36. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 506. n°. 45.

Plante herbacée, haute de six à sept pouces, qui a des rapports avec le *sisymbrium heterophyllum*, mais dont elle diffère par les folioles ciliées un peu différentes, & dont les tiges sont simples, cylindriques, presque lisses, dichotomes à leur partie supérieure, feuillées; les rameaux droits, allongés. Les feuilles radicales sont nombreuses, réunies en gazon; les feuilles caulinaires alternes, toutes ailées, composées de trois à quatre paires de folioles avec une impaire, inférieurement plus petites du sommet à la base, un peu arrondies, obliques, ciliées à leurs bords, un peu distantes; la terminale plus grande, réniforme, légèrement crénelée ou médiocrement incisée; les feuilles florales pinnatifides; les fleurs blanches, d'une grandeur médiocre; les filiques lisses & filiformes.

Cette plante croît à la Terre-de-Feu, dans les lieux humides, sur les montagnes un peu au dessus de la région des neiges. ♀ (*Descript. ex Forster.*)

46. SISYMBRE à feuilles de géranium. *Sisymbrium geraniifolium*.

Sisymbrium glaberrimum, foliis subpinnatis; pinnis inciso-lobatis, acutis; siliculis fusulatis, erectis. (N)

Ses tiges sont droites, tendres, herbacées, assez élevées, rameuses, feuillées, lisses, un peu jaunâtres, très-glabres, garnies de feuilles amples, alternes, pétiolées, presque deux fois ailées, vertes, glabres à tous deux faces; les pinnules pétiolées, opposées ou alternes, pinnatifides; les découpures larges, lobes ou profondément incisées; les lobes incisés ou fortement dentés; les dentelures irrégulières, aiguës, presque mucronées.

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale, courte, touffue. Le calice est ouvert, composé de quatre folioles verdâtres, linéaires, obtuses. La corolle est grande, de couleur blanche, assez semblable à celle des basilica; les pétales ovales, arrondis, très-entiers, ongiculés; les étamines & le pistil plus courts que la corolle. Les filiques sont droites, glabres, presque cylindriques, un peu subulées, obtuses, longues d'un à deux pouces, soutenues par des pédoncules redressés, glabres, cylindriques, longs au moins d'un pouce.

Cette plante croît au détroit de Magellan, où elle a été recueillie par Commerçon. (V. f. in herb. Juss.)

***** Feuilles lancéolées & entières.

47. SISYMBRE à feuilles pubescentes. *Sisymbrium strictissimum*. Linn.

Sisymbrium foliis oblongo-lanceolatis, dentatis, pubescentibus; petiolatis; siliculis patentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 506. n°. 46.

Sisymbrium foliis lanceolatis, dentato-ferratis, caulinis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 921. — Hort. Cliff. 337. — Hort. Upf. 192. — Roy. Lugd. Bat. 341. — Jacq. Vind. 122. — Flor. austr. tab. 194. — Crantz. Stirp. Austr. pag. 54. — Hoffm. Germ. 236. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 291. — Il. pag. 134. — Gouan, Hort. Monip. pag. 327. n.º 10.

Eruca caule paniculato; foliis nervosis, ovato-lanceolatis, integerrimis. Hall. Helv. n.º 458.

Draba lutea, foliis stridissimis. C. Bauh. Pin. 110.

Arabis quibusdam, dista planta. Camer. Epitom. 342.

Hesperis lutea, foliis stridissimis. Tourn. Inst. R. Herb. 222.

Draba lutea quibusdam. J. Bauh. Hist. 2. p. 870. Sine icon.

On distingue aisément cette espèce à ses filiques grêles, allongées, ramassées en une panicule serrée; à ses feuilles pubescentes, lanceolées, denticées ou très-denticées.

Ses tiges sont droites, roides, cylindriques, striées, rameuses, verdâtres, légèrement pubescentes, hautes de deux à trois pieds & plus, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, nombreuses, très-simples, lancéolées, denticées en scie à leurs bords; les dentelures courtes, aiguës, plus ou moins distantes, quelquefois presque nulles, pubescentes à leurs deux faces, légèrement ciliées, nerveuses, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, longues de deux à trois pouces sur un demi-pouce environ de large; les pétioles comprimés, d'une à trois lignes de long.

Les tiges se divisent à leur sommet en rameaux simples, étalés, axillaires, nus ou feuillés, paniculés, fleuris. Les fleurs forment, par leur ensemble, une ample panicule, & sont disposées sur chaque rameau en une grappe droite, serrée, pubescente, terminale. Les pédoncules sont filiformes, ouverts, un peu pubescents, au moins de moitié plus courts que les filiques; les calices colorés, légèrement velus, à quatre folioles médiocrement ouvertes, obtusés; la corolle assez petite, plus grande que le calice, de couleur jaune; les pétales entiers; leur limbe en ovale renversé, obtus; les antères prennent souvent une teinte violette après la fécondation. Les filiques sont nombreuses, redressées, très-grêles, filiformes, glabres, longues d'environ deux pouces au moins, médiocrement arquées, terminées par le stigmate obtus & persistant.

Cette plante croît en France, dans les Alpes, en Suisse, en Allemagne, en Italie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

48. SISYMBRE à filiques pendantes. *Sisymbrium peniculatum.* Desfont.

Sisymbrium caule erecto, inferius piloso; foliis lanceolatis, hirtis, dentatis; filiquis planis, linearibus, glabris, peniculis, truncatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 82. tab. 156.

Sisymbrium foliis lanceolatis, mucoso-dentatis, hispatis; filiquis pendulis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 506. n.º 47.

Ses tiges sont droites, hautes d'un à deux pieds & plus, simples ou médiocrement rameuses, cylindriques, un peu striées, pileuses à leur partie inférieure, glabres vers leur sommet, garnies de feuilles simples, alternes, presque sessiles, lancéolées, hispides à leurs deux faces, longues de trois à quatre pouces, larges de six ou huit lignes, incisées, denticées à leur contour, décourcées & rétrécies en pétiole à leur base; les découpsures ou les dentelures inégales, aiguës, distantes.

Ses tiges, divisées à leur partie supérieure en quelques rameaux simples, alternes, nus, fleuris, forment une torse de panicule composée de grappes lâches, terminales. Le calice est coloré, caduc, pubescent, à quatre folioles lâches, elliptiques. La corolle est plus grande que le calice, de couleur jaune. Les pétales ont leur limbe ovale, elliptique. Le style est nul; le stigmate épais. Les filiques glabres, linéaires, comprimées, presque tronquées à leur sommet, longues d'environ deux pouces & plus, pendantes à l'extrémité des pédoncules à l'époque de la maturité; les pédoncules épais, distans, très-ouverts, filiformes, un peu plus courts que les filiques; les semences petites, nombreuses & rouillâtres.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines, en Barbarie, dans les plaines sablonneuses, aux environs de Casja; elle fleurit vers la fin de l'hiver. (L'Esprit, ex Desfont.)

49. SISYMBRE d'Espagne. *Sisymbrium hispanicum.* Jacq.

Sisymbrium foliis lanceolatis, dentatis, fissilibus, glabris; filiquis adpressis; caule ramofo, divaricato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 506. n.º 48.

Sisymbrium foliis cylindricis, breviusculis, erectis; foliis lanceolatis, ferratis, fissilibus. Jacq. Ic. Rar. vol. 1. tab. 124. — Idem, Collect. vol. 1. pag. 69.

Ses tiges sont droites, feuillées, cylindriques, striées, divisées en rameaux alternes, allongés, très-étalés, garnis de feuilles alternes, sessiles, lancéolées, glabres à leurs deux faces, denticées à leurs bords, particulièrement vers leur sommet; quelquefois très-croisées, un peu rétrécies à leur base; les dentelures courtes, aiguës, plus ou moins distantes, un peu inégales.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux & des tiges, en longues grappes droites, un peu lâches. La corolle est d'une grandeur médiocre, de couleur jaune; les pétales entiers; leur limbe ovale, obtus; les filiques médiocrement pédonculées, droites, presque appliquées contre les tiges, courts, cylindriques, un peu comprimés, presque filiformes, légèrement courbées en arc, longues de plus d'un pouce, renfermant des semences fort petites, assez nombreuses, d'un brun-roussâtre.

Cette plante croît en Espagne. On la rencontre également dans les départements méridionaux de la France; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. O (V. v.)

50. SISYMBRE à feuilles de paquerette. *Sisymbrium ballidifolium*.

Sisymbrium pumilum, caule simpliciter, subnudo; foliis radicalibus, ovato-spathulatis, petiolatis, subvillosis, subintegris, seu leviter crenatis; racemo terminali, paucifloro. (N.)

Cette espèce est fort petite & se rapproche beaucoup des *arabis*. Ses tiges sont droites, grêles, filiformes, hautes de trois à quatre pouces, très-simples, pubescentes, nues ou garnies de quelques petites feuilles très-courtes, distantes, à peine longues d'une ligne. Les feuilles, radicales, fort étendues sur la terre, en rosette, pétiolées, ovales, un peu spatulées, légèrement velues, ciliées à leurs bords, longues de quatre à cinq lignes, larges d'environ trois lignes, entières ou légèrement sinuées, ou crénelées à leur contour, obtuses; les pétioles au moins de la longueur des feuilles.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une petite grappe très-courte, composée de quatre à cinq fleurs très-petites, dont le calice est verdâtre, à quatre folioles obtuses, un peu ouvertes. La corolle est blanche, à peine plus longue que le calice; les pétales un peu oblongs, obtus, entiers; les filiques droites, subulées, un peu comprimées, presque linéaires, très-glabres, longues d'environ un demi-pouce, soutenues par des pédoncules droits, sétacés, longs de trois à quatre lignes, très-glabbres; les semences extrêmement petites, un peu roussâtres.

Cette plante croît à Buenos-Ayres, où elle a été recueillie par Commerçon. (V. f. in herb. Jusieu.)

51. SISYMBRE à tige basse. *Sisymbrium pumilum*. Willden.

Sisymbrium foliis lanceolatis, dentatis, sagittatis, amplexicaulibus; siliquis erecto-patentibus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 507. n°. 49.

Sisymbrium (pumilum), villosa-subincanum; foliis radicalibus, subruncinatis; caulibus sagittatis,

repando-dentatis, pedicellis fructus elongatis; siliquis tenuibus, farsum arcuatis. Stephan. in Litt.

Plante fort petite, dont les tiges sont hautes de trois à six ou sept pouces, blanchâtres, pubescentes, rameuses à leur base, garnies de filiques alternes, sessiles; les radicales longues de quatre lignes, roncées à leurs bords, obtuses à leur sommet; les feuilles caulinaires, alternes, amplexicaules & presque sagittées à leur base, sinuées ou dentées à leur contour, pubescentes, blanchâtres.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en grappes lâches, très-longues. La corolle est de couleur jaune; les filiques linéaires, d'environ un demi-pouce de long, grêles, droites, un peu arquées, soutenues par des pédoncules médiocrement ouverts, & qui s'allongent à mesure que les fruits mûrissent.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de la Perse. O (Descript. ex Willd.)

52. SISYMBRE des Indes. *Sisymbrium indicum*. Linn.

Sisymbrium foliis lanceolato-ovatis, serratis, petiolatis, levibus; siliquis subarcuatis. Linn. Syst. veget. pag. 596. n°. 29. — Maniff. 93. — Burm. Flor. ind. pag. 140. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 508. n°. 52.

Ses tiges s'élèvent presque à la hauteur d'un pied; elles sont droites ou redressées, très-lisses, anguleuses, flexueuses, médiocrement rameuses à leur partie inférieure, garnies de feuilles alternes, pétiolées, lanceolées, élargies ou ovales-lanceolées, nues à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, longuement acuminées; les pétioles très-glabbres; les feuilles supérieures sessiles.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales & axillaires, plus longues que les feuilles, formant par leur ensemble une panicule médiocrement éralée. Les calices sont glabres, fort petits; la corolle à peine plus longue que le calice, de couleur blanche; les filiques pédonculées, cylindriques, légèrement arquées.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. O

53. SISYMBRE à feuilles entières. *Sisymbrium integrifolium*. Linn.

Sisymbrium foliis linearibus, integerrimis; pedunculis glutinosis-hispidiis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 922. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 170. tab. 63. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 508. n°. 51.

Hesperis caule ramosissimo, foliis linearibus, pedunculis hispidiis. Gmel.

Cette espèce est petite: ses tiges sont droites,

hautes de trois à quatre pouces, divisées dès leur base en rameaux nombreux, garnis de feuilles alternes, linéaires, glabres, un peu obtuses à leur sommet, entières à leurs bords. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en grappes droites, pubescentes, supportées par des pédoncules visqueux, hérissés de poils courts. La corolle est d'une grandeur médiocre, de couleur blanche, quelquefois jaunâtre; les filiques droites, linéaires.

Cette plante croît dans la Sibérie. ○

54. SISYMBRE des salines. *Sisymbrium falsuginosum*. Pallas.

Sisymbrium foliis lanceolatis, integerrimis, cordatis, amplexicaulis, glabris; filiquis patentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 507. n°. 50.

Sisymbrium falsuginosum. Pall. Itin. 2. Append. n°. 114. tab. V.

Cette plante est entièrement glabre, de couleur glauque. Ses feuilles sont sessiles, alternes, lancéolées, amplexicaules & échanquées en cœur à leur base, un peu aiguës à leur sommet, très-entières à leurs bords. Les fleurs sont blanches, fort petites, disposées en une grappe terminale; les filiques médiocrement pédonculées, droites, épaisses; les pédoncules étalés.

Cette espèce se rencontre dans la Sibérie, dans les terrains pénétrés de sel. ○

55. SISYMBRE hispide. *Sisymbrium hispidum*. Vahl.

Sisymbrium caulescens, foliis petiolatis, oblongis, dentatis, caulique hispido. Vahl, Symbol. 2. pag. 77. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 508. n°. 53.

Sinapis (harr.) foliis ovalibus, sinuatis, hispidis; caule glabro, caulescens hispida. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 118. n°. 64.

Ses tiges sont droites, rameuses, hautes de trois à sept pouces, chargées de poils rudes, garnies de feuilles pétioles, alternes, un peu grasses, hispides à leurs deux faces; les radicales linéaires, presque pinnatifides; les supérieures oblongues, un peu ovales, inégalement dentées, sans nervures apparentes, rétrécies en pétiole à leur base, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en une grappe lâche, terminale, supportées par des pédoncules inclinés, très glabres, longs d'environ six lignes. Les calices sont très-ouverts, hispides; la corolle d'une grandeur médiocre, de couleur jaune, renfermant deux glandes allongées, fort grandes, situées entre les plus longues étamines, & deux autres beaucoup plus petites entre les étamines les

plus courtes. Les filiques sont glabres, distantes, linéaires, aussi longues que les pédoncules.

Cette plante croît en Egypte. Elle offre un pâturage très-agréable aux troupeaux. On fait prendre aux femmes enceintes ses feuilles réduites en poudre.

56. SISYMBRE spatulé. *Sisymbrium spathulatum*.

Sisymbrium foliis radicalibus integerrimis, spathulatis; caulibus crenatis; caule humili, simpliciter; filiquis erectis, compressis. (N.)

Ses racines sont grêles, filiformes, garnies de quelques fibres courtes, capillaires, blanches; il s'en élève des tiges droites, très-floies, glabres, cylindriques, grêles, hautes de trois à quatre pouces, médiocrement feuillées; les feuilles caulinaires ou inférieures sont assez nombreuses, longues d'un pouce & demi, spatulées, très-entières, glabres à leurs deux faces, sans nervures apparentes, rétrécies à leur base en un pétiole allongé, arrondies à leur sommet, sumont souvent d'une petite pointe; les feuilles caulinaires alternes, distantes, fort petites, médiocrement pétioles, un peu arrondies, crénelées à leur contour.

Les fleurs sont disposées en une grappe courte, terminale. Le calice est glabre, verdâtre, à quatre petites folioles, un peu concaves, aiguës, ouvertes. La corolle est blanche, petite, un peu plus longue que le calice; les pétales ovales, oblongs, entiers, obtus. Les filiques sont droites, comprimées, un peu élargies, très-glabres, longues d'un pouce, aiguës, supportées par des pédoncules courts, cylindriques, redressés.

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par Commerçon. (V. f. in herb. Juss.)

SITUATION DES FEUILLES. On désigne par ce mot les différentes positions qu'affectent les feuilles sur les tiges & sur les rameaux. Considérées sous ce rapport, les feuilles sont alternes, opposées, éparées, entassées, imbriquées, fasciculées, &c. (Voyez ces mots.)

La situation des fleurs n'est pas moins à remarquer; elle dépend de la place qu'elles occupent sur ces mêmes rameaux. Ainsi, elles sont terminales; latérales, éparées, axillaires, solitaires, ramassées, sessiles, pédonculées, &c. (Voyez ces mots.) La situation des fleurs doit être distinguée de leur disposition, qui consiste dans la forme qui résulte de leur réunion & de leur situation: elles sont alors en ombelle, en panicule, en corymbe, en épi, en grappe, &c.

SKIMMIE. *Skimmia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyphylées, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les rameaux sont alternes, les feuilles

également alternes, rapprochées, presque verticillées, toujours vertes; les fleurs disposées en panicules terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, partagé en quatre; quatre pétales concaves; quatre étamines; un style; une baie supérieure, ombiliquée, à quatre semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, persistant, partagé en quatre, quelquefois en cinq découpures ovales, aiguës.

2°. Une corolle composée de quatre pétales fort petits, ovales, concaves.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont fort courts, terminés par des anthères.

4°. Un ovaire supérieur, surmonté d'un seul style, terminé par un stigmate.

Le fruit est une baie ovale, de la grosseur d'un pois, ombiliquée, marquée de quatre sillons, presque à quatre valves, remplie d'une pulpe farineuse, & contenant quatre semences oblongues, blanchâtres, anguleuses d'un côté, convexes de l'autre.

ESÈCE.

SKIMMIE du Japon. *Skimmia japonica*. Thunb.

Skimmia foliis alternis, petiolatis, oblongo-undulatis, versus apicem crenatis; paniculâ terminali. (N.)

Skimmia japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 62. — Nov. Gener. pag. 57. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 309. n°. 1548. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 671.

Sin fan, vulgò mijanea skimmî. Kempf. Amoen. 8. pag. 779. Reliq. Icon. tab. 5.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont droites, glabres, divisées en rameaux alternes, lisses, légèrement tétragones, garnies de feuilles pétioles, alternes, situées vers la partie supérieure des rameaux, très-rapprochées, presque verticillées, nombreuses, oblongues, entières, ondulées à leurs bords, droites, longues de trois à quatre pouces, vertes & ridées en dessus, plus pâles & ponctuées à leur face inférieure, toujours vertes, d'une saveur aromatique, légèrement crénelées vers leur sommet, un peu repliées à leur contour, soutenues par des pétioles épais, à demi-cylindriques, longs d'environ un pouce.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en panicules, dont les pédoncules sont

cylindriques, épais, longs d'environ un pouce; les calices d'une seule pièce, fort petits, de couleur verte, à quatre, quelquefois cinq découpures ovales, aiguës. La corolle est blanche; les pétales fort petits, concaves, ovales. Le fruit est une baie rouge, de la grosseur d'un pois, très-glabre, blanche, pulpeuse en dedans, presque à quatre valves, renfermant quatre semences blanchâtres.

Cette plante croît au Japon. Ses fruits mûrissent dans le mois de décembre. h (*Descript. ex Thunb.*)

SMITHIE. *Smithia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, irrégulières, de la famille des légumineuses, qui a quelques rapports avec les *hedysarum*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles ailées, sans impaire; munies de stipules persistantes, & dont les fleurs forment de petites grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice bifide, à deux lèvres; dix étamines séparées en deux paquets égaux; une gousse composée d'articulations monospermes; les semences rangées latéralement le long du style.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, divisé en deux lèvres ovales, lancéolées, presque égales.

2°. Une corolle papilionacée, dont l'étendard est en cœur renversé; les ailes oblongues, obtuses, un peu plus courtes que l'étendard; la carène linéaire, oblongue, fendue à sa base, de la longueur des ailes.

3°. Dix étamines diadelphes, dont les filamens sont réunis en deux paquets égaux, & terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire environné à sa base par le calice, surmonté d'un style capillaire & persistant, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une gousse renfermée dans le calice, composée de quatre ou sept articulations distinctes, soutenues par le style persistant, orbiculaires, hérissées, contenant chacune une semence glabre, réniforme, comprimée.

ESÈCE.

SMITHIE sensitive. *Smithia sensitiva*. Aiton.

Smithia foliis abruptè pinnatis; foliolis obovato-oblongis, margine seseto; stipulis infernè bifidis; racemis axillaribus, paucifloris. (N.)

Smithia sensitiva. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag.

496. tab. 13. — Lam. Illustr. Gener. tab. 627. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1161.

C'est une plante herbacée, dont les tiges sont lisses, cylindriques, renversées, divisées en un grand nombre de rameaux étalés, alternes, diffus, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, sans impaire; composées de folioles ovales, oblongues, petites, opposées, presque sessiles, au nombre de huit à vingt, entières, obtuses ou à peine aiguës, garnies de poils fins & soyeux, tant à leurs bords que sur leur principale nervure. Les pétioles sont courts, munis également, dans toute leur longueur, de poils soyeux. Les stipules sont opposées, situées à la base des pétioles, persistantes, à demi-lancéolées, très-entières, acuminées au dessus du point de leur insertion, & prolongées au dessous de ce même point en deux découpages sagittés, inégales; l'une obtuse, plus courte; l'autre acuminée, plus longue.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles supérieures, en grappes courtes, composées de trois à six fleurs au plus, à peine plus longues que les feuilles, souvent plus courtes; le pédoncule commun filiforme, plus long que les pétioles; les pédoncules propres plus courts que les calices, & à la base desquels est située une bractée semblable aux stipules, mais plus petite & moins prolongée à sa partie inférieure. Chaque calice est enveloppé à sa base de deux autres bractées opposées, ovales, lancéolées, hérissées de poils roides, & formant comme un calice extérieur. Le calice se divise en deux lèvres; il est chargé de poils tuberculés. La corolle est jaune.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. O

SOLANÉES (les), famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle renferme un grand nombre de genres qui ont beaucoup de rapports avec les morelles (*solanum*), qui s'y trouvent comprises.

Les plantes qui composent cette famille sont, ou herbacées, ou ligneuses; les feuilles alternes, souvent deux feuilles opposées qui partent du même point d'insertion. La disposition des fleurs est très-variée dans beaucoup d'espèces; elles sont placées isolément sur les tiges, un peu au dessus de l'aisselle des feuilles.

Le calice se divise en cinq découpures plus ou moins profondes; il est très-souvent persistant. La corolle est monopétale, ordinairement régulière, à cinq découpures; les étamines, au nombre de cinq, attachées au fond de la corolle; un seul style; un stigmate simple, quelquefois creusé par un double sillon.

Le fruit est ordinairement divisé en deux loges, contenant plusieurs semences. C'est tantôt une capsule à deux valves, séparées par une cloison

parallèle aux valves, comme dans les scrophulaires; plus souvent c'est une baie dont les réceptacles des semences sont centraux, opposés, séparés par une cloison, souvent saillants, & divisant alors les baies en autant de loges doubles qu'il y a de réceptacles. L'embryon est environné d'une substance farineuse.

Les principaux genres renfermés dans cette famille sont :

* Fruits capsulaires.

Les celsies.....	<i>Celsia</i> .
Les molènes.....	<i>Verbascum</i> .
Les jusquiames.....	<i>Hyoscyamus</i> .
Les nicotianes.....	<i>Nicotiana</i> .
Les stramoines.....	<i>Datura</i> .

** Fruits en baie.

Les jaboroses.....	<i>Jaborosa</i> .
Les mandragores.....	<i>Mandragora</i> .
Les belladones.....	<i>Atropa</i> .
Les nicandres.....	<i>Nicandra</i> .
Les coquerets.....	<i>Physalis</i> .
Les aquarts.....	<i>Aquaria</i> .
Les morelles.....	<i>Solanum</i> .
Les pimons.....	<i>Capcium</i> .
Les liciers.....	<i>Lycium</i> .
Les cistreaux.....	<i>Cestrum</i> .

SOLANDRE. *Solanum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des malvacées, qui a des rapports avec les *hibiscus*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ternées, ou simples, ou lobées; les fleurs axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice simple, à cinq divisions; des anthères monadelphes; un style; cinq stigmates; une capsule oblongue, à cinq loges, à cinq valves polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice simple, divisé en cinq découpures profondes, lancéolées, aiguës, persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales très-ouverts, ovales-oblongs, réunis par leur base, attachés sur le tube des étamines.

3°. Des étamines nombreuses, monadelphes, dont les filaments sont réunis en un tube alongé; les anthères insérées à la surface du tube, vers son sommet.

4°. Un ovaire cylindrique, acuminé, surmonté

d'un style droit, terminé par cinq stigmates capités & pédicellés.

Le fruit est une capsule ovale, acuminée, à cinq loges, à cinq valves séparées dans leur milieu par une cloison, contenant des semences petites, arrondies, lincérées par un réceptacle persistant, central & uniforme.

Observations. Le nom de *folandra* avoit été employé pour trois genres différens. Il avoit été appliqué pour désigner une très-belle plante de la famille des solanées, le *folandra grandiflora* Swartz, que M. Lamarck a placé parmi les *datura* dans les *Illustrations des Genres*, sous le nom de *datura farmentosa*, vol. 2. pag. 9. n°. 2295, & dont en effet elle ne diffère pas assez pour former un genre à part. (Voyez l'article STRAMOINE.) Le même nom de *folandra* avoit été donné auparavant à une plante de la famille des ombellifères (*folandra capensis* Linn.), que Linné fils a rappelé parmi les *hydracotyle*, & qui se trouve aussi décrit dans ce genre au mot HYDRACOTYLE de cet ouvrage, n°. 17.

Willdenow a conservé le genre, & en même temps le nom de *folandra*, pour le *datura farmentosa* de M. Lamarck, & ce dernier a consacré le nom de *folandra* pour la plante malvacée que Cavanilles a décrite sous ce nom, & que Willdenow a réunie aux *laguna* de Cavanilles. Nous croyons également que ces deux genres de Cavanilles (*folandra* & *laguna*) ne sont pas assez distincts l'un de l'autre pour être séparés, & nous nous sommes déterminés à les réunir ici sous le nom de *folandra*, la principale différence entre ces deux genres ne consistant essentiellement que dans le stigmate, pelté dans les *laguna*; à cinq rayons capités à leur sommet dans les *folandra*.

De très-grands rapports existent entre les *folandra* & les *hibiscus*. La principale différence consiste dans un calice simple pour les premiers, double pour les seconds; caractère bien foible, & qu'il eût mieux valu employer comme division dans le genre *hibiscus*, pour ne point séparer des plantes qui doivent aller ensemble dans l'ordre naturel.

ESPECES.

1. SOLANDRE à feuilles lobées. *Solandra lobata*.

Solandra foliis cordatis, superioribus trilobatis, dentatis; pedunculis axillaribus, unifloris. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 580.

Solandra (lobata), foliis omnibus simplicibus. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1050. — Murr. in Comm. Goett. 1784. pag. 21. tab. 1. & Syst. veget. pag. 623. — Cavan. Dissert. 1. pag. 55. & Dissert. 5. pag. 279. tab. 136. fig. 1.

Laguna (lobata), foliis cordatis, trilobis, dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 733. n°. 1.

Hibiscus (folandra), foliis subcordatis, vtriusque pedatis, serratis; calicibus calciculatis. Lheritier, Stimp. 1. pag. 103. tab. 49.

Triguera (acetifolia), foliis petiolatis, inferioribus cordatis; superioribus palmatis, incis; summis trifidis aut lanceolatis; caule spica laxa terminato; pedunculis unifloris. Cavan. Dissert. 1. pag. 41. tab. 11. ultim. divif.

Pentapetes herbacea, virella, foliis brevi hirsutis, scabris; inferioribus cordatis, midis angulosis; superioribus palmatis, incis; summis trifidis vel etiam lanceolatis, integerrimis. Commers. Herb. & fig. in Hist. Nat. Insul. Franciz manuif.

Cette plante a des tiges droites, rameuses, hautes d'environ deux pieds, velues, striées, cylindriques, garnies de feuilles alternes, longuement pétiolées, scabres ou hérissées de quelques poils; les inférieures entières, assez pettes, en cœur à leur base, un peu arrondies, aiguës; celles du milieu à plusieurs lobes, presque palmées, dentées à leurs bords; les supérieures élargies, divisées en trois lobes inégaux, oblongs, aigus, dentées en scie; les terminales étroites, lancéolées, entières, dentées; les pétiolés beaucoup plus longs que les feuilles, surtout ceux des feuilles inférieures; garnis à leur base de stipules allongées, linéaires, aiguës, légèrement ciliées.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules velus, très-longs, simples, uniflores; les supérieurs sortent de l'aisselle d'une bractée assez semblable aux stipules. Le calice est simple, ovale-oblong, à cinq découpures lancéolées, aiguës, légèrement hispides. La corolle est blanche, très-ouverte; les pétales ovales, oblongs, presque obtus, veinés, presque auriculés à un des côtés de leur base; les étamines nombreuses, situées vers le sommet du tube; l'ovaire ovale, oblong, acuminé; le style filiforme, surmonté d'un stigmate à cinq rayons, chaque rayon terminé par une petite tête velue. Le fruit est une capsule ovale, acuminée, presque à cinq angles, un peu plus longue que le calice qui persiste & l'enveloppe; les valves légèrement ciliées.

Cette plante croît à l'île-de-France, où elle a été recueillie par Commerfon. ☉ (V. f.)

2. SOLANDRE à feuilles ternées. *Solandra ternata*. Cavan.

Solandra caule herbaceo, villoso; foliis inferioribus ternatis, medio longissimo; superioribus subhastatis, longissimis, integerrimis. Cavan. Dissert. 5. pag. 279. tab. 136. fig. 2.

Laguna (ternata), foliis ternatis simplicibusque, integerrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 733. n°. 2.

Ses

Ses racines sont épaisses, cylindriques, un peu fibreuses : il s'en élève plusieurs tiges herbacées, velues, hautes d'environ un pied, rameuses dès leur base, garnies de feuilles pétiolées, alternes, distantes, velues ; les inférieures ternées, composées de trois folioles ovales, linéaires, très-inégales ; celle du milieu étroite, fort longue, entière ; les supérieures échancrées en cœur & hastées à leur base, lancéolées, très-longues, fort étroites, entières ; les pétioles filiformes, un peu plus courts que les feuilles, munis à leur base de stipules courtes, petites, caduques.

Les fleurs sont solitaires, latérales, axillaires, soutenues sur de très-longes pédoncules droits, grêles, épaissis & geniculés à leur partie supérieure. Leur calice est simple, d'une seule pièce, profondément divisé en cinq découpures lancéolées, très-aiguës, persistantes. La corolle n'a point encore été observée. Les étamines sont monadelphes. Le fruit est une capsule renfermée dans le calice, ovale, acuminée, à cinq valves, à cinq loges, chaque loge renfermant trois semences noires, réniformes, hérissées de plusieurs petites tubercules.

Cette plante croît au Sénégal. ○ ? (*Describe. ex Cavan. V. f. in herb. Juss.*)

3. SOLANDRE épineux. *Solandra aculeata*.

Solandra caule aculeato tomentoso, foliis profundè multipartitis, floribus axillaribus, solitariis. Cav.

Laguna aculeata. Cavan. Dissert. 3. pag. 173. tab. 71. fig. 1.

Laguna (aculeata), foliis ternatis, foliolis inciso-dentatis, caule muricato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 734. n° 3.

Laguna. Lam. Illustr. Gener. tab. 577.

Volgairement cattacacherée, dans les Indes.

Ses tiges sont droites, cylindriques, tomenteuses, chargées de quelques petits aiguillons courts & droits, médiocrement rameuses, hautes d'environ un pied & demi, garnies de feuilles alternes, longuement pétiolées, profondément divisées en trois ou plusieurs découpures dentées en scie ; la découpure du milieu plus allongée.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules courts, solitaires, uniflores. Le calice est monophylle, tomenteux, ovale oblong, terminé à son sommet en cinq pointes très-courtes, subulées : il se divise latéralement jusque vers son milieu par l'expansion de la corolle ; celle-ci est jaune, étalée, une fois plus longue que le calice, composée de cinq pétales médiocrement élargis, rétrécis à leurs ongles ; les filamens sont très-courts, épars sur la surface du tube ; les anthères

Botanique. Tome VII.

arrondies ; le style simple ; le stigmate rougeâtre, pelté, peu saillant. Le fruit est une capsule oblongue, acuminée, à cinq faces, tomenteuse, à cinq loges, à cinq valves, qui renferment des semences noires, en forme de rein.

Cette plante croît sur la côte du Coromandel : ses feuilles passent pour résolatives. (*V. f. in herb. Juss.*)

4. SOLANDRE écailleux. *Solandra squamea*.

Solandra arborescens, foliis lanceolato-oblongis, integerrimis, subius squameis, albicantibus. Vent.

Laguna (squamea). Vent. Jardin de la Malmaison, pag. 42. tab. 41.

Hispicus paterfonius. Andretw. Botan. Reposit. 186.

Cette belle plante se distingue par son port & surtout par ses feuilles, de toutes les autres espèces de ce genre, & même, dit M. Ventenar, de toutes les malvacées connues. On la prendroit, sans sa floraison, pour un *aleagnus*, un *kiggellaria* ou un *capparis*.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ dix à douze pieds, droites, cylindriques, rameuses, écailleuses, divisées en rameaux alternes, axillaires, munis de feuilles pétiolées, alternes, lancéolées, oblongues, très-entières, coriaces, d'un vert-foncé, obtuses, longues de trois poices environ, parsemées, surtout à leur face inférieure, d'un grand nombre d'écaillés blanchâtres ou cendrées, frangées, fort petites & soutenues par des pétioles articulés, fil'onés, écailleux, très-courts, munis à leur base de stipules linéaires, caduques, plus courtes que les pétioles.

Les fleurs sont grandes, solitaires, axillaires, articulées sur leur pédoncule, d'un violet-rose, inodores, soutenues par un pédoncule simple, un peu plus long que le pétiole, cylindrique, strié, articulé à sa base, élargi à son sommet, uniflore. Le calice est campanulé, épais, coriace, écailleux, velu & foveux en dedans, visqueux, trois fois plus court que la corolle, divisé à son limbe en cinq découpures droites, égales, ovales, aiguës. La corolle est en forme de cloche, composée de cinq pétales alternes avec les découpures du calice, ovales, oblongs, obtus. Les étamines sont nombreuses ; les filamens réunis en un tube cylindrique, libres à leur partie supérieure, surmontés d'anthères vacillantes, à quatre sillons, d'un jaune doré. L'ovaire est en forme de poire, foveux, divisé en cinq loges, renfermant plusieurs ovules disposés sur deux rangs ; le style cylindrique, dilaté à son sommet ; le stigmate à cinq lobes ovales, arrondis, ouverts en étoile, pubescens & blanchâtres en dehors.

Cette plante croît à l'île de Norfolk, à l'est de Ff

la Nouvelle-Hollande : elle est cultivée au Jardin de la Malmaison, où elle fleurit sur la fin de l'été. *h* (*Descript. ex Vent.*)

SOLDANELLE. *Soldanella*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille de lythnaches, qui a des rapports avec les *corufa*, qui renferme des herbes indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont radicales, entières, longuement pétiolées ; les hampes à une ou deux fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; une corolle campanulée, déhiscence à son limbe ; cinq étamines ; un style à une capsule à une seule loge, s'ouvrant à son sommet par plusieurs dents.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. *Un calice* persistant, plus court que la corolle, partagé en cinq découpures lancéolées.

2°. *Une corolle* monopétale, campanulée, élargie insensiblement, droite, déhiscence à son bord en plusieurs découpures étroites, inégales.

3°. *Cinq étamines* dont les filaments sont subulés & les anthères sagittées.

4°. *Un ovaire* supérieur, arrondi, surmonté d'un style filiforme, persistant, terminé par un stigmate simple.

Le fruit consiste en une capsule oblongue, cylindrique, striée, à une seule loge, s'ouvrant à son sommet par plusieurs dents, contenant des semences nombreuses, très-petites, acuminées.

ES P È C E.

SOLDANELLE des Alpes. *Soldanella alpina*. Linn.

Soldanella floribus nutantibus, laciniis dentatis, stylo corollae exsertito ; foliis reniformibus, subulatis. Smith. Bohem. 1, 2. n°. 147.

Soldanella alpina. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 206. — Hort. Cliff. 49. — Roy. Lugd. Bat. 414. — Hall. Helv. n°. 634. — Jacq. Flor. austr. tab. 11. — Mill. Dict. n°. 1. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 210. — Sabbat. Hort. tab. 16. — Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 306. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 434. n°. 1966. tab. 99. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 808. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 254. n°. 281.

Soldanella alpina, rotundifolia. C. Bauh. Pin. 209. — Tournef. Inst. R. Herb. 81. — Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 285. §. 3. tab. 15. fig. 8. — S. Heuch. Alp. 1. pag. 50.

Soldanella alpina. Camer. Epitom. 154. — Clus. Pann. pag. 253. tab. 254.

Soldanella alpina major. Clus. Hist. 308.

Soldanella montana quibusdam. J. Bauh. Hist. 2. pag. 217.

Soldanella alpina, rotundifolia, flore niveo. C. Bauh. Pin. 296.

3. *Soldanella* (Clusii), *floribus nutantibus, laciniis corollae integris, stylo corollae breviori, foliis reniformibus, integerrimis.* Smith, Bohem. 1. n°. 148.

Soldanella alpina minor. Clus. Hist. 309.

Cette plante, quoique petite, est d'un aspect agréable ; elle ressemble assez, par son port, par la forme de ses feuilles & par ses hampes nues, au pain-de-pourreau, *cyclamen*.

Ses racines sont composées de fibres droites, filiformes, allongées, de couleur jaunâtre ; elles produisent de leur collet des feuilles toutes radicales, longuement pétiolées, épaisses, très-entières, arrondies, d'environ un pouce ou deux de diamètre ; vertes, glabres à leurs deux faces, fermes, un peu réniformes, quelquefois un peu sinuées & même presque lobées à leur contour. Les pétiolés sont grêles, à peu près aussi longs que les hampes, très-glabres.

Les fleurs sont disposées presque en ombelle, au nombre de quatre ou six, à l'extrémité d'une hampe simple, glabre, cylindrique, haute de six à huit pouces. Les pédoncules sont inégaux, longs d'environ un pouce, droits ou un peu inclinés, surtout à l'époque de la floraison. Le calice est glabre, divisé en cinq découpures lancéolées ; la corolle campanulée, rougeâtre, quelquefois parfaitement blanche, déchirée à son limbe en huit ou dix découpures & plus, inégales, aiguës. Le fruit est une capsule droite, allongée, cylindrique, glabre, finement striée, à une seule loge, s'ouvrant à son sommet en plusieurs dents très-courtes, ovales.

La variété se diffère de la précédente, en ce qu'elle est plus petite dans toutes ses parties. Ses feuilles sont réniformes, très-entières ; le limbe de la corolle un peu moins déchiré ; le style plus court que la corolle.

Cette plante croît sur les Alpes & sur les montagnes des départements méridionaux de la France, ainsi que dans la Suisse, les Pyrénées, l'Autriche, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

SOLIDE (Bulbe). *Radix bulbosa, solida*. On donne aux racines bulbeuses le nom de solide, lorsqu'elles sont d'une substance pleine, ferme, charnue, & non pas écaillées ou tuniquées ;

telles sont les bulbes de la tulipe, des ornithogales, &c.

SOLIDE (Tige). *Caulis solidus.* Les tiges herbacées prennent le nom de solides lorsqu'elles sont entièrement pleines & non spongieuses ou fistuleuses, comme celles de plusieurs orchis, des ellebottes, &c.

SOLITAIRE (Fleur). *Flos solitarius.* Une fleur porte le nom de solitaire lorsqu'elle est seule dans le lieu de son insertion, comme celle du mouron, &c.; elle est encore solitaire lorsqu'elle est seule sur la tige, qu'elle termine assez ordinairement: telles sont les fleurs des tulipes.

Le pédoncule reçoit la même dénomination dans les mêmes circonstances.

On donne également le nom de solitaires aux stipules lorsqu'il n'y en a qu'un: à la base de chaque pétiole, ou de chaque pédoncule s'il s'agit des bractées. Enfin le style est solitaire quand l'ovaire est chargé d'un seul style, comme dans le lys, le prunier, &c. quoiqu'il soit quelquefois divisé en deux ou trois coupures.

SOMMEIL DES PLANTES. *Somnus plantarum.* Linnæus, en faisant allusion aux attitudes particulières que prennent les animaux de différentes espèces lorsqu'au déclin du jour ils veulent se livrer au repos, a nommé sommeil des plantes un état opposé à l'épanouissement de quelques-unes des parties du végétal. Cette disposition particulière ou ce sommeil des plantes n'est pas seulement indiqué par les fleurs qui se ferment avant la nuit & qui s'épanouissent le matin à différentes heures, mais il l'est encore par l'état des feuilles qui, vers la fin de la journée ou lorsque le ciel est nubuleux, se rapprochent & restent dans un état de contraction remarquable jusqu'au retour de la lumière, ou jusqu'à ce que le ciel soit plus serein. Linnæus, qui nous a donné des détails très-curieux sur ce phénomène dans sa Dissertation intitulée *Somnus Plantarum* (Amoen. Académ. vol. 4), a encore observé que la contraction des feuilles pendant la nuit changeoit la physionomie des plantes, au point qu'elles devenoient très-difficiles à reconnaître. Il nous apprend que cette contraction ou que ce rapprochement est plus frappant dans les jeunes plantes que dans celles qui sont adultes. Il montre que c'est l'absence de la lumière, & non le froid, qui est la principale cause de ce phénomène, puisqu'il observe que les feuilles se contractent, pendant la nuit, dans les serres chaudes comme en plein air. Enfin il observe que cette contraction fait prendre aux feuilles des positions différentes, suivant que ces feuilles sont simples ou composées, & il pense que le but de la nature, dans cette diversité de moyens qu'elle em-

ploie, est de mettre les jeunes pousses à l'abri des injures de l'air.

Les feuilles simples ont, pendant leur sommeil, quatre positions différentes. Elles sont conniventes (*conniventes*), renfermantes (*includentia*), environnantes (*circumspicientia*), & prélevantes (*manientia*).

1°. Les feuilles conniventes sont celles qui, étant opposées, s'appuient si étroitement par leur face supérieure, qu'elles paroissent ne former qu'une seule feuille, comme dans l'*Asperula hortensis*, dans l'*Asplenium media* & dans les apocynées.

2°. Les feuilles renfermantes sont celles qui, étant alternes, se rapprochent de la tige, comme dans le *suia abutilon*, l'*ayenia*, l'*anetha multifida*, &c.

3°. Les feuilles environnantes sont celles qui, étant horizontales, se redressent, environnent de toutes parts la tige ou le sommet des rameaux, & forment une espèce d'entonnoir sous lequel les boutons à fleurs & les jeunes bourgeons sont à l'abri des vents, comme dans le *malva parviflora*, le *Vicia onopordium*, le *parthenium hysterophorus*, l'*arroz*, le *mandragora*, le *datura stramonium*, &c.

4°. Les feuilles prélevantes sont celles qui, portées sur de longues pétioles, s'abaissent & forment une espèce de voûte, comme dans l'*hyssopus subarvensis*, l'*achyranthus aspera*, l'*impatiens noli-tangere*, le *symplocaria orientalis*, le *milleria quinqueflora*, &c.

Les feuilles ailées sont en général bien plus susceptibles de rhangement de position ou de sommeil, que les feuilles simples; elles se replient tous les soirs, c'est-à-dire que leurs folioles se rapprochent les unes des autres. Si pendant le jour le ciel est couvert & l'air frais, les folioles se trouvent dans un même plan avec le pétiole commun. Dès que le soleil donne sur quelque partie de la plante, les folioles se rapprochent par leur face inférieure, & le pétiole se trouve en dessous. A mesure que le jour diminue, les folioles se redressent, & sont un même plan avec le pétiole. Lorsque le soleil est couché, les folioles se rapprochent par leur face inférieure, & au dessous du pétiole commun. Ce n'est cependant que dans les climats tempérés où les folioles sont un même plan avec le pétiole. Dans les régions orientales, où la chaleur est plus grande, les folioles ont la pointe tournée en haut, & changent aisément de position, tandis que, dans les contrées septentrionales, leur position n'est presque jamais horizontale, & ne change presque jamais. La sensitive est, de toutes les plantes à feuilles ailées, celle dont le mouvement est plus marqué; il n'est point borné aux folioles; il s'observe aussi dans le pétiole & dans les branches où le simple attouchement suffit pour l'exciter. (Voyez ACACIE sensitive, vol. 1.)

Les feuilles ailées ont, pendant leur sommeil, fix positions différentes; elles sont conductrices (*conduplicantia*), involutes (*involventia*), divergentes (*divergentia*), pendantes (*dependentia*), retournées, dans une situation renversée (*invertentia*); retournées, dans une situation horizontale (*imbricantia*).

1°. Les feuilles *conductrices* sont celles dont les folioles se rapprochent par paires les unes des autres, en s'appliquant par leur face supérieure, comme dans la plupart des *baubinia*, dans l'*hymenaea courbaril*, dans plusieurs espèces de *lathyrus* ou de gessé, dans le *calutea arborea* & *fruticosa*, dans l'*hedysarum caronarium*, dans le *pfurales pinnata*, & dans le *vicia faba*, la fève, &c.

2°. Les feuilles *involutes* sont celles dont les folioles se rejoignent seulement par leur sommet, forment entre elles une cavité, & laissent entre leur base un intervalle où les fleurs sont abritées & garnies des injures de l'air, comme dans le *trifolium resupinatum* & *incarnatum*, dans le *medicago polymorpha*, dans le *lotus tetragonolobus* & *ornithopodioides*, &c.

3°. Les feuilles *divergentes* sont celles dont les folioles, rapprochées à leur base, sont ouvertes à leur sommet, comme dans le *melilotus officinalis*, *pulsatilla*, *italica*, &c.

4°. Les feuilles *pendantes* sont celles dont les folioles se renversent ou se courbent pour défendre les bourgeons ou les fleurs, comme dans le *lupinus albus*, l'*oxalis incarnata*, *hedysarum canadense*, *robinia pseudo-acacia*, *glycyrrhiza*, *amorphia fruticosa*, *abrus precatorius*, &c.

5°. Les feuilles *retournées*, dans une situation renversée, sont celles dont le pétiole commun se redresse un peu, & dont les folioles, en se renversant, se retournent & s'appliquent par leur face supérieure ou extérieure, comme dans presque toutes les *caissia*, *castia*, &c.

6°. Les feuilles *retournées*, dans une situation horizontale, sont celles dont les pétioles des folioles s'appliquent longitudinalement sur le pétiole commun, & dont la face inférieure des folioles devient l'extérieure, comme dans le *tamarindus indica*, dans l'*hamamelis*, dans le *mimosa sensitiva*, *putida*, & dans le *glehnia trianthos*, &c.

Linnaeus termine sa Différentiation en invitant les botanistes à observer eux-mêmes les différentes positions qu'assument les feuilles pendant leur sommeil, dans les plantes citées plus haut. Celui, dit-il, qui observera, dans certaines soirées d'été, les plantes que je viens d'indiquer, & qui ne dédaignera pas de suivre de ses propres yeux ce merveilleux phénomène de la nature, que personne n'a encore remarqué, sera sans d'admiration son cœur & son esprit trouveront dans

cette agréable contemplation, une source intarissable de jouissances qu'il est plus facile de sentir que de décrire.

SOMMET. *Apex*. On donne ce nom assez généralement à la partie qui termine un organe dans les plantes, ou à celle qui est la plus élevée. Le sommet de l'étrémine, c'est l'antère; le sommet d'une feuille, c'est l'extrémité opposée au pétiole.

Le sommet fournit très-souvent, surtout dans les feuilles, les pétales & les fruits, de très-bons caractères secondaires & spécifiques. Ainsi les feuilles, par exemple, considérées quant à leur sommet, sont obtuses, tronquées, échancrées, émoussées, mordues, rongées, aiguës, acuminées, vrillées, &c. (*Voyez ces mots.*)

SONDARI. *Kaka-ponna*. Rheed. Hort. Malab. vol. 5. pag. 79. tab. 40.

Arbuste de la côte de Malabar, dont le genre & la famille ne sont point encore déterminés, qui parait avoir quelques rapports avec les *evonymus*.

Ses racines sont noires, d'une odeur assez agréable. Son tronc s'élève à environ dix pieds; il est grêle: son bois est blanc, la moelle roussâtre, l'écorce brune, les rameaux étalés, garnis de feuilles éparées, pétiolées, ovales-oblongues, acuminées, très-entières, d'un vert-foncé & luisant en dessus, plus pâles en dessous, traversées par une côte saillante & blanchâtre, avec des nervures latérales, alternes, simples, arquées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes presque paniculées, touffues; elles sont petites, odorantes; leur calice est court, monophyllé, à cinq découppures aiguës. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice, à cinq pétales (ou à cinq découppures?) lancéolés, aiguës. Les étamines sont au nombre de cinq; l'ovaire est globuleux, verdâtre, surmonté d'un style court, d'un vert-blanchâtre. Les fruits sont des baies à quatre coques, quelquefois cinq, d'abord vertes & luisantes, ensuite jaunâtres, & qui deviennent noires quand elles font mûres; remplies d'une substance succulente, noirâtre, aromatique, qui enveloppe quatre osselets à trois faces, scarées, d'un blanc-roussâtre.

Cet arbuste croît dans plusieurs contrées au Malabar; il se conserve vert pendant toute l'année, fleurit & donne ses fruits mûrs en septembre.

SOPHORA. *Sophora*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs irrégulières, papilionacées, de la famille des légumineuses, qui a de grands rapports avec les *pedalyria* & les *virgilia*. Il comprend des arbres ou arbustes (quelquefois des herbes)

étrangers à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, les fleurs disposées en épis ou en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une calice à cinq dents ; une corolle papilionacée, les ailes de la longueur de l'étendard ; six étamines libres ; une gousse toruleuse, en chapelet.

• CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, campanulé, à cinq dents, un peu relevé en bourse à sa base, persistant.

2°. Une corolle papilionacée, à cinq pétales, dont l'étendard est oblong, droit, insensiblement plus élargi, réfléchi à ses côtes ; les deux ailes oblongues, appendiculées à leur base, de la longueur de l'étendard ; la carène divisée en deux pétales semblables aux ailes, en forme de nacelle, rapprochés inférieurement à leurs bords.

3°. Dix étamines libres, dont les filaments sont parallèles, subulés, de la longueur de la corolle, renfermés dans la carène, terminés par des anthères petites, redressées.

L'ovaire est oblong, cylindrique, surmonté d'un style de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une gousse grêle, allongée, à une seule loge, à laquelle les semences relevées donnent la forme d'un chapelet ou d'un collier. Ces semences sont un peu arrondies.

Observations. J'ai exposé, à l'article PODALYRIA, les raisons qui ont déterminé à exclure du genre *sophora* de Linné un grand nombre d'espèces pour les réunir en deux autres genres, vu la différence très-frappante de leurs gousses ; ce genre, par cette réforme, devient beaucoup plus naturel, &c. les espèces sont bien mieux liées entr'elles. Il faut en excepter le *sophora monosperma*, dont les gousses n'ont qu'une seule semence.

ESPÈCES.

1. *SOPHORA* à quatre ailes. *Sophora tetraptera*. Aiton.

Sophora foliis pinnatis, foliolis numerosis (17-19), lanceolato-oblongis, villosiusculis ; leguminibus membranaceo-quadrangulis, eauli arboris. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 45. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 499. — Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 82. tab. 3.

Sophora tetraptera. Joh. Mill. Icon. tab. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 325. fig. 3.

Arbrisseau dont les tiges, hautes d'environ douze pieds, se divisent en rameaux glabres, al-

ternes, cylindriques ; les inférieurs un peu pendans, garnis de feuilles pétioolées, alternes, ailées, avec une impaire ; composées de folioles nombreuses, depuis douze jusqu'à dix-neuf paires environ, opposées, sessiles, lancéolées, oblongues, un peu velues, très-entières, arrondies, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, longues d'environ six à huit lignes, rangées sur un pétiole grêle, nu à sa partie inférieure.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales ; elles sont grandes, très-belles, pétioolées ; les calices courts, campanulés, larges, à cinq dents aiguës ; la corolle d'une belle couleur jaune ; l'étendard plus court que les ailes & la carène ; celui-ci à deux pétales ; les ailes oblongues, arrondies à leur sommet, plus courtes que la carène ; les étamines droites, les anthères ovales. Le fruit est une gousse allongée, divisée en nœuds globuleux ou ovales, quelquefois interrompus, munis, sur leurs angles latéraux, de quatre ailes longitudinales, membraneuses, finies ou crénelées : le dernier nœud est terminé par une corne subulée, un peu courbée, également ailée.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *H* (V. v.)

2. *SOPHORA* à petites feuilles. *Sophora microphylla*. Aiton.

Sophora foliis pinnatis, foliolis numerosis (33-41), obovatis, villosiusculis ; leguminibus membranaceo-quadrangulis, eauli arboris. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 43. — Lam. Illustr. Gen. tab. 325. fig. 1.

Sophora (tetraptera), foliis pinnatis ; foliolis numerosis, obovatis, emarginatis ; leguminibus tetragonis, angulis membranaceis. Linn. f. Suppl. pag. 130. — Forst. Prodr. n°. 183.

Soufbarbisseau presque glabre, peu élevé, dont les tiges sont droites, grêles ; les rameaux alternes, diffus, un peu torseux, presque cylindriques, garnis de feuilles pétioolées, alternes, ailées, avec une impaire ; composées d'environ seize à dix-huit paires de folioles très-petites, opposées, sessiles, presque rondes ou en ovale renversé, légèrement velues, entières, obtuses, arrondies à leur sommet, un peu aiguës à leur base.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en grappes courtes, latérales, supportées sur des pédicules longs, épars, cylindriques, un peu inclinés. Le calice est ample, tomenteux, rubulé, à cinq dents courtes. La corolle est grande, de couleur jaune ; les pétales veinés, obtus ; l'étendard presque aussi long que les ailes & la carène, large, arrondi à sa base, un peu aigu à son extrémité ; les ailes oblongues ; l'ovaire subulé ; les étamines libres, un peu courbées, plus courtes que le style. Le fruit est une gousse alcon-

gée, un peu comprimée, plane sur son dos & à ses côtés, toruleuse, munie latéralement de quatre ailes longitudinales & de membraneuses.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. C'est un arbrisseau d'ornement. h (V. v.)

3. *SOPHORA* queue de renard. *Sophora alopecuroides*, Linn.

Sophora foliis pinnatis; foliolis numerosis, oblongis, villosis; caule herbaceo. Linn. Syst. veget. pag. 391. n°. 1. — Mill. Dict. n°. 1. — Kniph. Cent. 10. n°. 94. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 499. n°. 4.

Sophora, Hort. Cliff. 136.

Ervum orientale, alopecuroides, perenne; frutic. longissimum. Tourn. Coroll. 27. — Dill. Hort. Eltham. pag. 146. tab. 112. fig. 136.

Glycyrrhiza siliquis nodosis, quasi articulatis. Buxb. Cent. 3. pag. 25. tab. 46.

Ses racines sont rampantes & vivaces : il s'en élève plusieurs tiges droites, herbacées, rameuses, hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles alternes, ailées, composées d'un très-grand nombre de folioles ovales, oblongues, velues, presque oppo- sées, médiocrement pétioles, terminées par une impaire.

Les fleurs naissent à l'extrémité des branches, dans les aisselles de rameaux : elles sont disposées en longues grappes simples, presque droites. Les pédoncules sont épars, filiformes. Le calice est d'une seule pièce, presque campanulé, muni à son orifice de cinq dents peu marquées, obtuses. La corolle est petite, à peine une fois aussi longue que le calice, d'un bleu-pâle, quelquefois blanche; elles produisent des gousses allongées, noueuses, presque articulées.

Cette plante croît dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit dans le courant du mois de juillet. z (V. v.)

4. *SOPHORA* à fleurs jaunes. *Sophora flavescens*, Aiton.

Sophora foliis pinnatis; foliolis numerosis, oblongis, glabris; caule herbaceo. Aiton. Hort. Kew. vol. 2. pag. 43. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 499. n°. 3.

Plante de médiocre grandeur, qui ressemble beaucoup au *sophora alopecuroides*, dont il diffère par ses feuilles parfaitement glabres.

Ses tiges sont herbacées, glabres, presque cylindriques, striées, rameuses, légèrement anguleuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles ailées avec une impaire, pétioles, alternes,

composées ordinairement de six paires de folioles oblongues, presque lancéolées ou ovales, très-entières à leurs bords, obtuses à leur sommet ; la plupart alternes, pétioles, glabres à leurs deux faces, un peu pales en dessous, à nervures très-fines, peu sensibles, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs sont disposées en longues grappes terminales, simples, un peu pendantes, portées chacune sur des pédoncules simples, épars, filiformes, plus courts que les fleurs. Le calice est glabre, ovale, campanulé, presque tronqué, à cinq dents courtes, très-obtuses. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, au moins une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. z (V. v.)

5. *SOPHORA* du Japon. *Sophora japonica*, Linn.

Sophora foliis pinnatis; foliolis paribus ovatis, glabris; caule arboreo. Linn. Syst. veget. pag. 391. n°. 1. — Michx. G. — Durm. Flor. ind. pag. 61. — Thunb. Flor. jap. 178. — Willd. Arb. 364. — Idem, Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. n°. 7. — DuRoi. edit. nov. vol. 1. pag. 84. tab. 21.

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de soixante pieds & plus, dont le tronc est droit, muni de rameaux alternes, tortueux, diffus, cylindriques, très-lisses, de couleur purpurine, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées avec une impaire, assez semblables à celles du *rosinia coragana* Linn., dont les folioles sont presque opposées, médiocrement pétioles, la plupart ovales ou un peu oblongues, très-entières, obtuses, souvent terminées par une petite pointe à leur sommet, étendues, glabres à leurs deux faces, de couleur jaunâtre en dessous, au nombre de sept à onze & quelquefois plus, longues d'environ un pouce & les folioles inférieures plus petites que les supérieures.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes pendantes, d'une grandeur médiocre, réunies en une sorte de panicule. Leur calice est petit, campanulé, à quatre ou cinq dents. La corolle est de couleur blanchâtre ; l'étendard grand, ouvert, un peu arrondi, réfléchi sur le calice ; les ailes ovales-oblongues, appliquées contre la carène ; celle-ci à demi-orbiculaire, arrondie, de la longueur des ailes. Le fruit est une gousse un peu charnue, à une seule, quelquefois à deux articulations médiocrement arrondies ou presque globuleuses, contenant des semences ovales.

Cette plante croît au Japon. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, &c. h (V. v.)

Son bois est très-dur, susceptible d'un beau travail ; mais on prend qu'il a occasionné des coliques suivies de diarrhées aux ouvriers qui ont

essayé de le travailler. Cet arbre est d'ailleurs très-bien acclimaté en France, où il croit en pleine terre; mais il convient, quand il est jeune, de le g. tantir des fortes gelées.

6. *SOPHORA* cotonneux. *Sophora tomentosa*. Linn.

Sophora foliis pinnatis; foliolis numerosis, subrotundis, tomentosis. Linn. Syst. veget. pag. 191. n°. 2. — Mill. Dict. n°. 2. — Gzertn. de Fruct. & Sem. tab. 149. — Lam. Illustr. Geset. tab. 325. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. n°. 5.

Sophora tomentosa, foliolis subrotundis. Flor. zeyl. 163.

Indigofera foliis tomentosis. Hott. Cliff. 487.

Colutea zeylanica, argentea tota. Herm. Lugd. Bat. 169. tab. 171. — Kai, Hist. 1720.

Vulgairement pois de pigeon.

C'est un arbrisseau dont les tiges s'élèvent à la hauteur de sept à huit pieds, divisées en rameaux diffus, alternes, tomenteux, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées avec une impaire, composées de six à sept paires de folioles ovales, un peu arrondies, cotonneuses, très-entières, obtuses ou un peu échancrées à leur sommet, pétiolées, opposées, longues à peine d'un pouce.

Les fleurs sont disposées en grappes lâches, terminales, allongées; les pédoncules épais, de la longueur du calice, simples, tomenteux, épais. Le calice est velu, presque tronqué, denté en lobes à ses bords. La corolle est grande, inodore, de couleur jaune, assez semblable à celle du genêt d'Espagne. Le fruit est une gousse allongée, toruleuse, en forme de chapelet, velue, presque cylindrique, divisée en quatre & cinq nœuds ou renflements un peu arrondis, le dernier surmonté d'une sorte de corne, subulée, aiguë, dans chacun desquels est renfermée une semence brune, presque globuleuse, de la grosseur d'un pois.

Cette plante croit dans l'île de Ceylan. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B (V. v.)

7. *SOPHORA* d'Occident. *Sophora occidentalis*. Linn.

Sophora foliis pinnatis; foliolis numerosis, subrotundis, incanis, fruticosa. Swartz. Observ. Bot. pag. 154. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 500. n°. 6.

Sophora foliis pinnatis; foliolis numerosis, subrotundis. Linn. Syst. veget. pag. 381. n°. 3. — Irew. Ehret. 77. tab. 59.

Galega fruticosa, foliis subrotundis, pinnatis; foliis simplicibus, terminalibus. Brown. Jam. 289. tab. 31. fig. 1.

Corall dendron, foliis pseudo-seais, falsis tomentosis; flore lacto. Plum. Spec. 21. & Icon. 101.

Arbori corall affinis, non sinuata; fraxini folio rotundior, foliis & ramulis pubescentibus. Sloan. Jam. pag. 144. Hist. 2. pag. 40. tab. 107. fig. 3.

Cette plante a de très-grands rapports avec le *sophora tomentosa*, dont elle diffère peu, & dont elle n'est peut-être qu'une variété. On l'en distingue à ses feuilles bien moins velues, & presque seulement tomenteuses à leur face inférieure.

Ses tiges sont ligneuses; les rameaux pubescents, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées avec une impaire, composées de folioles nombreuses, entières, blanchâtres, un peu arrondies, légèrement tomenteuses en dessous. Les fleurs sont réunies en grappes simples, terminales, allongées. Le calice est tubulé, renflé à sa base, divisé à son orifice en cinq dents inégales, obtuses. La corolle est jaune, assez grande; l'étendard oblong, recouvrant la carène & les ailes; celle-ci onguiculée; les ailes de la longueur de l'étendard. Les gousses sont pédicellées, filiformes à leur partie inférieure, allongées, cylindriques, divisées en nœuds sphériques, légèrement velues; les semences presque globuleuses.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique septentrionale. On la cultive en Angleterre. B

8. *SOPHORA* à sept folioles. *Sophora heptaphylla*. Linn.

Sophora foliis pinnatis; foliolis septenis, glabris. Linn. Syst. veget. p. 191. n°. 6. — Mart. exotic. 110. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 501. n°. 3.

Sophora glabra, foliolis septenis. Flor. zeyl. 164.

Anticholericia. Rumph. Amboin. vol. 4. pag. 60. tab. 22.

Fraticulus sinensis, senna silvestris folio angustiore; nodosa filiqua, rostrato longiore donata. Pluk. Amalth. pag. 18. tab. 551. fig. 10. ?

Radalya. Herm. Zeyl. 16.

Cette espèce est un sous-arbrisseau qui a des rapports avec le *sophora tomentosa*; mais il est particulièrement glabre dans toutes les parties. Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées ordinairement de sept folioles pétiolées, ovales-oblongues, dilatables, entières, un peu aiguës à leur sommet, étroites, assez semblables à celles du sené, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes nues, longues; les pédoncules simples, épais. Les calices sont glabres, campanu-

mulés; la corolle d'une grandeur médiocre. Le fruit est une gouffe noueuse, dont le dernier nœud est terminé par une longue come aiguë.

Cet arbrisseau croît dans les Indes. *Th*

9. *SOPHORA* à feuilles émoussées. *Sophora retusa* Pers.

Sophora foliis pinnatis; foliolis retusis, junioribus leguminibusque tomentosis. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 452. n° 8.

Quoique les fleurs de cette plante ne soient pas bien connues, son port, le caractère de ses fruits, celui de ses feuilles, tout indique suffisamment qu'elle doit appartenir aux *sophora*. Ses rameaux sont glabres, alternes, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles presque opposées, ovales-lancéolées, un peu aiguës à leur base, émoussées & très-orinairement échancrées à leur sommet, légèrement tomenteuses, ainsi que les gouffes, particulièrement dans leur jeunesse; les fruits sont étroits, allongés, médiocrement toruleux.

Cette plante a été recueillie dans l'Isle-de-France par Comberion. (*V. f. in herb. Juss.*)

10. *SOPHORA* à feuilles obliques. *Sophora obliqua* Pers.

Sophora foliis oblique pinnatis, subius ferrugineis; foliolis parvis, basi obliquis; pedunculis verrucosis. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 452. n° 7.

Cette plante a des feuilles alternes, ailées, sans tige, composées de folioles fort petites; les supérieures ovales; les inférieures presque deltoides, obliques à leur base, chargées en dessous d'un duvet roussâtre, léger, ainsi que les pétioles par eux. Les gouffes sont longues, toruleuses; les pédoncules chargés de verrues en forme de petites écailles.

Cette plante croît, à ce que l'on présume, dans les contrées méridionales de l'Amérique. (Pers.)

11. *SOPHORA* à graines allongées. *Sophora mesocarpa*.

Sophora foliolis oblongis, glabris; nodis frustis oblongis; caule arborescente. Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86.

C'est un arbre ou arbriste qui a été autrefois cultivé au Jardin de Trianon près Versailles, mais qui n'y existe plus, & dont M. de Jussieu possède un rameau dans son herbier. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles au nombre de sept à neuf, oblongues, entières, glabres à leurs deux faces, d'un vert tirant sur le glauque. Les gouffes sont cylindriques, allongées; les ramifications des graines bien moins sensibles que

dans les autres espèces; les semences ovales-acronides, un peu comprimées.

Le lieu natal de cette plante ne nous est pas connu. *Th* (*V. f. in herb. Juss.*)

Especies moins connues.

* *Sophora* (sericea), *foliolis ovatis; ramulis, petiolis, foliolis volutis sericis & rubro-ferrugineis*. Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86. n° 2.

Cette plante & les suivantes, observées dans quelques herbiers, & manquant de plusieurs parties essentielles dans leur fructification, ne peuvent être que mentionnées à la suite des *sophora*, jusqu'à ce qu'elles soient mieux connues. Celle-ci est remarquable par le duvet soyeux & d'une couleur de fer rouille, qui revêt les folioles, les pétioles & les jeunes rameaux. Ses folioles sont petites, ailées, ovales, obtuses. Elle a été découverte à l'Isle-de-France par Commerçon. Elle se trouve dans les herbiers de MM. Desfontaines & de Jussieu.

* *Sophora* (albicans), *foliolis oblongis, ovatis, subpilis; petiolis, pedunculis foliisque albicansis*. Duham. Arbr. edit. nov. vol. 1. pag. 86. n° 4.

On la distingue par le léger duvet d'un beau blanc qui recouvre ses feuilles, les pétioles & ses pédoncules. Les folioles sont ovales-oblongues, légèrement pileuses & blanches. Elle a été recueillie en Sibirie par M. Patrin, qui l'a communiquée à M. Lamarck.

* *Sophora* (crassifolia), *foliis pinnatis; foliolis oblongis, glabris, crassis, subius incanis*. Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 87. n° 9.

Cette plante croît au Sénégal; elle existe dans les herbiers de MM. de Jussieu & Richard. Ses feuilles sont ailées; les folioles oblongues, épaisses, glabres, blanchâtres en dessous.

* *Sophora* (havanensis), *foliis pinnatis; foliolis numerosis, villosis, oblongo-ovatis, emarginatis*. Jacq. Amer. pag. 116. tab. 173. fig. 1.

SORAMIE. *Soramia*. Geste de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, poly pétalées, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges font farmenteuses; les feuilles alternes; les fleurs presque en corymbe, souvent axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq pétalées alternes avec les divisions du calice; un grand nombre d'étamines insérées sur le réceptacle; un ovaire supérieur; un stigmate en tête; une baie monosperme à une seule loge.

CARACTÈRE

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq découpures ovales, concaves, colorées.

2°. Une corolle à cinq pétales arrondis, insérés par leurs onglets sur le réceptacle, au dessous des étamines.

3°. Un très-grand nombre d'étamines insérées sur le réceptacle, dont les filaments sont filiformes, un peu élargis à leur partie supérieure, terminés par des anthères comprimées, à deux loges séparées par un sillon.

4°. Un ovaire sphérique, supérieur, surmonté d'un style d'ougé, courbé, terminé par un stigmate en tête.

Le fruit est une baie ovale, à une seule loge, contenant une seule semence ovale, enveloppée par une membrane blanchâtre, épaisse, visqueuse.

E S P È C E S.

SORAME de la Guiane. *Soramia Guianensis*. Aubl.

Soramia caule sarmentoso, foliis alternis, floribus subcorymbosis. (N.)

Soramia Guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 552. tab. 269.

Arbrisseau sarmenteux, dont les branches, chargées de tubercules, se répandent sur les troncs des arbres, & s'élèvent jusque sur leur sommet; elles se divisent ensuite en plusieurs rameaux alternes, très-longs & penlans, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, très-entières, lisses, vertes, épaisses, rétrécies à leur base, obtuses, mucronées à leur sommet, longues d'environ six pouces, sur trois & plus de large; traversées par une nervure longitudinale, de laquelle partent plusieurs autres nervures latérales, presque simples; l'intervalle rempli par des veines réticulées.

Les fleurs sont disposées en une sorte de corymbe, dans l'aisselle des feuilles, ou sur les petits tubercules des branches & des rameaux; les pédoncules sont longs, grêles, rougeâtres. Le calice est profondément divisé en cinq découpures concaves, arrondies, vertes en dessous, rougeâtres en dessus. La corolle est blanche, à cinq pétales un peu plus longs que le calice; les filaments des étamines blancs & nombreux; les anthères jaunes & comprimées; le style rougeâtre, charnu, surmonté d'un stigmate large, arrondi, convexe.

Le fruit est une baie ovale, rougeâtre, de la grosseur d'une cerise, revêtue d'une écorce ferme, charnue, légèrement acide; elle renferme une amande recouverte d'une membrane blanche,

Botanique, Tome V^{ll}.

épaisse, visqueuse. Le calice subsiste; il devient charnu & d'un rouge-foncé.

Cet arbrisseau croit dans la Guiane, sur les bords de la rivière de Sinémari; il fleurit & fructifie dans le mois de mai. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

SORBIER. *Sorbus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des rosacées, qui a de grands rapports avec les *crataegus* & les *mespilis*, & qui comprend des arbres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont ailées ou quelquefois à demi-ailées; les fleurs disposées en corymbes terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq pétales; un grand nombre d'étamines attachées au calice; une pommelle à trois semences cartilagineuses.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, concave, ouvert, persistant, à cinq découpures.

2°. Une corolle à cinq pétales arrondis, concaves, insérés sur le calice.

3°. Environ vingt étamines, dont les filaments sont subulés, insérés sur le calice, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire inférieur, surmonté de trois, quelquefois cinq styles filiformes, droits, terminés par des stigmates en tête.

Le fruit est une pommelle molle, pyriforme ou globuleuse, ombiliquée à son sommet, renfermant trois, quelquefois cinq semences oblongues, distinctes, cartilagineuses.

Observations. En admettant la variété du nombre des styles dans ce genre & dans celui des alisiers (*crataegus*), comme en effet plusieurs botanistes assurent l'avoir observée, il s'ensuit que le caractère distinctif de ces deux genres s'évanouit, se ressemblant d'ailleurs dans leurs autres parties. En les tenant séparés on céde plutôt à l'usage, qu'à une division naturelle & méthodique. On peut dire cependant qu'il est bien plus général de voir trois styles & trois semences dans les sorbiers, & deux styles avec deux semences dans les alisiers. Tous deux sont bien distingués des nésiers (*mespilus*), dont les semences sont ovales & non cartilagineuses.

E S P È C E S.

1. SORBIER des oiseaux. *Sorbus aucuparia*. Linn.

Sorbus foliis pinnatis, utrinque glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 683. — Mater. medic.

G g

126. — Mill. Dict. n°. 1. — Gmel. Sibit. vol. 3. pag. 178. — Gunn. Norveg. n°. 99. — Pollich. Pal. n°. 473. — Duroi, Harbk. 2. n°. 420. — Blackw. tab. 73. — Willd. Arbr. 365. — Hoffm. Germ. 171. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 213. — vol. II. pag. 544. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 487. n°. 1086. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 473. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1008. n°. 1. — Ger. Em. 1473. — Mill. Ill. Icon. tab. 43. — Lam. Ill. Gener. tab. 434.

Mespilus foliis pinnatis, utrinque glabris. Hall. Helv. n°. 1091.

Sorbus foliis pinnatis. Hort. Cliff. 188. — Flor. suec. 400. 435. — Roy. Lugd. Bat. 274. — Gronov. Orient. 151.

Sorbus (aucuparia), foliis pinnatis; fructibus densè corymbofis, porculis, globosis, ratilis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 290.

Sorbus aucuparia. Tourn. Inst. R. Herb. 634. — J. Bauh. Hist. 1. pag. 62. Icon. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 272. tab. 73.

Sorbus silvestris, foliis domestica similis. C. Bauh. Pin. 415.

Sorbus silvestris. Camer. Epitom. 161.

Sorbus silvestris, alpina. Lobel. Icon. pars 2. tab. 107.

Sorbus (aucuparia), foliis pinnatis; fructu pomiformi, quinqueloculari. Crantz. Austr. pag. 88. tab. 1. fig. 4.

Mespilus florib-ix trigynis; foliis pinnatis, glabris. Scopol. Carn. edit. 1. pag. 584. n°. 3. — Edit. 2. n°. 583.

Sorbus silvestris, aucupario. Frank. Spec. 37.

Aucuparia rivini. Rupp. Jen. 126.

Sorbus aucupario vel ornus. Vainm. Icon. n°. 941.

Vulgairement cormier, sorbier, cohesne.

Arbre d'une médiocre grosseur, qui s'élève peu, & dont le tronc est revêtu d'une écorce lisse & grise; celle des rameaux d'un brun foncé, très-glabre. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, un peu pubescentes dans leur jeunesse, glabres à leurs deux faces dans leur entier développement, composées de treize à quinze folioles & plus, lancéolées, aiguës, opposées, sessiles, dentées en scie à leurs bords, vertes en dessus, blanchâtres ou d'un gris blanc en dessous, longues de deux pouces, sur six lignes & plus de large, à nervures sinuées, latérales, alternes; les veinules réticulées, le pétiole commun cylindrique en dessous, canaliculé & strié en dessus.

Les fleurs sont disposées en un beau bouquet

ou corymbe rouffu, étalé, axillaire, latéral & terminal, dont les ramifications sont glabres, cylindriques, axillaires, inégales. Le calice est pubescent, ainsi que les pédoncules, concave, court, presque campanulé, divisé à son orifice en cinq découpures aiguës. La corolle est blanche; les pétales concaves, arrondis, les étamines un peu plus courtes que la corolle; les pistils au nombre de trois, quelquefois quatre ou cinq. Les fruits sont un peu arrondis, d'un rouge-vif, pulpeux, ombiliqués à leur sommet, renfermant dans leur centre trois & même quatre ou cinq semences oblongues, cartilagineuses, placées dans autant de loges distinctes. Le nombre des semences est ordinairement en rapport avec le nombre des pistils; cependant quand ceux-ci sont plus de trois, quelques-unes des semences avortent.

Michaux, qui a observé cette même plante en Amérique, en distingue deux variétés, une à feuilles fortement acuminées, une autre à feuilles insensiblement aiguës; toutes varient également par leurs feuilles glabres ou pubescentes.

Cette plante croît dans les grandes forêts d'Europe, & même dans les bois, en France, aux environs de Paris, en Allemagne, au Canada & sur les hautes montagnes de la Caroline. h (P. v.)

Cet arbre, très-agréable dans les bosquets de printemps, par le grand nombre de belles fleurs blanches dont il est tout chargé, ne l'est pas moins en automne & dans une partie de l'hiver par ses beaux fruits d'un rouge-vif de corail. Aussi, quoiqu'indigène de l'Europe, l'a-t-on retiré des forêts pour en orner les bosquets. Les merles, les grives, & en général la plupart des oiseaux frugivores, & même les bestiaux, sont très-avides de ses fruits: ils sont diurétiques, très-astringents, surtout avant leur maturité parfaite. On peut en obtenir par la fermentation une liqueur vineuse & spiritueuse. Toutes les parties de cet arbre sont astringentes, & peuvent servir à tanner les cuirs: on se sert de ses rameaux dans la teinture noire commune: l'on prétend que son bois seul pourroit suffire pour teindre en un noir très-beau & très-durable.

Ce bois est très-dur, & propre aux ouvrages qui exigent de la solidité; il est recherché par les ébénistes, les menuisiers, les armuriers: on l'emploie surtout pour les parties des machines qui sont exposées à de grands frottements, telles que des pièces de pressoir, des outils de menuiserie, des chevilles de moulins, &c. mais il est un peu sujet à se tourmenter.

2. *Sorbeer domestica. Sorbus domestica.* Linn.

Sorbus foliis pinnatis, subsist vill-fo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 684. — Mill. Dict. n°. 2. — Duroi, Harbk. 2. pag. 423. — Hoffm. Germ. 171.

— Roth. Germ. vol. I. pag. 214. — vol. II. pag. 546. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 488. n°. 1086. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 474. n°. 2. — Gouan, Monip. pag. 241. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1009. n°. 3. — Jacq. Flor. austr. 5. tab. 447. — Destont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 356.

Muscis foliis pinnatis, subtri. Allosi. Haller, Hclv. n°. 1092.

Sorbus foliis pinnatis; fructu pyriformi, quinqueloculari. Crantz. Austr. pag. 87. tab. 2. fig. 3.

Sorbus sativa. C. Bauh. Pin. 415. — Edw. Av. tab. 211. — Rai, Hist. 1456. — Tournef. Infl. R. Heib. 633. — Blauw. tab. 174. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 272. n°. 1.

Sorbus. J. Bauh. Hist. 1. pag. 59. Icon. Mala. — Dodon. Empt. pag. 803. — Tabern. Icon. 1019.

Sorbus legitimo. Clus. Hist. 1. pag. 10. Icon. — Parkinson, Theatr. 1420. Icon. — Gerard. Hist. 1471.

Sorbus domestico. Matth. Comment. lib. 1. cap. 136. — Camer. epit. 160. — Lobel. Icon. pars 2. tab. 106. — Dalech. Hist. 1. pag. 330. Icon. — Tragw. 1012. Icon. Mala.

Sorbus ovatum. Fusch. Hist. 576. Icon.

Le sorbier commun. Regnault, Botan. Icon.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *sorbus aucupario* : à peine peut-elle même en être distinguée lorsqu'on ne s'attache qu'à quelques-unes des parties de cet arbre, telles qu'aux feuilles & aux fleurs; cependant, considérée avec plus de soin, on ne peut ni confondre ces deux plantes ni les regarder comme de simples variétés, la culture ne leur faisant rien perdre des caractères qui les constituent.

Celle dont il est ici question est un arbre ordinairement plus élevé que le précédent : son tronc est droit, & ses branches forment une tête assez régulière. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, ailées. Les folioles sont en général moins nombreuses dans le *sorbus aucupario*, elles sont ovales-oblongues, un peu obtuses, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, & légèrement cotonneuses même dans leur développement parfait.

Ses fleurs sont blanches, disposées en corymbe dont les ramifications & les pédoncules sont blanchâtres & tomenteux; ils deviennent souvent glabres en vieillissant. Les étamines sont au moins aussi longues que la corolle. Les fruits distinguent particulièrement cette espèce de la précédente; ils sont beaucoup plus gros, en forme de petites poires, d'un rouge-jambré, à trois, quelquefois cinq loges, mais dont au moins deux avortent fréquemment. Les semences sont ovales, oblongues, membra-

neuses. Ces fruits produisent plusieurs variétés, qui diffèrent par leur grosseur, leur forme & même leur couleur; mais on n'a pas encore remarqué qu'aucune de ces variétés amenât les fruits de l'espèce précédente.

Cet arbre croît plus généralement dans les forêts de l'Europe méridionale, en Barbarie, dans les environs d'Alger; mais on l'a rencontré aussi aux environs de Paris. Il est cultivé au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

Les fruits de cet arbre sont astringens, un peu difficiles à digérer; ils occasionnent beaucoup de vents, néanmoins on les mange dans plusieurs provinces, en les laissant amolir dans de la paille, comme on le fait pour les nèfles.

3. SORBIER hybride. *Sorbus hybrida*. Linn.

Sorbus foliis semipinnatis, subtri. tomentosa. Linn. Decad. 6. — Oeder. Flor. dan. tab. 30. — Willd. Arbr. 166. — Hoffm. Germ. 177. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 214. — vol. II. pag. 545. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1008. n°. 2.

Crotaeg. fennica Kolmii. y. Linn. Flor. suec. edit. 2. pag. 167. n°. 433.

On distingue cette espèce des deux précédentes par la forme de ses feuilles tomenteuses en dessous, & qui ne sont ailées qu'à leur partie inférieure; la partie supérieure est ou entière & lobée à son contour, ou à demi-pinnatifide.

Cet arbre présente à peu près le même port que le *sorbus domestico*. Ses rameaux sont d'un brun-foncé, nus, tomenteux & blanchâtres dans leur première jeunesse, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales-oblongues, très-obtuses, glabres & vertes à leur face supérieure, très-blanches, nerveuses & tomenteuses en dessous, très variables dans leur forme; les unes, surtout les supérieures, presque entières dans toute leur longueur, lobées, irrégulièrement dentées, ou un peu à demi-ailées; d'autres, & c'est le plus grand nombre, ailées à leur base jusque vers leur milieu plus ou moins. Les pétioles sont cylindriques, un peu comprimés, cotonneux.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe touffu, très-rameux; les rameaux & les pédoncules tomenteux, surtout dans leur jeunesse; les calices presque lanugineux, la corolle blanche, les étamines de la longueur des pétales; les fruits blanchâtres ou pubescens dans leur jeunesse, petits, touffus, un peu pyriformes.

Cet arbre croît dans la Lapponie. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. Il est ornement. h (V. v.)

Soubenissa. *Pec. ponnayam*. Hort. Malab. vol. 5. pag. 37. tab. 24.

Arbustueux peu commun, qui s'élève à la hauteur d'environ douze pieds, dont les rameaux sont étalés, diffus ; le bois blancâtre ; l'écorce cancrée & linnéineuse. Les feuilles sont alternes, linéolées, grandes, pétioles, très-entières, acuminées, à fortes nervures dirigées vers le sommet des feuilles.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des rameaux, disposées en un épi pédonculé, alongé, plumeux, d'un vert-jaurâtre. Les fruits sont arrondis, à quatre angles, verdâtres, couronnés à leur sommet par un ombilic à quatre découpures. Les semences sont petites, oblongues, roussâtres, luisantes, distribuées dans quatre loges.

Cette plante croît au Malabar ; elle reste verte toute l'année, fleurit & donne ses fruits au mois d'août. On fait avec le suc de ses racines & de ses feuilles, uni au miel, un onguent employé contre les morsures & le venin des animaux.

SOUCHET. *Cyperus*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, hermaphrodites, de la famille des fougères, qui a de grands rapports avec les *scirpes*, & qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les tiges ou chaumes sont triangulaires dans le plus grand nombre des espèces, cylindriques dans quelques autres ; les fleurs disposées en épis agglomérés ou en ombelles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs hermaphrodites, disposées en épis comprimés ; les bates calicinales disposées, par imbrication, sur deux rangs opposés ; trois étamines ; un style ; trois stigmates ; une semence nue, enveloppée par le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Pour calice une écaille ovale, carinée, convexe, dont la réunion forme un épi ou épillet comprimé, tubrigé par les écailles placées sur deux rangs opposés.

2°. Point de corolle.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont très-courts, terminés par des anthères oblongues, filiformes.

4°. Un ovaire supérieur, fort petit, surmonté d'un style filiforme, alongé, terminé par épillet stigmates capitulaires.

Les semences sont solitaires, ordinairement un peu triangulaires, nues, acuminées, enveloppées

par les écailles calicinales persistantes, dépourvues de poils à leur base.

Observations. Ce genre n'est que bien faiblement séparé des *scirpes*. Les écailles calicinales, au lieu d'être imbriquées en tous sens, comme dans les *scirpes*, le sont sur deux rangs opposés. Néanmoins ce caractère est si peu sensible dans quelques espèces, surtout dans celles dont les épillets sont presque cylindriques, qu'on est incertain auquel des deux genres les rapporter. Nous renvoyons, pour les autres considérations, aux observations que nous avons déjà présentées à l'article *SCIRPE*. Nous ajouterons que le nombre des étamines n'est pas constant. Quoiqu'il y en ait trois dans la plupart des espèces, on en trouve aussi à une seule ou à deux étamines ; le style divisé en deux ou trois stigmates.

Les sous-divisions établies sur la disposition des fleurs ne laissent pas que d'avoir des difficultés, quoiqu'elles facilitent d'ailleurs la distribution & la reconnaissance des espèces. Linné s'en est borné à celle des tiges, cylindriques dans les unes, triangulaires dans un plus grand nombre d'autres. Depuis lui on a ajouté d'autres coupes appuyées sur les épillets simples ou filiformes, & remis en ombelle ; ou pédonculées, en ombelles simples ou en ombelles composées, c'est-à-dire, en ombelles & en ombellules.

Ces sous-divisions, si faciles à reconnaître en apparence, deviennent nulles pour un assez grand nombre d'espèces. J'ai très-souvent observé que des espèces à ombelles filiformes devenoient souvent pédonculées, que beaucoup d'autres, à ombelles simples, produisoient des ombellules, & vice versa. On ne peut donc prononcer affirmativement sur la véritable place d'une espèce, qu'après s'être assuré, par l'examen d'un très-grand nombre d'individus, qu'elle ne varie pas ; mais quand on ne peut les observer que dans les herbiers, il est difficile de ne pas commettre quelque erreur, d'autant plus funeste à la science, qu'elle occasionne l'établissement de nouvelles espèces, qui ne sont que des variétés.

ESPÈCES.

* *Tige cylindrique.*

1. **SOUCHET petit.** *Cyperus minimus*. Linn.

Cyperus culmo capillari, spica solitaria geminata, involucri monocotyllo. Thunb. Prodr. pag. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 269. n°. 1.

Cyperus (minimus), culmo tereti, nudo ; spica sub apice. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 66. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 143. n°. 697.

2. *Cyperus (teretibus), culmo nudo, festaceo ; spica solitaria geminataque, sessilibus.* Linn. f. Suppl. pag.

103. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 143. n° 700.

Cyperus (lateralis), culmo teretiusculo, nudo; spica laterali, sessili. Linn. f. Suppl. pag. 102.?

Cyperus culmo tereti, spicas sub apice ferente. Hort. Cliff. 21. — Roy. Lugd. Bat. 49.

Scirpus setaceus. Var. n. Rottb. Gram. pag. 47. tab. 15. fig. 4.

Gramen parvum, athiopicum, tenuissimis foliis, spica simpliciter & gemmâ. Pluken. Almag. pag. 176. tab. 300. fig. 4, 5.

Gramen cyperoides, minimum; spicis plurimis, compitis, ex oblongo-rotundis. Sloan, Jam. 36. Hill. 1. pag. 120. tab. 79. fig. 3. — Rai, Hill. 3. pag. 625.

γ *Cyperus* (πυγμαξ), culmo teretiusculo, nudo, vix ancili; spica sessili, sub apice; squamis striatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 143. n° 699.

Cette espèce a des tiges simples, très-basses, à peine de la longueur d'un pouce, quelquefois cependant hautes de deux ou trois pouces, réunies en gazon, chevillées, sétacées ou de la grosseur d'un crin de cheval, cylindriques, dépourvues de feuilles, très-rabres, lisses, terminées ordinairement par un, quelquefois deux épis sessiles, situés latéralement un peu au dessous du sommet, lisses, ovales, comprimés, à deux angles, munis de huit à douze écailles fort petites, disposées sur deux rangs opposés, un peu aiguës, très-glabres, garnies, à la base de l'épi, d'un involucre à une seule foliole. La plante s'en paraît être la même, ou du moins une simple variété de la précédente, dont les tiges, plus basses, ne portent qu'un seul épi composé d'un plus petit nombre de fleurs. Quant à la variété γ, elle a trop de rapport avec les deux plantes précédentes pour en être séparée. Les écailles des épis sont striées. Ses tiges sont très-courtes, terminées par un épi solitaire, latéral, sessile, situé un peu au dessous du sommet.

Cette plante croît dans la Jamaïque, en Afrique, au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

2. SOUCHET sétacé. *Cyperus setaceus.* Retz.

Cyperus culmis setaceis, striato-angulosis, nudis; spica terminali, subquadriflora, nuda. Retz. Obscrv. bot. 5. pag. 10. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 269. n° 2.

Cette espèce a de grands rapports avec le *scirpus acicularis*, &c, sous cette considération, ces deux espèces devroient être rangées dans le même genre, &c de préférence dans les souchets, ayant toutes deux leurs écailles calicinales disposées sur deux rangs, mais moins sensiblement dans le *scirpus acicularis*.

Ses tiges sont droites, peu élevées, très-fines, sétacées, fasciculées, striées, un peu anguleuses, très-glabres, dépourvues de feuilles, munies, seulement à leur base, de quelques gaines cylindriques, membraneuses. Elles supportent à leur sommet des fleurs disposées en un seul épi grêle, très-court, composé d'environ quatre fleurs privées d'involucre à leur base.

Cette plante croît en abondance parmi les zones humides, à Calcuta.

3. SOUCHET des sables. *Cyperus arenarius.* Retz.

Cyperus culmo compresso, nudo; spicis capituli glomeratis, sessilibus; involucri fascimonophyllo. Retz. Obscrv. bot. 4. pag. 9. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 269. n° 3.

Scirpus maderaspatanus, capitulo squamoso, subrotundo. Scheuchz. Gramin. 3. 69.

Gramen cyperoides maderaspatanus, capite ex spicis plurimis acuminatis, in eacumque oculis glomerato. Pluken. Almag. pag. 178. tab. 300. fig. 7. Bona.

Ses tiges s'élèvent en touffes; elles sont glabres, comprimées, assez grêles, très-lisses, nues dans toute leur longueur, munies à leur base de quelques membranes vaginales, terminées à leur sommet par plusieurs épis courts, sessiles, agglomérés, aigus, formant presque une petite tête ovale. Ces fleurs sont composées d'écailles imbriquées sur deux rangs opposés, rouilleuses, petites, un peu aiguës, soutenues, à la base des épis, d'un involucre ordinairement à une seule foliole.

Cette plante se rencontre aux Indes orientales, où elle croît dans le sable mouvant. γ

4. SOUCHET prolifère. *Cyperus prolifer.* Thunb.

Cyperus culmo tereti, capitulo globo, prolifero. Thunb. Prodr. pag. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 270. n° 4.

Scirpus prolifer), culmo tereti, compresso, nudus; capitulis glomeratis, nudis, tandem proliferis. Rottb. Gram. pag. 55. tab. 17. fig. 2.

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce & le *Cyperus arenarius*, surtout par la disposition des fleurs; cependant celle-ci en est très-distincte par son port & par d'autres caractères qui lui sont particuliers.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, médiocrement comprimées, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur, munies de membranes vaginales à leur partie intérieure. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en épis agglomérés, &c forment une petite tête globuleuse, du centre de laquelle sortent une ou plusieurs autres têtes, toutes dépourvues d'involucre à leur base.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. α

5. SOUCHET étalé. *Cyperus effusus*.

Cyperus culmo tereti, subligneo; umbellâ rotâ, spicis glomeratis, involucrio subulato, triphylo. Rottb. Gram. pag. 22. tab. 12. fig. 3. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 270. n°. 5.

Ses tiges sont fermes, roides, cylindriques, blanchâtres, grêles, finement striées; elles supportent à leur sommet des fleurs réunies sur des épillets presque en ombelle, sessiles, agglomérés à leur base, écartés entr'eux; souvent il sort latéralement deux ou trois rayons courts, terminés également par une tête de fleurs. Ces épillets sont lanceolés, à ongles, munis d'écaillés nombreuses, un peu pubescentes, ovales, concaves, striées, acuminées, purpurines sur leur carène, scarieuses & de couleur cendrée à leurs bords. L'involucre est composé de trois folioles inégales; la plus grande, bien plus longue que l'ombelle, est droite, roide, & paroit être un prolongement de la tige. Les deux autres sont sabuleuses, plus courtes que les fleurs.

Cette plante croît dans l'Arabie, aux environs de la Mecque.

6. SOUCHET à tige comprimée. *Cyperus complanatus*, Willd.

Cyperus culmo compresso, plano, nudo; umbellâ compressâ; involucrio diphylo, pariali brevissimo, polyphylo; foliulis fissacis, basi membranaceis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 270. n°. 8.

Scirpus (complanatus), culmo compresso, angustius; umbellâ supra decompositâ; involucrio diphylo, longiore. Retz. Observ. f. pag. 14. ?

Cette plante a des tiges droites, hautes d'environ deux pieds, dépourvues de feuilles, comprimées, à deux angles planes, opposés. Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale & composée, munie à sa base d'un involucre universel à deux folioles, dont l'une est plus longue que l'ombelle, linéaire, un peu obtuse; l'autre linéaire-lanceolée, à peine aussi longue que l'ombelle; les involucre partielles composées de plusieurs folioles rudes, sétacées, très-courtes, élargies & membraneuses à leur base. Les épillets sont d'un brun-obscur, munis d'écaillés imbriquées, aiguës, membraneuses à leurs bords.

Cette plante croît à Java. α (Descript. ex Willd.)

7. SOUCHET articulé. *Cyperus articulatus*, Linn.

Cyperus culmo tereti; nudo, articulo. Linn. Spec. Pl. nr. vol. 1. pag. 66. — Rottb. Gram. pag. 26. — Swartz, Observ. Bot. pag. 29. — Vahl, Symb.

pag. 7. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 270. n°. 6.

Cyperus (articulatus), culmo tereti, nudo, articulo; umbellâ compressâ, nudâ. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 143. n°. 697.

Cyperus culmo nudo, articulo. Roy. Lugd. Bat. 51.

Cyperus (niloticus), culmo tereti, nudo, aequali, non articulo; umbellâ compressâ, spicis globosis. Forsk. Flor. ægypt-arab. pag. 13. n°. 37.

* *Cyperus teres, erectus; spiculis striatis, ovatis, exterioribus pedunculatis, conferatim nascentibus.* Brown. Jam. 128. n°. 10.

Juncus cyperoides, creberrimè geniculatus; medullâ fortius, aquaticus; radice rubrâ, tuberosâ, odoratâ. Sloan, Jam. 36. pag. 121. tab. 81. fig. 11.

Cyperus (articulatus), ophyllis, elatior; culmo tereti, subprementibus digitis quasi articulo; umbellâ compressâ; spiculis subsulcatis, longi-linearibus, erectis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 27.

β . *Idem, umbellatis paniculosis, spiculis duplè longioribus.* Lam. Illustr. Gener. l. c.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes d'environ deux pieds, de la grosseur du petit doigt à leur partie inférieure, insensiblement rétrécies vers leur sommet, lisses, spongieuses intérieurement; leur moëlle séparée par intervalles, d'où il résulte que lorsque l'on glisse ces tiges entre les doigts, elles paroissent articulées; ces articulations, peu sensibles dans les individus vivans, le deviennent davantage par la dessiccation. Les racines sont tubéreuses, rougeâtres, odorantes; les chaumes dépourvus de feuilles.

Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale, plus ou moins composée, formée d'épis alternes, très-rapprochés, fasciculés ou réunis en tête; chaque épi droit, oblong, linéaire, muni d'écaillés calicinales imbriquées, lanceolées, une plus courte à la base. Les pédoncules sont inégaux, allongés, simples ou divisés à leur sommet en une seconde ombelle; dans le centre, un pédoncule solitaire, plus court, à un seul épi, contenant depuis dix jusqu'à vingt fleurs, dépourvues d'involucre dans la variété β . Les ombellules sont paniculées, & les épis une fois plus longs.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans la Caroline, l'Égypte, dans les Indes, sur le bord des ruisseaux. La variété β a été recueillie dans l'île Maurice. α (V. f. in herb. Lam.)

8. SOUCHET pourpré. *Cyperus atropurpureus*, Persl.

Cyperus culmo tereti, subsulphoso, retrorsum scabro;

foliis subulatis, canaliculatis. Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 60. n°. 11.

Cyperus striatus. Flor. peruv. vol. 1. pag. 47.

Cette espèce a des tiges droites, cylindriques, médiocrement feuillées, glabres, rudes lorsqu'on les glisse entre les doigts de bas en haut. Les feuilles sont peu nombreuses, subulées, canaliculées, environnant les tiges par une gaine ciliée à sa partie inférieure. Les fleurs sont composées d'épillets ovales, d'un pourpre-noirâtre.

Cette plante croît sur les collines arides, dans les environs de la ville de Tarma au Pérou. Elle fleurit dans le courant de l'hiver.

9. SOUCRET ponctué. *Cyperus punctatus*. Lam.

Cyperus culma tereti, nudo, basi vaginato; spiculis sessilibus, capitatis, proliferis; squamis pubescentibus. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 144. n°. 701.

Ce fouchet a des tiges droites, cylindriques, striées, hautes de huit à dix pouces, dépourvues de feuilles, garnies seulement à leur base d'une gaine cylindrique, membraneuse, d'un brun-rougeâtre, tronquée, longue d'environ un pouce & demi.

Ces tiges se terminent par une tête composée de plusieurs épillets sessiles, serrés, inégaux, sans involucre, garnis d'écaillies calicinales, imbriquées, concaves, éparées, ovales, striées, un peu aiguës, panachées par des points bruns ou un peu rougeâtres, sur un fond d'un blanc-verdâtre. Souvent du centre de ces fleurs sortent plusieurs autres tiges semblables aux premières, mais plus courtes, également vaginales à leur base.

Cette espèce croît dans les Indes, où elle a été recueillie par M. Sonnerat. (*V. f. in herb. Lam.*)

10. SOUCRET en forme de jonc. *Cyperus junciformis*. Cavan.

Cyperus culmo junciformi, subtereti, basi monophyllo; spiculis aggregatis, sessilibus; spatia aliphellâ; foliolo altero, spiculis brevioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 41. tab. 7. fig. 1.

Cyperus culmo mucronato; spiculis lateralibus, nigris, sessilibus, absque involucre. Cavan. Icon. Rar. n°. 223. tab. 204. fig. 1.

Cyperus distachyus. Allion. Auct. 48. tab. 2. fig. 5.

Cette espèce a de grands rapports avec le *Cyperus pannonicus* de Jacquin; elle en diffère par les tiges cylindriques & beaucoup plus élevées, par ses épillets plus allongés, par l'une des deux folioles de la collerette, plus courte que les épillets.

Ses tiges sont grêles, assez semblables à celles des juncs, lisses, cylindriques, droites, simples, aiguës, nues dans toute leur partie supérieure,

hautes d'un pied & plus, munies ordinairement d'une seule feuille à leur base, un peu arrondie, subulée, plus courte que les tiges qu'elles enveloppent par une gaine entière, cylindrique, allongée.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en trois ou six épillets sessiles, linéaires, souvent légèrement courbés en arc, obtus, de couleur brune, longs de quatre à six lignes, composés d'écaillies concaves, imbriquées sur deux rangs opposés, obtuses; munis à leur base d'un involucre en forme de spathe, forme de deux folioles très-inégales, une beaucoup plus longue, droite, subulée, serinée, aiguë, deux & trois fois plus longue que les épillets, & qui paroît être le prolongement de la tige; l'autre fort petite, bien plus courte que les épillets, quelquefois à peine visible.

Cette espèce croît sur les côtes de Barbarie & en Espagne. (*V. f.*)

11. SOUCRET à épis serrés. *Cyperus congestus*.

Cyperus culma tereti, folioso; umbellâ decompositâ, involucre pentaphyllo, spiculis congestis, subsessilibus. Retz.

Cyperus compactus. Retz. Observ. 5. pag. 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 271. n°. 10.

Ses racines sont fibreuses, & produisent des tiges cylindriques, striées, hautes de deux pieds, garnies à leur partie inférieure de feuilles linéaires, de la hauteur des tiges, striées, glabres; leur gaine purpurine.

L'ombelle est composée de plusieurs rayons cylindriques, étalés, qui soutiennent des ombellules de trois à cinq rayons terminés par des épillets rapprochés en tête, linéaires, subulés, d'un brun-noirâtre, sessiles, longs d'un demi-pouce, garnis d'environ six fleurs, dont les écaillies calicinales sont subulées, striées, purpurines, vertes sur leur carène. L'involucre est à cinq folioles inégales, dont une est longue d'un pied & demi, rudes à leurs bords.

Cette plante croît à la Chine. (*Descript. ex Retz.*)

12. SOUCRET mucroné. *Cyperus mucronatus*, Rottb.

Cyperus culmo nudo, vaginato, triquetris; involucre monophyllo, arida; spiculis subternis, sessilibus. Rottb. Gramin. pag. 19. tab. 8. fig. 4. — Vahl, Symb. 1. pag. 7. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 273. n°. 20.

Cyperus (lateralis), culma tereti, basi vaginato, folioso, capitulo laterali. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 13. n°. 38.

Cyperus (mucronatus), culmo tereti, nudo; spiculis lateralibus, sessilibus; involucre monophyllo. Retz. Observ. 5. pag. 10.

Ses tiges sont hautes de six à huit pouces, glabres, cylindriques à leur partie inférieure, rétrécies & légèrement trigones vers leur sommet, presque subulées, nues dans toute leur longueur, enveloppées à leur base par plusieurs gaines cylindriques, tronquées ou quelquefois terminées par une petite feuille longue d'environ deux pouces.

Les fleurs sont latérales (terminales si l'on considère le prolongement de la tige comme un involucre subulé, à une seule foliole), & forment une tête composée de deux à dix épillettes ovales, lancéolées, médiocrement comprimées, d'un vert-pâle, tous fertiles; l'épillet du milieu souvent un peu plus long que les autres, & même légèrement pédonculé; garnis de huit à dix fleurs; à la base de chaque épillet deux écailles ou bractées vertes, lancéolées, une fois plus courtes que les épillettes. Quelquefois, outre la partie supérieure de la tige, on observe une foliole qui lui ressemble, subulée, canaliculée, écartée, & plus longue que les épis.

Cette plante se rencontre également dans les Indes & dans l'Égypte, sur les rives du Nil; elle fleurit au commencement du mois de novembre.

13. SOUCHET maritime. *Cyperus maritimus*.

Cyperus culmo tereti, pumilo; foliis latis, subcannaliculatis, asperis; umbellâ compositâ; spiculis confertis, sessilibus, subcylindricis; involucri polyphylo, nudo; radice repente. (N.)

Ses racines sont dures, traçantes, garnies de fibres; elles produisent des tiges feuillées, cylindriques, roides, très-droites, lisses, finement striées, hautes de quatre à six pouces, garnies à leur base de feuilles nombreuses, imbriquées, très-fermes, coriaces, rudés à leurs bords, très-lisses, un peu canaliculées, très-aiguës, longues de six à dix pouces, larges de quatre à cinq lignes.

L'involucre est composé de plusieurs folioles très-inégaux, assez semblables aux feuilles, beaucoup plus longues que l'ombelle. Celle-ci est courte; ses rayons sont nombreux, inégaux, longs d'un demi-pouce à un pouce au plus, serrés, munis à leur base d'une gaine très-courte, lâche, divisée en deux longues dents subulées, opposées; chaque rayon supporte un grand nombre d'épillets fertiles, agglomérés, presque cylindriques, aigus, longs au moins d'un demi-pouce, roussâtres, garnis d'écailles concaves, striées, ovales, obtus, très-fermées; le style à trois divisions profondes.

Cette plante croît dans le sable, sur les bords de la mer, à l'île de Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. T.)

14. SOUCHET empenné. *Cyperus pennatus*, Lam.

Cyperus culmo semitereti, umbellâ supra decompositâ, foliosâ; spiculis alternis, confertis, pennatis, paucifloris. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 703.

Cette plante a des tiges droites, assez fortes, striées, d'un vert-pâle, à demi-cylindriques, hautes d'un pied & demi à deux pieds, terminées par une ombelle ample, feuillée, plusieurs fois composée, munie à sa base d'un involucre à plusieurs folioles étalées, roides, planes, striées, claires à leur partie inférieure, très-aiguës, extrêmement longues, accrochantes à leurs bords.

Les rayons de l'ombelle sont courts, inégaux, roides, presque triangulaires, striés; ils se divisent à leur sommet en plusieurs ramifications souvent simples, étalées en forme d'ailes, garnies dans presque toute leur longueur d'épillets fertiles, alternes, horizontaux, un peu arrondis, petits, ovales-oblongs, aigus, roussâtres, composés d'écailles concaves, imbriquées, striées, acuminées à leur sommet.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île de Java, sur les bords des fleuves. (V. f. in herb. Lam.)

15. SOUCHET à tiges nues. *Cyperus nudicaulis*.

Cyperus culmo subcylindrico, gracili, nudo; spiculis sessilibus, subcapitatis, ovatis, planis; involucri subdiphylo, brevis. (N.)

Ses tiges sont droites, élancées, grêles, striées, presque cylindriques, un peu anguleuses, glabres, parfaitement nues, hautes d'environ deux pieds, terminées par des épillets au nombre de six à douze, fertiles, agglomérés en ombelle, élégants, larges, ovales, comprimés, obtus, longs d'un demi-pouce, luisants, souvent mêlés de blanc-cendre & d'un brun-rougeâtre, garnis d'écailles fortement imbriquées sur deux rangs opposés, concaves, coriaces, presque obtuses. L'involucre est composé de deux, quelquefois trois folioles inégales, subulées; la plus grande à peine plus longue que les épillets. Le style est trifide; les semences triangulaires.

Cette plante a été recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. T.)

* * Tige triangulaire; un ou plusieurs épis fertiles, en ombelles simples ou médiocrement composées.

16. SOUCHET à un seul épi. *Cyperus monostachyos*, Linn.

Cyperus culmo triquetro, nudo; spicâ simplici, ovata, terminali; squamis macronatis. Linn. Mant. pag. 180. — Swartz, Observ. pag. 29. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 704. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 271. n°. 11.

Gramen

Grasses cyperoides, minimum; spica simplici, composita; radice tuberosa, odorata. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 120. tab. 79. fig. 2.

Iria (*Cyperus caribæus*), *espèce laro; squamis binis, infimis aristatis.* Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 65. n°. 91.

Ses racines sont munies de quelques tubercules odorans; il s'en élève plusieurs tiges lâches, molles, filiformes, triangulaires, disposées en gazon, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur, excepté à leur base, hautes d'environ huit à dix ponce, quelquefois plus; munies à leur partie inférieure de feuilles radicales nombreuses, linéaires, très-étroites, lâches, très-lisses, longues de six à sept ponce.

Les fleurs sont réunies en un seul épi terminal, très-simple, ovale, lisse, médiocrement comprimé, de la grandeur d'une semence de concombre, composé d'écaillés imbriquées, relevées en carène; les supérieures très-serrées, mutiques, un peu mucronées; les deux inférieures lâches, aristées; un involucre à la base de l'épi, forme d'une ou de deux folioles subulées, de la longueur de l'épi; chaque écaille ne renferme qu'une seule étamine, deux filigames. Les semences sont mutiques.

On trouve cette espèce dans les pâturages secs de l'Amérique méridionale, à la Jamaïque, à la Nouvelle-Espagne.

17. SOUCHET des Indes. *Cyperus indicus.* Pers.

Cyperus espèce strida, squamis plurimis aristatis. Persoon, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 65. n°. 92. (*Iria*.)

Cyperus (*monostachyos*), *culmis setaceis, triquetris, subnudis; spica simplici, terminali, ovata; squamis infimis longius mucronatis.* Rottb. Gram. pag. 18. tab. 13. fig. 3.

Cette plante, très-voisine du *Cyperus monostachyos*, avec laquelle on l'a confondu, en paroît néanmoins assez distincte pour en être séparée. Outre qu'elle croît dans les Indes orientales, tandis que l'autre se trouve dans l'Amérique méridionale, elle en diffère particulièrement par ses tiges droites, plus roides, plus serrées, réunies en gazons denses; fines, sétacées, triangulaires, presque nues, munies à leur base de feuilles très-fines. Les fleurs forment un épi solitaire, terminal, ovale, composé d'écaillés, dont les inférieures sont aristées; les supérieures imbriquées, serrées, contenant chacune une étamine & deux filigames.

Cette espèce croît dans les pâturages secs des Indes orientales.

Nota. M. Richard pense que cette espèce & la précédente doivent être séparées des *Cyperus*, & Botanique. Tome VII.

former un genre particulier sous le nom d'*Iria*, dont le caractère essentiel consiste dans un épi simple, composé d'écaillés imbriquées, médiocrement disposées sur deux rangs; les écaillés supérieures entières & serrées; les inférieures aristées. Le nombre des étamines étant assez souvent variable, tant dans les touchets que dans les scirpes, elles ne peuvent être employées pour établir le caractère générique, à moins qu'elles ne soient réunies à d'autres caractères plus constants & mieux tranchés. C'est une considération qui ne doit pas échapper à ceux qui se proposent d'établir des genres nouveaux.

18. SOUCHET à deux épis. *Cyperus distachyos.* Willd.

Cyperus culmo triquetris, filiformi, basi folioso; spica binis, sessilibus, involucri brevioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 272. n°. 12.

Ses tiges sont basses, droites, filiformes, glabres, striées, à trois angles; hautes d'environ cinq à six ponce, munies d'une seule feuille à leur base, étroite, graminiforme, canaliculée, vaginale à sa partie inférieure. Les fleurs sont réunies sur deux épis sessiles, à l'extrémité des tiges, oblongs, de couleur brune, garnis à leur base d'un involucre composé de trois folioles, dont une très-longue, les deux autres plus courtes que les épis.

Cette plante croît en Italie. (*Descr. ex Willd.*)

19. SOUCHET à trois épis. *Cyperus triflorus.* Linn.

Cyperus culmo triquetris, nudo; umbellâ triflorâ, intermediâ sessili; spiculis levigatis. Linn. Mantill. pag. 180. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 272. n°. 13.

Sichanus (*Cyperoides*), *culmo compresso, semitereti, nudo; spiculis sessilibus, lanceolatis, tortis; infima involucriata.* Retz. Observ. 4. pag. 8.

Ses tiges sont droites, triangulaires, légèrement comprimées & presque à demi-cylindriques, glabres, lisses, dépourvues de feuilles; elles se terminent par trois épis lisses, ovales, comprimés, à deux angles opposés, tranchés, composés d'écaillés calicinales, imbriquées sur deux rangs opposés, glabres, acuminées; les deux épis latéraux supportés par des pédoncules plus longs que les épis; l'épi du milieu sessile. L'involucre est terminal, à deux folioles subulées, plus courtes que les épis.

Cette plante croît dans les prairies sèches de l'Inde.

20. SOUCHET nain. *Cyperus nanus.* Willd.

Cyperus culmo triquetris, setaceo; umbellâ sessili. Hb

capitata, diphylla; glumis nervosis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 272. n°. 14.

Gramen cyperoides, capillaceis foliis, pufillum, ex infula Cheufan. Pluken. tab. 417. fig. 8.

C'est une très-petite plante, dont les tiges sont glabres, triangulaires, sétacées, hautes à peine d'un demi-pouce ou d'un pouce, garnies à leur base de feuilles nombreuses, toutes sétacées, sétacées, plus longues que les tiges, quelquefois une autre feuille plus courte, & solitaire à la partie inférieure des tiges. Les fleurs sont terminales, réunies en une petite ombelle filiforme, dont les épillets sont rapprochés en un fascicule capité; chaque épillet ne contient guère que trois à quatre fleurs, dont les valves calicinales sont imbriquées, obtuses à leur sommet, nerveuses. L'involucre est composé de deux folioles sétacées, plus longues que les épillets.

Cette plante croît dans la Guinée. (*Descript. ex Willd.*)

21. SOUCHET de Hongrie. *Cyperus pannonicus.* Linn. f.

Cyperus culmo triquetra, decumbente; spiculis sessilibus, aggregatis, subquaternis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 407.

Cyperus culmo triquetra; spicis sessilibus, glumis lateralibus, sphacelatis. Linn. f. Suppl. pag. 103. — Jacq. Flor. austr. vol. 5. p. 29. tab. Append. 6.

β. *Idem, minor, vaginis foliorum laxis.* (N.)

Cyperus culmo obsoleto triquetra, prostrato; spicis subquaternis, sessilibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 79. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 273. n°. 19.

Ce souchet se distingue du *Cyperus junciformis* par ses tiges triangulaires & couchées; du *Cyperus tetraepachys* par les épillets sessiles, bien moins comprimés, obtus.

Ses tiges sont très-grêles, presque-filiformes, couchées sur la terre, ou rabattues, glabres, triangulaires, nues, légèrement striées, garnies à leur base de feuilles très-étroites, lisses, aiguës, plus courtes que les tiges, vaginales à leur base. Les fleurs sont latérales, réunies en un fascicule de trois ou quatre épillets sessiles. L'involucre est composé de trois ou quatre folioles très-inegales, la plus grande droite, subulée, & qui n'est qu'un prolongement de la tige, renflée en spathe à sa base, ainsi que les autres; celle qui lui est opposée, subulée & plus longue que les épillets; les autres ne sont presque que des écailles concaves, mucronées, scarieuses, plus courtes que les épillets; ceux-ci sont courts, épais, médiocrement comprimés, obtus, garnis d'écailles calicinales, concaves, très-obtuses, relevées en carène, & ver-

dâtres sur leur dos, d'un brun-noir très-foncé à leurs côtés, un peu membraneux & blanchâtres à leurs bords.

Cette plante croît dans l'Autriche, la Hongrie & l'Espagne. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

N°. 1. La plante β, recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars, ne m'a pas offert de différences assez sensibles pour la séparer de la précédente. Ses tiges sont plus courtes; les gaines des feuilles réfléchies d'une manière remarquable; les épillets moins longs; la principale foliole de la collerette moins droite & moins roide.

22. SOUCHET à quatre épillets. *Cyperus tetraepachys.* Desfont.

Cyperus culmo triquetra; involucri subteraphyllis, corymbo brevioribus; spiculis subquaternis, arcuratis, acutis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 45. tab. 8.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Cyperus pannonicus*, dont elle diffère par ses épillets plus allongés, plus comprimés, arqués; par son involucre plus court que les épillets; par les écailles calicinales aigües & non obtuses, par ses tiges droites, plus élevées; par ses feuilles plus larges.

Ses ratines sont composées d'une touffe épaisse de fibres capillaires, courtes, serrées, d'où s'élèvent des tiges nues, droites, grêles, triangulaires, lisses, légèrement striées, glabres, simples, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, garnies seulement à leur partie inférieure de feuilles glabres, subulées, relevées en carène, étroites, un peu denticulées à leurs bords, vaginales à leur base.

Les fleurs sont presque latérales vers l'extrémité des tiges, disposées en un petit corymbe de quatre, quelquefois cinq épillets pédonculés, soutenus par un involucre à trois ou quatre folioles très-inegales, la plus longue droite, subulée, & qui ne paroît être que la prolongation des tiges; les autres, subulées, en carène, ordinairement plus courtes que les épillets; les pédoncules simples, très-courts, particulièrement les intérieurs, supportant chacun un seul épillet d'un brun-noirâtre, comprimé, long d'environ un pouce au plus, sur une ligne de large, un peu arqué, subulé; les valves calicinales petites, concaves, relevées en carène, verdâtres sur leur dos, aiguës à leur sommet.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans le royaume d'Alger, sur les bords du fleuve Faddah. (V. f.)

23. SOUCHET douteux. *Cyperus dubius.* Rottb.

Cyperus culmo setaceo, triquetra; capitulo terminali; involucri retraphyllo, longissimo. Rotb. Gramin. pag. 20. tab. 4. fig. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 273. n° 16.

Cyperus (leucocephalus), culmo setaceo, triquetra, nudo; capitulo sessili; involucri subtraphyllo, patentissimo; floribus monanthis. Ratz. Obsev. 5. pag. 11. ?

Il existe trop peu de différence entre la plante de Rotballe & celle de Retzius, du moins d'après la description qu'en donnent ces deux auteurs, pour les présenter comme deux espèces distinctes. Willdenow les a réunies, & nous ne trouvons en effet, avec cela, d'autre distinction entre elles que des fleurs à une seule étamine, & un involucre à folioles tétracées, plus étroites dans la plante de Retzius.

Elles ont d'ailleurs des tiges droites, menues, tétracées; elles sont terminées par une petite tête de fleurs sessile, composée d'écaillés imbriquées sur deux rangs, petites, un peu obtuses, munies à leur base d'un involucre ordinairement à quatre folioles très-longues, étalées, fort étroites, glabres, aiguës à leur sommet.

Cette plante croît au Malabar.

24. SOUCHET compaëte. *Cyperus compallus*. Lam.

Cyperus culmo triquetra, nudo; capitulo terminali, subtraphyllo; squamis striatis, obtusiusculis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n° 706.

Ses racines sont composées de plusieurs fibres droites, assez fortes, noires, tortueuses, algues, garnies de chevelus très-courts; elles produisent des tiges droites, hautes de huit à dix pouces, triangulaires, fermes, striées, garnies à leur partie inférieure de feuilles nombreuses, imbriquées, lisses, vertes en dessus, d'un blanc-cendré en dessous, médiocrement larges, graminiformes, très-aiguës, moins longues que les tiges qu'elles embrassent par une gaine d'un brun-noirâtre.

Les fleurs sont réunies en tête à l'extrémité des tiges. Les épillets sont sessiles, très-ferrés, larges, ovales, obtus, comprimés, presque luisans, glauques & d'un blanc-cendré, composés d'écaillés fortement imbriquées sur deux rangs, agréablement striées, obtuses. L'involucre est composé de deux ou trois folioles étalées, roides, très-aiguës, beaucoup plus longues que les fleurs.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île de Madagascar. (V. f. in herb. Lam.)

25. SOUCHET lisse. *Cyperus levigatus*. Linn.

Cyperus culmo triquetra, nudo; capitulo diphylo, floribus levigatis. Linn. Mantiss. 179. — Rotb.

Gramin. pag. 19. tab. 16. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n° 705.

Cyperus (levigatus), culmo trigono; capitulo glomerato, globofo; involucri diphylo, gumis obtusis. Thunb. Prodr. pag. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 274. n° 21.

Cette espèce a des tiges droites, hutes au moins de deux pieds, assez épaisses, très-lisses, à trois faces, n'ayant, à ce qu'il paroît, d'autres feuilles que quelques écaillés sèches, membranacées, linéaires, longues d'environ un pouce, situées à leur partie inférieure.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en une tête arrondie, composée de plusieurs épillets sessiles, munis à leur base d'un involucre à deux folioles planes, canaliculées vers leur partie supérieure, subulées à leur sommet, assez roides, plus longues que les épillets; la plus grande est droite & paroît être un prolongement de la tige; l'inférieure est allée & plus courte. Les épillets sont parfaitement glabres, ovales, oblongs, garnis d'écaillés calicinales imbriquées, ovales, un peu obtuses.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Description. ex Lian.)

26. SOUCHET neigeux. *Cyperus niveus*. Retz.

Cyperus culmo triquetra, filiformi, nudo; umbellâ terminali, fissili, aphyllâ; spicis compressis, lanceolatis. Retz. Obsev. 5. pag. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 273. n° 18.

Cette espèce a des tiges hautes d'un pied & demi, filiformes, triangulaires, striées, munies de feuilles radicales peu nombreuses, courtes, étroites. Les ombelles sont sessiles, terminales, composées de plusieurs épillets d'un blanc de neige, très-comprimés, lancéolés, contenant environ une trentaine de fleurs. Les valves sont carénées, striées, comprimées; elles renferment trois étamines dont les filaments sont membraneux, un ovaire trigone; un style simple, terminé par trois stigmates légèrement velus. Les semences sont noires. L'involucre est à deux folioles réfléchies, plus longues que l'ombelle.

Cette plante croît aux Indes, dans les forêts. (Description. ex Retz.)

27. SOUCHET pied d'oiseau. *Cyperus ornithopus*. Petsoon.

Cyperus culmis caespitosus, incurvis; umbellâ fissili, sublaterali; spicis teretiusculis, sublinearibus; involucri triphylo, longissimo. Petsoon. Synop. Plant. vol. 1. pag. 61. n° 23.

Ses racines poussent des tiges nombreuses, dépourvues de feuilles, à trois faces, glabres, courbées en dehors, soutenant à leur partie supérieure,

H h 2

un peu au dessous de leur sommet, plusieurs épis sessiles, presque linéaires, médiocrement cylindriques, acuminés, garnis d'écaillés calicinales imbriquées, presque épartes, concaves, un peu aiguës. L'involucre est composé de trois folioles très-longues.

Cette espèce croît dans les marais desséchés, à Saint-Domingue.

28. SOUCHET scarieux. *Cyperus squarrosus*. Linn.

Cyperus culmo triquetris, nudo; umbellâ foliosâ, glomeratâ; spicis striatis, squarrosi. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 124. n. 9. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 303. — Lam. Illustr. Genes. vol. 1. pag. 145. n. 714.

Cyperus (squarrosus), culmis triquetris, nudo; umbellâ tetraphyllâ, glomeratâ; spiculis ovatis, glumis mucronatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 274. n. 22.

Cyperus (pygmaeus), culmis triquetris, aggregatis; involucri polyphylli, capitulo terminali subsolitario; spiculis subaequalibus, apice spinulosis. Rottb. Gram. pag. 20. tab. 14. fig. 1. (*Exelutis* synonyme Linnæi & Tillii, secundum Willd.)

Gramen cyperoides, parvum, sinicum; capitulo globoso, ad summum eadem inter quatuor folia fissili. Pluk. Almag. 112.

C'est une fort petite espèce, dont les tiges sont réunies en un gazon touffu, hautes d'environ deux ou trois poices au plus, droites, glabres, dépourvues de feuilles, à trois faces, soutenant à leur sommet une petite tête de fleurs ordinairement solitaire, composée de plusieurs épillets sessiles, ovales, tous presque égaux, agglomérés, munis d'écaillés calicinales imbriquées, scarieuses, striées, acuminées, presque épineuses à leur sommet. Ces épillets sont garnis à leur base d'un involucre à trois ou quatre folioles élargies à leur base, rétrécies, aiguës à leur sommet, plus longues que les épillets.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

29. SOUCHET luisant. *Cyperus nitens*. Retz.

Cyperus culmis triquetris, basi foliosis; umbellâ subsimpliciâ; involucri triphyllâ, floribus monandris. Retz. Observ. 5. pag. 13. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 275. n. 23.

Cette espèce, qui est fort petite, a beaucoup de rapports avec le *Cyperus maderuspatanus*; mais outre que ses fleurs forment une ombelle presque simple & sans sous-divisions pédonculées, les épillets sont une fois plus larges, les écaillés plus courtes.

Ses tiges sont droites, peu élevées, triangulaires, très-glabres, feuillées seulement à leur base. Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des

tiges, en une ombelle ordinairement très-simple, composée de plusieurs épis sessiles, ovales, assez larges, garnis d'écaillés calicinales à une seule étagine, imbriquées, glabres, luisantes, courtes, élargies, presque point écartées à leur sommet; les épillets soutenus à leur base par un involucre universel à trois folioles.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

30. SOUCHET enflanté. *Cyperus cruentus*. Rottb.

Cyperus culmo triquetris; involucri polyphylli, longo; umbellâ simplici, spicis conglomeratis, spiculis sulcato-punctatis. Rottb. Gram. pag. 21. tab. 5. fig. 1. — Vahl. Symb. t. pag. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 275. n. 26.

Cyperus (globosus), culmo triquetris, basi foliosis; spicis conglomeratis, subglobosis; spiculis convexis, viridibus, nitidis. Forst. kh. Flor. ægypt.-arab. p. 13. n. 40.

Cette plante s'élève à la hauteur de six ou huit poices. Ses tiges sont droites, glabres, triangulaires, garnies seulement, à leur partie inférieure, de feuilles blanchâtres & vaginiales à leur base, linéaires, alongées, striées, plissées en deux. Les tiges sont terminées à leur sommet par une ombelle simple, dont les rayons inégaux soutiennent des épillets fasciculés, presque réunis en tête, presque sessiles, alternes, épars, munis d'écaillés calicinales imbriquées, convexes, de couleur verte ou cendrée, luisantes, marquées de lignes & de points d'un rouge-foncé, qui se retrouvent également sur la gaine des feuilles. La base des ombelles est garnie d'un involucre à plusieurs folioles inégales, très-longues, étalées.

Cette plante se rencontre dans l'Arabie.

31. SOUCHET blanchâtre. *Cyperus albidus*. Lam.

Cyperus culmo triquetris; umbellâ simplici, triphyllâ; spiculis conglomeratis, albis; squamis levibus. Lam. Illustr. Genes. vol. 1. pag. 146. n. 724.

Il y a beaucoup d'affinité entre cette espèce & le *Cyperus cruentus*; cependant elle doit en être distinguée par des caractères qui lui sont particuliers. Elle est remarquable par la blancheur de toutes ses parties.

Ses tiges sont grêles, droites, finement striées, triangulaires, d'un blanc-cendré, hautes de six à huit poices, garnies à leur base de quelques feuilles graminiformes, étroites, plus courtes que les tiges, d'un vert glauque-blanc-hâtre, un peu recourbées en dehors, enveloppant les tiges par une gaine lâche, très-mince, membraneuse.

Les fleurs forment une petite ombelle simple, terminale; les rayons inégaux, peu nombreux, supportant à leur sommet plusieurs épillets

sessiles, courts, ovales, obtus, fasciculés, presqu'en tête, remarquables par leur grande blancheur, composés d'écaillés concaves, obtuses, imbriquées, très-glabres, scarieuses. L'involucre est formé par trois folioles inégales, assez semblables aux feuilles, dont deux au moins plus longues que l'ombelle, un peu recourbées en dehors.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par M. Sonnerat. (*V. f. in herb. Lam.*)

32. SOUCHET de Ténériffe. *Cyperus Teneriffæ.*

Cyperus culmo triquetro, basi folioso; spiculis sessilibus glomeratis, lato-complanatis; squamis membranaceis, apice subreflexis; involucri subtriphyllo, longo. (N.)

Ce souchet est fort petit. Ses tiges ne s'élèvent guère qu'à deux ou trois pouces; elles sont menues, foibles, triangulaires, enveloppées à leur base de feuilles étroites, presque tubulées, de la longueur des tiges; les gaines très-minces, larges, blanchâtres, imbriquées.

Les fleurs sont disposées en une tête terminale, composée de plusieurs épillets assez grands, très-comprimés, sessiles, serrés, au nombre de huit à dix, ovales-oblongs, obtus, munis d'écaillés opposées, imbriquées sur deux rangs, concaves, ovales, relevées en carène, membraneuses, d'un brun-rougeâtre, scarieuses à leurs côtés, terminées par une pointe courte, un peu réfléchie en dehors. L'involucre est à trois ou quatre folioles inégales, étroites, aiguës, plus longues que les épillets.

Cette plante croît à l'île de Ténériffe. (*V. f. in herb. Lam.*)

33. SOUCHET à épillets lancéolés. *Cyperus lanceolatus.*

Cyperus culmo triquetro, stricto; foliis angustis, triquetris; involucri subtriphyllo; spiculis sessilibus, congestis, lanceolato-linearibus, compressis; glumis obtus. (N.)

β. Idem, culmo breviori, foliis sublinearibus, planis.

Cette plante a des rapports avec notre *Cyperus fascicularis*; mais les épillets sont plus larges, les feuilles bien plus étroites.

Ses racines sont grêles, fibreuses, fasciculées, garnies de chevelus très-fins & courts; il s'en élève plusieurs tiges droites, grêles, hautes d'environ un pied, triangulaires, munies à leur partie inférieure de feuilles roides, droites, fort étroites, presque triangulaires, longues de six à huit lignes, élargies à leur base en une gaine allongée, souvent ouverte & presque plane vers son sommet; elles sont recouvertes, proche les racines,

par quelques autres gaines courtes, tronquées ou un peu prolongées à leur sommet.

Les fleurs sont terminales, disposées sur des épillets nombreux, sessiles, fasciculés, linéaires-lancéolés, longs de six à huit lignes, larges presque de deux, très-comprimés, très-lisses, un peu jaunâtres, luisans, composés d'écaillés imbriquées sur deux rangs, concaves, obtuses; l'involucre à deux ou trois folioles semblables aux feuilles, dont une très-longue, les autres plus courtes.

Cette plante croît à Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (*V. f. in herb. P. T.*)

Nota. La plante *β.*, recueillie par le même voyageur à Madagascar, diffère de la précédente par ses tiges plus courtes, plus épaisses; par les feuilles linéaires, presque planes, coriées, aiguës. Ses involucre ont de trois à quatre folioles. Ses épillets sont oblongs, un peu disposés en épi; les écaillés de couleur pâle, vertes sur leur carène.

34. SOUCHET pygmée. *Cyperus pygmaeus. Cav.*

Cyperus culmo triquetro, folioso; capitulo globofo; involucri 6-7-phyllo; foliolis tribus longissimis. Cav. Icon. Rar. vol. 6. pag. 65. tab. 568. n. 2. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 61. n. 25.

Il existe de très-grands rapports entre cette espèce & notre *Cyperus fascicularis*, toutes deux originaires du même pays; mais celle-ci est beaucoup plus petite.

Ses racines sont fibreuses; elles produisent plusieurs tiges triangulaires, feuillées, hautes d'environ un pouce, garnies de feuilles linéaires, aiguës; les racines plus courtes, ramassées en gazon, élargies à leur base, marquées de lignes rougeâtres; les caulinaires alternes, plus longues que leur paine, ordinairement plus courtes que les chaumes, glabres, un peu carénées.

Les fleurs sont réunies en une petite tête, à peine de la grosseur d'un pois, composée d'un très-grand nombre d'épillets d'un vert-jaunâtre, dont les écaillés, au nombre de douze environ, sont carénées, très-aiguës & divergentes à leur sommet. L'involucre est formé par six folioles, quelquefois sept, dont trois striées, plus longues; trois autres plus courtes, alternant avec les premières, toutes plus longues que les fleurs. Les semences sont glabres, trigones, ovales, aiguës.

Cette plante a été recueillie, par M. Broussonnet, dans la Mauritanie, le long du fleuve Jébu. (*Descript. ex Cavan.*)

35. SOUCHET fasciculé. *Cyperus fascicularis. Poiret.*

Cyperus culmo triquetro, nudo, levî; spiculis li-

nearibus, acutis, corymbofo-fasciculatis; involueris subpentaphyllis, corymba longioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 44.

Cyperus culmo triquetra, basi foliata; panicula fasciculata-capitata. Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 88.

Cyperus culmo triquetra; umbellâ compositâ, fasciculata-capitata; foliolâ; spiculis linearibus, acutis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 708. tab. 38. fig. 2.

Cyperus (polystachios), culmo triquetra; involucri polyphyllis; panicula terminali, subsistili, ramossima; spiculis linearibus-lanceolatis, complanatis, cuneatis. Rottb. Gram. pag. 39. tab. 11. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. n°. 24.

Gramen cyperoides, an potius cyperus indica. Plak. Mant. pag. 97. tab. 416. fig. 6.

Cyperus (polystachios), culmo trigono; umbellâ compositâ, convexâ; involueris quinis, spiculis lanceolatis. Thunb. Prodr. pag. 18. ?

Idem, *pedunculis longioribus, apice subumbellatis.* Poirer, Voyag. en Barb. l. c.

Cette plante a des racines brunes, fibreuses, très-grêles, ramassées en un gazon épais : il s'en élève plusieurs tiges droites, simples, très-glabres, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur, finement striées, triangulaires, aiguës & très-lisses sur leurs angles, longues d'un pied ou d'un pied & demi.

Les feuilles sont toutes radicales ou inférieures, ces dernières enveloppant la base des tiges par une gain. longue d'un à trois pouces, glabre, striée; elles sont d'un vert un peu cendré, alongées, mais plus courtes que les tiges, glabres, médiocrement élargies, en carène, aiguës, lisses ou un peu rugées à leurs bords vers leur sommet.

Les fleurs forment une sorte de corymbe paniculé, terminal, presque sessile, ou dont les pédoncules sont très-courts, très-rameux, supportant un très-grand nombre d'épillets serrés, ramassés en tête, linéaires, alongés, comprimés, aigus, d'un jaune-pâle ou un peu verdâtres, composés d'écaillés très-serrées, imbriquées sur deux rangs, très-petites, relevées en carène, aiguës à leur sommet. L'involucre est composé de quatre à six folioles inégales, aiguës, semblables aux feuilles, une ou deux fois plus longues que les panicules.

Cette espèce offre quelques variétés remarquables dans la longueur des tiges, qui quelquefois n'ont pas plus de dix pouces de long, surtout dans les panicules dont les pédoncules, longs d'un pouce & plus, grêles, filiformes, sont terminés par des épillets fasciculés, presque en ombelle & pédicellés. Quelquefois aussi les panicules sont tout-à-fait sessiles : ce n'est qu'un paquet en tête, composé d'épillets très-nombreux & fort serrés.

J'ai recueilli cette plante dans les environs de Lacalle en Barbarie, sur les bords des ruisseaux, dans les sables humides. Elle croit aussi dans l'Inde, & peut-être au Cap de Bonne-Espérance; elle fleurit dans le courant de l'été. (V. v.)

36. SOUCHET filiforme. *Cyperus filiformis.* Sw.

Cyperus culmo triquetra, nudo, filiformi; foliis setaceis; spicis terminalibus, sessilibus, confertis, teretibus-subulatis. Swartz, Prodrum. pag. 20. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 120. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 272. n°. 15.

Ses racines sont longues, filiformes, noirâtres; les tiges filiformes, triangulaires, striées, hautes d'un à trois pieds, munies à leur base de feuilles lâches, setacees, de la longueur des tiges.

Les fleurs sont réunies en épillets terminaux, sessiles, agrégés, subulés, un peu cylindriques, légèrement flexueux, à peine disposés en ombelle, munis d'un involucre à une ou deux folioles, semblables aux feuilles, mais plus courtes. Les écaillés calicinales sont imbriquées, ovales, aiguës, légèrement bombées en carène, verdâtres sur leur dos, ponctuées de brun. Les filaments sont solitaires; les anthères linéaires; l'ovaire trigone, alongé; le style trifide; les ligamens bruns, élargis, droits, saillans; les semences à trois faces.

Cette plante croît sur les gazons, dans les forêts, dans les contrées méridionales de la Jamaïque. (Descript. ex Swartz.)

37. SOUCHET capité. *Cyperus capitatus.*

Cyperus culmo setaceo, subangulato, capitato; foliis setaceis, planis; capitulo terminali, subtriphyllis; spicis agglomeratis, sessilibus; glumis striatis, obtusis, viridibus. (N.)

Cyperus (capitatus), culmo subangulato, striato, medio foliato; capitulo terminali, triphyllis; spicis sessilibus. Retz. Observ. 4. pag. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 275. n°. 17.

Ses tiges sont extrêmement déliées, striées, légèrement anguleuses, hautes de trois à six pouces & quelquefois davantage, munies à leur partie inférieure de feuilles presque capillaires, planes, vertes, aussi longues que les tiges & même plus longues, lisses; leur gain. membraneuse & blanchâtre.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en une petite tête globuleuse, composée d'épillets sessiles, très-serrés, verdâtres, ovales, un peu aigus, longs d'une ligne ou un peu plus, légèrement comprimés; les écaillés calicinales peu nombreuses, écartées, imbriquées, striées, concaves,

obtus à leur sommet. L'involucre est à deux ou trois folioles longues, inégales, semblables aux feuilles.

Cette espèce croît dans les bois à Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. T.)

38. SOUCHET à feuilles molles. *Cyperus mollis*.

Cyperus culmo anguloso, subcompresso; foliis sublinearibus, planis; capitulo terminali, subtetraphyllo; spicis numerosissimis. (N.)

Il y a de tels rapports entre cette espèce & le *Cyperus capitatus*, qu'elle n'en diffère guère que par les proportions de grandeur de toutes les parties, par ses têtes de fleurs bien plus épaisses, & par ses involucre ordinairement à quatre folioles.

Ses riges sont foibles, molles, ramassées en gazon, souvent hautes d'un pied & plus, striées, légèrement anquilques, un peu comprimées, à prime triangulaires, très-lisses, garnies à leur partie inférieure de feuilles planes, linéaires, molles, glabres, étroites, plus courtes que les riges qu'elles embrassent par une gaine blanchâtre, membraneuse, très-mince.

Les fleurs font agglomérées en une tête arrondie, très-ferrée, composée d'épillets d'un blanc-verdâtre, médiocrement comprimés, aigus, longs d'un demi-pouce au plus, contenant environ une douzaine de fleurs, dont les écailles calicinales sont un peu ventrues, ovales, striées, terminées par une pointe muette. L'involucre est composé de trois à quatre folioles très-ouvertes, molles, inégales, presque aussi longues & de même forme que les feuilles, point rudes à leurs bords. Les semences sont petites, triangulaires.

Cette espèce a été recueillie à l'île de Madagascar, par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. T.)

39. SOUCHET congloméré. *Cyperus conglomeratus*. Rottb.

Cyperus culmis subtriquetris, foliis fasciculatis, stricissimis, canaliculatis, squigpedalibus; capitulo paniculato, terminali, triphylo. Rottb. Gram. pag. 21. tab. 15. fig. 7. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 275. n°. 25.

On distingue aisément cette espèce de ses congénères, à ses feuilles très-longues, roides & à demi-cylindriques.

Ses racines font fibreuses, & produisent un grand nombre de riges fasciculées, de la grosseur du petit doigt, & feuillées à leur partie inférieure, nues, grêles, un peu jaunâtres, tristes & légèrement triangulaires à leur partie supérieure.

Les feuilles sont très-nombreuses, imbriquées, canaliculées, subulées, longues d'un pied & demi, coriaces, glauques, finement striées, embrassant les riges par une gaine d'un pourpre-noirâtre, un peu rudes à leurs bords.

Les fleurs presque en ombelle, réunies en une tête terminale, presque paniculée, composée d'épillets agglomérés, sessiles ou médiocrement pédonculés, ovales, lancéolés, garnis d'écailles imbriquées sur deux rangs, membraneuses, ovales, concaves, striées, glabres, glauques ou cendrées, ou quelquefois de couleur purpurine, terminées par une petite pointe. Le style est triside; l'involucre à trois folioles inégales, étalées, un peu flexueuses, plus longues que l'ombelle.

Cette plante se rencontre dans l'Arabie. (V. f. Descript. ex Rottb.)

40. SOUCHET à crochets. *Cyperus uncinatus*.

Cyperus culmo triquetris, pumilo; foliis filiformibus; involucri triphylo, longo; spiculis sessilibus, congestis, linearibus-oblongis; glumis obusis, mucrone uncinato terminatis. (N.)

Ce souchet me parait se rapprocher beaucoup du *Cyperus capensis* de Willdenow; mais ses épillets sont tous sessiles, agglomérés.

Ses racines sont composées de fibres très-déliées, fasciculées; elles produisent des riges nombreuses, ramassées en gazon épais, étalées; elles sont droites, très-ménues, triangulaires, hautes de quatre à six pouces, garnies à leur base de deux ou trois feuilles ordinairement moins longues que les riges, très-étroites, filiformes, courbées, très-lisses; leur gaine lâche, un peu purpurine.

Les épillets sont agglomérés à l'extrémité des riges, sessiles, très-nombreux, couleur de chair, étroits, linéaires, comprimés, longs d'environ un pouce, larges d'une ligne, munis d'écailles imbriquées sur deux rangs opposés, concaves, relevées en une carène verdâtre, obuses, terminées par une petite pointe un peu courbée en crochet. L'involucre est composé de trois folioles beaucoup plus longues que les épillets, filiformes, inégales. Les semences sont fort petites, triangulaires & jaunâtres.

Cette espèce croît à Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. T.)

41. SOUCHET bronzé. *Cyperus brunneus*. Swartz.

Cyperus culmo triquetris, nudo; foliis lato-linearibus, planis; umbellâ obsoletâ, spicis subsessilibus, glumis striatis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 116. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 63. n°. 64.

Cette espèce se rapproche du *Cyperus polyflachius* de Rottb. tab. 41. fig. 1. Ses racines sont longues, filiformes, fasciculées; ses tiges droites, glabres, à trois angles branchans, roides, hautes de deux à trois pieds, garnies à leur base de feuilles larges, linéaires, planes, droites, glabres, un peu roides, vaginales à leur base.

Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale, dont les rayons courts ou presque nuls sont nombreux, un peu ramifiés, serrés, agrégés, environnés par un involucre à trois folioles, dont une beaucoup plus longue, semblable aux feuilles. Les épillets sont rapprochés en tête, comprimés, lancéolés, aigus, de couleur bronzée, composés d'écaillés glabres, luisantes, lancéolées, striées, relevées en carène, imbriquées sur deux rangs opposés. Elles renferment trois éramines, dont les filaments sont capillaires, les anthères jaunâtres. L'ovaire est trigone; le style filiforme, strié; les stigmates droits & rouges; deux filets soyeux, un peu élargis de chaque côté de l'ovaire. Les semences sont à trois faces. Cette plante se rencontre dans les Indes occidentales. (*Descript. ex Swartz.*)

42. SOUCHET brun-maron. *Cyperus badius*. Desf.

Cyperus corymba terminali; foliis margine dorsoque serratis; spiculis linearibus subulatis, densis congestis, involucre pedunculis tortuosis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 45. tab. 7. fig. 2.

p. Cyperus (tenuiflorus), culmo triquetris; foliis linearibus, umbellâ decompositâ; spiculis linearibus, acutis, angustissimis. Rottb. Gram. pag. 30. tab. 14. fig. 1. — Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 296. — Idem, Cnidef. 3. pag. 190. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 284. n.° 57.

Cette espèce a de grands rapports avec le *Cyperus fascicularis* & le *Cyperus longus*. Elle est remarquable par la couleur de ses épillets d'un brun-maron-rouge ou tirant un peu sur le rouge-âre.

Ses racines sont fibreuses; ses tiges droites, simples, triangulaires, très-glabres, striées, dépourvues de feuilles, lisses sur leurs angles, hautes de deux & trois pieds. Les feuilles, toutes radicales ou inférieures, sont longues, striées, d'un vert-pâle, un peu roides, larges de trois lignes au moins, érisiformes, aiguës, plus courtes que les tiges, rudes & légèrement denticulées à leurs bords & sur leur carène, enveloppent la base des tiges par une gaine longue de trois à quatre pouces, un peu lâche, striée, tronquée à son orifice.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle lâche, quelquefois simple, plus ordinairement composée, enveloppée à sa base d'un involucre de quatre à cinq folioles inégales, semblables aux feuilles, un peu plus étroites, deux & même presque quatre fois plus longues

que les ombelles. Les pédoncules communs, au nombre de six à douze, sont grêles, inégaux, triangulaires, longs d'un à trois pouces & plus. Les extérieurs sont plus longs; les intérieurs très-courts, souvent presque nuls, simples ou plus ordinairement légèrement ramifiés à leur sommet. Les épillets sont nombreux, alernes, à peine pédicelles, rapprochés, étroits, linéaires, subulés, d'un brun-rouge ou rouge-âre; les valves concaves, obtuses, striées, souvent verdâtres sur leur carène, fortement imbriquées sur deux rangs.

La plante ne me paroît être qu'une variété de la précédente, dont les tiges sont ordinairement plus élevées; les feuilles plus larges, les épillets plus nombreux & plus rapprochés, très-courts, aigus.

Cette espèce a été découverte par M. Desfontaines sur le bord des ruisseaux, aux environs d'Alger. Je l'ai également recueillie dans les plaines marécageuses aux environs d'Aix en Provence. Les individus que j'en ai conservés me paroissent avoir plus de rapport avec la plante *p. x* (V. v.)

43. SOUCHET conoïde. *Cyperus conoideus*. Rich.

Cyperus culmo triquetris; foliis; umbellâ simplici; spiculis compatis, obtusis concis. Rich. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. pag. 106. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 62. n.° 12.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *Cyperus lagotis*; mais elle est bien plus petite, & en diffère particulièrement par la forme de ses épillets. Ses tiges sont droites, assez élevées, striées, grêles, à trois faces, munies à leur partie inférieure de feuilles allongées. Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en une ombelle simple, dont les pédoncules sont terminés par des épillets presque ovales, de forme un peu conique, obtus à leur sommet, soutenus à leur base par un involucre à plusieurs folioles étroites, très-longues, striées, à peine rudes à leurs bords. Les épillets sont sessiles, très-courts, très-ferrés, comprimés, obtus; les écaillés membraneuses, imbriquées, courtes, obtuses, presque de couleur cendrée.

Cette espèce croît dans les contrées chaudes de l'Amérique, à Cayenne. (*V. f. in herb. Lam. ex Leblond.*)

44. SOUCHET ferré. *Cyperus confertus*. Swartz.

Cyperus culmo triquetris, nudo; umbellâ simplici, foliosis; spiculis ovatis, conglomeratis; glumis apice recurvis, acuminatis. Swartz, Prodr. pag. 20. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. p. 115. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 276. n.° 29.

Ses tiges sont droites, simples, hautes de deux pieds, glabres, triangulaires, garnies à leur base

de feuilles linéaires, droites, presque aussi longues que les tiges, relevées en carène, glabres, sans épillets à leurs bords.

Les fleurs sont réunies en épillets presque disposés en ombelle, dont les rayons sont courts, inégaux; d'autres allongés, triangulaires, engainés à leur base; l'involucre composé de trois folioles très-longues, étalées, planes, linéaires, un peu carénées, un peu canaliculées au dessus de leur base; les gaines tronquées à leur sommet. Les épillets sont rapprochés en tête, sessiles, étalés & non imbriqués, munis d'écaillés ovales, concaves, acuminées, d'un jaune-foncé; recourbées à leur sommet, renfermant chacune deux à trois filaments courts & des anthères fort petites. L'ovaire est oblong; le style de la longueur des écaillés, trifide à son sommet; les stigmates réfléchis. Les semences sont nues, anguleuses, à trois faces.

Cette espèce croît dans les pâturages humides de la Jamaïque. (*Descript. ex Swartz.*)

45. SOUCHET brizé. *Cyperus brizans*. Rich.

Cyperus culmo triquetris; foliis angustis; umbellulis confertis; apiculis; spiculis oblongo-ovatis, obtusis. Rich. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. pag. 106. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 62. n° 34.

Ce souchet a des tiges droites, simples, à trois faces, glabres, munies de feuilles étroites, allongées, vaginales à leur base. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en ombelles qui se divisent ordinairement en ombellules serrées, dépourvues de collerette, composées d'épillets assez semblables à ceux des brizés, ovales, oblongs, obtus, garnis d'écaillés imbriquées, concaves, courtes, un peu obtuses.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique méridionale.

46. SOUCHET ramassé. *Cyperus confertus*. Lam.

Cyperus culmo triquetris; umbellula decomposita, foliis, confertis; spiculis tenuibus, acutis, alternis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 145. n° 718.

Ce souchet a des rapports avec le *Cyperus strigosus*. Ses tiges sont droites, foibles, striées, triangulaires, verdâtres, un peu comprimées, terminées par une ombelle ramassée en paquet, très-courte, dont les rayons très-inégaux, fort courts, supportent des fleurs presque en panicule serrée, disposées sur des épillets alternés, presque sessiles, grêles, aigus, garnis d'écaillés calicinales d'un brun un peu rougeâtre, imbriquées sur deux rangs, portées, à peine aiguës. L'involucre universel est composé de cinq ou six grandes folioles inégales, très-longues, linéaires, aiguës, tudes à leurs bords.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par M. Sonnerat. (*V. f. in herb. Lam.*)

Botanique. Tome VII.

47. SOUCHET polycéphale. *Cyperus polycephalus*. Lam.

Cyperus culmo triquetris; umbellula polycephala; capitulis ovatis, pedunculatis; spiculis densissimis congestis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 147. n° 738.

Cyperus (luzula), culmo triquetris, umbellula simpliciter; spiculis ovatis, capitato-spicatis; involucri polyphylo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 279. n° 28.

Cyperus (luzula), umbellula simpliciter, polyphylla; capitulis terminalibus, foliatis, oblongo-ovatis; spiculis ovatis, concavis, densissimis conglomeratis. Rotb. Gram. pag. 25. tab. 13. fig. 3. (*Exclusis synonymis Linnæi & Plukenetii.*)

Gramen cyperoides, minus; compadisi, subrotundis, flavicantibus. Sloan, Jam. tab. 79. fig. 1.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ un à deux pieds; elles sont roides, striées, très-lisses, grêles, obtusément triangulaires, garnies à leur base de trois à quatre feuilles assez larges, presque de la longueur des tiges, relevées en carène, finement striées, glabres, tudes à leurs bords, aiguës à leur sommet, de couleur glauque.

Les fleurs sont disposées en une grande ombelle simple, dont les rayons sont nombreux, inégaux, étalés, triangulaires, lisses, soutenant un grand nombre d'épillets presque sessiles, réunis en une tête solitaire, ovale, oblongue, assez grosse; les épillets petits, ovales, comprimés, d'un jaune-clair ou cendré, composés de dix à douze écaillés petites, ovales, concaves, imbriquées, membraneuses, transparentes, souvent d'un blanc-argenté, sans stries. L'involucre est formé d'un très-grand nombre de folioles très-étalées, de huit à dix, très-longues, triangulaires, tudes à leurs bords & sur leur carène.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, & à l'île de St. Thomas, où elle a été recueillie par M. Ledru. (*V. f. in herb. Lam.*)

48. SOUCHET ligulaire. *Cyperus ligularis*. Linn.

Cyperus culmo triquetris; umbellula compadisi; spiculis paucifloris, spicatis; glumis obtusis mucronatis; involucri polyphylo, longissimo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 277. n° 31.

Cyperus (ligularis), culmo triquetris, nudo; umbellula spiculis capitatis, oblongis, sessilibus; involucri longissimis, serrato-speris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 70. — Amœn. Acad. vol. 5. p. 391. — Rotb. Gramin. pag. 35. tab. 11. fig. 2. — Thunb. Prodr. pag. 18. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 147. n° 739.

p. Cyperus (cinnamomeus), culmo triquetris, foliis, umbellula spiculis capitatis, pedunculatis, sessilibus.

filibusque; involucri pentaphyllo, serrulato-sabro.
Retz. Observ. 4. pag. 10. ?

Cyperus major, subtriquetus; panicula oblonga, aristatissima. Brown. Jam. 128. n°. 6.

Cyperus maximus; panicula minus sparsa, serrulata; capitulis compatis, crassioribus. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 36. tab. 9.

Espèce remarquable par sa grandeur, par la force de ses riges, qui a beaucoup de rapports avec le *Cyperus alopecuroides*, mais qui en diffère par les épis plus épais, par ses balles mucronées.

Sestiges sont droites, glabres, épaisses, striées, triangulaires, de couleur glauque, un peu jaunâtre. Elles soutiennent une ombelle simple, mais plus ordinairement composée, dont les rayons sont au nombre de cinq à huit, inégaux, roides, terminés par de gros épis cylindriques, très-obtus, longs d'un à deux pouces, simples ou agrégés en ombelle, sessiles ou pédonculés, composés d'un très-grand nombre d'épillets très-serrés, imbriqués, étroits, subulés, d'un brun-clair ou un peu rougeâtre; les écailles calicinales imbriquées, alternes, oblongues, étroites, concaves, membraneuses, mucronées à leur sommet. L'involucre universel se divise en sept ou huit grandes feuilles larges, très-longues, d'un à deux pieds & plus, denticulées & accrochantes à leurs bords & sur leur côté; les involucreux partiels, à la base des épis, sont formés de quelques petites folioles étroites, linéaires, presque filiformes, plus courtes que les épis, de couleur cendrée.

Cette plante croît aux Indes orientales & dans l'Amérique méridionale, à la Jamaïque. (V. f. in herb. Lam. ex Sonnerat.)

49. SOUCHET à gaine bidentée. *Cyperus bidentatus.*

Cyperus culmo triquetus; involucri subtriaphyllo, longissimo, sabro; umbellula compata; spicula aggregatis, patulis, subrotundis. (N.)

Ce souchet est un peu rapproché du *Cyperus ligularis*. Ses tiges sont assez fortes, triangulaires, dures, lisses, striées; sa partie inférieure ne m'est pas connue. L'involucre universel est composé de trois à quatre folioles inégales; les plus grandes longues au moins d'un pied, larges d'un demi-pouce, fermes, très-aiguës, denticulées & accrochantes à leurs bords. Les ombelles sont composées de six à dix rayons très-inégaux, serrés, longs de deux à quatre pouces, roides, munis à leur base d'une gaine lâche, longue d'un demi-pouce, terminée par deux dents aiguës; des épis sessiles & agglomérés dans le centre de l'ombelle. Chaque rayon est terminé par plusieurs épis simples ou quelquefois rameux, épais, longs d'un à deux pouces, fasciculés, chargés d'épillets très-

nombreux, serrés, planes, ovales-oblongs, d'environ six lignes de long, larges d'une ligne & demie. Les écailles sont un peu concaves, lancéolées, étroites, aiguës; les semences fort petites, triangulaires; le style bidenté, quelques écailles concaves pour involucre partiel.

Cette plante se trouve dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Petit-Thouars.)

50. SOUCHET rouge-brun. *Cyperus spadiceus.* Lam.

Cyperus culmo triquetus; umbellula glomerata; involucri subulato, subtriaphyllo; spicula aggregatis, glumis obtusis. Lam. Illustr. Genet. vol. 1. p. 147. n°. 736.

Cette plante, dont je ne connois que les sommités avec une portion de la tige, ressemble beaucoup au *Cyperus glomeratus*; mais elle en diffère particulièrement par ses écailles calicinales, obtuses, point mucronées.

Les tiges sont droites, striées, très-grêles, à trois angles, de couleur glauque-cendrée, nues, du moins à leur partie supérieure, supportant à leur sommet des fleurs disposées presque en panicule ou en une petite ombelle dense, dont les rayons sont très-courts, inégaux, soutenant des épillets simples ou agrégés, sessiles ou médiocrement pédonculés, linéaires-lancéolés, comprimés, très-glabres, composés d'écailles calicinales très-serrées, imbriquées sur deux rangs, d'un rouge-brun très-foncé, blanchâtres à leurs bords, très-obtus. L'involucre est à trois folioles étroites, inégales, dont une au moins plus longue que l'ombelle, subulée, toide, aiguë.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam. ex Sonnerat.)

51. SOUCHET en gazon. *Cyperus spissifolus.*

Cyperus culmo filiformi, triquetus; foliis linearibus, planis; involucri triaphyllo, elongato; spicula umbellatim subsessilibus, agglomeratis; glumis obtusis, dorso purpurascens. (N.)

Cette espèce a bien des rapports avec les deux plantes que j'ai mentionnées à l'article du *Cyperus spadiceus*, observées dans l'herbier de M. du Petit-Thouars; celle-ci, qui présente presque le même port, en diffère par ses épillets presque en ombelle sessile, par ses feuilles planes, linéaires; cependant j'ai remarqué que, dans la même touffe, plusieurs individus en offroient aussi de très-étroites, presque filiformes. Ces feuilles sont nerveuses, ramassées en gazon, plus courtes que les tiges, aiguës, avec une nervure saillante sur le dos.

Les racines sont fibreuses & produisent un très-grand nombre de tiges disposées en un gazon touffu,

grêles, triangulaires, hautes de six à huit poutres; elles supportent à leur sommet des épillets presque sessiles, agglomérés en ombelle, étroits, linéaires, oblongs, comprimés, de cinq à dix, garnis d'écaillés calicinales imbriquées, sur deux rangs opposés, concaves, ovales, presque rondes, très-obtusif, presque luisantes, striées, d'un pourpre-foncé sur leur dos, griffées & scarieuses à leurs côtés. Leur involucre est composé de deux à trois folioles plus longues que les épillets, inégales, assez semblables aux feuilles, mais un peu plus étroites.

Cette plante croît dans les fentes des rochers à Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (*P. f. in herb. P. T.*)

52. SOUCHET menu. *Cyperus tenuis*. Swartz.

Cyperus culmo triquetror, nudo; umbellâ simplici; spiculis subulatis, confertis. horizontali-reflexis, foliis involucri linearis setaceis. Swartz, Prodr. pag. 20. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 119. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 281. n°. 45.

Ses tiges sont droites, hautes de deux pieds, glabres, triangulaires, garnies à leur base de feuilles linéaires, presque aussi longues que les tiges, droites, relevées en carène, glabres sur leurs angles.

Les fleurs sont presque disposées en une ombelle terminale, dont l'involucre est à trois folioles très-longues, linéaires, étalées, planes, glabres, relevées en carène sur leur dos, canaliculées au dessus de leur base. Les rayons sont inégaux, triangulaires; les uns allongés, d'autres très-courts, enveloppés à leur base d'une gaine tronquée à son sommet. Les épillets sont rapprochés en tête, étalés & non imbriqués, sessiles, ovales, composés d'écaillés ovales, carénées, acuminées, recourbées à leur sommet, d'un brun-jaunâtre. Les filaments sont au nombre de deux ou trois, très-courts, surmontés d'anthères très-ménues. L'ovaire est obtus; le style est de la longueur des écaillés, trifide à son sommet; les stigmates réfléchis. Les semences sont nues, trigones, anguleuses.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les pâturages humides. (*Descript. ex Swartz.*)

53. SOUCHET queue de renard. *Cyperus alopecuroides*. Rottb.

Cyperus culmo triquetror, umbellâ suprà decompositâ; spicis digitatis, oblongis; spiculis confertissimis, imbricatis, erectis. Rottb. Gram. pag. 38. tab. 8. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 741.

Cyperus (alopecuroides), culmo trigono; umbellâ decompositâ; involucri polyphylla, serrato, brevior; spiculis cylindricis. Thunb. Prodr. pag. 18.

Cyperus (glomeratus), culmo triquetror, nudo; umbellâ triphyllâ, suprà decompositâ; spicis glomerato-rotundatis; spiculis subulatis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 125. n°. 13. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 301.

Cyperus (glomeratus), culmo triquetror; umbellâ decompositâ; spiculis ovatis, cylindrico-spicatis; glumis obtusis; involucri polyphylla, umbellâ longiore. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1771. n°. 32.

5. *Cyperus aquaticus, italicus, procerior; locustis tenuissimis in ramum densè congestis.* Michel, Gener. pag. 45. — Séguier, Plant. Vcron. vol. 3. pag. 68. tab. 2. fig. 2. ?

Cyperus capitulis glomeratis congestis, feminibus aristatis. Monti, Gram. pag. 14. tab. 1. fig. 1. ?

Ses tiges sont hautes, épaisses, très-glabres, luisantes, finement striées; fermes, à trois angles tranchés, nues à leur partie supérieure, garnies à leur base de quelques feuilles larges, allongées, terminées à leur sommet par un très-grand involucre universel d'environ cinq à six feuilles & plus; amples, étalées, très-longues, inégales, larges d'environ un pouce; striées, denticulées à leurs bords.

De leur centre sortent plusieurs rayons inégaux, très-fermes, souvent longs d'un demi-pied, qui soutiennent une ombelle simple ou de nouveau ombellée, munie d'un involucre propre, à cinq ou six folioles plus étroites, linéaires, aiguës, inégales, la plupart plus longues que les fleurs. Celles-ci sont réunies en plusieurs épis allongés, cylindriques, presque digités, composés d'épillets très-nombreux, ovales-lancéolés, comprimés, garnis d'écaillés membraneuses, ovales, d'un vert-jaunâtre.

Il paroît très-doux que la plante de Séguier & de Monti soit la même que celle-ci; elle en seroit du moins une variétés très-remarquable.

Cette plante croît dans l'Arabie, dans les Indes & au Cap de Bonne-Espérance. 3. (*P. f. in herb. Lamarck.*) Elle a été recueillie au Sénégal par M. Rouffillon.

54. SOUCHET traçant. *Cyperus hida*. Mich.

Cyperus culmo triquetror, levi; umbellâ simplici, spicis subsessiculatis, alternis; involucri subtriphyllis; radice repente, tuberifera. (N.)

Cyperus radice repente, tuberifera; foliis radicalibus recurvatis; culmo triquetror, levigato; umbellâ simplici; spiculis ad summities proximè alternis, subsessiculatis, patentibus, lanceolato-linearibus, confertis compressis, saturatè castaneis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 27.

5. Idem, culmo altiore, spiculis sæpè duplè longioribus, numerosissimis. (N.)

Ses racines sont composées de longues fibres traçantes & de filaments très-déliés, munies, de distance en distance, de tubercules qui deviennent le principe d'une nouvelle plante : il s'en élève des tiges droites, simples, grêles, triangulaires, dépourvues de feuilles, glabres, striées, à peine hautes d'un pied, très-lisses sur leurs angles, garnies à leur base de feuilles lisses, étroites, striées, aiguës, subulées, sans asperités, souvent recourbées en dehors, plus courtes que les tiges qu'elles embrassent par une gaine étroite, très-glabre, serrée, longue d'un à deux pouces.

Les fleurs sont disposées en une ombelle simple, terminale, dont les pédoncules sont très-inégaux ; les extérieurs longs d'un à deux pouces, filiformes, triangulaires, très-glâbres, garnies, seulement à leur partie inférieure, de plusieurs feuilles molles, planes, étroites, linéaires, aiguës, point rudés à leurs bords, membraneux à leur gaine, plus courtes que les tiges.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en épillets simples, peu nombreux, disposés en une ombelle courte, très-simple. Les pédoncules sont courts, inégaux, filiformes, &c. et terminent par un seul épillet droit, comprimé, d'un vert-blanchâtre ; quelquefois cendrés, presque luisants, linéaires, obtus. Quelquefois ces épillets sont presque tous sessiles, au nombre de cinq à huit. Les écailles calicinales sont opposées, imbriquées, concaves, striées sur leur dos, membraneuses & blanchâtres à leurs côtés. L'involucre universel est composé de trois, quelquefois quatre folioles inégales, droites, semblables aux feuilles, plus longues que les fleurs.

Cette plante croît dans les terrains cultivés, à la Caroline, dans la Virginie, la Floride & à Porto-Rico : elle m'a été communiquée par MM. Bosc & Ledru. (V. f.)

Ce souchet est une des plantes les plus nuisibles dans les champs cultivés, par sa grande multiplication occasionnée par les racines traçantes & les tubercules qui le reproduisent avec rapidité ; il est difficile de l'extirper entièrement.

55. SOUCHET comprimé. *Cyperus compressus*. Linn.

Cyperus culmo triquetto, nudo; umbellâ subteraphyllâ; spiculis alternis, subulatis, glumis macronatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 723.

Cyperus (compressus), culmo triquetto, nudo; umbellâ universali triphyllâ; glumis macronatis, luteribus membranaceis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 68. — Rottb. Gramin. 27. tab. 9. fig. 3. — Swartz, Observ. 30. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 282. n°. 49.

Cyperus culmo triquetto, nudo; paniculâ foliosâ; pedunculis simplicibus; spiculis alternis, subulatis, distichis. Roy. Lugd. Bat. 51. — Gronov. Virg. t. 31.

Cyperus rotundus, gramineus, ferè inodorus; paniculâ sparsâ, compressâ, viridi. Sloan, Jam. 35. Hist. t. pag. 17. tab. 76. fig. t. — Rai, Suppl. 523.

Gramen cyperoides, species major, vaudemantecode Malabararum. Pluk. Mant. pag. 97. tab. 417. fig. 2.

Ses racines sont fibreuses, nrisâtes, fasciculées : il s'en élève des tiges faibles, hautes de cinq à dix pouces & plus, striées, presque filiformes, triangulaires, très-glâbres, garnies, seulement à leur partie inférieure, de plusieurs feuilles molles, planes, étroites, linéaires, aiguës, point rudés à leurs bords, membraneux à leur gaine, plus courtes que les tiges.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en épillets simples, peu nombreux, disposés en une ombelle courte, très-simple. Les pédoncules sont courts, inégaux, filiformes, &c. et terminent par un seul épillet droit, comprimé, d'un vert-blanchâtre ; quelquefois cendrés, presque luisants, linéaires, obtus. Quelquefois ces épillets sont presque tous sessiles, au nombre de cinq à huit. Les écailles calicinales sont opposées, imbriquées, concaves, striées sur leur dos, membraneuses & blanchâtres à leurs côtés. L'involucre universel est composé de trois, quelquefois quatre folioles inégales, droites, semblables aux feuilles, plus longues que les fleurs.

Cette plante croît à la Caroline, à la Jamaïque, dans les prés gazeux ; elle m'a été communiquée par M. Bosc. (V. f.)

56. SOUCHET imbriqué. *Cyperus imbricatus*. Retzius.

Cyperus culmo triquetto, nudo; umbellâ decompositâ; umbellularum radiis imbricatis; involucri hexaphylli foliis tribus longissimis, tribus brevissimis. Retz. Observ. 5. pag. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 278. n°. 33.

Cette plante a des tiges droites, triangulaires, pourvues à leur base de quelques feuilles radicales, terminées à leur sommet par une ombelle composée, longue de quatre pouces, à rayons inégaux, enveloppés à leur base par une gaine purpurine à sa partie inférieure, tronquée à son sommet, surmontée d'une petite pointe. L'involucre est composé de trois folioles, longues d'un à deux pieds, linéaires, hérissées à leurs bords, mais lisses sur leur carène ; les involucre partielles sont étroits, plus courts que l'ombelle.

Les ombellules sont, ou sessiles, ou soutenues par des pédoncules triangulaires, longs d'environ

trois pouces, chargés d'épillets imbriqués, pédonculés, convexes, un peu comprimés, lancéolés, de couleur fauve, de donze à vingt fleurs, munies d'écailles imbriquées, larges, ovales, aiguës, membraneuses à leurs bords, ne s'enfermant ordinairement qu'une seule étamine. L'ovaire est trigone; le style simple; le stigmate trifide.

Cette plante croît dans l'Inde. (*Descript. ex Recq.*)

57. SOUCHET effilé. *Cyperus strilus*. Lam.

Cyperus culmo subtriquetro, umbellâ compositâ, subglomeratâ, triphyllâ; foliis strilis, angustis, canaliculatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 721.

Il existe beaucoup de rapports entre cette plante & le *Cyperus conglomeratus*, mais ses feuilles sont planes & non à demi-cylindriques; les ombelles pédonculées.

Ses tiges sont grêles, foibles, un peu comprimées, légèrement triangulaires, glabres, striées, munies, seulement à leur base, de feuilles un peu molles, très-étroites, linéaires, aiguës, plus courtes que les tiges. Celles-ci sont terminées par une petite ombelle serrée, courte, un peu agglomérée, environnée à sa base d'un involucre à trois folioles inégales, un peu fermes, très-étroites, légèrement roulées à leurs bords, une d'elles presque aussi longue que les tiges; les deux autres plus longues que l'ombelle. Les rayons sont courts, très-inégaux, soutenant une très-petite panicule courte d'épillets ovales, comprimés, obtus, pâles ou cendrés, dont les écailles calicinales sont concaves, obtuses, imbriquées sur deux rangs.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île de Java. (*V. f. in herb. Lam.*)

58. SOUCHET à balai. *Cyperus scoparius*.

Cyperus culmo triquetro, angulis asperis; umbellâ decompositâ, strilâ; spiculis sparsis, paucifloris; involucri subtriquetro, maximo, denticulato; involucri brevissimis. (N.)

On distingue cette plante à la disposition de ses fleurs, aux larges folioles denticulées de son involucre.

Ses tiges sont hautes, triangulaires, un peu comprimées; les angles tranchans, hérissés d'aspérités de bas en haut. J'ignore si elle a des feuilles à sa base. L'involucre universel est composé de trois à quatre grandes folioles inégales, larges d'environ un pouce, longues d'un pied à un pied & demi, fermes, striées, très-aiguës, coupantes & denticulées à leurs bords.

Les fleurs sont deux fois ombellées. Les rayons de l'ombelle universelle sont droits, fermes, fer-

rés, inégaux, un peu comprimés, striés, longs de deux à trois pouces, enveloppés à leur base par une gaine cylindrique, membraneuse, un peu lâche, longue d'un pouce, inégalement tronquée à son sommet. Chaque rayon supporte à son sommet des épis grêles, allongés, fasciculés, simples, inégaux, longs de deux pouces, réunis en ombelle, chargés dans toute leur longueur d'épillets épars, presque par petits paquets, courts, ovales, aigus, un peu cylindriques, sessiles, à quatre ou six fleurs, d'un roux-clair. Les écailles sont imbriquées, concaves, ovales, serrées, un peu acuminées, blanches & scarieuses à leurs côtés; les involuques partiels formés par trois ou quatre folioles inégales, au moins de deux tiers plus courtes que les épis, étroites, subulées à leur sommet.

Cette plante a été découverte à Madagascar par M. du Petit-Thouars. x. (*V. f. in herb. P. T.*)

59. SOUCHET à long involucre. *Cyperus involucreatus*.

Cyperus culmo triquetro, infernâ folioso; umbellâ spicatis, subcylindricis; involucri longissimo, polyphyllâ, aspero; spiculis minimis, glumis acutis. (N.)

Cette espèce paroît tenir le milieu entre le *Cyperus ligularis* & le *Cyperus alopecuroides*; elle en diffère par ses épis plus grêles, par les folioles de l'involucre, étroites, très-longues, accrochantes.

Ses tiges sont longues d'environ deux pieds, droites, lisses, fermes, striées, triangulaires, garnies à leur partie inférieure de plusieurs feuilles alternes, étroites, presque aussi longues que les tiges, tombantes, denticulées à leurs bords, embrassant les tiges par une gaine allongée, très-mince, scarieuse à sa face intérieure; l'involucre universel composé de plusieurs folioles, dont trois ou quatre longues au moins de deux pieds, pendantes, étroites, denticulées, semblables aux feuilles.

L'ombelle universelle est courte; les rayons inégaux, longs d'un à trois pouces, rapprochés, roides, munis à leur base d'une gaine lâche, courte, terminée par deux dents subulées. Chaque rayon supporte des épis fasciculés, réunis en ombelle presque cylindrique, de la grosseur d'une forte plume; longs d'un à deux pouces, chargés dans toute leur longueur d'épillets courts, sessiles, très-serrés, fasciculés, d'un brun foncé; les écailles concaves, aiguës, peu nombreuses; les involuques partiels presque nuls ou formés de quelques petites folioles subulées, aiguës.

Cette plante a été recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars. x. ? (*V. f. in herb. P. T.*)

60. SOUCHET de Madras. *Cyperus madraspatanensis*. Willd.

Cyperus culmo triquetro; umbellâ compoſitâ; ſpiculis linearibus; glumis lanceolatis, uncinato-muricatis; involucri triphyllâ, longiſſimo, lanceolato. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 278. n°. 34.

Cyperus squarroſus. Rottb. Gram. pag. 25. tab. 6. fig. 3.

Gramen cyperoides, moderaſpatanum, minimum, iſcham paniculâ cum anſis. Pluk. Amâth. p. 114. tab. 397. fig. 2.

C'eſt une ſort petite eſpèce, dont les racines ſont ſcaſculées, très-menues, d'où s'élèvent pluſieurs tiges filiformes, preſque ſétacées, triangulaires, hautes d'un à deux pouces, entourées à leur baſe de pluſieurs feuilles en gazon, fines, ſétacées, ſouvent plus longues que les tiges, dont les gaines ſont courtes, noirâtres.

Les fleurs forment une petite ombelle à deux ou trois diſiſions; l'ombellule du centre ſeſſile, les latérales ou preſque ſeſſiles, ou l'une d'elles ſupportées par un pédoncule plus ou moins long, qui ſe termine par quelques épillettes ſeſſiles, linéaires, étroits, comprimés, aigus, munis d'écaillés imbriquées, oppoſées, concaves, comprimées, très-aigues, la pointe renverſée en dehors, d'un brun-noirâtre, membraneuſes à leur ſommet, verdâtres fur leur carène. L'involucre eſt compoſé de trois ou quatre folioles inégales, alternativement plus courtes, plus longues que les ombelles, étalées, ſemblables aux feuilles; à la baſe de chaque épillet une petite bractée ovale.

Cette plante croît dans les Indes, à Madras. (V. ſ. in herb. Lam.)

61. SOUCHET couleur de châtaigne. *Cyperus caſtaneus*. Willd.

Cyperus culmo triquetro; umbellâ compoſitâ; ſpiculis linearibus; multiſloris; glumis obuſis, recurvato-muricatis; involucri triphyllâ, longiſſimo, convolato, ſetaceo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 278. n°. 35.

Cette eſpèce a beaucoup de rapports avec le *Cyperus moderaſpatanus*, dont elle offre toutes les formes extérieures, la même diſpoſition dans les fleurs. Elle en diſſère par ſes épillettes linéaires, plus allongés, plus abondans en fleurs, de couleur châtaigne-foncée, & non de couleur verte & jaunâtre. Les écailles calicinales ſont obuſes, recourbées à leur ſommet, terminées par une pointe en hameçon. L'involucre eſt compoſé de trois folioles très-longues, roulées fur elles mêmes, caliculées, ſétacées, & non planes & lancéolées comme celles de l'eſpèce précédente.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Deſcript. ex Willd.)

62. SOUCHET à fix épillettes. *Cyperus hexaſtachyos*. Rottb.

Cyperus culmo triquetro, nado; umbellâ ſimplici, laxâ; ſpicis linearibus, alternis, ſubſeſis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 117.

Cyperus (hexaſtachyos), foliis graminibus, linearibus, molliſculis, glaucis; umbellâ ſimplici, ſcacciâ; ſpicis linearibus, alternis, ſubſeſis. Rottb. Gram. pag. 28. tab. 14. fig. 2.

Cyperus rotundus. Linn. Flor. zeyl. 15. n°. 36. non Mater. medic.

Cette eſpèce paroît, d'après Swartz, avoir été confondue par Linné, avec le *Cyperus rotundus*, dont elle eſt très-diſtincte par ſes ombelles ſimples.

Ses racines ſont filiformes & ſcaſculées; ſes tiges droites, roides, triangulaires, cannelées, glabres, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles radicales droites, linéaires, molles, glabres, à gaines membraneuſes.

Les fleurs ſont diſpoſées en une ombelle ſimple, terminale, dont les rayons ſont filiformes, lâches, longs de deux pouces; ceux du centre très-courts. L'involucre eſt compoſé de trois à quatre folioles inégales, larges, linéaires, étalées, un peu redreſſées. Les épillettes ſont longs d'un demi-pouce, linéaires, comprimés, acuminés, à deux tranchans, au nombre de quatre à neuf, d'un vert-pourpre, munis d'écaillés de douze à ſeize, lâchement imbriquées, alternes, ovales, carénées, aiguës, marquées en avant fur leurs bords d'une tache purpurine, ſtriées & verdâtres fur leur carène.

Cette plante croît à la Jamaïque, parmi les gazons humides. (Deſcript. ex Swartz.)

* * * Tige triangulaire. Épis en ombelle compoſée.

63. SOUCHET luſtant. *Cyperus nitidus*. Lam.

Cyperus culmo triquetro, nado; umbellâ compoſitâ; tetraphyllâ; ſpiculis lanceolatis, nitidis, congesto-digiſatis. Lam. Illuſtr. Gener. vol. 1. pag. 145. n°. 715.

Cyperus (pumilus), culmo ſoliſo, triquetro; involucri tetraphyllâ; umbellâ compoſitâ; ſpicis alternis, oblongo-lanceolatis, nitidis. Rottb. Gram. 29. tab. 9. fig. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 282. n°. 47.

Cyperus (pumilus), culmo triquetro, nado; umbellâ diſphyllâ, compoſitâ; ſpiculis alternis, nigicatis, lanceolatis; glumis muricatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 67. — Amoen. Acad. vol. 4. p. 301. — Gærtn. de Fruſt. & Sem. Cent. t. tab. 2. fig. 2.

Gramen cyperoides; pumilum; elegans, à Maderaſpatan. Pluk. Almag. pag. 179. tab. 191. fig. 8. ?

On diſtingue cette eſpèce à ſes épillettes très-

comprimés, lancéolés, d'un brun-foncé, très-luisans.

Ses tiges sont hautes de six à dix pouces & plus, glabres, triangulaires, garnies à leur partie inférieure de feuilles assez larges, lancéolées ou linéaires-lancéolées, striées, relevées en carène, roulées & point rudes à leurs bords, un peu purpurines à leur gaine.

Les ombelles sont courtes, terminales, presque composées, ramifiées; les rayons inégaux, roides, presque filiformes, supportant une petite panicule étalée, composée d'épillets sessiles ou un peu pédonculés, presque digités, lancéolés, longs d'un pouce, très-comprimés, luisans, dont les écailles sont concaves, brunes, lancéolées, obtuses. L'involucre est à quatre folioles semblables aux feuilles, inégales; une ou deux plus longues que l'ombelle.

J'en ai observé, dans l'herbier de M. Lamarck, une variété moins élevée, plus petite dans toutes ses parties; les épillets bien moins nombreux, plus étroits, très-aigus.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

64. SOUCHET folonifère. *Cyperus foloniferus*. Retz.

Cyperus culmo nudo, triquetra; umbellâ compo-
sitâ, involucriâ; spiculis lanceolatis. Retz. Observ. Bot.
4, pag. 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 281.
n°. 48.

Ses racines sont bulbeuses, garnies de fibres allongées, qui produisent des jets horizontaux couverts d'écailles, & portant à leur extrémité des bulbes d'où s'élèvent des tiges & des feuilles.

Les tiges sont triangulaires, hautes de six à sept pouces, garnies à leur base de feuilles étroites, linéaires, plées, de la longueur des tiges. Les ombelles peu garnies; une seule ombellule presque sessile, à trois rayons environ, supportant de trois à cinq épillets lancéolés, rougeâtres, dont les écailles font fortement imbriquées; l'involucre presque à deux folioles subulées, striées, la plus grande longue d'un pouce & demi, la plus petite d'un demi-pouce; quelquefois une ou deux autres folioles encore plus petites.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Descript. ex Retz.)

65. SOUCHET blond. *Cyperus flavidus*. Retz.

Cyperus culmo triquetra, striato; umbellâ compo-
sitâ, triphyllâ; spiculis lanceolatis, squamulis mo-
nandis. Retz. Observ. Bot. 5, pag. 13. — Willd.
Spec. Plant. vol. 1, pag. 279. n°. 38.

Cette espèce a des tiges triangulaires, striées, hautes d'un demi-pied; les feuilles sont radicales,

courtes, étroites, fasciculées; une seule embrasse la tige par sa base; elle est une fois plus courte qu'elle.

Les fleurs sont disposées en épis, les uns sessiles, d'autres médiocrement ombellés. Leur involucre est composé de trois folioles droites, linéaires, trois & quatre fois plus longues que l'ombelle; les épillets sont lancéolés, munis d'environ vingt-six fleurs, dont les écailles sont étroites, purpurines à leurs côtés, scarieuses, contenant une seule étamine, trois stigmates velus.

Cette espèce se rencontre dans l'Inde. (Descript. ex Retz.)

66. SOUCHET de Retzius. *Cyperus Retzii*.

Cyperus culmo triquetra, nudo; umbellâ compo-
sitâ; pedunculis corymbosis; involucri polyphylo,
longissimo. Retz.

Cyperus albidus. Retz. Observ. 6, pag. 21. —
Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 283. n°. 51.

Cette plante a des tiges droites, triangulaires, lisses, hautes de trois pieds, garnies à leur base de feuilles lisses, longues de deux pieds. Les ombelles sont composées, munies d'environ huit rayons très-ouverts, longs d'un à deux pouces; ceux du centre très-courts, comprimés, enveloppés à leur base d'une gaine bifide.

L'involucre universel est composé d'environ huit folioles très-inégales, lisses; la plus grande, longue d'un pied & demi, graduellement plus courte, jusqu'à la longueur de trois pouces; point d'involucre partiel. Les épillets sont disposés en une sorte de corymbe, blanchâtres, courts, étroits, munis de quinze à vingt fleurs; les écailles imbriquées, aiguës, divergentes à leur sommet. Les semences sont triangulaires, d'un vert-noirâtre, luisantes, acuminées.

Cette plante croît dans la Chine. (Descript. ex Retz.)

67. SOUCHET jaunâtre. *Cyperus flavescens*. Linn.

Cyperus culmo triquetra, sabudo; umbellâ compo-
sitâ, triphyllâ; spiculis lanceolatis. Lam. Illustr.
Genet. vol. 1, pag. 144. n°. 709. tab. 38. fig. 1.

Cyperus culmo triquetra, nudo; umbellâ tri-
phyllâ; pedunculis simplicibus, inaequalibus; spi-
cis confertis, lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1,
pag. 68. — Pollich. Pal. n°. 41. — Scop. Carn.
n°. 53. — Hoffm. Germ. 15. — Roth. Germ. vol. 1,
pag. 20. — vol. II, pag. 50. — Lam. Flor. franç.
vol. 3, pag. 546. n°. 1162. — Getard, Flor. gall.
Prov. pag. 117. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2,
pag. 89. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1, pag. 46.
— Krokot. Sibér. Icon. tab. 11.

Cyperus culmo triquetra; spicis sessilibus, confertis.

distichis, apici trifoliatis infidentibus, Sauvag. Monsp. 21. — Gouan, Monsp. pag. 29. n°. 2.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ subcompositâ, triphyllâ; spicis confertis, lanceolatis; glumis obtusis, Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 279. n°. 39.

Cyperus umbellâ trifolidâ; spicis sessilibus, umbellatis; glumis obtusis, Hall. Helv. n°. 1343.

Cyperus culmo triquetro, nudo; paniculâ foliosâ, supra decompositâ; spicis confertis, distichis compressis, Dalib. Paris. 14.

Cyperus minimus, paniculâ sparsâ, flavescente, Scheuch. Gram. 85. — Monti, Prodr. 13. — Tourn. Inst. R. Herb. 527.

Gramen cyperoides, minus, paniculâ sparsâ, subflavâ, C. Bauh. Pin. 6. — Idem, Theatr. Botan. pag. 89. Icon. 89.

Cyperus minor, pulcher, paniculâ latâ, compressâ, subflavescente, Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 239. §. 8. tab. 11. fig. 37.

Gramen pulchrum, parvum, paniculâ latâ, compressâ, J. Bauh. Hist. 2. pag. 470. Icon. Medioeris.

Calamagrostis altera, Tragus. 694.

β. Idem, culmo altiore; spiculis longius pedunculatis. Poirer, Voyag. en Barb. l. c.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées, & produisent des tiges nombreuses, disposées en gazon, nues, triangulaires, feuillées seulement à leur base, hautes de deux à cinq pouces & quelquefois plus, très-glabres; foibles, droites, striées. Les feuilles sont toutes radicales, nombreuses, assez longues, étroites, canaliculées, subulées; aiguës, très-glabres, vaginales à leur base.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales, presque sessiles, enveloppées à leur base, d'un involucre à trois, rarement deux folioles très-inegales, semblables aux feuilles, plus longues que l'ombelle. Les épillets, au nombre de six à quinze & plus, sont d'un jaune-pâle, linéaires, très-comprimés, obtus & rétrécis médiocrement vers leur sommet, longs de trois à six lignes; les uns sessiles; d'autres médiocrement pédonculés, composés d'écaillés calicinales imbriquées, sur deux rangs opposés, petites, concaves, un peu obtuses. Les semences sont ovoïdes & fort petites.

La variété β, que j'ai recueillie sur les côtes de Barbarie, diffère de la précédente par ses tiges plus élevées, un peu plus fermes; par les épillets plus nombreux & plus longuement pédonculés; les intérieurs presque sessiles; les extérieurs soutenus par des pédoncules longs quelquefois de plus d'un pouce, qui réunissent à leur sommet huit à dix épillets presque sessiles; l'involucre offre quelquefois une quatrième foliole sétacée.

On trouve cette espèce dans les lieux marécageux & les prés humides, en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne & dans la Barbarie. (V. v.)

68. SOUCHET brun. *Cyperus fuscus*, Linn.

Cyperus culmo triquetro, subnudo; umbellâ compositâ, triphyllâ; spiculis confertis, linearibus, Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 710.

Cyperus culmo triquetro; umbellâ compositâ, triphyllâ; spicis linearibus, confertis; glumis acutis, imbricatis, Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 180. n°. 40.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ trifidâ; pedunculis simplicibus, inaequalibus; spicis confertis, linearibus, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 69. — Eder. Flor. dan. tab. 179. — Pollich. Pal. n°. 42. — Roth. Gram. 33. — Leers, Herborn. n°. 33. tab. 1. fig. 2. — Hoffm. Germ. 15. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 20. — vol. II. pag. 50. — Kroker. Siles. Icon. tab. 12. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 90. — Destonir, Voyag. atlant. vol. 1. pag. 47. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 546. n°. 1162. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 118. n°. 2.

Cyperus culmo nudo, triquetro; umbellâ trifidâ; pedunculis simplicibus, inaequalibus; spicis confertis, linearibus, atris, Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 46. — Gouan, Monsp. pag. 29. n°. 3.

Cyperus umbellâ trifolidâ; spicis petiolatis, congestis; glumis ovato-lanceolatis, Hall. Helv. n°. 1349.

Cyperus culmo triquetro, nudo; paniculâ diphyllâ, supra decompositâ, spicis triglostris, confertis, distichis compressis, Dalib. Paris. 15.

Cyperus minimus, paniculâ sparsâ, nigricante, Tourn. Inst. R. Herb. 527. — Scheuch. Gram. 144. — Moori, Prodr. 13. — Garid. Aix, pag. 144.

Gramen quantum, Tragus. 676. Icon. 679. fig. minor.

Cyperus longus, minimus, pulcher, paniculâ compressâ, nigricante, Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 239. §. 8. tab. 911. fig. 38.

Gramen cyperoides, minus, paniculâ sparsâ, nigricante, C. Bauh. Pin. 6.

Gramen parvum, pulchrum, aliud, paniculâ compressâ, nigricante, J. Bauh. Hist. 2. pag. 471. Icon.

β. Idem, culmo altiore, pedunculis exterioribus multo longioribus, apice subumbellatis. (N.) Voyag. en Barb. vol. 2. l. c.

γ. *Cyperus (ferrugineus), culmo triquetro, pedali, 6. foliofolio, spiculis compresso-connatis, linearibus, fasciculatis, ferrugineis*, Forsk. Flor. ægypt. arab. pag. 14. n°. 49.

Cerua

Cette espèce a de tels rapports avec la précédente, qu'elle n'en paroît être, au premier aspect, qu'une simple variété; néanmoins elle offre dans le détail, des caractères suffisans pour l'en faire distinguer.

Ses tiges sont assez généralement plus élevées, nombreuses, réunies en gazon, nues, triangulaires, un peu plus larges, feuillées seulement à leur base; les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un faisceau serré d'épillets d'un brun-noirâtre, linéaires, lancéolés, mais plus étroits au moins de moitié, un peu obtus, plus courts, enveloppés par une collerette à trois folioles inégales, beaucoup plus longues que les fleurs; les épillets du centre sont presque sessiles; ceux de la circonférence placés en paquets à l'extrémité d'un pédoncule commun, médiocrement allongé; les écailles calicinales sont très-petites, concaves, relevées en carène, aiguës. Les semences sont nues, fort petites, point ponctuées; celles du *Cyperus flavescens* sont ponctuées & légèrement tuberculées, selon l'observation de Scopoli.

La variété β , que j'ai observée en Barbarie, a des tiges plus élevées; ses épillets sont bien plus nombreux, en paquets, presque sessiles dans le centre; ceux de la circonférence fasciculés & légèrement pédicellés à l'extrémité d'un long pédoncule commun, filiforme, triangulaire.

La plante de Forskhal, variété γ , me paroît devoir être rapprochée de cette même espèce. Ses tiges sont triangulaires, nues, hautes d'un pied, feuillées à leur base; les fleurs réunies en une ombelle terminale & feuillée; les épillets fasciculés, linéaires, comprimés, un peu convexes, noirâtres, verts à leurs bords, sessiles, rarement pédicellés, réunis par paquets à l'extrémité des pédoncules communs; les bractées plus longues que les pédicelles. (*Descript. ex Forsk.*) C'est une des plantes les plus communes, & presque la seule qui garnit les prés humides sur les bords du Nil.

Cette espèce se rencontre dans les prés humides, en France, en Allemagne, dans la Suisse & sur les côtes de la Barbarie. γ (V. v.)

69. SOUCHET de l'Yemen. *Cyperus yemenicus*. Retzius.

Cyperus culmo triquetra, seminudo, basi bulboso; involucri diphylla, umbellâ subsimplici, spiculis linearibus. Retz. Observ. Botan. 4. pag. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 231. n°. 43.

Cyperus (yemenicus), culmo incurvo, triquetra, basi bulboso; foliis fasciculatis, setaceis; umbellâ simplicissima, spicis conglomeratis. Rottb. Gram. pag. 25. tab. 8. fig. 1.

C'est une petite plante, très-voisine du *Cyperus* Botanique. Tome VII.

divaricatus (Lamarck), dont elle n'est peut-être qu'une variété, distinguée par ses tiges & ses feuilles glauques, par ses épillets d'un pourpre-noirâtre, mêlé de blanc; les anthères & les stigmates d'un pourpre-foncé.

Ses racines sont épaisses en forme de bulbes & elles produisent de petites fibres simples, flexueuses, d'où s'élèvent des tiges hautes de cinq à sept pouces, grêles, garnies à leur partie inférieure de feuilles fasciculées, linéaires, sétacées, flexueuses, plus courtes que les tiges, élargies, membraneuses à leur base.

Les ombelles sont simples, composées de quelques rayons très-courts, munis d'un involucre à deux folioles un peu plus longues que l'ombelle, sétacées. Les épillets sont agglomérés, linéaires, comprimés, longs à peine d'un pouce, chargés d'écailles nombreuses, concaves, lancéolées, aiguës, membraneuses à leurs bords, un peu recourbées à leur sommet, contenant trois étamines, dont les filamens sont membraneux, les anthères subulées. L'ovaire est petit, triangulaire; le style trifide; les stigmates très-longs, flexueux, velus.

Cette plante se rencontre dans l'Arabie heureuse & à Ceilan, sur les gazons. γ

70. SOUCHET divergent. *Cyperus divaricatus*. Lamarck.

Cyperus culmo triquetra, umbellâ compositâ, confertâ, subtriphyllâ; spiculis linearibus, complanatis, divaricatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 145. n°. 716.

Ses tiges sont droites, triangulaires, striées, hautes de huit à dix pouces & plus, garnies à leur partie inférieure de feuilles étroites, glabres, linéaires, presque de la longueur des tiges, un peu rudes à leurs bords, quelquefois plus larges, presque ensiformes, aiguës.

Les fleurs sont disposées en une ombelle ramifiée, courte, presque simple, dont les rayons très-inégaux supportent vers leur sommet des épillets divergens, sessiles ou légèrement pédonculés, linéaires, très-comprimés, longs de six lignes, quelquefois d'un pouce, d'un roux-pâle, dont les écailles calicinales sont imbriquées, médiocrement serrées, concaves, obtuses, nombreuses, presque membraneuses. L'involucre universel est composé de deux à trois folioles inégales, plus longues que l'ombelle, semblables aux feuilles.

Cette plante a été recueillie dans l'Inde par M. Sonnerat; elle croît aussi à l'île de Madagascar. (V. f. in herb. Lam.)

71. SOUCHET verdâtre. *Cyperus virens*. Hoffm.

Cyperus culmo triquetra, umbellâ compositâ, tri-
K k

phylla; spicis linearibus, confertis; glumis acutis, parvis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 180. n°. 41.

Cyperus (virescens), culmo triquetro; umbellâ universali triphyllâ, spicis compressis. Hoffman. Germ. 16.

Cyperus compressus noster, seu viridis. Krock. Sil. n°. 69. tab. 13.

Ce fougère ressemble beaucoup au *Cyperus fuscus*. Peut être n'en est-il qu'une variété, dont la différence consiste en des tiges plus élevées, triangulaires, terminées par une petite ombelle, dont les épillets sont beaucoup plus petits, comprimés, linéaires, très rapprochés, garnis d'écaillés calicinales aigües, et nus; juncatres & non d'un brun-noirâtre, traversées dans leur milieu par une ligne verdâtre, élargie; l'involucre compose de trois folioles.

Cette plante croît dans les montagnes de la Sicile. O

72. SOUCHET difforme. *Cyperus difformis*. Linn.

Cyperus culmo triquetro, subnudo; umbellâ diphyllâ; spicis linearibus, glomeratis; squamis obtusis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 149. n°. 719.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ diphyllâ, simplici, trifidâ; spicis cuspidatis, intermediâ fissili. Linn. Amœn. Acad. vol. 4. pag. 402. — Syn. Plant. vol. 1. pag. 115. n°. 10. — Rottb. Gram. pag. 24. tab. 9. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 180. n°. 42.

Gramen cyperoides, elegans; paniculis molibus compositum, maderospaeanum. Pluken. Almag. tab. 192. fig. 3.

D'un faisceau de racines noisâtres & fibreuses s'élève plusieurs tiges foibles, longues d'un pied, triangulaires, très-glabres, striées, garnies, seulement à leur base, de deux ou trois feuilles au plus, alternes, linéaires, étroites, molles, striées, aigües, enveloppant les tiges par une très-longue gaine.

Les fleurs forment une ombelle simple, terminale, environnée à sa base d'un involucre à deux folioles, dont une très-longue, droite; l'autre beaucoup plus courte, étalée. Les rayons de l'ombelle sont peu nombreux, très-inégaux, étiés, simples, supportant à leur sommet des épillets disposés en une rosette globuleuse, très-nombreux, sessiles, comprimés, lancéolés, courts, obtus, très-remarquables par la disposition & la couleur des écaillés, qui sont courtes, un peu concaves, ovales, obtuses, élégamment imbriquées, d'un vert-cendré ou un peu blanchâtre, blanches & scarieuses à leur contour.

Cette plante croît dans les Indes. (V. f. in herb. Lamarck.)

73. SOUCHET tubéreux. *Cyperus tuberosus*. Rottb.

Cyperus culmo triquetro, basi folioso; involucre triphyllâ, umbellâ compressâ, spicis lanceolatis, teretiusculis. Rottb. Gram. pag. 28. tab. 7. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 181. n°. 46.

Ses racines sont épaisses, presque tubéreuses, garnies de fibres, revêtues d'écaillés membranées, imbriquées, d'où s'élève une tige haute de deux pieds, triangulaire, marquée de taches brunes, munie à sa base de quatre à cinq feuilles alternes, lancéolées, très-longues, de couleur glauque, rudes, tant à leurs bords que sur leur carène.

Les fleurs forment, par leur disposition, une ombelle composée; l'involucre universel à trois folioles inégales, deux & trois fois plus longues que l'ombelle, semblables aux feuilles. Les rayons, au nombre de quatre à six, sont inégaux, longs d'un à deux pouces, garnis d'une gaine brune, striée, courte, tronquée obliquement à son sommet. Ces rayons sont simples ou un peu ramifiés à leur sommet, où ils supportent des épillets presque en panicule, un peu pédicelées ou sessiles, lancéolées, un peu cylindriques, épais, d'environ six lignes de long, munis d'écaillés imbriquées, ovales, concaves, striées sur leur dos, brunes, blanchâtres & membraneuses à leurs bords; de petites folioles ou des bractées sétacées à la base des panicules.

Cette plante se rencontre dans les Indes. x

74. SOUCHET amourettes. *Cyperus eragrostis*. Lamarck.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ compressâ, foliosâ; spiculis glomeratis, squamis acutiusculis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 722.

Cyperus compressus. Jacq. Hort. 3. tab. 12.

Cette plante, très-différente du *Cyperus compressus* de Linné, est bien certainement celle à laquelle Jacquin a donné ce nom.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées; ses tiges droites, striées, glabres, triangulaires, garnies, seulement à leur partie inférieure, de quelques feuilles glabres, droites, verdâtres, étroites, striées, point rudes à leurs bords, un peu plus courtes que les tiges. Celles-ci supportent à leur sommet une ombelle composée, dont les rayons sont longs, très-inégaux, étalés, très-grêles, lisses, filiformes, divisés à leur sommet en d'autres rayons courts, inégaux, en ombelle, dans le centre desquels est un paquet d'épillets sessiles; de plus, chaque rayon supportant des épillets agglomérés, nombreux, sessiles, comprimés, courts, ovales,

obtus, assez ressemblans à ceux du *briza eragrostis*, garnis d'écaillés régulièrement imbriquées, nombreuses, ovales, concaves, un peu membraneuses, surtout vers leurs bords; luisantes, pâles, un peu jaunâtres, obtuses, avec une très-petite pointe. Ces épillets offrent quelques variétés dans les proportions de leur grandeur. L'involucre est composé de plusieurs folioles inégales, quelques-unes plus longues que les ombelles, semblables aux feuilles.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale.
 ♀ (V. f. in herb. Lam.)

75. SOUCHET branchu. *Cyperus brachiatus*.

Cyperus culmo triquetro, basi folioso; foliis angustis, linearibus, brevibus; umbellâ compositâ; radiis lateralibus putiginosis; involucrio subtetraphyllo, umbellâ longiore; spiculis fissilibus, umbellatim agglomeratis, oblongo-lanceolatis; glumis acutis, apice patentibus. (N.)

Ce fouchet a quelques rapports, par la forme de les épillets, avec le *cyperus nudicaulis*. Ses racines sont fibreuses, odorantes; elles produisent des tiges grêles, triangulaires, striées, à angles moussus, hautes d'un pied & demi à deux pieds, garnies à leur partie inférieure de feuilles alternes, étroites, linéaires, un peu rudés à leurs bords, aigües, plus courtes que les tiges, & dont les gaines sont lâches, minces, scarieuses, blanchâtres.

Les fleurs sont disposées en une ombelle de trois à cinq rayons très-inégaux; les extérieurs longs de trois à cinq pouces, roides, divariqués, très-ouverts, enveloppés à leur base par une gaine courte, cylindrique, tronquée, noisâtre à sa base; des épillets sessiles & fasciculés dans le centre de l'ombelle; chaque rayon supportant huit à douze épillets sessiles, presque ombellés, agglomérés, d'un aspect très-agréable, luisans, gris de lin, larges, comprimés, longs de huit à dix lignes, ovales-oblongs, obtus, garnis d'écaillés concaves, presque coriaces, régulièrement imbriquées sur deux rangs, un peu aigües. L'involucre est composé de trois à quatre folioles inégales, semblables aux feuilles, plus longues que l'ombelle. Les semences sont petites, noirâtres, triangulaires.

Cette plante a été observée, par M. du Petit-Thouars, à l'île de Madagascar. (V. f. in herb. P. T.)

76. SOUCHET à épillets verts. *Cyperus virens*. Michaux.

Cyperus majusculus, nitidus; involucrio longissimo; umbellâ compositâ, subnuda; ramis summis divaricatis-ramulis; spiculis fasciculatis, virentibus, ovalibus, plano-compressis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 28.

Ce fouchet est parfaitement glabre dans toutes ses parties; il s'élève à une hauteur médiocre. Ses tiges sont droites, luisantes, à trois angles fort tranchans; terminées par des fleurs en forme d'ombelle composée, presque nue. Les rayons se divisent à leur sommet en petits rameaux diffus, qui supportent des épillets verdâtres, fasciculés, très-nombreux, courts, ovales, planes, comprimés, épars & disposés en tous sens. L'involucre universel est très-long, composé de plusieurs folioles.

Cette plante a été observée par Michaux dans la Caroline. (Descript. ex Mich.)

77. SOUCHET à épillets jaunes. *Cyperus flavicomus*. Michaux.

Cyperus majusculus, basi foliosus; involucrio longissimo, reflexo; umbellâ compositâ; ramulis ab ipsâ basi floratis; spiculis patentibus, flavis, oblongis, septemfloris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 28.

Cette espèce a des tiges droites, simples, grêles, hautes d'environ un pied, striées, triangulaires, garnies à leur partie inférieure de quelques feuilles alternes, étroites, verdâtres, un peu plus courtes que les tiges, dont les gaines sont longues d'un pouce au moins, souvent un peu rougeâtres à leur base.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle serrée, simple ou composée, dont les rayons sont chargés, depuis leur base jusqu'à leur sommet, d'épillets d'un jaune-pâle, médiocrement pédonculés, alternes, étalés ou situés horizontalement, petits, oblongs, aigus, composés de cinq à sept fleurs; les écaillés calicinales imbriquées, concaves, obtuses, un peu membraneuses à leurs bords. L'involucre est formé de quatre à cinq folioles très-inégales, presque filiformes, la plupart très-longues, réfléchies.

La description que je viens de présenter de cette plante a été faite d'après un individu qui m'a été communiqué par M. Boic, qu'il avoit recueilli dans la Caroline, & que je crois devoir appartenir à la plante de Michaux. (V. f.)

78. SOUCHET élégant. *Cyperus elegans*. Linn.

Cyperus culmo triquetro, umbellâ decompositâ, spiculis ovatis; glumis mucronatis, patulis; involucrio tetraphyllo, umbellâ longiore. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 278.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ foliosâ; pedunculis nudis, prolifris; spiculis confertis, mucronibus patulis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 68. — Roy. Lugd. Bat. 51. — Rottr. Gram. pag. 34. tab. 6, fig. 4.

Cyperus paniculâ maximè sparsâ, ferrugineâ, com-

pressâ, elegantissimâ. Sloan, Jam. 31. — Hist. 1. pag. 117. tab. 75. fig. 1. — Rai. Suppl. 623.

Cyperus major, umbellatus, paniculis laxis, spiculis teretibus, culmo triquetro. Brown. Jam. pag. 128. n°. 4.

C'est une très-jolie espèce, remarquable par la disposition de ses panicules presque nées d'une triple ombelle, par le très-grand nombre de ses épillets fort petits, dont les valves sont légèrement mucronées.

Les tiges sont droites, glabres, simples, fort hautes, triangulaires, striées, lisses sur leurs angles, dépouillées de feuilles dans leur longueur, garnies seulement de feuilles radicales & inférieures, glabres, ensiformes, verdâtres, assez larges, striées, subulées, très-âgées, embrassant par leur gaine la partie inférieure des tiges.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une sorte de panicule étalée, dont les ramifications assez régulières produisent un effet agréable. Dans le centre est une touffe d'épillets sessiles, d'où sortent des rameaux simples, ouverts en étoile, chargés de fleurs depuis leur base jusqu'à leur sommet. Les ramifications extérieures sont des pédoncules ombellés, très-ouverts, ordinairement plus longs que les rameaux internes, toides, glabres, simples, nus, divisés à leur sommet en trois, quelquefois quatre branches en étoile ou en ombelle, longues d'un à deux pouces, garnies dans toute leur longueur d'épillets très-ferrés, extrêmement nombreux, fort petits, presque sessiles, ou qui paroissent plus ou moins pédicellés par la chute des fleurs inférieures. Ces épillets sont d'un roux-clair, ovales-oblongs, aigus, composés d'écaillés très-courtes, concaves, membraneuses, glabres, mucronées à leur sommet. L'involucre est formé d'environ quatre folioles inégales, semblables aux feuilles, & dont quelques-unes sont plus longues que la panicule.

Cette plante se rencontre dans les lieux maritimes & marécageux à la Jamaïque. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

79. SOUCHET lâche. *Cyperus laxus.* Lam.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ foliosâ, laxissimâ; spiculis subaggregatis, raris, squarrosis. Lam. Illust. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 730.

Il existe quelques rapports entre cette espèce & le *Cyperus alternifolius*, & plus encore avec le *Cyperus elegans*; mais les feuilles de l'involucre sont moins larges, moins nombreuses. Les tiges sont feuillées à leur base, & les ombelles lâches.

Ses tiges sont grêles, triangulaires, très-glabres, striées, nues dans toute leur longueur, hautes d'environ un pied & demi, garnies à leur base de plusieurs feuilles assez larges, imbriquées,

ensiformes, rudes à leurs bords, aiguës, au moins de deux tiers plus courtes que les tiges : leur gaine est un peu lâche, très-mince, souvent rougeâtre.

Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale, enveloppées à leur base d'un involucre à plusieurs folioles larges, inégales, la plupart plus longues que l'ombelle. Les rayons sont filiformes, lâches, terminés par des épillets presque agrégés, peu nombreux, les uns pédonculés assez longuement, d'autres presque sessiles, ovales, comprimés; les écaillés verdâtres sur leur dos, scarieuses & un peu blanchâtres à leurs bords, presque obtuses.

Cette espèce croît à l'île de Cayenne. (V. f. in herb. Lam.)

80. SOUCHET pâle. *Cyperus pallens.* Desfont.

Cyperus culmo triquetro, basi folioso, pedunculis supra decompositis; spiculis linearibus, rectis, distinctis; involucri subtetraphyllo, umbellâ breviori. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 45. tab. 9.

Cyperus longus. Poiteb., Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 89.

Ce souchet ressemble beaucoup, par son port, au *Cyperus longus* : il en diffère par ses racines grêles, point odorantes; par ses tiges moins élevées, par l'involucre des ombelles, ordinairement plus court que les pédoncules.

Ses racines sont composées de fibres droites, grêles, & d'un grand nombre de filaments courts, capillaires, d'un brun-clair. La tige qui s'en élève est à sa base presque de la grosseur du petit doigt; elle s'amincit insensiblement vers son sommet, s'élève à la hauteur d'un à deux pieds, quelquefois plus; elle est glabre, triangulaire à sa partie supérieure, presque cylindrique à sa base, nue, striée, très-glabre. Les feuilles sont toutes radicales ou inférieures, peu nombreuses, plus courtes que les tiges, ensiformes, en carène, larges de deux à trois lignes, très-aiguës à leur sommet, un peu rudes à leurs bords, glabres, striées : leur gaine est longue, cylindrique, un peu lâche, d'un vert-pâle ou cendré, ainsi que les feuilles, à leur face inférieure.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une sorte d'ombelle étalée & lâche, dont les pédoncules sont allongés, grêles, inégaux, triangulaires; les épillets alternes, sessiles ou à peine pédicellés, au nombre de six à douze à l'extrémité des pédoncules communs, étroits, linéaires, aigus, pâles & roussâtres, mêlés quelquefois d'un peu de vert, composés d'écaillés fortement imbriquées, concaves, petites, obtuses à leur sommet, striées, un peu membraneuses à leurs bords. L'involucre est composé de trois ou quatre folioles inégales, ordinairement plus courtes que l'ombelle,

fabulées, très-aiguës, assez semblables aux feuilles. J'en possède un exemplaire où ces folioles sont presque une fois plus longues que l'ombelle, mais celle-ci est moins développée.

J'ai trouvé cette plante en Barbarie, sur le bord des lacs, à quelques lieues de Lacaille, du côté du ballion de France. 2 (V. v.)

81. SOUCHET ferrugineux. *Cyperus ferrugineus*.

Cyperus culmo triquetris; foliis ensiformibus, subcoriaceis; involucri longissimo, polyphylo; umbellâ decompositâ, brevi, subagglomeratâ; radiis apice paniculatis; spiculis lanceolatis, acutis. (N.)

Ses racines sont composées de grosses fibres fasciculées; elles produisent une tige droite, ferme, triangulaire, striée, haute d'environ un pied & demi, garnie à sa partie inférieure de feuilles alternes, dures, presque coriaces, ensiformes, assez larges, plus courtes que les tiges, striées, accrochantes à leurs bords, & dont la gaine est lâche, membraneuse, fortement striée.

L'involucre est composé de six ou huit folioles environ très-inégaux, plus longues que les ombelles; les très-grandes longues de huit à dix pouces, assez semblables aux feuilles. De leurs aisselles sortent plusieurs rayons courts, grêles, inégaux, presque en ombelle, qui supportent une petite panicule d'épillets agglomérés, presque sessiles, lancéolés, aigus, longs de trois à quatre lignes, luisants, d'un rouge très-foncé, presque noir, très-comprimés, munis d'écailles imbriquées sur deux rangs, petites, ovales, concaves, à peine aiguës.

Cette espèce a été recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars. 2 (V. f. in herb. P. T.)

82. SOUCHET de Surinam. *Cyperus surinamensis*. Rottb.

Cyperus culmo triquetris; umbellâ decompositâ, spiculis ovatis; glumis acuminatis, imbricatis; involucri triphylo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 279. n°. 37.

Cyperus (surinamensis), culmo triquetris, nudo; umbellâ decompositâ; spicis oblongo ovatis, congestis; mucronibus incumbens. Rottb. Gram. pag. 35. tab. 6. fig. 5.

Cette plante a quelques rapports avec le *Cyperus eragrostis*. Ses tiges sont triangulaires, foibles, hautes d'un pied & plus; elles supportent à leur sommet une ombelle composée, dont l'involucre est à trois folioles linéaires; les rayons assez nombreux, lâches, striés, flexueux, d'un à deux pouces de long, soutenant chacun une petite ombelle courte, nue, à rayons inégaux, chargés à leur sommet d'épillets agglomérés, ovales, oblongs, comprimés, d'environ deux lignes de long,

obtus, composés d'écailles opposées, concaves, lancéolées, carénées, acuminées.

Cette plante croît à Surinam. (Descript. ex Rottb.)

83. SOUCHET de Malacca. *Cyperus malaccensis*. Lam.

Cyperus culmo triquetris; umbellâ paniculatâ; involucri longissimo; spiculis linearibus, subcoriaceis; squamis ovatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 725.

Cyperus culmo triquetris; involucri tetraphyllo; paniculâ terminali, pedunculatâ; spicis linearibus, torosis, confertissimis, patentissimis. Rottb. Gram. pag. 40. n°. 52. tab. 11. fig. 3. ? (Exclusis synonymis Linnæi & Sloanii.)

Ce souchet a de très-rapports avec la plante de Rottbelle, tab. 11. fig. 3, qu'il est difficile de l'en séparer; elle ne peut être d'ailleurs le *Cyperus strigosus* de Linné, ayant des ombelles bien plus petites, plus serrées; des épillets linéaires, plus étalés, &c.

Ses tiges sont très-glabres, striées, triangulaires, un peu comprimées, terminées par une ombelle courte, serrée, presque paniculée, dont les rayons sont courts, simples, filiformes, rarement divisés, soutenant à leur sommet des épillets étalés, alternes, presque sessiles, linéaires, un peu arrondis, longs d'un demi-pouce, peu nombreux, composés d'écailles brunes, imbriquées, obtuses, blanchâtres & scarieuses à leurs bords; la plupart terminées par une très-petite pointe recourbée. L'involucre universel est composé de trois grandes folioles inégales, planes, assez larges, glabres, striées, très-longues, droites, aiguës; les rayons de l'ombelle enveloppés à leur base par une gaine courte, tronquée, noirâtre.

Elle croît dans les Indes & dans la presqu'île de Malacca. 2 (V. f. in herb. Lam.)

M. du Petit-Thouars a rapporté du Cap de Bonne-Espérance une plante très-voisine de celle-ci. Ses tiges sont feuillées jusque vers leur moitié; les feuilles sont planes, linéaires, rudes à leurs bords, plus longues que les tiges; leur gaine est lâche, scarieuse, longue de trois à quatre pouces; les épillets très-étroits, longs de huit à dix lignes, panachés de rouge & de vert; les écailles oblongues, striées sur leur dos, un peu aiguës.

84. SOUCHET pangoré. *Cyperus pangorei*. Retz.

Cyperus culmo triquetris; basi folioso; involucri triphylo; umbellâ universali, decompositâ; paniculis subtrifidis. Retz. Observ. Bot. 4. pag. 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 284. n°. 58.

Cyperus (pangorei), culmo triquetris; involucri

triphyllo; *umbellâ universali*, *decompositâ*; *parialibus subtrifloris*; *spicis alternis*, *filiformibus*, Rottb. Gram. 31. tab. 7. fig. 3.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & demi, triangulaires, striées, terminées par une ombelle simple ou composée, dont les rayons sont inégaux, longs de deux à quatre pouces, peu nombreux, très-étalés, soutenant à leur sommet quelques épillets longs de plus d'un pouce, alternes, presque filiformes, médiocrement comprimés, garnis d'écaillés oblongues, concaves, alternes, un peu obtuses, plus pâles à leurs bords. L'involucre est composé de trois folioles linéaires, étroites, dont deux au moins aussi longues que l'ombelle; la troisième plus courte.

Cette plante croît dans les Indes & à la Chine. (*V. f. in herb. Lam.*)

85. SOUCHET panic. *Cyperus panicoides*, Lam.

Cyperus culmo triquetris; *umbellâ decompositâ*, *triphyllâ*; *spiculis linearibus*; *floribus alternis*, *remotis*, *obtusissimis*, Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 149. n°. 720.

Cyperus (Sintonici), *culmo triquetris*; *umbellâ supra decompositâ*, *verticillatâ*, *paniculatâ*, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 66.

Cyperus paniculis sessilibus & pedunculatis; *spiculis linearibus*; *sessilibus alternis*, *remotis*, *obtusissimis*, Rottb. Gramin. pag. 41. n°. 55. tab. 9. fig. 1.

Cette plante, que j'ai observée dans l'herbier de M. Lamarck, diffère si peu de celle de M. Rottb. que je n'hésite pas à la regarder comme la même espèce.

Ses tiges sont grêles, droites, hautes d'environ un pied, triangulaires, garnies à leur partie inférieure de feuilles molles, striées, linéaires, un peu rudes à leurs bords, étroites, d'un vert-pâle, à peine de la longueur des tiges, & dont les gaines sont longues de plus d'un pouce.

Les fleurs sont disposées en une sorte d'ombelle dont les rayons filiformes, assez courts, inégaux, supportent une petite panicule à ramifications capillaires, courtes, presque verticillées, garnies d'épillets menus, étroits, linéaires; les écaillés calicinales alternes, distantes, fort petites, concaves, ovales, obtuses, d'un jaune-pâle. L'involucre universel est composé de trois folioles inégales, plus longues que la panicule, semblables aux feuilles; l'une d'elles très-longue, de petites bractées courtes & setacées à la base des ramifications.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*V. f. in herb. Lam.*)

86. SOUCHET à fleurs nombreuses. *Cyperus vegetus*, Willd.

Cyperus culmo obtusâ triquetris; *umbellâ compositâ*; *spiculis lanceolatis*, *aggregatis*, *monandris*; *involucro polyphyllâ*, *longissimo*, Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 283. n°. 51.

Cyperus (monandrus), *culmo inferatâ foliis obtusâ triangulo*; *umbellâ polyphyllâ*, *decompositâ*; *spicis lanceolatis*, *congestis*, *sessilibus*; *floribus monandris*, Rottb. Catal. Bot. 1. pag. 3.

Cyperus declinatus, Moench. Method. 317.

C'est une belle & grande espèce, remarquable par ses ombelles à nombreux épillets agrégés & sessiles à l'extrémité des pédoncules, munis d'un involucre à plusieurs folioles très-longues.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un p. d. & demi ou deux pieds, glabres, très-lisses, striées, triangulaires, fermes, épaisses, garnies à leur partie inférieure de feuilles glabres, larges au moins de trois lignes, plus courtes que les feuilles, plissées en deux, striées, aiguës, tudes à leurs bords, dont la gaine est blanchâtre, membraneuse, très-lisse.

Les fleurs sont terminales, disposées en une sorte d'ombelle dont les rayons sont très-inégaux, roides, un peu comprimés, striés, divisés à leur sommet en plusieurs autres assez courts, qui supportent des épillets très-nombreux, fasciculés, sessiles, comprimés, lancéolés, aigus, très-glabres, d'un vert-jaunâtre, composés d'écaillés imbriquées, ovales, lancéolées, aiguës, à une seule étamine. L'involucre général est composé de plusieurs folioles très-longues, réfléchies, assez semblables aux feuilles, tant par leur forme que par leur longueur. Les rayons partiels sont munis la plupart d'une foliole très-étroite, subulée, vaginale à la base, à peu près aussi longue que le rayon.

Cette plante croît aux Antilles. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 2. (*V. v.*)

87. SOUCHET à épillets grêles. *Cyperus strigosus*, Linn.

Cyperus culmo triquetris, *nudo*; *umbellâ compositâ*, *foliosâ*; *spicibus tereti-fusculatis*, *horizontalibus*, Lam. Illustr. Genet. vol. 1. p. 146. n°. 726.

Cyperus culmo triquetris, *nudo*; *umbellâ simplicis*; *spiculis linearibus*, *confertissimis*, *horizontalibus*, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 69. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 281. n°. 44.

Cyperus rotundus; *panicâ lâ spâsâ*; *spicis strigosis*, *ferrugineis*, Sloan, Jam. 35. Hist. 1. pag. 116. tab. 74. fig. 2, 3.

Cyperus (strigosus), *magnus*; *foliis radicalibus*; *culmo triquetris*; *involucro longissimo*; *umbellâ com-*

profus; spiculis copiosis, subtereti-fubulatis, spicatis undique patentissimis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 28.

Cyperus (ferox), foliosus, triquetus, majusculus; umbellâ spatiosa, compositâ; spiculis copiosissimis, confertis; petalis filiformi-fubulatis. Richard, Act. Soc. Hist. Nat. Paris, vol. 1. pag. 106.

Ce fouchet se rapproche beaucoup du *cyperus vegetus* : il en diffère par ses épillets beaucoup plus grêles, presque cylindriques, subulés, & par les folioles de l'involucre, & les feuilles du bas plus étroites.

Ses tiges sont roides, droites, assez grêles, très-glabres, striées, triangulaires, les angles très-faillans, feuillées seulement à leur base; les feuilles très-allongées, roides, striées, presque triangulaires, un peu roides à leurs bords, d'un vert-glauc, plus longues que les tiges qu'elles entourent à leur base par une gaine longue d'environ deux pouces, souvent rougeâtre à la partie inférieure.

L'ombelle est courte, serrée, simple ou composée, très-épaisse, munie d'un involucre universel à cinq folioles & plus, inégales, très-longues, étalées, semblables aux feuilles; les rayons sont courts, inégaux; ils soutiennent à leur sommet des épis courts, épais, formés par un grand nombre d'épillets rouilleux, sessiles, entassés, cylindriques, subulés, horizontaux; les écailles concaves, obtus., & surtout les inférieures, vertes sur leur carène, membraneuses à leurs bords.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans l'île Cayenne. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

88. SOUCHET odorant. *Cyperus odoratus.*

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ decompositâ, simpliciter foliosa; pedicellis distincte spicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 68. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 284. n°. 55.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ decompositâ, sessipedicatis; spicis confertissimis, subulatis. Rottb. Gram. pag. 38.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ duplicatâ, foliosa; pedunculis propriis, distincte spicatis. Roym. Lugd. Bat. 50. — Gronov. Virgin. 131.

Cyperus longus, odoratus, paniculâ sparsâ; spicis strigosioribus, viridibus. Swen. Jam. 35. Hist. 1. pag. 116. tab. 74. fig. 1. & tab. 8. fig. 1.

C'est une très grande plante, dont les tiges sont fort élevées, triangulaires, striées, de l'épaisseur du doigt, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur, supportant à son sommet un involucre très-ample, composé de plusieurs folioles lancéolées ou linéaires-lancéolées, inégales, la plupart

plus longues que l'ombelle; les involucre partielles semblables aux folioles de l'involucre universel, mais plus courts & plus étroits, lurt aigus.

Les ombelles sont amples, grandes, composées; leurs rayons très-long, nombreux, enveloppés à leur base par une gaine argileuse, longue d'un pouce, un peu purpurine, biffée à son sommet; les rayons des ombellules moins nombreux, plus courts; ces rayons supportent des épillets très-ra-prochés, nombreux, horizontaux, épars le long des rayons ou pédoncules partiels, grêles, cylindriques, subulés, longs d'environ un demi-pouce, de couleur noirâtre, ferrugineuse.

Cette plante croît dans l'Amérique, sur le bord des fleuves. 2

89. SOUCHET géant. *Cyperus giganteus.*

Cyperus culmo subtereti, altissimo; involucri foliis numerosis, confertissimis; umbellâ maximâ, decompositâ; spicis confertis; spiculis subulatis, patentissimis. (N.)

Ce fouchet, qui a des rapports avec le *cyperus strigosus* par la forme de ses épillets, & peut-être plus encore avec le *cyperus elatus*, est remarquable par sa force, sa grandeur, & surtout par ses ombelles très-amples.

Ses tiges sont droites, hautes de six à huit pieds, fortes, de l'épaisseur du doigt à leur sommet, très-glabres, finement striées, cylindriques à ce qu'il m'a paru, terminées par une très-vaste ombelle, dont l'involucre universel est composé de folioles nombreuses, roides, dures, larges, ensiformes, striées, point rudés à leurs bords, très-aiguës; celles des involucre partielles également nombreuses, de même forme, mais plus étroites, à peine de la longueur des ombellules. Les rayons de l'ombelle universelle sont nombreux, roides, droits, striés, glabres, anguleux, un peu comprimés, longs de huit à douze pouces, enveloppés à leur base par une gaine coriace, longue d'un pouce & plus, tronquée, d'un vert-glauc ou cendré; les rayons des ombellules presque filiformes, presque égales, étalées, longs de trois à quatre pouces, terminés par des épis longs au moins d'un pouce, épais, obtus, quelques-uns sessiles dans le centre des ombelles, composés d'épillets sessiles, épars, très-nombreux, presque horizontaux, subulés, presque cylindriques, d'un roux-clair; les écailles concaves, oblongues, étroites, presque obtus.

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à Porto-Rico. 2 (V. f. in herb. Lam.)

90. SOUCHET glabre. *Cyperus glaber.* Linn.

Cyperus culmo triquetro, nudo, levi; umbellâ triphyllâ, floribus glomeratis, inferioribus brachiatis; foliis glabris. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 126.

n°. 14. — Maniff. pag. 179. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 28; n°. 54.

Cyperus parvus, *punctat* *conglobat*, *spicis compressis*, *spadiceo-viridibus*. Séguier, Plant. Veron. Suppl. pag. 66. tab. 2. fig. 1.

Cette plante est petite; ses tiges sont glabres, hautes de trois à quatre pouces, triangulaires, dépourvues de feuilles dans sa longueur, excepté des feuilles radicales droites, très-glabres, aussi longues que les tiges. Celles-ci se terminent par une ombelle simple, dont les rayons supportent à leur sommet des fleurs alternes; les inférieures médiocrement pedunculées; les supérieures sessiles, agglomérées. Les épillets sont ovales, comprimés, composés d'écaillés imbriquées sur deux rangs, très-glabres, verdâtres, qui prennent en vieillissant une couleur jaunâtre. La base de l'ombelle est munie d'un involucre à trois folioles plus longues que cette ombelle, & trois autres folioles plus courtes, subulées.

Cette plante se rencontre dans les lieux humides, aux environs de Véronne. ☉

91. SOUCHET nu. *Cyperus denudatus*. Linn. f.

Cyperus culmo triquet, *involucro subnullo*. Linn. f. Suppl. pag. 102. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 737. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 285. n°. 59.

D'après Linné fils, ce souchet a des tiges droites, triangulaires, hautes de deux pieds, n'ayant d'autres feuilles qu'une gaine foliaire placée vers leur milieu; elles se terminent par une ombelle composée, peu étalée, dont l'involucre universel est fort petit, à peine sensible, sans involucre partiel. Les épillets sont oblongs, de couleur purpurine, verdâtres sur leur carène, un peu écartés à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ☿

92. SOUCHET tremblant. *Cyperus tremulus*.

Cyperus triquet, *basi foliofo*, *umbellâ decompositâ*, *spiculis subulatis*, *glumis obtusis*, *albo marginatis*; *involucro polyphylo*; *folioli tribus externis*, *umbellâ multo longioribus*, *æstivis*. (N.)

Belle espèce, dont les épillets délicats sont agréablement panachés de vert, de jaune & de blanc; les tiges & les feuilles molles, souples & pliantes, distinguées d'aillours par les balles courtes, très-obtusées.

Les tiges sont droites, assez ébouriffées, triangulaires, très-filles, trices, hautes de trois à quatre pieds, garnies à leur base de feuilles molles, presque planes, rudes à leurs bords, aiguës. L'involucre est composé de plusieurs folioles très-inegales;

les trois extérieures beaucoup plus longues que l'ombelle, semblables aux feuilles; les autres plus courtes, très-étroites; les involucre partiel plus courts que les ombellules, très-ouverts, presque filiformes.

L'ombelle est ample, étalée; les rayons du centre très-courts, point ramifiés, presque fasciculés, presque chargés d'épillet dans toute leur longueur; ceux de la circonférence élancés, inégaux, supportant à leur sommet des ombellules dont les rayons sont garnis d'épillets étalés, horizontaux, grêles, subulés, munis d'écaillés alternes, un peu distantes, courtes, ovales, concaves, obtuses & arrondies à leur sommet, vertes sur leur dos, fauves à leurs côtés, blanches & scarieuses à leurs bords, s'écartant les unes des autres à mesure que les semences mûrissent. La base des rayons est enveloppée par une gaine cylindrique, un peu lâche, brune à sa base, terminée par deux dents.

Cette plante croît sur le bord des eaux, à Madagascar; elle y a été observée par M. du Pent-Thouars. (F. f. in herb. P. T.)

93. SOUCHET comestible. *Cyperus esculentus*. Linn.

Cyperus culmo triquet, *nudo*; *umbellâ foliofâ*; *radicum tuberibus ovatis*, *zonis imbricatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 67. — Royen, Lugd. Bat. pag. 51. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 548. n°. 1162. — Idem, Illustr. Gener. vol. 1. pag. 149. n°. 712. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 118. n°. 4. — Destont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 43. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 284. n°. 56.

Cyperus rotundus, *esculentus*, *angustifolius*. C. Bauh. Pin. 14. — Idem, Theatr. Botan. pag. 222. Icon. — Tournef. Inst. R. Herb. 527. — Scheuch-Gram, pag. 382. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 236. §. 8. tab. 11. fig. 10. — Monn. Prodr. 12.

Dulcichinum. Dodon. Pempt. 340. Icon.

Cyperus rotundus, Camer. Epir. 10. Icon. Bona.

Throfi. J. Bauh. Hist. 2. pag. 504. Icon. — Matth. Comment. 412. Icon. — Lobel. Icon. 78. — Idem, Obferv. pag. 41. Icon.

Cyperus dulcis. Tabern. Icon. 657.

Cette espèce a des racines un peu tortueuses & fibreuses, fort menues, chargées à leur extrémité de gros nœuds ou de tubercules oblongs ou un peu arrondis, articulés, de couleur brune en dehors, d'une substance blanche & presque farineuse en dedans, assez tendre & savoureuse, d'où sortent de toutes parts des fibres très-menues. Ses tiges sont droites, triangulaires, glabres, nues dans toute leur longueur, hautes d'environ un pied & plus. Les feuilles sont toutes radicales, presque aussi

presqu'aussi longues que les tiges, étroites, carénées, un peu tudes ou denticulées à leurs bords, surtout à leur partie supérieure, d'un vert-glaque.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, qui présente une sorte d'ombelle dense, peu étalée, dont les pédoncules sont grêles, triangulaires; les uns centraux, très-courts ou nuls; d'autres simples ou soutenant des ombelles partielles. Les épillets sont linéaires, subulés, d'un brun-roussâtre, longs de deux ou trois lignes, sessiles & tassés sur un pédoncule commun, au nombre de cinq à douze, munis d'écaillés comprimées, fortement imbriquées sur deux rangs; les pédoncules inégaux, longs d'environ un pouce, garnis à leur base d'un involucre d'environ quatre feuilles, dont quelques-unes sont ordinairement plus longues que les panicules.

Cette plante croît dans les lieux humides, sur le bord des ruisseaux, dans l'Italie, l'Orient, la Barbarie, & même dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Montpellier. (V. f.)

Les tubercules de ses racines passent pour adoucissants & diurétiques; ils ont d'ailleurs une saveur douce, agréable, assez semblable à celle de la châtaigne, qu'on peut manger même crus. Ce fouchet, ayant l'avantage d'offrir un aliment tout préparé, & de croître assez facilement dans les lieux humides & sur le bord des eaux, mérite peut-être une attention toute particulière. On pourroit le multiplier sans peine & avec avantage dans des terrains humides, le long des rivières, très-souvent abandonnés, & dont la culture aisée remplacerait d'autres plantes dont on ne peut tirer aucun profit.

94. SOUCHET rond. *Cyperus rotundus*, Linn.

Cyperus culmo triquetris, subnudo; umbellâ decompositâ; spicis alternis, linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 67. — Mater. medic. pag. 45. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 145. n° 713. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 283. n° 53.

Exclue *cyperus rotundus*. Flor. zeyl. — Mater. medic.

Cyperus orientalis, radice olivariâ, spicis longis, & f. decidua purpurascens. Scheuch. Gram. pag. 391. tab. 9. fig. 3.

1. *Cyperus rotundus vulgaris*. C. Bauh. Pin. 13. — Idem, Theatr. 210. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 235. §. 8. tab. 11. fig. 1.

Ce fouchet a de si grands rapports avec le *cyperus esculentus*, qu'il est assez difficile de l'en distinguer; il en diffère particulièrement par ses racines, dont les fibres sont plus fortes, traçantes. Botanique. Tome VII.

muniées, de distance à autre, de tubercules ovales, de couleur brune, d'une saveur amère.

Ses tiges sont droites, triangulaires, hautes d'environ un pied, nues, garnies de feuilles radicales, linéaires, semblables à celles des graminées, de couleur glauque. Les fleurs sont disposées en une ombelle composée, un peu dense; les pédoncules terminés par des épillets presque sessiles, alternes, linéaires; l'involucre composé de quatre à cinq folioles inégales, dont quelques-unes sont ordinairement plus longues que les ombelles.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe, aux environs de Montpellier, &c. &c.

Nota. Le *cyperus rotundus* (Linn. Flor. zeyl.) est une espèce très-différente, qui se rapporte au *cyperus hexastachyos* (Rottb.), & avec laquelle plusieurs botanistes l'ont confondu.

95. SOUCHET long. *Cyperus longus*, Linn.

Cyperus culmo triquetris, foliis; umbellâ foliolâ, supra decompositâ; pedunculis nudis; spicis alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 67. — Roy. Lugd. Bat. §. 0. — Mater. medic. 45. — Dalib. Paris. 14. — Scopol. Carn. edit. 2. n° 55. — Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 297. — Idem, Coll. &c. vol. 3. pag. 191. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 547. n° 1162. — Idem, Illustr. Gener. vol. 1. pag. 145. n° 711. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 43. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 285. n° 61.

Cyperus (procerus), culmo triquetris, subnudo; foliis lanceolatis; umbellâ decompositâ; spicis linearilanceolatis, alternis, nudis. ? Rottb. Gram. pag. 29. tab. 5. fig. 3.

Cyperus odoratus, radice longâ, seu cyperus officinarum. C. Bauh. Pin. 14. — Idem, Theatr. 216. Icon. — Tournet. Inst. R. Herb. 527. — Scheuch. Gram. pag. 378. tab. 8. fig. 12. — Monti, Prodrom. 12.

Cyperus longus, major; paniculâ sparsâ, speciosâ. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 237. §. 8. tab. 11. fig. 13.

Cyperus. Camer. Epit. 9. Icon. — Tragus, 915. Icon. — Fuchs, Hist. 453. Icon. — Gerard, Hist. 30. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 991. Icon.

Cyperus longus, odoratior, habiliior. Lobel. Icon. 75. — Idem, Observ. pag. 40. Icon. — Tabet. 656. Icon. — Marth. Comm. 26. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 992. Icon. *Altera*.

Cyperus paniculâ sparsâ, speciosâ. J. Bauh. Hist. 2. pag. 501.

Cyperus longus. Dodon. Pempt. pag. 338. Icon. Le fouchet. Regn. Botan. Icon.

Ses racines sont dures, épaisses, torrueuses, odorantes, surtout quand elles sont sèches, allongées, d'un brun-noirâtre en dehors, chargées d'un grand nombre de fibres capillaires, rameuses; elles produisent plusieurs tiges droites, glabres, triangulaires, hautes de deux à quatre pieds, lisses sur leurs angles, feuillées seulement à leur partie inférieure. Les feuilles sont très-longues, glabres, striées, d'un vert-bleuâtre, caninées, zigües, un peu rudes, tant à leurs bords que sur leur carène, vaginales à leur base; la gaine longue, glabre, striée.

Les fleurs sont disposées en corymbe ou en une sorte d'ombelle terminale, grande, lâche, étalée, dont les pédoncules sont très-égaux, grêles, triangulaires; les intérieurs beaucoup plus courts; les extérieurs allongés; les uns simples, d'autres formant une double ombelle, dont les pédoncules propres sont filiformes, presque teracés. Les épillets sont longs d'environ un pouce, comptés, linéaires, très-étroits, aigus, roussâtres, composés d'écaillés fortement imbriquées sur deux rangs opposés, petites, en carène, un peu obtuses, verdâtres sur leur carène. L'ombelle générale sort d'un involucre très-ample, composé de trois à six folioles très-grandes, inégales, semblables aux feuilles, quelques-unes deux & trois fois plus longues que les ombelles.

Cette plante croît dans les marais, sur le bord des rivières, en France, dans les environs de Paris, en Italie, dans la Barbarie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Ses racines passent pour stomachiques, diurétiques, déterives; elles sont odorantes, aromatiques, mais d'une saveur un peu amère: on s'en sert aussi comme mallicatoires, & pour déterger les ulcères de la bouche. Les parfumeurs les réduisent en poudre, & les font entrer dans la composition de leurs arômes, dans l'eau de miel de Londres.

96. SOUCHET faigüié. *Cyperus fastigiatus*. Rottb.

Cyperus culmo triquetris, umbellâ decompositâ; pedunculis longissimis, filiformibus, subquinguefidis; fideis plurimis, linearibus, sparsis. Rottb. Gram. 32. tab. 7. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 285. n°. 62.

Cyperus odoratus. Barm. Flor. ind. 20. tab. 8. fig. 2.

Cyperus (exaltatus), culmo triquetris, monophyllo; umbellâ supra decompositâ, polyphyllâ; spiculis linearibus, pedunculatis. Retz. Observ. Bot. 5. pag. 11. ?

Cette plante, d'après Rottb., a des tiges glauques, épaisses, triangulaires, striées; elles sup-

portent à leur sommet un très-grand involucre, composé d'environ six folioles inégales, hétéroclées à leurs bords & sur leur carène; les plus grandes, deux & trois fois plus longues que les ombelles; les involucre parielles, à deux folioles fécécées.

Les rayons de l'ombelle universelle sont très-inégaux, filiformes, flexueux, enveloppés à leur base par une gaine longue d'environ un pouce, tronquée obliquement à son sommet. Les ombelles partielles sont presque sessiles, ou bien elles n'ont que des pédoncules courts, capillaires, flexueux, chargés presque dans toute leur longueur d'épillets épars, alternes, linéaires, un peu cylindriques, très-rapprochés de ceux du *Cyperus longus*, auquel cette plante ressemble beaucoup. Les écaillés sont d'un brun foncé, petites, oblongues, lancéolées, acuminées, blanchâtres à leurs bords, brunes & striées sur leur carène, traversées par une ligne blanche.

Cette plante croît dans les Indes. (Description. ex Rottb.)

97. SOUCHET canaliculé. *Cyperus canaliculatus*. Retzius.

Cyperus culmo triquetris, canaliculatus, nudo; umbellâ decompositâ; pedunculis racemosis; involucre polyphyllâ, longissimo. Retz. Observ. Bot. 6. pag. 20. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 286. n°. 63.

Ses tiges sont triangulaires, hautes de trois pieds, arrondies sur leurs angles, creusées en gouttière à leurs trois faces, munies à leur base de feuilles longues, très-fines.

Les ombelles sont plusieurs fois composées; leurs rayons droits, simples, supportant à leur sommet une & deux ombellules. L'involucre universel est composé d'environ six folioles, dont la plus grande a environ deux pieds de long; les autres graduellement plus courtes; celles des involucre parielles filiformes, plus courtes que les ombelles; tous les rayons enveloppés à leur base d'une gaine jaunâtre, tronquée, prolongée en pointe à un côté de ses bords. Les épillets sont serrés, épars, imbriqués, aigus, assez petits, composés de cinq à huit fleurs.

Cette espèce se rencontre dans les Indes orientales. (Description. ex Retz.)

98. SOUCHET iria. *Cyperus iria*. Linn.

Cyperus culmo triquetris, seminudo; umbellâ fasciculâ, decompositâ; spiculis alternis, granis distinctis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 64. — Rottb. Gram. 41. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 729. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 286. n°. 65.

Gramen cyperoides, India orientalis, elatius; pa-

nicula sparsa, pal'escens. Pluken. Almag. pag. 179. tab. 191. fig. 7.

Iria feu fatari. Rheed. Malab. vol. 12. pag. 105. tab. 56. *Mediocris*.

On distingue cette espèce à la couleur noirâtre de la base des tiges & des rayons; les autres parties blanchâtres; les épillets luisans; les écailles vertes sur leur carène; les semences brunes.

Ses racines sont fibreuses; elles produisent des tiges triangulaires, striées, hautes d'un pied, garnies à leur partie inférieure de feuilles linéaires, lancéolées, striées, molles, relevées en carène, presque de la longueur des tiges qu'elles enveloppent à leur base par une très-longue gaine.

Les ombelles sont deux fois composées, munies d'un involucre universel à trois ou quatre folioles inégales, semblables aux feuilles, plus longues que les fleurs. Les involucre partiel, situé à la base des pédicelles, sont des écailles siccées, caduques, flexueuses. Les rayons sont au nombre de huit à douze, inégaux, très-ouverts, longs depuis un demi-pouce jusqu'à trois, soutenant à leur partie supérieure quelques rameaux, où sont situés les épillets pédicellés, linéaires, comprimés, disposés par deux rangs, imbriqués par des écailles alternes, petites, comprimées, naviculaires, très-obuses, striées sur leur carène. Les semences sont glabres, petites, trigones.

Cette plante croît dans les Indes.

99. SOUCHET de Monti. *Cyperus Monti*.

Cyperus culmo triquetro, umbellâ decompositâ, paniculatâ; spiculis oblongis, stoculis distinctis, involucri hexaphyllo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 286. n°. 64.

Cyperus (Monti), culmo tereti; umbellâ suprà decompositâ; foliis carinatis levibus. Linn. f. Suppl. pag. 120. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 144. n°. 702.

Cyperus (serotinus), umbellâ universali decompositâ, foliosa; partialibus nudis, subtrifidis; spicis serotinis, alternatim pinnatis. Rottb. Gramin. pag. 31.

Cyperus serotinus, odoratus; radice longâ; paniculâ toxisyllis talis, ferrugineis, compatis. Monti, Gram. pag. 12. tab. 1. fig. 2. — Scheuch. Gram. 380.

Cette plante a des tiges triangulaires & non pas cylindriques, droites, glabres, hautes d'environ un pied ou un pied & demi, simples, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur, excepté à leur base, c'est sur leurs angles. Les feuilles sont glabres, très-longues, en carène, un peu rudes & légèrement coupantes à leurs bords, très-lisses sur leur carène.

Les fleurs sont disposées en ombelles universelles & partielles; ces dernières composées d'épillets oblongs, comprimés, un peu convexes, alternes, dont les pédicelles font souvent un peu rameux, munis à leur base d'une gaine cylindrique, de couleur brune, tronquée à son sommet; les écailles calicinales brunes, un peu scarieuses à leurs bords; l'ombelle universelle garnie à sa base d'un involucre à six folioles très-longues, semblables aux feuilles.

Cette plante croît en Italie, dans le Piémont, sur les côtes maritimes, le long des fossés aquatiques, & sur le bord des rivières & des lacs. * (*V. f.*)

100. SOUCHET à corymbes. *Cyperus corymbosus*. Rottb.

Cyperus involucri polyphyllus, umbellâ suprà decompositâ; pedunculis filiformibus, corymbosis, striatis. Rottb. Gram. pag. 41. tab. 7. fig. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 66.

Cyperus (corymbosus), culmo trigono, aphyllis; umbellâ decompositâ, involucri brevioris; spicis linearibus. Thunb. Prodr. pag. 18.

Ses tiges sont épaisses, triangulaires, de couleur glauque, tachetées de brun; elles font naître à leur sommet un involucre composé de quatre folioles linéaires, lancéolées, rudes à leurs bords, au moins de la longueur des ombelles, larges d'environ deux lignes à leur base.

Les fleurs forment une ombelle plusieurs fois composée, dont les rayons, de douze à quinze, sont roides, filiformes, inégaux, longs d'un demi-pouce à trois pouces, enveloppés à leur base par une gaine longue de quatre lignes, striée, tronquée obliquement avec une pointe très-obuse; divisés à leur sommet en petits corymbes, munis à la base des ramifications de petites écailles linéaires, striées. Les épillets sont grêles, cylindriques, subulés, longs au moins d'un demi-pouce, composés d'écailles oblongues, concaves, blanchâtres & membranées à leurs bords, un peu aigües.

Cette plante croît dans les Indes & au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Rottb.*)

101. SOUCHET à feuilles de gramin. *Cyperus graminifolius*.

Cyperus culmo debili, subtriquestro, humili, basi folioso; umbellâ suprà decompositâ, spiculis minimis, involucri subdiphyllis. (N.)

C'est une petite plante, haute de trois à quatre pouces, dont les racines fasciculées & fibreuses produisent des tiges droites, très-foibles, triangulaires, un peu comprimées, garnies à leur base

de feuilles molles, graminiformes, planes, étroites, glabres, un peu plus courtes que les tiges.

Celles-ci se terminent par des fleurs plusieurs fois ombellées, dont l'involucre universel est à deux folioles très-inegales; la plus grande un peu plus longue que les ombelles, semblable aux feuilles; l'autre plus courte. Dans le centre une ombelle presque sessile; des rayons grêles, inégaux, filiformes partant de la circonférence, s'écartent fortement entr'eux, & supportent une très-petite ombellule, dont les épillets ont des pédoncules très-courts, sétacés, souvent réfléchis. Ces épillets sont roussâtres, fort petits, subulés, garnis d'écailles concaves, imbriquées, opposées, obuses, très-petites; point d'involucre partiel.

Cette plante croît dans les Indes. (V. f. in herb. P. T.)

102. SOUCHET à longs épillets. *Cyperus macrostachyos*. Lamarck.

Cyperus culmo triquetris; umbellâ compositâ, amplissimâ; spiculis linearibus, arcuatis, longissimis; glumis obtusifolius. Lam. Illustr. Genér. vol. 1. pag. 147. n°. 734.

La partie supérieure de cette belle plante, la seule portion que j'aie vue, présente une ombelle très-ample, composée, dont les rayons sont nombreux, longs au moins d'un demi-pied, glabres, cylindriques, striés, enveloppés à leur base par une gaine cylindrique, d'un brun-noirâtre, tronquée, membraneuse, longue d'un pouce, & d'un involucre dont les folioles très-peu nombreuses (je n'en ai vu qu'une seule conservée) sont étroites, linéaires, planes, plus courtes que les ombelles.

Les épillets sont alternes, presque sessiles, longs au moins de deux pouces, arqués, comprimés, dont le rachis est très-flexueux, aplati, canaliculé, membraneux à ses bords, nu à la partie inférieure par la chute des écailles. Celles-ci sont d'un brun-clair, membranées, un peu cendrées, ovales, concaves, imbriquées sur deux rangs, à peine aiguës. Les semences sont noires, ovales, comprimées, obtuses. La partie supérieure des tiges est triangulaire, nue, striée, un peu fistuleuse.

Cette espèce se trouve dans l'Afrique. (V. f. in herb. Lam.)

Cette espèce, dont je n'ai vu qu'une portion, seroit-elle la même que noire *Cyperus latifolius*, auquel elle ressemble beaucoup par ses fleurs?

103. SOUCHET à larges feuilles. *Cyperus latifolius*.

Cyperus culmo erecto, triangulari, levi; foliis culmum aequantibus; involucre maximo, subteu-

phyllis; umbellâ suprà decompositâ; spiculis confertis, oblongis; squamis distinctis. (N.)

C'est une grande & belle espèce, dont les tiges sont fortes, droites, triangulaires, hautes de trois à quatre pieds, tranchantes, mais lisses sur les angles, garnies à leur base de très-grandes feuilles latérales, au moins aussi longues que les tiges, larges d'un pouce & plus, fermes, tranchantes, mais point rudes à leurs bords. L'involucre est composé de trois à quatre folioles inégales, dont une longue d'environ un pied & demi, semblable aux feuilles; les autres plus étroites, plus courtes, à peine de la longueur de l'ombelle.

Celle-ci est ample, plusieurs fois composée; les rayons de six à huit, très-inegaux, fermes, striés, munis d'une gaine lâche à leur base; une ombelle courte, presque sessile, serrée dans leur centre. Ces rayons sont plus ou moins ramifiés à leur sommet, & supportent un très-grand nombre d'épillets ramassés, d'un jaune-clair, étroits, à peine comprimés, longs d'un pouce, garnis d'écailles aigües, un peu écartées, concaves, obtuses, coriaces. Les semences sont petites & triangulaires.

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-Thouars à Madagascar, sur le bord des eaux, où elle est assez abondante par cantons. Ses feuilles sont employées, par les naturels, pour faire des nattes & des pagnes, qui sont de peu de durée. (V. f. in herb. P. T.)

104. SOUCHET à grappes. *Cyperus racemosus*. Retz.

Cyperus culmo triquetris, nudo; umbellâ suprà decompositâ; pedunculis ramosis racemosisque; involucre polyphyllis, longo. Retz. Observ. Bor. 6. pag. 20. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 68..

J'ai cru devoir rapporter à cette espèce une plante qui m'a été communiquée par M. du Petit-Thouars, & d'après laquelle je donne la description suivante.

Ses racines sont dures, épaisses, presque ligneuses; il s'en élève plusieurs tiges droites, fermes, un peu grêles, hautes d'environ un pied & demi, fortement striées, un peu comprimées, plutôt anguleuses que triangulaires, dépourvues de feuilles, munies seulement à leur base de quelques gaines minces, membranées, alternes, qui enveloppent quelquefois les tiges jusque vers leur moitié. L'involucre universel est composé de beaucoup de folioles très-longues, planes, larges, presque égales, droites, aiguës, point rudes, minces, striées. De leur centre sort une ombelle assez ample, dont les rayons, assez nombreux, sont presque capillaires, triangulaires, munis d'une petite gaine très-courte à leur base, ramux ou un peu ombellés à leur sommet; les ramifications courtes,

très-déliées, simples, ou de nouveau ramifiées, supportant des épillets d'un brun-roussâtre, planes, linéaires, longs d'environ un demi-pouce; les écailles calicinales concaves, imbriquées par deux rangs opposés, un peu aiguës. Quelquefois les ombelles sont beaucoup plus grêles, les épillets plus petits.

Cette plante a été recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars. *z* (V. f. in herb. P. T.)

105. SOUCHET élevé. *Cyperus elatus*. Linn.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ foliosâ, suprà decompositâ; spiculis digitalibus, imbricatis; spiculis subulatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 67. — Amœn. Acad. vol. 4. pag. 301. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 70.

Ce souchet a des tiges très-hautes, droites, lisses, triangulaires, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur : elles se terminent par une ombelle fort ample, feuillée, subdivisée en plusieurs autres, très-irrégales. L'involucre universel est composé de plusieurs folioles très-longues; celles des involucre partiels sont plus courtes que les ombelles. Les fleurs sont réunies en épis sessiles, tant aux ombelles qu'aux ombellules; ils sont de la longueur du doigt, de couleur noirâtre, composés d'épillets imbriqués, subules, disposés sur deux rangs opposés.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales.

106. SOUCHET étalé. *Cyperus expansus*.

Cyperus culmo praeter, nudo, triangulari; umbellâ suprà decompositâ ramisque expansis, complanatis; involucri subteraphyllo, longissimo; spiculis subulatis. (N.)

Cette plante se rapproche beaucoup du *Cyperus difans*, principalement par la disposition de ses fleurs & par ses épillets subules, mais plus serrés. D'ailleurs, les tiges n'ont point de feuilles inférieures, & les folioles de l'involucre sont très-longues.

Ses tiges sont triangulaires, nues, presque de la grosseur du petit doigt à leur base, glabres, striées, hautes d'environ trois pieds, munies à leur base de quelques gaines assez longues, brunes, membraneuses; elles se terminent par une ombelle fort ample, étalée, plusieurs fois composée.

L'involucre est formé de trois à quatre grandes folioles bien plus longues que l'ombelle, assez larges, droites, presque égales, très-lisses, striées; la quatrième beaucoup plus étroite & plus courte; elle manque quelquefois. Les rayons de l'ombelle sont allongés, étalés, grêles, inégaux; ils se divisent à leur sommet en plusieurs ramifications alternes, horizontales, presque capillaires, simples ou un peu rameuses, & soutiennent des épillets

alternes, presque sessiles, un peu distans, longs d'un demi-pouce, grêles, subules, un peu cylindriques; les écailles calicinales lâchement imbriquées, concaves, obtuses, blanches & scarieuses à leurs bords, d'un roux très-clair sur leur dos.

Cette plante a été recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars. *z* (V. f. in herb. P. T.)

107. SOUCHET à deux folioles. *Cyperus diphyllus*. Retz.

Cyperus culmo triquetro, diphyllus; umbellâ suprà decompositâ; spiculis teretibus, subinnatis. Retz. Observ. Bor. 5. pag. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 288. n°. 72.

Ses racines sont capillaires; ses tiges triangulaires, hautes de six pieds, garnies de deux feuilles vaginales à leur base, terminées à leur sommet par une ombelle plusieurs fois composée, longue de quatre pouces, dont l'involucre est composé de plusieurs folioles courtes, aiguës. Les rayons sont comprimés, & sous chacune de leurs divisions se trouve un petit involucre lancéolé, blanchâtre. Les épillets sont presque cylindriques, de couleur pâle, aiguës, presque disposés en aile, contenant environ douze fleurs, dont les écailles sont imbriquées, ovales, aiguës, striées longitudinalement, renfermant trois étamines, un ovaire étroit; trois styles, des stigmates velus.

Cette plante se trouve dans les eaux courantes, aux Indes orientales. (Description. ex Retz.)

108. SOUCHET à fleurs distantes. *Cyperus difans*. Linn. f.

Cyperus culmo triquetro, nudo; umbellâ foliosâ, suprà decompositâ; spiculis alternis, filiformi-subulatis; flocculis difantibus. Linn. f. Suppl. pag. 103. — Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 259. — Idem, Collect. vol. 3. pag. 189. — Lam. Illustr. Genér. vol. 1. pag. 146. n°. 747. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 288. n°. 71.

Cyperus (elatus), culmo triquetro, nudo; umbellâ foliosâ, suprà decompositâ; spiculis alternis, longissimis, filiformi-subulatis. Rottb. Gram. p. 37. tab. 10.

Ses racines sont noirâtres, tubéreuses, garnies de fibres flexueuses, d'où s'élèvent des tiges droites, hautes de deux pieds, triangulaires, striées, garnies seulement à leur base de feuilles assez larges, lancéolées, alternes, relevées en carène, réfléchies à leurs bords.

Les ombelles sont terminales, étalées; les unes presque sessiles dans le centre, les autres deux & presque trois fois composées; les pédoncules communs inégaux, longs de quatre à six pouces & plus, presque filiformes, terminés par une ombellule plus petite, dont les rayons presque fasciés soutiennent ces épillets très-grêles, distans, al-

ternes, lâches, filiformes, subulés, horizontaux, longs d'environ un pouce, composés d'écaillés fort petites, alternes par deux rangs, distantes, obtuses, un peu noirâtres. L'involucre universel est formé par plusieurs folioles semblables aux feuilles, inégales, la plupart plus longues que l'ombelle; les folioles des involucre partiels bien plus étroites, linéaires, plus courtes que les ombelles.

Cette plante croît dans l'Inde & au Malabar. (V. f. in herb. Lam.)

109. SOUCHET *haspan*. *Cyperus haspan*. Linn.

Cyperus caule triquetris, foliis; umbellâ suprà decompositâ; spiculis umbellato-fistilibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 66. — Flor. zeyl. 37. — Rotb. Gram. pag. 36. n°. 47. tab. 6. fig. 2. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 146. n°. 718. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 287. n°. 69.

Gramen cyperoides, maderaspatanum; paniculâ magis sparsâ & speciosa. Pluken. Almag. pag. 179. tab. 192. fig. 2.

Ses racines sont d'un brun-noir, fibreuses; elles produisent des tiges hautes au moins d'un pied, striées, à trois angles très-saillans, munies à leur partie inférieure de feuilles linéaires, d'un vert jaunâtre, striées, ordinairement plus longues que les tiges.

Les fleurs sont réunies en une ombelle terminale, composée, très-ample, dont les rayons sont très-nombreux, étalés, inégaux, triangulaires; les uns terminés par des épillets sessiles; d'autres, en bien plus grand nombre, soutenant une ombelle simple ou composée, dont les rayons filiformes supportent des épillets presque sessiles, également disposés en une petite ombelle. Ces épillets sont comprimés, linéaires, longs d'un demi-pouce, composés d'écaillés fort petites, imbriquées, sur deux rangs, de couleur brune, un peu obtuses, légèrement ponctuées, de seize à vingt sur chaque épillet. L'involucre universel n'a ordinairement que deux grandes folioles, l'une d'elles plus longue que l'ombelle. Les involucre partiels sont des écaillés lancéolées, situées à la partie inférieure de chaque petite ombelle. Les rayons sont enveloppés à leur base chacun par une gaine longue d'environ un demi-pouce, tronquée.

Cette plante croît dans l'Inde & l'Ethiopie. (V. f. in herb. Lam.)

110. SOUCHET à longues feuilles. *Cyperus longifolius*.

Cyperus culmo triquetris, basi longè foliis; umbellâ suprà decompositâ; involucre polyphyllis, longissimis. (N.)

Cette plante paroît avoir de très-grands rap-

ports avec le *Cyperus haspan*; elle en diffère par les folioles nombreuses de l'involucre universel, & se distingue par ses feuilles larges, très-longues.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied ou d'un pied & demi, munies à leur partie inférieure de cinq à six feuilles & plus, planes, molles, striées, point ridées à leurs bords, plus longues que les tiges, larges au moins d'un demi-pouce, embrassant les tiges par une gaine lâche, membraneuse, un peu purpurine à sa base.

L'involucre universel est composé de cinq à six folioles & plus, inégales, semblables aux feuilles, bien plus longues que l'ombelle; celle-ci est trois fois composée, outre des paquets de flurs presque sessiles dans son centre. Les rayons sont nombreux, étalés, très-inégaux, roides, allongés, lisses, triangulaires; les ombellules garnies d'un involucre à plusieurs folioles subulées à leur partie supérieure, plus courtes que les rayons. Les épillets fasciculés & sessiles, presque en grappes ou ombelles à l'extrémité des ombelles partielles; ils sont petits, ovales, comprimés, roussâtres; les écaillés imbriquées, concaves, ovales, aiguës, réfléchies légèrement à leur sommet.

Cette plante croît à Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. T.)

111. SOUCHET à fleurs lâches. *Cyperus laxiflorus*.

Cyperus culmo triquetris, nudo; umbellâ compositâ; radiis numerosissimis, longissimis; spiculis subulatis, laxifloris, umbellato-fistilibus; involucre polyphyllis, brevi, partiali, subdiphyllis. (N.)

C'est une grande & belle espèce qui se rapproche par son port du *Cyperus papyrus*. Ses tiges sont hautes, peu épaisses, glabres, striées, triangulaires, dépourvues de feuilles, terminées par une ombelle très-ample, dont les rayons sont simples, triangulaires, extrêmement nombreux, fasciculés, long de huit à dix pouces, soutenant à leur sommet une sorte d'ombelle composée d'épillets sessiles, ordinairement peu nombreux, grêles, subulés, longs d'un à deux pouces, dont les écaillés sont d'un brun-clair & luisant, alternes, un peu distantes, concaves, lancéolées, obtuses. L'involucre universel est formé de plusieurs folioles courtes, roides, enfiliformes, striées, aiguës, élargies à leur base; les involucre partiels à deux folioles très-courtes, inégales.

Cette plante croît à Madagascar. (V. f. in herb. P. T.)

112. SOUCHET à papier. *Cyperus papyrus*. Linn.

Cyperus culmo triquetris, nudo; umbellâ involutis longioribus; involucrellis triphyllis, setaceis, longis

gioribus ; spiculis ternis. Linn. Syst. veget. pag. 97.
— Rottb. Gramin. pag. 32.

*Cyperus culmo triquetra, nudo ; umbellâ involu-
eris longiore ; radiis basi vaginatis, spiculis subula-
tis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 732.

*Cyperus culmo triquetra, nudo ; umbellâ simplicis,
foliosa ; pedunculis simplicissimis ; vaginatis, distichis
spicatis.* Roy. Lugd. Bat. pag. 50.

*Cyperus omnium maximus, papyrus dictus ; lo-
cuffis minimis.* Mich. Gen. 44. tab. 19. — Monti,
Gram. 14.

*Cyperus enodis, nudus, culmis à vaginis brevibus
prodeuntibus ; spicis tenuioribus.* Scheuch. Gramin.
pag. 387. tab. 8. fig. 14.

Cyperus niloticus vel syriacus, papyraceus. Mo-
ris. Oxon. Hist. 3. pag. 239. 6. 8. tab. 11. fig. 41.

Papyrus nilotica. J. Bauh. Hist. 2. pag. 506. Ic.
— Lobel. Icon. tab. 79. — Idem, Advers. 38.
Icon.

Papyrus aegyptia pena. Dalech. Hist. 2. p. 1878.
tab. 1883.

Papyrus syriaca & scitiana. C. Bauh. Pin. 19.
— Idem, Theatr. Botan. pag. 333. Icon.

Sari. Theophrast.

Papyrus. Bruce, Itin. 5. pag. 1. tab. 1. edit.
Germ. 5. pag. 13. tab. 1.

Volgairement bérâ par les Egyptiens.

Cette plante, si intéressante par sa grandeur
& par les usages auxquels il paroît que les An-
ciens l'ont employée pour la fabrication de leur
papier, se fait distinguer par la hauteur de ses ri-
ges, & par l'ampleur & la régularité de ses om-
belles.

Ses racines sont très-grosses, presque de l'é-
paisseur du poignet, rameuses, allongées, noueu-
ses & s'étendant très-loin ; elles produisent une
tige haute de huit à dix pieds, triangulaire, striée,
glabre, de couleur pâle & cendrée, au moins
aussi grosse que le bras, très-essilée vers son som-
met, très-droite, dépourvue de feuilles dans sa
longueur ; celles de la base assez larges, droites,
ensiformes, bien plus courtes que la tige. Celle-ci
se termine par un très-grand nombre de rayons
allongés, presque égaux, grêles, très-ferrés, trian-
gulaires, munis à leur base d'une gaine cylindrique,
longue d'environ deux pouces. L'involucre de l'om-
belle générale est composée d'environ huit folioles
larges, ensiformes, aiguës, bien plus courtes que
l'ombelle ; les quatre folioles extérieures plus lar-
ges que les autres. Les ombellules ne sont guère
composées que de trois à quatre rayons très-courts ;
leur involucre de trois folioles sétacées, droites,
plus longues que ces ombellules. Quelquefois les

rayons de l'ombelle universel sont simples, & se
terminent par des épillets alternes, sans ombel-
lule ; d'autres sont stériles.

Ses fleurs, situées à l'extrémité des ombelles
partielles, sont disposées au sommet de chaque
rayon en un épi court, formé par un grand nombre
d'épillets sessiles, alternes, grêles, presque cy-
lindriques, subulés, garnis d'écaillés concaves,
étroites, presque obtrusées, un peu touffées sur
leur caène, très-blanches & membracées à leurs
côtés.

Cette plante croît sur le bord des fleuves dans
la Calabre, la Sicile, & particulièrement dans
l'Égypte le long du Nil. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. x (V. v.)

Observations. Il reste, sur le véritable *cyperus
papyrus* de Linné & des Anciens, des doutes assez
bien fondés. Il paroît qu'il en existe plusieurs es-
pèces confondues en une seule. Celle que l'on
cultive au Jardin des Plantes a les folioles des om-
belles partielles beaucoup plus longues que les
rayons, ainsi que le dit Linné.

M. du Petit-Thouars en a rapporté une espèce
de Madagascar, parfaitement semblable dans toutes
ses parties au *cyperus papyrus* de Linné, mais qui
en diffère par la collection des ombellules, bien
plus courte que ces mêmes ombellules. Ce même
savant a distingué dans cette espèce deux petites
écaillés situées aux deux côtés de l'ovaire, outre
l'écaille calicinaie qui le recouvre.

C'était avec les fortes tiges de cette plante
qu'autrefois on préparoit le papier en Égypte. On
les divisoit en vingt lames fort minces, on les ar-
rosoit avec de l'eau ; on les faisoit sécher au
soleil, puis on les croisoit en différens sens, & on
les mettoit à la presse. On fabriquoit également
du papier avec ses feuilles. On appeloit *papier té-
néotique* l'espèce de gros papier égyptien que
l'on faisoit avec les parties qui rouchoient le plus
près l'écorce du *papyrus*, car le beau papier étoit
fait avec la matière qui est au dessous de l'écorce
& de la lame qui la touche immédiatement. Il
étoit très-léger & comme calandré.

Après avoir détaché & enlevé l'écorce de la
tige de cette plante, on employoit encore la partie
intérieure, moëlleuse & spongieuse, pour en
faire les mâches des flambeaux qu'on portoit dans
les funérailles, & qu'on tenoit allumés tant que
le cadavre restoit exposé.

Les habitants du Nil employoient les racines de
ce fouchet pour brûler & pour fabriquer différens
vaies à leur usage. On entrelaçoit la tige en forme
de tissu, pour construire des barques qu'on gou-
dronnoit, & de l'écorce intérieure on *lisoit* on
faisoit des voiles, des nattes, des habillemens,
des couvertures pour les lits & les maisons, des

eordes, des espèces de chapeaux, & enfin du papier à écrire. La partie inférieure & succulente de la tige & les racines fournissent une substance alimentaire. Au reste, ce papier étoit anciennement *sacré* ou *hérétique*; il ne servoit que pour les livres de la religion égyptienne. Porté à Rome & différemment préparé, lavé, battu & lissé, ce papier prit le nom d'*Auguste*, de *Livie*, même celui du papetier *Fannius*. On trouva, sur le papier d'Égypte, de plus amples détails dans une savante Dissertation du comte de Caylus, en 1718.

L'usage du papier d'Égypte paroit avoir succédé à celui de plusieurs autres substances dont on se servoit les Anciens; car on écrivoit sur des peaux, sur des tablettes de cire, sur des coquilles, sur des métaux, sur l'écorce intérieure des arbres (le *liser*), sur l'ivoire, sur des feuilles de palmier, sur la toile de lin & de coton, sur du parchemin, &c. Avant l'invention de notre papier de chiffons, en 1470, on en faisoit, en Orient, avec des chiffons de toile de coton.

113. SOUCHET papyroïde. *Cyperus papyroides*.

Cyperus (prolifer), *culmo triquetro, nudo; umbellâ involucri longiore; radiis numerosissimis; spiculis minimis, proliferis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 733.

Cette espèce a des tiges droites, longues de deux pieds & plus, glabres, verdâtres, triangulaires, striées, dépourvues de feuilles, garnies à leur base de membranes lâches, minces, roussâtres, inégales, longues de deux à quatre ou cinq pouces; les tiges soutenant à leur sommet une ombelle ordinairement simple, remarquable par ses rayons très-nombreux, environ une centaine & plus, presque tous égaux, très-ferrés, filiformes, très-simples, munis à leur base d'une petite gaine courte, brune, membraneuse, tronquée, terminée par des épillets petits, très-étroits, linéaires, subulés, ramassés quelquefois en une petite ombelle à rayons courts, de trois à cinq, souvent plus nombreux & même deux fois ombellés. Les écailles sont d'un brun-obscur, ovales: du centre des ombelles sortent quelquefois d'autres épillets de même forme, pétioclés, réfléchis. L'involucre universel est composé de plusieurs folioles élargies à leur base, ensiformes, plus courtes que l'ombelle.

Cette plante croît à l'île-de-France, dans les lieux marécageux & sur le bord des fleuves. (V. f. in herb. Lam.)

114. SOUCHET joncoïde. *Cyperus juncoïdes*. Lamarck.

Cyperus culmo triquetro, umbellâ decompositâ, subnuda; spiculis parvis, aggregatis, serrato-squarrosi; glumis acutis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 735.

Ce souchet a, par sa panicule de fleurs, beaucoup de ressemblance avec le *juncus pilosus*. Ses tiges sont droites, glabres, triangulaires, un peu comprimées, striées, soibles, sans feuilles à leur partie supérieure (je ne connois pas la partie inférieure), terminées à leur sommet par une panicule presque en ombelle, dont les rayons très-inégaux supportent des ombelles partielles. L'involucre universel est composé de deux folioles inégales, plus courtes que l'ombelle, linéaires, subulés; la plus petite bien plus courte, quelquefois nulle; les involucre partielles fort petits, à deux folioles opposées, inégales, aiguës. Les épillets sont comprimés, petits, agrégés, sessiles ou légèrement pédonculés; les écailles calicinales d'un brun-rougeâtre, ovales, aiguës à leur sommet, dont la pointe, en s'écartant, fait paroître les épillets dentés à leurs côtés opposés.

Cette plante croît probablement dans les Indes. Elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Sonnerat. (V. f. in herb. Lam.)

115. SOUCHET flabelliforme. *Cyperus flabelliformis*, Rottboll.

Cyperus culmo triquetro, foliis in summo culmo confertis; umbellis axillaribus, decompositis; spiculis ovatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 189. n°. 74.

Cyperus (flabelliformis), *culmo sulcato, triquetro; involucri alternis; pedunculis axillaribus, foliatis; terminalibus umbellatis, corymbiferis*. Rottb. Gram. pag. 42. tab. 12. fig. 2.

Cyperus (flabelliformis), *culmo triquetro, nudo; involucri maximo, polyphylo; foliis alternis; pedunculis corymbiferis, axillaribus*. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 147. n°. 731.

Cette espèce a de si grands rapports avec le *cyperus alternifolius*, qu'il est même douteux que ce ne soit pas la même espèce. M. Lamarck a regardé ces deux plantes comme identiques; elles offrent néanmoins quelques différences qui pourroient, si elles étoient constantes, empêcher de les confondre.

Celle-ci a des tiges plus épaisses, tortues, profondément cannelées, striées, à trois angles, glabres, nues, n'ayant, comme l'autre, que des feuilles terminales, alternes, très-rapprochées, qui forment la colletette: elles font au nombre de vingt à vingt-cinq, planes, ensiformes, très-longues, ayant environ un pied, aiguës, de la base de laquelle sortent des pédoncules foliaires, qui supportent des corymbes ombellés, comme des épillets petits, ovales, un peu aigus, mais approchant bien moins de la figure linéaire que ceux du *cyperus alternifolius*.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. ✕

116. SOUCHET à feuilles alternes. *Cyperus alternifolius*. Linn.

Cyperus culmo triquetris; foliis in summo culmo confertis; umbellulis axillaribus, compositis; spiculis linearibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 189. n.º 75.

Cyperus (alternifolius), culmo triquetris, nudo, apice alternatim folioso; pedunculis lateralibus, prolixis. Linn. Mann. pag. 28. — Jacq. Icon Rat. 2. tab. 298. — Idem, Colect. 2. pag. 306.

Ses tiges sont hautes d'environ un pied, nues, un peu triangulaires, clabres, striées, de couleur glauque, feuillées seulement à leur partie supérieure. Ces feuilles sont très-approchées, alternes, très-fines, nerveuses, ensiformes, larges, aiguës, inégales, longues d'un demi-pied & même d'un pied, formant presque un grand involucre, un peu rudes sur leurs bords, seules ou presque sans gaine.

De l'aisselle de chacune de ces feuilles sort un pédoncule filiforme, trois & quatre fois plus court que ces feuilles, accompagné d'une bractée subulée, soutenant à son sommet une ombelle ou plutôt un petit corymbe ramé, composé d'épillets assez petits, linéaires, formés d'écaillés petites, imbriquées, peu nombreuses, d'un jaune-clair.

Cette plante croît dans les Indes & à l'île de Madagascar. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

117. SOUCHET médicinal. *Cyperus melicoides*.

Cyperus caule tereti, folioso; panicula elongata, coarctata; spiculis parvis, acutis; glumis mucronatis. (N.)

Cette plante n'appartient que faiblement à ce genre, comme on le verra par le détail des parties de la fructification, extrait d'une note qui m'a été communiquée par M. du Petit-Thouars.

Elle a par sa panicule le port du *melica caules*. Ses racines sont composées de chevelus qui adhèrent fortement à la terre. Ses tiges sont cylindriques, très-fermes, élançées, hautes de deux à trois pieds; les feuilles radicales étroites; les caulinaires roides, planes, assez larges, rudes à leurs bords, très-aiguës. Les fleurs sont disposées en une panicule droite, allongée, très-fermée, filiforme, longue d'environ un pied, dont les rameaux principaux forment de l'aisselle des feuilles supérieures plusieurs ensemble, appliqués à une des faces de la tige creusée en gouttière. Ces rameaux sont très-comprimés, à deux angles tranchants; leurs divisions nombreuses, très-fermées. Les épillets sont petits, à peine comprimés, axillaires & terminaux, pédonculés, roussâtres, ovales, aigus, paniciformes, composés de deux écaillés extérieures, brunes, scarieuses, rennées par une pointe

Botanique, Tome VII.

droite, aussi longue qu'elles; les écaillés calicinales de même forme, imbriquées sur deux rangs, un peu plus longues. Elles renferment six filaments stériles, velus; trois fertiles, à peine plus longs que les écaillés; un ovaire trigone; un style égal en longueur aux étamines, trifide à son sommet; une semence jaunâtre, lisse, à trois faces.

Cette plante a été observée, par M. du Petit-Thouars, dans les bois humides & élevés sur les îles de France & de Bourbon. (V. f. in herb. P. T.)

* Espèces incertaines ou peu connues.

* *Cyperus* (marginatus), culmo tereti, aphyllis; umbellulis compositis; spiculis oblongis, brunneis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* *Cyperus* (texilis), culmo tereti; umbellulis decompositis; involucri dodracaphyllo, levi, breviori; spiculis oblongis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* *Cyperus* (xyphiaceus), culmo tereti, nudo, apice spiculis multis, compositis; involucri maxima foliis recurvis. Gloxin. Observ. Botan. pag. 20. tab. 3.

* *Cyperus* (pulcher), culmo trigono; umbellulis decompositis, involucri subhexaphyllo, breviori; spiculis ovatis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* *Cyperus* (lanceus), culmo trigono, folioso; umbellulis decompositis, involucri dupli breviori, spiculis oblongis. Thunb. Prodr. pag. 18.

* *Cyperus* (gradatus), culmo subangulato, ad basin foliato; bracteis ad apicem paniculis dupli longioribus, spiritaliter remotis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 13. n.º 59.

* *Cyperus* (scopellatus), culmo triquetris; umbellulis subhexaphyllis; radiis alternis, confertis, ramosis, fasciculatis, aphyllis; spiculis linearibus, calatis. Vahl, Egl. 2. — Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Paris. 1. pag. 106. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 62. n.º 43.

* *Cyperus* (niger), culmo triquetris, nudo, glabro; foliis ensiformibus, umbellulis foliosis, pedunculatis plurimis, longis; spiculis laxis, nigricantibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 64. n.º 79.

SOUCHETS. *Cyperoides*. Famille de plantes monocotylédones ou à un seul lobe, ainsi nommée à cause du genre *souchet* (*Cyperus*) qu'elle renferme. Cette famille paroît, au premier aspect, n'être qu'un démembrement de celle des graminées, avec laquelle, il est vrai, elle a de très-grands rapports, mais il est très-facile d'en saisir les différences.

Les *souchets* n'ont point ces balles qui constituent le calice & la corolle, ou plutôt la double enveloppe des fleurs dans les graminées. Leur

M m

calice n'est composé que d'une seule écaille pour chaque fleur, dont quelquefois plusieurs sont stériles, & dans ce cas le calice semble composé de plusieurs paillettes ou écailles. Il y a trois étamines insérées sous le pistil; un ovaire supérieur; un seul style; trois, rarement deux stigmates; une seule semence nue ou nuaquée, environnée dans quelques espèces de duvet ou de poils à la base; l'embryon & la germination de même que dans les graminées.

Les fleurs sont réunies en épis, ou par fascicules, ou agglomérées en tête, &c.; elles sont, ou hermaphrodites, ou monoïques, très-rarement dioïques. Les tiges ou chaumes sont cylindriques ou triangulaires, la plupart sans articulations. Les feuilles radicales & culinaires embrassent les tiges par une gaine entière, & non fendue comme celle des graminées. Les feuilles qui accompagnent les fleurs, soit comme bractées ou comme involucre, sont privées de gaine.

Les principaux genres de cette famille sont les suivants :

I. Fleurs monoïques.

Les lichas..... *Carex*.

II. Fleurs hermaphrodites.

Les fuirènes..... *Fairna*.
Les choins..... *Schœnus*.
Les linaigrettes..... *Eriophorum*.
Les scirpes..... *Scirpus*.
Les trycocephales..... *Trycocephalum*.
Les killings..... *Killingia*.
Les chrysites..... *Chrysis*.
Les imapanes..... *Mugania*.

SOUCI. *Calendula*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *osteospermum*, & qui comprend des herb., rarement des arbuscules, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont entières, les fleurs très-ordinairement solitaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à folioles lancéolées, égales; des fleurs nodées; les fleurons du centre stériles; ceux qui les environnent hermaphrodites; les demi-fleurons femelles; les semences de plusieurs formes dans le même individu, point aigrettes; le réceptacle nu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont radiées; elles offrent :

1°. Un calice composé de plusieurs folioles pres-que toutes égales, lancéolées, presque disposées sur deux rangs.

2°. Une corolle radiée, composée de fleurons mâles dans le centre, d'autres fleurons hermaphrodites qui les environnent; de demi-fleurons femelles à la circonférence.

Les fleurons sont tubulés, de la longueur du calice, divisés en cinq dents à leur limbe; les uns centraux, mâles & stériles; les autres, plus extérieurement, hermaphrodites & fertiles.

Les demi-fleurons sont femelles, fertiles, situés à la circonférence, très-longs, étalés, ordinairement en un nombre que les folioles du calice, triplés à leur sommet, souvent velus à leur base.

3°. Cinq étonnes syngénèses, dont les filaments sont capillaires, très-courts; les anthères réunies en un tube cylindrique, de la longueur des fleurons.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étonnes, surmonté d'un stigmate à deux découpures oblongues, acuminées, réfléchies.

Les semences solitaires, très-ordinairement celles de la circonférence comprimées, membraneuses, en cœur; celles du centre oblongues, étroites, arquées, presque triangulaires, souvent membraneuses à leurs angles, lisses ou tuberculées sur leur dos, dépourvues d'aigrettes.

Le réceptacle est plane, nu.

Observations. En ne considérant que le port extérieur de la plupart des espèces qui composent ce genre, & qui nous sont venues du Cap de Bonne-Espérance, on y trouveroit peu de différences avec les *arctotis*, mais les parties de la fructification ne permettraient jamais de les confondre. Sous ce dernier rapport les soucis sont plus rapprochés des *osteospermum*, dont les semences sont bordées & globuleuses, presque ossifères.

Il existe une nuance très-remarquable entre les soucis d'Europe & ceux du Cap de Bonne-Espérance, qui pourroit presque servir à les diviser en deux genres. Dans les premiers, la corolle est jaune, & les semences de la circonférence courbées ou arc, souvent différentes de celles du centre. Dans les seconds, la corolle est assez généralement de deux couleurs au demi-fleuron, d'un beau blanc de lait en dessus, d'un pourpre-violet plus ou moins foncé en dessous. Les semences sont planes, membraneuses, en cœur, rarement de deux formes. Cette distinction, inévidente à remarquer, ne peut cependant autoriser à diviser un genre aussi naturel.

M. Ventenat a remarqué que toutes les espèces de *calendula* qu'il avoit eu occasion d'observer, avoient leurs feuilles parsemées de points transpa-

rens, & que les poils étoient articulés. J'ai vérifié cette observation, qui m'a également paru applicable à toutes les espèces que j'ai vues.

E S P È C E S.

1. SOUCI des champs. *Calendula arvensis*. Linn.

Calendula feminibus cymbiformibus, muricatis, incurvatis; exterioribus lanceolato-juvulatis, dorso muricatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 2339. n°. 1.

Calendula feminibus cymbiformibus, muricatis, incurvatis; extimis erectis, prostratis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1303. — Flor. luéc. 711. 777. — Mill. Dict. n°. 1. — Gzertn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 421. tab. 168. fig. 4. — Pollich. Pal. n°. 829. — Hoffm. Germ. 308. — Roth. Germ. vol. I. pag. 372. — vol. II. pag. 368. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 123. n°. 109. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 245. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 303. — Bulliard, Herb. franç. tab. 239.

Calendula foliis lanceolatis, amplexicaulis, dentatis; floribus concoloribus. Hall. Helv. n°. 94.

Caltha arvensis. C. Bauh. Pin. 275. — Tourn. Inst. R. Herb. 499. — Morif. Oxon. Hist. 3. p. 14. §. 6. tab. 4. fig. 6. — Vaillant, Aél. acad. Paris. 1720. pag. 289. — Mœnch. Method. 385.

Caltha officinalis. Scop. Carn. edit. 2. n°. 1040.

Calendula arvensis. Tabern. Icon. 335. — Gerard, Huit. 603. Icon.

Caltha minima. J. Bauh. Hist. 3. pag. 103. Icon.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un pied; elles sont grêles, striées, cylindriques, un peu rudet, rameuses, souvent chargées de quelques poils rares, garnies de feuilles sessiles, ovaires, ovales-oblongues ou lancéolées, quelquefois légèrement sinuées & munies de quelques petites dents rares, tendres, vertes, glabres à leurs deux faces, amplexicaules à leur base, aiguës ou un peu obtusés à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires, terminales, d'une grandeur médiocre, de couleur jaune; les folioles du calice glabres, vertes, lancéolées, aiguës, disposées sur deux rangs; les fleurons du centre fertiles; les femences du milieu fortement arquées, creusées en nacelle d'un côté, hérissées d'alpérètes sur leur dos, & renfermées dans des espèces de capsules membraneuses & convexes; les femences de la circonférence plus allongées, & souvent prolongées en une pointe filide.

Cette plante varie selon ses âges. Souvent ses tiges n'ont pas plus de deux ou trois pouces; elles ne sont pas même encore rameuses, que déjà elles produisent des fleurs; les feuilles & une partie de la plante font alors un peu pubescentes, mais elles se développent ensuite davantage, tellement

qu'on seroit tenté de regarder ces deux états de la même plante comme deux espèces.

Cette espèce croît dans les champs, parmi les vignes, en Europe & dans la Barbarie. ○ (V. v.)

Cette plante, employée autrefois, l'est beaucoup moins aujourd'hui; elle est un peu amère, légèrement acide. Elle passe pour résolutive, antiscorbutique, dépurative. Son suc & son infusion dans le vinaigre ont été recommandés contre la jaunisse, le scorbut, & surtout contre les écrouelles, auxquelles on applique le marc de la plante après en avoir exprimé le jus. Il est des pays où l'on mange les fleurs infusées dans le vinaigre avant leur développement. Le suc des fleurs donne, avec l'alun, une teinture jaune. Ces fleurs servent, dans quelques pays, à colorer le beurre. La plupart des bestiaux, excepté les cochons, mangent cette plante.

2. SOUCI des jardins. *Calendula officinalis*. Linn.

Calendula feminibus cymbiformibus, muricatis, incurvatis omnibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1304. — Mater. medic. 193. — Mill. Dict. n°. 3. — Gzertn. de Fruct. & Sem. vol. 2. p. 422. tab. 168. fig. 4. — Scholl. Barb. n°. 718. — Matusch. Sil. n°. 646. — Ludw. Fct. tab. 79. — Blaw. tab. 106. — Kniph. Cent. 6. n°. 18. Cent. 11. n°. 19. — Knorr. Del. 1. tab. R. 21. — Mill. Illustr. Icon. — Hoffm. Germ. 308. — Roth. Germ. vol. I. pag. 373. — vol. 2. pag. 369. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 245. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2340. n°. 4.

Calendula feminibus radii cymbiformibus, erectis, bicornibus. Hort. Cliff. 425. — Hort. Ups. 274. — Roy. Lugd. Bat. 77. — Dalib. Paris. 168. — Gerard, Flor. gall. Prov. 209.

Caltha officinalis. Mœnch. Method. 385.

Caltha vulgaris. C. Bauh. Pin. 275. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 13. §. 6. tab. 4. fig. 1.

Caltha vulgaris, flore pallido-citrino-rufa. Tourn. Inst. R. Herb. 498.

Caltha flore simplici. J. Bauh. Hist. 3. pag. 101. Icon.

Calendula. Dod. Pempt. 254. Icon.

3. *Caltha polyanthos major-maxima, flore aureo, flore melino*. C. Bauh. Pinn. 275. — Tourn. Inst. R. Herb. 498. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 6. tab. 4. fig. 2.

Caltha flore pleno. J. Bauh. Hist. 3. pag. 101. Icon. — Tabern. Icon. 332.

7. *Caltha floribus reflexis*. C. Bauh. Pin. 275. — Tourn. Inst. R. Herb. 498. — Morif. Hist. 3. §. 6. tab. 4. fig. 4.

Calendula multiflora, orbiculata. Tabern. Icon. 333. — Gerard, Icon.

♂. *Caltha prolifera, minoribus, majoribus floribus.* C. Bauh. Pin. 176. — Tourn. Inst. R. Herb. 498. — Murif. Hist. 3. §. 6. tab. 4. fig. 5.

Caltha prolifera. J. Bauh. Hist. 3. pag. 102. Icon. — Tabern. Icon. 334-335.

Plusieurs auteurs ont regardé cette espèce, que l'on cultive dans tous les jardins, & qui croît naturellement dans nos départemens méridionaux, comme une simple variété du souci des champs. Quoiqu'elle lui ressemble beaucoup, elle a cependant, même dans la plante inculée, des caractères qui l'en distinguent. Elle est beaucoup plus grande dans toutes les parties : ses tiges sont plus fortes, plus rameuses ; ses feuilles inférieures sont rétrécies à leur base en forme de spatule, & les fleurs plus nombreuses, plus grandes, & généralement d'un jaune plus foncé. Les semences du centre sont courbées en arc, hérissées d'aspérités sur leur dos ; celles de la circonférence élargies, creusées en forme de nacelle, obtuses à leur sommet, rudes sur leur carène dorsale.

Elle produit, dans les jardins, plusieurs variétés remarquables par la couleur plus ou moins foncée des fleurs, par leur grandeur, par les demi-fleurons de la circonférence fortement recourbés en dehors, enfin par une prolifération abondante.

Cette plante croît naturellement dans les départemens méridionaux de la France, aux environs de Montpellier, sur les côtes de Barvarie, &c. (K. v.)

3. *Souci de la Palestine. Calendula sancta.* Linn.

Calendula seminis arceolatis, obovatis, levibus ; calicis subnatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1304. — Mill. Dict. 2.º. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1340. n.º. 3.

Caltha media, folio longo, cinereo ; flore pallido. Bobart.

Ce souci, très-voisin de celui des champs, est parfaitement élabré, sans aucune aspérité. Ses tiges sont droites, striées, rameuses, cylindriques, très-lisses, garnies de feuilles alternes, sessiles, lancéolées, amplexicaules, larges, obtuses, nulles à leurs bords. Les fleurs sont supportées par des pédoncules simples, feuillés, uniflores, à l'extrémité des rameaux. Le calice est composé de plusieurs folioles presque égales, hérissées sur leur dos. La corolle est d'un grand ou médiocre, d'un jaune pâle. Les femences sont ventrues, repliées sur elles-mêmes en forme de pot, lisses à l'extérieur, les semences extérieures dépourvues d'aspérités.

Cette plante se trouve dans la Palestine. ○

4. *Souci étoilé. Calendula stellata.* Cavan.

Calendula caule aspero, foliis spatulato-lanceolatis ; seminis cymbiformibus, quinque alternis ; exterioribus cornutis, longioribus ; flore sulphureo. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 304.

Calendula seminis quinque exterioribus cymbiformibus, glabris ; quinque alternis, cornutis, punctatis, muricatis ; reliquis cochleatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 3. n.º. 5. tab. 5.

Calendula seminis cymbiformibus, incurvatis, muricatis ; exterioribus quinque ovato-lanceolatis, margine membranaceis, dentatis, dorso muricatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1340. n.º. 2.

♂. *Eadem, floribus duplè majoribus.* Desfont.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le souci des jardins ; elle s'en distingue par la forme de ses semences, surtout par celles de la circonférence, bien plus grandes & de deux fortes ; par ses fleurs plus petites, & par ses feuilles ordinairement plus étroites ou plus allongées.

Ses tiges sont droites, un peu couchées à leur base, hautes d'environ deux pieds, rudes, velues, striées, rameuses, dures, cylindriques, garnies de feuilles alternes, sessiles, un peu rudes, pubescentes surtout dans leur jeunesse, légèrement ciliées, oblongues, lancéolées, rétrécies à leur base en spatule, surtout les inférieures, sinuées ou légèrement dentées à leur contour, obtuses à leur sommet ; les feuilles supérieures étroites, lancéolées, souvent un peu aiguës.

Les fleurs sont terminales, solitaires, assez nombreuses, supportées par de longs pédoncules simples, feuillés, grêles, striés, très-rudes. Le calice est pubescent, chargé d'aspérités, composé de plusieurs folioles presque toutes égales, disposées sur dix rangs, étroites, lancéolées, subulées, une fois plus courtes que la corolle. Celle-ci est d'un jaune-pâle, un peu plus petite que celle du souci des jardins. Les demi-fleurons sont étroits, linéaires, à trois ou quatre dents. Les semences sont roussâtres, de deux fortes ; celles du centre étroites, fortement arquées, presque en coquille de limçon, hérissées de pointes sur leur carène ; celles de la circonférence au nombre de dix, cinq extérieures & alternes ovales, lancéolées, assez larges, membranées, échancrées, presque lobées ou denticulées sur les bords de leur membrane, un peu courbées en nacelle, hérissées sur le dos, ouvertes en écaille ; les cinq autres fortement recourbées en dedans, tant à leurs bords qu'à leur sommet, de forme viculaire. Ces formes font sujettes à quelques variations.

Il existe une variété de cette plante à fleurs une fois plus grandes, & dont les demi-fleurons sont d'un jaune plus foncé, de couleur de safran. M. Desfontaines l'a observée dans le mont Atlas.

Cette espèce croît dans les campagnes, sur les côtes de Barbarie. Je l'ai recueillie dans les environs de Lacalle & du bassin de France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (V. v.)

5. SOUCI de Sicile. *Calendula sicula*.

Calendula foliis ovato-lanceolatis, integris; seminibus vesiculosis, duris mucatis; caule ramosissimo. (N.)

Malgré les rapports que cette espèce parait avoir avec le *calendula stellata*, elle en est très-distincte par ses feuilles & par la forme de ses semences.

Ses tiges sont fistuleuses, verdâtres, anguleuses, striées, un peu rudes, divisées en rameaux nombreux, diffus, élancés, grêles, très-négatifs, garnis de feuilles alternes, sessiles, lancéolées ou ovales-lancéolées, presque membraneuses, un peu rudes, très-entières, hérissées à leurs bords de petites aspérités; obtuses ou un peu aiguës, & terminées à leur sommet d'une très-petite pointe spinuliforme; à demi-amplexicaules, longues de deux à trois pouces, larges au plus d'un pouce.

Ses fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité de pédoncules plus ou moins allongés, grêles, cylindriques, scabres. Le calice est composé de plusieurs folioles disposées sur deux rangs, inégales, étroites, lancéolées, acuminées, pubescentes. La corolle est d'un jaune de soufre, lorsqu'elle est plus grande que le calice. Les semences sont grosses, concaves, renflées, vésiculeuses, un peu courbées, hérissées sur leur carène de fortes pointes, longues, aiguës, en crête de coq. Les intérieures, également vésiculeuses, sont seulement tuberculeuses sur leur carène.

Cette plante a été cultivée par M. Brayer de Soissons: il en avait reçu les graines du Jardin de Gand, sous le nom de *calendula sicula*; ce qui me fait soupçonner qu'elle est originaire de la Sicile. ☉ (V. v.)

6. SOUCI cornu. *Calendula cornuta*.

Calendula foliis lanceolatis, serrato-sulcatis; seminibus exterioribus longe cornatis, caulis asperis. (N.)

La forme singulière des semences extérieures de cette plante, prolongées en une sorte de corne, la tend facile à distinguer. D'ailleurs, elle se rapproche beaucoup du *calendula stellata*.

Ses tiges sont droites, herbacées, tendres, striées, rudes au toucher, rameuses; les rameaux diffus, alternes, garnis de feuilles alternes, sessiles, lancéolées; les intérieures légèrement sinuées, rudes à leurs bords, élargies, obtuses; les supérieures plus étroites, aiguës, entières, hérissées

à leur contour de petites dents nombreuses, pinquantes.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de pédoncules simples, qui ne sont que le prolongement des rameaux. Le calice est composé de plusieurs folioles lancéolées, acuminées, inégales. La corolle est d'un jaune pâle, à peu près de la grandeur de celle du *calendula stellata*; les semences extérieures larges, environnées d'une membrane dentée en crête à son contour, prolongée à son sommet en un appendice en forme de corne, courbée ou droit, d'un pouce & plus de longueur; les semences intérieures renflées en bourse, courbées, chargées sur leur carène, les unes de tubercules, d'autres d'aiguillons courts, inégaux.

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris en 1792. J'ignore son lieu natal. (V. f. in herb. Juss.)

7. SOUCI à feuilles blanchâtres. *Calendula incana*. Willden.

Calendula seminibus cymiformibus, levibus; exterioribus subulatis, credis, submucatis; foliis oblongo-spathulatis, utrinque tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1341. n° 6.

Calendula (tomentosa), caule folisque tomentosis, sessilibus, incanis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 305. tab. 245.

Calcha maritima, lufitanica, lanuginosa. Tourn. Infl. R. Herb. 499. — Vaill. Aët. Acad. Paris, ann. 1720. pag. 189.

Cette espèce est remarquable par le duvet tomenteux & blanchâtre qui revêt toutes ses parties. Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied & demi, cylindriques, striées, tomenteuses, divisées en rameaux étalés, alternes, garnis de feuilles alternes, presque sessiles ou decurrentes sur leur pétiole, lancéolées ou presque ovales, obtuses à leur sommet, sinuées ou lâchement denticulées à leurs bords, rétrécies à leur base.

Les fleurs sont supportées, à l'extrémité des rameaux, sur des pédoncules inégaux, simples, uniflores, feuillés à leur partie inférieure. Le calice est composé de folioles inégales, disposées sur deux rangs, lancéolées, subulées, pubescentes. La corolle est de moitié plus petite que celle du tout des jarbins; les demi-fleurs ont d'un jaune doré. Les semences intérieures ou des fleurs sont courtes, en forme de nacelle, oblongues, membranées à leurs côtés, striées, mais sans aspérités sur leur dos, divisées en dessous presque à deux lons, avec une cloison faillante; celles des demi-fleurs ou de la circonférence plus longues que les intérieures, arquées, subulées, légèrement hérissées.

Cette plante croît au royaume de Maroc, où

elle a été recueillie par M. Broussonet. (*Descript. ex Desfont.*)

8. Souci soufigneux. *Calendula suffruticosa*. Vahl.

Calendula feminibus cymbiformibus, muricatis, incurvis, exterioribus lanceolato-subulatis, foliis saepe scabris. Vahl, Synbol. 2. pag. 94.

Calendula feminibus cymbiformibus, incurvatis, muricatis, exterioribus lanceolato-subulatis, muricatis, erectis; foliis lanceolatis, subnatis-denticatis, scabris; caule suffruticosa. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2341. n°. 5.

Il y a beaucoup de rapport entre cette plante & le souci étoilé : elle paroît presque tenir le milieu entre ce dernier & le souci des champs ; mais les tiges sont très-dures, presque ligneuses, & toutes les parties de la plante très-rudes. Ses rameaux sont alternes, longs de six à sept pouces, redressés, ascendans, munis de feuilles alternes, lancéolées, rétrécies à leur base, rudes, particulièrement à leur face inférieure ; les inférieures légèrement sinuées & dentées à leurs bords ; les supérieures lisses à leurs deux faces, bidentées de chaque côté. Les fleurs sont assez semblables à celles du *calendula arvensis*. Les semences sont fortement courbées, creusées en forme de nacelle, hémisphériques sur leur carène ; les extérieures droites, lancéolées, subulées, chargées d'aspérités.

Cette plante croît dans le royaume de Tunis, aux environs de Porto Farina. h

Observations. Je suis porté à regarder cette espèce comme une variété du souci étoilé, si j'en juge d'après des individus que j'ai recueillis dans le même pays, qui conviennent assez bien à la plante de M. Vahl, mais qui ont la corolle une fois plus grande que celle du souci des champs, dont les feuillets sont plus ou moins rudes, & qui varient dans leurs sinuosités & leurs dentelures.

9. Souci à rameaux tombans. *Calendula flaccida*. Ventenat.

Calendula caule suffruticosa, foliis linearilanceolatis, integerrimis, trinerviis, ciliatis; radio concoloris, feminibus obcordatis. Vent. Jard. Malm. pag. 25. tab. 20.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *calendula tragus*, dont elle diffère presque uniquement par la couleur des demi-fleurs d'un beau rouge-orangé, la seule espèce d'Afrique (avec le *calendula chrysanthemifolia* & l'*arborescens*) connue jusqu'ici, dont les demi-fleurs soient entièrement de couleur jaune.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu ligneuses à leur partie inférieure, divisées en rameaux alternes, rapprochés, herbacés, faibles,

tombans, légèrement pubescens vers leur sommet, garnis de feuilles alternes, sessiles, linéaires, lancéolées, très-entières, ciliées, marquées de trois nervures ; les inférieures rapprochées, recourbées à leur sommet, obtuses ; les supérieures distantes, droites, aiguës, insensiblement plus courtes.

Les fleurs sont supportées par des pédoncules simples, droits, cylindriques, striés, pubescens, uniflores. Leur calice est simple, composé de plusieurs folioles presque égales, peu ouvertes, lancéolées, aiguës, membraneuses à leurs bords, parsemées à leur face extérieure de quelques poils articulés. La corolle est de la grandeur de celle de l'*asfer chinensis*, d'un rouge-orangé à sa circonférence, d'un pourpre-foncé dans le disque, répandant une odeur peu agréable, s'ouvrant vers les sept heures du matin, & se fermant le soir vers les quatre heures. Les fleurs du disque sont hermaphrodites ; ceux du centre mâles ; les demi-fleurs renferment trois ou quatre étamines libres, avortées. Les fruits sont penchés, presque globuleux, légèrement déprimés, entourés par le calice subsistant ; les semences ovales, en cœur, planes, comprimées, membraneuses, de couleur brune ; le réceptacle nu, convexe, creusé de fossettes dans lesquelles s'insèrent les semences.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance ; elle se cultive à la Malmaison, passe l'hiver dans l'orangerie, & fleurit au commencement du printemps. h (*Descript. ex Vent.*)

10. Souci à feuilles de chrysanthème. *Calendula chrysanthemifolia*. Vent.

Calendula foliis obovatis sublyratis, scabrisculis; caule suffruticosa, erecta. Vent. Jard. de la Malm. pag. 36. tab. 36.

Cette espèce, d'après les observations de M. Ventenat, se distingue des autres espèces du Cap de Bonne-Espérance, principalement par ses feuilles presque en lyre ; elle semble tenir le milieu entre les *aspospermum* & le *calendula* ; elle appartient au premier par ses fleurs, dont les demi-fleurs sont femelles, fertiles, & dont tous les fleurs sont hermaphrodites & stériles ; mais son fruit la place parmi les *calendula*.

Ses tiges sont fortes, droites, épaisses, ligneuses, légèrement striées, rudes au toucher, munies de rameaux axillaires, alternes, glauques, cylindriques, d'abord droits, ensuite penchés à mesure que les fleurs se développent. Ils ont garnis de feuilles alternes, pétioles, réfléchies, ovales, renversées, profondément sinuées, presque en forme de lyre, planes, ciliées, rudes, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, rétrécies en pétiole à leur base.

Les fleurs sont radiées, deux fois plus grandes que celles de l'*asfer chinensis*, d'un jaune-doré,

s'épanouissant vers les onze heures du matin, & se fermant vers les trois ou quatre heures du soir, fournies par des pédoncules solitaires, un peu courbés, pubescens, finement striés, uniflores. Leur calice est hémisphérique, pubescent, composé de plusieurs folioles peu ouvertes, lancéolées, aiguës, relevées d'une nervure saillante, membraneuses sur leurs bords, disposées sur un seul rang. Les demi-flurons sont en forme de languette, très-ouverts, à trois dents, amincis, & roulés à leur base en un tube court, parfumé de pois articulés; les flurons très-nombreux, en entonnoir, pubescens, à cinq dents ovales, aiguës. Les semences sont brunes; celles de la circonférence en cœur renversé, fertiles, bordées d'une large membrane; celles du disque & du centre en forme de coin, comprimées, stériles, bordées d'une membrane courte.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance; elle se cultive au Jardin de la Malmaison & dans celui de M. Cels. *h* (Descript. ex Venc.)

11. Souci en arbre. *Calendula arborescens*. Jacq.

Calendula foliis oblongis, dentatis, scabris; calicibus frutiferis cernuis; seminibus suborbiculatis; caule fruticoso, paniculato. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 234. n°. 23.

Calendula (arborescens), foliis lanceolatis, serrato-dentatis, scabris; caule arborescente, ramis de-jectis. Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 596. — Idem, Collect. vol. 3. pag. 167.

Calendula (rizida), foliis ellipticis, dentatis, scabrisculis; seminibus albis semiorbiculatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 271.

Calendula (aspera), foliis scabris, inferioribus obovatis, dentatis, superioribus lanceolatis; caule frutescente, paniculato. Thunb. Prodr. pag. 164.

C'est un arbruste dont les tiges sont ligneuses, cylindriques, rudes au toucher, divisées en rameaux alternes, presque panicules, alongés, rombans, garnis de feuilles alternes, lancéolées, oblongues, presque elliptiques; les inférieures ovales-oblongues, un peu sinuées, dentées à leur contour, rudes au toucher. Les fleurs sont solitaires, supportées par des pédoncules simples, droits avant & pendant la floraison, recourbés à l'époque de la maturité des fruits. La corolle est jaune; les semences presque orbiculaires, membraneuses à leurs bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

12. Souci des pluies. *Calendula pluvialis*. Linn.

Calendula foliis lanceolatis, sinuato-denticulatis; caule folioso, pedunculis filiformibus. Linn. Spec.

Plant. vol. 2. pag. 1304. — Hort. Upfal. 274. — Thunb. Prodr. pag. 164.

Calendula foliis angusto-lanceolatis, sinuato-denticulatis; caule folioso, pedunculis filiformibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 234. n°. 7.

Calendula (scabra), foliis linearibus, acutis, denticulatis; caule folioso, pedunculis cylindricis, calicibus ciliatis. Berg. Plant. Cap. pag. 310.

Calendula foliis densatis. Roy. Log. Bat. 177. — Mill. Diét. n°. 4. Icon. tab. 75. fig. 2.

Calendula feminibus radii obsoletis serratis, disci cordatis. Hort. Cliff. 435.

Calendula humilis; africana; flore intus albo, foris violaceo, simpliciter. Hieron. Lugd. Bat. 104. tab. 185. — Brevyn. Icon. 26. tab. 14. fig. 1. — Stiff. Botan. 59. tab. 59.

Coltsa africana, flore intus albo, extus ferruginea. Morif. Oxon. Hist. 1. pag. 14. §. 6. tab. 3. fig. 8. — Tourn. Inst. R. Herb. 499.

C'est une plante très-agréable par la grandeur & la couleur de ses fleurs, d'un blanc de neige en dessus, & d'un violet-foncé, un peu verdâtre en dessous, qu'on cultive aujourd'hui comme une plante d'ornement dans plusieurs jardins, & qui a la propriété de se fermer toutes les fois que le temps se dispose à la pluie; elle ne s'ouvre d'ailleurs que lorsqu'elle est éclairée par le soleil, & se ferme lorsqu'il commence à se retirer vers l'horizon.

Ses racines sont blanchâtres & fibreuses; ses tiges un peu couchées, médiocrement redressées, à peine hautes d'un pied; ses rameaux longs, alternes, glabres, diffus, garnis de feuilles alternes, sessiles, alongées, lancéolées, un peu étroites, succulentes, d'un vert-pâle, presque glabres à leurs deux faces, n'ayant que quelques poils rares, épars; échancrées, denticulées à leurs bords, obtuses à leur sommet; les feuilles supérieures beaucoup plus étroites.

Les fleurs sont solitaires, assez nombreuses, soutenues par des pédoncules inégaux, grêles, élancés, feuillés. Le calice est composé de folioles presque égales, droites, lancéolées, très-aiguës, légèrement velues, blanches & membraneuses à leurs bords. La corolle est aussi grande que celle du souci des jardins; ses demi-flurons bien moins nombreux, étroits, presque linéaires, obtus, à peine bilobés à leur sommet, d'un beau blanc en dessus, d'un violet-clair en dessous; les flurons du centre d'un pourpre-foncé. Le pédoncule s'affaiblit & se courbe pendant la maturation des semences; il se redresse lorsqu'elles sont mûres. Celles-ci (les extérieures) sont ovales, en cœur, point membraneuses, coriaces, d'un roux-clair, presque planes, avec un rebord épais, très-gl-

bres ; celles de l'intérieur plus courtes, droites, coniques, obtuses, presque anguleuses, tuberculées par des rides transversales ; quelques paillettes minces, linéaires, droites entre les semences de la circonférence.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance : on la cultive dans les jardins. ○ (V. v.)

13. Souci hybride. *Calendula hybrida*. Linn.

Calendula foliis albis glaucolatis, obtusis, dentatis ; caule foliis, pedunculis superne incrassatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1344. n° 8.

Calendula foliis lanceolatis, dentatis ; caule foliis, pedunculis superne incrassatis. Linn. Hort. Upsl. 274. — Mill. Dict. n° 6. Icon. tab. 75. fig. 2. — Thunb. Prodr. 164. — Sauvag. 304. — Gouan, Hort. Monip. 463.

Calendula foliis radicalibus sinuatis, caulinis superne denticulatis. Royen, Lugd. Bat. 177.

Caltha africana, flore intus albo, foris violaceo ; semine majore, oblonga. Brey. Icon. 26. tab. 14. fig. 2.

Cadiaspermum africanum, pubescens ; foliis incisissimis, pinnatifidis. Tiant. Ad. Parisi. 1724. pag. 39. tab. 2.

Ce souci paroît tenir le milieu entre le *calendula pluvialis* & le *calendula nudicaulis*. Il en diffère par ses fleurs beaucoup plus petites, & par les feuilles d'une largeur remarquable à leur partie supérieure.

Ses tiges sont droites, annuelles, rameuses, épaisses, cylindriques, pubescentes, hautes à peine d'un pied, garnies de feuilles alternes, très-longues, lancéolées ; les racines sinuées à leurs bords ; les caulinaires lancéolées, presque ovales, élargies à leur partie supérieure, obtuses, un peu charnues, dentées à leur contour, mais n'ayant plus ordinairement que trois ou quatre dents aiguës vers leur sommet.

Les fleurs sont assez nombreuses, supportées par de très-longes pédoncules droits, simples, uniflores, renflées à leur partie supérieure. La corolle est petite, d'un pourpre-violet en dessous, d'un très-beau blanc en dessus. Les semences sont grandes, oblongues, planes, à peine membraneuses, légèrement échancrées en cœur.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

14. Souci à tige nue. *Calendula nudicaulis*. Linn.

Calendula foliis lanceolatis, sinuatis dentatis ; caule folioso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1305. — Mill. Dict. n° 5. — Kniph. Centur. 2. n° 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1343. n° 14.

Calendula (nudicaulis), foliis cuneiformibus, serrato-dentatis, scabris ; caule subnudo. Bergius, Plant. Cap. pag. 312. n° 4.

Calendula foliis lanceolato-oblongis, dentatis, ciliatis ; caule herbaceo, subaphyllo. Thunb. Prodr. pag. 164.

Calendula africana, foliis scabiofa argentea viridibus. Herm. Alit. 5.

Bellis africana, forum pediculis penè aphyllis, foliis incisissimis. Commel. Hort. 2. pag. 66. tab. 35.

Caltha africana, flore intus albo, extus leviter violaceo ; semine plano, cordato. Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 125.

On distingue cette espèce à ses tiges presque nues, feuillées seulement à leur partie inférieure ; à ses feuilles spatulees, presque entières ; elle diffère du *calendula pluvialis* par ses fleurs plus petites, & dont l'extérieur est d'un pourpre bien moins foncé.

Ses tiges sont droites, peu élevées, point rameuses, un peu trifurcées à leur base, dépourvues de feuilles à leur partie supérieure, garnies à leur partie inférieure de feuilles alternes, sessiles, peu distantes, lancéolées, oblongues, très-entières, rétrécies à leur partie inférieure, un peu élargies en spatule à leur sommet, de couleur verte, un peu velues, scabres à leurs bords, ou quelquefois munies de quelques petites dents aiguës ; les feuilles supérieures rares, épaisses, linéaires, très-souvent nulles.

Les fleurs sont solitaires, supportées à l'extrémité d'un long pédoncule simple, cylindrique, strié, pubescent, rude au toucher. Le calice est composé de plusieurs folioles droites, égales, lancéolées, aiguës, un peu velues. La corolle est radiale, blanche en dedans, d'un violet-clair en dehors, d'une grandeur médiocre ; leurs fileurs divisés en cinq découpures linéaires, droites, un peu recourbées à leur sommet ; les demi-fileurs linéaires-lancéolées, à quatre nervures, obtus & tridentés à leur sommet. Les semences sont planes, orbiculaires, un peu membraneuses, à peine échancrées.

Cette espèce se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. x

15. Souci nain. *Calendula pumila*. Forst.

Calendula foliis orbiculatis, dentatis ; petiolis ciliatis ; seapo nudo, uniflora. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1344. n° 16.

Calendula seminis oblongis, incurvatis ; foliis orbiculatis, crenato-serratis, serraturis mucronatis ; seapo nudo, uniflora. Forst. Prodr. n° 305.

C'est une espèce remarquable par sa petitesse.

See

Ses tiges sont des hampes nues, filiformes, uniflores, hautes de deux à trois pouces, garnies de feuilles toutes radicales, petites, longuement dentées, presque orbiculaires, crénelées ou grossièrement dentées en scie, longues d'environ un pouce; les pétioles sont une fois plus longs que les feuilles, chargés de cils pileux, articulés.

Les tiges ne supportent qu'une seule fleur à leur extrémité, assez semblable à celle de la paquerette, mais quatre fois plus petite. Les semences sont oblongues, courbées en dedans.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, où elle a été découverte par Forster. 7

16. Souci de Magellan. *Calendula magellanica*.

Calendula foliis cuneiformibus, apice dentatis; scapo nudo, unifloro. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 2344. n°. 17.

Calendula pumila p. Forst. in Comment. Goett. 9. pag. 40.

Aster nudicoulis. Lam. Encyclop. vol. 1. pag. 308. n°. 42. & 1. illustr. Gener. tab. 681. fig. 4.

Cette plante a été déjà décrite par M. Lamarck, & rangée parmi les astères. Le caractère de ses semences, exposé par Forster, la range nécessairement parmi les soucis. Forster ne la regardoit que comme une variété du *calendula pumila*; les différences qui l'en séparent, sont trop prononcées pour permettre de réunir ces deux plantes. Ses racines sont rampantes, filonifères; les feuilles cunéiformes ou spatulées, sessiles, seulement rétrécies en pétiole non cilié, dentées à leur sommet; les dentelures très-obtuses, de trois à cinq; les hampes filiformes, quelquefois garnies d'une ou deux folioles; les fleurs solitaires, terminales, semblables à celles du *calendula pumila*, mais plus petites.

Cette plante croît au détroit de Magellan. 7 (V. f.)

17. Souci arborescent. *Calendula fruticosa* Linn.

Calendula foliis obovatis, subdentatis; caule fruticoso, decumbente. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1305. — Amoenit. Acad. vol. 5. pag. 25. — Mill. Dict. n°. 8. Icon. 189. tab. 283. — Berg. Plant. Capenf. pag. 315. n°. 5. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2346. n°. 22.

Calendula foliis obovatis, subdentatis, scabris; caule decumbente. Thunb. Prodr. pag. 164.

Calendula foliis obovatis ovatis, denticulatis; caule perenni. Roy. Lugd. Bat. 531.

Calendula africana, bellidifolio, succulento, frutescens. Fabric. Helmsl. 83.

Des rameaux souples, grêles, ligneux; des feuilles spatulées, entières, un peu rudes, mucronées.

de grandes fleurs subséminées à celles du *calendula pluvialis*, caractérisent cette espèce.

Ses tiges se divisent, presque dès leur base, en de très-longs rameaux cylindriques, diffus, tombans, qui ne s'élèvent qu'à l'aide d'un soutien, longs de trois à quatre pieds & plus, cylindriques, striés, un peu rudes, pubescens, garnis de feuilles alternes, éparées, presque sessiles, longues d'un à deux pouces, spatulées, très-obtuses, rétrécies à leur base en un pétiole plane, un peu épaissi & charnues, entières, rudes, quelquefois munies de petites dents tates, très-courtes, piquantes, arrondies & mucronées à leur sommet, ciliées, un peu velues à leur contour.

Les fleurs sont supportées par des pédoncules simples, qui terminent les rameaux, médiocrement allongés, scabres, velus, uniflores. Le calice est composé de plusieurs folioles linéaires, lancéolées, acuminées, presque égales, disposées sur un seul rang, velues sur leur dos, un peu membraneuses à leurs bords. La corolle est au moins une fois plus longue que le calice, blanche en dessus, violette en dessous; les fleurons à cinq découpures aiguës; les demi-fleurons linéaires, lancéolés, obtrus, à trois dents très-courtes. Les semences sont larges, comprimées, un peu membraneuses, en cœur.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

18. Souci à feuilles linéaires. *Calendula tragus* Aiton.

Calendula foliis linearibus, subdenticulatis, subius muricato-punctatis; seminibus suborbiculatis, caule fruticoso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2345. n°. 19.

Calendula caulescens, foliis alternis, linearibus, subintegerrimis, pilosulculis; seminibus suborbiculatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 271.

Calendula foliis sublinearibus, denticulatis & integerrimis, subius muricatis; seminibus suborbiculatis; caulibus ramosis, suffruticosis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2. pag. 14. tab. 153.

Ses tiges sont un peu ligneuses, divisées en rameaux herbacés, tombans, garnis de feuilles sessiles, alternes, linéaires, légèrement denticulées à leurs bords, glabres à leur face supérieure, un peu rudes & ponctuées en dessous; les inférieurs plus rapprochées, obtuses à leur sommet; les supérieures insensiblement plus étroites, aiguës.

Les fleurs sont terminales, supportées par des pédoncules allongés, cylindriques, striés, à une seule fleur, dont le calice est composé de folioles presque égales, étroites, lancéolées, membraneuses à leurs bords, aiguës à leur sommet, char-

nité nous en donne des descriptions plus étendues, nous nous bornerons à les rappeler ici, plusieurs d'entr'elles offrant d'ailleurs, dans la seule exposition de leur caractère spécifique, des notes suffisantes pour qu'on puisse les reconnaître.

* *Calendula (amplexicaulis)*, foliis amplexicaulis, hujusmodi-oblongis, dentatis; caule herbaceo, erecto. Thunb. Prodr. pag. 164.

* *Calendula (pinnata)*, foliis pinnatis. Thunb. Prodr. pag. 164.

* *Calendula (scabra)*, foliis elliptico-lanceolatis, dentatis, scabris; caule herbaceo, erecto. Thunb. Prodr. pag. 163.

* *Calendula (parviflora)*, foliis fissilibus, lanceolatis, dentatis; caule herbaceo, piloso, scabro. Thunb. Prodr. pag. 163.

* *Calendula (decurrens)*, foliis lanceolatis, decurrentibus, integerrimis, glabris; caule herbaceo. Thunb. Prodr. pag. 163.

* *Calendula (tomentosa)*, foliis obovatis, tomentosis, integris. Thunb. Prodr. pag. 163.

Calendula foliis obovatis, integerrimis, tomentosis; seapo nudo, uniflora. Linn. f. Suppl. pag. 384.

* *Calendula (oppositifolia)*, foliis oppositis, linearibus, integerrimis, subcartilagineis, glabris. Aiton. Hort. Kew. vol. 3. pag. 272.

An *calendula rosmarinifolia*? Houttuyn, Linn. Fl. Syst. 10. pag. 23. tab. 70. fig. 2.

* *Calendula (glabrata)*, foliis ellipticis, integris, glabris; caule fruticoso, erecto. Thunb. Prodr. pag. 163.

* *Calendula (muricata)*, foliis oblongis, papilloso-fimbriatis, inferius dentatis, superioribus integris; caule fruticoso. Thunb. Prodr. pag. 164.

* *Calendula (cuneata)*, foliis cuneiformibus, cartilagineis, dentatis; caule fruticoso. Thunb. Prodr. pag. 164.

SOUDE. *Salsola*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des arénchées, qui a de grands rapports avec les anagisses, & qui comprend des herbes quelquefois à tige presque ligneuse, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont opposées ou alternes, planes ou cylindriques; les fleurs peu apparentes, axillaires ou terminales, quelquefois munies de trois bractées à leur base.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq divisions; point de corolle; cinq étamines; deux ou trois styles; une capsule supérueuse; une semence roulée en spirale.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en cinq découpures profondes, ovales, concaves, persistantes, quelquefois campanulés.

2°. Point de corolle.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont très-courts, insérés entre les découpures du calice, terminés par des anthères petites, un peu échaucrées à leur base.

4°. Un ovaire globuleux, surmonté de deux ou trois styles courts, terminés par des stigmates recourbés.

Le fruit est une sorte de capsule inférieure, ovale, à une seule loge formée par la base du calice persistant, renfermant une seule semence roulée sur elle-même en spirale ou en coquille de limaçon, quelquefois surmontée d'une aile membraneuse, lobée, campanulée, en forme de corolle, surtout lorsque le calice est d'une seule pièce, ou plutôt des découpures concaves.

Observations. Ce genre est très-complicé. Il est évident que, pour le rendre naturel, il faudrait presque s'en tenir aux cinq à six espèces citées par Tournefort dans ses *Ess. R. Herb.*; mais à mesure qu'on a fait la découverte de plantes qui s'en rapprochoient plus que de tout autre genre, on les a réunies aux soudes avec assez de raison; cependant le nombre en étant devenu beaucoup plus considérable, & les nouvelles espèces s'écartant de plus en plus des premières qui avoient servi de type, on a commencé à sentir la nécessité d'une réforme. Elle n'étoit pas très-facile, d'autant plus que, n'ayant pas toujours les détails de la fructification nécessaires pour prononcer sans incertitude, il a fallu s'en tenir aux premières données. D'ailleurs, ces parries ne peuvent pas être observées avec beaucoup de facilité dans un assez grand nombre d'espèces. Je reviens au genre tel qu'il est aujourd'hui dans les dernières éditions de Linné, & aux changements qu'on a essayé d'y faire.

Les soudes, considérées quant à leur port & à leurs caractères secondaires, sont des plantes herbacées ou ligneuses, ordinairement très-rameuses, dont les feuilles, la plupart assez semblables à celles des *sedum*, sont grâces, épaisses, succulentes, entières, cylindriques ou à demi-cylindriques, quelquefois planes, ou linéaires, ou subulées, rarement sèches, terminées dans plusieurs espèces par une pointe épineuse.

Le caractère principal de ce genre consiste dans les semences foliaires, roulées sur elles-mêmes en spirale ou en coquille de limaçon; ce caractère devroit être de rigueur: ces semences sont enve-

l'appès par le calice persistant, entier à sa base, ou dont les divisions sont conniventes; alors les femences paroissent être renfermées dans une capsule, & le fruit devient capsulaire. On conçoit néanmoins que cette expression est inexacte, & qu'il n'y a point de véritable capsule. Les styles & les stigmates varient d'un à trois; ils ne peuvent former un bon caractère. Le nombre des étamines est assez constant: on en compte cinq. Il n'y a point de corolle.

J'ai dit que le calice étoit à cinq découpures profondes; il est tel en effet dans les *salicoides*, *helia*, &c. Des découpures deviennent plus concaves à mesure que les femences naissent; elles se reconviennent en turrité; mais dans d'autres espèces le calice est quelquefois entier à sa partie inférieure; il prend, à la maturité des femences, la consistance d'une membrane mince, de forme capsulaire, souvent très-refflée à son orifice, où il se dilate en un rebord très-court, membraneux, lobé, ou bien il s'épanouit en un limbe qui présente l'aspect d'une corolle, d'autant mieux qu'il est souvent coloré, campaniforme, préexistant ou à cinq lobes arrondis. Il arrive aussi que ces cinq lobes ne sont que le prolongement de cinq divisions inférieures & conniventes sur les femences.

Cette considération a déterminé Roth à l'établissement d'un nouveau genre pour les espèces qui ont le calice dilaté à son sommet en une membrane campaniforme: il est vrai qu'il y ajoute un autre caractère; savoir: cinq petites écailles triangulaires formant l'orifice du calice, caractère que je n'ai pu vérifier sur les plantes seches que j'ai examinées. Ces écailles exceptées, qui ne sont qu'un bien faible caractère, on voit évidemment que le développement du calice en une membrane campaniforme ne peut pas être présenté comme la base fondamentale d'un nouveau genre, d'autant plus que l'on observe, dans quelques espèces de soude, la même membrane, mais extrêmement courte. J'ajouterai que cette partie n'est ordinairement apparente dans les fleurs, que vers l'époque de la maturité des femences, de sorte qu'il n'est guère possible de l'observer lorsque la plante est en fleurs: il est bien plus simple & plus conforme à l'ordre naturel de l'employer pour subdiviser les espèces.

Les fleurs sont assez généralement axillaires & sessiles, enveloppées la plupart de bractées; mais je trouve une forte contradiction dans les auteurs: ils citent les fleurs comme axillaires, & ils leur donnent trois bractées. Dans celles que j'ai examinées, j'ai très-bien observé deux bractées, & la troisième étoit la feuille même dans l'aisselle de laquelle elles se trouvoient placées, & qui se trouve prise pour une bractée dès qu'on en cite trois; mais alors les fleurs ne sont plus axillaires,

ou bien, dans ce dernier cas, elles n'ont que deux bractées qui manquent dans plusieurs espèces, surtout dans quelques-unes de celles qui se rapprochent des *chenopodium*.

Ces trois bractées, c'est-à-dire, cette feuille florale & les deux bractées ont été regardées par quelques auteurs, & en particulier par M. Cavanilles, comme un calice à trois folioles, & le calice est devenu une corolle à cinq pétales. Il est un peu difficile d'admettre cette opinion. Au reste, la définition des termes suffit pour être entendu; mais une fois fixée, il ne faut pas leur donner un autre sens. Il me paroît en effet que l'on a fait le contraire dans l'établissement des *anabasis*, même si voisin des *helia*, qu'il n'est guère possible de l'en séparer, qui tirent d'un autre côté dans les *helia* de Roth, surtout si l'on se retrace de ce dernier les écailles de l'orifice du calice, qui d'ailleurs ne me paroît pas distingué du genre *caroxylon* de Thunberg (*Voyez ce mot, tome I, pag. 636*), que j'ai réunis aux *helia*, ainsi que l'ont fait plusieurs auteurs avant moi. C'est le *salicoides aphylla* de Linneus.

Je reviens à l'établissement du genre *anabasis*. On lui donne un calice à trois folioles; c'est, en d'autres termes, les trois bractées des *helia*, une corolle à cinq pétales; c'est le calice à cinq découpures des *helia*. Le fruit est une baie monosperme, enveloppée par le calice; mais cette baie ou cette enveloppe presque charnue qui entoure les femences, est encore la partie inférieure du calice qui est entier à sa base, ayant ses découpures moins profondes, quelquefois même d'une seule pièce, lobé ou crénelé à ses bords, ordinairement membraneux, quelquefois un peu charnu à sa partie inférieure. Cette portion du calice qui enveloppe la femence, peut-elle devenir une baie parce qu'elle devient un peu succulente? N'est-ce pas alors confondre toutes les idées? On en a fait une capsule dans les *helia*, parce qu'elle est sèche: ici on en fait une baie, parce qu'elle se trouve presque pulpeuse. De tels caractères peuvent-ils jamais devenir génériques? Des semblables distinctions peuvent-elles être admises dans une science d'observation?

Je conclus de ces observations, que le calice est très variable dans les *helia* pour servir de caractère générique fondamental, & que les genres que l'on a, d'après cette considération, formés en partie de plusieurs espèces de soude, doivent être supprimés, tels que les *anabasis*, les *helia*, les *chelonae*, les *caroxylon*.

Si ce genre est susceptible d'être divisé en deux ou trois autres genres, les fondemens de ces nouveaux genres doivent être recherchés dans les femences. Il est à présumer que toutes ne se ressemblent pas; que celles de plusieurs espèces n'ont pas été suffisamment observées, surtout dans ces

espèces qui se rapprochent de *S. chenopodium* ; qu'il en est dont les semences ne sont point roulées en spirale, &c.

J'ai ajouté aux *Salsola* le genre *Suaeda* de Forskhal. Les espèces qui le composent, a eu juger d'après les descriptions de Forskhal, n'offrent point de différences assez marquées pour en être séparées, excepte peut-être le *Suaeda baccata*, dont les fruits renferment plusieurs semences ; mais comme ces espèces ne me sont pas connues, & que quelques uns pourroient appartenir à d'autres *Salsola*, je les ai présentés séparément à la fin de ce genre.

ESPÈCES.

1. SOUDE COUCHÉE. *Salsola kali*. Linn.

Salsola herbacea, de umbra; ; foliis subulosis, spinosis ; calicibus marginatis, axillaribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 322. — Miller, Dict. n°. 1. — Scholl. Barb. n°. 189. — Wedd. Flor. dan. tab. 8. 8. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. p. 359. tab. 75. fig. 4. — Mill. Icon. 4. pag. 244. — Lam. Illustr. Gener. tab. 181. fig. 1. — Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 331. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 216. — Hoffm. Germ. 86. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 114. — vol. II. pag. 292. — Gerard, Flor. gal. Prov. pag. 332. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1310. n°. 1.

Salsola foliis pungentibus. Hort. Cliffort. 86. — Flor. luc. 206. 215. — Roy. Lugd. Bat. 220. — Gronov. Virgin. 28.

Salsola foliis rigidis, pungentibus. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 88. n°. 69.

Kali soda. Scopul. Carn. edit. 2. n°. 285.

Salsola decumbens. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 241. n°. 841.

Kali spinosum, foliis crassioribus & brevioribus. Tourn. Inst. R. Herb. 247. — Schaw. Spec. n°. 353. — Gaid. Aix. 262.

Kali spinosa officina. C. Bauh. Pin. 289. — Morif. Oxon. Hist. 2. 6. 5. tab. 33. fig. 11.

Tragum. Camer. Epitom. Icon. 779. — Matth. Comment. 731. Icon.

♂. *Salsola kali, glabra ; caulis nervis rubris, elatis*. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 54. n°. 84. ?

♀. *Salsola kali, hispida, fetosa*. Forskh. l. c. n°. 84. ?

γ. *Salsola kali, hispida, polygama ; floribus summis hermaphroditis, non coronatis, reliquis roseis, potentibus, rubris*. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 55. n°. 85. ?

Cette plante, qui diffère peu du *Salsola tragus*, a des tiges presque couchées, rudes, filices, her-

bacées, très-rameuses ; les rameaux très-étalés, garnis de feuilles alternes, sessiles, charnues, épaisses, courts, subulces, scabres, convexes à leur face intérieure, dilatés & canaliculés à leur base, terminés par une pointe droite, épineuse, un peu jaunâtre.

Les fleurs sont situées, dans l'aisselle des feuilles, le long des rameaux ; elles sont solitaires, sessiles, munies sous leur calice de trois bractées terminées par une épine droite, très-piquante. Le style est, d'après Linné, à trois divisions. Le calice est environné d'un rebord foliacé.

Cette plante croît en Europe & dans la Barbarie, sur les côtes de la mer. ○ (V. v.)

J'ai mentionné, d'après Forskhal, quelques variétés de cette espèce, que l'on reconnoitra peut-être par la suite comme devant être elles-mêmes distinguées comme espèces lorsqu'elles auront été mieux observées.

2. SOUDE ÉPINEUSE. *Salsola tragus*. Linn.

Salsola herbacea, cresta ; foliis subulosis, spinosis, levibus ; calicibus ovatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 322. — Amoen. Academ. vol. 4. pag. 311. — Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 331. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 217. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1310. n°. 2.

Kali tragus. Scop. Carn. edit. 2. n°. 284.

Salsola spinosa. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 240. n°. 841.

Kali spinosum, foliis longioribus & angustioribus. Tourn. Inst. R. Herb. 247.

Tragum Matthioli. Lobel. Icon. tab. 797. — Id. Oberv. pag. 463. Icon.

Cette soude ne paroît être qu'une variété de la précédente, dont elle ne diffère guère que par les tiges droites, hautes d'un à deux pieds, formes, rameuses, cannelées, point scabres, un peu velues vers leur sommet. Les feuilles sont sessiles, étroites, linéaires, glabres, charnues, longues de plus d'un pouce, terminées par une pointe épineuse, très-roides. Les fleurs sont sessiles, axillaires, disposées le long des rameaux, garnies de trois bractées courtes, épineuses.

Cette plante croît dans le sable, sur le bord de la mer, en France, dans les contrées méridionales de l'Europe, sur les côtes de Barbarie. ○ (V. v.)

3. SOUDE COMMUNE. *Salsola soda*. Linn.

Salsola herbacea, patula, foliis inermibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 321. — Guettard, Stamp. pag. 216. — Sauv. Monip. 7. — Mill. Dict. n°. 3. — Jacq. Hort. tab. 68. — Desfont. Flor. atlant.

vol. 1. pag. 216. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1311. n° 4.

Salsola longifolia. Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 241. n° 841.

Kali majus, cochleata semine. C. Bauh. Pin. 289. — Tournef. Inst. R. Herb. 247. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 33. fig. 1.

Soda, kali magnum, fedi medii folio, semine cochleato. Lobel. Icon. tab. 394. — Idem, Advers. 169. Icon.

Kali magnum, pena. Dalech. Hist. 2. pag. 177. Icon.

Kali vulgare. J. Bauh. Hist. 3. p. 702. *Sine icon.*

On reconnoît cette espèce à ses longues feuilles fins point acineuses. Ses tiges sont tres-glabres, lisses, cylindriques, quelquefois un peu rougeâtres, couchées à leur base, et dressées, hautes d'un pied & plus, rameuses; les rameaux axillés, garnis de feuilles sessiles, alternes, charnues, très glabres, étroites, linéaires, un peu cylindriques, très-ouvertes, longues de deux à trois pouces & plus, marquées à leurs deux faces de deux stries longitudinales.

Les fleurs sont sessiles, solitaires ou réunies deux ou trois dans l'aisselle des feuilles supérieures, montées de deux bractées au moins une fois plus longues que les fleurs. La femelle qui les renferme dans ton aisselle pourroit être regardée comme une troisième bractée; elle est très-élargie, concave à sa partie inférieure, striée, un peu membraneuse à ses bords, subulée à sa partie supérieure. Le calice est à cinq découpures profondes, assez larges, concaves, obtuses, persistantes avec les fruits. Cent-ci sont un peu arrondis, renferment une seule semence noirâtre, assez grosse, roulée en spirale.

Cette plante croît sur les côtes maritimes des contrées méridionales de l'Europe, en Barbarie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. C. (V. v.)

Cette soude passe pour diurétique, apéritive & anti-ulcéreuse, favorable dans les maladies de la peau, propre pour chasser les vers & détruire les obstructions. Quelques personnes en mangent les effluves, dont la saveur n'est point désagréable; les brebis en sont très-avides.

Quoiqu'on emploie assez indifféremment les diverses espèces de soude pour en obtenir le sel alcali connu sous le nom de soude, néanmoins celle-ci est une des plus estimées pour cette opération. Voici de quelle manière on le prépare. On creuse une tranchée près de la mer: on y place des lattes en travers, sur lesquelles on met cette plante en monceaux après l'avoir laissée bien secher; on fait du feu au dessus, on agite fortement

les cendres brûlantes qui en résultent; elles se rassemblent en morceaux durs & solides, employés dans le commerce & les arts pour la composition du verre & du savon, pour dégraisser les étoffes; on s'en sert également pour les lessives partout où les cendres de bois sont rares ou de mauvaise qualité.

4. SOUDE hérissée. *Salsola maricata*. Linn.

Salsola frutescens, patula, ramis hirsutis, calicibus spinosis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 618. n° 11. — Mantiss. 34. 512. — Vahl, Symb. 1. pag. 24. — D. ston. Flor. atlant. vol. 1. pag. 217. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1317. n° 25.

Kali aegyptium, incanum & villosum; calice stellato & aculeato. Lippi, M. — Herb. Vaill. (D. f. font.)

Bastis maricata. Allion, Miscell. Taur. 3. 177. tab. 4. fig. 2.

Chenopodium maritimum, ramulis virgatis. Buxb. Cent. 3. pag. 27. tab. 49.

Salsola (monobactra), diffusa, frutescens, foliis linearibus, pilosis, incanibus; calicis fici in spinam transiente. Forsk. Flor. aegypt.-arab. pag. 55. n° 85.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu striées, presque ligneuses, hautes de deux à trois pieds, pubescentes, chargées de fleurs dans toute leur longueur, rameuses, d'un blanc-cendré, un peu jaunâtres; les rameaux grêles, disposés en une sorte de panicule, garnis de feuilles sessiles, alternes, linéaires, molles, médiocrement charnues, un peu velues, obtuses, sans pointe épineuse.

Les fleurs sont sessiles, réunies dans l'aisselle des feuilles de deux à trois ou solitaires. Leur calice est tomenteux, à cinq découpures; elles se développent, à la maturité des fruits, en une petite étoile terminée par cinq arêtes ouvertes, roides, souvent courbées en crochets à leur sommet. La semence est fort petite, roulée en coquille de limaçon, enveloppée par le calice.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe, en Egypte, & en Barbarie dans le désert proche Caïre. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. H. (V. v.)

La plante de Lippi a des feuilles un peu plus étroites, les tiges plus grêles; les derniers rameaux sont presque filiformes. (V. f. la herb. Justea.)

5. SOUDE cultivée. *Salsola fativa*. Linn.

Salsola diffusa, herbacea, foliis teretibus, glabris; foribus conglomeratis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 625. — Lœfl. Iter. 132. — Cavan. Icon. Bar. vol.

4. pag. 46. tab. 291. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1311. n°. 5.

Kali hispanicum, *spinum*, *annuum*, *sed foliis brevioribus*. Juss. Act. Facif. 1715. pag. 74. Icon.

Kali minus, *alterum*. C. Bauh. Pin. 283.

Ses racines sont succulentes, & produisent une tige herbacée, longue d'environ un pied, divisée en rameaux étalés sur la terre, diffus, cylindriques, souvent rougeâtres, garnis de feuilles épaisses, nombreuses, sessiles, presque cylindriques, grasses, très-glâbres, courtes, assez semblables à celles d'un *scum*.

Les fleurs sont sessiles, réunies en paquets, agglomérées dans l'aisselle des feuilles, au nombre de cinq à sept, munies à leur base d'une bractée à trois folioles ovales, aiguës, concaves, à peine sensibles à l'œil nu. Le calice est extrêmement petit, plus grand que les bractées, dont les divisions sont concaves, conniventes, scarieuses à leur limbe, où elles se développent en cinq petits lobes arrondis, ouverts; les semences petites, comprimées, roulées en spirale.

Cette plante croît sur les côtes maritimes de l'Espagne, dans le royaume de Valence; on la cultive en grand pour le commerce. ○ (V. f.)

6. Soude satinée. *Salsola canescens*. Hort. Paris.

Salsola caule frutescente, foliis; foliis linearibus, tomentosis, planis, argenteo-sericeis. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 296. n°. 17.

Chenopodium sinense. Willem. Essais de Médec. & d'Hist. Nat. 3. pag. 1233.

Salsola canescens. Desfont. Catal. Hort. Paris. pag. 41.

Cette plante se rapproche beaucoup par son port, du *salsola diffusa*.

Ses tiges sont médiocrement ligneuses; elles se divisent en rameaux simples, couchés, alongés, cylindriques, souples, un peu grêles, longs de huit à dix pouces, pubescents & argentés dans leur jeunesse, garnis de feuilles nombreuses, épaisses, sessiles, rapprochées, planes, un peu coriaces, linéaires, un peu aiguës à leur sommet, blanchâtres, soyeuses & tomenteuses à leurs deux faces, longues de trois à quatre lignes, larges à peine d'une ligne & demie.

Les fleurs sont sessiles, solitaires dans l'aisselle des feuilles. Le calice est à cinq découpures petites, ovales, obtuses, concaves, tomenteuses & blanchâtres en dehors, un peu noirâtres en dedans; elles renferment cinq étamines plus courtes que le calice, dont les anthères sont à deux lobes; un style divisé en deux stigmates divergens, aigus, plus longs que le calice.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Son lieu natal n'est pas connu; on la suppose originaire de la Chine. ? (V. v.)

7. Soude diffuse. *Salsola diffusa*. Thunb.

Salsola herbacea, tomentosa, decumbens, foliis lanceolatis. Thunb. Prodr. pag. 48. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 296. n°. 18.

Salsola (sericea) frutescens, ramis diffusis, foliis lanceolatis, sericeis; calicibus mucosis. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 317.

Chenela diffusa. Thunb. Nov. Gener. pag. 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1203.

Cette plante, qui paroît s'écarter un peu des *salsola* par sa fructification capsulaire, ombiliquée, y a d'ailleurs trop de rapport pour en être séparée.

Ses tiges sont presque herbacées, couchées, tomenteuses, divisées en rameaux diffus, étalés, garnis de feuilles sessiles, opposées, ovales, lancéolées, charnues, terminées par une pointe net épineuse, planes à leur face supérieure, convexes en dessous, tomenteuses ou couvertes de poils soyeux, argentés; les feuilles supérieures très-rapprochées, imbriquées.

Les fleurs sont sessiles, axillaires, solitaires ou réunies deux ou trois dans l'aisselle des feuilles supérieures. Leur calice est divisé en cinq découpures persistantes; il renferme cinq étamines, poire de corolle; un seul style filiforme, surmonté de deux stigmates réfléchis. Le fruit consiste en une seule semence enveloppée d'une membrane capsulaire, ombiliquée à son sommet, un peu comprimée.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les lieux bas & maritimes. ?

8. Soude élevée. *Salsola albigemma*. Linn.

Salsola herbacea, crella, ramiflora; foliis glaberrimis, acutiusculis, hirsutiusculis. Linn. Syst. veget. pag. 217. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1312. n°. 7.

Salsola crella, ramiflora, herbacea, foliis glaberrimis, acutiusculis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 524.

Chenopodium albigemma. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 221. — Hort. Upf. 55. n°. 3.

Chenopodium albigemma, foliis succulentis. Euxb. Cent. 1. pag. 21. tab. 31. fig. 2.

● *Kali granitico folio*. C. Bauh. Pin. 289. & Prodr. 133. — Burf. XVI. 20.

Chenopodium orientale, annuum, albigemma, kali folio breviora & caps. Tourn. Coroll. 38.

p. Salsola foliis filiformibus, inermibus, mucronatis; caule ramossissimo. Hort. Upl. 56.

Lerchia foliis filiformibus, acutis. Hall. Goett. 2. pag. 22.

Il est difficile de déterminer le véritable genre auquel cette plante appartient. La petite des parties de la fructification, leur disposition, peut-être la forme de leurs semences légèrement comprimées, presque point en spirale, la rapprochent beaucoup des *chenopodium*; mais son port & plusieurs autres rapports avec les souses ne permettent guère de l'en séparer. Elle a d'ailleurs un caractère spécifique très-remarquable, qui consiste dans les fleurs dont le pédoncule est inséré à la base des feuilles, & non axillaires.

Ses tiges sont droites, cylindriques, très-élevées, très-rameuses, hautes de trois à quatre pieds, fermes, glabres, velutées, garnies de feuilles nombreuses, sessiles, éparées, très-rapprochées sur les jeunes rameaux, un peu charnues, fines, filiformes, d'un vert-foncé, très-glabres, un peu aigües, mais point mucronées à leur sommet, longues d'environ un pouce, quelquefois plus.

Les fleurs sont très-nombreuses, fort petites, situées le long des jeunes rameaux, vers l'aisselle des feuilles, supportées par un pédoncule très-court, inséré sur la feuille à sa base : il est terminé par une fleur, & en porte, à sa partie inférieure, deux autres qui paroissent sessiles. Ces fleurs sont dépourvues de bractées. Leur calice est composé de cinq petites folioles ou découpsures profondes, concaves, obtuses, glabres, verdâtres. Elles enveloppent une semence noirâtre, un peu comprimée, de la grosseur à peine d'une tête d'épingle. L'ovaire est surmonté de trois styles.

Cette plante croit en Sixe, en Italie, en Perse, parmi les sables. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

9. SOUDE à trois styles. *Salsola trigyna*. Willd.

Salsola herbacea, erecta, foliis filiformibus, obtusis, carnosis; floribus axillaribus, sessilibus, ternis; stylo trifido. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1312. n°. 8.

Salsola (altissima), erecta, herbacea, ramossissima, floribus ternis, medio axillari, lateralibus hinc inde ad basin folii. Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. 46. tab. 289. (Exclusis synonymis.)

Quoique très-ressemblante par son port au *Salsola altissima*, cette plante doit en être distinguée par le caractère de la fructification, ses fleurs étant axillaires, sessiles, point insérées par un pédoncule court sur la base des feuilles.

Ses tiges sont fort hautes, droites, herbacées, très-rameuses, striées, cylindriques; les rameaux diffus, alternes, garnis de feuilles nombreuses, sessiles, filiformes, charnues, un peu obtuses. Les fleurs sont fort petites, sessiles, réunies au nombre de trois dans l'aisselle des feuilles, dont deux latérales, situées en dehors. Elles renferment trois styles, ou un seul style profondément trifide. Les semences sont petites, un peu comprimées.

Cette plante croit en Espagne. O

10. SOUDE salée. *Salsola salsa*. Linn.

Salsola herbacea, erectiuscula, foliis linearibus, subcarnosis, mucicis; calicibus succulentis, diaphanis. Linn. Syst. veget. pag. 217. — Mantiss. 347. — Pallas, Iter 1. pag. 420. — Lepech. Iter 1. pag. 254. — Jacq. Hort. 3. pag. 44. tab. 83. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1312. n°. 9.

Salsola patula, herbacea, foliis semiteretibus, obtusis; ramis reflexis. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 324.

Chenopodium foliis linearibus, obtusis, subius convexis; caule ramoso, ramis flexis. Hort. Upl. 55. Spec. Plant. edit. 1. pag. 221.

Chenopodium maritimum, foliis fedi ceterisibus. Buxbaum. Centur. 1. pag. 21. tab. 31. fig. 1.

p. Salsola (americana), humilior subcumbens, floribus confertioribus. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 296.

Salsola (salsa), herbacea, erectiuscula, ramossissima, foliis linearibus, mucicis, carnosis, glomeratis; floribus quasi in spicas interfoliaceas approximatis, calicibus fructiferis, depressis subrotundis. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 1. n°. 174.

7. Salsola (salsa), caule herbaceo, erecto; foliis semiteretibus, obtusis; floribus axillaribus, ternis. Cavan. Ic. Rar. vol. 3. pag. 46. tab. 290.

Salsola (spicata), herbacea, foliis oblongis, obtusis, semiteretibus; floribus ternis, axillaribus, sessilibus. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1311. n°. 6.

Les trois plantes que je réunis sous une seule espèce, comme variétés, font peut-être autant d'espèces distinctes, ainsi que l'ont cru quelques auteurs; mais les caractères qui les séparent, appuyés particulièrement sur la différence de leur port, ne m'ont point paru jusqu'alors assez saillants pour en former des espèces.

La première a des tiges herbacées, presque droites, hautes d'un pied, lisses, cylindriques, souvent purpurines, légèrement striées, dont les rameaux assez nombreux & tombants forment une sorte de panicle, & sont garnis de feuilles alternes, éparées, sessiles, charnues, courtes, linéaires,

à demi-cylindriques, planes à leur face supérieure, approchant des feuilles du *sedum*, presque obtuses, sans pointe épineuse. Les fleurs ont l'apparence de celles des *chenopodium*; elles sont sessiles, réunies au nombre de trois dans les aisselles des feuilles. Les folioles ou découpures du calice sont larges, convexes en dehors, profondément creusées en voûte, fermées à leur sommet; elles deviennent, à mesure que les semences mûrissent, plus succulentes, plus épaisses & transparentes. Les styles sont au nombre de trois, biftides à leur sommet.

Cette plante croît en Perse, dans les environs d'Astracan, & dans la Sibirie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

La plante β , observée par Michaux en Amérique, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, a des tiges bien moins élevées, très-rameuses, presque couchées. Les fleurs sont plus rapprochées, plus nombreuses, plus ramassées, & presque disposées en épis foliacés.

La plante γ , qui croît naturellement en Espagne, a des tiges droites, herbacées; ses feuilles plus longues, obtuses, à demi-cylindriques; ses fleurs réunies au nombre de trois dans les aisselles des feuilles & des rameaux eux-mêmes axillaires; elles forment par leur ensemble une sorte d'épi grêle, foliacé. ○

11. SOUDE à fleurs nues. *Salsola nudiflora*. Willden.

Salsola sublignosa, ascendens, foliis filiformibus, carnosius; floribus glomeratis, foliis glomerulorum longitudinalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1313. n°. 10.

Cette espèce, assez semblable au *salsola salsa* par ses feuilles, en diffère par les fleurs agglomérées dans les aisselles de feuilles si petites, qu'elles sont cachées par les fleurs, d'où il arrive que celles-ci paroissent nues.

Ses tiges sont presque ligneuses, ascendentes, herbacées à leur partie supérieure, rameuses; les rameaux supérieurs disposés en une sorte de panicule. Les feuilles sont alternes, sessiles, charnues, assez courtes, filiformes; celles des rameaux fleuris très-courtes. Les fleurs sont très-nombreuses, disposées par paquets le long des branches, dans l'aisselle des feuilles.

Cette plante croît dans les Indes, à Tranguabar, le long des côtes maritimes. x

12. SOUDE jaunâtre. *Salsola flavescens*. Cavan.

Salsola caule suffruticosa, ramis erectis, foliis alternis, teretibus, incanis; floribus axillaribus, solitariis. Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. 45. n°. 315. tab. 288.

Botanique. Tome VII.

Salsola (flavescens), sublignosa, erecta, foliis teretibus, pubescentibus; floribus subglomeratis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1313. n°. 11.

Cette plante, voisine du *salsola hirsuta*, en diffère par ses tiges presque ligneuses, par ses feuilles plus étroites, par sa couleur jaunâtre.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un demi-pied, très-rameuses; les rameaux longs d'un pied & demi, garnis de feuilles alternes, sessiles, cylindriques, jaunâtres, ainsi que toutes les autres parties de la plante, très-peu chatnues, couvertes d'un léger duvet blanchâtre.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, axillaires, sur de petits rameaux axillaires, où elles sont souvent si rapprochées, qu'elles forment une sorte d'épi; chaque fleur séparée par une petite feuille, outre deux petites bractées plus courtes que les fleurs. Le calice est composé de découpures oblongues, conniventes. Les étamines sont une fois plus longues que le calice; les anthères jaunes, échan-crées à leur base. L'ovaire est globuleux; le style simple; deux stigmates rous.

Cette plante croît sur les montagnes, en Espagne. x (V. f.)

13. SOUDE arbrisseau. *Salsola fruticosa*. Linn.:

Salsola erecta, fruticosa; foliis filiformibus, obtusiusculis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 324. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 217. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 242. n°. 841.

Salvia fruticosa, foliis carnosius, teretibus, obtusius, imbricatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1316. n°. 22.

Chenopodium foliis linearibus, teretibus, carnosius; caule fruticosa. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 221. — Hort. Cliff. 86. — Roy. Lugd. Bat. 220. — Guett. Stamp. vol. 2. pag. 425.

Chenopodium, sedi folio minimo, frutescens, perenne. Duham. Arbt. vol. 1. pag. 163. tab. 62.

Lerchea foliis obtusius. Hall. Goett. 21.

Kali speciosae vermicularis, marina, arborescens. J. Bauh. Hist. 3. pag. 704. Icon.

Sedum minus arborescens. Munt. Hist. 469. tab. 130.

Anthyllis chamapitides, frutescens. C. Bauh. Pin. 282. ?

Exclue *salsola fruticosa*. Cavan. n°. 312.

Chamapitys vermiculata. Lobel. Icon. 331. — Idem, Advetf. 163. Icon.

Chamapitys prima Dioscoridis pens & Lobelij. Dalech. Hist. 2. pag. 1160. Icon.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu

○ ○

striées, ligneuses, hautes de deux à trois pieds, munies d'un grand nombre de rameaux, grêles, alternes, rapprochées, garnis de feuilles sessiles, alternes, petites, charnues, très-rapprochées, à demi-cylindriques, planes à leur surface supérieure, glabres, linéaires, obtuses, longues de trois à quatre lignes.

Les fleurs sont sessiles, disposées le long des jeunes rameaux, dans l'aisselle des feuilles, solitaires, ou quelquefois au nombre de deux ou trois, petites, sans bractées, rapprochées de celles des *chenopodium*. Leur calice est divisé en cinq découpures concaves, légèrement membraneuses à leurs bords, vertes ou un peu roussâtres. Les étamines sont un peu plus longues que le calice; les anthères jaunes, un peu rejetées en dehors; trois styles courts ou rougeâtres; les semences sont petites, arrondies, médiocrement comprimées.

Cette plante croît sur les côtes maritimes, dans les départements méridionaux de la France, en Espagne, en Perse, en Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

14. SOUDE des Indes. *Salsola indica*. Willd.

Salsola frutescens, foliis linearibus, carnosis, semiteretibus; floribus oblongis, obtusis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1317. n° 23.

C'est un petit arbuste dont les tiges s'élèvent à peine à la hauteur d'un pied, & se divisent en rameaux garnis de feuilles assez semblables à celles du *salsola frutescens*, mais une fois plus longues, à demi-cylindriques, linéaires, charnues; celles qui accompagnent les fleurs sont beaucoup plus courtes, oblongues, obtuses.

Les fleurs sont sessiles, réunies trois par trois dans les aisselles des feuilles des rameaux d'un an; elles ressemblent d'ailleurs à celles du *salsola frutescens*.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. Descript. ex Willd.)

15. SOUDE laineuse. *Salsola laniflora*. Pallas.

Salsola herbacea, foliis teretibus, pubescentibus; floribus axillaribus, antheris coloratis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1314. n° 13.

Salvia (Linn. t. 2), foliis obtusis, carnosis; antheris coloratis. Linn. Suppl. pag. 172.

Salsola laniflora. Gmel. Iter 1. pag. 160.

Salsola lanata. Pallas, Iter 2. Append. 104. tab. P.

Des anthères couleur de rose, le prolongement des folioles du calice après la fécondation, des feuilles cylindriques & pubescentes rendent cette espèce facile à distinguer.

Ses tiges sont droites, herbacées, hautes de deux pieds, cylindriques, striées, lanugineuses dans leur jeunesse, glabres dans leur entier développement, & sur les rameaux à fruits, garnies de feuilles sessiles, alternes, charnues, cylindriques, pubescentes, obtuses & sans aiguillon à leur sommet. Les fleurs sont disposées le long des rameaux presque en épis, réunies au nombre de trois dans les aisselles des feuilles, de couleur jaunâtre. Les calices sont divisés en cinq folioles qui se prolongent presque en paillettes très-longues, aiguës, colorées en rose à leurs bords. Les anthères sont de la même couleur.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie.

16. SOUDE velue. *Salsola hirsuta*. Linn.

Salsola herbacea, diffusa, foliis teretibus, obtusis, tomentosis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 626. n° 8. — Æder. Flor. dan. tab. 187. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1313. n° 11. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 241. n° 841.

Chenopodium (hirsutum), foliis obtusis, teretibus, tomentosis, alternis; caule herbaceo. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 221. — Sauv. Monsp. 7. — Gouan, Monsp. pag. 525. n° 13.

Kalimimus, villosum. C. Bauh. Pin. 89. — Idem, Prodr. 133.

Kali parvum, hirsutum. J. Bauh. Hist. 3. p. 701. Icon.

Cette soude, qui s'élève, par la culture, à la hauteur d'un ou deux pieds & plus, n'a guère que huit à dix pouces dans son sol natal. On la distingue aux poils fins, tomenteux, un peu roussâtres, dont les feuilles sont chargées.

Ses tiges sont cylindriques, striées, d'un vert jaunâtre, pubescentes, très-rameuses; les rameaux diffus, étalés, inégaux, grêles; les inférieurs allongés, presque couchés, garnis de feuilles alternes, sessiles, étroites, linéaires, molles, presque point charnues, d'un vert-blanchâtre, velues, légèrement cotonneuses, longues de six à huit lignes, aiguës, presque subulées à leur sommet.

Les fleurs se rapprochent beaucoup de celles des *chenopodium*: elles sont petites, placées dans l'aisselle des feuilles le long de rameaux très-courts; elles sont presque solitaires; leur calice est très-velu; les semences petites, noirâtres.

Cette plante croît aux lieux maritimes, dans les environs de Montpellier, le Danemarck, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

17. SOUDE à feuilles d'hyssope. *Salsola hyssopifolia*. Pallas.

Salsola herbacea, foliis linearibus, planis; glomeratis floribus axillaribus, lanatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1314. n° 14.

Salsola hyssopifolia. Pallas, Iter 1. Append. n° 107. tab. L.

On ne peut pas confondre cette espèce avec le *salsola laniflora*, quoique les fleurs soient également lanugineuses. Ses tiges sont herbacées, rameuses, un peu velues, garnies de feuilles filiformes, alternes, linéaires, planes & non cylindriques. Les fleurs sont réunies par paquets agglomérés dans l'aisselle des feuilles le long des rameaux, environnées d'un duvet lanugineux.

On trouve cette plante dans les campagnes arides & salines de la Sibirie. ○

18. SOUDE maritime. *Salsola maritima.*

Salsola caule herbaceo, diffo; foliis semiteretibus; seminibus nudi, sphaeroidibus, nigris, incurvis. (N.)

Chenopodium (maritimum), foliis subulotis, semicylindricis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 622. n° 17. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 83. n° 64. — Act. Stockh. 1743. pag. 107. — Scop. Carn. edit. 2. n° 283. — Hoffm. Germ. 85. — Scholl. Barb. n° 209. — Wd. Flor. dan. tab. 489. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 117. — Il. pag. 299. — Poirer, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 130. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 245. n° 843. — Idem, Dict. vol. 1. pag. 197.

Chenopodium foliis subulotis, carnosiss, semiteretibus; floribus glomeratis, axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1307.

Chenopodium foliis subulotis, superne planis, subus convexis. Hort. Cliff. 86. — Flor. suec. 218-224. — Roy. Lugd. Bat. 210.

Kali minus, album, semine splendens. C. Bauh. Pin. 289. — Moris. Oxon. Hist. 2. pag. 610. §. 5. tab. 33. fig. 3. *Medicoris.*

Kali album. Dod. Pempt. pag. 81. Icon.

Vulgairement la blanchette.

Il est difficile, disons plus, il est impossible, en s'attachant aux rapports naturels des plantes entr'elles, de ne pas rapporter celle-ci aux *salsola*, quoiqu'elle ait, par les semences, quelque affinité avec les *chenopodium*. La seule différence que j'y trouve, consiste en ce que ces semences, quand elles font mûres, quittent le calice, & qu'elles sont à peine à demi-roulées en spirale. Mais si, d'un autre côté, nous faisons attention au port de la plante, à ses feuilles grasses, courtes, épaisses, sales; à ses fleurs axillaires, sessiles & à son lieu natal, habitant, avec la plupart des autres soudes, les bords de la mer, on ne pourra disconvenir qu'elle doit nécessairement rester parmi elles, & qu'il a fallu en quelque sorte faire violence à la

première idée qui s'est présentée en la voyant, pour la ranger parmi les *chenopodium*.

Ses tiges sont glabres; ses rameaux courts, grêles, étalés, presque tombans; les feuilles alternes, courtes, charnues, à demi-cylindriques, presque obtuses, sans pointe épineuse, longues de quatre à cinq lignes; les fleurs sessiles, axillaires, sans bractées, par paquets de deux à quatre, petites; les calices à cinq découpures vides, membraneuses à leurs bords, un peu concaves, très-obtus, presque orbiculaires; les semences d'un noir-luisant, bombées, comprimées, un peu en spirale, s'échappant nues du calice à l'époque de la maturité. Je renvoie, pour le reste de la description, à ce qui en a été dit à l'article *ANSERINE* maritime, vol. 1. pag. 197.

Cette plante croît sur toutes les côtes maritimes de l'Europe, sur celles de Barbarie, où je l'ai recueillie. ○ (V. v.)

L'espèce que j'ai recueillie en Barbarie, aux environs de Bonne, sur les bords de la mer, à ses tiges une fois plus hautes, plus épaisses; les rameaux plus relevés; les feuilles un peu plus longues, presque subulotes; les fleurs & les semences les mêmes: elle se rapproche du *salsola salsa* par son port.

19. SOUDE à feuilles molles. *Salsola mollis.* Desfont.

Salsola fruticosa, ramis patentibus; foliis cerebis, carnosiss, glaucis, obtusis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 216. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 297. n° 32.

Arbuste d'un à deux pieds & plus de haut, dont les tiges sont droites, très-rameuses; les rameaux étalés, garnis de feuilles sessiles, alternes, épaisses, cylindriques, charnues, glabres, très-molles, de couleur glauque, succulentes, parfaitement semblables à celles du *sedum album*, mais un peu plus courtes & moins épaisses, d'environ quatre lignes de long.

Cette plante croît dans les sables, proche Casis en Barbarie. h (Descript. ex Desfont.)

20. SOUDE à feuilles de camphrée. *Salsola camphorosmoides.* Desfont.

Salsola fruticosa, ramis paniculatis, spinosis; foliis filiformibus, glabris. (N.)

Salsola fruticosa, spinosa, ramiflora, foliis glabris, alternis, filiformibus, cum foliis axillaribus. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 297. n° 30.

Kali orientale, fruticosum, spinosum, camphorata foliis. Tournef. Coroll. 18. & Heib. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 218.

Cette plante offre l'aspect d'une camphrée, sur-
O o 2

tout par la disposition & la forme de ses feuilles. Ses tiges sont droites, glabres, ligieuses, très-rameuses; les rameaux épineux, disposés en panicule; les épines très-piquantes. L'écorce est blanche dans les jeunes rameaux; elle devient brune à mesure qu'ils vieillissent. Les feuilles sont glabres, sessiles, alternes, filiformes, & elles renferment souvent dans leurs aisselles d'autres feuilles fasciculées. Les fleurs, trop peu développées, n'ont pas pu être suffisamment observées.

Cette plante croît en Barbarie, proche Tlemcen, dans les terres incultes. *h* (*Descript. ex Desfont.*)

21. SOUDE à une étamine. *Salsola monandra*. Pall.

Salsola caule herbaceo, ramoso, carnosio, subaphyllo; foliis teretibus, carnosio; floribus monandris. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1315. n°. 17.

Salsola monandra. Pall. Iter 3. Append. n°. 83, tab. M. fig. 1.

Cette plante se rapproche beaucoup, par son port, des *polycornes*, ou plutôt des *salicornes*, n'ayant d'ailleurs, comme elles, qu'une seule étamine.

Ses tiges sont droites, herbacées, à rameaux glabres, nombreux, garnies à leur base de feuilles opposées, charnues, cylindriques, très-glabres, obtuses. Le reste de la plante est ordinairement dépourvu de feuilles, excepté à l'insertion des principales ramifications, excepté des renflements alternes, charnus, en forme de dents, à rebords membraneux, dans lesquels sont renfermées deux stipules convergentes, triangulaires, aiguës.

Les fleurs sont solitaires, axillaires dans les renflements, dont le calice est composé de trois folioles membraneuses, concaves, conniventes, aiguës; elles ne renferment qu'une seule étamine, deux styles séparés. Les semences sont petites, roulées sur elles-mêmes en spirale, renfermées dans le calice persistant qu'elles remplissent.

Cette plante croît en Sibérie, dans les marais salins inondés. *o* (*Descript. ex Pall.*)

22. SOUDE à feuilles d'orpin. *Salsola sedoides*. Pall.

Salsola suffruticosa, foliis teretibus, filiformibus, ciliatis; floribus glomeratis & axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1317. n°. 24.

Salsola sedoides. Pall. Itin. 1. Append. n°. 108, tab. M. fig. 1, 2.

Cette plante, dans sa jeunesse, est presque à tige simple, très-droite, haute d'un pied; elle devient avec l'âge presque ligneuse, plus haute, rameuse dès sa base. Les tiges sont légèrement to-

menteuses; les rameaux alternes, ramifiés, très-feuillés. Les feuilles sont épaisses, nombreuses, charnues, courtes, cylindriques, obtuses, munies de longs poils blanchâtres.

Les fleurs sont fort petites, sessiles, solitaires ou agglomérées dans l'aisselle des feuilles. Leur calice est globuleux, à cinq découpures couvertes d'un duvet lanugineux. Elles renferment cinq étamines longues, saillantes; les anthères ovales, à deux loges; un style bifide. Les semences sont renfermées dans le calice persistant.

Cette plante croît en Sibérie, dans les lieux humides & salins. (*Descript. ex Pall.*)

23. SOUDE verticillée. *Salsola verticillata*. Schousb.

Salsola fruticosa, erecta, foliis oppositis, linearibus, semicylindricis; floribus subverticillatis. Schousb. Maroc. vol. 1. pag. 123. — Perf. Synops. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 34.

Arbrisseau droit, très-glabre, haut de trois pieds, dont les rameaux sont cylindriques, articulés, blanchâtres; les articulations longues d'un pouce, marquées de deux lignes saillantes, formées presque par les feuilles décurrentes; celles-ci sont opposées, sessiles, linéaires, charnues, à demi-cylindriques, canaliculées, presque à trois faces, obtuses, de la longueur des articulations, terminées par une petite pointe, contenant dans les aisselles d'autres feuilles plus courtes.

Les fleurs sont sessiles, presque verticillées, trois environ dans chaque aisselle, opposées, situées vers l'extrémité des rameaux; deux bractées opposées aux fleurs inférieures, de la grandeur & de la forme des feuilles; celles des feuilles supérieures, ovales, lancéolées.

Cette espèce croît le long du port de la ville de Mogador, dans le royaume de Maroc. *h*

24. SOUDE tofacée. *Salsola roscacea*. Linn.

Salsola herbacea, foliis subulatis, mucronatis; calicibus explanatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 322. — Miller, Dict. n°. 3. — Letch. in Nov. Act. A. N. C. vol. 5. Append. pag. 181. — Gertn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 359. tab. 75. — Lam. Ill. Gen. tab. 181. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1310. n°. 3.

Salsola (tofacea), caule erecto, ramoso; foliis alternis, conico-subulatis, mucronatis, membranaceis corollinis purpureis. Cavan. Icon. Rav. vol. 3. pag. 44. tab. 286.

Salsola foliis conico-subulatis, mucronatis; calicibus corolliformibus, obtusis, coloratis, crenatis. Hort. Upsal. 56.

Salsola foliis ternis, floribus subulatis, ex conico-

subulatis, flares aquantibus. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 96. n°. 75.

Kali humile, alis purpureis, flarem rosaceum mentientibus. Baux. Centur. 1. pag. 9. tab. 14. fig. 2.

On distingue aisément cette belle espèce à ses calices membraneux, dont le limbe s'épanouit en une sorte d'aile campanulée, d'un rose tendre.

Ses racines sont droites, fibreuses, très-fines : il s'en élève une tige droite, cylindrique, un peu striée, très-ferme, haute de huit à dix pouces, qui s'élève quelquefois par la culture à un pied & demi ou deux pieds & plus, un peu rude, agréablement parachée de lignes longitudinales, vertes & roses, bien plus sensibles vers la base. Les rameaux sont nombreux, diffus, garnis de feuilles alternes, sessiles, très-étroites, subulées, longues d'un à deux pouces & plus, mucronées à leur sommet par une épine très-courte, un peu élargies, & presque coniques à leur base.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, ou réunies deux ou trois dans l'aisselle des feuilles, enveloppées de bractées à trois folioles, au moins une fois plus longues que les fleurs, larges & concaves à leur base, un peu membraneuses à leurs bords, subulées, mucronées à leur sommet. Le calice est membraneux, d'une seule pièce, fermé à son orifice, se développant après la fécondation en un limbe campaniforme, traversé de quelques lignes verdâtres, sur un fond de couleur rose légère, fugace, un peu lobé à ses bords.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Asie, parmi les salines. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Nota. Dans mes herborisations aux environs de la ville de Lyon, j'ai recueilli autrefois, dans des campagnes arides vers les bords du Rhône, au-delà des travaux Perrache, un *salsola* qui ne diffère de cette espèce que par des feuilles plus courtes, presque coniques ; des tiges plus roides ; des rameaux moins élanés. Cette plante étoit venue sans culture dans un champ stérile ; cependant je suis très-porté à croire qu'un hasard particulier y avoit amené quelques semences, & je ne pense pas qu'elle y soit naturelle.

25. Soude à feuilles opposées. *Salsola oppositifolia*, Desfont.

Salsola frutescens, foliis subulatis, inermibus, oppositis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 219.

Kali sculium, lignosum, floribus membranaceis. Boccon. Sic. pag. 59. tab. 31. — Tournef. Inst. R. Herb. 247.

Kali minus, tenuifolium, fruticosum, sculium. Battch. Icon. Rar. tab. 79.

Kali floridum, semine cochlear & floribus mem-

branaceis. Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 5. tab. 33. fig. 2.

Kali membranaceum, foliis angustis, conjugatis. Schaw. Specim. n°. 354.

Salsola frutescens. Cavan. Icon. Rar. n°. 312. tab. 285.

C'est une très-belle espèce, remarquable par ses feuilles opposées & par ses fleurs nombreuses, dont le calice, dilaté à son limbe, présente presque une fleur rosacée, d'un rouge tendre.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ un pied, très-rameuses ; les rameaux nombreux, glabres, tendres, noueux, opposés, garnis de feuilles sessiles, opposées, fort petites, glabres, charnues, subulées, sans pointe épineuse, un peu aigües, longues de trois à quatre lignes.

Les fleurs sont sessiles, solitaires ou réunies au nombre de trois dans l'aisselle des feuilles, munies de trois bractées petites, subulées ; l'infertilité plus grande. Leur calice est court, persistant, divisé en cinq découpures droites, elliptiques, obtuses ; elles renferment cinq étamines saillantes hors du calice, dont les anthères sont jaunâtres, tétragones ; deux styles, autour de stigmates aigus. Les semences sont roulées en coquille de limaçon, enveloppées d'une membrane légère, couronnées par un limbe campanulé, membraneux, en éventail, à cinq lobes élargis, d'un rose tendre, obtus & arrondis à leur sommet.

Cette plante croît en Sicile & dans le royaume de Tunis. Elle fleurit au commencement de l'hiver. (V. Description ex Desfont.)

26. Soude des sables. *Salsola arenaria*, Persf.

Salsola caule diffusa; foliis linearibus, pilosis; calicinis fructibus laciniis membranaceis, scariosis, venosis, ovato-oblongis, obtusis. Persf. Synops. Plant. vol. 1. pag. 296. n°. 15.

Kochia arenaria. Roth. Botan. Beytr. pag. 175.

Salsola arenaria. Roth. Flor. germ. vol. 2. App. pag. 575.

Chenopodium. Flor. weterav. pag. 356.

Camphorosma mansuetiliana. Pollich. Pal. n°. 176.

Willemetia. Moerklin.

Cette espèce est plus ou moins velue sur toutes ses parties. Ses racines sont dures, blanchâtres, & se divisent en ramifications grêles, très-longues, filiformes. Ses tiges sont droites, hautes au moins d'un pied, très-roides, pourvues de rameaux alternes, nombreux, diffus, cylindriques, blanchâtres & pubescens, garnis de feuilles très-étroites, linéaires, subulées, longues au moins d'un pouce, alternes, couvertes de poils fins ; les inférieures

contenant dans leurs aisselles d'autres feuilles plus courtes, fasciculées.

Les fleurs sont sessiles, solitaires ou réunies deux ou trois dans l'aisselle des feuilles, sur presque toute la longueur des rameaux, dépourvues de bractées. Leur calice est extrêmement velu, blanchâtre. Le fruit est couronné par un limbe membraneux, divisé en cinq lobes scarieux, blanchâtres, traversés par des veines purpurines.

Cette plante croît dans le sable, dans les contrées méridionales de l'Allemagne, & le long des bords du Rhin. Elle m'a été communiquée par M. Petsson. ? (V. f.)

27. SOUDE vermiculaire. *Salsola vermiculata*. Linn.

Salsola frutescens, foliis fasciculatis, terribus, filiformibus; floralibus ovatis, acutis, carnosius. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1315. n°. 18.

Salsola frutescens, foliis ovatis, acutis, carnosius. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 627. n°. 11. — Mill. Dict. n°. 4. — Pallas, Iter 1. Append. 103.

Salsola fruticosa, floribus spicatis, alternis, solitariis. Lœffl. Iter. 129.

Salsola (rigida), fruticans, fragilis, tomentosa; foliis carnosius, cylindricis, lanuginosis. Pallas, Ill. Plant. Faic. 1. pag. 19. tab. 11.

Kali geniculatum, aphyllanthus, gilvis paleaceis flosculis, hispanicum. Bartel. Icon. Rar. n°. 501. tab. 215. & 205, 206.

Kali fruticosum, erica folio. Buxb. Centur. 1. pag. 8. tab. 14. fig. 1. ?

Salsola (microphylla), caule fruticosa; foliis fasciculatis, minimis, terribus; floribus solitariis, in spicam densam approximatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. 45. tab. 287.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, hautes d'environ deux pieds, divisées en rameaux cylindriques, tombans, grêles, alonges, fragiles, pubescens, chargés de feuilles sessiles, alternes, velues, fort petites, cylindriques, filiformes, presque semblables à celles de la bruyère commune, contenant dans leurs aisselles d'autres feuilles fasciculées, ordinairement plus courtes. Celles qui accompagnent les fleurs sont courtes, charnues, ovales, aiguës.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, axillaires, formant par leur ensemble, sur les rameaux supérieurs, des épis nombreux, rapprochés. Elles sont accompagnées chacune de deux petites bractées courtes, ovales, ou de trois bractées si l'on prend pour telle la petite feuille florale extérieure. Le calice, environ trois fois plus long que les bractées, est divisé en cinq découpures jaunâtres,

aiguës. Il renferme cinq étamines plus longues que le calice, & dont les anthères sont échanquées à leur base. L'ovaire est globuleux; le style simple, surmonté de trois stigmates rougeâtres. Le fruit consiste en une semence solitaire, globuleuse, comprimée, enveloppée par la partie intérieure du calice, couronnée par son limbe, qui ne se montre qu'à mesure que le fruit mûrit, & qui s'épanouit en une aile membraneuse, presque à cinq lobes obtus, un peu courts, légèrement crénelés, rougeâtres.

Cette plante croît en Espagne & dans la Sibérie. *h* (V. f.)

28. SOUDE à feuilles courtes. *Salsola brevifolia*. Desfont.

Salsola fruticosa, ramissima; foliis ovatis, caneris, brevissimis, pubescentibus. Desfont. Flor. arl. vol. 1. pag. 218. Excluse Bocconi synonyma.

An kali vermiculatum, incanum, fruticans? Bartel. Icon. Rar. tab. 205.

An potius polygonum fruticosum, erectum, hispanicum? Bartel. Icon. 713.

Arbrisseau de deux à trois pieds de haut, dont les racines sont très-fortes, les tiges ligneuses, très-rameuses; les rameaux pubescens, garnis de feuilles sessiles, alternes, courtes, ovales, obtuses, pubescentes; celles des rameaux nombreuses, très-terreuses, de la grandeur & de la même forme que celles du *sedum acre*.

Les fleurs sont axillaires, sessiles, solitaires, très-nombreuses. Leur calice persiste avec le fruit, & le couronne par un limbe membraneux, campaniforme & lobé.

Cette plante croît en Sicile. Elle a été recueillie, par M. Desfontaines, dans les plumes sablonneuses des environs de Casa en Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. v.)

29. SOUDE à feuilles de genêt. *Salsola genisfoidea*. Juss.

Salsola caule fruticosa, subaphyllo; ramis numerosissimis, fasciculatis, erectis; foliis alternis, squamiformibus; calice campanulato. (N.)

Kali fruticosum, hispanicum, genisla fronde. Tourn. Inst. R. Herb. 247.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds, qui a le port d'un genêt par la disposition & la forme de ses rameaux, dont les feuilles petites & très-caducues seroient croire, au premier aspect, qu'il en est privé.

Ses tiges sont cylindriques, assez fortes, divisées en rameaux striés, qui produisent un grand nombre d'autres petits rameaux droits, ligneux,

presque fasciculés, glabres, très-roides, garnis de feuilles alternes, sessiles, grâces, courtes, fort petites, aiguës, assez semblables à de petites écailles.

Les fleurs sont avillaires, sessiles, munies de trois bractées : l'ensemble forme un épi terminal sur chaque rameau. Le calice est composé de cinq folioles concaves, membraneuses, renfermant cinq étamines, des anthères oblongues. Les semences four renfermées dans le calice persistant, couronnées par ton limbe campanulé, à cinq lobes arrondis, d'une grandeur médiocre.

Cette plante croît en Espagne. *h* (*V. f. in herb. Jussieu.*)

30. SOUDE de Caroline. *Salsola caroliniana*. Walthr.

Salsola herbacea, decumbens, glabra, foliis brevifolia, dilato-fimbriatis, spinoscentibus, levibus; floribus digyis, geminis fruticulosissimis valde turpibus; calicibus frutiferis, latis explanato-alatis. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 174.

Salsola (caroliniana), *decumbens, foliis lato-fimbriatis, spinosis levibus; calicibus axillaribus, fimbriatis.* Waltr. Flor. carol. pag. 111.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *salsola roscu*. Ses tiges sont herbacées, glabres, presque tendues sur la terre, garnies de feuilles alternes, sessiles, très-lisses, dilatées à leur partie inférieure, fimbriées vers leur sommet, terminées par une pointe épineuse. Les fleurs sont axillaires, sessiles; leurs bourgeons très-renflés; les calices dilatés en un limbe plane, membraneux, contenant deux styles.

Cette plante croît dans la Caroline, sur les côtes maritimes. (*Descript. ex Michx.*)

31. SOUDE polyclone. *Salsola polytelon*. Linn.

Salsola subulnosa, diffusa, foliis oblongis; calicibus marginatis, glomeratis, coloratis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 626. n°. 9. — Mantiss. 54. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1314. n°. 15.

Anthyllodes rotundifolia, fœcula, euphrasie floribus subulnibus. Bocc. Mus. 2. pag. 34. tab. 34.

Pedicularis minima, polytelon, humifusa. Barrel. Icon. Rar. pag. 22. n°. 214. tab. 275.

Ses tiges sont dures, médiocrement ligneuses, divisées dès leur base en rameaux nombreux, diffus, épars, en partie couchés, glabres, courts, inégaux, chargés de feuilles assez petites, oblongues ou un peu arrondies, charnues, sans pointe épineuse, alternes, sessiles, nombreuses.

Les fleurs sont sessiles, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, agglomérées. Leur calice est

d'une seule pièce, membraneux, en entonnoir, dilaté à son sommet en un limbe plane, petit, coloré, à cinq découpures.

Cette plante croît sur les côtes maritimes, en Espagne & dans la Sicile. *x*

32. SOUDE couchée. *Salsola prostrata*. Linn.

Salsola frutescens, foliis linearibus, pilosis, inermibus. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 627. n°. 10. — Pallas, Iter 1. pag. 490. — Gmel. Sibir. vol. 3. tab. 20. fig. 11. — Buxb. Centr. 1. tab. 11. fig. 2. — Amoen. Acad. vol. 2. pag. 346. — Jacq. Flor. austr. tab. 294. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1315. n°. 16.

Salsola suffrutescens, affurgens, foliis linearilanceolatis, villosis; caudibus suffragatis, floribus glomeratis. Pallas, Illustr. Plant. Fasc. 1. pag. 17. tab. 10.

Salsola caule fruticoso, ramossissimo, pilosissimo; foliis filiformibus, inermibus. Gmel. Sibir. l. c. pag. 20. tab. 10. fig. 2.

Salsola lignosa, ramis filiformibus, edicanscibus; floribus conglomerato-spicatis. Lœf. Iter. 131.

Chenopodium foliis subulatis, sericeis; forum glomerulis geminis. Haller, Helv. n°. 1575. ?

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont courtes, très-rameuses, pubescentes, cylindriques, ligneuses, qui se divisent presque dès leur base en rameaux sessiles, alongés, redressés ou droits; les inférieurs plus courts, & ne paroissant guère qu'après la floraison; les supérieurs grêles, presque herbacées, supportant les fleurs. Les feuilles sont sessiles, alternes, linéaires, planes, glabres en dessus, un peu charnues, munies en dessous & à leurs bords de quelques poils épars, aiguës, presque subulées à leur sommet, sans pointe épineuse.

Les fleurs sont situées le long des rameaux supérieurs, presque en épis, sessiles, solitaires ou quelquefois deux dans l'aisselle des feuilles. Le calice est velu, petit, à cinq découpures dilates en un limbe membraneux, ouvert, arrondi en lobes, traversé de nervures.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie, dans plusieurs autres contrées septentrionales de l'Asie, en Allemagne & en Suisse, s'il faut y rapporter la synonymie d'Haller. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

33. SOUDE de Crimée. *Salsola dasyantha*. Pall.

Salsola annua, stellata, ramosa, foliis alternis, filiformibus, pubescentibus; floribus lanuginosis. Pall. Illustr. Plant. Fasc. 1. pag. 19. tab. 11.

Salsola laniflora. Gmel. jun. Itin. 1. pag. 100. tab. 47.

Ses racines sont annuelles, alongées, presque simples, flexueuses, d'où s'élève une tige droite, haute d'environ un pied & demi, un peu striée, rougeâtre, cylindrique, garnie de rameaux alternes, étalés, revêtus de quelques poils blanchâtres. Les feuilles sont alternes, linéaires, pubescentes, fasciculées sur les rameaux stériles.

Les fleurs sont sessiles, axillaires, au nombre de deux ou trois dans chaque aisselle, accompagnées de deux feuilles latérales. Leur calice est presque globuleux, à cinq découpures, couvert d'un duvet lanugineux & blanchâtre; cinq étamines saillantes dans leur parfait développement; deux stigmates sessés, rougeâtres, plus longs que le calice. Le fruit est renfermé dans le calice, qui se développe en un limbe plane, rouffêtré, à découpures lancéolées, denticulées en scie à leurs bords.

Cette plante croît en Russie & dans la Crimée; elle fleurit en juin, & donne ses semences mûres en octobre. Elle a de grands rapports avec le *salsola prostrata*. (Descript. ex Pall.)

34. SOUDE en arbre. *Salsola arborefcens*. Linn. f.

Salsola frutescens, foliis femicylindricis, inferioribus conjugatis. Linn. f. Suppl. pag. 173. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1316. n°. 21.

Kali fruticosum, incanum; foliis ex succis. Buxb. Cent. 1. pag. 9. tab. 15. 2. — Willd.

Ses tiges sont droites, ligneuses, un peu courbées à leur base, ascendantes, de couleur blanche, rameuses, garnies de feuilles sessiles, alternes, à peine charnues, lisses à leurs deux faces, à demi-cylindriques; celles de la base des rameaux très-souvent gémminées, deux par deux à chaque point d'insertion. Les fleurs sont disposées en un épi terminal; les calices scarieus, rosacés, surmontés d'un limbe scarieus, à cinq lobes obtus.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Descript. ex Linn. f.)

35. SOUDE hérissée. *Salsola echinus*. Labill.

Salsola fruticosa, glabra, foliis subulatis, mucis; spinis divaricatis, floriferis. Labill. Decad. Syr. 2. pag. 10. tab. 5.

Salsola (macronata), fruticosa, ramulis mucronatis; foliis subulatis, inermis. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 56.

Anabasis (spinosissima), foliis subulatis; spinis ramifera, floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1319. n°. 4.

Anabasis frutescens, ramis nudis, spinosissimis. Linn. f. Suppl. pag. 173. — Vahl, Symb. 1. pag. 24. — 3. pag. 45.

Cette espèce est très-remarquable par les petites

rameaux, qui ressemblent à de longues épines très-dures, très-piquantes, chargées de fleurs.

Ses tiges sont dures, glabres, ligneuses, divisées presque dès leur base en longs rameaux diffus, étalés, tombans ou tressés, lisses, revêtus d'une écorce blanche, un peu jaunâtre, & produisant à leur partie supérieure un grand nombre d'autres petits rameaux roides, courts, florifères, subulés, terminés en une pointe épineuse, longs d'un à deux pouces, nus à leur partie supérieure. Les feuilles naissent particulièrement sur les longs rameaux; elles sont épaisses, presque fasciculées, petites, roides, glabres, subulées, d'un vert-pâle, point mucronées, caduques; les rameaux à fleurs sont presque dépourvus de feuilles, si l'on en excepte quelques petites écailles presque imbriquées, situées à leur base.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, alternes ou éparées, placées le long des petits rameaux épineux. Elles sont enveloppées de bractées à trois folioles dures, roides, très-fertées, lancéolées, aiguës, vertes, carénées, blanchâtres sur leur carène & à leurs bords. Le calice est divisé en cinq ou six découpures profondes, membraneuses, presque scarieuses, lancéolées, droites, à peine de la longueur des bractées, quelquefois plus longues, s'épanouissant à leur sommet en un limbe ouvert, presque campanulé, d'une légère teinte purpurine, couronnant les semences. Les filamens des étamines sont très-courts, les anthères renfermées dans le calice. L'ovaire est globuleux; le style filiforme; le stigmate légèrement échancré. Il lui succède une semence orbiculaire, un peu comprimée, roulée en coquille de limaçon, environnée d'une pellicule transparente, renfermée en vessie.

Cette plante croît dans la Syrie, sur les montagnes du Liban, en Perse, aux environs d'Alexandrie. (V. f. Commun. Labill.)

36. SOUDE effeuillée. *Salsola aphylla*. Linn. f.

Salsola arborefcens, aphylla, articulata, foliis brevissimis, ovatis, adpressis, acutis, caducis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1316. n°. 20.

Salsola fruticosa, subaphylla, ramis flosculorum rudimento cooperitis. Linn. f. Suppl. pag. 173.

Salsola arborefcens, subaphylla. Thunb. Prodr. 48.

Caroxilon salsola. Thunb. Dissert. nov. Plant. Gener. 2. pag. 38.

Caroxilon d'Afrique. Lam. Dict. vol. 1. p. 639.

Quoique cette plante présente dans ses fleurs quelques caractères qui paroissent devoir l'éloigner des soudes, cependant son port, ses semences roulées

roulées en spirale, son calice, ses deux bractées, le nombre & la situation des étamines m'ont déterminé à le faire rentrer dans ce genre.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de cinq à six pieds, extrêmement rameux, & dont les rameaux sont diffus, étalés, nus, très-irréguliers, flexueux, qui se divisent en d'autres beaucoup plus courts, blanchâtres, pubescens, chargés seuls de feuilles & de fleurs. Les premières sont fort petites, presque globuleuses, courtes, imbriquées, obtuses. Les fleurs sont feilées, axillaires. Les autres détails ont été présentés à l'article CAROTTION d'Afrique, vol. 1. pag. 636.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

37. SOUDE arbutif. *Salsola arbutifolia*. Pall.

Salsola fruticosa, foliis fasciculatis, teretibus, basi attenuatis, incurvis; floribus solitariis, sparsis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1315. n°. 19.

Salsola arbutifolia. Pall. Iter 1. Append. n°. 102. tab. K.

C'est un petit arbutif, haut d'environ un pied, diffus, étalé, roide, difforme, irrégulier, dont la partie inférieure de la tige est de la grosseur du doigt, inclinée vers la terre, redressée, à rameaux alternes, glabres, presque en buisson, revêtus d'une écorce blanche, chargés de bourgeons écaillés. Les feuilles sont éparées, presque fasciculées, charnues, cylindriques, obtuses, un peu rétrécies à leur base, d'un vert gai, très-glabres, caduques.

Il sort de chaque bourgeon une ou deux fleurs sessiles, ordinairement accompagnées de trois feuilles persistantes jusqu'à la maturité des semences. Le calice est jaunâtre, quelquefois un peu rougeâtre. L'enveloppe particulière qui entoure les semences est à cinq découpures conniventes au sommet des semences, & qui s'élargissent en rosette.

Cette plante croît dans le désert de la Tartarie, le long des fleuves, sur le bord des lacs. (Description. ex Pall.)

38. SOUDE glauque. *Salsola glauca*. Bieb.

Salsola fruticosa, erecta, glaberrima, foliis semiteretibus, filiformibus; calicibus solitariis, bracteatis; fructibus explanatis, hyalinis. Bieberst. Tableau. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 35.

Kali orientale, fruticosum, altissimum; floribus fluminibus purpuris. Tournef. Coroll. pag. 18.

Cette plante est citée dans un ouvrage intitulé de *Tableau des provinces situées sur la côte occidentale de la mer Caspienne, entre les fleuves Terek & Cour*, mentionné dans le *Journal botanique de Schrader, an Botanique. Tome VII.*

née 1799. Ses tiges sont droites, ligneuses, très-glabres; les feuilles à demi-cylindriques, filiformes, glabres, charnues; les fleurs solitaires dans l'aisselle des feuilles, accompagnées de bractées. Les calices s'épanouissent à leur sommet en un limbe diaphane qui couronne les semences.

Cette plante croît sur les revers des montagnes, du côté de la mer Caspienne, entre Kuba & l'ancienne Schamachie. h

39. SOUDE à feuilles d'arroche. *Salsola arthropifolia*. Spreng.

Salsola caule compresso, herbaceo; foliis lanceolato-oblongis, angulato-dentatis; calicibus fructibus margine orbiculari hinc emarginato. (N.)

Kochia (dentata), foliis lanceolatis, sinuato-dentatis; stylo subtripartito. Willd. Hort. Berol. Faicul. 3. pag. 28. tab. 28.

Salsola (platyphylla), caule herbaceo, diffusè ramossimo; foliis ovato-oblongis, inaequaliter acutiusque angulato-dentatis; ramulis floridis paniculatis; floribus trigynis; calicibus fructiferis, alii horizontali, denticulatis cinctis. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 174.

Salsola (platyphylla), caule herbaceo, ramossissimo; foliis lato-lanceolatis, sinuato-dentatis; floribus paniculatis, trigynis; calicibus fructibus margine orbiculari hinc emarginato. Perfoon, Synops. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 37.

Salsola (radiata), foliis lato-lanceolatis, dentatis; calice coronula denticulata cincto; semine orbiculari, hinc emarginato. Desfont. Catal. Paris. & Annal. Mus. Hist. Nat. Paris. 2. pag. 28. tab. 1c.

Salsola chenopodioides & latifolia, in plur. hortis culta.

Cette plante singulière s'écarte par son port, & surtout par ses feuilles, de toutes les autres espèces de soude: elle ne s'en rapproche que par quelques parties de sa fructification; elle a plutôt l'aspect d'un *chenopodium*, mais elle en diffère par ses fruits; elle offre aussi des ressemblances avec la fructification des *anabasis*. Il suit de toutes ces considérations, qu'elle pourroit former un genre séparé s'il se présentait quelques autres espèces à lui réunir. Elle étoit entrer dans les *kochia* de Koch.

Ses tiges sont glabres, herbacées, aplaties, striées ou cannelées, divisées en rameaux nombreux, diffus, très-étalés, munis de quelques poils rares; les jeunes rameaux pubescens, garnis de feuilles alternes, planes, oblongues lancéolées, élargies, longues d'environ deux pouces, anguleuses, dentées & à pinnules ciliées à leur contour, veines & glabres à leurs deux faces, sinuées à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base.

De l'aisselle des feuilles supérieures sortent de petits rameaux presque paniculés, courts, à peine feuillés, chargés de petites fleurs verdâtres, solitaires ou réunis par petits paquets, sessiles, munis souvent d'une bractée subulée, caluque. Le calice est à cinq découpures vertes, un peu membraneuses à leurs bords, obtuses; les styles au nombre de trois. Les calices se développent avec les fruits, & se produisent à leur sommet une aile membraneuse, orbiculaire, denticulée; les semences échancrées à un de leurs côtés, & fort petites: à l'époque de leur maturité la plante a perdu toutes ses feuilles; ce qui la rend alors méconnaissable, & lui donne l'apparence d'une autre plante.

Cette espèce croît dans l'Amérique septentrionale, au pays des Illinois. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O (V. v.)

Nota. On en cultive au Jardin des Plantes de Paris une espèce voisine de celle-ci, sous le nom de *Salsola Lasipolia*. Ses feuilles sont oblongues, denticulées, vertes, & nitres, vertes; elles ressemblent assez à des Feuilles de chicorée: je n'en connois pas la fructification; & elle vient de l'Asie.

* *Suaeda*. Forsk.

40. SOUDE à baies. *Salsola baccata*.

Salsola foliis teretibus, nitidis, punctatis; fructu baccato. Forsk.

Suaeda baccata. Forsk. Flor. ægypt.-arab. p. 69. n° 13.

Ses tiges sont ligneuses, diffuses, garnies de feuilles ovales, obtuses, entaillées, à demi-cylindriques, charnues, luisantes, ponctuées; les inférieures souvent subulées. Les fleurs sont sessiles, agglomérées dans l'aisselle des feuilles; leur calice charnu, à cinq découpures; point de corolle; cinq étamines; un style à trois divisions terminées par des stigmates subulés. Le fruit est une sorte de baire enveloppée par le calice, à cinq valves, renfermant plusieurs semences.

Cette plante, d'après les caractères que Forskhal attribue à ses semences, s'écarte des *salsola* par ses fruits en capsules bacciformes, à cinq valves, renfermant plusieurs semences. Il est à présumer que ces cinq valves sont les cinq découpures du calice; & ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'il renferme plusieurs semences. Cette espèce croît dans les campagnes, aux environs d'Alexandrie, où elle fleurit vers la fin de septembre.

41. SOUDE farineuse. *Salsola farinosa*.

Salsola foliis sumiteretibus, farinosis, non punctatis; fructu peltato. Forsk.

Suaeda vera. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 69. n° 16.

Arbusteau dont les rameaux sont diffus, d'un pourpre-violet dans leur jeunesse, quelquefois roussâtres, garnis de feuilles charnues, à demi-cylindriques, planes en dessus, un peu recourbées, obtuses, point ponctuées, couvertes d'une légère poussière farineuse, fugace; les feuilles d'un vert-bleuâtre lorsqu'elles en sont dépourvues. Les fleurs sont solitaires ou quelquefois agglomérées dans l'aisselle des feuilles; elles n'ont point de corolle; leur calice est à cinq découpures; les stigmates sont à trois ou quatre découpures presque laciniées, membraneux, rougeâtres, saillans avant le développement de la fleur; ils forment ensuite une sorte de tête plane, peltée, de la longueur des étamines & du calice.

Cette plante croît en Egypte.

42. SOUDE à feuilles globuleuses. *Salsola globulifolia*.

Salsola foliis carnosiss, ovatis, subglobosis, farinosis, punctatis, stigmatibus subulatis. Forsk.

Suaeda vermiculata. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 70. n° 18.

Cette plante, d'après Forskhal, a de grands rapports avec le *salsola vermiculata*; elle en diffère par la privation des trois folioles ou bractées qui enveloppent les fleurs dans cette dernière. Ses tiges sont diffuses, ligneuses; ses feuilles charnues, très-rapprochées, presque globuleuses; les inférieures plus alongées, ovales, ponctuées de blanc, couvertes d'une poussière farineuse bleuâtre, fugace. Les fleurs sont solitaires, axillaires & sessiles; les stigmates rouges ou verdâtres, subulés, saillans hors de la fleur avant son épanouissement, de la même longueur que les étamines.

Cette plante croît dans les environs d'Alexandrie, le long des rivages, dans les campagnes; elle fleurit au commencement du mois d'Octobre.

43. SOUDE annulaire. *Salsola annularis*.

Salsola foliis sparsis, carnosiss, linearibus, utrinque convexis, obtusis. Forskhal.

Suaeda trifurcata. Forsk. Flor. ægypt.-arab. p. 70. n° 19.

C'est un arbusteau qui s'élève à la hauteur de quatre ou cinq pieds, dont les feuilles sont charnues, éparées, presque sessiles, lineaires, longues d'un pouce, convexes à leurs deux faces, obtuses, point farineuses. Les fleurs sont sessiles, disposées en petites têtes dans l'aisselle des feuilles à la partie supérieure des rameaux. Leur calice est divié en cinq folioles verdâtres, ouvertes, concaves, opposées aux étamines. On trouve, entre le pistil & les étamines, un appendice verdâtre, élevé en forme d'anneau. L'ovaire est globuleux, plane, dilaté à son sommet, duquel sortent trois

Styles filiformes, subulés, trois fois plus longs que l'ovaire, étalés & filiformes tant que la fleur est fermée, rapprochés quand elle est développée. Le fruit est une petite capsule membraneuse, entièrement remplie par la semence.

Cette plante croît dans l'Arabie.

44. SOUDE monoïque. *Salsola monoica*.

Salsola caule fruticoso, difuso; floribus masculo-um germinis supra oculo-um, femineis trigynis. Forskhal.

Suaeda monoica. Forsk. Flor. ægypt.-arab. p. 70. n°. 20.

Ses tiges sont ligneuses, diffuses; ses feuilles alternes, linéaires, obtusés, charnues, à peine longues d'un pouce, ouvertes, comprimées, jointes farineuses, poudrées. Les fleurs sont monoïques; les mâles & femelles réunies dans le même épiquet; elles sont sessiles, axillaires, agglomérées; les filaments plus grandes, dépourvues de style saillant. Lorsque le calice est ouvert, il offre cinq étamines étalées & un ovaire filiforme, plus court, plus épais que les filaments, surmonté à son sommet d'un cercle membraneux & blanc; du centre s'élèvent deux styles courts, roussâtres, sessiles. Les fleurs femelles sont plus petites, munies de trois styles divergens, saillans hors de la fleur avant son épanouissement. Les découpures du calice sont conniventes, & renferment une semence assez grosse.

Cet arbrisseau s'élève peu & fleurit pendant toute l'année. Il croît dans l'Arabie.

Les Arabes en retirent, par la combustion, un sel alcali qu'ils font dissoudre dans l'eau, & dans laquelle ils lavent leurs vêtements avant d'employer le savon. Pour obtenir ce sel, ils creusent une fosse en terre, la recouvrent de bois & de charbon, jettent par-dessus cette couche qu'ils appellent *asaf*, y mettent le feu. Le sel se réunit au fond de la fosse sous la forme d'une scorie noirâtre. Il s'en fait un grand commerce.

45. SOUDE à calices divergens. *Salsola divergens*.

Salsola foliis linearibus, sarinosis; calicibus fructibus carnosius, divergentibus; stigmatibus triplisibus. Forsk.

Suaeda hortensis. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 71. n°. 21.

Arbrisseau extrêmement rameux & diffus, qui s'élève à la hauteur de deux pieds. Ses feuilles sont charnues, linéaires, longues d'un pouce, planes en dessus, pourlées de blanc & recouvertes d'une forme bleuâtre, fugace. Les fleurs sont sessiles, agglomérées dans l'aisselle des feuilles, quelquefois incomplètes; elles ont trois stigmates saillans, à peine réunis à leur base. Les

étamines sont peu sensibles dans quelques fleurs. La semence est enveloppée par un tegument verdâtre, entourée par le calice presque divergent.

Cette plante se cultive dans les jardins du Caire en Égypte. Elle croît naturellement dans les lieux incultes, aux environs de la ville de Taes.

* *Salsola (suxia), foliis oblongis, interdum linearibus, vix folliculosis.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 79. n°. 17. (suxia).

* Espèces douteuses ou moins connues.

* *Salsola (coquimbana), aphylla, calicibus succulentis, diaphanis.* Molin. Hill. rar. Chili, pag. 36.

* *Salsola (orientalis), suffrutescens, erecta, ramosa, villosa, foliis imbricatis, subrotundatis.* Gmel. Syst. nat. vol. 2. pag. 453. — S. G. Gmel. Itin. 4. pag. 47. tab. 5.

* *Salsola (longifolia), fruticosa, prostrata; foliis inermibus, teretibus, glabris, sarinosis.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 55. n°. 86.

Ses tiges sont ligneuses & couchées; les feuilles charnues, linéaires, cylindriques, presque triangulaires, opposées, acuminées, le plus souvent canaliculées en dessus, longues, d'un bleu verdâtre, couvertes d'une farine fugace. Les fleurs sont sessiles, agglomérées, quelquefois hermaphrodites, le plus grand nombre femelles; les semences surmontées à leur sommet d'une membrane pétaloïde, d'un blanc lavé de rouge. Elle croît en Égypte, dans les déserts.

* *Salsola (articulata), caule fruticoso, decumbente, aphylla; ramis floriferis, articulatis; floribus oppositis ad apices articulorum.*

Ses tiges sont ligneuses & couchées, articulées, dépourvues de feuilles; les rameaux opposés, & articulés renfés, cylindriques, terminés à leur sommet par deux petites dents aiguës; les fleurs opposées, sessiles à l'extrémité des articulations; les unes femelles, d'autres mâles ou hermaphrodites; les semences en spirales, solitaires dans une substance pulpeuse, couronnées par un limbe rosacé. Elle croît dans le sable, aux environs des pyramides d'Égypte. Elle appartient aux salicornes par son port, & plutôt aux *anabasis* qu'aux *salsola* par sa fructification. Je la soupçonne la même plante que l'*anabasis aphylla*.

* *Salsola (inermis), fruticosa, aphylla, ramis inermibus, bracteis sarinosis-villosis.* Flor. ægypt.-arab. pag. 57. n°. 89.

Ses tiges sont ligneuses & couchées; les rameaux alternes, dressés, velus, dépourvus de feuilles; les fleurs sessiles, latérales, alternes, munies de trois bractées un peu arrondies, ac-

minées, convexes, succulentes, velues, farineuses, un peu membraneuses à leurs bords; quelques-unes de ces fleurs femelles, les autres hermaphrodites; les semences couronnées par une membrane violette, pétaloïde. Elle croît dans les environs d'Alexandrie.

* *Salsola* (imbricata), fruticosa, diffusa, inermis, ramis v. llofis, ramulis imbricatis; bracteis obtusis, nudis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 57. n°. 50.

Ses tiges sont ligneuses, diffuses; les rameaux roides & tomenteux, point de feuilles; des bractées presque imbriquées, nues, obtuses; toutes les fleurs hermaphrodites; trois styles de couleur brune; cinq étamines; les anthères droites, hautes; les semences surmontées d'un limbe rosacé. Elle se trouve en Arabie, dans les lieux stériles. C'est une plante qui plaît beaucoup aux chameaux.

* *Salsola* (vermiculata?), foliis ternis, oppositis, fœtem involucentibus. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 57. n°. 91.

Cette plante n'est pas le *salsola vermiculata* de Linné. Ses tiges sont articulées; les articulations renflées à leur sommet, longues d'un demi-pouce; les feuilles opposées trois par trois; les fleurs placées dans leurs aisselles; les filaments blancs & comprimés; les anthères rouges. Les fleurs femelles & les fruits n'ont point été observés. Elle croît en Égypte.

* *Salsola* (tetrandra), fruticosa, incumbens, inermis, floribus brachiis oppositis, tetrandris. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 58. n°. 92.

Feuilles & rameaux opposés, tomenteux; fleurs latérales; trois bractées charnues, celle du milieu hémisphérique; un style; un stigmate partagé en deux; quatre étamines. Cette plante croît dans les environs d'Alexandrie.

Sous-arbrisseau, Arbuste. *Suffrutex.* C'est une plante à tige ligneuse, ordinairement très-inférieure à l'arbrisseau par sa grandeur, qui ne s'élève guère plus que les herbes, mais dont il est difficile de fixer les caractères, à moins qu'on ne les borne aux plantes ligneuses dont les branches ne produisent point de bourgeons, ainsi qu'il faut faire entrer parmi les sous-arbrisseaux ou arbutus des plantes qui rentrent parmi les arbrisseaux, & presque parmi les arbres, par leur élévation & la grosseur de leur tige.

Souslignieuse (Tige). *Suffruticosus, frutescens caulis.* Lorsque l'on considère les tiges relativement à leur durée ou à leur consistance, on dit qu'elles sont souslignieuses lorsque leur base subsiste sensiblement, tandis que les rameaux qu'elle produit, périssent presque entièrement tous les hi-

vers, comme dans le *solanum dulcamara*, le *salix retusa*, &c.

SOYEUSES (Feuilles). *Sericea folia.* Les feuilles prennent ce nom lorsqu'elles sont chargées de poils mous, couchés & luisants, qui leur donnent un aspect soyeux & satiné, comme on peut le remarquer dans le *persea argentea*, l'*archimilla argentea*, le *potentilla argentea*, &c.

SPADICE. *Spadix.* C'est un axe simple ou rameux, qui supporte des fleurs disposées en une sorte de colonne ou de grappe, & qui sortent ordinairement d'une spathe ou membrane quelquefois colorée, tantôt entière, tantôt divisée, & dans laquelle les fleurs étoient renfermées avant leur épanouissement. Ce même axe prend le nom de *rachis* dans les graminées. Le spadice est simple dans l'*arum*, le *calla*; il est rameux dans le palmier. Dans le spadice proprement dit, la colonne ou la grappe de fleurs est renfermée en totalité dans une ou deux spathes; mais dans le faux spadice (les orchis) la colonne de fleurs a autant de feuilles florales qu'il y a de fleurs.

SPANDONCEA. *Spandoncea.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polycétées, régulières, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *cajup*, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, ailées, avec une impaire; les pédoncules solitaires, axillaires, supportant deux ou trois fleurs.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq pétales égaux & réguliers; six étamines libres; un style; une gousse à plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice campanulé, à cinq demi-divisiones ovales, un peu aiguës.

2°. Une corolle régulière, campaniforme, composée de cinq pétales ovales, entiers, plus longs que le calice.

3°. Dix étamines insérées à la partie inférieure du calice, dont les filaments sont libres, arqués, un peu renflés à leur base, dont cinq alternent avec les pétales, & cinq autres opposés aux pétales, terminés par des anthères oblongues, obtuses, à deux loges.

4°. Un ovaire supérieur, comprimé, en forme de faux, pédicellé, latéral, surmonté d'un style aigu, terminé par un stigmate court.

Le fruit est une gousse oblongue, arquée, contenant plusieurs semences.

Observations. I. Ce genre a été consacré, par M. Desfontaines, à M. Gerard Van-Spendonck, célèbre peintre de fleurs, professeur d'iconographie au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. En appelant cet arbrisseau du nom de *spendonck*, dit M. Desfontaines, j'ai voulu consacrer un souvenir à l'amitié, & par un monument pris dans la nature même, perpétuer la mémoire de cet artiste, dont les pinceaux la représentent avec tant de vérité dans une de ses plus aimables productions, & donner à des fleurs fragiles & périssables des grâces immortelles.

II. Ce genre est très-voisin des *casia*; cependant il en est évidemment distinct en ce que les calices ont leur calice découpé jusqu'à la base, leurs pétales ouverts & inégaux, les étamines point appliqués circulairement contre la corolle, les trois filaments inférieurs plus longs que les autres, & les supérieurs plus courts que ceux des côtés, portant des anthères fort petites, ordinairement stériles; enfin les feuilles des calices sont ailées, sans impaire.

E S P È C E.

SPANDONCKEA à feuilles de tamarin. *Spandonckea tamarindifolia*. Desfont.

Spandonckea foliis alternis, impari-pinnatis; foliis parvis, numerosissimis; pedunculis axillaribus, solitariis, submultifloris. (N.)

Spandonckea tamarindifolia. Desfont. Décad. philosph. polit. & littér. 7. pag. 259.

Cadia purpurea. L'hérit. Magaf. encyclop. 5. pag. 29. — Air. Hort. Kew. vol. 5. pag. 492. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 548. — Persoon, Synops. Plant. vol. 1. pag. 461.

Cadia. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 90. n°. 76.

Panciatia purpurea. Piccivoli. Hort. Panivat. 9. Icon.

Arbrisseau très-élégant, dont la tige est droite, cylindrique, haute d'environ huit pieds, divisée en rameaux touffus, inclinés vers la terre, & couverts à leur sommet d'un léger duvet. Les feuilles sont alternes, nombreuses, persistantes pendant l'hiver, ailées, avec une impaire; composées de vingt à vingt-cinq paires de folioles linéaires, obuses, lisses, glabres, d'un vert-clair, très-proches les unes des autres, & souvent un peu échanquées à leur sommet. Le pétiole est pubescent, muni à sa base de deux stipules latérales, très-petites, sétacées, caduques.

Les fleurs sont axillaires, supportées par des pédoncules longs d'environ deux pouces, quelquefois uniflores, plus ordinairement garnis de deux ou trois fleurs pédicellées, pendantes, ac-

compensées d'une petite bractée simple ou ternée. Chaque fleur a un pouce de diamètre, & neuf lignes de longueur. Leur calice est campanulé, à demi-divisé en cinq découpures ovales, un peu saillies, pubescentes, & si on l'observe intérieurement on aperçoit dans le fond dix petits rayons divergens, qui partent du centre & le prolongent jusqu'à la circonférence. La corolle est au moins une fois plus longue que le calice; les pétales se recouvrent latéralement par les bords; ils sont d'abord de couleur blanche; ils se teignent ensuite d'une belle couleur rose.

Cette plante est originaire d'Abissinie. Elle a fleuri, pour la première fois, dans les serres du Jardin des Plantes au commencement de brumaire an 5, de graines envoyées par le chevalier Bruce. On l'abrite dans les serres-chaudes pendant l'hiver. f. (P. v.)

SPARGANOPHORE. *Sparganophorus*. C'est un genre établi par Gaertner, qui n'est qu'un démembrement de celui des *ethalia*, adopté par M. Lamarck dans ses *Illustrations des genres*, & par Michaux dans sa *Flore de l'Amérique septentrionale*, auquel il ajoute une nouvelle espèce.

Ce genre appartient à la famille des corymbifères; il a des rapports avec les *ethalia*, & comprend des plantes exotiques à l'Europe, dont les fleurs fasciculées sont axillaires, stériles, agglomérées, quelquefois solitaires & terminales; les feuilles presque entières.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice imbriqué, presque globuleux; des fleurs sous hermaphrodites; une semence couronnée par une sorte de cupule cartilagineuse; un réceptacle nu.

C A R A C T È R E G É N É R I Q U E.

Les fleurs sont toutes fasciculées, hermaphrodites & fertiles; elles ont :

1°. Un calice commun, presque globuleux, composé d'écaillés imbriquées, inégales, ouvertes ou un peu recourbées à leur sommet.

2°. Une corolle composée de fleurs nues hermaphrodites, infundibuliformes, dont le limbe se divise en cinq découpures égales.

3°. Cinq étamines synergènes, dont les filaments sont capillaires; les anthères oblongues, réunies en cylindre.

4°. Un ovaire prismatique, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates recourbés.

Les semences sont nues, presque tétragones, souvent un peu turbinées à leur base, surmontées d'une couronne en forme de cupule, entière, luisante, presque cartilagineuse.

Le réceptacle est nu, plus ou moins convexe.

Observations. Il est évident, d'après les détails que nous venons de présenter, que ce genre est assez bien distingué des *ethulia*, principalement par la contenance en forme de cupule, dont les semences sont surmontées, & qui forme presque une sorte de calice propre. Il est vrai que celles des *ethulia* offrent un rebord qui approche de ce caractère, mais ce n'est qu'un bourrelet très-court, à peine sensible. D'ailleurs, ce qui peut déterminer en faveur de l'adoption de ce nouveau genre, c'est son port, qui n'est plus le même que celui des *ethulia*, les fil us étant, ou terminales & foliaires, ou réunies en paquets sessiles & axillaires. Quant au *strachium* de Brown, il a trop de rapport avec ce genre pour ne pas y être réuni. Peut être même que le *grangea* d'Adanson devoit aussi rentrer dans ce genre à cette plante étoit mieux connue.

ES P È C E S.

1. SPARGANOPHORE verticillé. *Sparganophorus verticillatus*. Mich.

Sparganophorus foliis setaceo linearibus, verticillatis; caulibus summis subuniifloris; pappo campanulato, quinque dentato. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 95. tab. 42.

Ethulia (uniiflora), caule uniiflora; foliis verticillatis, floribus purpureis. Walther, Flor. carol. pag. 195.

Ethulia (uniiflora), foliis linearibus, glabris, verticillatis; caule subuniiflora. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1742. n° 7.

Ses tiges sont droites, herbacées, glabres, striées, cylindriques, hautes de six à huit pouces, garnies de feuilles sessiles, lineaires, très-étroites, presque setacées, disposées en verticilles au nombre de cinq à six, entières, aiguës; les verticilles inférieurs très-rapprochés; les supérieurs bien plus écartés les uns des autres.

Les fleurs sont foliaires, rarement deux, soutenues par un pédoncule droit, terminal, simple, uniiflora. Le calice est presque globuleux, composé d'échelles imbriquées, lineaires, étroites, oblongues, inégales, cartées & même un peu recourbées à leur sommet. La corolle est purpurine, formée de fileurs tous hermaphrodites; les semences un peu anguleuses, presque à cinq angles, surmontées d'une couronne campanulée, légèrement cartilagineuse, entière, munie de cinq petites dents.

Cette plante croît dans les terrains inondés, depuis la Caroline jusque dans la Floride. (*Dejeux Mich.*)

2. SPARGANOPHORE à fil us axillaires. *Sparganophorus strachium*.

Sparganophorus floribus axillaribus, sessilibus, omnibus trifidis. Swartz, Prodr. pag. 111. Sub *ethulia*. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1740. n° 3.

Strachium 1. Brown, Jam. p. 312. tab. 34. fig. 2. — Juss. Genet. Plant. pag. 184.

Grangea. Adanson, Fam. des Plantes, vol. 2. pag. 121.

Cette espèce, qui n'est encore qu'imparfaitement connue, a des feuilles entières, alternes; des fleurs sessiles, agglomérées dans l'aisselle des feuilles. Leur calice est composé d'échelles imbriquées, ouvertes; la corolle formée de fileurs tubuleux; ceux du centre à quatre découpures; ceux de la circonférence à trois divisions. Selon Swartz, ces fileurs n'ont tous que trois découpures. Les semences sont surmontées d'une membrane tunulée, à quatre crénelles à ses bords.

Cette plante croît à la Jamaïque. ☉

3. SPARGANOPHORE porte-bandeau. *Sparganophorus fasciatus*.

Sparganophorus foliis ovato-lanceolatis, subdentatis; floribus axillaribus, sessilibus, aggregatis. Lam. Illustr. Gener. tab. 670. — Germ. de Fruit. & Sem. tab. 165.

Ethulia (sparganophora), floribus sessilibus, lateratibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1171. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1740.

Ethulia nodiflora. Lam. Encycl. vol. 2. pag. 357. n° 2.

En rappelant cette plante dans ce genre, nous renvoyons à l'article cité plus haut de cet ouvrage, pour la description & le reste de la synonymie.

SPARGOUTE. *Spergula*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, de la famille des Caryophyllées, qui a des rapports avec le *cerastium* & avec les *arnica*, & qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont étroites, verticillées avec des stipules, ou opposées sans stipules; les fileurs axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq divisions; cinq pétales entiers; six étamines; cinq styles; une capsule à une loge, à cinq valves; un réceptacle libre.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en cinq folioles persistantes, ouvertes, ovales, concaves, obtusées.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ovales, concaves, très-entiers, plus grands que le calice.

3°. Dix étamines, dont les filamens sont subulés, plus courts que la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire ovale, surmonté de cinq styles filiformes, droits, réfléchis, terminés par des stigmates un peu écartés.

Le fruit est une capsule ovale, à une seule loge, à cinq valves, enveloppée par le calice, renfermant des semences nombreuses, globuleuses, un peu comprimées, petites, quelquefois environnées d'un rebord écarté.

Le réceptacle des semences libre & central.

Observations. Les espèces renfermées dans ce genre forment deux divisions très-remarquables ; dans les unes les feuilles sont ordinairement verticillées & munies de stipules à leur base ; dans les autres elles sont opposées, ou fasciculées, dépourvues de stipules.

Les dernières ont la plupart tellement le port des *Jugina*, qu'il est difficile au premier aspect de les en distinguer. Mais dans les *Jugina* toutes les parties de la fructification sont constamment partagées en quatre : le calice, la corolle, les étamines, les styles & la capsule. Les variétés, dans les *Spergula*, ne portent que sur le nombre des étamines de cinq à dix ; les divisions du calice, de la corolle, sont constantes.

Ce genre diffère des *arenaria*, dont il a le port, en ce que ses capsules se divisent en cinq valves jusqu'à leur base. Dans les *arenaria*, qui d'ailleurs n'ont que trois styles, les capsules ne sont divisées en cinq qu'à leur sommet. Les *cerastium* ont le même caractère, & de plus leurs pétales biffés.

Ainsi les *spargouttes*, quoique très-rapprochées de plusieurs autres genres, soit par leur port, soit par leur fructification, offrent néanmoins des caractères assez constants dans leur calice à cinq folioles, dans leurs pétales entiers, dans les cinq valves de leur capsule, pour être assez facilement distingués.

ES P È C E S.

* Feuilles verticillées ; des stipules à leur base.

1. SPARGOUTTE des champs. *Spergula arvensis*.

Spergula foliis verticillatis ; seminibus rotundatis, utrinque convexis, submarginatis. (N.)

Spergula foliis verticillatis, floribus decandris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 630. n°. 1. — Hort. Cliffort. 173. — Flor. Suec. 477, 419. — Roy. Lugd. Bat. 451. — DuRoi. Cult. 6. p. 149. tab. 1.

— Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 153. — Gunn. Norv. n°. 20. — Pollich. Pal. n°. 446. — Scopol. Carn. n°. 542. — Hoffm. Germ. 160. — Rorh. Germ. vol. 1. pag. 195. — Il. pag. 504. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 54. n°. 691. — Idem, Illustr. Gener. tab. 392. fig. 1. — Curtis, Lond. Icon. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 170. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 368. — C. L. Flor. dan. tab. 1033. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 818. n°. 1. — Germ. de Fruct. & Sem. tab. 130.

Alfne foliis verticillatis, seminibus rotundis. Hall. Helv. n°. 873.

Alfne floribus decandris, pentagynis ; foliis verticillatis. Scop. Carn. edit. 1. pag. 499. n°. 5. — *Spergula frutic. pendulo.* Flor. lappon. 180.

Spergula. Dodon. Pempt. pag. 547. Icon. — Gerard, Hilt. 1225. Icon. — Park. Theat. 562. Ic.

Alfne, spergula diffusa, major. C. Bauh. Pin. 251. — Tour. Inst. R. Herb. 243.

Sagina spergula, polygonon vagi. Lobel. Ic. 803.

Spergula. J. Bauh. Hilt. 3. pag. 722. Icon. — Dalech. Hilt. 2. pag. 1331. Icon.

S. Spergula (geniculata), glabra, caule elongato, ramis filisque ad nodos verticillatis. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 522. n°. 3.

Ses racines sont grêles, filiformes, garnies de quelques fibres capillaires très-courtes. Les tiges sont presque simples, un peu rameuses ou dichotomes à leur partie supérieure, légèrement pubescentes, noueuses, articulées, réfléchies à leurs articulations, droites ou légèrement courbées à leurs nœuds, garnies de feuilles verticillées, au nombre de dix à quinze de plus à chaque verticille, un peu charnues, légèrement pubescentes, linéaires, subulées, plus courtes que les entre-nœuds, quelquefois renfermant entre leurs aisselles d'autres fascicules de feuilles, garnies à leur base de petites stipules membranées, caduques, semblables aux bractées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une sorte de panicule étalée, dont les rameaux sont dichotomes ; les pedoncules simples, filiformes, inégaux ; la plupart pendans, surtout après la floraison ; munis à leur base de deux petites bractées courtes, opposées, obovées, en forme d'écaillés membranées, un peu acuminées. Le calice est visqueux, ainsi que les pedoncules, persistant, à cinq découpures ovales, obtuses, serrées, membranées à leurs bords. La corolle est blanche, composée de cinq pétales entiers, ovales, obtus, un peu plus longs que le calice. Les étamines, ordinairement au nombre de dix, varient quelquefois de cinq à dix. L'ovaire est ovale, surmonté de cinq styles ; la cap-

fule ovale, plus longue que le calice, s'ouvrant en cinq valves, & renfermant des semences noires, arrondies, convexes à leurs deux faces, un peu ridées, environnées d'un rebord à peine sensible. Le réceptacle des semences est libre, central & rameux.

Cette espèce croît en Europe, dans les champs & les plaines sablonneuses. Je l'ai également recueillie en Barbarie. ○ (V. v.)

« Cette plante, dit M. Durand, fournit un excellent fourrage pour les chèvres, les moutons, les chevaux & les cochons, mais les vaches n'en veulent point. On sème la spargoute en Flandres immédiatement après la récolte des blés : on la fait manger en vert aux bestiaux. Les habitants de la Norvège ramassent sa graine, dont ils font un assez mauvais pain. Cette graine convient mieux pour la nourriture des poulets & des pigeons. Au reste, cette plante étant grêle & s'élevant peu, le champ qui en est le mieux fourni est d'un mince produit.

Observations. Le *Spergula geniculata* de M. Persoon n'est bien certainement qu'une variété du *Spergula arvensis*, si j'en juge d'après les nombreux individus que j'ai recueillis sur les côtes de Barbarie. Plusieurs d'entre eux font fortement geniculés : de l'aisselle des feuilles qui garnissent ces articulations, on voit sortir plusieurs autres paquets, & même le rudiment de nouvelles tiges. Cette plante devient presque prolifère par l'effet d'une végétation vigoureuse, & ses tiges s'allongent quelquefois jusqu'à près de deux pieds ; mais aussi il arrive alors qu'elles tombent & se redressent à leur partie supérieure, en se couvant à ses articulations, qui pourroient bien devenir radicantes ; mais je ne l'ai jamais observé.

2. SPARGOUTE à cinq étamines. *Spergula pentandra*. Linn.

Spergula foliis verticillatis ; floribus pentandris ; seminibus subcomplanatis, circulo albo, membranaceo cinctis. (N.)

Spergula foliis verticillatis, floribus pentandris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 630. n°. 1. — I. c. f. l. iter. 43. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 196. — vol. II. pag. 305. — Hoff. Germ. 160. — Moenchs. Hall. n°. 376. — Weber. Spicil. Flor. goett. pag. 14. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 53. n°. 69. — Idem. Illustr. Gener. tab. 392. fig. 2. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 170. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 819. n°. 2.

Alfne (marginata), foliis verticillatis, seminibus marginatis. Schreb. Spicil. pag. 31.

Stellaria pentandra. Scopol. Carn. n°. 543.

Arenaria media. Pollich. Palat. 446.

Arenaria teretifolia, verna, flore albo, semine limbo foliaceo cincto. Rupp. Jen. 1. pag. 118.

Alfne spergula facie minima, seminibus marginatis. Vail. Paris. pag. 8. — Tournef. Inst. R. Herb. 144. (Excluse hoc synonymon & sequens ex arenaria media.)

Spergula annua, semine foliaceo, nigro, circulo membranaceo albo cincto. Dillen. Giff. 46. E. N. C. Centur. 5 f. 6. pag. 275. tab. 4. — Morif. Bloef. 128.

Cette plante est tellement rapprochée de la précédente, qu'il est difficile de l'en distinguer au premier aspect ; elle ne peut l'être que médiocrement par les cinq étamines, puisque la *spargoute des champs* n'en a quelquefois pas davantage. Son principal caractère consiste dans la forme de ses semences bien moins convexes que celles de la spargoute des champs, comprimées & entourées d'une bordure blanche & membraneuse.

Ses tiges sont ordinairement moins élevées, droites, articulées, noueuses, légèrement velues, souvent entièrement glabres. Les feuilles sont verticillées, un peu plus courtes, & en général moins nombreuses, garnies à leur base de petites stipules courtes, ovales, membraneuses, caduques. Les fleurs forment une panicule terminale, peu ramifiée, étalée ; les pédoncules propres pendans après la floraison, munis de petites bractées opposées, semblables aux stipules ; les calices un peu visqueux, à cinq divisions obtuses ; la corolle blanche ; les semences d'un brun-noirâtre, petites, comprimées, lisses, entourées d'un rebord membraneux & blanchâtre.

On rencontre cette plante en Europe, dans les lieux sablonneux, dans les environs de Paris, au bois de Boulogne. Je l'ai recueillie en Barbarie. ○ (V. v.)

3. SPARGOUTE velue. *Spergula villosa*. Persf.

Spergula pubescens, foliis verticillatis, petalis calice brevioribus. (N.)

Spergula caule folisque pubescentibus. Persoon, Synopt. Plant. vol. 1. pag. 521. n°. 5. — Commerf. Herb.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la *Spergula arvensis* ; elle s'en distingue principalement par ses folioles calicinales, & par sa corolle plus courte que le calice.

Ses tiges sont grêles, nombreuses, étalées ; les ramifications diffuses, noueuses, pubescentes ; les feuilles verticillées, pubescentes, inégales, subulées, munies de stipules blanchâtres, scarieuses. Les fleurs forment, vers l'extrémité des rameaux, une petite panicule dont les pédoncules sont filiformes, pubescents, un peu visqueux. Le calice

calice est composé de cinq folioles droites, linéaires, étroites, un peu obtuses. La corolle est blanche, plus courte que le calice. Je ne connois ni les capsules ni les semences.

Cette espèce a été recueillie par Commerçon à Monte-Video. (*V. f. in herb. Juss.*)

4. SPARGOUTE élevée. *Spergula grandis*. Pers.

Spergula foliis verticillatis, internodiis longioribus, pedunculis dichotomis, floribus secundis. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 522. n°. 4. — Commerçon. Herb.

C'est une espèce forte, assez élevée, dont les tiges sont glabres, épaisses, cylindriques, noueuses; les nœuds très-rapprochés à la partie inférieure, bien plus distans vers le sommet, garnis de feuilles verticillées, longus au moins de deux pouces, glabres, étroites, subulées, un peu charnues; les inférieures beaucoup plus longues que les entre-nœuds, munies à leur base de stipules blanchâtres, membraneuses.

Les fleurs sont grandes, nombreuses, & forment, à l'extrémité des tiges, des amples panicules souvent dichotomes, & dont les ramifications sont nombreuses, presque par dichotomies, un peu latérales; les pédoncules partiels filiformes, glabres, munis à leur base de petites bractées opposées, membraneuses. Les folioles du calice sont blanches & scarieuses à leurs bords, lancéolées, un peu aiguës; la corolle blanche, la capsule ovale, plus longue que le calice; les semences brunes, petites, entourées d'une aile blanche, membraneuse.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Monte-Video. (*V. f. in herb. Juss.*)

** Feuilles la plupart opposées; point de stipules.

5. SPARGOUTE nouvelle. *Spergula nodosa*. Linn.

Spergula foliis oppositis, subulatis, levibus; caulibus simplicibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 630. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 153. — Reyg. Ged. 1. pag. 124. — Pollich. Palat. n°. 447. — Roith. Germ. vol. 1. pag. 196. — II. pag. 505. — Kniph. Cent. 11. — Hoffm. Germ. 161. — Oeder. Flor. dan. tab. 96. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 54. n°. 691. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 819. n°. 3.

Spergula foliis oppositis, pedunculis simplicibus. Royt. Cliff. 173. — Flor. suec. 378 - 420. — Roy. Lugd. Bat. 471.

Spergula (nodosa; var. a, palustris), foliis oppositis, subulatis; infimis late vaginantibus; caulibus simplicibus. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 522. n°. 6.

Botanique. Tome VII.

Alfene foliis superioribus fasciculatis, imis conjugatis. Hall. Helv. n°. 871.

Stellaria nodosa. Scop. Carn. n°. 545.

Arenaria. J. Bauh. Hist. 3. pag. 720. Icon. — Raf. Hist. 1033.

Alfene nodosa, germanica. C. Bauh. Pin. 251.

Alfene arenaria dista. Vaill. Paris. pag. 7.

Alfene palustris, erica folio, polygonaoides; articulis crebrioribus; flore albo, pulchello. Pluk. Almag. 23. tab. 7. fig. 4.

Polygonum foliis graminis, alterum. Loef. Pruff. 204. tab. 64.

6. *Spergula (nodosa, var. 3, brevifolia), caule simplicissimo, nodis plus approximatis, foliis caulibus brevissimis, floribus majusculis*. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 522. n°. 6.

Spergula (nodosa, var. 7, maritima), foliis carnosulis, incurvo-patulis. Pers. Synopf. Plant. 1. c.

C'est une plante fort petite & fluette, qui varie dans sa grandeur selon les localités, ayant à peine deux ou trois pouces lorsqu'elle croît dans les lieux sablonneux & secs, & six ou huit & plus dans les terrains humides. Elle se reconnoît aisément à ses feuilles opposées, très-courtes. Les jeunes pousses qui sont dans leurs aisselles, les font paroître fasciculées, & donnent à la tige un aspect nouveau.

Ses racines sont fibreuses, très-déliées; les tiges très-menues, presque capillaires, droites, simples ou rameuses à leur base, glabres, articulées; les articulations supérieures très-rapprochées; les inférieures distantes. Les feuilles sont opposées, adhérentes par leur base & les inférieures filiformes, glabres, subulées, longues d'environ un pouce & les supérieures très-courtes, garnies dans leurs aisselles de jeunes pousses fasciculées, dépourvues de bractées.

Les fleurs sont terminales, solitaires, quelques-unes latérales, axillaires, supportées par des pédoncules simples, droits, capillaires, unifoires. Le calice est glabre, lisse, à cinq découpures ovales, obtuses. La corolle est blanche, plus grande que le calice; les pétales entiers & les semences roussâtres, très-petites, orbiculaires, comprimées, sans rebord sensible à leur contour.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Europe, en France, aux environs de Paris, dans les lieux humides & sablonneux. (*V. v.*)

6. SPARGOUTE laricine. *Spergula laricina*. Linn.

Spergula foliis oppositis, subulatis, ciliatis, fast-
Qq

aculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 631. — Smith, Icon. ined. 1. pag. 18. tab. 18. — Lam. Illustr. Gener. tab. 392. fig. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 820. n°. 4.

Alfina foliis oppositis, linearibus, rigidis, fasciculatis, basi ciliatis; petalis integris, calicis aequalibus. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 155. n°. 51.

Cette espèce est remarquable & très-distincte par la grandeur de ses fleurs, quoique la corolle soit presque égale au calice en longueur.

Ses tiges sont droites, glabres, filiformes, simples ou à peine ramufes, garnies de feuilles sessiles, opposées, lineaires, tubulées, rudes, ciliées particulièrement à leur moitié inférieure, contenant dans leurs aisselles des fascicules d'autres feuilles plus étroites. Les fleurs sont solitaires, axillaires; leur pédoncule simple, un peu plus long que les feuilles, uniflore. Leur calice se divise en cinq découpures profondes, lancéolées, un peu aiguës. La corolle est blanche; les pétales oblongs, obtus, très-entiers. Les étamines sont au nombre de dix; les anthères petites; cinq styles courts, divergens. Les capsules sont ovales, oblongues, à cinq valves.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie. ♀

7. SPARGOUTE glabre. *Spergula glabra*. Willd.

Spergula foliis oppositis, fasciculatis, filiformibus, glabris; floribus axillaribus, petalis calice majoribus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 821. n°. 7.

Spergula saginoides. All. Flor. pedem. n°. 1735. tab. 64. fig. 1.

Cette espèce a tout-à-fait l'aspect du *sagina procumbens*, ainsi que les deux suivantes, avec lesquelles elle a aussi de grands rapports, mais sa fructification la distingue du *sagina procumbens*; ses pétales plus longs que le calice du *spergula saginoides* (Linn.), & ses tiges, ainsi que ses feuilles glabres, du *spergula subulata*.

Ses racines sont simples, grêles, un peu dures, garnies de fibres courtes. Ses tiges sont menues, très-glabres, couchées, ascendantes, à peine ramufes, longues de deux à quatre pouces, garnies de feuilles opposées, petites, glabres, filiformes, portant dans leurs aisselles des touffes de jeunes feuilles, élargies & réunies à leur base.

Les fleurs sont solitaires, terminales, ou latérales & axillaires, portées sur des pédoncules glabres, capillaires, droits, allongés, simples, uniflores. Le calice est divisé en cinq folioles ovales, vertes, lisses, obtuses, un peu membracées & blanchâtres à leurs bords. La corolle est blanche, plus grande que le calice; les pétales entiers, obtus; l'ovaire chargé de cinq styles courts; la capsule presque deux fois plus longue que le ca-

lice, divisée en cinq valves, contenant des semences brunes, fort petites, un peu anguleuses.

Cette plante croît en France, dans les prés ombragés des montagnes, dans les départements méridionaux, dans le Piémont. Elle m'a été communiquée par M. Detoncault, qui l'a recueillie sur les montagnes aux environs de Grenoble. ♀ (V. f.)

8. SPARGOUTE sagine. *Spergula saginoides*. Linn.

Spergula foliis oppositis, linearibus, levibus; pedunculis solitariis, longissimis; floribus pentandris, caule repente. Swartz. in Ad. Nov. Holm. 1789. pag. 18. tab. 1. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 820. n°. 5.

Spergula foliis oppositis, linearibus, levibus; pedunculis solitariis, longissimis; caule repente. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 631. — Gouan. Illustr. pag. 31. — Smith, Flor. brit. vol. 1. pag. 504.

Alfina foliis graminibus, sapè fasciculatis; pedunculis longis, nudis, unifloris. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 157. n°. 64.

Alfina foliis linearibus, connatis; pedunculis longissimis, unifloris. Haller, Helv. n°. 862.

Alfina alpina repens. Mich. Hort. pag. 5.

On ne distingue qu'avec peine cette espèce des deux précédentes. Ses différences sont-elles constantes ou l'effet des localités? Quoi qu'il en soit, elle est parfaitement glabre, & elle ne diffère du *spergula glabra* que par ses pétales plus courts que les folioles calicinales, & du *spergula subulata* en ce que cette dernière a ses tiges & ses feuilles garnies de quelques poils courts & rares.

Ses racines sont fines, composées de fibres capillaires. Ses tiges sont filiformes, en partie couchées ou relevées à leur partie supérieure, longues de deux ou trois pouces, médiocrement ramufes, garnies de feuilles sessiles, opposées, conniventes à leur base, linéaires, fort étroites, parfaitement glabres, presque obtuses, contenant assez fréquemment dans leurs aisselles des fascicules d'autres feuilles plus courtes.

Les fleurs sont solitaires, souvent penchées, soutenues par de très-longs pédoncules grêles, simples, axillaires, uniflores, sans bractées. Le calice est glabre, verdâtre, à cinq folioles obtuses. La corolle est blanche; les pétales entiers, obtus; les étamines au nombre de cinq, d'après l'observation de M. Swartz. Les capsules s'ouvrent en cinq valves plus longues que le calice.

Cette plante croît dans les lieux humides & élevés, en Suisse, en France, dans la Suède & la Sibérie. ♀ (V. f.)

9. SPARGOUTE en alène. *Spergula subulata*. Swartz.

Spergula foliis oppositis, subsessilibus, linearibus, ciliatis, pilosis decanuria. Sw. etc. in Nov. Act. Holm. 1789 pag. 39. tab. 1. fig. 3.
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 810. n°. 6.
— Smith, Flor. britan. 353.

Spergula saginoides. Retz. Observ. 1. pag. 19. — 2. pag. 18. — 3. pag. 32. — Curt. Lond. — Hoffm. Germ. 161. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 197. — II. pag. 506. — Lain. Flor. franq. vol. 3. pag. 55. n°. 691.

Spergula laticina. Lichf. Scot. 1. pag. 244. — Hurf. Angl. 203. — Oeder. Flor. dan. tab. 858.

Spergula (laticina), foliis oppositis, subulatis, viscidovillosis ciliatisque; axillis subsessilibus. Wulf. in Jacq. Collect. 2. pag. 207.

Alyce tenuifolia, pedunculis floribus longissimis. Vahl. Parif. 8. — Sauv. Montp. 142.

Deux attributs particuliers ont fait distinguer cette espèce du *Spergula saginoides*; ses feuilles un peu velues ou ciliées, & les pétales au moins aussi longs que le calice: elle est d'ailleurs fort petite, & se confond presque avec le *Sagina procumbens*.

Ses racines sont composées de quelques fibres capillaires; ses tiges fines, sétacées, souvent couchées, en touffe gazonneuse, longues de deux à trois pouces, un peu rameuses, munies de quelques poils courts, épars, garnies de feuilles opposées, sessiles, fort menues, subulées, quelquefois unilatérales.

Les fleurs sont solitaires, supportées par des pédoncules simples, aussi longs que les tiges, axillaires, uniflores. Le calice le divise en cinq folioles bifides, ovales, obtuses. La corolle est blanche; les pétales entiers, obtus, de la longueur du calice; la capsule presque une fois aussi longue, à cinq valves obtuses.

Cette plante croît en Suède, en Angleterre, en France, dans les environs de Paris, dans les terrains humides & sablonneux. O (V. v.)

10. SPARGOUTE porte-poil. *Spergula pilifera.* Decand.

Spergula glabra, foliis subsessilibus, linearibus, apice fuscis; pedunculis axillaribus, unifloris; caule repente. (N.)

Spergula pilifera. Decand. Descript. des Plantes de France, vol. 4. pag. 774. n°. 4391.

Cette spargoute se distingue facilement à ses feuilles linéaires, un peu roides, parfaitement glabres, nombreuses, souvent disposées en faisceaux, toutes terminées par un poil ferme, semblable à celui qu'on observe à la sommité des feuilles de plusieurs mousses.

Ses tiges sont couchées, rameuses, rampantes,

entre-mêlées, disposées en gazon serré. Les pédoncules sont axillaires, redressés, glabres, uniflores, longs d'environ un pouce. Les folioles du calice sont obtuses; les pétales ovales, deux fois plus longs que le calice. (Decand. l. c.)

Cette plante croît sur les hautes montagnes de l'île de Corse, où elle a été recueillie par M. Robert.

SPARGOUTINE. *Spergulastrum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polytallées, de la famille des Caryophyllées, qui a de très-grands rapports avec les *Stellaria* & les *Spergula*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles opposées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles; cinq pétales plus courts que le calice, qui avortent quelquefois; dix étamines; quatre stigmates sessiles; une capsule à quatre valves plus longues que le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en cinq folioles ovales-lancéolées, concaves, ouvertes, persistantes.

2°. Une corolle à cinq pétales entiers, plus courts que le calice, qui avortent quelquefois.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont filiformes, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire ovale, surmonté de quatre stigmates sessiles, en lianière étroite, sétacée.

Le fruit est une capsule ovale, plus longue que le calice qui l'enveloppe, à une seule loge, divisée en quatre valves, contenant des semences fort petites.

Observations. Ce genre a été établi par Michaux. Les grands rapports qui existent entre lui & les *Spergula* lui ont fait donner le nom de *Spergulastrum*. Il se rapproche aussi beaucoup des *Stellaria*, des *Sagina*, &c. En comparant les caractères qui distinguent ces genres entre lesquels il y a tant d'affinité, on verra que celui-ci en diffère par ses capsules à quatre valves, & que sous ce rapport il ne peut être confondu avec les *Sagina*, dont les capsules ont le même nombre de divisions, divisions qui existent encore pour toutes leurs autres parties, tandis que dans les *Spergulastrum* elles sont de cinq à dix.

Les espèces renfermées dans ce genre ne m'étant point connues, je me bornerai à ne présenter que ce que Michaux nous en dit.

ESPÈCES.

1. SPARGOUTINE lanugineuse. *Spergulastrum lanuginosum.* Mich.

Spergularum caulibus tenuissimâ densâque lanugine vestitis; foliis latiusculis lanceolatis, in petiolum angustatis; floribus aequalis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 177.

Ses tiges sont herbacées, revêtues d'un duvet épais, lanugineux, très-fin; elles sont garnies de feuilles opposées, lanceolées, un peu élargies, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure. Les fleurs sont dépourvues de corolle.

Cette plante croît dans les contrées chaudes de l'Amérique septentrionale.

2. SPARGOUTINE lancéolée. *Spergularum lanceolatum.* Mich.

Spergularum glabrum, foliis utrinque angustato-lanceolatis, floribus petalisferis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 177.

Ses tiges sont glabres, ainsi que ses feuilles. Celles-ci sont opposées, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités; les pétales ovales, très-courts. Le nombre des stigmates varie de trois à quatre.

On rencontre cette espèce dans les contrées froides de l'Amérique septentrionale.

3. SPARGOUTINE à feuilles de graminée. *Spergularum gramineum.* Mich.

Spergularum glaberrimum, foliis linearibus, erectis; floribus petalisferis.

Cette espèce a le port du *stellaria graminea*. Toutes ses parties sont glabres; les feuilles linéaires, redressées. Ses fleurs ont des pétales entiers, plus courts que les calices.

Cette plante croît dans la Pensilvanie.

SPARLING. *Tzeria-pu-pat-valli-vanalla-valli.* Rheed. Hort. Maiab. vol. 7. pag. 103. tab. 55.

Plante du Malabar, peu connue, dont les tiges sont cylindriques, revêtues d'une écorce mince, pubescente; médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, légèrement pétioles, ovales, lancéolées, très-entières, assez grandes, acuminées à leur sommet, fermes, épaisses, glabres, presque luisantes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, & munies de quelques poils avec des nervures assez fortes, simples, latérales. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, rameuse; les principales ramifications opposées. Le calice est divisé en cinq découpures aigues. La corolle, un peu plus grande que le calice, est blanche, mêlée d'un peu de rouge, à cinq pétales oblongs, écartés, ouverts en étoile (réunis en tube à leur base?), d'une odeur agréable. L'ovaire est conique, surmonté de cinq styles lancéolés, aigus. Le fruit n'a pas encore été observé.

Cette plante croît au Malabar, où elle fleurit pendant toute l'année.

SPARMANE. *Sparmannia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des triacées, qui a des rapports avec la *triumfetta*, & qui comprend des arbruticux étrangers à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, pétioles, stipulacées; les pédoncules opposés aux pétioles, supportant une sorte d'ombelle, munie à sa base d'un involucre à plusieurs folioles courtes.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice à quatre folioles; une corolle à quatre pétales réfléchis; des étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle; les filaments extérieurs stériles & toruleux à leur base; un style; une capsule anguleuse, à cinq loges, hirsutante.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, divisé en quatre folioles égales, entières, lancéolées, réfléchies.

2°. Une corolle à quatre pétales planes, égaux, cunéiformes, entières.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filaments sont libres, filiformes, insérés sur le réceptacle, surmontés d'anthères ovales, en cœur; les filaments extérieurs stériles, plus courts que les autres, toruleux à leur base.

4°. Un ovaire supérieur, presque globuleux, hispide, à cinq angles, surmonté d'un style filiforme, droit, beaucoup plus long que les étamines, terminé par un stigmate tronqué, papilleux.

Le fruit est une capsule à cinq angles, à cinq loges, hirsutée de toutes parts de pointes roides, droites, piquantes, picaules, plus longues sur les angles.

Les semences sont au nombre de deux dans chaque loge, glabres, oblongues, relevées en carène à un de leur côté.

Observations. Plusieurs caractères particuliers séparent ce genre de celui des *triumfetta*, auquel il a d'ailleurs beaucoup d'affinité, tant dans son port que dans les parties de la fructification. Tous deux ont leurs capsules hirsutes, mais les pointes sont courbées en hampe dans le dernier, droites dans le premier; les capsules divisées en quatre loges dans les *triumfetta*, en cinq dans les *sparmannia*, remarquables d'ailleurs par les filaments stériles des étamines extérieures, &c.

ESPÈCES.

1. SPARMANE d'Afrique. *Sparmannia africana.* Linn. l.

Sparmannia foliis alternis, petiolatis; foliis cordato-ovatis, sublobatis, serratis; pedunculis oppositifoliis, umbelliferis. (N.)

S. armannia africana, Linn. f. Suppl. pag. 266. — Thunb. Nov. Plant. Gener. 5. pag. 89. — Lam. Illustr. Gener. tab. 468. — Retz. Oblect. Bot. 5. pag. 25. n°. 65. tab. 4. (*Exclusis synonymis, patria & descriptione.*) — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1160.

C'est un arbrisseau qui ressemble beaucoup par son port à un *triumfetta*, qui n'en diffère que par les caractères du genre. Ses tiges se divisent en rameaux droits, alternes, cylindriques, légèrement pileux, garnis de feuilles alternes, pendantes, longuement pétiolées, ovales, en cœur à leur base, médiocrement lobées à leur contour, dentées en scie, acuminées à leur sommet, légèrement velues à leurs deux faces, traversées par neuf nervures, veinées; les pétioles très-longs, cylindriques, pileux, munis à leur base de deux stipules latérales, opposées, droites, subulées, velues.

Les fleurs sont disposées en ombelles latérales; le pédoncule commun opposé aux feuilles, plus long que les pétioles, pileux, redressé, soutenant à son sommet une ombelle assez semblable à celle de *desperanium*, garnie à sa base d'un involucre à plusieurs folioles courtes, subulées. Les rayons sont simples, un peu inégaux, pubescents, au nombre de dix à quinze & plus, redressés pendant la floraison, mais rabattus avant & après; les calices pileux, à cinq découpures lancéolées, aiguës, point aristées. La corolle est jaune, à quatre pétales cunéiformes, plus longs que le calice, réfléchis à leur partie supérieure, fertés à leur base; les filaments stériles de couleur jaune; les autres de couleur purpurine. Le pistil est jaune, beaucoup plus long que les étamines; la capsule brune, hétérogonée; les semences noires.

Cette plante se rencontre dans les forêts, au Cap de Bonne-Espérance. h (*Descript. ex Linn. f.*)

SPATHIE. *Spatha*. C'est une espèce de coiffe ou de gaine membraneuse qui entoure ordinairement le spadice dans les fleurs de la famille des aroïdes & des palmiers, & qui s'ouvre tantôt de bas en haut, & tantôt de côté. Son emploi est en général de renfermer une ou plusieurs fleurs avec leurs enveloppes, leurs pédoncules, & souvent même des bouquets entiers de fleurs en panicule. Ainsi plusieurs fleurs sont munies de spathes, quoiqu'elles n'aient point de spadice, telle que la membrane qui recouvre les fleurs du narcisse & de plusieurs autres liliacées. Linné regardait la spathe comme une sorte de calice.

On trouve sous certaines fleurs des écailles membraneuses, plus ou moins blanchâtres & transpa-

rentes, mais qui n'ont jamais contenu ces fleurs, & qu'il ne faut point confondre avec les spathe. Ce sont de véritables bractées, & c'est à tort que quelques botanistes leur ont appliqué le nom de *spathe*; c'est donner à cette expression une extension trop vague, & qui ne s'accorde plus avec l'idée qu'on attache communément au mot de *spathe*.

Cette partie est d'une pièce ou monophylle dans le narcisse, diphyllé ou de deux pièces dans l'ail, à deux divisions dans le *crinum*, divisée en deux parties dans l'*hamanthus*; elle ne renferme qu'une seule fleur dans le *narcissus poeticus*, deux fleurs dans le *pancratium mexicanum*, plusieurs fleurs dans l'*amaryllis regina*. Elle périt & se sèche presque aussitôt qu'elle est ouverte, dans l'ail & le narcisse; elle persiste aussi long-temps que les fleurs dans l'*arum*, le *calla*, &c.

SPATHÉLIER. *Spathelia*. Geste de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des tétrabanthacées, qui a des rapports avec les *schinus*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, avec une impaire; les fleurs disposées en panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq pétales, cinq étamines; trois stigmates sessiles; une capsule à trois angles, ailée, à trois loges; une semence dans chaque loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de cinq folioles oblongues, colorées.

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs, égaux.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont subulés, ascendans, courts, dilates & velus à leur base, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire ovale, plus court que les étamines, surmonté de trois stigmates très-courts, un peu arrondis.

Le fruit est une capsule oblongue, à trois faces, à trois angles, une aile membraneuse à chaque angle, à trois loges, renfermant chacune une semence oblongue, à trois côtes.

E S P È C E.

SPATHÉLIE d'Amérique. *Spathelia simplex*, Linn.

Spathelia foliis impari-pinnatis, foliolis alternis, floribus racemosis. (N.)

Spathelia simplex, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag.

386. — Gratin, de Fruct. & Sem. tab. 58. — Lam. Illustr. Gener. tab. 209. — Juss. Gener. Plant. pag. 371. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1496.

Aceri aut paliuro affinis arbor, caudice non ramoso, foliis foris, floribus racemosis purpureis, fructu tribo membranulis alato. Sloan, Jam. 138. Hist. 2. pag. 18. tab. 171. — Rai, Dend. 94.

Spathæ caudice simplici; fronde pinnatâ, ramosa; racemo simplicissimo, laxo, terminali. Brown, Jam. 187.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont droites, simples, cylindriques, sans rameaux, terminées à leur partie supérieure par une touffe de feuilles pétiolées, alternes, éparées, ailées, avec une impaire, assez semblables à celles du torbier des oiseaux, composées de folioles alternes, sessiles, glabres, hénceulées, arrondies à leur base, aiguës à leur sommet, dentées en scie à leur contour; les dentelures presque obuses.

Du milieu de ces feuilles s'élèvent des panicules de fleurs droites, alongées, rameuses; les ramifications alternes, presque simples, un peu courtes, surtout les supérieures, & formant presque autant de petites grappes dépourvues de bractées. Le calice est glabre, à cinq découpures profondes, ovales-oblongues, aiguës, colorées. La corolle est petite, de couleur purpurine, une fois plus longue que le calice, composée de cinq pétales obtus. Les filamens des étamines sont courts, un peu dilatés & velus à leur base. L'ovaire n'a point de style; il supporte trois stigmates courts, arrondis. Le fruit est une capsule ovale-oblongue, à trois ailes membraneuses, à une seule valve, à trois loges; une semence oblongue, anguleuse dans chaque loge.

Cette plante se rencontre dans la Jamaïque. *h* (V. f.)

SPATULÉES (Feuilles). *Spatulata folia*. On appelle ainsi les feuilles dont la partie supérieure est arrondie, tandis que la partie inférieure est alongée & plus étroite, comme celles du *bellis perennis*, du *claytonia jomhalsii*, &c.

SPERMACOCÉE. *Spermacoce*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *diodia* & les *hedysotis*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées; les fleurs axillaires, quelquefois verticillées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice supérieur, à quatre dents; une corolle en entonnoir, à quatre découpures; quatre étamines; un style; une capsule à deux loges, à deux semences, couronnée par le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, petit, persistant, à quatre dents courtes.

2°. Une corolle monopétale, en forme d'entonnoir, dont le tube est cylindrique, plus long que le calice, & le limbe divisé en quatre découpures ouvertes.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont bulbuleux, plus courts que la corolle, attachés sur le tube, terminés par des anthères simples, ovales.

4°. Un ovaire inférieur, arrondi, un peu comprimé, surmonté d'un style filiforme, biffé à son sommet; les stigmates simples.

Le fruit est une capsule inférieure, couronnée par le calice, à deux loges.

Les semences sont solitaires, ovales, convexes d'un côté, un peu concaves de l'autre, dont les bords sont roulés en dedans.

Observations. Ce genre se distingue des *diodia* par les quatre découpures ou les quatre dents égales de son calice; celui des *diodia* est divisé en deux folioles, quelquefois quatre, mais dont deux sont constamment plus grandes; il se distingue des *hedysotis* par ses capsules, celles des *hedysotis* étant globuleuses, s'ouvrant transversalement; les loges sont remplies de plusieurs semences.

La plupart des espèces renfermées dans ce genre ont un grand nombre de caractères communs, qui leur donnent un air de famille, & qui les font reconnaître aisément. Elles sont plus ou moins hérissées d'aspérités, soit par leurs tiges ou sur leurs feuilles, aussi que sur leurs calices. Il en est peu d'entièrement glabres. Les feuilles sont presque sessiles, opposées, entières, munies à leur base de stipules souvent membraneuses, très-courtes, bulbuleuses ou tronquées, & garnies à leurs bords de cils longs, seracés, roides ou flexibles. Les fleurs sont axillaires, sessiles, plus ou moins verticillées, fort petites.

La distinction des espèces entr'elles se tire de la forme des feuilles, de celle des stipules, de leurs aspérités, de leurs poils, des tiges herbacées, quelquefois unes ligneuses, droites ou couchées, simples ou rameuses; les rameaux opposés, souvent les supérieurs alternes; des étamines renfermées dans le tube de la corolle, ou saillantes & plus longues que le tube; dans les capsules glabres ou hérissées d'aspérités, &c. D'ailleurs, aucune des espèces que nous connoissons ne s'écarte du caractère générique qui a été exposé plus haut.

ESPÈCES.

1. **SPERMACOCÉE scabre**. *Spermacoce tenuior*. Linn.

Spermocoe foliis lanceolatis, subpetiolatis, super scabris; caule glabro; floribus subverticillatis, axillaribus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 273. n°. 1433. tab. 62. fig. 1.

Spermocoe glabra, foliis linearibus, flaminibus inclusis, floribus verticillatis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 290. n°. 1. — Mill. Dict. n°. 1. — Kniph. Cent. 2. n°. 88. — Swartz, Observ. 43.

Spermocoe glabra, foliis lanceolatis, flaminibus inclusis, floribus verticillatis, seminibus hirsutis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 568. n°. 1.

Spermocoe verticillatis tenuioribus. Dill. Eltham. pag. 370. tab. 277. fig. 339. — Sabat. Hort. Rom. tab. 99.

Spermocoe annuum, foliis lanceolatis, glabris; floribus verticillatis. Læf. Iter. 202.

Spermocoe scandens, foliis oblongis, venis arcuatis, refertis; floribus paucioribus, confertis ad alas. Brown, Jam. 141. n°. 5.

Spermocoe. Roy. Lugd. Bat. 253.

Anonymos americana, foliis parietaria scabris; floribus albis, ad foliorum ortum vix conspicuis. Pluken. Almag. pag. 33. tab. 136. fig. 4.

β. *Eadem, foliis angustioribus.*

Ses tiges sont droites, grêles, tétragones, un peu ailées sur leurs angles, hautes d'environ deux pieds, roides, glabres ou légèrement pubescentes, d'un vert-brun, divisées en rameaux étalés, opposés; les supérieurs alternes, garnis de feuilles opposées, à peine pétiolées, lancéolées, d'un à deux pouces de long sur trois à quatre lignes de large, entières, rudes au toucher, particulièrement à leur face supérieure, aiguës à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, munies de stipules subulées, caduques.

Les fleurs sont réunies, dans l'aisselle des feuilles, par paquets opposés, sessiles, presque verticillés. Le calice est très-court; la corolle petite, blanche; les étamines renfermées dans la corolle; les capsules ovales, petites, couronnées par les dents du calice, chargées d'aspérités, à deux loges, contenant des semences foliées, très-glabres.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

J'en ai observé, dans l'herbier de M. Lamarck, une variété β à feuilles beaucoup plus étroites, plus distantes; à fleurs moins nombreuses. Elle avoit été recueillie à la Guadeloupe par M. Badier.

2. *Spermocoe bleuâtre. Spermocoe caerulea.* Aublet.

Spermocoe foliis ovatis, acutis, pil. fusculis, levibus; stipulis floribus verticillatis, aquantibus; flaminibus exsertis. Vahl, Symbol. Ligno. t. pag. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 569. n°. 3.

Spermocoe (caerulea), foliis ovatis, acutis; floribus numerosis, axillaribus, verticillatis; caule simpliciter erecto. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 57. tab. 19. fig. 2.

Cette plante a de très-grands rapports avec la *Spermocoe latifolia*; mais les tiges sont bien moins élevées, droites, point rameuses, quadrangulaires, glabres à leur base, un peu velues à leur partie supérieure, piluleuses sur leurs angles. Les feuilles sont larges d'un pouce, velues, presque glabres, opposées, médiocrement pétiolées; les intérieures ovales, trois fois plus courtes que les entre-nœuds; les supérieures lancéolées, rudes à leurs bords, munies à leur base de stipules très-courtes, aiguës, ciliées à leurs bords, de la longueur des verticilles.

Les fleurs sont très-petites, sessiles, disposées, dans l'aisselle des feuilles, en quatre verticilles agglomérés, mais nombreux au verticille terminal. Leur calice est très-court, terminé par quatre petites dents aiguës; la corolle bleuâtre, un peu plus longue que le calice; les étamines saillantes hors de la corolle; les fruits extrêmement petits.

Cette plante se rencontre dans la Guiane, sur le bord des chemins.

3. *Spermocoe à larges feuilles. Spermocoe latifolia.* Aublet.

Spermocoe glabra, flavescens, foliis ovatis; caule erecto, quadrangulati; stipulis calicibusque villosis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1441. tab. 62. fig. 2.

Spermocoe (latifolia), caule erecto, quadrangulati; floribus axillaribus. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 55. tab. 19. fig. 1.

Spermocoe glabra, foliis ovatis, flaminibus exsertis, floribus verticillatis, stipulis ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 569. n°. 2.

Cette espèce est remarquable par sa couleur jaune, par les larges feuilles, par les stipules & les calices velus. Ses tiges sont droites, quadrangulaires, glabres, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales-lancéolées, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet; les supérieures à peine pétiolées ou médiocrement rétrécies en pétiole à leur base; les stipules courtes, très-aiguës, caduques, velues, ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont petites, axillaires, sessiles, réunies en petits paquets alternes, point verticillés. Les calices sont velus, divisés en quatre dents al-

guée. La corolle est courte, tubulée ; son limbe a quatre lobes aigus ; les filamens sésacés, faillans hors de la corolle ; les anthères presque quadrangulaires, bifides à leurs deux extrémités ; la capsule ovale, à deux lobes, un peu velue.

Cette plante croît à Cayenne & dans la Guiane, sur le bord des chemins. (*V. f. in herb. Lam.*)

4. SPERMACOCÉE diodine. *Spermacoe diodina*. Michaux.

Spermacoe caule hirsuto ; foliis linearibus , glabris , subserrulatis ; floribus axillaribus , alternis ; fructibus hirsutis. (N.)

Spermacoe annua , caule erecto , hirsuto ; foliis linearibus vel linearilanceolatis , glabris , marginibus minutissimis aculeolatis quasi serrulatis ; stipulis longissimè multifidis ; floribus in axillis alternis , solitariis sessilibus ; fructibus hirsutis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 82.

Le port de cette plante la placeroit plutôt parmi les *adias* que dans les *spermacoe* ; mais son calice à quatre divisions ne permet pas de la séparer de ce dernier.

Ses tiges sont droites, annuelles, velues, garnies de feuilles opposées, linéaires ou linéaire-lancéolées, glabres à leurs deux faces, aigues à leur sommet, munies à leurs bords de très-petites dents en scie ou de petites aiguilles très-courtes. Les stipules sont garnies de longues soies très-fines. Les fleurs sont sessiles, solitaires, alternes dans l'aisselle des feuilles ; elles produisent des fruits hérissés de poils courts.

Cette plante croît dans les terrains sablonneux, au milieu des forêts de la Caroline. Elle fleurit dans les mois d'août & de septembre. ☉ (*Descript. ex Mich.*)

5. SPERMACOCÉE glabre. *Spermacoe glabra*. Michaux.

Spermacoe procumbens , caulibus , foliis fructibusque glabris ; foliis ovali-lanceolatis , verticillis multifloris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 82.

Ses tiges sont glabres, en partie couchées sur la terre, garnies de feuilles opposées, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces ; les fleurs réunies dans l'aisselle des feuilles en verticilles composés d'un assez grand nombre de fleurs ; les calices & les capsules très-glabres.

Cette plante croît en Amérique, sur les bords du fleuve Ohio & du Mississipi ; elle fleurit dans les mois de juillet & d'août. (*Descript. ex Mich.*)

6. SPERMACOCÉE hérissée. *Spermacoe hirsuta*. Linn.

Spermacoe scabra , foliis oblongis , summis qua-

ternis ; floribus verticillatis. Linn. Syst. veget. pag. 124. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1438.

Spermacoe scabra , ramosa , foliis ovato-lanceolatis ; floribus confertis , axillaribus ; fluminibus exseris. Swartz, Prodr. 45. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 571. n°. 12.

Spermacoe erecta , subhirsuta ; foliis oblongis ; venis arcuatis , resertis ; superioribus majoribus , approximatis ; floribus confertis ad alas. Brown, Jam. 141.

Ses tiges sont droites, tétragones, roides, presque glabres ; les angles faillans, pileux, tranchans ; les rameaux étalés, nombreux, garnis de feuilles opposées, ovales-lancéolées, presque elliptiques & obtuses, médiocrement pétioles, longues d'un pouce & demi environ, larges de dix lignes, point velues, rudes à leurs deux faces, particulièrement en dessous le long des nervures, traversées par des veines latérales, un peu arquées ; les pétioles presque connivens à leur base, enveloppés par une stipule membraneuse, tronquée, garnie à son sommet de plusieurs filamens sésacés ; les feuilles supérieures très-rapprochées & presque quaternées.

Les fleurs sont sessiles, presque verticillées, réunies en paquets peu garnis dans l'aisselle des feuilles supérieures. La corolle est blanche, tubulée ; son limbe divisé en quatre lobes ; les étamines à peine faillantes hors de l'orifice du tube ; les anthères violettes ; les fruits ferts petits.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les terrains secs, parmi les gazons. ☉ (*V. f. in herb. Lam.*)

7. SPERMACOCÉE articulée. *Spermacoe articulata*. Linn. f.

Spermacoe foliis ellipticis , obtusiusculis , subserratis. Linn. f. Suppl. pag. 119. (*Exclusa Ramphi synonymo.*) — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 274. n°. 1440. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 572. n°. 6.

Cette espèce a beaucoup d'affinité avec la *spermacoe hispida*, mais elle est bien moins velue, moins hérissée. Ses feuilles sont elliptiques, point ondulées à leur contour.

Ses tiges sont cannelées, cylindriques, rougeâtres, herbacées, rameuses ; les rameaux étiles, couchés ou rabattus ; les articulations distantes, épaissies. Les feuilles sont opposées, médiocrement pétioles, ovales, elliptiques, entières, obtuses à leur sommet, un peu rudes, légèrement velues, vertes en dessus, blanchâtres à leur face inférieure, munies en dessous de nervures alternes. Une stipule membraneuse, garnie à ses bords

de

de filets fécacés, enveloppe les feuilles à leur partie inférieure.

Les fleurs sont sessiles, réunies par petits paquets dans l'aisselle des feuilles. Les calices sont très velus; la corolle blanche; son tube étroit. Le synonyme de *Rumph. Amboin.* vol. 6, pag. 25, tab. 10, rapporté à cette plante par Linné fils, appartient à l'*Hydrocotyle verticillata*.

Cette plante croît aux Indes, dans les terrains argileux & découverts. (V. f. in herb. Lam.)

8. SPERMATOCÉE hispide. *Spermatoce hispida*. Linn.

Spermatoce hispida, foliis obovatis, undulatis; axillis paucifloris. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1439.

Spermatoce hispida, foliis obovatis, obliquis. Linn. Mantiss. pag. 558. — Murray, Comm. Nov. Goett. r. 3. pag. 77. tab. 5.

Galeopsis zeylanica, folio oblongo, flore albo. Burm. Thes. Zeylan. pag. 103. tab. 20. fig. 5.

Cette plante est hérissée d'aspérités sur toutes ses parties, distinguée par ses feuilles ovales, obtuses, ondulées à leurs bords, ayant d'ailleurs beaucoup de rapport avec le *spermatoce articulata*.

Ses tiges sont presque droites, herbacées, tétragones, à quatre angles mousses, verdâtres, rudes, légèrement pileuses; les articulations inférieures très-distantes; les supérieures rapprochées, rameuses; les rameaux inférieurs opposés; les supérieurs alternes, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, en ovale renversé, épaisses, fermes, velues, rudes à leurs deux faces, vertes, plus pâles en dessous, légèrement sinuées ou ondulées à leur contour, obtuses à leur sommet, souvent terminées par une petite pointe recourbée, rétrécies en pétiole à leur partie inférieure, munies de stipules qui les enveloppent à leur base, scarieuses, tronquées, surmontées de cinq filets fécacés.

Les fleurs sont sessiles, axillaires, peu nombreuses dans chaque aisselle. Le calice est rude, divisé en quatre découpures lancéolées, étalées; la corolle petite, de couleur violette, turbinée, campanulée, assez grande, droite, parragée, jusqu'à la moitié, en quatre découpures. Les étamines sont aussi longues que la corolle, de couleur purpurine; le style incliné, terminé par deux stigmates obtus, recourbés; les capsules hérissées, couronnées par les quatre découpures du calice, divisées en deux loges, les semences noires, oblongues.

Cette plante croît dans les Indes & à l'île de Ceylan. (V. f. in herb. Lam.)
Botanique, Tome VII.

9. SPERMATOCÉE lisse. *Spermatoce levis*. Lam.

Spermatoce glabra, foliis lanceolatis, subpetiolatis; floribus sessilibus, subverticillatis; capsulis levibus. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 273. n°. 1435.

Aparine pauciribus foliis, semine lavi. Sloan, Hilt. 1. tab. 94. fig. 2.

Cette espèce paroît avoir beaucoup de rapport avec le *spermatoce glabra* de Michaux, mais ses tiges sont droites. Elle ressemble beaucoup par son port au *spermatoce tenuior*, dont elle diffère par ses capsules lisses, & par ses feuilles glabres, plus larges.

Ses tiges sont droites, herbacées, presque cylindriques, tendres, très-lisses, ramcuses; les rameaux opposés, érales, alongés, garnis de feuilles opposées, légèrement pétiolées, lancéolées, minces, très-glabres, entières, acuminées, longues de deux ou trois pouces, larges de huit à dix lignes & plus; les supérieures plus étroites. Les fleurs sont réunies en paquets sessiles, presque verticillés & assez épais dans l'aisselle des feuilles. Les capsules sont glabres & obtuses.

Cette plante croît à Saint-Domingue, où elle a été recueillie par Joseph Martin. (V. f. in herb. Lam.)

10. SPERMATOCÉE à nœuds distans. *Spermatoce remota*. Lam.

Spermatoce foliis linearilanceolatis, internodiis brevioribus; floribus densè verticillatis, verticillis distantibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 273. n°. 1436.

Des feuilles beaucoup plus courtes que les entre-nœuds, d.s verticilles épais, distans; des capsules velues, donnent à cette plante un port particulier, qui la fait aisément reconnoître.

Ses tiges sont droites, grêles, obscurément tétragones, légèrement pubescentes; les feuilles opposées, sessiles, linéaires-lancéolées, entières à leurs bords, très-rudes au toucher, particulièrement à leur face supérieure, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, un peu aiguës à leur sommet, longues d'un pouce & plus, au moins une fois plus courtes que les entre-nœuds. Les fleurs sont axillaires, ramifiées en paquets sessiles, épais, verticilles, très-ferrés, distans. Les capsules sont courtes, obtuses, hérissées d'aspérités.

Cette espèce a été recueillie à Saint-Domingue par Joseph Martin. (V. f. in herb. Lam.)

11. SPERMATOCÉE barbu. *Spermatoce barbata*. Lamarck.

Spermatoce procumbens, subra, foliis lanceolatis, R

villosa; stipulis ciliato-barbatis, axillis paucifloris.
Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1437.

Il existe beaucoup de rapport entre cette espèce & le *Spermacoce diodina* de Michaux; elle s'en distingue par ses tiges couchées & par ses feuilles velues. Les fleurs, quoiqu'en petit nombre, ne sont pas solitaires dans les aisselles des feuilles.

Les tiges sont grêles, presque rampantes, quadrangulaires, rougeâtres lorsqu'elles ont perdu leur écorce; les rameaux alternes, redressés, blanchâtres, pubescents, garnis de feuilles sessiles, opposées, étroites, lancéolées, d'un vert-blanchâtre, rudes, pubescentes, aiguës, longues à peine d'un pouce; les supérieures presque fasciculées par les jeunes feuilles qui naissent dans leurs aisselles, environnées à leur base d'une stipule courte, membraieuse, vaginale, velue, tronquée, & garnie à ses bords de cils blanchâtres, droits, longs, subules. Les fleurs sont petites, réunies deux ou trois & plus dans l'aisselle des feuilles.

Cette plante croît à Saint-Domingue, où elle a été découverte par Jos. Martin. (*V. f. in herb. Lam.*)

11. SPERMACOCÉE rude. *Spermacoce aspera.* Aublet.

Spermacoce villosa-hirta, foliis angusto lanceolatis, asperis, sessilibus; verticillis multifloris. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1442.

Spermacoce foliis oblongis, angustis, asperis; floribus verticillatis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 59. tab. 22. fig. 6.

Spermacoce (aspera), foliis ellipticis, scaberrimis, acutis, glaberrimis; floribus axillaribus, confertis; flaminibus inclusis. Vahl, Elog. 1. pag. 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 371. n°. 21.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *Spermacoce hirta*, mais elle n'a point ses feuilles velues, au moins d'une manière sensible, & ses étamines ne sont point saillantes hors de la corolle.

Ses tiges sont droites, herbacées, tétragones, rameuses, munies de poils à leurs angles. Les feuilles sont opposées, presque sessiles, elliptiques, longues d'un pouce, très-entières, scabres à leurs deux faces, particulièrement en dessous; les supérieures rapprochées; les stipules membraieuses, terminées par dix filaments sétacés, pileux. Les fleurs sont réunies plusieurs ensemble dans chaque aisselle des feuilles.

On trouve cette plante dans la Guiane & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale.

13. SPERMACOCÉE à longues feuilles. *Spermacoce longifolia.* Aubl.

Spermacoce caule flexuoso, floribus minimis; foliis ovato-oblongis, acutis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 58. tab. 21.

Spermacoce (longifolia), glabra, foliis lanceolatis, utrinque acutis, marginibus scabris; verticillis dimidiatis. Vahl, Elog. 1. pag. 8.

Spermacoce (longifolia), glabra, foliis oblongo-lanceolatis, acutis, subsessilibus; verticillis æquis, multifloris. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 1443.

Ses tiges sont glabres, purpurines, tétragones, lisses, cendrées à leur sommet, & couvertes de quelques poils courts, visibles à la loupe; les rameaux alternes, axillaires, garnis de feuilles étalées, distantes, presque pétiolées, longues d'un demi-pouce; les supérieures plus rapprochées, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, rudes à leurs bords, glabres à leurs deux faces, un peu pubescentes sur leurs nervures; les stipules partagées en six ou sept découpures droites, sétacées.

Les fleurs sont alternativement réunies dans l'aisselle des feuilles, en têtes agglomérées, sessiles, opposées aux rameaux, au nombre d'environ vingt-quatre à chaque paquet. Les découpures du calice sont ovales.

Cette plante croît à Cayenne. (*Descript. ex Vahl.*)

14. SPERMACOCÉE en fouet. *Spermacoce flagelliformis.*

Spermacoce foliis oblongo-lanceolatis, subsæpatis, erectis; floribus verticillatis, ramis flagelliformibus. (N.)

Cette espèce a beaucoup d'affinité avec le *Spermacoce longifolia*, mais elle en diffère par son port, par ses feuilles plus étroites, redressées d'une manière remarquable.

Ses tiges sont souples, grêles, courbées à leur base; elles produisent un assez grand nombre de rameaux effilés, pendans, alongés, très-lisses, quadrangulaires, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées ou rétrécies en pétiole à leur partie inférieure, dont la base est élargie, un peu concave, fortement courbée en arc; ensuite les feuilles se redressent & deviennent perpendiculaires. Elles sont étroites, lancéolées, entières, aiguës, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, longues au moins de deux pouces, larges de trois à cinq lignes, un peu rudes au toucher, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures latérales, simples, alternes, ascendantes. Les stipules sont larges, courtes, membraieuses, un peu pubescentes.

Les fleurs sont réunies en paquets verticillés & f. files dans l'aisselle des feuilles; le calice divisé en quatre dents courtes, aiguës; les capules presques glabres, tronquées, couronnées par les dents du calice.

Cette plante se rencontre à l'Île-de-France. (*V. f. in herb. Lam.*)

15. SPERMACÉE étalée. *Spermacoe prostrata*. Aublet.

Spermacoe glabra, foliis ovatis, acutis; caule ramoso, subsessilibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 144.

Spermacoe foliis parvis, ovatis, levibus. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 38. tab. 20. fig. 3.

Spermacoe (prostrata), glabra, foliis subsessilibus, ellipticis, acutis; floribus versicillatis, caule prostrato. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 570. n°. 6.

Ses tiges sont glabres, herbacées, étendues sur la terre, rameuses, quadrangulaires; les rameaux opposés, sortant de l'aisselle des feuilles. Celles-ci sont presque sessiles, opposées, lisses, ovales, entières à leur contour, presque elliptiques, rétrécies en pointe à leur base, aiguës à leur sommet, de couleur verte. Les fleurs sont fort petites, verticillées, axillaires.

Cette plante croît dans la Guiane, sur le bord des rivières.

16. SPERMACÉE radicante. *Spermacoe radicans*. Aubl.

Spermacoe foliis lanceolato-oblongis, glabris; caulis ramosis, prostratis, ad nodos radicantibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 274. n°. 145.

Spermacoe foliis lanceolatis, acutis; floribus parvis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 38. tab. 20. fig. 4.

Spermacoe (radicans), glabra, foliis subsessilibus, lanceolatis; floribus versicillatis; caule procumbente, radicante. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 570. n°. 7.

Cette espèce est tout-à-fait rampante, distinguée par les racines fibreuses qui croissent à chacun des nœuds de la tige. Ses racines sont vivaces, composées de fibres grêles, à peine rameuses; les tiges quadrangulaires, munies de rameaux alternes, axillaires, couchés. Les feuilles sont presque sessiles, opposées, étroites, lanceolées, alongées, très-entières, un peu rétrécies, glabres à leurs deux faces, médiocrement aiguës à leur sommet. Les fleurs sont très-petites, axillaires, verticillées.

Cette espèce croît sur les bords de la rivière d'Otapu, dans la Guiane. (*Descript. ex Aubl.*)

17. SPERMACÉE ailée. *Spermacoe alata*. Aubl.

Spermacoe caulibus & ramulis radicantibus; foliis ovatis, subsessilibus; floribus caruleis, terminalibus. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 60. tab. 22. fig. 7.

Spermacoe (alata), glabra, foliis ovatis, summis sessilibus; floribus terminalibus, capitatis; caule tetragono, alato, repente. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 569. n°. 4.

Cette plante pousse des tiges étendues sur la surface de la terre, quadrangulaires, articulées; chaque angle bordé d'une membrane courte, en forme d'aile. Les articulations produisent des petites racines grêles & fibreuses. Les rameaux sont axillaires, opposés; les feuilles sessiles, opposées; les inférieures un peu pétiolées, ovales, élargies, molles, lisses à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, aiguës, presque acuminées à leur sommet; les supérieures élargies & presques en cœur à leur base.

Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux, entre deux feuilles opposées. Leur calice est à quatre divisions étroites, aiguës; la corolle bleue, assez grande; le tube court; le limbe divisé en quatre lobes égaux, obtus; les étamines au nombre de quatre, situées entre les divisions de la corolle, deux à l'entrée du tube, deux plus courtes sur la partie moyenne & interne du tube. L'ovaire est inférieur, surmonté d'un style qui s'élève au milieu de quatre petits corps glanduleux. Il est grêle, & se termine par deux longs stigmates. Le fruit se divise en deux capicules monospermes.

Cette plante croît dans la Guiane, sur le bord de la rivière d'Aroura. (*Aubl.*)

18. SPERMACÉE à tige hexagone. *Spermacoe hexangularis*. Aubl.

Spermacoe foliis ovatis, petiolatis; caule flexuoso, hexangulari; floribus terminalibus. Lam. Ill. Genet. vol. 1. pag. 275. n°. 146.

Spermacoe caule flexuoso; foliis ovato-acutis, petiolatis; floribus terminalibus. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 61. tab. 22. fig. 8.

Spermacoe (hexagona), glabra, foliis ovatis, petiolatis; floribus terminalibus; caule prostrato, hexagono. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 569. n°. 5.

Il existe des rapports entre cette plante & le *Spermacoe alata*; elle en diffère par ses tiges flexueuses, faibles, tombantes, à six angles; par ses feuilles plus courtes, moins aiguës, médiocrement pétiolées, ovales, glabres à leurs deux faces: Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux; la corolle est petite, de couleur bleue, renfermant quatre étamines situées à l'entrée du tube & au dessous de ses divisions.

R 2

Cette plante se rencontre à Cayenne, sur le bord des ruisseaux. (*Descript. ex Aubl.*)

19. SPERMATOCÉE à corymbes. *Spermatoce corymbosa*. Linn.

Spermatoce procumbens, foliis linearibus; corymbis lateralibus, pedunculatis. Linn. Sp. c. Plant. edit. 2. par. 149. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 275. n°. 1447.

Spermatoce (procumbens). Syst. veget. p. 124. — Will. Spec. Plant. vol. 1. pag. 573. n°. 19.

Ses tiges sont foibles, herbacées, anguleuses, diffuses, divisées en rameaux, couchés, étalés, garnies de feuilles opposées, linéaires, sessiles. Les fleurs sont disposées en corymbes latéraux, pédonculés, opposés, formant des fascicules presque en ombelle simple, garnie d'un involucre à plusieurs folioles plus longues que l'ombelle. Les étamines sont saillantes, plus longues que la corolle.

Cette plante se rencontre dans les Indes. (*Descript. Linn.*)

20. SPERMATOCÉE de Sumatra. *Spermatoce sumatrensis*. Retz.

Spermatoce hispida, foliis lanceolatis; corymbis terminalibus, dichotomis. Retz. Fascicul. 4. n°. 68. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. p. 275. n°. 1448.

Ses tiges sont herbacées, à quatre faces, tomenteuses, articulées; les articulations distantes; les rameaux opposés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, lancéolées, très-entières, hispides, munies en dessous de nervures tomenteuses. Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux, composés de petites grappes dichotomes. Les calices sont fort petits, à quatre dents; la corolle en entonnoir; les capsules à deux loges, couronnées par les quatre dents calicinales, & contenant deux semences.

Cette plante croît à Sumatra. (*Descript. ex Retz.*)

21. SPERMATOCÉE spinuleuse. *Spermatoce spinulosa*. Linn.

Spermatoce frutescens, foliis linearibus, spinulosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 148. — Swartz, Observ. Botan. pag. 45. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 275. n°. 1449.

Spermatoce fruticosum. Læf. Iter. 201.

Spermatoce erecta, simplex, foliis lanceolatis, nervis denticulatis, floribus cespitoso ad alas. Brown, Jam. 141. n°. 1.

Ses tiges sont droites, dures, presque ligneuses, canaliculées à leur base, simples à leur partie

supérieure; les rameaux diffus, les feuilles opposées, linéaires, rapprochantes de celles du romarin, plus longues que les entre-nœuds, marquées de nervures liriées obliquement, garnies à leurs bords de petites épines très-courtes & très-fines, en forme de cis. Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en verticilles lâches, sessiles. La corolle est blanche.

Cette plante croît dans les contrées chaudes de l'Amérique.

22. SPERMATOCÉE du Pérou. *Spermatoce peruviana*. Ruiz & Pav.

Spermatoce foliis lanceolatis, nervosis, plicatis; flore dichotomo-corymbosis, terminalibus.

Spermatoce corymbosa. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 60. tab. 91.

Plante presque ligneuse, dont les tiges sont droites, hautes de deux pieds, cylindriques, brunes, rameuses; les rameaux alternes, tétragones, garnis de feuilles opposées, lancéolées, conniventes à leur base, plissées, nerveuses, relevées, très-entières, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, munies de stipules vaginales, courtes, dont les bords sont surmontés de longs cils droits, roides, subulés. Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux, dichotomes.

Cette espèce croît dans les montagnes du Pérou, où elle fleurit pendant les mois de juillet & d'août. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

23. SPERMATOCÉE redressée. *Spermatoce ossurgens*. Ruiz & Pav.

Spermatoce foliis lanceolatis, lineatis, margine scabris; verticillis parvis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 60. tab. 92.

Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges redressées, purpurines, hautes d'un pied & demi, rameuses, tétragones, rudes sur leurs angles, garnies de feuilles sessiles, opposées, conniventes à leur base, ovales-lancéolées, très-entières, rudes à leurs bords, munies de stipules vaginales & ciliées. Les fleurs sont sessiles, axillaires, verticillées, petites, assez nombreuses; leur calice est de couleur purpurine; la corolle d'un blanc teint de pourpre; les semences noires, ovales, rétrécies à leur base.

Cette plante croît aux environs de Lima au Pérou, dans les lieux inculés. Elle fleurit toute l'année. *x* (*Descript. Ruiz & Pav.*)

24. SPERMATOCÉE grêle. *Spermatoce gracilis*. Ruiz & Pav.

Spermatoce globosa, foliis lanceolatis, angustis; ramis inferioribus oppositis, superioribus dichotomis;

verticillis minimis. Flor. peruv. vol. 1. pag. 61. tab. 92. fig. 2.

Plante glabre, herbacée, haute d'environ un demi-pied, dont les racines sont fibreuses; les tiges droites, foliaires, grêles, tétragones, rameuses; les rameaux inférieurs opposés; les supérieurs dichotomes, inégaux, à quatre faces, garnis de feuilles conniventes, opposées, étroites, lancéolées, très-entières, rudes à leurs bords, traversées par des veines aérées, latérales, munies de stipules vaginales, ciliées. Les fleurs sont axillaires, sessiles, verticillées, fort petites; la corolle blanche, les capsules & les calices légèrement hispides.

Cette plante croît au Pérou, sur le revers des montagnes. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

25. SPERMACOCÉE verticillée. *Spermacoe verticillata*. Linn.

Spermacoe glabra, foliis lanceolatis, verticillis globosis capitatisque. Mill. Dict. n°. 2. — Swartz, Observ. Bot. pag. 44. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 570. n°. 9.

Spermacoe glabra, fluminibus exstantibus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 102.

Spermacoe verticillis globosis. Dillen, Eliham. pag. 369. tab. 277. fig. 338. — Hort. Cliff. 33.

Spermacoe frutescens atque ramosa, foliis linearibus, floribus confatis ad alas. Brown, Jam. pag. 141. n°. 4.

Scabiosa jamaicensis, hyssopifolia. Pluk. Almag. pag. 336. tab. 58. fig. 6.

Pulegium fruticosum erectum, verticillis densissimis. Sloan, Jam. 64. Hist. 1. pag. 170.

Cette plante a la forme d'un petit arbrisseau. Ses tiges sont ligneuses, grêles, hautes de deux à trois pieds, tétragones, glabres, à peine hérissées sur leurs angles, rameuses; les rameaux éraillés, la plupart opposés, de couleur cendrée, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles; les inférieures distantes; les supérieures souvent rapprochées, presque verticillées; d'autres feuilles souvent plus petites dans leurs aisselles, linéaires-lancéolées, assez semblables à celles de l'hyssope, glabres, vertes à leur face supérieure, un peu plus pâles en dessous, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, marquées en dessous de nervures peu sensibles, garnies à leur base de stipules courtes, terminées à leur sommet par plusieurs filets sétacés.

Les fleurs sont la plupart terminales, ramassées dans l'aisselle des feuilles, en gros paquets verticillés, globuleux, amplexicaux, sessiles ou quelquefois légèrement pédonculés, épais, serrés; ces fleurs sont petites. La corolle est blanche, en forme

d'entonnoir; le limbe découpé en quatre lobes ouverts; les étamines plus longues que le tube de la corolle; les capsules à deux loges, à deux semences. Quand cette plante est en fleurs, elle répand une odeur qui approche de celle du melior.

Cette espèce croît dans la Jamaïque & en Afrique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (*V. v.*)

26. SPERMACOCÉE à fleurs en tête. *Spermacoe capitata*. Ruiz & Pav.

Spermacoe foliis lanceolatis, verticillis globosis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 61. tab. 91. fig. 8.

Ses tiges sont ligneuses, couchées, nombreuses, cylindriques, divisées en rameaux redressés, tétragones, velus, de couleur purpurine, garnis de feuilles sessiles, conniventes, lancéolées, très-entières, rudes à leurs bords, plissées, flétries, glabres à leurs deux faces, horizontales, puis rabattues; celles du sommet quaternaires, dont deux opposées, plus courtes; celles du bas quelquefois verticillées, garnies de stipules vaginales, surmontées de longs cils un peu épaissis à leur sommet.

Les fleurs sont réunies en tête, verticillées, sessiles, nombreuses, axillaires. La corolle est blanche; les étamines aussi longues que le tube; les anthères inclinées, un peu violettes; le filigmate capité, un peu échancré; les semences foliaires, jaunâtres, hilonnées, convexes d'un côté.

Cette plante se rencontre au Pérou, sur le revers des montagnes. Elle fleurit depuis le mois d'août jusqu'à celui d'octobre. h (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

27. SPERMACOCÉE à feuilles de lin. *Spermacoe linifolia*. Vahl.

Spermacoe foliis linearilanceolatis, villosis, levibus; summis quaternis, floribus verticillatis, flaminibus exsertis. Vahl, Elog. 1. pag. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 573. n°. 18.

On distingue cette espèce du *Spermacoe frida* à ses feuilles & à ses tiges velues, ainsi qu'à ses stipules beaucoup plus grandes.

Ses tiges sont herbacées, tétragones, un peu velues, particulièrement sur leurs angles; de couleur cendrée à leur sommet, garnies de feuilles médiocrement pétioles, ongiculées; les supérieures à peine longues d'un pouce, linéaires, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, rudes à leurs bords, velues à leurs deux faces, à peine nerveuses, vertes en dessus, un peu pâles en dessous, au nombre de quatre sous le verticille terminal; deux plus petites dans chaque aisselle. Les stipules sont membraneuses, à découperies sétacées.

Les fleurs sont nombreuses, verticillées, un peu plus longues que les stipules; la verticille terminal est globuleux, un peu plus grand que les autres. Les calices sont velus, de couleur cendrée; les étamines plus longues que la corolle; les anthères bleuâtres.

Cette plante croît à Cayenne. (*Descript. ex Pahl.*)

28. SPERMACOCÉE à rameaux serrés. *Spermacoce stricta*. Linn. f.

Spermacoce foliis linearis-lanceolatis, lineatis. Linn. f. Suppl. pag. 120. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 573. n° 17.

Cratogeomom amboinicum, minus. Rumph. Ambon. vol. 6. pag. 25.

C'est une plante basse, petite, haute d'environ un demi-pied, dont les tiges sont herbacées, roides, tétragones, rudes par leurs angles, munies de rameaux rapprochés, serrés, alternes, plus courts que les tiges, garnis de feuilles opposées, à peine pétiolées, étroites, lancéolées, un peu rudes au toucher, presque linéaires, enveloppées à leur base par une stipule membraneuse, ciliée à ses bords. Les fleurs sont sessiles, axillaires, disposées en verticilles étroits. La corolle est blanche.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Linn. f.*)

29. SPERMACOCÉE scabre. *Spermacoce scabra*. Willd.

Spermacoce foliis subrotundis cauleque hispido-scabris, floribus verticillatis, flaminibus exsertis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 572. n° 15.

Tardivel. Rheed. Malab. vol. 9. pag. 149. tab. 76. ? *Mula*.

Cette espèce se distingue aisément de toutes les autres par ses petites feuilles presque orbiculaires, très-obtuses. Ses tiges forment plusieurs ensemble des mêmes racines; elles sont simples ou médiocrement rameuses, diffuses, quadrangulaires, rudes au toucher, garnies de feuilles opposées, rudes à leurs deux faces, hispides. Les fleurs sont disposées par verticilles dans l'aisselle des feuilles. La corolle est grande, en forme d'entonnoir, trois fois plus longue que le calice; les étamines saillantes hors du tube de la corolle.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Willd.*)

30. SPERMACOCÉE velue. *Spermacoce villosa*. Swartz.

Spermacoce villosa, simplex; foliis ovato-lanceo-

latis, pubescentibus, summis quaternis; floribus verticillatis, flaminibus inclusis. Swartz, Prodr. 29.

Cette espèce a ses tiges simples ou à peine rameuses, quadrangulaires, velues, garnies de feuilles opposées, ovales-lancéolées, entières, pubescentes; les feuilles supérieures quaternées. Les fleurs sont disposées par verticilles dans l'aisselle des feuilles; les étamines renfermées dans le tube de la corolle.

Cette plante croît à la Jamaïque. (*○*)

31. SPERMACOCÉE denticulée. *Spermacoce serrulata*. Paliss. Beauv.

Spermacoce foliis ovatis, marginibus serrulatis, subsinosis; nervis rubellis; floribus axillaribus, verticillatis; caule suberecto, striato. (N.)

Spermacoceserrulata. Paliss. Beauv. Flor. d'Oware, 4^e. liv. pag. 39. tab. 33.

Ses tiges sont presque droites, tétragones, striées, garnies de feuilles médiocrement pétiolées, ovales, longues d'environ un pouce, finement denticulées en dents de scie, & comme épineuses à leur contour, un peu aiguës à leur sommet, trécérées en pointe à leur base, munies de plusieurs nervures rougeâtres, latérales, parallèles, dirigées vers le sommet des feuilles, dont la surface inférieure est munie de points enfoncés, placés irrégulièrement, & qui produisent de petites éminences à la face supérieure. Les stipules sont droites, subulées, & entourent les tiges.

Les fleurs sont sessiles, disposées par verticilles dans l'aisselle des feuilles; les calices à quatre divisions aiguës, légèrement ciliées; le limbe de la corolle à quatre découpures linéaires, lancéolées, obtuses; les étamines à peine de la longueur de la corolle; le style droit, saillant; le stigmate capité, presque à deux lobes. Le fruit est une capsule glabre, ovale, couronnée par les dents calicinales; les semences un peu reniformes.

Cette plante a été recueillie par M. Palissot de Beauvoir, en Afrique dans le royaume d'Oware, aux environs de l'établissement français.

* Espèces moins connues.

* *Spermacoce (flexuosa)*, caule flexuoso, gentiliis scissis; foliis ovato-lanceolatis, crassis. Lour. Flor. cochin. pag. 100.

* *Spermacoce (scandens)*, caule volubili; foliis subrotundis, acuminatis, debilibus. Sloan, Jam. Hill. 1. pag. 75. tab. 28. fig. 4. — Gmel. Sylt. Nat. vol. 1. pag. 234.

* *Spermacoce (havenensis)*, fruticosa, ramis spinosis. Gmel. Sylt. Nat. vol. 2. pag. 234. — Jacq. Stirp. Amer. edit. 2.

* *Spermatocoe* (ocymoides), *glabra*, *foliis ovatis*, *acuminatis*. Burm. Flor. ind. tab. 13. fig. 1.

* *Spermatocoe rubra*. Hott. Patif. & Jacq.

Cette dernière espèce a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris, citée de Jacquin. Elle ne m'est pas connue.

SPHAIGNE. *Sphagnum*. Genre de plantes acotylédones, de la famille des mousses, qui a des rapports avec les *buxbaumia* & les *phascum*, qui comprend des herbes la plupart matécapsuleuses, ramifiées, assez grandes & d'un vert-bleuâtre, dont la fructification est monoïque, latérale & terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques ; une capsule médiocrement pédonculée, latérale ou terminale, point ciliée à son orifice ; un opercule convexe, qui tient lieu de coiffe, & se fend transversalement.

Observations. Je crois avoir déjà remarqué que depuis la publication des premiers volumes de cet ouvrage, il avoit été fait de grands changements dans les différens genres de la cryptogamie ; que, d'après de nombreuses observations, tous les anciens genres établis par Linné avoient été réformés en partie, un grand nombre d'autres créés sur ces anciens ou sur des espèces nouvellement découvertes, ou d'après des observations plus étendues ; mais comme le plus grand nombre des genres de Linné ont déjà été présentés dans toute leur étendue, nous sommes forcés de suivre la marche établie d'abord par Linné, & de nous en tenir aux genres qu'il a présentés.

Ces plantes ont des fleurs monoïques ou dioïques. Les fleurs mâles, en forme de tête de clou, occupent la sommité des rameaux supérieurs. Les fleurs femelles sont situées à l'extrémité des tiges, au milieu des rameaux, quelquefois dans leurs aisselles ; elles produisent des capsules ou des urnes, dont les unes sont latérales, axillaires ; les autres terminales, plus ou moins pédonculées, globuleuses ou ovales, dont les bords ou le péristome sont nus, point ciliés, recouverts d'un opercule bombé, qui tient lieu de coiffe, qui se rompt en travers, & dont souvent les débris entourent la base de la capsule.

Observations. Les sphaignes tiennent une place bien importante dans l'économie de la nature ; elles occupent de très-vastes espaces dans les marais stagnans des grandes forêts & des montagnes ; elles s'y convertissent en une toulbe fibreuse, qui remplace, dans plusieurs contrées, le bois de chauffage. Leur végétation rapide & abondante exhausse insensiblement le terrain, & le convertit à la longue en un sol susceptible de culture. Comme cette mousse est douce, assez souple, sans piquans,

sans aspérités, presque corneuse & chaude, les femmes japonnoises en garnissent le berceau de leurs enfans ; elle entretient leur chaleur, absorbe leurs urines, & peut se renouveler fréquemment & sans frais.

ESPÈCES.

1. **SPHAIGNE à larges feuilles.** *Sphagnum latifolium*. Hedw.

Sphagnum ramis deflexis, foliis latioribus, ovatis, sabotibus ; capsulis subrotundis. (N.)

Sphagnum (palustre, var. *»), ramis deflexis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1569. n°. 1. — Flor. lapp. 415. — Flor. suec. 864. 959. — Reyg. Ged. 2. pag. 159. — Weiss. Cryptog. pag. 253. — Leers, Hærborn. n°. 806. — Pollich. Pal. n°. 971. — Dext. Nall. 310. — Æter. Flot. dan. tab. 474. — Lam. illust. Gener. tab. 872.

Sphagnum ramis deflexis, pedunculis terminalibus, capsulis subrotundis. Scop. Can. edit. 1. pag. 161. n°. 2. — edit. 2. n°. 1284.

Sphagnum cauliferum, ramis teretibus, pendulis. Haller, Helv. n°. 1724.

Sphagnum cauliferum, ramifolium, palustre, molle, candidum, reflexis ramulis, foliis latioribus. Haller, Enum. Helv. pag. 92. n°. 1.

Hypnum (cubile), *ramis lateralibus, deflexis ; primariis subrotundis, terminalibus congestis.* Neck. Meth. 188. n°. 45.

Sphagnum palustre, molle, deflexum ; squamis cymbiformibus. Dill. Musc. pag. 240. tab. 32. fig. 1.

Muscus palustris, in ericetis nascens. Pluk. Phyt. 101. fig. 1. — Vaill. Paris. 139. tab. 23. fig. 3.

Muscus squamosus, palustris, candidus, mollissimus. Tourn. Inst. R. Herb. 554.

Sphagnum cymbifolium. Hedw. Fund. 1. tab. 1. fig. 9. — II. tab. 3. fig. 1.

Sphagnum obtusifolium. Hoffm. Germ. 2. p. 21.

Sphagnum latifolium. Hedw. Spec. 27.

Sphagnum (vulgaire), *ramulis teretibus, deflexis ; foliis brevi-ovalibus, obtusiusculis, concavioribus ; perigonialibus obtusis.* Mich. Flot. boreal. Amer. vol. 2. pag. 285.

Cette plante est d'un vert-bleuâtre, blanchâtre ou un peu rougeâtre ; elle pousse des tiges serrées, fasciculées, souvent longues d'un pied ou deux pieds & plus, garnies, surtout à leur sommet, de rameaux grêles, très-nombreux, fasciculés, presque paniculés, sans consistance, se brisant très-facilement, souvent recourbés à leur extrémité, formant au sommet des tiges un paquet dense ou une sorte de tête épaisse, quelquefois d'un rouge-

rix, où un petit corymbe lorsqu'ils s'étalent. Les feuilles sont imbriquées, concaves, membraneuses, un peu élargies, presque obtuses, sans nervures sensibles, molles, tendres & souples lorsqu'elles sont jeunes ou garanties de l'air; sèches, cassantes, membraneuses quand elles sont frappées par l'air ou desséchées.

Les fleurs sortent, à l'extrémité des tiges, du centre du corymbe que forment les rameaux supérieurs. Leur pédoncule est court, blanchâtre, renflé en bourrelet à son sommet; il supporte une capsule sphérique, droite, brune à l'époque de la maturité.

Cette plante est très-commune dans les prés humides, les marais, les fossés, surtout dans les grandes forêts, là où se forme la tourbe. Elle occupe souvent un grand espace de terrain, & forme des gazons touffus, très-épais, souvent enfoncés de plusieurs pieds. (V. v.)

Elle offre quelques variétés remarquables, les unes n'ayant que des rameaux très-courts & fortement rapprochés entr'eux, d'autres ont leurs feuilles & toutes leurs parties beaucoup plus petites.

2. SPHAGNE capillaire. *Sphagnum capillifolium*. Hedw.

Sphagnum ramis deflexis; foliis lanceolatis, acutis, subplanis; capsulis ovatis. (N.)

Sphagnum palustre. Var. β . Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1569.

Sphagnum palustre, capillaceum. Weiff. Crypt. pag. 265.

Sphagnum ramis deflexis, gracilibus, acutioribus; foliis angustioribus, caule brevissimis. Haller, Helv. n°. 1714. Var. β .

Sphagnum palustre, molle, deflexum; squamis capillaceis. Dill. Musc. pag. 245. tab. 32. fig. 2.

Sphagnum cauliferum & ramosum, palustre, candidans; reflexis ramulis, foliis angustioribus. Haller, Enum. Helv. pag. 96. n°. 2.

Sphagnum capillifolium. Hedw. Fund. II. pag. 86. — I. tab. 3. fig. 13. 14. 15. — Brid. Musc. tab. 32. fig. 2. A.

Sphagnum intermedium. Hoffm. Germ. 2. p. 434.

β . *Sphagnum cuspidatum*. Hoffm. Germ. 2. p. 22.

— Dillen. tab. 32. fig. 2. B.

Sphagnum (gracile), *ramulis gracilibus, deflexis, subquarrosi; foliis minus, crebrioribus, lanceolatis, acutis; perigonalibus acuminatis*. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. pag. 283.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; elle offre cependant, dans toutes les par-

ties, des différences assez prononcées pour la regarder comme une espèce. Ses tiges sont ordinairement beaucoup plus courtes; les rameaux très-courts, presque filiformes, recourbés; ceux du sommet forment une petite tête presque arrondie, souvent d'un rouge très-vif. Les feuilles sont très-nombreuses, petites, imbriquées, planes ou médiocrement concaves, lancéolées ou presque capillaires, aiguës, d'un vert-glauque tendre ou un peu blanchâtre. Les capsules sont ovales, obtuses, point arrondies; elles sortent du centre de la petite tête terminale, d'entre les aisselles des rameaux qui la composent. Les pédoncules sont droits, filiformes, plus longs que ceux de l'espèce précédente.

Cette plante se rencontre dans les mêmes lieux que le *Sphagnum latifolium*, dans les marais stagnans des forêts & des montagnes. (V. v.)

3. SPHAGNE hérissée. *Sphagnum squarrosum*. Decand.

Sphagnum foliis distichè imbricatis, ovalibus, acutis, apice divergentibus. (N.)

Sphagnum squarrosum. Flugg. ined. ex herb. Clarion. — Pers. med. ex Hedw. fil. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 443.

Cette espèce ressemble aux deux précédentes par son port, sa couleur, les ramifications & la consistance de son feuillage; mais elle en diffère par la forme & la disposition de ses feuilles. Celles-ci sont imbriquées par deux rangs, concaves & ovales à leur base, aiguës & fortement divergentes à leur sommet; ce qui donne aux jeunes rameaux un aspect hérissé.

Elle croît dans les marais, aux environs de Paris, & a été observée par M. Delaroche. (Descript. ex Decand.)

4. SPHAGNE compacte. *Sphagnum compactum*. Decandolle.

Sphagnum pumilum, ramis brevibus, compactis; foliis ovato-oblongis, subacutis; capsulis ovalibus. (N.)

Sphagnum compactum. Decandolle, Flor. franç. vol. 2. pag. 443.

Sphagnum condensatum. Schleich. Crypt. Exf. Centur. 2. n°. 5.

« Cette espèce, dit M. Decandolle, est la plus petite de ce genre. Sa tige ne dépasse pas deux pouces; elle se divise, dès sa base, en branches qui émettent des rameaux courts & peu étalés. Les feuilles sont imbriquées, concaves, ovales-oblongues, presque pointues, d'un vert glauque ou blanchâtre, dépourvues de nervures. Les capsules sont peu nombreuses, droites, portées sur un

un pédicelle de deux à trois lignes, ovales-oblongues, brunes à leur maturité, ainsi que le pédicelle. »

Cette plante croît dans les marais ; elle a été découverte par M. Deleuze. x

« Je l'ai aussi reçue, ajoute M. Decandolle, de M. Schleicher, qui la regarde comme le *Sphagnum condensatum* de Bridel, à laquelle elle ressemble en effet par le port ; mais elle semble en différer par les rameaux moins étiles, & par la couleur d'un vert-glauque. La fructification du *Sphagnum condensatum* n'est pas encore connue ; & comme cette mouffe est originaire de l'île Bourbon, j'ai cru devoir désigner celle d'Europe sous un nom particulier, en attendant qu'on connoisse la fructification de la mouffe indiquée par Bridel. Au reste, la figure 4, tab. 2, v. 2 de l'ouvrage de ce naturaliste, donne l'idée du port de notre plante. »

5. SPHAIGNE des arbres. *Sphagnum arborescens* Lam.

Sphagnum ramosum, repens, *antheris lateralibus*, *secundis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1570. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 35. n°. 1260.

Neckera (heteromalla), *trunco inferiori ramoso*, *superiori foliato*; *capsulis heteromallis*; *foliis ovato-acuminatis*, *concavis*. Hedw. Crypt. 3. pag. 39. tab. 15. — Spenc. 202. — Brid. Muscol. 3. pag. 6.

Hypnum heteromallum. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1340. n°. 107.

Sphagnum heteromallum, *polycephalum*. Dillen. Musc. 248. tab. 32. fig. 6.

Musci apocarpus, *arboribus adnascens*, *polyspermos*. Vail. Parif. pag. 129. tab. 17. fig. 17.

Hypnum (polycephalum), *furculo ramoso*, *sparsis capitulis lateralibus*, *secundis*, *marginibus ciliatis*. Neck. Meth. 190.

Cette mouffe, très-différente des sphaignes par son port, par son lieu natal, l'est encore par le caractère de sa fructification ; elle se rapproche bien davantage des *hypnum* ; elle a été rangée dans un genre particulier, le *neckera*.

Ses tiges sont longues au moins d'un pouce, roides, termites, presque rampantes, divisées en rameaux nombreux, redressés, courts, étalés, formant de petits gazonz touffus, d'un vert-foncé, garnis de feuilles serrées, fort petites, concaves, lancéolées, pointues, trivértes d'une nervure presque dans toute leur longueur. Les capsules sont presque stiles, latérales, toutes disposées du même côté à la partie supérieure des rameaux, environnées de quelques feuilles aiguës, oblongues, jaunâtres, munies à leur bord extérieur de petites dents aiguës, & d'autant de cils univertés, Botanique. Tome VII.

alternes avec les dents ; surmontées d'un opercule droit, aigu, d'un rouge vif, persistant.

Cette plante croît sur le tronc des arbres ; elle fleurit dans le courant de l'automne ; les capsules conservent leur opercule jusque vers la fin de l'hiver. x (V. v.)

Observations. Le *Sphagnum alpinum* Linn. paroît avoir beaucoup plus de rapport avec les *bryum*. Ses tiges sont droites, médiocrement rameuses, presque dichotomes ; ses feuilles petites, linéaires-lancéolées, d'un vert-foncé, presque disposées sur trois rangs ; ses capsules ovales. Il croît dans les terrains marécageux au sommet des Alpes.

6 SPHAIGNE à tige simple. *Sphagnum ramosissimum*. Louréir.

Sphagnum foliis capillaribus, *imbricatis*; *ramis nullis*. Louréir. Flor. cochinch. pag. 839.

Louréir, dans la Flore de la Cochinchine, a mentionné cette nouvelle espèce de sphigne, remarquable par ses tiges dépourvues de rameaux, droites, pâles, longues de deux pouces, garnies de feuilles capillaires, imbriquées, très-nues. Les capsules sont arrondies, lisses à leur orifice, dépourvues de coiffe.

Cette plante croît dans les ruis pluvieux, sur les murs & les troncs des arbres à la Cochinchine. Appartient-elle aux sphaignes, ou conviendrait-il de la rapporter à un autre genre ? (Descript. ex Louréir.)

SPHÉRANTE. *Spheranthus*. Genre de plantes dicorylédonées, à fleurs composées, de la famille des cinarocéphales, qui a des rapports avec les *échinops*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont très-souvent décurrentes ; les fleurs réunies en têtes globuleuses, terminales ou axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des calices partiels à cinq folioles, contenant plusieurs fleurs ; des écailles courtes, formant un calice commun ; des fleurs hermaphrodites dans le centre, femelles à la circonférence ; un réceptacle médiocrement écailleux, sphérique ; les semences nues.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont réunies en une sorte de calice commun, composé d'écailles courtes, ovales, persistantes, qui enroulent le réceptacle de toutes parts, que Gærner considère comme les paillettes de ce réceptacle. On distingue :

1°. Un calice partiel, composé de quatre ou cinq folioles égales.

2°. Une corolle formée par des fleurs tubulées, Ss

hermaphrodites dans le centre, femelles à la circonférence; ceux du centre au nombre de deux ou trois, infundibuliformes, divisés à leur limbe en cinq découpures courtes, ouvertes, aigües; ceux de la circonférence de cinq à six, rubulés, étroits, presque subulés, à trois petites découpures à peine sensibles.

3°. Cinq *étamines* syngénèses; les filaments capillaires, très courts; les anthers cylindriques, réunies en un tube, plus longues que la corolle.

4°. Un *ovaire* oblong, un *style* sétacé, de la longueur des étamines; un *stigmate* bifide. Dans les fleurs hermaphrodites l'ovaire est stérile, le style épais, le stigmate très-simple.

Les *semences* sont solitaires, oblongues, couvertes de quelques poils blanchâtres, dépourvues d'aigrettes.

Le *réceptacle* commun est sphérique, creux en dedans à la base de chaque calice propre, de paillettes ovales, acuminées, un peu velues; le réceptacle partiel nu.

Observations. Ce genre se rapproche des *echinops*, dont il a presque le port; mais aucuns de ses parties n'est épineuse, & les espèces qui le composent, sont beaucoup plus petites. D'ailleurs, il y a de grandes différences entre la fructification de ces deux genres. Les *spharanthus* sont réduits à un très-petit nombre d'espèces. On pourroit même presque douter si ce ne sont pas des variétés de la même. Burmann, qui les a observées dans leur lieu natal, dit que le *spharanthus* varie d'une manière remarquable selon son âge, son exposition & la nature du terrain où il croît; ce qui doit rendre très-difficile pour la formation des nouvelles espèces, & ce qui exige un examen particulier de la part des voyageurs.

ES P È C E S.

1. SPHERANTE des Indes. *Spharanthus indicus*. Linn.

Spharanthus foliis lanceolatis, serratis, decurrentibus, glabris; pedunculis alatis; alis caulibus & pedunculorum serratis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2394. n°. 1.

Spharanthus foliis decurrentibus, lanceolatis, serratis; pedunculis cristatis. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 344. — Flor. zeyl. 312. — Roy. Lugd. Bat. 145. — Miller, Dict. n°. 1. — Lam. Illustr. tab. 718. fig. 2.

Spharanthus purpurea, alata, serrata. Burm. Thes. zeyl. pag. 220. tab. 9. fig. 3.

Polycephalus. Forsk. Flor. ægypt-arab. pag. 154. n°. 100.

Scabiosa major, indica, caule & pediculis foliosis. Pluken. Phytogr. tab. 312. fig. 6.

Adaca-menien. Rheed. Hort. Malab. vol. 10. pag. 85. tab. 43. — Rai, Suppl. 241.

Vulgairement la bouleare.

Ses tiges sont hautes d'environ un pied, striées, lisses, rameuses; les rameaux simples, alerces, ailés, ainsi que les tiges; l'aile courte, un peu membraneuse, verdâtre, denticulée à ses bords; les feuilles alerces, sessiles, décurrentes à leur base, lancéolées, vertes, glabres à leurs deux faces, médiocrement dentées en scie à leur contour, obtuses ou à peine aigües à leur sommet.

Chaque rameau ne porte guère qu'une seule fleur latérale, dont le pédoncule, ordinairement plus court que la feuille, lui est opposé, simple, ailé, uniflore. Cette fleur est globuleuse, très-serrée, bleuâtre; ses calices & ses écailles presque glabres; le style saillant hors de la corolle; celle-ci fort petite. Les semences sont ovales-oblongues, hérissées de quelques poils rares & courts.

Cette plante croît dans les Indes orientales. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

2. SPHERANTE à petite tête. *Spharanthus microcephalus*. Willden.

Spharanthus foliis obovato-lanceolatis, obsolete mucronato-serratis, decurrentibus, glabris; pedunculis alatis; alis caulibus & pedunculorum integerrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2395. n°. 2.

Cette espèce n'est probablement qu'une variété du *spharanthus indicus*, dont elle offre les principaux caractères; elle en diffère par les aîles des rameaux & des pédoncules très-entières & non denticulées; par ses feuilles en ovale renversé, presque lancéolées, dentées en scie, mais dont les dentelures sont dilantes, fort petites, un peu mucronées. Les rétes des fleurs ne sont point sphériques, mais oblongues & une fois plus petites.

Cette plante croît à l'Île de Java. (Descript. en Willd.)

3. SPHERANTE d'Afrique. *Spharanthus africanus*. Linn.

Spharanthus foliis decurrentibus, ovatis, serratis; pedunculis teretibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1314. — Thunb. Prod. 169. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2395. (Exclusio Burmanni synonymo, tab. 60. fig. 2.)

Spharanthus folio oblongo minor. Vaillant, A&C. Acad. Paris. 347.

Senecio minor, alato caule, maderaspatana. Pluken. Almug. pag. 335. tab. 108. fig. 7. — Rai, Suppl. 235.

La différence qui existe entre le port de cette

espèce & la précédente, est peu marquée; elle consiste principalement dans les pédoncules cylindriques, & dépourvus d'une membrane ailée. Les tiges sont droites, médiocrement rameuses; les rameaux simples, garnis de feuilles décurrentes sur les tiges, sessiles, plutôt ovales que lancéolées, dentées en scie à leur contour, les dentelures aiguës; les fleurs latérales, soutenues par un pédoncule simple, opposées aux feuilles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. O

Le *Spharanthus africanus*, Burm. Flor. Ind. pag. 185. pag. 60. fig. 2. appartient, d'après Willdenow, à l'*Hippia integrifolia* de Linné fils.

4. SPHÉRANTE hérissée. *Spharanthus hirtus*. Willd.

Spharanthus foliis obovatis, serratis, hirtis, decurrentibus; pedunculis alatis; alis, caulis & pedunculo hirtis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 2395. n°. 3. — Lam. Illustr. Gener. tab. 718. fig. 1.

Cette plante, qui a des rapports avec le *Spharanthus africanus*, doit en être distinguée par ses feuilles, ses ailes hérissées de poils courts, ciliées à leurs bords, & par ses pédoncules garnis d'une aile membraneuse.

Ses tiges sont droites, grêles, médiocrement rameuses; les rameaux courts, alternes, pourvus d'une aile courte, un peu ondulée, ou bien irrégulièrement déchirée & munie de cils inégaux à ses bords. Les feuilles sont ovales, presque sessiles, chargées de poils courts & rares, rétrécies à leur base en un pétiole court & décurent, arrondies & un peu acuminées à leur sommet, ciliées & finement denticulées en scie à leurs bords; les dentelures courtes, serrées, inégales, aiguës; les feuilles supérieures entièrement sessiles. Les fleurs sont latérales, globuleuses, opposées aux feuilles, supportées par un pédoncule ailé, un peu plus long que les feuilles; celui des fleurs supérieures très-court.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

5. SPHÉRANTE de la Chine. *Spharanthus chinensis*. Linn.

Spharanthus foliis sessilibus, pinnatifidis. Linn. Mantiff. 119. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2395. n°. 5.

Cette espèce s'élève peu; elle a le port du *Spharanthus indicus*, mais elle est beaucoup plus petite: on la distingue d'ailleurs à ses feuilles profondément finées & presque pinnatifides à leurs bords; à ses ailes des tiges, des rameaux & des pédoncules sont décurrentes, crépues & ondulées.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales.

SPHÉRIE. *Spharia*. Genre de plantes acotylédones, de la famille des algues, qui a des rapports avec les lichens & les clavaires, & qui comprend des espèces la plupart très-petites, foliaires ou agrégées; d'autres beaucoup plus grandes, supportées par une base plane ou allongée, qui dévient le réceptacle d'un grand nombre de loges féminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un réceptacle très-variable; des petites loges ou capsules arrondies, remplies d'une liqueur gélatineuse, qui contiennent de très-petites semences pulvérulentes; un orifice souvent allongé, plus ou moins ouvert.

Observations. Les sphéries, considérées en elles-mêmes, c'est-à-dire, relativement aux seules parties de leur fructification, indépendamment du réceptacle sur lequel elles sont très-souvent insérées, sont de petites capsules ou des loges féminales globuleuses, arrondies ou ovales, fermes, coriaces, ouvertes à leur sommet par un orifice souvent prolongé, quelquefois à peine sensible. Une substance mucilagineuse remplit leur intérieur, & contient en même temps des grains infiniment petits, pulvérulents, qu'on regarde comme les semences fécondées par le mucilage dont nous venons de parler, & qui forment par l'orifice de la capsule. Ces capsules changent ordinairement de forme selon leur âge; elles se présentent dans leur jeunesse, sous la forme de petits tubercules, quelquefois de la grosseur d'une tête d'épingle, & même plus petits, tandis que d'autres espèces, bien moins nombreuses, parviennent à celle d'un petit pois. Elles sont alors pleines, arrondies ou ovales, en totalité ou en partie enfoncées dans le réceptacle, ayant leur orifice plus ou moins saillant, quelquefois presque point sensible, plus ordinairement allongé de manière à donner à la capsule la forme d'une poire; dans d'autres c'est un petit mamelon obtus, proéminent. Ces capsules, après avoir lancé leurs semences, souvent le compriment, deviennent concaves ou ombilicées à leur sommet. Leur forme n'est plus la même; leur substance est plus dure, plus coriace. D'autres offrent encore, un peu avant l'époque de la maturité des semences ou de l'éclosion de leurs graines, une pousière blanchâtre, très-fugace, qui a été très-bien observée par Bulliard, Tode, Hoffmann, &c. Une autre particularité essentielle est que le plus grand nombre des espèces qui n'ont point de réceptacle élevé & allongé, naissent sous l'épiderme des feuilles mortes & des vieux troncs d'arbres, qu'elles percent lorsqu'elles sont arrivées à l'époque de répandre leurs semences. Toutes ces capsules sont noires; quelques-unes cependant sont rouges ou jaunâtres.

Le réceptacle sur lequel sont insérées toutes ces capsules est très-variable; il est quelquefois épais, allongé, assez fort, charnu ou de la nature du liège, long d'un ou de plusieurs pouces. Les capsules ou loges féminales sont situées à sa surface extérieure, soit dans toute sa longueur, soit à la partie supérieure; cette surface paroit alors comme chagrinée ou granuleuse. Dans un plus grand nombre d'autres espèces le réceptacle est par plaques étalées, comprimées, subéreuses ou charnues, plus ou moins épaisses, dans lesquelles les capsules sont enfoncées en totalité ou en partie. Il arrive aussi que le réceptacle consiste en lignes simples ou ramifiées, qui se glissent sous l'épiderme de l'écorce, & y sont plus ou moins allongées. D'autres fois le réceptacle n'est pas sensible: alors les capsules sont réunies par groupes, conniventes à leur base ou simplement rapprochées, mais distinctes. Enfin d'autres capsules existent solitairement, éparées sur les corps où elles croissent, isolées ou un peu confluentes. Ces caractères offrent de très-bonnes sous-divisions.

Les espèces sont très-nombreuses, très-difficiles à bien distinguer, leur petitesse exigeant l'usage du microscope ou d'une très-forte loupe. Nous nous bornerons à faire connoître les plus saillantes, & nous renvoyons le lecteur, pour les autres, aux ouvrages d'Hoffman, de Bulliard, de Tode, de Dixon, & principalement à ce que M. Persoon a publié sur ce genre. Peu de botanistes ont porté aussi loin que ce savant infatigable les recherches & les observations sur les plantes cryptogames, particulièrement sur les champignons. La précision & l'exactitude des descriptions, réunies à la vérité des figures, doivent inspirer la plus grande confiance aux ouvrages de M. Persoon, & lui mériter une reconnaissance due à ses longues & pénibles recherches.

ESPÈCES.

* Loges féminales insérées sur un réceptacle allongé, charnu ou subéreux.

1. SPHÉRIE militaire. *Spharia militaris*. Persf.

Spharia carnosus, flavescens-rubra, clavulæ sphaerulæ prominentibus tuberculosa. Persf. Synopf. pag. 1. — Idem, Comm. de Fung. Clar. pag. 11. & Observ. Mycol. 2. pag. 66. tab. 2. fig. 3.

Clavaria militaris. Linn. Spec. pag. 1652. — Lam. Dict. 2. pag. 37. — Oeder. Flor. dan. tib. 337. fig. 1. — Lam. Illustr. Gen. tab. 838. fig. 1.

Clavaria granulosa. Bull. Champ. pag. 199. rab. 496. fig. 1. — Vaill. Botan. Paris. tab. 7. fig. 4.

Clavaria squamosa. Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 125.

§. *Polycephala minor, in clavulas plures divisæ*. Persf. Synopf. pag. 2.

Cette sphérie se présente sous la forme d'une petite massue, haute de deux à trois pouces, d'un beau jaune de safran, simple, quelquefois un peu comprimée & à plusieurs têtes, comme dans la variété §, glabre, cylindrique, épaisse à son sommet, d'une substance jaunâtre, tendre, fragile, dont la partie supérieure est chargée de petites grains saillans, ovales, cartilagineux, dans lesquels est renfermée une liqueur mucilagineuse où se trouvent de fort petites semences.

On la rencontre, au commencement de l'automne, après les grandes pluies, dans les forêts, sur le tronc des arbres pourris, parmi les mousses sur la terre, & même sur des chrysalides. (V. v.)

2. SPHÉRIE fongue. *Spharia alutacea*. Persf.

Spharia carnosus, opaca, pallida, clavulæ sublevis. Persf. Synopf. pag. 2. — Comm. pag. 12. & Obs. Mycol. 2. pag. 66. tab. 1. fig. 2. a. b. c.

§. *Spharia (albicans), majuscula, carnosus, albidus, pallidus, clavulæ stipitatae basi turgidis*. Persf. l. c.

Spharia clavata. Sowerb. Engl. Fung. tab. 159.

Cette sphérie croît sur les rameaux & parmi les feuilles de pins & de sapins à demi-décomposés sur la terre: on la trouve aussi quelquefois sur des chrysalides. Son réceptacle est un peu mou, charnu, épais, presque cylindrique, long d'environ deux pouces, obru à son sommet, d'un jaune très-pâle dans sa jeunesse. Il est beaucoup plus renflé à l'époque des semences, épais à sa partie supérieure, ventru, de couleur olivâtre. Sa surface est parsemée de loges féminales fort petites, arrondies: il s'en échappe une liqueur épaisse, gélatineuse, qui se condense en forme de petits filamens. La plante § est plus grande: son sommet est creux en dedans. Elle croît en automne dans les forêts, en Angleterre.

3. SPHÉRIE capitée. *Spharia capitata*. Persf.

Spharia clavula ovata, badia, stipite longiusculo, crasso; radice tuberosa. Persf. Synopf. pag. 3. — Comm. pag. 13. — Oeder. Flor. dan. tab. 490.

Clavaria capitata. Holmsk. Coryph. Icon. & ed. Persf. pag. 52.

§. *Spharia (agariciformis), stipitata, stipite flavo, cylindrico; pileo ovato, castaneo, punctato, subgeminato; radice tuberosa, bivolvoïda, internis nigra*. Butt. Fung. pag. 8. tab. 170.

On rencontre cette espèce sur la terre. Elle a une racine tubéreuse, noire en dedans. Son réceptacle est allongé, épais, charnu, cylindrique, jaunâtre; sa partie supérieure renflée, de couleur

de châtaigne, ovale, quelquefois fendue en deux, & parsemée de points qui sont autant de loges féminales.

4. SPHÈRE à racines. *Spharia radicata*. Decand.

Spharia clavula inaequalis, subtergida, nigrescente; stipite, basi insisque flavo. (*Spharia ophioglossoides.*) Pers. Synopf. pag. 4. — Comm. pag. 12. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1474. — Ehrh. Plant. Crypt. ex Sic. Dec. 16. n°. 160. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 283.

Clavaria radicata. Bull. Champ. pag. 195. tab. 410. fig. 2.

Cette *Spharia* croît en automne sur la terre, parmi les bruyères & les bois de pins. Son pédicule ou réceptacle est ovale, renflé, long d'environ deux pouces, presque cylindrique, rarement biffé, de couleur olive, un peu noirâtre à l'extérieur, d'un vert-jaunâtre en dedans, muni d'une longue racine jaunâtre & fibreuse. Sa substance est un peu molle, coriace; toute sa surface couverte d'un rang de petites loges, qui contiennent des semences enfoncées dans une matière gélatineuse.

5. SPHÈRE bulbeuse. *Spharia bulbosa*. Pers.

Spharia terrestris, subramosa, glabra, nigrescenti-cinerea; radice tuberosa. Pers. Synopf. pag. 5. — Comm. pag. 14. & Observ. Mycol. 2. pag. 1. fig. 1. a. b.

Cette espèce a des rapports avec le *spharia cornuta*; elle en diffère par son réceptacle glabre, par ses racines bulbeuses, presque globuleuses. Elle est droite, haute d'environ un pouce & demi, cylindrique, aiguë à son sommet, de couleur cendrée, un peu noirâtre; mais à mesure qu'elle avance en âge, elle devient presque plate, comprimée, se fend & se rompt longitudinalement. Toute sa surface est garnie de petites loges noires, orbiculaires, mamelonnées dans leur milieu, un peu gélatineuse dans leur intérieur.

Cette plante croît sur la terre, parmi les mousses & dans les bois de pins.

6. SPHÈRE cornue. *Spharia cornuta*. Hoffm.

Spharia gregaria, ramosa, compressa, basi hirta. (*Spharia hypoxylon.*) Pers. Synopf. p. 5. — Comm. pag. 14. & Observ. Mycol. 1. pag. 20. fig. 2. fig. 1. a. f. — Sowerb. Engl. Fung. tab. 55. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 283.

Spharia (cornuta), palmata, compressa, nigra. Hoffm. Plant. Crypt. t. pag. 11. tab. 3. fig. 1. (*Varietas major.*)

Clavaria (hypoxylon), ramosa, cornuta, compressa. Linn. Syst. veget. edit. 15. pag. 1018. —

Lam. Dict. 2. pag. 38. — Idem, Flor. franç. vol. 1. pag. 126. — Bull. Champ. t. b. 180.

Coralloides ramosa, nigra, compressa, apicibus albidis. Tournef. Inst. pag. 565.

β. *Cupressiformis, minor, clavula ventricosa, aut tereti-acuminata.* Pers. l. c. — Mich. Nov. Gener. Plant. tab. 55. fig. 5.

Spharia (cupressiformis), subimplex, stipitata; capitulo conico. Woodw. apud With. Botan. arrang. 3. pag. 457.

Cette sphère est d'une substance dure, coriace, subéreuse, haute d'un à deux pouces, d'un noir-foncé, simple à sa partie inférieure, & tres-ordinairement irrégulièrement ramifiée à sa partie supérieure, couverte dans sa jeunesse d'une poussière blanchâtre & sans loges apparentes, hérissée de poils noirs à sa base. Les sommets de ses divisions sont blanches & pubescentes, qui deviennent cendrées & glabres à mesure que la plante avance en âge. C'est alors seulement que les loges féminales sont apparentes sous la forme de petits points noirs, environnés d'un suc mucilagineux, & qui s'échappent sous l'apparence d'une poussière noire.

Cette plante croît en hiver sur les bois pourris, sur les vieilles poutres, &c. Elle ne fructifie guère que dans l'été. (V. v.)

7. SPHÈRE polymorphe. *Spharia polymorpha*. Persoon.

Spharia gregaria, formidabilis, clavula ventricosa, sphaerula uniaque cinctis. Pers. Synopf. pag. 7. — Comm. pag. 17. & pag. 114. — Idem, Obs. Mycol. 2. pag. 64. 65. tab. 2. fig. 2. 4. f. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 283.

Spharia (carcharias), pileo rugoso, subramoso; thecis apicem ambientibus. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1474.

Spharia carcharia, β obtusa. Weig. Obs. Botan. pag. 49. tab. 3. fig. 3.

Spharia digitata. Sowerb. Engl. Fung. tab. 69.

Clavaria digitata. Holmsk. Coryph. Icon. & cd. Pers. pag. 75. — Weder. Flor. dan. tab. 90.

Clavaria hybrida. Bull. Champ. pag. 194. tab. 440. fig. 1.

Spharia nigerima, aspera, palmata; corymbus planis, cornosis, pulverulentis. Hall. Helv. 2194. — Michx. Gen. tab. 55. fig. 1. 2.

Cette espèce varie, tant par sa grandeur que par ses formes; elle se rapproche beaucoup du *spharia digitata*; elle en diffère en ce qu'elle est constamment moins élevée, n'ayant guère plus d'un pouce de haut; que ses sommets sont toujours jaunâtres, le plus souvent comprimés & ramifiés. Elle

est parfaitement glabre ; ce qui la distingue de *Spharia cornuta*. Sa substance intérieure est blanche, de la nature du liège ; elle n'a point de racines, mais elle s'insinue quelquefois dans les fentes du bois par des fibres noires de diverses formes.

Cette plante croît sur les vieilles souches, & sur les troncs à demi-pourris des arbres, surtout des hêtres.

8. SPHÈRE digitée. *Spharia digitata*. Pers.

Spharia castiposa, nigra, stipitibus glabris, basi connatis; clavulis teretibus; apice acuminato, sterilibus. Pers. Synopf. pag. 6. — Comm. pag. 15. & Obs. Mycol. 2. tab. 2. fig. 6. (*immatura*) & fig. 1. (*matura*). — Dec. Flor. franç. vol. 2. pag. 284.

Clavaria (digitata), ramosa, lignea. Linn. Spec. Plant. pag. 1651. — Lam. Dict. 2. pag. 38. — Bull. Champ. pag. 192. tab. 120. — Schæff. Fung. Bav. tab. 265.

Spharia. Haller, Helv. n°. 2194.

Agaricus digitatus, niger (& apicibus albidis). Tournet. Inst. R. Herb. 562.

Lithophytoides terrestre, digitatum, nigrum. Marchand, Act. Academ. 1711. pag. 100.

Lichen-agaricus, terrestris, digitatus, niger, apicibus albis-rufis, &c. ? Michel, Gen. 104. tab. 54. fig. 4.

Cette sphère, implantée par sa base dans du bois pourri, est entière à sa partie inférieure, d'une substance coriace, approchant de celle du liège, divisée ordinairement en un grand nombre de digitations droites, fasciculées, glabres, raboteuses, blanches en dedans, d'un noir-foncé en dehors, allongées, un peu aiguës dans leur jeunesse, raccourcies, plus épaisses & en forme de massue à l'époque de la maturité. Les sommets sont blanchâtres, pubescens, pulvérulens ; leur surface couverte de petites loges noirâtres.

Cette espèce croît dans les lieux ombragés, sur des bois pourris. Exposée sous l'eau, au soleil, elle donne un gaz dans lequel M. Decandolle a trouvé jusqu'à 0,70 de gaz hydrogène. (V. v.)

9. SPHÈRE à pédicule grêle. *Spharia entomorphiza*. Dickf.

Spharia capitulo subrotundo, fusco; stipite longo, tenuissimo. Pers. Synopf. pag. 4.

Spharia (entomorphiza), stipitata, capitulo subrotundo, fusco. Dickf. Plant. Crypt. Britan. Fasc. 2. pag. 22. tab. 3. fig. 3.

Cette espèce croît sur les larves mortes des insectes. Elle est très-remarquable par son pédicule très-grêle, presque filiforme, long au moins de deux pouces, un peu comprimé, qui souvent

se divise en deux à sa partie supérieure, & se termine alors par deux têtes sphériques, de couleur brune, de la grosseur d'un petit pois, qui paroissent granuleuses par les petites loges féminales dont elles sont parsemées.

10. SPHÈRE des fruits. *Spharia carpophylla*. Persoon.

Spharia caulescens, tenuis, primò subulata-villosa, demùm clavata, glabra; clavula cylindrica, fissile multò brevior. Pers. Synopf. pag. 6. — Comment. pag. 18. — Idem, Observ. Mycol. 1. pag. 19; & 2. pag. 65. tab. 1. fig. 3. 2. d.

Cette sphère se rencontre assez fréquemment sur le péricarpe des fruits du hêtre. Elle se présente sous la forme d'un filament épais, subulé, velu dans toute sa longueur, très-rétréci & blanchâtre à son sommet, presque de couleur d'olive foncée. Avec l'âge le duvet tombe, la partie supérieure s'allonge, se renfle en massue oblongue, un peu flexueuse, & se couvre de petits grains qui sont autant de loges féminales. Sa longueur est d'un ou deux pouces.

* * Loges féminales, insérées sur un réceptacle plane, étalé, plus ou moins apparent.

11. SPHÈRE menteuse. *Spharia decipiens*. Decandolle.

Spharia subinerea, loculis nigris; apertura cylindrica, truncata. (N.)

Spharia decipiens. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 285. n°. 760.

La base de cette sphère est une plaque étendue, plane, dure, charnue, d'un blanc-sale, dans laquelle sont encaissées des loges ovoïdes, nombreuses, noires, qui se prolongent au dessus de la base en un orifice cylindrique, d'un noir mat, tronqué & un peu chagrine au sommet, long d'environ une ligne ; ces orifices nombreux, & tous de la même longueur, donnent à cette sphère un aspect de régularité remarquable.

Elle croît sur les vieux troncs pourris, quelquefois dans les places dépourvues d'écorce, & alors son orifice prolongé la fait aisément reconnaître ; quelquefois dans les places encore munies d'écorce, & alors les orifices étant cachés en partie dans l'écorce, l'aspect de cette plante est tout-à-fait changé : on croiroit, au premier coup d'œil, voir une foule de sphères à loges solitaires & distinctes, tandis que ce sont réellement des orifices d'une sphère à plusieurs loges. (Decand. l. c.)

12. SPHÈRE concentrique. *Spharia concentrica*. Pers.

Spharia obovata subrotundaque magna, intus striis concentricis interrupta. Pers. Synops. pag. 8. tab. 1. fig. 2-4. — Bott. Fung. tab. 180. — Dec. Flor. franç. vol. 2. pag. 284.

Sphario (fraxinea), subrotunda, nigro, externè glabra, subpustulata, internè circulis concentricis natato. Sibth. Flor. Oxon. pag. 401. — Sower. Engl. Fung. tab. 160.

5. *Sphario pedicellato, fuscescens, minor, sulcigristato.* Pers. l. c.

Spharia tunicata. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 59. tab. 17. fig. 130.

Lycoperdon orrum. Schæff. Fung. bav. tab. 329. (*Varietis atra.*)

Cette sphérie varie plus ou moins quant à la forme de ses expansions plus ou moins arrondies, quelquefois épaisses, étalées ou presques carrées; sa couleur est brune ou noirâtre. Le plus grand nombre des individus sont fétilles; quelques-uns ont un pédicule court, épais: dans leur vieillesse, ils ressemblent de loin à une vesse de loup. Leur surface est inégale, noirâtre, couverte de protubérances gristâtes. Si l'on coupe transversalement cette petite masse charnue, on distingue des couches concentriques très-blanches, séparées par des veines noirâtres. La couche extérieure contient un rang de petites capsules ovales, noirâtres, pleines d'une substance noire, pulvérulente. Les couches blanches sont composées de filaments perpendiculaires qui ressemblent à ceux de l'amiante.

Cette espèce, une des plus grandes de ce genre, croît sur les troncs des saules & des frênes.

13. SPHÉRIE couleur d'argile. *Spharia argillacea.* Pers.

Spharia sparsa, subglobosa, argillacea aut lutescente cinereo, sphaerulis prominulis papillatis; substantia submolli fuscescente. Pers. Synops. p. 10. n.º 4. — Idem, l. Pic. Fung. Fasc. 1. p. 5. tab. 3. fig. 1.

Spharia (argillacea), subrotunda, sparsa, argillaceo, intus nigrescent, sphaerulis prominentibus, papillatis. Pers. Dispos. Method. Fung. pag. 49.

On rencontre cette espèce sur les troncs & sur les rameaux desséchés des arbres, particulièrement sur le frêne; elle n'est pas commune. Elle forme de petits amas globuleux, arrondis, d'environ trois lignes de diamètre; quelquefois plus ou moins aplatis, de couleur d'argile ou d'un cendré-jaunâtre. Les capsules sont légèrement proéminentes, terminées par un petit mamelon. La substance intérieure est molasse, de couleur brune, presque noire dans la vieillesse.

14. SPHÉRIE grenue. *Spharia granulosa.* Decand.

Sphario magno, tota nigra, sphaerulis globosis,

prominulis. Pers. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 286.

Spharia rubiformis. Pers. Synops. 9. — Dispos. Method. Fung. pag. 2. & in Annal. Bot. Fasc. 2. pag. 20. tab. 2. fig. 1.

Hypoxylon granulosum. Bull. Champ. pag. 176. tab. 487. fig. 11.

15. *Eudem, effusa, dilatata, undulata.*

Sa forme est presque ronde ou ovale, sous l'aspect d'une croûte épaisse, très-dure, noirâtre, plus ou moins élargie, couverte dans sa jeunesse d'une poudie gristâte. Sa surface est chargée de protubérances mamelonées, qui répondent à autant de cellules intérieures, de couleur noire. Ses formes varient selon l'âge de la plante.

On trouve cette sphérie sur le tronc des bois morts, dans les forêts.

15. SPHÉRIE bicolore. *Spharia bicolor.* Decand.

Spharia globosa, primò rubra, dein nigricans, laticida, localis aggregatis, minimis, superficiè granulosis. (N.)

Hypoxylon coccineum. Bull. Champ. pag. 174. tab. 495. fig. 2.

16. *Spharia (fragiformis), gregario, subconfluens, rubiginosa, intus atro nient, sphaerulis papillatis.* Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 49. & in Annal. Bot. pag. 21. tab. 2. fig. 5. — Idem, Synops. pag. 9.

Spharia rubra, frangi similis. Hall. Helv. n.º 2150. tab. 47. fig. 10.

Lycoperdon (variolosum), parasiticum, sessile, subrotundum, cortice exteriori suavo, deciduo; farinè atrâ, compositâ. Linn. Syst. veget. edit. 15. p. 1019.

17. *Spharia (radians), composita, subglobosa, aggregata, sparsa, subincurculosa, atra, submonophicha; volva pulverulenta, fulva; sphaerulis albis.* Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 29. tab. 12. fig. 101.

18. *Spharia (callosa), composita, subglobosa, aggregata, sparsa, aequalis, nigra, monophicha; volva fusca, fugaci; sphaerulis atris.* Tode, l. c. pag. 28. tab. 12. fig. 100.

J'ai réuni, d'après M. Persoon, plusieurs espèces de sphéries en une seule, qui ne sont très-probablement que des variétés de la même, selon les différents âges ou son lieu natal.

Cette sphérie forme, dans son premier âge, des globules épars, sphériques, variables dans leur grandeur, tendres, charnus, d'un rouge tirant sur le vermillon. Ces globules grossissent avec l'âge, acquièrent une couleur noirâtre & luisante dans leur intérieur, & celle d'un rouge de brique au dehors. Ils forment, par leur ensemble, une croûte épaisse & fort dure, dont la surface est inégale,

parfennée d'un rang de cellules fort petites, très-ferrées, un peu saillantes au dehors. Ils perdent leur enveloppe extérieure dans leur vieillesse, & offrent alors une substance compacte & charbonneuse.

Cette plante croît sur l'écorce des arbres, particulièrement sur celle des hêtres, des noyers, du marronnier, &c.

16. SPHÉRIE machefet. *Spharia scoria*. Decand.

Spharia tuberculata rotundato-oblonga, fuscescens, cinereo-fusca; punctis nigris, vix prominentibus. (N.)

Spharia scoria. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 286. n°. 762.

Cette espèce a quelques rapports avec la sphérie bicolorée avancée en âge; elle forme des tubercules arrondis ou oblongs, souvent réunis les uns avec les autres en forme de bande allongée, légèrement convexes, un peu tuberculeux, d'un gris-brun & sale, marqués de petits points noirs peu proéminents, qui indiquent l'orifice des loges. Celles-ci sont noires, luisantes, petites, nombreuses, posées sur une substance blanche & un peu subéreuse.

Cette plante croît sur les bois morts. Elle a été trouvée par MM. Leman & Dufour. (Decand. l. c.)

17. SPHÉRIE cohérente. *Spharia coherens*. Persf.

Spharia gregaria, conflens, planiuscula, primò levis, fordide fuscescens, demùm subbullata, nigrescens. Persf. Disposit. Meth. Fung. pag. 2. — Idem, Synopf. pag. 11. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 286.

Elles forme de petites masses arrondies, comprimées, irrégulières, très-ordinairement réunies plusieurs ensemble, & forment une croûte inégale & mamelonnée. Leur couleur est brune ou rouffâtre, & ensuite devient noire avec l'âge. Elles renferment un grand nombre de cellules arrondies, dont les orifices sont saillants, & se présentent au dehors comme autant de grains prourans qui finissent par se boursoffier d'une manière très-irrégulière.

Cette plante croît dans les forêts, sur l'écorce des hêtres.

18. SPHÉRIE brune. *Spharia fusca*. Persf.

Spharia deformis, subconflens, fusca, intus subconcolor; sporulis umollicatis, subprominulis. Persf. Disposit. Meth. Fung. pag. 49. & in Annal. Bot. pag. 27. tab. 2. fig. 3. — Synopf. pag. 12. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 287.

Spharia (frugiformis), composita, convexa,

obscurè rubra. Hoffm. Plant. Crypt. 1. pag. 20. tab. 5. fig. 1. — Dickf. Fascic. 1. Plant. Crypt. pag. 24.

Spharia conflens. Willd. Flor. botol. pag. 416. tab. 7. fig. 21.

Spharia tuberculosa. Bot. Fung. tab. 123. fig. 1.

S. Spharia coryli. Decand. l. c. pag. 287.

Elle croît sur le hêtre, l'épine blanche, & plusieurs autres arbres dont elle perce l'épiderme. Elle est d'un brun-rougeâtre, & présente des tubercules compacts, arrondis ou oblongs, d'environ deux lignes de diamètre & de hauteur, sinués & en bois en dessus. La substance intérieure est également d'un brun-rougeâtre. Chaque tubercule renferme plusieurs loges dont l'orifice n'est pas sensible.

La plante se diffère de la précédente en ce que ses tubercules sont plus globuleux, plus rarement réunis, & n'ont point leur surface marquée de rides ou d'anfractuosités. Les loges en sont aussi plus grandes & plus visibles; leur orifice ne se distingue pas en dehors. (Decand.)

19. SPHÉRIE en bouclier. *Spharia peltata*. Decand.

Spharia fusco-rubra, cicularis, peltata, loculis minimis, numerosissimis, superjace papillis. (N.)

Spharia peltata. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 287. n°. 767.

Cette espèce se rapproche de la sphérie brune par sa couleur, mais elle forme sur l'écorce un bouton orbiculaire, uni, plane sur les bords, relevé vers le centre en un mamelon obtus, de couleur plus foncée. Les loges sont très-petites, nombreuses, situées à la surface: on ne peut en distinguer l'orifice.

Cette plante croît sur le hêtre & le chêne; elle a été observée par M. Dufour. (Decand. l. c.)

20. SPHÉRIE en bulles. *Spharia bullata*. Hoffm.

Spharia (bullata), depressa, sabrounda, ovalis reniformis, apiculis papillaribus. Persf. Synopf. pag. 27. — Idem, Leon. Pict. Fung. Fasc. 1. 7. tab. 5. fig. 6.

Spharia bullata, composita, convexa, nigra, carne alba. Hoffm. Plant. Crypt. tab. 5. pag. 2. fig. 1.

Lyoperdon nigrum. Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 644 ?

Lichen-agaricus, bullatus, parvus, ex obscurò-nigricans, sub cute emortuorum arborum. Mich. Gen. 105. Ord. 1. tab. 54. fig. 2.

Lichenoidea tuberculorum, compressum, nigrum, lignis

lignis putridis adascens. Dillen, Hist. 127. tab. 18. fig. 7.

Cette sphérie se présente sous la forme de petits tubercules noirs, de la grandeur d'un pois environ, hémisphériques ou un peu comprimés, de figure ovale, oblongue ou arrondie, sortant de l'écorce déchirée des arbres morts. Vus à la loupe, ces tubercules paroissent couverts de petits mamelons perforés à leur sommet. La substance inférieure est blanche, charnue; l'épiderme très-mince & recouvert de petites loges nombreuses, ovales, noires; elles sont creusées dans l'état de sècheresse, & sont tapissées de fils très-fins, comme ceux d'une toile d'araignée.

Cette plante croît sur l'écorce des arbres morts, dans les bois.

21. SPHÈRE ramassée. *Spharia glomerulata.* Decand.

Spharia aggregata, tuberculis sphaericis, pubescentibus, pulverulentis, cinereis, dein nigris; superficie glabra. (N.)

Spharia glomerulata. Decand. Flor. fr. vol. 2. pag. 287.

Hypoxylon glomerulatum. Bull. Champ. p. 178. tab. 458. fig. 3.

Cette sphérie forme, sur le bois ou l'écorce, de gros boutons ordinairement sphériques: ces boutons sont d'abord charnus & un peu molasses, grisâtres, pubescents & comme saupoudrés d'une poussière cendrée; ils deviennent ensuite noirs, fort durs & glabres. Sa surface ne paroît pas raboteuse, même vue avec les plus fortes loupes; les loges internes sont arrondies & pleines d'un suc glaireux. (Decand. l. c.)

22. SPHÈRE scabreuse. *Spharia scabrosa.* Decand.

Spharia primò pubescens, sulfureo-gineæ, confluenta, dein lucido-nigra, scabrosa. (N.)

Spharia scabrosa. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 288.

Cette sphérie ne se trouve jamais que sur les bois dépouillés de leur écorce: dans la jeunesse elle est pubescente, d'un jaune-rouillé ou d'un brun-rouge, & paroît comme saupoudrée d'une poussière jaunâtre: dans son développement parfait elle forme une croûte large, mince, noire, luisante, fort raboteuse. Chaque loge est un peu terminée en pointe à son sommet, & surmontée d'un petit mamelon qu'on ne peut bien voir qu'à la loupe. (Decand. l. c.)

23. SPHÈRE note de musique. *Spharia melogramma.* Pers.

Spharia substriata, erumpens, obconica, nigrescens. Botanique. Tome VII.

centes fuliginis; sphaerulis subprominulis. Pers. Synopf. pag. 13. n°. 21.

Spharia ocellata. Pers. Dispos. Method. Fung. pag. 2.

Variolaria melogramma. Bull. Champ. pag. 182. fig. 1.

Spharia obduca. Bolton. Fung. tab. 125. ?

Cette espèce est d'un gris-cendré dans sa jeunesse, & légèrement pubescente. A mesure qu'elle vieillit, elle offre des boutons de diverses grandeurs, qui ne sont uniquement composés que de la réunion d'un grand nombre de petites loges élargies à leur orifice. Ces boutons, fort souvent placés à la suite les uns des autres, forment presque des notes de musique. Leur surface est d'un noir de suie, inégale; leur substance intérieure est noire.

On rencontre cette plante sur l'écorce de l'aune, du charme & du hêtre. (V. v.)

24. SPHÈRE du groseillier. *Spharia ribesii.* Pers.

Spharia erumpens, mollis, elliptica, subdepressa, sphaerulis diffusis, albicantibus. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 50. & in Annal. Botan. pag. 24. — Idem, Synopf. pag. 14.

Cette sphérie est un peu molasse, légèrement comprimée, de forme arrondie, souvent oblongue & presque canaliculée longitudinalement, de couleur de brique. Les loges sont blanchâtres lorsqu'on les coupe, leur ouverture un peu faillante; ce qui rend cette espèce un peu grenue lorsqu'on l'examine à la loupe. Elle est assez commune pendant l'hiver sur les rameaux secs du groseillier rouge, dont elle perce l'écorce transversalement. (V. v.)

25. SPHÈRE du sureau. *Spharia sambuci.* Pers.

Spharia erumpens, suborbicularis, leviuscula, atra; substantiâ mollâ, cinerescens. Pers. Synopf. pag. 14.

Spharia (natans), composita, subrotunda, convexo-plana, aggregata, atra, membranacea; cortice superatæ calliculoso, substantiam viscidulam, transverse centem continens; sphaerulis aggregatis 13, albis. Toze, Fung. 2. pag. 27. tab. 12. fig. 58.

Elle perce l'écorce des branches de sureau, & se présente sous la forme de tubercules arrondis ou ovales, un peu aplatis, noirs, à peine larges d'une demi-ligne. La substance intérieure est molle, un peu gélatineuse, tellement que les petites capsules semblent nager dans cette sorte de gelée. Elles sont blanchâtres, agrégées, globuleuses: leur sommet un peu saillant; l'ouverture n'est point sensible. Elle se montre dans les mois de mai & d'avril.

T r.

26. SPHÈRE ponctuée. *Spharia punctata*.

Spharia (poronia), *spitata*, *periziformis*, *albida*, *aisco truncato*; *spharulis sparsis*, *punctiformibus*, *nigris*. Persl. Synopf. pag. 15. — Bott. Fu g. tab. 127. fig. 1. — Soweb. Fung. tab. 54. — D. cand. Flor. franç. vol. 2. pag. 288.

Periza (punctata), *tubinata*, *truncata*, *disco punctato*. Linn. Spec. Plant. pag. 1650. — Oerter. Flor. dan. tab. 288. — Bull. Champ. pag. 259. tab. 252.

Spharia nivea, *plana*, *punctis nigricantibus*. Hall. Helv. n°. 2184.

Spharia stercoracea. Wigg. Primit. pag. 85.

Poronia Gleditschii. Willd. Berol. pag. 400.

Elvula turbinata, *putula*, *disco foraminulis perforato*; *basi brevissimâ*. Gleditsch. Fung. 44. n°. 7.

Muscus minimus, *lignosus*, *disco punctato*. Boccon. Mus. pag. 25. tab. 107.

Cette sphère a l'aspect d'une pézize. Sa substance est coriace; elle est munie d'un pédicule très-court, noirâtre, qui s'élève en un disque blanc, orbiculaire, plane ou légèrement concave, couvert de très-petits points noirs, épars, qui sont les orifices d'autant de petites loges remplies d'un suc glaiseux.

Elle se rencontre dans les plaines sablonneuses, sur le crotin de cheval.

27. SPHÈRE brûlée. *Spharia deusta*. Hoffm.

Spharia deusta, *composita*, *convexa*, *reniformis*, *nigra*. Hoffm. Veget. Crypt. pag. 3. tab. 1. fig. 2. — Persl. Synopf. 16.

Spharia (maxima), *magna*, *crassa*, *atra*, *superne pustulis notata*. Weber. Goett. pag. 286. — Dickf. Fasc. Plant. Crypt. pag. 23.

Spharia maxima, *convexa*, *nigerrima*. Hall. Hist. n°. 2192.

Spharia lycoperoides, var. *♂*, *maxima*. Tabouret, Chlot. Lugd. 40.

Lycoperdon fraxineum. Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 647.

Lichen agaricus crustaceus, *crassus*, *bovinum remem veluti representans*, *niger* & *quasi deustus*. Michel, Gen. 104. Ord. 2. tab. 54. fig. 1.

Hypoxylon usulatum. Bull. Champ. pag. 176. tab. 487. fig. 1.

Cette espèce se présente sous la forme d'une croûte noirâtre, comme charbonneuse, étendue en larges plaques sur les vieilles fouches, d'abord d'une consistance molle & charnue, blanche intérieurement, d'un gris-cendré en dehors, cou-

verte de points très-nombreux, fort petits; elle se couvre ensuite d'une poussière cendrée, & finit par devenir friable, boursofflée, noire comme du charbon. Sa surface est convexe, lissée presqu'en rein, recouverte d'une membrane très-mince, sous laquelle sont situées de petites loges séparées, & chaque loge surmontée d'un petit mamelon extérieur. Elle produit une poussière noire & charbonneuse. Cette sphère est sessile ou supportée quelquefois par un pédicule très-court, charnu.

Cette espèce croît à la racine des arbres, dans les forêts & sur les troncs pourris. (V. v.)

28. SPHÈRE faux xyloma. *Spharia xylomoides*. Decand.

Spharia nigrescens, *plana*, *convexa*, *dein orbiculata*, *maculis confluentibus*, *numerissimis*; *superficie subtilissimè punctata*. (N.)

Spharia xylomoides. Decand. Flot. franç. vol. 2. pag. 289. n°. 772.

Spharia ulmi. Schleich. Cryptog. ex Sic. n°. 75.

Elle naît à la surface supérieure des feuilles de l'orme, & commence par soulever l'épiderme; elle est d'un noir mat, d'abord plane, ensuite convexe, orbiculaire; enfin les taches, se réunissant les unes aux autres, finissent par former de grandes plaques de figure indéterminée. La substance interne est compacte & d'un beau noir; mais sur toute la face on remarque de petites loges sphériques, très-rapprochées, pleines d'une matière blanche, laquelle, examinée au microscope, paraît composée de globules sphériques. Ces loges paraissent aboutir à des perforations très-fines, qui sont probablement leurs orifices, & qu'on aperçoit après la destruction de l'épiderme.

Cette plante doit-elle appartenir au genre sphérie? doit-elle former un genre particulier avec l'*aredo* ponctuée? (Decand. l. c.)

29. SPHÈRE lenticulaire. *Spharia lenta*. Tode.

Spharia aggregata, *suborbicularis*, *nigra*, *disco gibbo*, *marginè subrepando*. Persl. Synopf. pag. 17.

Spharia composita, *lenticiformis*, *aggregata*, *lenta*, *pulla*, *monosticha*, *spharulis globosis*. Tode, Fung. Mecklenb. 2. pag. 30. tab. 12. fig. 102.

Cette sphère forme de petits groupes contenant deux, trois ou quatre individus rapprochés ou connivens. Ils ont la figure d'une lentille, d'environ deux ou trois lignes de diamètre, relevés en bosse dans leur centre, aplatis sur les côtés, un peu ondulés à leurs bords, faroués dans leur vieillesse; d'un gris-obscur, lisses, ridés quand ils sont vieux. Leur substance intérieure est blanche, spongieuse, fibreuse. Ils croissent, dans le mois de

septembre, sur le tronc & les racines des vieux hêtres.

30. SPHÈRE pénétrante. *Spharia serpens*. Perf.

Spharia effusa, inaequalis, nuda, nigrescens, sphaerulis subprominentibus. Perf. Synopf. pag. 20. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 289.

5. *Spharia* (serpens lumbricoides), magna, repens, elongata, utrinque attenuata. Perf. Observ. Mycol. 1. pag. 18.

Elle s'étend sur les saules creux, sur les hêtres & les chênes, en plaques d'abord grises & pubescentes, qui ensuite deviennent noires, glabres, tuberculeuses, un peu grenues, placées sur le bois dépouillé d'écorce, & qui pénètrent dans les fentes du tronc. Ces plaques sont composées de loges réunies par une base noire peu apparente; elles sont presque globuleuses. Leur orifice est une petite protubérance obtuse.

31. SPHÈRE stigmatée. *Spharia stigma*.

Spharia stigma, composita, corticis, nigra, punctata. Hoffm. Plant. Crypt. pag. 7. tab. 2. fig. 2.

Spharia stigma. Perf. Synopf. 21.

Hypoxydon operculatum. Bull. Champ. pag. 177. tab. 478. fig. 2.

Lichen-agaricus, obscurus, in arborum corticibus, & precipit ad ilicem innascens, superficie levi, & veluti sabhisfud. Michel, Gen. 105. tab. 55. fig. 2.

Cette espèce est très-commune; elle s'étend, sous l'épiderme de l'écorce des arbres, en larges plaques noirâtres, peu épaisses, souvent fendues en divers sens, entourées à leur circonférence par un rebord plus épais, arrondi & un peu en rein. Leur surface est pubescente, presque farineuse, couverte d'un très-grand nombre de petits points. On y distingue à la loupe plusieurs petits anneaux comprimés, qui forment l'opercule d'autant de loges internes. La substance intérieure est brune ou un peu blanchâtre; les loges ardoises ou un peu alongées.

Cette plante se rencontre sous l'épiderme de l'écorce des arbres, particulièrement des yeules. (V. v.)

32. SPHÈRE coussinet. *Spharia pulvinata*. Hoffm.

Spharia pulvinata, composita, atra, convexa, tuberculosa. Hoffm. Plant. Cryptog. pag. 9. tab. 2. fig. 3.

Ce sont de petits coussinets noirâtres, convexes, arrondis, d'environ cinq à six lignes, recouverts d'un épiderme, tuberculeux à leur surface, mais dont les pores sont à peine sensibles. On y distingue des loges internes de deux formes;

ce qu'il faut probablement attribuer à leur âge; les unes plus grandes, oblongues, remplies d'une poussière noire; les autres arrondies, pleines d'une substance blanchâtre, mucilagineuse.

Cette espèce croît sur l'écorce des arbres pourris.

33. SPHÈRE écarlate. *Spharia coccinea*. Perf.

Spharia capisulosa, diluta rubra, sphaerulis ovatis, levibus. Perf. Synopf. pag. 49. & Icon. Desc. Fung. pag. 47. tab. 12. fig. 2.

Spharia decidua. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 31. tab. 13. fig. 104.

5. *Lata, sphaerulis subrotundis, rugulosis, laet rubris*. Perf. 1. c.

Jolie espèce, de couleur écarlate, qu'on rencontre sur l'écorce sèche du hêtre, où elle forme de petites plaques granuleuses. Le réceptacle est mince, épais d'une demi-ligne, de couleur jaunâtre. Les petites capsules sont un peu ovales, très-petites, quelquefois couleur de fraise, lisses à leur surface, surmontées d'un petit manelon obtus. Dans la variété 5, les capsules sont plus arrondies, un peu ridées, d'un rouge plus vif.

34. SPHÈRE nue. *Spharia decorticata*. Sow.

Spharia longitudinaliter effusa, atra, ostioliis prominentibus, subconicis. Sowerb. Engl. Fung. tab. 137. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 269.

Spharia stigma, var. 5, decorticata. Perf. Synopf. pag. 21. n° 35.

Il existe beaucoup de rapport entre cette espèce & le *Spharia stigma*. Elle forme des plaques noires, minces & larges, point luisantes, qui naissent sur les couches corticales & détruisent entièrement l'épiderme. La substance intérieure est blanche. Les loges sont ovoïdes, très-nombreuses; la plupart se terminent par un orifice saillant, conique, obtus, non enligné à son sommet. On la trouve sur le chêne, le hêtre, &c.

35. SPHÈRE nummulaire. *Spharia nummularia*. Decand.

Spharia orbiculata, cinerea, pubescens, dein nigra; superficie non granulosa; loculis rotundatis, viscosi, non prominentibus. (N.)

Spharia nummularia. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 290.

Hypoxydon nummularium. Bull. Champ. pag. 179. tab. 468. fig. 4.

Elle forme de larges plaques orbiculaires & aplaties, un peu épaisses, grises & pubescentes dans leur jeunesse, puis d'un noir-mat. Leur surface n'est point granuleuse. Elles renferment plu-

fiéux loges arrondies, non saillantes, ploines d'un suc glaireux, & dont l'orifice n'est point sensible. Elle croît sur les troncs & les branches morts, dont elle détruit l'épiderme.

36. SPHÈRE à mamelons cornus. *Spharia ceratospërma*.

Spharia conferta, dura, inaequalis, aphialia spinulosa, ad latera ut plurimum erumpentibus. Persoon, Synopf. pag. 22. — Disf. Meth. Fung. pag. 50. — Decand. l'lon. franç. vol. 2. pag. 293. — Lam. Ill. Gener. tab. 879. fig. 2.

a. *Spharia podoides*. Pers. l. c.

Var. laria ceratospërma. Bull. Champ. pag. 184. tab. 432. fig. 1.

ß. *Spharia podoides*, var. ß, *inermis*. Pers. l. c.

γ. *Spharia (ceratospërma), subrotunda, convexa, sparsa; aphialia spinulosa, à medio erumpentibus.* Pers. Synopf. pag. 23. — Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 53. tab. 17. fig. 131. Var. α. — Michel, tab. 56. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 879. fig. 1.

Cette espèce forme des petites plaques arrondies en bouton, dures, inégales, d'un brun-noirâtre, incrustées dans l'écorce des arbres, persistantes pendant plusieurs années. Elles sont composées de plusieurs loges, dont les sommets offrent de petits mamelons très-saillants; leurs bords garnis de petites pointes recourbées. Dans d'autres individus ces pointes ne sont point apparentes, & les mamelons à peine saillants. Dans la variété γ, l'écorce est lisse, noire, & se sépare de la substance intérieure. Celle-ci est fibreuse, moins compacte, blanchâtre; elle devient ensuite d'un brun-noirâtre. Les loges sont saillantes, droites, allongées, un peu scabres à leur superficie, presque sillonnées longitudinalement. Cette dernière croît en masse sur l'écorce morte du *rosta canina*; elle paroît en juillet. La première se rencontre sur le chêne & les bois durs.

37. SPHÈRE en disque. *Spharia disciformis*. Hoffm.

Spharia sparsa, orbicularis, planioscula, levis, aphialia immersa, subpunctiformibus. Pers. Synopf. pag. 24. — Lam. Illustr. Gener. tab. 879. fig. 3.

Spharia (disciformis), composita, subrotunda, plana, punctata. Hoffm. Plant. Crypt. 1. pag. 15. tab. 4. fig. 1.

Spharia atra, plana, carne albâ. Haller, Helv. n°. 2186. tab. 47. fig. 9.

Var. laria punctata. Bull. Champ. pag. 185. tab. 432. fig. 2.

Lichen-agaricus, terrestris, scutatus, albus. Mich. Gen. 105. tab. 54. fig. 3. (*Saltem quoad figuram.*)

Ce sont de petites plaques en forme de disque, aplaties, orbiculaires ou un peu oblongues, quelquefois reniformes, de deux à trois lignes de diamètre, d'un noir-mat, bordé dans leur jeunesse par les débris de l'épiderme déchiré. Leur substance intérieure est blanchâtre, & leur surface parsemée de points très-apparés, noirâtres, qui correspondent à autant de loges internes, dures, remplies d'une matière visqueuse, & dans leur vieillesse d'une poussière noire.

Cette espèce croît sur l'écorce du hêtre; elle y persiste pendant plusieurs années. (V. v.)

38. SPHÈRE de l'aneth. *Spharia anethi*. Pers.

Spharia elongata, interrupta, sublinearis, rugosa, opaca, sphaerulis cohaerentibus, papillis, subnullis. Persoon, Observ. Mycol. 1. pag. 67. — Synopf. pag. 30.

Spharia microscopica. Ehrh. Plant. ex Sic. Dec. 23. n°. 229.

On la trouve fréquemment en automne sur les tiges sèches de l'*anethum graveolens*, où elle se montre en forme de plusieurs lignes allongées, très-inégales, de trois à quatre & dix lignes de long, d'abord d'une couleur cendrée, & puis noirâtres, opaques, d'une substance un peu molle. Sa surface est un peu raboteuse à raison du grand nombre, de petites loges serrées, un peu saillantes.

39. SPHÈRE allongée. *Spharia longissima*. Pers.

Spharia atra, sphaerulis minutis in series longissimas parallelas confluentibus. Pers. Observ. Myc. pars 2. pag. 68. — Synopf. pag. 31.

ß. *Spharia (nebulosa), grisea, sphaerulis minutissimis, sparsis, maculas nigrescente-griseas interruptas, inaequaliter lineatas efformantibus; aphialia prominulis, subacatis.* Pers. l. c.

Elle forme, sur les tiges sèches du *cherophyllum bulbosum*, de l'*anethum*, &c. plusieurs lignes noirâtres, parallèles, très-longues, & qui s'étendent souvent d'une branche à l'autre. Ces lignes sont composées de petites loges simples, très-serrées, dont l'orifice est court & obtus. Elles forment de dessous l'épiderme des tiges qu'elles teignent en noir.

La plante ß, qui paroît très-voisine & peut-être une variété de la précédente, forme sur les herbes élevées des taches longues de trois à quatre lignes & plus, larges d'une ligne & demie, nébuleuses, composées de loges fort petites, un peu distantes.

40. SPHÈRE massette. *Spharia tephyna*.

Spharia subcomposita, elongato-ambiens in grami-

mun culmis parafitica. Perf. Synopf. pag. 30. & Icon. Fung. pars 1. pag. 21. tab. 7. fig. 1. — Dec. Flor. franç. vol. 2. pag. 290.

Cette espèce est remarquable par sa position sur le chaume de plusieurs graminées qu'elle envahit, dans une longueur de trois à quatre lignes, sans pénétrer dans l'intérieur. Sa couleur est d'abord blanchâtre, & devient ensuite d'un jaune d'ocre; & les bords restent blancs: elle forme une couche peu épaisse, grumeleuse, presque crustacée. Vue à une forte loupe, on remarque que chaque grain est l'indice d'une loge presque sphérique & dont l'orifice est à peine visible. On rencontre cette plante particulièrement sur le *daucylis glomerata*.

M. Berger pense qu'elle est la demeure d'un insecte; il dit en avoir découvert la lave dans l'intérieur de la rigole, avoir vu l'insecte parcourir les diverses loges de la croûte externe, & sortir quelquefois à tête par l'orifice des loges. Cette singulière production mérite d'attirer de nouveau l'attention des observateurs. (Decand. l. c.)

*** Loges féminales, conniventes ou rapprochées en faisceau, mais sans réceptacle commun apparent.

41. SPHÉRIE des graminées. *Spharia graminis*. Perf.

Spharia epiphylla, sublinearis, maculaformis, nitente-nigra, officinis latentibus. Perf. Synopf. p. 30. n°. 50. — Observ. Mycol. tab. 1. fig. 1-2. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 291.

« Il est très-facile, dit M. Decand. e, de confondre au premier coup d'œil cette sphérie avec la puccinie des graminées; mais les taches de la sphérie sont luisantes. Celles de la puccinie sont d'un noir mat: dans la première, l'épiderme ne se rompt point, & ne forme pas de bordure autour de la tache; dans la seconde, l'épiderme se rompt, & forme, surtout dans la jeunesse, une bordure autour de la tache. Le microscope apprend d'ailleurs que l'organisation interne est très-différente. »

Cette plante forme, sur les feuilles des graminées, des taches linéaires ou oblongues, noires, glabres, luisantes, un peu raboteuses. Dans l'intérieur de ces taches on trouve des loges globuleuses, dont les orifices ne sont pas sensiblement percés ni proéminents. Ces loges sont très-rapprochées, mais on ne voit pas de réceptacle propre qui les unisse. Elle croît sur le *solium perenne*, le *lymus europæus*. (Decand.)

42. SPHÉRIE muriforme. *Spharia muriformis*. Perf.

Spharia gregaria, simplex, sphaerulis cretulis, obovatis, tuberculosis. Perf. Synopf. Fung. pag. 82.

— Idem, Icon. Pict. Falc. 2. pag. 25. tab. 11. fig. 1.

On rencontre cette espèce assez fréquemment sur les troncs des arbres desséchés, particulièrement sur ceux du pin: à quelquefois on la trouve entourée d'une sorte de byssus ou de moisissure griseâtre. Elle est d'une substance dure & creuse en dedans, caractère qui, indépendamment de l'absence d'un réceptacle, la distingue de l'espèce suivante. Ses capsules sont nombreuses, éparpillées, tuberculeuses, noires, ovales.

43. SPHÉRIE de l'épine-vinette. *Spharia berberis*. Perf.

Spharia castiposa, nigra, sphaerulis globosis, rimoso-rugosis, farctis. Persoon, Synopf. pag. 52. — Idem, Dispos. Method. Fung. Falc. 2. pag. 3. & Icon. Pict. Fung. l'éc. 1. pag. 26. tab. 11. fig. 3. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 293.

C'est une forte petite espèce, qui le plus souvent forme de petites touffes sur les rameaux de l'épine-vinette, & qui affecte aussi quelquefois une disposition longitudinale sur les bords de l'écorce rompue. Les capsules sont noires, globuleuses, rugueuses, blanchâtres intérieurement, d'une substance analogue à celle des sclérotites. On les aperçoit, à l'œil nu, comme un point noir qui a percé l'épiderme: chacun de ces points, selon M. Persoon, est un amas de loges féminales, réunies par leur base sur un réceptacle charnu.

44. SPHÉRIE du sorbier. *Spharia aucuparia*. Perf.

Spharia castiposa, nigra, albido-pulverulenta, sphaerulis farctis, elongato-subcylindricis. Perf. Synopf. pag. 51.

Spharia (castiposa), composita, hydnoides, lamellata, globoso-castiposa, aggregata, atra, lamellis radiatis, inferius connatis, apice sphaeruliferis. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 41. tab. 14. fig. 113.

Elle se rencontre sur les rameaux secs du sorbier des oiseaux, où elle forme, sous l'épiderme, des petits groupes noirâtres, arrondis, à peu près de la grandeur d'une vesce, de couleur noire, composés de plusieurs loges conniventes, planes & en forme de lames à leur partie inférieure, qui se prolongent en une sorte de cylindre, quelquefois un peu lobé ou digité à son sommet, souvent couvert d'une poussière cendrée. Ces groupes conservent à leur contour les débris de l'épiderme de l'écorce déchirée.

45. SPHÉRIE variée. *Spharia varia*. Perf.

Spharia castiposa, sphaerulis variis; minoribus ovatis, cavis; majoribus subglobosis, farctis. Perf. Synopf. pag. 52.

Cette espèce est rare; elle croît sur les bran-

ches & les rameaux du cerisier, par petites groupes qui en déchirent l'écorce transversalement. Les loges séminales sont d'un noir-foncé, larges d'une ligne & de deux fortes; les unes plus grandes, globuleuses, dures, sans ouverture sensible, seulement un peu ondulées à leur sommet; d'autres plus petites, ovales, creusées en dedans.

46. SPHÈRE humide. *Spharia uda*. Pers.

Spharia difformis, oblonga aut subquadrangularis, nigra, *spharulis* obovatis, inaequaliter prominentibus. Pers. *Dispos. Meth. Fung.* pag. 3. & *Synops.* pag. 33.

Spharia (uda, var. β , *falicaria*), *caespitulo sub-interrupto*; *spharulis* *regularibus*, *prominulis*, *circu ostioli subdepressis*. Pers. l. c.

Cette espèce croît sur les bois de chêne desséchés, où elle affecte une forme linéaire plus ou moins élargie, très-irrégulière, quelquefois presque carrée, de couleur noire. Les capsules s'élèvent, tantôt de leur moitié au dessus de l'épiderme; tantôt elles sont à peine saillantes & ne montrent que leur sommet. Leur orifice est obtus. La variété β croît sur la saule. Ses capsules sont ridées, un peu déprimées à leur orifice, un peu saillantes.

47. SPHÈRE aiguë. *Spharia spiculosa*. Pers.

Spharia subeffusa, *atro-inquinans*, *ostiolis* *longis*, *teretibus*, *tenuissimis*. Pers. *Synops.* pag. 33.

Cette sphère est rare; elle teint en noir les rameaux sur lesquels elle croît. Ses capsules y sont entièrement enfoncées, noires; elles ne laissent appercevoir que leurs orifices, qui sont fines, cylindriques, saillantes, longues d'une à deux lignes.

48. SPHÈRE alignée. *Spharia seriata*. Pers.

Spharia perithecia in seriem elongata ut plurimum confertis, *minutissimis*, *rugulosis*, *mollibus*, *orbiculatis* *depressis*, *papillatis*. Pers. *Synops.* pag. 65. — *Icon. Pil.* Fasc. 3. pag. 38. tab. 17. fig. 2.

Cette sphère, à la simple vue, ne semble formée que par une grosse poussière noire, disposée par lignes éparées. Vue à la loupe, on aperçoit distinctement les capsules, qui le plus souvent, & sans doute après l'émission de la semence, sont déprimées & arrondies, disposées en une série allongée, très-petites, rugueuses, surmontées d'un petit mamelon. On les rencontre sur le bois de chêne sec & dépourvu de son écorce.

49. SPHÈRE poussiérée. *Spharia pulveracea*. Pers.

Spharia conferta, *simplex*, *spharulis* *liberis*, *ovatis*, *rigidis*; *ostio* *obliquo* *obtusulo*. Pers. *Synops.* pag. 83. — *Decand. Flor. franç.* vol. 2. pag. 297.

Ses capsules sont rapprochées par groupes peu

ferrés, ou éparés sur le bois mort; elles sont presque globuleuses, glabres, à peine larges d'une demi-ligne, terminées par un orifice obtus, à peine saillant, d'un noir mat. Elles croissent sur le bois sec, particulièrement sur celui du chêne.

50. SPHÈRE circonscrite. *Spharia circumscissa*. Persoon.

Spharia simplex, *et cinereo subfufescentis*, *spharulis* *ramorum cortice* *scissis*; *parte superiore villosa*, *membranacea*, *evanescente*. Pers. *Synops. Meth. Fung.* pag. 115. & *Icon. Rar. Fung. Fasc.* 1. pag. 4. tab. 2. fig. 4.

Elle a beaucoup de rapport avec la sphère du tilleul, dont elle se distingue par sa structure interne, & par la nature du suc glaireux qu'elle renferme. Elle est simple, d'un cendré-rouillâtre. Ses capsules sont recouvertes par l'écorce du bois. Sa partie supérieure est d'un tissu membraneux, pubescent, qui se déchire facilement. Si on enlève l'épiderme de l'écorce qui la recouvre, on entraîne en même temps la moitié supérieure & pubescente des capsules; alors la moitié inférieure, qui reste fixée, présente la forme d'une petite coupe. Ces capsules s'ouvrent à la surface du bois, par un petit orifice dont il découle un suc glaireux; noirâtre dans l'état sec, retenant des semences (*sporules*) allongées.

On rencontre cette espèce assez rarement l'écorce des rameaux, dans les haies. (*Descript. ex Pers.*)

51. SPHÈRE rape. *Spharia radula*. Pers.

Spharula pustulata, *ostiolis* *subteretibus*, *prominentibus*, *angulato-asperis*. Pers. *Synops.* pag. 37. — *Decand. Flor. franç.* vol. 2. pag. 291.

Cette espèce croît sur l'écorce du chêne. Les capsules sont ovales, un peu arrondies, légèrement anguleuses, insérées dans les couches corticales, écartées à leur base, rapprochées par leur orifice, & dont l'ensemble forme un tubercule conique, de couleur blanche en dedans, d'un brun-noirâtre en dehors, qui soulève & perce l'épiderme, & s'élève en un petit disque sur lequel on remarque quelques protubérances noires.

52. SPHÈRE blanche. *Spharia nivea*. Hoffm.

Spharia conica, *disco farinaceo*, *niveo*; *ostiolis* *prominulis*, *papillatis*. Pers. *Synops.* pag. 38. — *Decand. Flor. franç.* vol. 2. pag. 291.

Spharia tuberculosa, *tuberculis* *truncatis*, *niveis*. Hoffm. *Veget. Crypt.* 1. pag. 28. tab. 6. fig. 3.

Lichen (rosaceus), *tuberculis* *niveis*, *nigro-pannatis*. Wedd. *Flor. dan.* tab. 825. fig. 1.

Elle offre, dans sa jeunesse, des points blancs arrondis, enfoncés dans l'épiderme, point saillants.

qui prennent ensuite la forme d'un petit disque blanc, dont la substance est sèche, pulvérescente. On distingue sur sa surface, avec la loupe, des petites pointes grenues, qui sont l'orifice d'autant de petites capsules enfoncées sous l'écorce. Elle croît sur les branches sèches du *populus tremula*.

53. SPHÈRE bouche-blanche. *Spharia leucostoma*. Perf.

Spharia disco truncato, albido, poris nigrescentibus perforato. Perf. Dispos. Method. Fung. pag. 50. & in Annal. Bot. fl. 11. pag. 23. — Idem, Synopf. pag. 39.

Cette espèce a quelques rapports avec la *spharia nivea*; elle se rencontre sur les branches & les rameaux des pruniers & des cerisiers, où elles offrent de petits disques blanchâtres, tronqués, dont les capsules n'ont point d'orifices saillans, & à la place desquels on distingue quelques petits pores noirs.

54. SPHÈRE des fibres. *Spharia fibrosa*. Perf.

Spharia orbicularis, depressa, disco expallenscente; ostiis subrotundis, nigris, disco subexcavatis. Perf. Synopf. pag. 40.

Cette sphère est enfoncée dans la substance fibreuse de l'écorce des rameaux, particulièrement ceux des pruniers; elle est orbiculaire, comprimée, & forme un disque pâle. Les orifices des loges, en perçant l'épiderme de l'écorce, changent sa couleur naturelle en une teinte roussâtre avec un cercle plus pâle.

55. SPHÈRE du tilleul. *Spharia tilia*. Perf.

Spharia sparsa, testis, subannulata, ampulliformis aut circumscissa; ostiis magna. Perf. Synopf. pag. 84. — Dispos. Method. Fung. p. 3. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 298.

6. *Spharia (contracta), ostiis in appendicem crassam plicatam ramosam excrecente*. Perf. l. c.

7. *Spharia (globosa), subaggregata, opaca, figurâ glabuliformi aurantiâ, interâ pulvinatâ*. Perf. l. c. — Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 23. tab. 11. fig. 91.

Elle croît sur les rameaux desséchés du tilleul d'Europe. Sa couleur est noire; ses capsules glabres, ovales, un peu comprimées, évanescentes à leur sommet en un large orifice en forme d'anneau, dont le milieu est occupé par un petit mamelon. La substance intérieure est de couleur grise, & forme quelquefois des prolongemens extrêmes, semblables à ceux des nematodes. Cette espèce est placée sous les couches corticales dont elle soulève l'épiderme sans le percer. On en rencontre quelques variétés sur le saule, le chêne, &c.

56. SPHÈRE capsulaire. *Spharia capsularis*. Perf.

Spharia circinnata, ostiis prominulis, sphaerulis ovato-papillatis mentientibus. Perf. Synopf. p. 42.

Cette plante, que l'on trouve sur les rameaux secs, est rare & assez singulière; elle se présente dans sa jeunesse, sous la forme de petites pustules blanchâtres, arrondies, entourées d'une ligne noire. Lorsqu'elle est vieille, outre les capsules renfermées dans la substance de son écorce, elle en produit d'autres ou peut-être des orifices ovales, creux en dedans, luisans, surmontés d'un petit mamelon aigu.

57. SPHÈRE. *Spharia pulchella*. Perf.

Spharia circinnata, nuda, ostiis longissimis, flexuosis. Perf. Dispos. Method. Fung. pag. 3. — Synopf. pag. 43.

C'est une des plus grandes espèces de cette division; elle croît sous l'épiderme des tiges & des rameaux du cerisier. Ses loges sont courtes, ovales, la plupart couchées, tandis que leurs orifices sont allongés, rapprochés les uns contre les autres; les intérieures droites, plusieurs d'entre elles flexueuses, ouvertes à leur sommet.

58. SPHÈRE en pustules. *Spharia pustulata*. Perf.

Spharia sublenticularis, callo brevi contracto, disco fuliginoso, foro unico perforato. Perf. Synopf. p. 41. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 292.

Spharia (pustulata), lentiformis, perforata. Hoffm. Veget. Crypt. 1. pag. 26. tab. 5. fig. 5.

Elle est d'un brun-noirâtre, comprimée, grenue à sa surface, à peine saillante au dessus de l'écorce sur laquelle on la trouve, où elle offre presque la forme d'une petite pustule. Elle est composée de plusieurs loges rapprochées, dont l'orifice est court, resserré, semblable à un petit mamelon. On ne la rencontre que sur l'écorce des arbres dont le bois est tendre; sur l'aune, le saule, &c.

59. SPHÈRE couronnée. *Spharia coronata*. Hoffm.

Spharia circinnata, ostiis incrassatis, obtusis, levibus. Perf. Synopf. pag. 43. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 292.

Spharia ostiis epidermide perforata, spinulosis. Hoffm. Veget. Crypt. 1. pag. 26. tab. 5. fig. 4, 4, 5.

Cette sphère croît sur le bouleau blanc. Ses loges, au nombre de cinq à six, sont noires, globuleuses, disposées circulairement en forme de petite couronne. Leurs orifices sont cylindriques, allongés, inclinés de manière à se réunir par leur sommet. Ces loges sont situées dans les couches

corticales & leur orifice perce l'épiderme, mais il est peu saillant en dehors.

60. SPHÈRE du hêtre. *Spharia faginea*. Perf.

Spharia circinnata, *osiolis hamatis*, *asperis*. Perf. Dispos. Meth. Fung. pag. 3. — Synopf. pag. 44. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 292.

♂ *Spharia* (var. β, turgida), *circinnata*, *testa*, *turgescens*; *spharulis subrotundis*; *osiolis rectis*, *levissculis*. Perf. l. c. & Oberv. Mycol. 1. pag. 17.

Elle est très-abondante sur les rameaux du hêtre, qu'elle colore en un jaune de rouille, & dont elle perce l'épiderme de petites cavités remplies d'une matière noirâtre, grenue, rude au toucher. Si l'on enlève cet épiderme, on distingue en dessous de petites loges féminales réunies trois ou cinq ensemble, de couleur noire, dont les orifices sont connivens, & forment par la même ouverture de l'épiderme. Ces orifices sont droits, aigus ou crochus, & rendent l'épiderme rude au toucher. Dans la planne β, qui est peut-être une espèce distincte, l'épiderme n'est point rude, mais soulevé par de petites bulles remplies d'une matière noire, gélatineuse.

61. SPHÈRE environnante. *Spharia ambiens*. Perf.

Spharia circinnata, *osiolis subovatis*, *discum albidum cingentibus*. Perf. Synopf. pag. 44.

Cette espèce croît sur l'écorce du *crataegus* & sur celle du hêtre, où elle forme très-souvent par sa réunion une suite de lignes alongées & parallèles. Elle est arrondie; elle a un disque blanchâtre, autour duquel sont disposées circulairement de petites loges presque rondes, dont l'orifice est ovale, point saillant, obtus, & ne produit aucune aspérité à la surface de l'épiderme.

62. SPHÈRE du cythre. *Spharia laburni*. Perf.

Spharia magna, *caespitosa*, *nigra*, *spharulis congestis*, *globosis*, *papillatis*, *opacis*. Perf. Oberv. Mycol. 1. pag. 69. & Synopf. 50. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 293.

Elle forme, sur les branches mortes du cythre des Alpes, de petits groupes arrondis, inégaux, qui ont trois ou quatre lignes de large, & environ deux lignes de haut, quelquefois coniques, & qui restent environnés par les débris de l'épiderme qu'ils ont percé. Ils sont composés d'un grand nombre de loges noires, placées sur un réceptacle commun, peu apparent. Ces loges, d'abord globuleuses, deviennent ensuite un peu alongées, très-rapprochées, obtuses, on bilobées.

63. SPHÈRE en masse. *Spharia clavata*. Decand.

♂ *Spharia caespitosa*, *spharulis elongatis*, *claviformis*, *primò nitidopunctatis*, *dein nigris*. (N.)

Spharia clavata. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 293.

Hypoxylon clavatum. Bull. Champ. pag. 171. tab. 444. fig. 5.

Cette espèce se rencontre sur les vieux bois dépouillés de leur écorce, particulièrement sur les impressions des prolongements médullaires, où elle forme des stries longitudinales. Ses loges féminales sont oblongues, rétrécies à leur base, arrondies à leur sommet, réunies plusieurs ensemble par leur partie inférieure, composant de petits groupes assez nombreux. Ces loges, pendant leur jeunesse, sont blanches & pubescentes vers leur sommet; elles prennent ensuite une couleur d'un noir foncé, & sont parfaitement glabres.

64. SPHÈRE en cupule. *Spharia cupularis*. Perf.

Spharia caespitosa, *nigra*, *spharulis rugosis*, *at plurimum collapsis*. Perf. Synopf. pag. 53. — Oberv. Mycol. 1. pag. 64.

Spharia (cucurbitula, var. β, *nigrescens*). Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 39.

Cette espèce pourroit être prise, au premier aspect, pour une petite peize de couleur noirâtre, dont les loges féminales, réunies en un petit groupe arrondi, sont un peu molles & raboteuses dans leur état de siccité, de manière à offrir au milieu de chaque groupe, un vide qui leur donne l'air d'une petite cupule; mais lorsque ces planes sont humectées, elles reprennent une forme arrondie. Leur surface est légèrement ridée. Les loges n'ont point d'orifice sensible; elles sont séparées entr'elles, portées sur un réceptacle très-mince & noirâtre. On les trouve sur les rameaux du frêne & souvent sur ceux du tilleul.

65. SPHÈRE cucurbit. *Spharia cucurbitula*. Perf.

Spharia caespitosa, *rubra*, *spharulis mollibus*, *levissculis*, *collapsis*. Perf. Synopf. pag. 53.

Spharia (cucurbita, var. α, *flavescentis*), *composita*, *convexo-plana*, *aggregata*, *monophylla*, *spharulis ovalibus*, *contabescens concavescentibus*, *infusis*, *rubris*. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 38. tab. 14. fig. 110.

Cette sphère croît au printemps sur les branches & les rameaux de plusieurs arbres morts, particulièrement sur ceux du peuplier; elle offre les mêmes caractères que la précédente, mais ses loges féminales sont lisses, très-glabres, point ridées, ovales, & de couleur rouge dans leur jeunesse, souvent couvertes d'une légère poussière blanchâtre ou cendrée.

*** Loges

*** Loges féminales, dissimulées, solitaires ou rapprochées, point conniventes, & sans réceptacle commun.

66. SPHÈRE en chapeau. *Spharia pileata*. Pers.

Spharia simplex, *ostiole plano*, *obconico*. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 4. & Synopf. pag. 54.

Spharia (macrostoma, var. α , pileata). Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 13. tab. 9. fig. 78.

Elle croît au printemps sur les écorces sèches des rameaux des arbres. Ses capules sont solitaires, de forme ovale, presque globuleuse; fortement rétrécies à leur orifice, élargies ensuite & prolongées en une sorte de limbe qui offre presque la figure d'un cône tronqué. Leur écorce est dure & friable. Elles sont enfoncées dans l'écorce & même dans le liber.

67. SPHÈRE en crête. *Spharia cristata*. Pers.

Spharia simplex, *spharula subglobosa*; *ostiole compresso*, *dilatato*. Pers. Synopf. pag. 54.

α . *Spharia* (crenata), *nuda*, *conferta*, *ostiole cristata subcrenata*, *spharula latitudine*. Pers. l. c.

β . *Spharia* (arundinis), *subimmersa*, *sparsa*, *ostiole levi*, *spharula angustiore*. Pers. l. c.

Cette sphère, d'une couleur noirâtre, est remarquable par son orifice saillant, comprimé, dilaté, en forme de crête, légèrement crénelé, & aussi large que les loges féminales dans la variété α , lisse, sans crénelures, & plus étroit que les loges dans la variété β . Les loges sont simples, solitaires, entièrement enfoncées sous l'épiderme de l'écorce dans leur jeunesse, ensuite sortant au moins de moitié. La première est un peu plus grande, moins enfoncée; elle croît sur le prunier épineux; la seconde sur les tiges sèches de l'arundo phragmitis.

68. SPHÈRE à large ouverture. *Spharia dehiscens*. Pers.

Spharia simplex, *immersa*, *ostiole compresso*, *labiato*, *dehiscens*. Pers. Synopf. pag. 55.

Spharia (macrostoma, var. α , nigra), *simplex*, *aggregato-sparsa*, *globosa*, *ostiole largo*, *labiato*. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 12. tab. 9. fig. 76.

Spharia (macrostoma, var. β , fusca). Tode, l. c.

Spharia (macrostoma, var. γ , nigro-fusca). Tode, l. c.

Spharia (macrostoma, var. δ , libera). Tode, l. c.

Spharia (libera), *spharula nuda*, *exasperata*; *ostiole labiato*, *dehiscens*. Pers. Synopf. pag. 54.

Cette espèce est très-variée, mais au milieu de Botanique. Tome VII.

les variétés elle conserve toujours son principal caractère, qui consiste dans l'orifice saillant en sorte de crête, d'abord entier, & qui se divise ensuite en une ouverture fermée presque par deux lèvres. D'ailleurs, cette sphère est simple, de la grosseur d'une graine de pavot, globuleuse, éparse, enfoncée, noirâtre, à large orifice; plus petite & de couleur brune dans la variété β ; d'un brun-noirâtre & légèrement tomenteuse dans la plante γ ; elle est saillante, point enfoncée, de forme sphérique dans la variété δ . Elles croissent sur les rameaux en décomposition de plusieurs arbres & arbrustes; elles ont beaucoup de rapport avec le *spharia pileata*.

69. SPHÈRE rétrécie. *Spharia diminuta*. Pers.

Spharia simplex, *nigra*, *spharula minutis*, *prominens*, *subtruncatis*; *ostiole compresso*, *angusto*, *diminuto*, *nonnullis subconico*. Pers. Synopf. pag. 57.

Cette sphère est petite, arrondie; quelques individus tronqués à leur disque, presque aplatis, de couleur noire; d'autres un peu plus saillants. Les orifices sont très-courts, ayant à peine une ligne de longueur, étroits, comprimés, affectant quelquefois une forme assez régulière, approchant de celle d'un cône. On la rencontre sur des bois desséchés; elle n'est pas très-commune.

70. SPHÈRE crépue. *Spharia epipharia*. Pers.

Spharia simplex, *gregaria*, *parasitica*, *rubra*, *spharula minutissimis*, *subcompressis*, *cristatis*, *flaccidis*. Pers. Synopf. pag. 57.

Spharia (epiphaziza), *simplex*, *aggregato-sparsa*, *purpurea*, *globosa*, *collabescendo-complanata*, *pillula convexo-oblonga*. Tode, Fung. Mecklenb. 2. pag. 21. tab. 11. fig. 89.

Elle forme des globules solitaires extrêmement petits, épars ou rapprochés, de couleur purpurine, mous, un peu comprimés lorsqu'ils sont humides, crépus dans leur état de siccité, droits, convexes, & en crête à leur sommet. On la rencontre, comme plante parasite, sur le *spharia stigma*.

71. SPHÈRE gnome. *Spharia gnomon*. Pers.

Spharia simplex, *epiphylla*, *spharula ut plurimum collapsa*, *ostioleque clavatis*, *glaberrimis*. Persoon, Synopf. pag. 61. & Dispos. Fung. pag. 51. — Id. Annal. Bot. fr. 11. pag. 24. tab. 2. fig. 6. — Dec. Flor. franç. vol. 2. pag. 194.

Spharia (gnomon), *simplex*, *stylosa*, *aggregata*, *globosa*, *collabescendo-concavescentis*, *nigra*, *stylum spermatico*, *procero*, *subrecto*. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 50. tab. 16. fig. 125.

Cette plante est assez commune au commencement du printemps; elle croît dans les forêts, sur

les feuilles tombées du noisetier. Elle y forme des petites taches simples ; noirâtres , arrondies en anneau , agrégées , un peu convexes , & qui deviennent concaves en vieillissant , cachées sous l'épiderme des feuilles. Les loges feminales sont libres , distinctes les unes des autres , en tubercules mamelonés. Leur orifice est concave : il s'en élève un prolongement droit , linéaire , allongé , assez semblable à un style.

72. SPHÈRE fétacée. *Spharia fetacea*. Persf.

Spharia simplex, epiphylla, *spharulis sparsis*, in folii substantiâ latentibus ; *ostiolis prominulis*, *fetaceis*, attenuatis. Persf. Synopf. pag. 62. & Annal. Botan. pag. 2. tab. 2. fig. 7. a.

Elle a des rapports avec la précédente , mais elle est plus rare , & se rencontre au printemps sur les feuilles tombées du chêne. On l'apperoit à la loupe sous la forme de petites soies noirâtres , un peu obliques , qui sont les orifices de loges feminales , renfermées dans la substance des feuilles. Elles sont éparées , assez rares , point agrégées.

73. SPHÈRE à bec latéral. *Spharia latericolla*. Decand.

Spharia localis nigris, aggregatis ; *rostris laterali producto*. (N.)

Spharia latericolla. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 294. n°. 790.

Ses loges sont noires , lisses , glabres , distinctes , rapprochées en groupes étendus & peu serrés ; elles ont presque la forme d'une cornue , c'est à dire que la loge est à peu près sphérique , & s'allonge de côté en un orifice conique , roide & un peu pointu. Après la sortie de la gelée intérieure , la loge s'affaïse & devient concave en dedans , comme une pézize. Son diamètre est d'une demi-ligne.

Cette plante croît sur le bois de chêne dénué d'écorce. Elle a été observée par MM. Dufour & Lémant. (Decand. l. c.)

74. SPHÈRE en bec. *Spharia rostrata*. Persf.

Spharia simplex, nuda, *spharulis granulatis*; *ostio longissimo*, spinuloso. Persf. Synopf. pag. 58.

Spharia rostrata, var. a. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 14. tab. 9. fig. 79.

On la trouve , dans le mois de juillet , sur les branches coupées & altérées , où elle forme de petites capsl'es éparées , noirâtres s , globuleuses , granulees extérieurement , de la grosseur d'une graine de pavois , dont l'orifice ressemble à un petit bec allongé , un peu recourbé à son sommet. Elles s'ouvrent insensiblement un passage au travers le bois dans lequel elles sont encaissées.

75. SPHÈRE des fientes. *Spharia stercoris*. Dec.

Spharia localis minimis, ovalibus, obtusis, *solitariis* vel *subaggregatis*; *aperturâ vix manifestâ*. (N.)

Spharia stercoris. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 294. n°. 791.

Cette espèce naît sur les fumées du cerf , & on la reconnoît plus facilement à sa station qu'à sa structure. Ses loges sont noires , ovoïdes , obtusis , de la grosseur d'une tête d'épingle , solitaires ou rapprochées deux ou trois ensemble , très-adhérentes aux brins d'herbes seches qui composent la fiente , souvent à moitié cachées , terminées par un orifice non proéminent & à peine visible. Elle diffère , par ce dernier caractère , de la sphère du fumier décrite par M. Persoon. (Decand. l. c.)

76. SPHÈRE du fumier. *Spharia fmeti*. Persf.

Spharia fmetaria, subcrustacea, *spharulis subimmersis*; *ostio elongato*, subobliquo. Persf. Synopf. pag. 64.

a. *Equina*, crustâ tenui, casto-cinereo. Persf. l. c.

b. *Vaccina*, crustâ crassiore, nigra. Persf. l. c.

Elle s'étend sur le fumier en petites taches presque crustacées , très-minces , d'un bleu-cendré dans la variété a , plus épaisses & noirâtres dans la plante b. Les orifices sont prolongés , faillans , un peu obliques : il en sort en assez grande abondance une matière noire & gelatineuse.

77. SPHÈRE en mamelon. *Spharia mammiformis*. Persf.

Spharia simplex, parca, *spharulis majusculis*, globosis, levibus, subinflatis, glabris; *ostio papillato*. Persf. Synopf. pag. 64. — Idem, Icon. Fict. Fung. Fasc. 1. pag. 12. tab. 5. fig. 6.

Variolaria simplex. Bull. Champ. pag. 186. tab. 432. fig. 3.

Cette sphère se rencontre sur les rameaux desséchés du bois tendre. Elle est fort petite , simple , éparée çà & là. Sa substance est mince & cassante ; ses capitules plus grans que ceux des autres espèces , mais moins abondantes dans le même endroit , lisses , globuleuses , entièrement glabres , confluentes , réunies souvent au nombre de deux , plus rarement de trois ensemble. Leur orifice est terminé à son sommet par une petite pointe en forme de papille.

78. SPHÈRE pomiforme. *Spharia pomiformis*. Persoon.

Spharia gregaria, minuta, *spharulis pomiformibus*, levibus, circa ostiolum papilliforme subimpressis. Persf.

Synopf. pag. 65. — Idem, Icon. Piñ. fung. pag. 13. tab. 5. fig. 4.

Cette espèce est trois fois plus petite que la précédente, & plus cassante; elle est disposée en groupes. Ses capsules sont lisses, de forme globuleuse, présentant une légère dépression autour de l'orifice qui forme une sorte de papille. On rencontre assez souvent des capsules déchirées jusqu'à la moitié supérieure en dents irrégulières. Elles sont glabres, d'une couleur noirâtre, & se rencontrent sur le tronc des arbres morts.

79. SPHÈRE tuberculaire. *Spharia tubercularia*. Decand.

Spharia tuberculis ovatis, carnosis, basi pubescentibus, rubris acin nigrescentibus. (N.)

Spharia tubercularia. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 295. n°. 794.

Elle croît sur les couches corticales, soulève, puis déchire l'épiderme en trois ou quatre fragments persistants; elle paraît alors semblable à une tuberculeuse qui, au lieu de naître sur l'écorce, semblerait sortie de dessous l'épiderme. Sa base est entourée d'un léger duvet jaunâtre. Les tubercules sont charnus, ovoïdes, obtrus, d'un rouge-vif; ensuite ils deviennent noirs & comme charbonnés. On distingue alors à leur sommet un orifice enfoncé peu régulier.

M. Decandolle a trouvé cette plante, à la fin du printemps, sur l'écorce d'un noyer mort. (Decand. l. c.)

80. SPHÈRE pyriforme. *Spharia pyriformis*. Persoon.

Spharia sparsa, minuta, simplex, sphaerulis pyriformis-conicis; apiculis acutis, confluentibus. Pers. Synopf. pag. 64.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *spharia subulata* (Tode, tab. 15. fig. 107. c.), mais elle est beaucoup plus élargie à sa base. Sa surface n'est point lisse. On la rencontre sur les bois secs, où elle est simple, éparse, fort petite. Ses loges féminales sont coniques, un peu en forme de poire; les orifices aigus, confluent.

81. SPHÈRE pézize. *Spharia peziza*. Pers.

Spharia gregaria, foetide rubella, sphaerulis globosis, exscissis, collabescendo-concavis, basi subpilosis. Pers. Synopf. pag. 66. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 295.

Spharia (peziza), simplex, globosa, hydropora, aggregata, rubens, collabescendo-concavescens. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 46. tab. 15. fig. 122.

Peziza hydropora. Bull. Champ. pag. 243. tab. 410. fig. 2.

Spharia miniata. Hoffm. Flor. germ. 2. tab. 12. fig. 1.

Lycoperdon hydroporum. Sowatb. Engl. Fung. tab. 23. ?

Cette espèce croît par groupes sur les bois morts, à demi-putrescibles de plusieurs arbres; elle paraît dans l'automne, & varie dans sa couleur selon son âge. Sa substance est un peu molle, fragile, membraneuse, de couleur orangée; elle est de la grosseur d'un grain de millet. Sa forme est arrondie dans sa jeunesse; elle devient ensuite concave, & ressemblait alors à une petite pézize; mais auparavant elle jette, par son orifice, une liqueur onctueuse, limpide. Sa surface est, ou glabre, ou un peu pubescente, mais la base est toujours couverte de petits poils qu'on prendroit pour une espèce de byssus parasite.

82. SPHÈRE du scirpe. *Spharia scirpicola*. Dec.

Spharia loculis orbicularibus, nigris, depressis; aperturâ prominente, subconica. (N.)

Spharia scirpicola. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 300. n°. 809.

Cette espèce naît éparse & solitaire sur les tiges mourantes du scirpe des lacs. Ses loges sont noires, orbiculaires, déprimées, surmontées d'un orifice proéminent & à peu près conique; elle perce l'épiderme, & son orifice seul paraît au dehors par la petite fente que la sphère forme en grandissant.

Cette plante croît sur les scirpes; elle a été observée par M. Chaillat. (Decand. l. c.)

83. SPHÈRE à base cotonneuse. *Spharia byssidea*. Persoon.

Spharia majuscula; sphaerulis globosis-papillatis, tomento crasso, fusco cinis. Pers. Synopf. pag. 67. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 295.

a. *Corticis*. Decand. l. c.

Spharia byssidea, var. β , *fusca*. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 10. tab. 9. fig. 70.

β . *Putredinis*. Decand. l. c. pag. 296.

γ . *Ligni*. Decand. l. c.

Hyponoxylon globulare. Bull. Champ. pag. 169. tab. 444. fig. 2.

Cette sphère forme des globules assez gros, mamelonnés, solitaires. Ses loges sont noires, épaisses, dures, grossies comme de la grenaille à tirer, parfaitement sphériques, avec un petit mamelon protubérant qui indique l'orifice. Elles sont à moitié enchaînées dans un duvet brun, plus ou moins compacte, semblable à un byssus, & qui s'étend de côté & d'autre.

V v 2

La variété α croît sur les écorces saines ; la variété β le trouve dans les bois entièrement décomposés, & presque réduits en terreau : le mamelon des loges y est peu prononcé. La variété γ a été trouvée par Bulliard sur le bois ; elle ressemble aux précédentes par la forme, mais ce naturaliste ne parle point de la base conique. N'y existe-t-elle pas, ou l'aurait-il regardée comme étrangère à la sphérie ? (Decand.)

84. SPHERIE à base blanche. *Spharia albicans*. Persf.

Spharia perithecia majusculis, ad dimidium immersis, primò solitariis, acutùm confluentibus, materie albicante (signi particula?) ut plurimum cinditis. Persf. Icon. Fung. Fasc. 3. pag. 37. tab. 17. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 296.

Spharia simplex, majuscula, sphaerulis globosis papillatis, nannullis confluentibus, subiculis albicanti subimmersis. Persf. Observ. Mycol. 1. p. 71. Synopf. pag. 70.

β . *Spharia (confluens), simplex, confluens, atra, papillata, vixit fugaci*. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 19. tab. 10. fig. 87.

Cette espèce se rencontre sur les bois morts & pourris des vieux troncs de saule. Ses capsules sont noires, & comme à demi-enfoncées dans le bois, d'abord libres, devenant ensuite confluentes, mais point réunies entr'elles par une substance particulière, assez grandes, coniques, presque globuleuses, terminées par un mamelon obtus, entourées à leur base d'une bordure blanchâtre, qui est due, ou à l'altération du bois, ou à quelques filaments de byssus. Elle a beaucoup de rapport avec le *Spharia uva*.

85. SPHERIE cendrée. *Spharia cinerea*. Persf.

Spharia sphaerulis globosis, nigris, papillato-acutis; crusta villosa, c'assâ, cinerea cinditis. Persf. Synopf. pag. 68.

C'est une belle espèce, assez rare, & qui croît sur des bois desséchés. Elle est composée de loges féminales distinctes, globuleuses, très-rapprochées, glabres à leur surface, de couleur noire, enveloppées de leurs parts, principalement dans leur jeune âge, d'un duvet lâche, épais, cendré. Leur orifice est formé par un mamelon aigu. (Persf. l. c.)

86. SPHERIE orangée. *Spharia aurantia*. Persf.

Spharia conferta, sphaerulis subrotundis, rubicundis, papillatis; crusta tomentosa, aurantio-ferrugineâ cinditis. Persf. Icon. & Descript. Fung. 2. tab. 11. fig. 4 & 5. — Idem, Synopf. pag. 69.

Ce sont de petites taches isolées, très-rapprochées, un peu arrondies, rougeâtres ou couleur

d'orange, qui croissent sur des champignons en putrefaction, enfoncées dans leur substance, épaisses, un peu ridées, qui s'élèvent un peu en dehors avec l'âge, & sont couvertes à leur base d'un duvet orange foncé. Leur orifice est un petit mamelon épais, obtus.

87. SPHERIE trichoderme. *Spharia trichoderma*. Synopf.

Spharia simplex, sphaerulis conicis, denudatis, aurantio-rubris, membrana tomentosa lateficienti insistentibus. Persf. Synopf. pag. 69.

Spharia (trichoderma), aggregata, sparsa, fissilis, conica, membrana tomentosa insuans. Hoffm. Veger. in Substr. Hyrcin. Fasc. 1. pag. 9. tab. 6. fig. 1.

Expansion membraneuse, composée d'un très-grand nombre de fibres semblables à celles d'un byssus, de divers couleurs, jaune, cendrée & orangée. Leur surface est granuleuse, formée par une infinité de petites loges agrégées, d'un rouge de sang ou orangé, insérées sur une base de nouillure ; elles se fèchent avec le tems, nouissent, deviennent plus minces, membraneuses, transparentes, & persistent long-tems. Elles croissent sur des bois presque réduits en terreau, profondément enfoncés en terre, dans les forêts d'Hyrcinie.

88. SPHERIE fils d'araignée. *Spharia arenea*. Persf.

Spharia simplex, opaca, nigra, sphaerulis papillatis, levibus, villo tenuissimo, albicante ostentis. Persf. Synopf. pag. 67. — Idem, Icon. & Descript. Fung. 1. pag. 24. tab. 7. fig. 6. B.

On la rencontre sur les branches sèches, dépouillées de leur écorce. Les loges féminales sont, ou solitaires, ou agrégées & un peu confluentes ; petites, épaisses, globuleuses, noires, lisses, mais recouvertes par un petit duvet très-fin, blanchâtre, & dont les fils sont entre-mêlés lâchement, à peu près comme ceux d'une roile d'araignée ; elles n'ont point pour réceptacle de croûte tomenteuse, comme le *Spharia byssida*, mais elles sont insérées immédiatement dans le bois ; elles se terminent par un petit mamelon ovale, court, un peu courbé, dont l'orifice est un peu ouvert.

89. SPHERIE laineuse. *Spharia ovina*. Persf.

Spharia sparsa, sphaerulis globosis ovatisque, liberis; tomento compoto, albidio testis; opistolo papillato, nigricante. Persf. Synopf. pag. 71. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 296.

Spharia mucida, var. β , *alba*. Tode, Fung. Meckl. 2. p. 16.

1. *Spharia* (fucescens), *gregaria*, *spharulis immixtis*, *globosis*, *aggregatis*, *tomento fusco involutis*. Pers. l. c.

Spharia mucida, var. γ , *fusca*. Tode, Fung. Meckl. 2. pag. 16. tab. 9. fig. 75.

On rencontre cette sphérie dans l'automne, sur les troncs des arbres pourris. Ses loges sont séparées, mais rapprochées en groupes, un peu ovales ou globuleuses, d'un blanc-cendré, couvertes d'une bourre cotonneuse & blanchâtre, surmontées d'un orifice noirâtre, un peu prolongé en une pointe obtuse. Dans la variété γ la bourre est brune, très-fine; les loges plus rapprochées; leur orifice brun dans sa jeunesse, il devient noirâtre en vieillissant.

90. SPHÈRE pileuse. *Spharia pilosa*. Pers.

Spharia simplex, *conferta*, *spharulis minutis*, *rotundis ovatis*, *leviusculis*, *pilosis*; *ostiole simpliciter*. Pers. Synopf. pag. 73. — Idem, Icon. & Descript. Fung. Falc. 2.

Cette sphérie est extrêmement petite; elle croît sur le bois sec & couvert de mousse. Ses loges féminales sont nombreuses, distinctes, ovales, un peu arrondies, chargées, dans leur jeunesse, de poils fasciculés; leur orifice est simple, très-court.

Le *spharia hirsuta*, Pers. Synopf. pag. 73, ne diffère de la précédente que par ses poils épars, plus courts; par ses loges plus ovales, un peu tuberculées, entièrement noires. L'orifice est obtus, médiocrement anguleux. Ce n'est peut-être qu'une variété de la précédente.

91. SPHÈRE graine de pavot. *Spharia spermoidea*. Pers.

Spharia congesta, *opaca*, *rigida*, *spharulis globosis*, *deorsum subteretibus*; *ostiole papilliformi obsoleto*. Pers. Synopf. pag. 75. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 297.

Spharia (spermoides), *gregaria*, *globularis*, *nigra*. Hoffm. Veget. Crypt. 2. p. 12. tab. 3. fig. 3.

Spharia (globularis), *globata*, *clausa*, *nigra*, *nitidis expertis*, *indurata*. Batich. El. Fung. Centur. 1. pag. 271. tab. 30. fig. 180.

Cette espèce croît sur le bois mort, où elle se présente comme un amas de petites graines de pavot. Ses loges sont agrégées, globuleuses, dures, distinctes, un peu chagrinées lorsqu'on les examine à la loupe, roides, fragiles, sans orifice sensible, placées sur un duvet cotonneux, noirâtre, peu sensible.

92. SPHÈRE bombe. *Spharia bombardata*. Pers.

Spharia simplex, *fusculata*, *fuscescens*, *spharulis*

elongatis, *subventricosis*; *ostiole papillâ acutâ*. Pers. Synopf. pag. 75.

Spharia (bombarda), *gregaria*, *oblonga*, *nigro-fusca*, *apice poro tenerrimo semen album experiente*. Batich. Elench. Fung. pag. 271. fig. 181.

Namospora (glabra), *oblonga*, *fusco-glabra*. Willd. Berol. n°. 1207. — Roth. Flor. Germ. vol. 1. pag. 553.

Cette plante paroît noire au premier aspect; mais si on l'examine avec la loupe, on la voit d'un brun-foncé. Sa substance est un peu moelle, & quand la saison lui est favorable, son mucilage se convertit en une poussière blanche, farineuse. Ses loges féminales sont simples, distinctes, réunies en groupe. Chaque loge est ventrue à sa base, prolongée en un orifice un peu aigu. On trouve cette espèce sur les troncs pourris.

93. SPHÈRE sphincter. *Spharia sphincterica*. Decand.

Spharia minuta, *simplex*, *elongata*, *subpubescens*, *apice obtusâ*, *acuta nigrescens*. (N.)

Spharia sphincterica. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 297.

Hypoxyton sphinctericum. Bull. Champ. pag. 168. tab. 444. fig. 1.

Cette sphérie croît sur les bois morts; elle est fort petite, simple, d'une forme allongée, un peu rétrécie à sa partie inférieure; elle n'a qu'une seule loge, mais les individus sont très-rapprochés les uns des autres. Ils sont, dans leur jeunesse, d'un blanc, légèrement pubescents, arrondis à leur sommet. Plus avancés en âge, ils deviennent noirs, & sont pleins d'une substance mucilagineuse. Alors leur sommet est creusé en entonnoir, couronné de poils très-apparens, plissé comme un sphincter ou comme une bourse fermée. Ils deviennent glabres dans leur vieillesse.

94. SPHÈRE patelle. *Spharia patella*. Pers.

Spharia sparsa, *simplex*, *atra*, *spharulis disco impresso plicatis*; *ostiole papillato*, *subobsoleto*. Pers. Synopf. pag. 76.

Spharia (penetrans, var. α , *patella*), *simplex*, *et hirsuta*, *globoso-acuminata*, *collabescendo-concavescent*, *aggregata*, *nigra*, *globis spermaticis*, *atra*. Tode, Fung. Meckl. 2. p. 45. tab. 15. fig. 122.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la précédente. C'est une des plus petites de ce genre; elle ne s'offre que comme des petits points épars, au mois de septembre, sur les tiges des plantes en putréfaction. Ses loges sont noires, lisses, globuleuses, luissantes, acuminées à leur sommet. Elles répandent par leur orifice une petite goutte

de liqueur, & ensuite elles s'aplatissent & prennent la forme d'une petite patelle concave, pûissée.

95. SPHÈRE artocroate. *Spharia artocreas*. Tode.

Spharia epiphylla, simplex, sparsa, atra, mammaformis, colla infundendo convexo complanata, plicis annulari. Tode, Fung. M.ckl. 2. pag. 20. tab. 9. fig. 73. — Pers. Synops. pag. 77.

Elle se présente sur les feuilles mortes du hêtre, sous la forme de tubercules très-petits, épars, simples, noirs, lesquelz, vus à la loupe, offrent des mamelons hémisphériques, qui s'affaissent en vieillissant, se compriment, forment à leur contour intérieur un pli annulaire, dont le milieu est rempli par un autre petit mamelon qui probablement leur sert d'orifice.

96. SPHÈRE lingan. *Spharia lingan*. Tode.

Spharia simplex, sparsa, subovalis, depresso-concava, plicis ruo oja, cymbulo rasi, decumbente aut subululo. Pers. Synops. pag. 77.

Spharia (lingan), simplex, stylosa, aggregata, subovalis, pubescentia, colla infundendo concava, rugosa, atra, stylo spermatico, brevissimo, decumbente. Tode, Fung. Neekl. 2. pag. 51. tab. 16. fig. 126.

Cette espèce est très-commune sur les feuilles pourries du *brassica oleracea rubra*; elle est fort petite: ses loges sont distinctes, réunies en groupes, de diverses formes, selon leur âge, tantôt aplaties, tantôt orbiculaires & renflées; leurs bords forment un bourrelet presque anguleux, à plusieurs fois concentriques; leur orifice, souvent peu apparent, est obtus, renversé, très-court, ayant l'apparence d'un style.

97. SPHÈRE sanguine. *Spharia sanguinea*. Pers.

Spharia simplex, ovata, sanguinea, apice perforata. Sibth. Oxon. pag. 404. — Bot. Fung. pag. 121. tab. 121. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 297. — Lam. Illustr. Genet. tab. 879. fig. 4. — Pers. Synops. pag. 81.

Hypoxylon (phoeniceum), unicolor, minimum, sphaerum, globofo-ellipticum, rubrum, glabrum. Bull. Champ. 171. tab. 487. fig. 3.

Cette plante est très-petite: on la trouve sur les vieilles tanches, plus ou moins enfoncée dans le bois. Ses loges féminales sont éparées, solitaires, simples, un peu irrégulières, plus ordinairement ovales, d'un rouge assez vif, lisses à leur surface, minces, concaves à leur sommet quand elles sont vieilles.

98. SPHÈRE barillet. *Spharia dollotum*. Pers.

Spharia simplex, sparsa, nuda, sphaerulis elevatis,

subterribus, obtrusa; plicis lateralibus distinctis, oftiolo papilliformi. Pers. Synops. pag. 78. — Idem, Icon. & Descript. Fung. Falc. 2. tab. 10. fig. 5 & 6.

On la rencontre sur les tiges des herbes élevées, & entre les feuilles sèches & tombées. Elle se rapproche beaucoup du *spharia artocreas* & *lingan*; elle en diffère par sa forme, qui ressemble plutôt à celle d'un petit baril. Les loges féminales sont petites, solitaires, éparées, sans duvet cotonneux, élevées, presque cylindriques, un peu coniques, obtuses à leur sommet, qu'il étoit médiocrement comprimées. Leur orifice est un petit mamelon assez apparent.

99. SPHÈRE tachante. *Spharia inquinans*. Pers.

Spharia simplex, sparsa, atro-inquinans, sphaerulis cum ligno subpromulis, perforatis. Pers. Synops. pag. 83. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 298.

« *Spharia (aceris), simplex, aggregata, obveluta-papillata, atra, immersa, seminum globulis (theis) cinctis, cylindricis.* Tode, Fung. M.ckl. 2. pag. 17. tab. 40. fig. 85. (*Spharia inquinans*.)

Variolaria ellipsoferma. Bull. Champ. pag. 183. tab. 493. fig. 3.

« *Spharia (xylosteum), atro inquinans, sphaerulis immersa, oftiolo seminum perforato.* Pers. Synops. pag. 84. — Idem, Disposit. Meth. Fung. pag. 4.

Cette sphère est éparée, solitaire; elle n'a qu'une seule loge, de couleur noire à sa partie supérieure, blanchâtre à sa partie inférieure, & qui laisse sur les couches corticales une empreinte très-visible. Elle est remplie de globules noirs, luisans, elliptiques, que l'on regarde comme les capsules des graines. A mesure que ces globules sortent de la loge, ils se collent autour de son orifice, & y forment une tache plus ou moins étendue. Cette espèce se trouve sur l'*acer campostis* & le *xylosteum-platanus*. La variété p. croît sur le *xylosteum xylosteum*; elle est remarquable par les taches beaucoup plus étendues qu'elle y occasionne, & ses loges plus enfoncées, dont l'orifice est perforé.

100. SPHÈRE en cratère. *Spharia craterium*. Decandole.

Spharia simplex, punctiformis, sphaerulis sparsis, colla infundendo-umbilicatis, crateriformibus; margine membranaceo, albidis. (N.)

Spharia craterium. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 298.

Spharia (punctiformis, var. β , hederæ), major, depresso-cupuleformis, in foliis hederæ heliciis proveniens. Pers. Synops. pag. 90.

« *Spharia (ambigua), puncta superficialia, plana,*

in maculâ albâ infusentia, in foliis quereinis aridis parafitica. Perf. Synopf. pag. 91. var. γ.

Elle croît à la surface inférieure des feuilles de lierre, où elle se montre d'abord sous la forme d'un disque blanc, aplati, large d'une demi-ligne. Ce disque se soulève un peu, noircit, se creève, & devient concave au centre; il ressemble alors à une petite coupe bordée par les débris d'une membrane blanchâtre: on la rencontre également sur le chêne.

101. SPHÈRE en forme de points. *Spharia punctiformis*. Decand.

Spharia simplex, *epiphylla*, *punctiformis*; *sphaerulis sparsis*, *collabescens* - *umbilicatis*, *subnitidis*. Perf. Synopf. pag. 90. & Dispos. Meth. Fung. pag. 51. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 299.

a. *Spharia quercus*. Decand. l. c.

β. *Spharia culmi*. Decand. l. c.

Cette sphère se présente par plaques qui ne sont que de petits points épars, arrondis, noirâtres, un peu faillans, convexes, qui forment ensuite une petite cavité ou un ombilic dans leur milieu. On ne peut y distinguer aucun orifice sensible. Elle croît sur deux faces des feuilles du chêne. La variété β, peu distinguée de la précédente, se trouve sur la paille.

102. SPHÈRE aplatie. *Spharia complanata*. Tode.

Spharia simplex, *aggregata*, *mammiformis*, *pulla*, *collabescendo-complanata*. Tode, Fung. Mækl. 2. pag. 21. tab. 11. fig. 88.

Spharia (herbarum), *simplex*, *sphaerulis sparsis*, *levibus*, *ut plurimum subdepressis*, *ostiolis papillatis*. Perf. Synopf. pag. 78. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 299. var. α.

a. *Complanata*, *major*, *sphaerulis ut plurimum denudatis*, *collatis*. Perf. l. c.

β. *Convexa*, *sphaerulis nudis*, *orbiculari-convexis*; *ostio prominente*, *crassiore*, *aperto*. Perf. l. c.

γ. *Trila*, *minor*, *sphaerulis testis*; *ostiolis prominentibus*, *punctiformibus*. Perf. Synopf. pag. 79. — Idem, Obscrv. Mycol. 2. pag. 69.

δ. *In veratri & gentiana caule*. Decand. l. c. var. β.

ε. *In aquifolii foliis*. Decand. l. c. var. γ.

ζ. *In rosi foliis*. Decand. l. c. var. δ.

La petitesse de cette espèce force de rapprocher comme variétés plusieurs plantes qui sont peut-être des espèces distinctes. Ses loges sont à peine sensibles, éparses sur les tiges des plantes herbacées, noires, foliaires, d'abord un peu élevées, puis planes, concaves dans leur vieillisse; l'orifice un peu proéminent dans leur centre. Il est

tantôt plus épais & plus élevé, tantôt à peine perceptible & comme un petit point. La variété A de M. Decandolle croît sur les tiges de la gentiane jaune & du *veratrum nigrum*; elle est plus petite, plus plane, & naît en sociétés nombreuses. La variété γ du même est un peu plus grande, un peu luisante, moins foncée en couleur dans le centre que sur les bords, & se trouve à la face supérieure des feuilles sèches du houx. La variété δ croît sur les deux faces des feuilles sèches du *ruscus*; elle y forme de petits points noirs, épars, qui, vus à la loupe, offrent un anneau noir avec le centre blanc.

103. SPHÈRE lichénoïde. *Spharia lichenoides*. Decand.

Spharia minutissima, *sphaerulis nigris*, *subprominentibus*; *ostio subnullo*. (N.)

Spharia lichenoides. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 299.

a. *Convallaria polygonati*. Decand. l. c.

β. *Hedera helix*. Decand. l. c.

« Je réunis sous le nom de *sphère lichénoïde*, dit M. Decandolle, de petites plantes qui croissent à la surface des feuilles mourantes de différentes plantes. Elles ont ceci de particulier, qu'elles décolorent la feuille à l'entour d'elles, & la privent de parenchyme; elles offrent des points noirs proéminens sur l'un des côtés, & quelquefois sur les deux côtés de la feuille, un peu plus petits que des têtes d'épingle, & dépourvus d'orifice prononcé. La variété α, qui croît sur le *convallaria polygonati*, n'a de tubercules faillans qu'à la face supérieure. La variété β, qui croît sur le lierre, pousse indistinctement sur les deux faces, & forme une tache blanche ou rousse. »

104. SPHÈRE pustule. *Spharia pustula*. Perf.

Spharia epiphylla, *pustuliformis*, *rufescens*, *intus gelatinâ compactâ*, *nigrescente*. Perf. Synopf. p. 91. — Idem, Annal. Bot. 11. pag. 26. n°. 36. tab. 2. fig. 7. B. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 300.

Cette sphère croît sur les feuilles sèches du chêne; elle y forme des taches d'un brun-noirâtre, comprimées, d'environ une à deux lignes de diamètre, assez semblables à des pustules. Elle n'a qu'une seule loge brune, remplie d'une substance noirâtre, gélatineuse & compacte, qui se répand sur la feuille: on n'y distingue point d'orifice.

105. SPHÈRE à poils roides. *Spharia pilifera*. Decand.

Spharia simplex, *maculiformis*, *sphaerulis minutis*, *congestis*, *planiusculis*; *pilis erectis* - *divergentibus*,

medio obstit. (Sphæria dematium). Pers. Synopf. pag. 88.

Sphæria pilifera. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 300.

5. *Caprea*, *epiphylla*, *punctiformis*, *sphærolis sparsis*, *subovatis*. Pers. l. c.

Cette sphérie se présente sur les tiges sèches des herbes, en forme de petites taches grisâtres ou noires, un peu luisantes, composées de points rapprochés, distincts, qui sont autant de petits tubercules convexes - ovales ou un peu arrondis, sur lesquels on aperçoit à la loupe quelques poils roides, noirâtres, droits & un peu divergens.

106. SPHÉRIE trompeuse. *Sphæria fallax*. Pers.

Sphæria simplex, *sparsa*, *sphærolis furium cylindricis*; ore lato, aperto, basi semiglobosa farila continuis. Pers. Icon. & Descript. Fung. fasc. 2. p. 41. tab. 10. fig. 11-12. — Idem, Synopf. pag. 92.

Cette sphérie croît sur le bois de chêne carié. On croit, au premier aspect, qu'elle a la base en capsule globuleuse & son orifice allongé, comme dans beaucoup d'autres espèces; mais la portion inférieure est pleine, globuleuse, point capsulaire, enfoncée dans le bois, tandis que la partie supérieure est creuse, cylindrique, courte, un peu ridée.

SPIGÈLE. *Spigelia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopérales, de la famille des gentianées, qui a des rapports avec les *ophiorrhiza*, & qui comprend des herbes ou arbrustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, quelquefois presque verticillées; les fleurs terminales, pourvues de bractées, & disposées en cime ou en épi.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle infundibuliforme; le limbe étalé, à cinq découpures égales; cinq étamines; un stigmate simple; une capsule à deux lobes, à deux loges; plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, inférieur, persistant, partagé en cinq découpures aiguës.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est beaucoup plus long que le calice, rétréci à sa partie inférieure; le limbe ouvert, à cinq découpures acuminées.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont plus courts que la corolle, insérés sur son tube, terminés par des anthères sagittées.

4°. Un ovaire supérieur, à deux lobes, sur-

monté d'un style subulé, terminé par un stigmate aigu.

4°. Le fruit est une capsule à deux lobes, presque à deux coques, biloculaire, à quatre valves.

Les semences sont nombreuses, fort petites, anguleuses, attachées à l'angle intérieur des loges.

ESPÈCES.

1. SPIGÈLE anhelminthique. *Spigelia anthelmia*. Linn.

Spigelia caule herbaceo, foliis lanceolatis, sessilibus; summis quaternis, majoribus. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 474. n°. 2153. tab. 107.

Spigelia caule herbaceo, foliis summis quaternis. Linn. Amœn. Acad. vol. 5. pag. 133. tab. 2. — Mater. med. 59. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 824. n°. 1.

Spigelia caule erecto, foliis quaternis, sessilibus; spicis terminalibus. Miller, Dict. n°. 1.

Spigelia quadrifolia, spicis terminalibus. Brown, Jam. pag. 156. tab. 37. fig. 3.

Arapabaca quadrifolia, fructu resiliato. Plum. Gener. Amer. pag. 10. tab. 31. — Barrer. France équinox. pag. 15.

Brazel parisi. Petiv. Gazoph. tab. 59. fig. 10.

Arapabaca, brasiliensis dista planta. Marcg. Brasil. 46.

Vulgairement poudre aux vers.

Ses racines sont fibreuses, & produisent une tige droite, assez forte, herbacée, glabre, cylindrique, presque simple, striée, haute d'environ un pied & demi. De l'aisselle des feuilles sortent quelques rameaux opposés, très-simples, semblables aux tiges. Les feuilles sont sessiles, opposées, lancéolées, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet. Les tiges, ainsi que les rameaux, sont terminés par quatre feuilles opposées, en croix, plus grandes que les autres.

Les fleurs sortent du centre des feuilles supérieures; elles sont terminales, disposées en épis médiocrement ramifiés à leur base, un peu grêles, peu allongés, munis de bractées. Chaque fleur est presque sessile, presque unilatérale, de couleur un peu herbacée. Le calice est partagé en cinq découpures aiguës; le tube de la corolle tendue à sa partie supérieure; le limbe à cinq lobes ovales, acuminés. Le fruit est une capsule à deux lobes, surmontés dans leur milieu du style persistant.

Cette plante croît au Brésil, à Cayenne & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

○ (V. v.)

Cetto

Cette plante paffit pour un des meilleurs fpecifiques connus pour détruire les vers intestinaux. Les habitants du Bréfil en font ufage depuis longtemps, ainfi que les Nègres, qui l'ont communiquée aux Colons des îles américaines. On lui a donné le nom de *poudre aux vers*.

2. *SPIGÈLE* du Mariland. *Spigelia marilandica*. Linn.

Spigelia caule herbaceo, tetragono; foliis feffilibus, omnibus oppofitis. Lam. Illutr. Gener. vol. 1. pag. 474. n°. 2154.

Spigelia caule tetragono, foliis omnibus oppofitis. Linn. Syst. veget. pag. 166. — Hope, Aët. Edimb. 3. ann. 1771. pag. 151. tab. 1. — Curtis, Magaf. 202. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 815. n°. 2.

Spigelia perennis, caulibus simpliciffimis; foliis omnibus oppofitis, feffilibus, lanceolato-ovalibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 148.

Lonicera (marilandica), fpecis terminalibus; foliis ovato-oblongis, acuminatis, diftinctis, feffilibus. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 149. — Gronov. Virgin. 142.

Spigelia (lonicera), foliis oppofitis, ovato-oblongis, acuminatis, feffilibus; fpecis terminalibus. Mill. Dict. n°. 2.

Pergelimeni Virginiani, flore coccineo, plantâ marilandica; fpecis erectâ, foliis conjugatis. Rai, Dendr. 31. — Catesb. Carol. 2. pag. 78. tab. 78.

On diftingue cette efèce à fes fleurs affez grandes & d'une belle couleur écarlate en dehors, à fes tiges fimples & à fes feuilles toutes oppofées, point en croix.

Ses racines font vivaces & fibreufes; il s'en élève plufieurs tiges droites, herbacées, hautes à peine d'un pied, roides, très-fimples, prefque quadrangulaires, un peu rudes fur leurs angles, gaines de feuilles oppofées, feffiles, affez grandes, larges, ovales, un peu lancéolées, très-entières, acuminées, vertes, glabres à leurs deux faces, étales, longues de deux à trois pouces, larges d'environ un pouce & demi au moins.

Les fleurs font terminales, toutes tournées d'un même côté, feffiles, difposées en épis fimples, plus longs que les feuilles, munis de bractées fort petites, oppofées. Le calice eft compofé de cinq folioles fubulées, prefque filiformes, perfiftantes. La corolle eft au moins longue d'un pouce, infundibuliforme, d'un rouge-vif en dehors, d'un jaune-foncé, orangé en dedans, à cinq angles à fa partie fupérieure, dilatée à fa bafe, relevée en boiffe à fon orifice; le limbe divifé en cinq découpures rabattues; cinq étamines plus courtes que la corolle; des anthères couvoitantes & fagittées. Botanique. Tome VII.

tées; un ftyle articulé & perfiftant à fa partie inférieure; le ftigmate rétréci; une capfule arrondie, à deux lobes; les loges à deux valves, renfermant plufieurs fémences fcares & anguleufes.

Cette plante croit dans la Caroline, la Virginie & au Mariland. Elle m'a été communiquée par M. Boft. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

Elle eft employée dans le nord de l'Amérique, aux mêmes ufages que le *figelia anthelmia*. Elle paffit pour un des meilleurs remèdes contre les vers. Le docteur Garden, dans le premier volume des *Effais philofophiques* imprimés à Edimbourg, a donné des détails particuliers fur les vertus de cette plante.

3. *SPIGÈLE* fruticuleufe. *Spigelia fruticulofa*. Lamarck.

Spigelia caule fruticulofa; foliis ovatis, petiolatis, fummis quaternis. Lam. Illutr. Gener. vol. 1. pag. 474. n°. 2152.

Cette efèce offre, dans fes feuilles fupérieures, le même caractère que le *figelia anthelmia*; elle s'en diftingue par fes tiges un peu frutefcentes, & par fes feuilles ovales, pétioles. Ses rameaux font grêles, très-glabres, médiocrement quadrangulaires, comprimés à leur partie fupérieure, garnis de feuilles oppofées, pétioles, ovales, un peu lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières, liftes, vertes à leur face fupérieure, plus pâles en dedans, longues de deux ou trois pouces, larges de plus d'un pouce, à nervures latérales, alternes, fimples, arquées, dirigées vers le fommet. Les fupérieures font au nombre de quatre, prefqu'en verticille. Les fleurs font difposées en un épi grêle, terminal, long de deux ou trois pouces; chaque fleur feffile ou un peu pédicellée.

Cette plante croit dans les bois, à l'île de Cayenne. 7 (V. f. in herb. Lam.)

SPILANTE. *Spilanthus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs compofées, de la famille des corymbifères, qui a de très-grands rapports avec les *verbefina* & les *biden*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées, dont les fleurs font folitaires, axillaires ou très-fouvent terminales; le réceptacle conique.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à deux rangs de folioles prefqu'égales; fleurs tous hermaphrodites, à cinq divifions; réceptacle conique, garni de paillettes; fémences furmontées de deux ailes glabres, fétacées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs font compofées uniquement de flous. X 2

rons tous hermaphrodites & fertiles ; elles offrent :

1°. Un calice commun, hémisphérique, composé ordinairement de deux rangs de folioles droites, presque égales, oblongues.

2°. Une corolle formée entièrement de fleurons tubulés, égaux, hermaphrodites, infundibuliformes, dont le limbe est divisé en cinq découpures courtes, quelquefois quatre.

3°. Cinq, quelquefois quatre étamines, dont les filaments sont courts, capillaires ; les anthers cylindriques, tubulés.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates recourbés.

Les semences sont solitaires, petites, ovales-oblongues, comprimées, souvent parsemées de très-petits poils blanchâtres ; ciliées, blanchâtres à leurs bords, couronnées par deux petites soies flexibles, glabres, inégales.

Le réceptacle est allongé, cylindrique, presque conique, environ une fois plus long que le calice, garni de paillettes membraneuses.

Observations. Ce genre a paru à M. Lamarck si peu distingué des *biden*, qu'il a cru devoir réunir ces deux genres ; c'est pourquoi nous renvoyons, quant à la description des espèces, à l'article *BIDENT*, vol. 1, pag. 411. Les rapports qui existent entre ce genre & les *verbena* ne sont pas moins nombreux, & ces deux genres diffèrent si peu, que, d'après l'observation de Garret, en donnant des fleurs radiées aux *Spilanthus*, on en feroit des *verbena*.

Néanmoins si l'on considère le port des espèces qui composent ces trois genres, on y remarque une différence frappante. Les *Spilanthus* sont la plupart des plantes basses, dont les tiges se divisent en rameaux étalés, presque couchés. Les feuilles sont opposées, succulentes, presque grasses, enrièrres, faiblement sinuées ou dentées à leur contour, point ailées ni pinnatifides, comme celles de la plupart des *biden*, dont d'ailleurs s'élèvent très-haut. Dans la fructification, les seuls caractères qui puissent les distinguer, consistent dans le réceptacle ordinairement plus allongé dans les *Spilanthus* que dans les *biden*, & dans les deux soies courtes, flexibles, point rudes, qui couronnent les semences des *Spilanthus*, tandis que celles des *biden* sont surmontées de deux dents toides, subulées, accrochantes. Ces caractères, quoique médiocres, peuvent néanmoins déterminer à conserver ces deux genres, surtout si l'on considère que le port des *Spilanthus* les rapproche tellement, qu'il en forme presque un genre naturel.

SPILMANE. *Spilmania*. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des gattiliers, qui a des rapports avec les *lantana* & les *saligales*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs axillaires & solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle hypocratérisiforme ; le limbe à cinq lobes ; quatre étamines égales ; un stigmate recourbé en crochets ; un drupe à noyau biloculaire.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, droit, persistant, à cinq découpures linéaires, subulées, presque égales.

2°. Une corolle monopétale, hypocratérisiforme, dont le tube est presque cylindrique, un peu globuleux à la base, barbu à son orifice ; le limbe divisé en cinq lobes presque réguliers, ouverts, planes, oblongs, tronqués.

3°. Quatre étamines insérées sur le tube de la corolle, dont les filaments sont courts, égaux, terminés par des anthers ovales, non saillantes.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style court, terminé par un stigmate en crochets.

Le fruit est un drupe globuleux, renfermant un noyau à deux loges, contenant des semences oblongues, solitaires.

Observations. On avoit confondu la seule espèce qui constitue ce genre avec les *lantana*, dont elle a en effet tout le port. Sa fructification n'étoit pas alors connue ; mais dès qu'elle s'est montrée, il a été facile de reconnaître que cette plante ne pouvoit être réunie avec les *lantana* ; dont elle diffère par son calice & sa corolle à cinq divisions, par ses étamines point didymes, par la disposition des fleurs solitaires dans l'aisselle des feuilles, &c.

ESPÈCE.

SPILMANE d'Afrique. *Spilmania africana*. Medic.

Spilmania foliis oppositis, superioribus alternis ; floribus axillaribus, solitariis ; caule subalato. (N.)

Spilmania africana. Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 337. n°. 1646. tab. 85.

Spilmania (jasminum), *foliis alternis, sessilibus, decurrentibus ; floribus sessilibus*. Medic. in Act. Palat. vol. 3. Phyt. pag. 198. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 321.

Lantana (africana), foliis alternis, sessilibus; floribus solitariis. Linn. Hort. Cliff. 320. — Roy. Lugd. Bat. 290. — Mill. Dict. n°. 11.

Lantana floribus solitariis. Gen. Plant. 632.

Jasminum afritanum, ilicis folio; flore solitario, ex alio foliorum proveniente. Comm. Rat. 6. tab. 6.

Arbresque dont les tiges sont droites, hautes de cinq à six pieds, rameuses; les branches étalées; les rameaux opposés, quadrangulaires, velus à leur partie supérieure, & un peu aillés; les ailes crénelées, ondulées, garnies de feuilles sessiles, opposées; les supérieures alternes, presque décurrentes, minces, ovales, un peu velues, dentées en scie à leurs bords; les dentelures fines & courtes, pointues à leur sommet, à peine longues d'un pouce, nombreuses, très-rapprochées.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles. Leur calice est légèrement velu, à cinq découpures droites, subulées, aiguës; la corolle petite, blanche; le tube de la longueur du calice, renflé à sa base; le limbe plane, divisé en cinq lobes très-obtus, presque tronqués; l'orifice garni de poils; les étamines courtes, renfermées dans le tube; le stigmate fortement courbé en crochets. Le fruit est un petit drupe globuleux, légèrement acuminé, divisé par un sillon, & renfermant un noyau à deux loges.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

SPINELLE. *Spinifex.* Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, polygames, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *anthistiria* par sa fructification, avec les *loliium* & les *triticeum* par ses épis. Il comprend des herbes presque ligneuses, exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont disposées en épis agrégés; les épillets disposés sur deux rangs; le rachis prolongé en une pointe épineuse.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs hermaphrodites; une balle calicinale à deux valves, à deux fleurs; les valves droites, parallèles au rachis; deux valves corollaires, mutiques; trois étamines, deux styles; une des deux fleurs mâle, dans le même calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs hermaphrodites & les fleurs mâles sont renfermées dans le même calice. Elles offrent :

1°. Un calice composé de deux valves biflores; les valves oblongues, obtuses, roulées en dedans, plus courtes que la corolle, droites & parallèles

au rachis, renfermant une fleur hermaphrodite & une fleur mâle.

2°. Une corolle à deux valves lancéolées, roulées en dedans, mutiques, plus longues que le calice; l'intérieure plus étroite; à deux petites écailles linéaires, membranées, diaphanes, lâches dans les fleurs hermaphrodites.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont linéaires; les anthères saillantes, linéaires.

4°. Un ovaire oblong dans les fleurs hermaphrodites, nul dans les fleurs mâles, surmonté de deux styles courts, linéaires, terminés par des stigmates simples.

Les semences sont oblongues, enveloppées par les valves de la corolle.

ESPÈCE.

SPINELLE scarieuse. Spinifex squarrosus. Linn.

Spinifex foliis convolutis, rigidis, apice spinosis, superioribus fasciculatis; spiciis aggregatis. (N.) — Lam. Illustr. Gener. tab. 840.

Spinifex squarrosus. Linn. Syst. veget. pag. 902. — Linn. Mantiss. 300. — Linn. f. Suppl. pag. 432.

Arundo arborescens, tabaxifera. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 219. §. 8. tab. 8. fig. 11.

Gramen dactylon, pumilum, malabaricum; spiciis loliaceis, in acutum spinum terminatis. Scheuch, Gram. 112.

Ila malla. Rheed. Hort. Malab. pag. 75. — Rai, Suppl. 614.

Stipa spinifex. Syst. veget. edit. 13. pag. 104.

C'est une de ces belles graminées, qui, par la grosseur & l'élévation de leurs chaumes, semble vouloir rivaliser avec les arbres, & se ranger à côté de plusieurs espèces de palmiers. Celle-ci a des chaumes très-élevés, presque ligneux, pleins dans leur intérieur, de la grosseur du doigt, glauques, géniculés. Les feuilles naissent par fascicules aux articulations; elles sont longues de trois à quatre pouces, presque ombriquées, graminiformes, roulées à leurs bords, très-roides, glauques ou blanchâtres, étalées, un peu recourbées, épineuses & piquantes à leur sommet. Leur gainé est ample, courte, lâche, ventrue, striée, garnie à son orifice d'une membrane lanugineuse. Les feuilles supérieures sont bien plus nombreuses à chaque fascicule, plus étroites, lancéolées, dépourvues de gaines.

De leurs aisselles sortent plusieurs épis longs de trois à quatre pouces, dont le rachis est triangulaire, prolongé en une pointe droite, épineuse; il supporte des épillets sessiles, latéraux, alternes, distans, de cinq à neuf & plus, ovales, oblongs,

appliqués latéralement contre le rachis. Les valves calicinales font ovales, lancéolées, striées, aiguës; elles renferment deux flurs, dont une hermaphrodite, l'autre mâle & stérile.

Cette plante croit dans les Indes orientales, sur la côte du Malabar, dans les lieux sablonneux sur les bords de la mer. (K. f. in herb. Lam.)

Observations. L'*arundo arbor tabasifera*, C. Bauh. Theatt. pag. 126. Icon., ne me paroît pas être la même plante que celle-ci, à en juger par la description & par la figure; cependant, d'après la forme des epis, quoiqu'imparfaitement rendue, on pourroit soupçonner qu'elle appartient au même genre. Celle de C. Bauhin fournir le *tabaxir*, liqueur sucrée, qui se coagule par l'action du soleil, & se convertit en larmes dures & concrètes, & dont on faisoit un grand usage autrefois avant la culture de la canne à sucre. Plusieurs auteurs pensent que cette liqueur est fournie par le bambou: il est possible qu'elle le soit par plusieurs autres plantes, & il paroît que celle que je viens de décrire en fournit également.

SPIRÉE. *Spiraea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, de la famille des rosacées, qui a des rapports avec les *suriana*, & qui comprend des arbrustes ou des herbes, dont plusieurs sont indigènes de l'Europe. Leurs feuilles sont simples, ternées ou ailées, avec impaire; les fleurs petites, axillaires ou terminales, paniculées, ou en corymbes, ou quelquefois fasciculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice ouvert, à cinq divisions; cinq pétales; un grand nombre d'étamines; de trois à douze ovaires; autant de capsules, bivalves intérieurement, à une seule loge; une à trois semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq découpures profondes, très-ouvertes, aiguës, persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales insérés sur le calice, oblongs ou arrondis.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filaments sont filiformes, plus courts que la corolle, insérés sur le calice, terminés par des anthères arrondies.

4°. De trois à douze ovaires, souvent cinq, libres, supérieurs, surmontés chacun d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminés par des stigmates en tête.

Le fruit consiste ordinairement en autant de capsules qu'il y a d'ovaires; elles sont oblongues, comprimées, à une seule loge, à deux valves internes, renfermant chacune d'une à trois semences assez petites, insérées à la suture interne des valves, & dont la radicule est supérieure.

Observations. Si l'on ne considéroit dans ce genre que le port de la plupart des espèces, & quelques variétés remarquables dans les parties de leur fructification, on seroit tenté de les ranger en trois ou quatre genres, ainsi que l'avoient fait Tournefort & quelques autres botanistes. Il est certain que ce genre, tel que nous l'offrons d'après Linné, n'est pas très-naturel. Les espèces ne se rapportent guère entr'elles que par leurs capsules à une seule loge, à deux valves internes, renfermant plusieurs semences; mais le nombre de ces capsules varie, ainsi que celui des ovaires & des styles. Les pétales sont constamment au nombre de cinq, mais ils varient dans leur forme; ils sont ovales, un peu arrondis, fort petits dans un grand nombre d'espèces, linéaires ou lancéolés, & plus grands dans d'autres. Les étamines, en nombre infini, sont, ou plus longues, ou plus courtes que la corolle. Le calice, enté à sa base, est divisé en cinq découpures plus ou moins profondes & ouvertes. La disposition des fleurs est très-variable. Elles font terminales ou axillaires, très-rarement solitaires, plus ordinairement en corymbes, en cime, presque en ombelles ou paniculées, quelquefois fasciculées.

Les tiges sont, ou ligneuses, ou herbacées. Les premières consistent de petits arbrustes très-rameux; les rameaux souvent élancés, grêles, alongés, divisés en d'autres plus petits, chargés de fleurs. Les secondes, considérées comme herbacées, sont grandes, élevées, fermes, & rivalisent presque avec les premières. Rien de plus varié que les feuilles; elles sont fort petites ou très-grandes, entières ou crénelées, lobes, simples ou ternées, pinnatifides, ailées, avec impaire; deux fois ailées, dépourvues ou garnies de stipules fort petites, insérées sur les pétioles. Parmi ces espèces il en est de tellement rapprochées, qu'on a peine à les distinguer, & qu'elles forment dans ce genre autant de petits groupes particuliers, surtout parmi les espèces ligneuses, à feuilles simples. Malgré toutes ces différences, tant dans le port ou la forme des feuilles, que dans les parties de la fructification, comme le caractère essentiel du genre se retrouve constamment dans les capsules, nous croyons qu'il convient de le conserver tel qu'il est, d'autant plus qu'il ne peut se confondre avec aucun autre. Celui dont il semble se rapprocher est le *suriana*; mais celui-ci n'a que dix étamines, cinq capsules à une seule semence, à une seule valve. Le *spirea trifoliata* seroit seul susceptible de passer dans un autre genre, à cause de ses capsules à cinq loges.

1. SPIRÉE à feuilles de saule. *Spiraea salicifolia*. Linn.

Spiraea foliis lanceolatis, obtusis, serratis, nudis; floribus duplicato-racemosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 700. — Hort. Cliff. 191. — Horr. Upf. 131. — Ruyon, Lugd. Bar. 277. — Gmel. Sibir. 3. pag. 188. n°. 47. tab. 39. — Roth. Germ. vol. I. pag. 215. — vol. II. pag. 350. — Hoffm. Germ. 137. — Duroi, Harbk. 2. pag. 428. n°. 1. — Kniph. Cent. 3. n°. 91. — Miller, Dict. n°. 1. — Weig. Observ. 31. — Pall. Flor. ross. pag. 36. tab. 21. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 477. — Lam. III. Genes. tab. 439. fig. 2.

Spiraea fruticoso, foliis lanceolatis, argutè serratis, membranaceis, nervosis, subius nudis; racemo terminali, composito, subpaniculato; floribus albis, pentagynis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 293.

Spiraea foliis oblongis, serratis, glabris; racemis decompositis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 197. — Willd. Flor. 370. & Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055.

*. *Carneo foliis lanceolatis, racemis subspicatis, petalis carneis, cortice ramorum lutescente*. Aiton, Horr. I. c.

Spiraea caulis fruticosus, foliis ovato-lanceolatis, undiquè serratis, glabris; racemis duplicatis, terminalibus. Ehrh. Beitr. 7. pag. 136.

Spiraea Theophrasti forte. Clus. Hist. 1. pag. 80. — J. Bauh. Hist. 1. pag. 559. Icon.

Frutex spicata, foliis serratis, salignis. C. Bauh. Pin. 475.

Spiraea salicis folio. Tournef. Inst. R. Herb. 618. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 277. tab. 75.

β. *Alpestris foliis lanceolatis, obtusis, simpliciter serratis, canescentibus; racemis subspicatis, brevissimis; petalis corneis*. Willd. Spec. I. c.

Spiraea salicifolia, var. β. Pall. Flor. ross. vol. 1. pag. 36. tab. 21.

Spiraea salicis folio brevior, lutesculo, crenato; floribus rubris. Amm. Ruth. pag. 188. tab. 18.

γ. *Paniculato foliis lanceolatis; racemis paniculatis, divaricatis; petalis albis, cortice ramorum rubro*. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 198.

Spiraea (alba), foliis lanceolatis, acutis, apice serratis; floribus duplicato-racemosis. Duroi, Harbk. 2. pag. 430.

Spiraea (alba), caulis fruticosus; foliis cuneato-lanceolatis, superne serratis, glabris; racemis duplicatis, terminalibus. Ehrh. Beitr. 7. pag. 137.

Spiraea foliis lanceolatis, acutè serratis; floribus paniculatis, caule fruticoso. Miller, Dict. Icon. 171. tab. 257. fig. 2.

δ. *Latifolia foliis ovato-oblongis, racemis paniculatis; petalis albis, cortice ramorum rufescente*. Ait. I. c.

Arbrisseau d'un aspect très-agréable, cultivé depuis long-temps dans les jardins, dont les tiges sont hautes de trois à quatre pieds, rameuses, droites, cylindriques; les rameaux grêles, élançés, revêtus d'une écorce lisse, jaunâtre, striée; les feuilles pétiolées, éparées, alternes, lancéolées, oblongues, aiguës ou obtuses, presque membraneuses, glabres à leurs deux faces, d'un vert tendre, dentées en scie à leur contour, traversées par des nervures jaunâtres; les pétioles courts, un peu ailés.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, une assez belle panicule droite, serrée, un peu courte, composée de petites grappes pauciflores, latérales, munies à la base de leurs ramifications d'une petite bractée membraneuse, linéaire, pubescente. Leur calice est court; ses découpures ovales, glabres, vertes; la corolle au moins une fois plus grande que le calice; les pétales ovales, un peu arrondis, obtus, blancs, couleux de chair ou lavés de rouge, renfermant assez ordinairement cinq ovaires, qui se convertissent en autant de capsules oblongues, un peu aplatis, très-aiguës.

Cette plante croît naturellement sur les montagnes élevées, en France, sur le Mont d'Or & au Cantal, dans la Sibérie, la Tartarie, & dans l'Amérique septentrionale, depuis la baie d'Hudson jusque dans la Pensilvanie. h (P. v.)

Observations. Cet arbrisseau, qui ne fleurit que dans le courant du mois de juin, doit être planté dans les bosquets d'été; il réussit très-bien, même dans les terrains un peu secs. Il varie par ses feuilles plus ou moins larges, aiguës ou obtuses, dentées en scie à leurs bords ou seulement vers leur sommet; il varie par ses panicules plus ou moins touffues, par ses fleurs d'un rouge-tendre, souvent couleux de chair, quelquefois entièrement blanches.

2. SPIRÉE à feuilles lisses. *Spiraea levis*. Linn.

Spiraea foliis lanceolatis, integerrimis, sessilibus; racemis compositis. Linn. Manrif. 244. — Willd. Arbr. 370. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055. — Lam. Illustr. Gener. tab. 436. fig. 3. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 338. tab. 69.

Spiraea (altaica), foliis oblongis, integerrimis, sessilibus; racemis terminalibus, compositis. Pall. Flor. ross. vol. 1. pag. 37. tab. 23. — Linn. vol. 2. pag. 739. n°. 3. tab. T.

Spiraea (altaïensis), *foliis lanceolatis, integerrimis, glabris, ad basin angustatis, sessilibus; floribus racemosis, racemis simplicibus*. Lasm. Nov. Act. Petr. vol. 15. pag. 555. tab. 29. fig. 1.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds, dont les tiges sont fortes, cylindriques; les rameaux grêles, effilés, revêtus d'une écorce d'un brun-rougâtre ou d'un vert-jaunâtre dans sa jeunesse, un peu ridée, très-glabre; garnis de feuilles alternes ou fasciculées avant le développement des rameaux, lancéolées, très-entières, lisses à leurs deux faces, rétrécies presque en coin à leur base, arrondies, très-obtusées à leur sommet, avec une petite pointe particulière, d'un vert-glauque, longues de trois pouces & plus, sur un demi-pouce de large.

Les fleurs sont terminales, réunies en plusieurs épis droits, pédonculés, composés de plusieurs petites grappes courtes, alternes, munies de petites bractées glabres, membraneuses à la base des ramifications. Le calice est presque globuleux, à cinq découpures ovales, arrondies, obtuses. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice; les pétales ovales, un peu arrondis; les étamines plus longues que la corolle; cinq ou six ovaires, auxquels succèdent autant de capsules ovaires, oblongues, pédonculées, velues, à une seule loge, à deux valves, insérées au fond du calice sur un réceptacle velu. Elles renferment quatre semences attachées à la suture interne, un peu pendantes, oblongues, légèrement courbées, anguleuses, d'un brun-rougâtre, aiguës à leurs deux extrémités.

Cette plante croît sur les montagnes élevées, dans la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (*V. v.*)

3. SPIRÉE à feuilles blennarres. *Spiraea carulefolia*.

Spiraea frutescens, foliis subsessilibus, lanceolato-oblongis, integris, subcarulefoliis; paniculis axillaribus, ramosis. (N.)

Ses rameaux sont grêles; ligneux, élancés, glabres, un peu anguleux, garnis de feuilles presque sessiles; les unes opposées; d'autres alternes, étroites, lancéolées, longues au moins de trois pouces, sur six lignes de large, aiguës à leurs deux extrémités, entières à leurs bords, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, passant par la dessiccation à une couleur bleue assez vive, surtout à leur face supérieure; traversées par une nervure saillante, & par d'autres latérales à peine sensibles.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles supérieures, en panicules courtes, à cime touffue; les ramifications munies à leur base d'une petite bractée linéaire, entière; les calices

glabres, à cinq découpures courtes, presque obtuses; la corolle blanche, un peu plus longue que le calice; les pétales obtus; les étamines plus courtes que la corolle. Je ne connois point le fruit.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par M. Sonnerat. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

4. SPIRÉE de Magellan. *Spiraea magellanica*.

Spiraea fruticosa, foliis petiolatis, lanceolatis, inaequaliter serratis, nervosis; racemis terminalibus, subsimplicibus. (N.)

Arbrisseau dont les tiges sont divisées en rameaux grêles, d'un brun-cerdé, très-glabres, garnis de feuilles éparées, pétioles, lancéolées, presque elliptiques, inégalement dentées, presque lobées à leur contour, obtuses à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles, un peu blanchâtres en dessous, longues d'environ un pouce & demi, sur un demi-pouce de large, marquées en dessous de nervures alternes, qui se dirigent vers leur sommet; les pétioles courts, filiformes.

Les fleurs terminent les jeunes rameaux, & sont disposées en une grappe presque simple, courte. Les pédoncules sont longs, glabres, capillaires; le calice glabre, à cinq découpures courtes, aiguës; la corolle assez grande, blanche; les pétales un peu arrondis.

Cette plante a été recueillie par Commerçon au détroit de Magellan. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

5. SPIRÉE tomenteuse. *Spiraea tomentosa*. Linn.

Spiraea foliis lanceolatis, inaequaliter serratis, subtus tomentosis; floribus duficatis-racemosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 480. — Miller, Dict. n°. 5. — Duroi, Hist. 2. pag. 431. — Wangerh. Amer. 114. — Willd. Arb. 371. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1056. n°. 4.

Spiraea (tomentosa), *fruticosa, foliis ovalibus seu sublancoatis, inaequaliter serratis, subtus tomentosis; racemo terminali, composito, confertifloro; ricibus fustilis, carnis, pentagynis*. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 293.

Ulmaria pentacarpa, integra, serratis foliis, parvis, fuscis incanis, virginiana. Fluk. Almug. pag. 393. tab. 121. fig. 5. — Raf. Suppl. 350. — Morif. Oxon. Hist. 3. piz. 325. — Dunan. Arb. vol. 2. pag. 278. n°. 6. (*Spiraea*.)

Arbrisseau peu élevé, dont les tiges, hautes d'un pied & demi ou au plus deux pieds, sont divisées, presque des leur base, en rameaux grêles, revêtus d'une écorce un peu rougeâtre, muqueuse, légèrement farineuse, garnis de feuilles alternes, éparées, médiocrement pétioles, ovales

ou un peu lancéolées, vertes & presque luisantes en dessus, tomenteuses en dessous, profondément dentées en scie ; les dentelures inégales, aiguës.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, composé de plusieurs épis très-touffus & chargés de petites grappes courtes, nombreuses. La corolle est fort petite, d'un beau rouge ; les capsules courtes, au nombre de cinq, un peu velues, particulièrement dans leur jeunesse.

Cette plante croît à Philadelphie, au Canada, & sur les montagnes de l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Th* (V. v.)

6. SPIRÉE calluse. *Spiraea callosa*. Thunb.

Spiraea foliis lanceolatis, acutis, serratis, subvillosis ; panicula decomposita, subsistigata. Thunb. Flor. jap. pag. 209. — Willd. Spec. Plant. vol. 2 pag. 1056.

Spiraea (japonica), fruticosa, caule pubescente ; foliis lanceolatis, acutis, serratis, natis ; corymbo terminali, composito. Linn. f. Suppl. pag. 262.

Cette espèce paroît tenir le milieu entre le *Spiraea salicifolia* & le *Spiraea tomentosa* ; elle diffère du premier par ses feuilles évidemment pétiolées, elliptiques, plus longues, plus aiguës ; leurs dentelures plus dilantes. Elle diffère du second par ses feuilles velues, mais non tomenteuses ; par ses fleurs plus grandes, disposées en une panicule fastigiée, bien plus courte.

C'est d'ailleurs un petit arbruste dont les tiges sont ligneuses, cylindriques, pubescentes, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, alongées, très-aiguës, lâchement dentées en scie, parsemées en dessous de quelques poils. Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux, en un corymbe paniculé. Les pédoncules sont velus ; les calices légèrement pubescens ; la corolle grande, un peu rougeâtre ; les capsules ordinairement au nombre de cinq.

Cette plante croît naturellement au Japon. *Th*

7. SPIRÉE argentée. *Spiraea argentea*. Linn. f.

Spiraea fruticosa, racemis compositis, foliis sericeis, cuneatis, linearibus, apice serratis, subsistigatis. Linn. f. Suppl. pag. 261. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1057.

Cette espèce a des tiges ligneuses, divisées en rameaux droits, striés, qui en produisent d'autres beaucoup plus courts, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, rétrécies en coin à leur base, dentées en scie à leur sommet, couvertes sur leurs deux faces d'un duvet blanchâtre & foyeux. Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux, en panicules alongées, composées de

grappes nombreuses. La corolle est très-petite, à cinq pétales ; elle renferme cinq ovaires velus, & un très-grand nombre d'étamines.

Cette plante se rencontre à la Nouvelle-Grenade. *Th* (*Descript. ex Linn. f.*)

8. SPIRÉE à feuilles d'orme. *Spiraea ulmifolia*. Willden.

Spiraea foliis ovato-lanceolatis, duplicato-densatis ; corymbis pedunculatis. Willd. Arbr. 372. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. n°. 9.

Spiraea (ulmifolia), fruticosa, foliis ovatis, acutis, platis, duplicato dentatis ; corymbis florum terminalibus. Scop. Carn. n°. 600. tab. 22.

Spiraea chamaedryfolia. Jacq. Hort. 2. tab. 140.

Spiraea (betulifolia), foliis lato-ovatis, serratis ; corymbis terminalibus, compositis, subsistigatis. Pall. Flor. ross. vol. 3. pag. 33. tab. 16.

Spiraea foliis ovatis, crenatis. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 189.

On distingue cette espèce du *Spiraea crenata* par ses tiges plus élevées, ses fleurs plus grandes ; par ses feuilles bien plus larges, ovales-lancéolées, dentées à leur contour & non pas seulement à leurs bords ; les dentelures inégales, grosses, alternativement plus courtes.

Ses tiges sont peu élevées, ligneuses, divisées en rameaux étalés, presque simples, un peu jaunâtres, glabres, légèrement striés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, les unes ovales ; les autres un peu arrondies, plus larges, très-obtusées, glabres à leurs deux faces, inégalement dentées en scie à leur contour ; les pétiolés courts. Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, droit, un peu étalé. Les capsules sont au nombre de cinq, droites, acuminées, de couleur cendrée, très-glabres.

Cette plante croît dans la Sibérie & la Carniole. *Th* (V. f.)

9. SPIRÉE à feuilles de millepertuis. *Spiraea hypericifolia*. Linn.

Spiraea foliis obovatis, integerrimis ; umbellis sessilibus. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 521. — Hort. Upsal. 131. — Miller, Dict. n°. 3. — Duroi, Herb. 2. pag. 434. — Wangenh. Amer. 119. — Willd. Arbr. 372. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1057.

Spiraea foliis integerrimis, pedunculis simplicibus. Hort. Cliffort. 19c. — Roy. Lugd. Bat. 177.

Spiraea hypericifolia, non crenata. Tourn. Inst. R. Herb. 613. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 277. n°. 3.

Pruno sivestri affinis, canadensis. C. Bauh. Pin. 517. — Pluken. Amag. pag. 408. tab. 118. fig. 5.

On distingue cette espèce du *spirea crenata* par ses feuilles ovales, un peu plus grandes, entières, point crénelées à leur sommet; par les corymbes en ombelles, dont les pédoncules sont bien plus longs.

C'est un arbrisseau d'un port agréable, haut de trois à quatre pieds & plus, dont les tiges sont chargées de rameaux nombreux, allongés, étalés, grêles, élançés, ramifiés, glabres, d'un brun-rougeâtre, garnis de feuilles éparfes, minces, petites, très-glabres, très-entières, en ovale renversé, arrondies à leur sommet, rétrécies en coin, & presque pétiolées à leur base, d'un vert-tendre & gai, plus pâles en dessous, à peine longues d'un pouce.

Les fleurs sont nombreuses, disposées le long de la partie supérieure des rameaux, en petites ombelles sessiles, qui forment d'une petite touffe de feuilles, ou plutôt qui terminent des rameaux non développés. Il résulte de leur ensemble une sorte d'épi long de huit à dix pouces. Les pédoncules sont glabres, filiformes, simples, au moins longs d'un pouce. Le calice est glabre, à cinq découpures ovales, un peu aiguës; la corolle blanche, & les pétales ouverts & arrondis; des étamines nombreuses, au moins aussi longues que la corolle.

Cette plante croît au Canada. On la cultive dans les boisquets de printemps, comme plante d'ornement. Elle fleurit vers la fin de mai. *h* (V. v.)

10. SPIRÉE crénelée. *Spirea crenata*. Linn.

Spirea foliis obovatis, acutis, apice dentatis, trinerviis; corymbis confertis, pedunculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. n°. 10.

Spirea foliis oblongiusculis, apice serratis; corymbis lateralis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 489. — Mill. Dict. n°. 4. — Gmel. Itin. 1. pag. 112. — Kniph. Cent. 11. n°. 94. — Gouan, Illustr. 31. — Pallas, Flor. ross. pag. 35. tab. 19.

Spirea hypericifolia ampliore, modò integro, modò dentato. Aitn. Ruth. 170.

g. Spirea hispanica, hypericifolia crenata. Barrel. Icon. Rar. n°. 1376. tab. 564. ? — Tournef. Intit. R. Herb. 618. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 277. n°. 4.

Cet arbriste est d'un port très-élégant, surtout lorsqu'il est chargé de ses fleurs blanches, qui recouvrent les rameaux presque en totalité. Ses tiges sont hautes de quatre à cinq pieds, divisées en un grand nombre de rameaux touffus, grêles, très-longs, d'un brun-rougeâtre, glabres, cylindriques; les feuilles petites, ovales, cuneiformes à

leur base, alternes, rétrécies en pétiole, élargies & crénelées à leur sommet, ou entières, vertes, glabres à leurs deux faces; les crénelures très-variables, tantôt à trois lobes courts, obtus; tantôt incisées, aiguës; les nervures en réseau: quelquefois cependant elles sont traversées par trois ou cinq petites nervures simples, dirigées vers la sommet; ce qui me fait soupçonner que le *spirea chamadryfolia* n'est qu'une variété de cette espèce.

Les fleurs sont très-nombreuses, disposées en petits corymbes ombellés, le long des rameaux; les pédoncules sont courts, simples, un peu pubescens, & terminent de petits rameaux non développés, d'où vient que ces corymbes paroissent pédonculés. La corolle est petite, d'un blanc de neige; les pétales ovales, arrondis; les étamines à peine aussi longues que la corolle.

Cette plante croît dans la Sibirie & la Hongrie: on la trouve aussi en Espagne & dans les Cévennes. *h* (V. v.)

Nota. La plante de Barrelier a ses feuilles plus allongées. Cet auteur ne parle point de la fructification. A en juger d'après la gravure, on pourroit soupçonner que les fruits sont ceux du *crataegus* ou des *mespilis*. Il est en conséquence très-douteux qu'elle appartienne aux *spirea*, & même le fait est très-certain si la gravure est exacte; aussi Barrelier l'avoit-il appelée *oxyacantha angustifolia*, non *spinosa*; & ce qui confirme mon observation.

11. SPIRÉE à feuilles de chamadrys. *Spirea chamadryfolia*. Linn.

Spirea foliis obovatis, apice inciso-dentatis; corymbis pedunculatis. Willd. Arbr. 372. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. n°. 8. — Pallas, Flor. ross. vol. 1. pag. 32. tab. 15.

Spirea foliis ovatis, inciso-serratis, glabris; umbellis pedunculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 701. — Duroi, Habk. 2. pag. 432.

Spirea foliis oblongo-ovatis, supra subcrenatis; pedunculis simplicibus. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 189.

Spirea chamadryos foliis. Aitn. Ruth. 269.

Cette plante ne m'est pas assez connue pour pouvoir tracer les caractères qui la distinguent essentiellement du *spirea crenata*, dont je la soupçonnerois n'être qu'une variété. Ses principaux caractères consistent, d'après Willdenow, dans les crénelures du sommet de ses feuilles, qui sont plus profondes, dentées, incisées, veinées & non traversées par trois nervures, comme dans le *spirea crenata*; mais il m'a paru que ce caractère étoit foible, & dispaeroissoit (ainsi que je l'ai observé dans des individus recueillis en Sibirie par M. Patrin); que dans le *spirea crenata* ces trois nervures étoient

étoient apparentes dans quelques feuilles, confuses dans d'autres, de sorte que ces deux espèces pourroient bien rentrer l'une dans l'autre. On ajoute cependant que dans le *Spiraea chamadryfolia*, les corymbes sont plus lâches, moins ramifiés, & les fleurs un peu plus grandes; caractère qui également a paru peu constant. Dans toutes leurs autres parties, ces deux plantes se ressemblent tellement, que l'espèce que l'on cultive dans tous les bosquets, sous le nom de *Spiraea crenata*, pourroit plutôt être prise pour celle dont il est ici question, si l'on en excepte des feuilles plus larges dans celle-ci, ainsi que l'indique la figure citée de Pallas.

Celle-ci croit en Sibérie & dans la Hongrie. *Th* (*V. f. in herb. Juss.*)

12. SPIRÉE à feuilles de thalitron. *Spiraea thalictroides*. Pall.

Spiraea obovatis, obtusif, subtrilobis; umbellis lateralibus, sessilibus. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1059. n°. 12.

Spiraea aquilegifolia. Pall. Itin. vol. 3. Append. 854. n°. 94. tab. P. fig. 3.

Spiraea (thalictroides), foliis oblongis, lobatis; umbellis sessilibus. Pall. Flor. ross. vol. 1. p. 34. tab. 18.

Spiraea foliis variis, per fasciculos congestis. Amm. Ruuh. pag. 188.

Cette espèce a de grands rapports avec le *Spiraea hypericifolia*; elle s'en distingue par ses feuilles bien plus petites, épaisses, ordinairement à trois lobes à leur sommet.

Ses tiges sont ligneuses, glabres, rameuses; les rameaux alternes, assez nombreux, grêles, diffus, garnis de feuilles nombreuses, rapprochées, éparées, quelquefois fasciculées, pétiolées, courtes, cuneiformes, presque ovales, variables, entières à leurs bords, divisées à leur sommet en trois lobes obtus & plus, un peu épaisses, pubescentes, glauques en dessous, marquées de trois ou cinq nervures à peine sensibles, dirigées vers le sommet des feuilles.

Les fleurs sont disposées, le long des jeunes rameaux, en petits corymbes latéraux, sessiles, presque en ombelle. Les calices sont glabres, obtus; la corolle blanche; les pétales obtus; les étamines à peine plus longues que la corolle; les capsules légèrement velues, presque obtuses.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Sibérie. *Th* (*V. f. in herb. Lam.*)

13. SPIRÉE feuillée. *Spiraea foliosa*.

Spiraea caule fruticoso; foliis ovatis, glabris, apice acutatis; floribus laxo racemosis, calice folioso. (N.) Botaniquet. Tome VII.

Cette espèce est très-remarquable par les divisions de ses calices, qui prennent la forme de petites feuilles; elle se distingue d'ailleurs par ses fleurs fort petites, lâches, soutenues; & ar de longs pédoncules filiformes.

Ses tiges sont cylindriques; les rameaux effilés, grêles, d'un blanc-jaunâtre, & d'un brun-cendré dans leur vieillesse. Les feuilles sont alternes, médiocrement pétiolées, assez grandes sur les anciens rameaux, longues au moins d'un pouce, larges de six lignes, ovales, glabres à leurs deux faces, minces, vertes, entières à leurs bords, obtuses & crénelées à leur sommet; celles des rameaux fleuris beaucoup plus petites, presque entières.

Les fleurs sont terminales; elles forment une grappe courte & lâche. Les pédoncules sont épars, quelques-uns axillaires, presque capillaires, au moins longs de deux pouces. Le calice est très-glabre: ses découpures se convertissent (peut-être par surabondance de végétation) en cinq petites folioles ovales, entières, inégales. La corolle est blanche, fort petite, cachée entre les folioles du calice; les pétales ovales, obtus; les étamines nombreuses, plus courtes que la corolle.

Cette plante a été cultivée en 1795 dans le jardin de M. Williams. J'ignore son lieu natal. *Th* (*V. f. in herb. Juss.*)

14. SPIRÉE alpine. *Spiraea alpina*. Pall.

Spiraea foliis linear-lanceolatis, denticulatis, glaberrimis; corymbis lateralibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1057.

Spiraea foliis lanceolatis, serrulatis, glabris; corymbis terminalibus. Pall. Flor. ross. vol. 1. pag. 35. tab. 20.

Spiraea crenata varietas. Georg. Itin. pag. 217.

Elle tient presque le milieu entre le *Spiraea hypericifolia* & le *crenata*; elle en est distinguée par ses feuilles étroites, linéaires-lancéolées, denticulées très-souvent dans toute leur longueur.

C'est un arbrisseau de deux ou trois pieds de haut, dont les rameaux sont alternes, diffus, étalés, glabres, cylindriques, de couleur brune, un peu rongéâtre, garnis de feuilles presque par fascicules, ou bien alternes, presque sessiles, lancéolées, rétrécies presque en pétiole à leur base, très-glabres à leurs deux faces; les unes entières; d'autres légèrement dentées à leur contour, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des petits rameaux latéraux, en corymbes courts, un peu globuleux, presque tournés du même côté, soutenues par des pédoncules grêles, allongés. Les calices sont glabres, les corolles un peu plus grandes que celles du *Spiraea crenata*. Les capsules sont oblongues, comprimées, droites, parallèles, de couleur cendrée.

Y y

Cette plante croît dans la Sibérie, dans les forêts, sur les montagnes élevées, & aux environs du lac Baïcal. *h* (*Descript. ex Pall.*)

15. SPIRÉE lancéolée. *Spiraea lanceolata*.

Spiraea caule fruticoso foliis lanceolatis, obtusè ferratis, glabris; umbellis terminalibus, pedunculatis. (N.) Commerf. Herb. & Icon.

Cette espèce, qui a beaucoup de rapport avec le *Spiraea alpina*, en diffère par les feuilles bien plus en ombelle, larges, alternes; par ses fleurs pédonculées, plus étalées.

Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, divisées en rameaux toides, effilés, alternes, d'un brun foncé, garnies de feuilles alternes, rapprochées, pétiolées, longues d'un pouce & demi, larges au moins d'un demi-pouce, lancéolées, glabres à leurs deux faces, un peu blanchâtres en dessous, obtuses, irrégulièrement dentées en scie à leurs bords; les dentelures presqu'obtus; les nervures rouffâtres, la plupart dirigées vers le sommet des feuilles; les pétioles filiformes, courts.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des jeunes rameaux, en ombelles pédonculées; les pédoncules sont grêles, & s'ouvrent à leur partie supérieure des rayons nombreux, presque capillaires. Le calice est glabre & court; la corolle blanche, d'une grandeur médiocre; les pétales ovales, presque ronds, obtus.

Cette plante a été rapportée de l'île-de-France par Commerf. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

Nota. Le *Spiraea* (incisa), *foliis ovatis, incisè quinque partitis, ferratis; umbellis terminalibus*, Thunb. Flor. japon. pag. 213, a des rapports avec les trois ou quatre dernières espèces que je viens de mentionner. Cette plante ne nous est pas assez connue pour prononcer sur la place qu'elle doit occuper ici. Ses feuilles sont ovales, incisées, à cinq découpures en dents de scie; les fleurs disposées en une sorte d'ombelle terminale. Elle croît au Japon.

16 SPIRÉE à trois lobes. *Spiraea triloba*. Linn.

Spiraea foliis lobatis, crenatis; umbellis terminalibus. Linn. Mantiss. pag. 244. — Pall. Flor. ross. vol. 1. pag. 35. tab. 17.

Spiraea foliis subrotundis, subcordatis, obtusè lobatis, dentatis; umbellis pedunculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1059. n° 11.

Spiraea ramossissima, parvo, subrotundo, opulifolia. Amm. Ruth. 271.

Arbrisseau très-élégant, qui se divise en rameaux droits, grêles, nombreux, cylindriques, striés, avec quelques lignes anguleuses, décurren-
tes, munis d'autres rameaux beaucoup plus

courts, jaunâtres, très-liffes, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, un peu arrondies, d'une grandeur médiocre, presqu'en cœur; de couleur glauque, glabres à leurs deux faces, larges, incisées ou souvent à trois lobes irréguliers, denticulés, variables.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des jeunes rameaux, en un corymbe ombellé, pédonculé; les pédoncules partiels au moins au nombre de quatre, simples, presqu'égaux, uniflores; les calices à cinq découpures courtes, aiguës; la corolle blanche, les pétales orbiculaires, un peu écartés à leur sommet; les éamines très-nombreuses, un peu plus courtes que les pétales; cinq capsules griffâtes, coniques, ouvertes en éroiles, mucronées par le style.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Sibérie. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

17. SPIRÉE à feuilles d'obier. *Spiraea opulifolia*. Linn.

Spiraea foliis lobatis, ferratis; corymbis terminalibus. Linn. Syst. veget. pag. 391. — Willd. n. Arbr. 374. — Cætern. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 337. tab. 69. fig. 5.

Spiraea foliis ovatis, trilobis, ferratis; corymbis pedunculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 1059. n° 13.

Spiraea foliis incisè, argutatis; floribus corymbofis. Hort. Cliff. 190. — Gronov. Virg. 55. — Roy. Lugd. Bat. 277. — Mill. Dict. n° 2. — Willck. Observ. n° 37. — Duroi, Harbk. 2. pag. 436. — Wangeh. Amer. 119.

Spiraea opulifolia. Tournef. Inf. R. Herb. pag. 618. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 278. n° 5.

Evonymus virginiana, ribesii folio, capsulis elegantè bullatis. Commel. Hort. 1. p. 169. tab. 87.

Anonymus, ribesii foliis. Robert. Icon.

Spiraea (opulifolia), *fruticosa, foliis lobatis, duplicato-dentatis, crenatis; corymbis terminalibus, subumbellatis, cæternim multifloris; floribus trigynis, capsulis infatis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 293.

Quand on ne considère que le port de cette plante, on est loin de soupçonner qu'elle puisse appartenir au même genre que celles dont nous venons de parler; mais la fructification l'y réunit nécessairement. On la distingue à ses feuilles larges, à lobes irréguliers, souvent au nombre de trois; à ses fleurs disposées en corymbes terminaux, de couleur blanche, ou quelquefois marquées d'un rouge-pâle.

C'est un arbrisseau qui s'élève au moins à la hauteur de quatre ou cinq pieds, rameux, dont les

branches sont lisses, brunes, un peu rougeâtres; les jeunes rameaux courts, inégaux, anguleux, garnis de feuilles pétioles, alternes, très irrégulières, larges, quelquefois étroites, alongées, presque entières, plus ordinairement lobées, à trois lobes plus ou moins profonds, obtus, crénelés ou à double dentelure; glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles & un peu blanchâtres en dessous, réticulées & à nervures saillantes, jaunâtres; les pétioles longs de plus d'un pouce, un peu pendans.

Les fleurs sont disposées en un corymbe touffu à l'extrémité de chaque rameau, presque en ombelles; les pédoncules sont grêles, simples, flexibles, glabres, filiformes, alongés. La corolle est blanche, assez petite; les ovaires au nombre de trois ou quatre, auxquels succèdent autant de capsules ovales, renflées, aiguës à leurs deux extrémités, un peu membraneuses ou coriaces, à une seule loge, anguleuses intérieurement, à deux valves, renfermant chacune deux à trois semences ovales, glabres, luisantes, rétrécies & comprimées vers leur ombilic.

Cette plante croît naturellement au pied des montagnes, dans la Virginie, & depuis le Canada jusque dans la Caroline. On la cultive, comme plante d'ornement, dans les bosquets de pruniers. Elle fleurit au commencement du mois de mai. (V. v.)

18. *SPINÉE* à feuilles de sorbier. *Spiraea sorbifolia*. Linn.

Spiraea foliis pinnatis & foliolis uniformibus, serratis; caule fruticoso, floribus paniculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 702. — Mill. Dict. n°. 6. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 190. tab. 46. — Duroi. Hark. 2. pag. 456. — Pallas, Flor. ross. vol. 1. pag. 38. tab. 24. — Willd. Arb. 375. — Idem, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1060.

Spiraea foliis pinnatis. Amoen. Acad. vol. 2. pag. 332.

Spiraea sorbifolia, tenuiter crenata, floribus in thyrsis albis. Amm. Ruth. 186.

β. *Alpina caule suffruticoso; floribus corymbosis, duplo majoribus*. Paill. Flor. ross. vol. 1. pag. 34. tab. 25.

Espèce remarquable par ses feuilles ailées, glabres, d'un vert gai, & par ses fleurs blanches, disposées en une panicule touffue & terminale. Ses tiges sont droites, ligneuses, hautes de trois à quatre pieds, divisées en rameaux étalés, glabres, cylindriques, striés, un peu tors, de couleur brune quand ils sont vieux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, avec une impaire; amples, étalées, composées de quinze à dix-neuf folioles lancéolées, longues d'un pouce & plus, incisées &

à dentelures irrégulières, très-aiguës à leur contour, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, munies, à la base des pétioles, de petites stipules lancéolées, caduques, presque entières.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, disposées en une panicule touffue, dont les ramifications sont courtes, serrées, garnies à la base de leur principale division d'une petite bractée lancéolée, glabre, incisée. La corolle est blanche, petite; les pétales obtus; les étamines nombreuses, un peu plus longues que la corolle. Dans la variété β, les fleurs sont disposées en corymbes & une fois plus grandes.

Cette plante croît dans la Sibérie & au Kamtschatka, dans les terrains humides, marécageux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.) La variété β se rencontre sur les bords du lac Baical.

* * Tiges herbacées.

19. *SPINÉE* barbe de chèvre. *Spiraea aduncus*. Linn.

Spiraea foliis supra decompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 702. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 192. — Cantz. Austr. pag. 109. — Scop. Carn. n°. 601. — Pollich. Pal. n°. 479. — Kniph. Centur. 3. n°. 89. — Hoffm. Germ. 173. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 216. — vol. II. pag. 551. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1060. n°. 15. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 126. n°. 748.

Spiraea foliis bipinnatis, floribus hermaphroditis masculisque. Gouan, Illustr. 31.

Euipendula dioica, foliis duplicato-pinnatis, pinnis quinquefoliis, trifoliis & simplicibus. Hall. Helv. n°. 1134.

Arunceus. Hort. Cliff. 463. — Royen, Lugd. Bat. 278. — Gronov. Virg. 121.

Spiraea (aruncus), herbacea; foliis bi seu tripinnatis; floribus minutis, dioicis, trigynis, paniculatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 294.

Barba capra, floribus oblongis. C. Bauh. Pin. 163. — Tourn. Inst. R. Herb. 265.

Barba capra. Camer. Hort. 25. tab. 9.

Drymopogon 1. Tabern. Icon. 777.

Barba capri. J. Bauh. vol. 4. pag. 488. Icon. — Dalech. Hist. vol. 1. pag. 1080. Icon.

β. *Hermaphroditi foliis lucidioribus, floribus in spicis minus crebris & hermaphroditis fertilibus*. Mich. l. c.

Vulgairement barbe de chèvre.

On distingue cette espèce à ses feuilles deux & trois fois ailées, à grandes folioles ovales, & à ses fleurs paniculées, dont les ramifications sont autant d'épis grêles, allongés.

Ses tiges sont fermes, droites, herbacées, hautes de trois à quatre pieds, divisées en rameaux étalés, alternes, peu nombreux, grêles, filies, lisses, cylindriques, un peu anguleux à leur partie supérieure, garnis de feuilles alternes, pétiolées, amples, deux & trois fois ailées, composées de folioles opposées, légèrement pétiolées, assez grandes, ovales, irrégulièrement dentées en scie, vertes, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet.

Les fleurs sont terminales, quelques-unes axillaires, disposées en une belle panicule étalée, formée par un grand nombre d'épis opposés ou alternes, cylindriques, allongés, fleuris dans toute leur longueur, à la plupart munis à leur base de très-petites bractées caduques. Ces fleurs sont ordinairement dioïques, quelques-unes hermaphrodites, tant sur les individus mâles que sur les femelles, mais stériles. Cependant Michaux en a observé, à la Caroline, une variété β , à fleurs hermaphrodites & fertiles, ayant des épis bien moins nombreux & les feuilles plus luisantes. La corolle est blanche, fort petite; 15 pétales un peu arrondis; les éamines plus longues que la corolle; trois pistils, qui deviennent autant de capsules droites, acuminées.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, sur les montagnes, dans les Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne, l'Allemagne; en Amérique, dans la Virginie, la Caroline, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (V. v.)

20. SPIRÉE filipendule. *Spiraea filipendula*. Linn.

Spiraea foliis pinnatis; foliolis uniformibus; serratis; caule herbaceo, floribus corymbosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 702. — Mater. medic. 128. — Gmel. Siliv. vol. 3. pag. 191. n°. 52. — Crantz. Austr. pag. 109. n°. 3. — Scop. Carn. n°. 602. — Pollich. Pal. n°. 480. — Wedd. Flor. dan. tab. 935. — Ludw. Ed. tab. 60. — Blackw. tab. 467. — Kniph. Cent. 3. n°. 90. — Hoffm. Germ. 174. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 216. — vol. II. pag. 552. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 129. n°. 748. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1061. n°. 16. — Lam. Illustr. Gener. tab. 439. fig. 1.

Filipendula foliis pinnatis, minimis intermixtis, extremâ trilobâ. Haller. Helv. n°. 1136.

Filipendula foliis pinnatis, foliolis uniformibus. Hort. Cliff. 191. — Flor. suec. 404. 439. — Roy. Lugd. Bat. 277. — Gerard. Em. 1058. fig. 1.

Filipendula vulgaris. C. Bauh. Pin. 163. — Tournef. Inst. R. Herb. 293. — Garid. Aix, pag. 184.

Filipendula. Dodon. Pempt. pag. 56. Icon. — (Exclut synonym. J. Bauh.) — Camer. Epit. 608.

Filipendula, *anranthe multorum*. Dalech. Hist. 1. pag. 781. Icon.

Anranthe filipendula. Lobel. Icon. 719. & Observ. pag. 420. Icon.

β . *Filipendula minor*. C. Bauh. Pin. 167. & Prodr. 85. — Tournef. l. c. — Garid. 184.

Vulgairement la filipendule.

Ses racines sont composées d'un grand nombre de bulbes, d'un brun-noirâtre, de forme ovale, presque de la grosseur d'une noisette, attachées & comme suspendues à des fils très-déliés; elles poussent une tige droite, haute d'environ deux pieds, très-glabre, d'un jaune-verdâtre, simple ou peu rameuse, garnie de feuilles pétiolées, alternes, étroites, lancéolées, longues de huit à dix pouces, ailées, composées d'un très-grand nombre de petites folioles diminuant de grandeur du sommet à la base, ovales ou oblongues, glabres, vertes à leurs deux faces, incisées & dentées à leur contour, encre-n éées avec d'autres bien plus petites, extrêmement courtes. Les stipules sont ovales, incisées, amplexicaules & un peu décourantes sur la base des pétioles.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges, où elles forment une panicule assez grande, presque semblable à une ombelle. Leur calice est réstéchi, glabre, très-court; la corolle blanche, un peu odorante, d'une grandeur médiocre; les pétales lancéolés, obtus; les éamines un peu plus courtes que la corolle. Le nombre des styles varie de huit à douze.

Cette espèce se trouve dans les bois & les prés couverts de l'Europe. Elle varie quelquefois par le nombre de ses pétales. La plante β est plus petite. γ (V. v.)

Ses racines sont astringentes & nourrissantes; on s'en est servi quelquefois dans des tems de disette. Elles fournissent un amidon assez abondant, que l'on obtient en les faisant macérer dans l'eau; elles sont recommandées comme diurétiques contre les affections catarrhales des voies urinaires & les graviers. Les cochons les recherchent avec avidité, & bouleversent les terrains dans lesquels elles se trouvent.

Les fleurs donnent un lait une saveur agréable. Toute la plante peut être employée pour tanner les cuirs.

21. SPIRÉE reine des prés. *Spiraea ulmaria*. Linn.

Spiraea foliis pinnatis, subius tomentosis, impari majori, trilobis; lateralibus indivisis, corymbis profliferis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1061. n°. 17.

Spiraea foliis pinnatis, impari majore, lobato ; foribus cymosis. Linn. Spec. Plant. vol. t. pag. 702. — Flor. lappon. 201. — Hort. Cliff. 191. — Flor. suec. 425. 440. — Mater. medic. 129. — Royen, Lugd. Bat. 277. — Æder. Flor. dan. tab. 547. — Crantz. Austr. pag. 109. — Scopol. Carn. 603. — Pollich. Pal. n°. 481. — Ludw. Edt. 23. — Kniph. Centr. 1. n°. 84. — Hoffm. Germ. 174. — Roth. Germ. vol. I. pag. 216. — vol. II. pag. 553. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 126. n°. 748. — Gerard. Em. 1045. fig. 1.

Filipendula foliis pinnatis, pinnis neut serratis, minimis intermixtis, extrema trilobata, maxima. Hall. Helv. n°. 1155.

Ulmaria Clusii. Tourn. Inst. R. Herb. 265.

Ulmaria. Clus. Hist. 198. Icon. — Mem. Stirp. Pann. pag. 700. tab. 699. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 488. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 1031. Icon. Mediocris.

Barba capra, floribus compadis. C. Bauh. Pin. 164.

Regina prati. DoJon. Pempt. pag. 57. Icon.

Barba capri, & ulmaria vulgi. Lobel. Icon. 711.

Vulgairement la reine des prés.

C'est une plante charmante, une des plus distinguées parmi celles qui embellissent si agréablement le bord des ruisseaux & les prés humides, où elle brille, parmi toutes les autres, par l'élevation de ses tiges, par ses beaux corymbes de fleurs blanches, odorantes; par ses feuilles ailées, revêtues en dessous d'un duvet velouté & blanchâtre. Les Anciens, qui souvent dans leur nomenclature consultoient davantage leurs sensations que les principes de la science, l'avoient nommée la reine des prés. L'homme sensible, qui étudie les plantes dans les vastes jardins de la nature, plus encore que dans les livres, applaudit à cette heureuse dénomination.

Ses racines sont fibreuses, touffues; elles produisent une tige droite, haute de trois à quatre pieds, ferme, glabre, un peu anguleuse, rougeâtre, médiocrement rameuse, garnie de feuilles amples, alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles ovales, d'un vert-foncé en dessus, blanchâtres & veloutées en dessous, longues de deux ou trois pouces, sur un de large, irrégulièrement dentées en scie ou presque incisées à leurs bords, acuminées à leur sommet; la terminale beaucoup plus grande que les autres, & souvent partagée en trois lobes, de très-petites folioles finées entre les grandes; des stipules amplexicaules & dentées à la base des pétioles.

Les fleurs sont nombreuses, réunies à l'extrémité des tiges en une panicule ample; les rameaux longs; les ramifications courtes, serrées; les ca-

lices pubescens & réfléchis; la corolle blanche, petite; les pétales obtus; les étamines un peu plus longues que la corolle; les anthères fort petites. Aux ovaires succèdent cinq à huit capsules comprimées, un peu contournées en spirale.

Cette plante croît dans les prés humides, sur le bord des ruisseaux & des étangs, en Europe. & (V. v.)

Elle passe pour astringente, vulnérable, tonique & sudorifique. Ses fleurs sont cordiales, aromatiques: on prétend qu'elles communiquent à la bière & au vin le fumer du vin de Malvoisie. La racine est allrigente, aromatique; elle a, dit-on, réussi dans les hémorrhoides sèches, causées par la stagnation du sang dans les vaisseaux de la veine porte, lorsque ces vaisseaux manquoient de ressort. On en a encore conseillé l'usage dans la diarrhée, la dysenterie & sur la fin des fièvres malignes. On peut s'en servir, ainsi que des feuilles, pour tanner les cuirs. Toute la plante plait beaucoup aux chèvres.

22. SUREE du Kamtchatka. *Spiraea camtschatica.* Pallas.

Spiraea foliis quinque lobis, petiolis auriculatis, caule hirsuto, corymbis prostratis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1062. n°. 20.

Spiraea herbacea, foliis simpliciter palmatis, petiolis appendiculatis, caule hirsuto, floribus cymosis. Pall. Flor. ross. vol. 1. pag. 41. tab. 18.

Spiraea foliis multifidis, angularis; fructibus erectis, hispida; petiolis appendiculatis. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 192.

Ulmaria frutibus hispida. Kraschenin, Kamtsch. vol. 1. pag. 202.

On distingue cette espèce à ses grandes feuilles, aux appendices foliacés, arrondis, qui garnissent la partie supérieure des pétioles; à ses tiges velues & à ses fleurs en cime, souvent prolifères.

Ses racines sont épaisses, noirâtres en dehors, blanches en dedans, d'où s'élèvent deux ou trois tiges hautes de cinq à six pieds, de l'épaisseur du doigt à leur base, profondément cannelées, velues, herbacées. Les feuilles radicales sont très-amples, souvent d'un pied de large, sur huit pouces de long, divisées en cinq lobes aigus, à double dentelure, munies en dessous de poils blanchâtres; les pétioles garnis vers leur sommet de quelques stipules fort petites; les feuilles caulinaires souvent à trois lobes, plus petites; les supérieures hastées ou lancéolées, ayant à la base de leur pétiole des stipules lancéolées ou à demi en cœur, dentées à leur contour.

Les fleurs sont odorantes, disposées en une très-belle cime rameuse. Leur calice est velu, à cinq

découpures réfléchies; la corolle blanche, un peu plus grande que celle du *spiraea ulmaria*; les pétales ovales; les érimines de dix à vingt; quatre à six ovaires velus; le style presque en tête, plus court que les étamines; les capsules droites, parallèles, hispides, à deux semences.

Cette plante croît au Kamtcharka, dans les prés humides, sur la bord des sources, des ruisseaux, parmi les saules. Elle fleurit au mois de juillet.

Toute la plante est astringente. Les naturels du pays en mangent les jeunes pousses crues. Ils recueillent les racines pour l'hiver, qu'ils apprennent avec des œufs de poisson. Les feuilles sont employées comme celles de plantes potagères.

23. SPIRÉE palmée. *Spiraea palmata*. Thunb.

Spiraea foliis palmatis, serratis; panicula supra decomposita. Thunb. Flor. jap. pag. 212. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1062. n.º 21.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le *spiraea opulifolia*; elle en diffère par ses riges herbacées, par ses feuilles palmées, à cinq ou sept lobes, à dentelures très-aiguës; par ses panicules plus amples, plus courtes.

Ses tiges sont herbacées, glabres, droites, striées, garnies de feuilles alternes, pétioles, presque palmées ou découpées en cinq ou sept lobes, glabres à leurs deux faces, plus pâles en dessous, veinées, réticulées, élargies, longues de trois pouces; les lobes oblongs, dentés en scie à leurs bords; les dents inégales, très-aiguës, acuminées à leur sommet; les pétioles brisés, quatre fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en une panicule ample, composée; elle varie quelquefois à fleurs rouges, qui ne contiennent que quatre styles au lieu de trois.

Cette plante croît au Japon, où elle a été découverte par Thunberg. (Descript. ex Thunb.)

24. SPIRÉE digitée. *Spiraea digitata*. Willd.

Spiraea foliis pinnatis, subtus tomentosis, imparimajore septemloba, lateralibus quinque locis; carymbo ramoso, corymbato. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1061. n.º 18.

Spiraea (palmata), herbacea, foliis pinnatis, impari-palmato, multifido; floribus cymosis. Pall. Flor. ross. vol. 1. pag. 40. tab. 27. — Idem, Itin. vol. 3. Append. 735. n.º 95. tab. O. fig. 1.

Spiraea folio impari majore, multifido. Gmel. Sibib. vol. 3. pag. 192.

Ulmaria foliis profunde laciniatis. Amm. Ruth.

74.

Il existe de grands rapports entre cette espèce

& le *spiraea lobata*; elle en diffère par ses feuilles tomenteuses en dessous, dont les découpures sont plus acuminées, & par ses fleurs blanches, disposées en un corymbe serré & rameux.

Ses racines sont à peine odorantes; ses tiges droites, cylindriques, glabres, striées, hautes de deux à trois pieds, garnies de feuilles alternes, pétioles, ailées; les radicales longuement pétioles, avec quelques stipules en forme d'aile; divisées à leur foliole supérieure, terminale & très-grande; en sept ou neuf lobes presque lancéolés, aigus, à double dentelure; les deux latéraux plus étroits; deux autres folioles inférieures plus pétiolées, opposées, feilées, moins divisées, blanchâtres & tomenteuses en dessous; les feuilles caulinares plus ordinairement palmées, point ailées.

Les fleurs sont odorantes, disposées en corymbe ou en cime, un peu serrées, nombreuses, plus petites que celles du *spiraea ulmaria*, un peu rougeâtres avant leur épanouissement; leur calice glabre, ainsi que les pédoncules, divisé en cinq découpures concaves, élargies; les pétales un peu étroits; environ vingt étamines plus longues que les pétales; les anthères rougeâtres; de cinq à sept ovaires velus; le style épais, terminé en tête; les capsules droites, étroites, médiocrement pédunculées, hérissées de poils blanchâtres, acuminées par le style persistant.

Cette plante croît dans la Sibérie, la Russie, sur les montagnes sous-alpines. (V. f. in herb. Jussieu.)

25. SPIRÉE lobée. *Spiraea lobata*. Linn.

Spiraea foliis pinnatis, glabris, impari majore, septemloba, lateralibus trilobis, carymbris proliferis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1062. n.º 19.

• *Spiraea lobata*. Murr. Syll. veget. edit. 4. p. 472. — Jacq. Hort. t. pag. 38. tab. 88.

Spiraea (lobata), herbacea, foliis pinnatis, pinnis lateralibus imparique maximo subpalmato-lobatis; lobis lanceolatis, duplicato-serratis; cyma composita; floribus roseis, 3-5-gynis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 294.

Spiraea (palmata), foliis pinnatis, impari lateralibusque lobatis, biserratis; floribus cymosis. Linn. f. Suppl. 262.

Spiraea (palmata), foliis pinnato-ternatis; foliolo impari quinquelobo, palmato. Syll. veget. edit. 13. pag. 393.

Cette plante a le port du *spiraea ulmaria*; elle lui ressemble beaucoup par ses feuilles, mais ses fleurs sont rouges, toute la plante inodore, excepté dans ses racines; elle se rapproche encore beaucoup du *spiraea digitata*, mais ses feuilles ne four point tomenteuses à leur face inférieure.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de deux à trois pieds & plus, glabres, anguleuses, peu rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, glabres à leurs deux faces ; les folioles des feuilles inférieures amples ; la foliole terminale beaucoup plus grande, divisée en sept lobes ; les deux latérales à trois lobes, dentées en scie inégalement à leur contour. Les feuilles caulinaires supérieures plus petites, presque simples, à trois ou cinq lobes. Les fleurs sont rouges, nombreuses, disposées en cime ou en corymbes prolifères ; les capsules droites, point torse, au nombre de trois ou cinq.

Cette plante croît dans la Virginie & dans les contrées septentrionales de la Caroline. ♀ (V. f.)

26. SPIRÉE trifoliée. *Spiraea trifoliata*. Linn.

Spiraea foliis ternatis, serratis, subsqualibus ; floribus subpaniculatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 762. — Mill. Dict. n°. 7. & Icon. tab. 256. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1063. n°. 22.

Filipendula foliis ternatis. Hort. Cliff. 191. — Hort. Upf. 131. — Roy. Lugd. Bat. 277. — Gronov. Virg. 55.

Ulmaria major, trifolia ; flore amplo, pentapetalo, virginiana. Pluk. Almag. pag. 393. tab. 236. fig. 5. — Rai, Suppl. 330.

Ulmaria virginiana, trifolia, floribus candidis, amplis, longis & acatis. Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 323.

Spiraea (trifoliata), herbacea, foliis trifoliatis, foliolis lanceolatis ; floribus laxè subpaniculatis, pentagynis ; calice tubuloso-campanulato. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 294.

Gillenia trifoliata. Mœnch, Meth. Plant. Suppl. pag. 286.

Des caractères particuliers à cette espèce, & qui l'éloignent des *spiraea*, ont déterminé Mœnch à en faire un genre particulier, dont le caractère essentiel consiste dans un calice campanulé, serré à son orifice, divisé à son limbe en cinq découpures égales, lancéolées, aiguës ; une corolle à cinq pétales linéaires-lancéolées ; des étamines nombreuses, insérées sur le calice ; cinq ovaires, cinq styles, autant de stigmates ; une capsule à cinq loges ; plusieurs semences dans chaque loge. Il suit de cet exposé, que cette plante diffère essentiellement des *spiraea* par son calice campanulé, un peu tubulé, & non pas plane, ouvert ; par ses capsules divisées en cinq loges, & non à une seule loge.

Ses racines sont vivaces, fibreuses ; ses tiges herbacées, annuelles, hautes au moins d'un pied, glabres, rougeâtres, divisées en rameaux alternes, étalés, garnis de feuilles alternes, pétiolées,

teintées ; les folioles lancéolées, pétiolées, longues de deux pouces environ, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, vertes en dessus, plus pâles en dessous, dentées en scie à leur contour ; les dents inégales, très-aiguës ; les nervures simples, latérales, obliques.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une panicule lâche, dont les divisions sont glabres, médiocrement ramifiées, étalées, peu nombreuses, munies de quelques petites bractées sécables. Le calice est glabre, verdâtre, campanulé ; la corolle blanche, les pétales longs d'un pouce, étroits, linéaires, obtus ; les étamines plus courtes que la corolle ; cinq styles, auxquels succède une capsule à cinq loges.

Cette plante se rencontre dans la Virginie, le Canada, la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

SPLANC. *Splachnum*. Genre de plantes acotylédones, cryptogames, de la famille des mousses, qui a des rapports avec les polytriches, qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont hermaphrodites, terminales ; les tiges simples, minuscules ; les feuilles petites, alternes ou presque opposées.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Une capsule terminale, cylindrique ou presque ovale, placée sur une apophyse en cône renversé ou en parafole, concave ; le périgone simple, à huit dents.

Observations. Ce genre est un des plus remarquables parmi ceux qui composent les mousses. Il offre de petites plantes à tiges simples, ou quelquefois divisées à leur base, droites, garnies à leur partie inférieure de feuilles fort petites, épaisses. La fructification termine les tiges : son ensemble présente fort souvent la forme d'une petite bouteille. Elle consiste en une petite urne droite, terminale, cylindrique ou ovale, dont l'ouverture ou le périgone est divisé à ses bords en huit petites dents marquées d'un sillon longitudinal, ou en huit paires de dents. La coiffe est fort petite, caduque, se fend latéralement ou se divise à la base en plusieurs lanières. L'urne ou capsule est située sur une sorte de réceptacle ou apophyse considérablement renflée, qui offre la forme d'une cloche, d'un parafole ou d'un cône renversé, & qui prend souvent l'aspect d'une petite bouteille. Ces fleurs ont été reconnues pour hermaphrodites, d'après les observations modernes ; Linné les regardoit comme dioïques : il est vrai qu'il en existe de stériles & de fertiles. Les premières offrent la forme d'un disque ; les secondes sont allongées, & telles que nous les avons décrites plus haut. Les espèces dont ce genre est

composé, ne se rencontrent guère que dans les terrains tourbeux des montagnes.

E S P È C E S.

1. **SPLANCH vésiculeux.** *Splachnum ampullaceum*. Linn.

Splachnum umbraculo ampullaceo, obconico. Linn. Spec. Plant. pag. 1572. — Amoen. Acad. vol. 2. pag. 280. — Flor. Suec. 2. n° 965. — Scop. Carn. edit. 2. n° 1288. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 42. n° 1263. — Hedw. Mufc. 5. 2. pag. 41. fig. 14. — Idem, Fund. 2. pag. 88. tab. 7. fig. 33, 34. — Brid. Mufc. 2. pag. 109.

Bryum foliis ovato-lanceolatis; capsulâ pyriformi, terminatâ cylindro. Hall. Helv. n° 1830.

Splachnum furculo capitulo; foliis lanceolatis, nitidis; appendice capitulorum turbinate. Neck. Meth. pag. 125.

Splachnum truncu erecto, simplici divisoque; apophyse inversè ampulliformi colloque longè virente. Hedw. Mufc. pag. 55.

Splachnum foliis linearilanceolatis, nervo carinatis, acuminatissimis. Zeyl. Flor. island.

Bryum ampullaceum, foliis thymi pellucidis, collo fruticore. Dilleu. Mufc. 345. tab. 44. fig. 3.

Mufcus capillaceus, minor, capitulis geminatis. Tourn. Inst. R. Herb. 552. — Vaill. Paris. pag. 130. tab. 26. fig. 4.

Mufcus aureus, capillaris, minor; capitulis geminatis, erectis, mutuo incubitu adnatis. Pluk. Almag. 246. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 629. 5. 15. tab. 16. fig. 10.

Cette plante forme de petits gazons assez agréables, d'un vert-foncé. Ses tiges sont droites, ordinairement simples ou divisées en deux ou trois autres dès leur base, longues d'un à deux pouces, garnies de feuilles éparées, ovales-lancéolées, glabres, entières, un peu aiguës, médiocrement distantes; celles du sommet un peu plus étroites, plus aiguës, plus rapprochées.

Les pédoncules sont simples, terminaux, filiformes, droits, rougeâtres, longs d'environ un pouce; ils soutiennent une urne ou capsule droite, glabre, cylindrique, de la forme d'un petit tube, d'un jaune-doré lorsqu'elle est mûre, placée sur un renflement d'un jaune-verdâtre ou de couleur purpurine, vuide, & qui représente la forme d'une petite bouteille. L'orifice de la capsule est garni de huit petites dents réfléchies en dehors après la chute de l'opercule. Celui-ci est convexe, d'un jaune-orangé; la coiffe campanulée, déchiquetée à ses bords. Elle fleurit dans le courant de l'été.

Cette plante croît dans les marais tourbeux,

aux environs de Pais, à Saint-Léger, dans la forêt de Villers-Cotterêts, & dans plusieurs autres contrées de l'Europe. x (V. v.)

2. **SPLANCH vasculaire.** *Splachnum vasculosum*. Linn.

Splachnum umbraculo ampullaceo, subglobofo. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 455. — Amoenit. Acad. vol. 2. p. 281. — Wedd. Flor. dan. tab. 192. — Hedw. Crypt. vol. 2. pag. 44. tab. 15. — Brid. 2. pag. 110.

Splachnum foliis ovatis, nervo carinatis, apice obtusifusculo. Zœg. Flor. island.

Splachnum foliis spatulatis, integris, obtusifusculis; apophyse subglobofa, sanguineâ. Hedw. Mufc. pag. 53.

Mufcus capillaceus, capitulis pyriformibus, tubulosis. Buxb. Cent. 2. pag. 1. tab. 1. fig. 1.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *splachnum ampullaceum*, mais le réceptacle ou apophyse de ses capsules est plus court, plus gros, presque globuleux & de couleur rouge.

Ses tiges sont droites, simples; ses feuilles éparées, alternes, très-glabres, entières à leurs bords, vertes, ovales, presque obtuses, ou bien moins aiguës à leur sommet, traversées par une nervure presque relevée en carène. Les capsules font terminales, cylindriques, supportées par un pédoncule sétacé, rougeâtre.

Cette mousse croît dans les contrées septentrionales de la Suède, dans les marais tourbeux.

3. **SPLANCH en bouteille.** *Splachnum brewerianum*.

Splachnum foliis lanceolatis, integerrimis; floribus sexu distinctis. Hedw. Mufc. pag. 53. — Idem, St.-Cr. 2. pag. 105. tab. 38. — Brid. Mufc. 2. pag. 114.

Splachnum (breweri), foliis lanceolatis, integerrimis. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1325. n° 8.

Bryum ampullaceum, foliis & ampullis brevioribus. Dillen. Mufc. pag. 345. tab. 44. fig. 5.

Elle a des rapports avec le *splachnum ampullaceum*. Ses tiges sont simples, glabres; ses feuilles simples, lancéolées, concaves, très-entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet; le pédoncule d'une longueur médiocre, muni à son sommet d'une apophyse oblongue, renflée, & qui prend la forme d'une petite bouteille.

Cette plante croît en Angleterre, parmi les bruyères.

4. **SPLANCH ovale.** *Splachnum ovatum*. Hedw. *Splachnum*

Splachnum truncu erecto, simplici; foliis spatulatis, apiculatis; sporangii erecti ovati, apophysi obovati, operculo obuso. Hedw. Mulf. p. 54. tab. 8. fig. 4, 5, 6.

Splachnum truncu erecto, minutissimo; foliis ovato-lanceolatis, acutiusculis; capsula ovata erecta, apophysi obovata; operculo obuso. Bridel. Mulf. vol. 2. pag. 105.

Splachnum (ovatum), acaule, foliis lanceolato-ovatis, acutis; receptaculo obovato. Dicki. Fasc. 2. pag. 2.

Bryum ampullaceum, foliis serpylli pellucidis. Dillen. Hist. Mulf. pag. 344. fig. 4.

Ses racines sont composées de petites fibres brunes, courtes, rameuses, fasciculées : il s'en élève une petite tige, simple, verte, droite, garnie de feuillets imbriqués, presque en cœur ou spatulés, très-glabres, entières à leurs bords, terminées en pointe à leur sommet.

Le pédoncule est terminal, de couleur verte à sa partie inférieure, d'un jaune de safran à son milieu, enfin vert ou d'un brun-rougeâtre vers l'apophyse ; il soutient une capsule droite, ovale, de couleur brune, surmontée d'un opercule convexe, tirant sur la couleur de safran, un peu mamelonné. L'apophyse est verte, ovale, un peu plus grande que la capsule qu'elle supporte.

Cette mousse croît dans les pâturages humides des hautes montagnes, en Ecosse, & dans les contrées septentrionales de l'Angleterre. 4

5. SPLANCH jaunâtre. *Splachnum luteum.* Linn.

Splachnum umbraculo orbiculari, plano. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 454. — Amoenit. Acad. vol. 2. pag. 277. tab. 3. fig. 1. — Flor. suec. edit. 2. n°. 964. — Hedw. Crypt. vol. 2. pag. 43. tab. 17.

Splachnum (luteum), truncu simplici, erecto; foliis sparsis, obversis ovatis; perigonalibus integerrimis; apophysi umbraculiformi, planiusculâ, luteâ. Hedw. Mulf. pag. 56.

On distingue cette espèce à l'apophyse qui soutient les urnes, & qu'elle élargi en forme de parasol, presque campanulé.

Ses tiges sont droites, très simples, glabres, à peine longues d'un pouce, garnies jusque vers leur milieu de feuilles alternes, presque imbriquées ou éparées, ovales, très-entières à leurs bords, glabres, luisantes, d'un vert-gai, obtuses à leur sommet, avec une petite pointe courte, un peu relevées en carène; celles du bas beaucoup plus petites. Le pédoncule est terminal, long de deux ou trois pouces & plus, d'un pourpre-doré, verdâtre à sa partie supérieure ; les capsules d'un brun-rougeâtre, cylindriques, denticulées à leur orifice, recouvertes d'un opercule fort petit, hémisphérique, d'un brun-noirâtre. L'apophyse est d'abord ovale, globuleux & verdâtre, adhérent par ses bords au pédoncule ; il s'en détache peu à peu, s'élargit, s'aplatit, & prend la forme d'un parasol d'une couleur jaunâtre.

Botanique. Tome VII.

Cette plante croît dans les marais tourbeux de la Norvège, de la Russie, en Sibérie, &c.

6. SPLANCH rouge. *Splachnum rubrum.* Linn.

Splachnum umbraculo orbiculari, hemisphærico. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 454. — Amoenit. Acad. vol. 2. pag. 272. tab. 3. fig. 2. — Flor. suec. edit. 2. n°. 963. — Crypt. vol. 2. pag. 2. tab. 18.

Splachnum furculo simplicissimo; appendice capitulorum orbiculato, hemisphærico. Neck. Meth. 125.

Splachnum (rubrum), truncu simplici, erecto; foliis sparsis, ovatis, concavis; perigonalibus denticulatis; apophysi membraculiformis, convexâ, rubrâ. Hedw. St.-Cr. 2. pag. 51. tab. 18. — Mulf. pag. 56.

Musci norvegicus, umbraculo ruberrimo insignitus. Petiv. Mulf. 70. tab. 1. fig. 10. — Dillen. Mulf. 547. tab. 83. fig. 9.

Musci coronatus, norvegicus, pediculo longissimo, umbraculo amplo. Moril. Oxon. Hist. 3. pag. 630. §. 15. tab. 7. fig. 10.

Lichen, capillaceo folio; elatior; pelvi ruberrimâ.

Cette mousse se distingue du *splachnum luteum*, par la forme de son apophyse ou renflement, qui reste constamment moisi ouvert en parasol, ayant la forme d'une cloche, & d'ailleurs d'une belle couleur rouge.

Ses racines sont composées de fibres droites, courtes, très-fines, fasciculées, presque simples ; il s'en élève une tige simple, longue à peine d'un demi-pouce, terminée par un très-long pédoncule de deux à quatre pouces. Les feuilles sont presque imbriquées, un peu lâches, ovales, presque obtuses, entières, glabres, transparentes, semblables à celles du *splachnum luteum*. Le pédoncule est droit, filiforme, très simple, un peu rougeâtre. Il supporte une urne cylindrique, denticulée à ses bords, très-glabre, appuyée sur un renflement concave, d'un rouge-vif, en forme de cloche, ou semblable à une moitié de sphère.

Cette plante croît aux lieux humides, marécageux, dans la Suède, la Norvège, la Russie, la Sibérie, &c.

7. SPLANCH sphérique. *Splachnum sphericum.* Linn.

Splachnum receptaculo globofo. Linn. Syst. veget. pag. 945. — Linn. l. Cliff. Meth. Mulf. tab. 5. fig. 1.

Zz

Splachnum foliis spatulato-acuminatis; apophysi globos. Hedw. St.-Cr. 2. pag. 46. tab. 16. — Mufc. 2. pag. 171.

Splachnum viride. Villars, Plant. du Dauph. vol. 4. pag. 361. tab. 56.

Cette mouffe croît en gazon ferrés; elle a des tiges droites, glabres, peu élevées, garnies de feuilles éparfes, allongées, lancéolées, glabres, entières à leurs bords, traversées par une nervure qui fe termine au sommet des feuilles par une petite pointe roide; les unes font terminales, folitaires; leur pédoncule eft droit, filiforme, à peine long d'un demi-pouce, rougeâtre à fa bafe. Il fupporte une petite capsule droite, glabre, cylindrique, rougeâtre; l'orifice garni de dents réfléchies en dehors; l'opercule conique, de couleur rouge; l'apophyse fphérique, de couleur verte, auffi long que la capsule. Les individus ftériles font plus longs que les fertiles; ils fe terminent par un difque composé de trois ou cinq petites feuilles en rofette, plus larges à leur bafe.

Cette plante croît en Europe, dans les départements méridionaux de la France, parmi les marais tourbeux des montagnes. ♀

8. SPLANG de Fernel. *Splachnum fralichianum.* Hedw.

Splachnum receptaculo pyriforini, capsulis sub-spharicis, pendulis. (N.)

Splachnum fralichianum, trunci simplici subdivifogue per innovationes, foliis inferioribus lingniformibus; superioribus spatulatis, obtusis; apophysi obliqua, inverti conic. Hedw. St.-Cr. 2. pag. 99. tab. 40. — Brid. Mufc. 2. pag. 105. — Schleich. Crypt. Exf. Cent. 3. n°. 7. — Decand. Flor. fr. vol. 2. pag. 451.

Bryum foliis ovato-lanceolatis; capsula pyriforini, breviffime papillata. Hall. Helv. n°. 1831.

Ses tiges font fimples, quelquefois divifées à leur bafe, droites, glabres, longues d'un à deux pouces, garnies de feuilles oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, prefque poudrées par un réseau fin, vifible à la loupe; les feuilles inférieures un peu aiguës à leur sommet; les fupérieures obtufes, un peu rétrécies en fpatule à leur bafe.

Les pédoncules font droits, terminaux, glabres, d'environ un pouce de long, jaunes ou un peu rougeâtres, foutenant une capsule d'un rouge-brun, un peu fphérique, légèrement inclinée dans fa jeunesse, tout-à-fait pendante lorfqu'elle eft mûre. Elle eft appuyée fur une apophyse en forme de poire ou de cône allongé & renverfé.

Cette plante croît fur les montagnes alpines, dans les fentes des rochers. ♀

9. SPLANG menu. *Splachnum tenue.* Dickf.

Splachnum caulefcens, foliis ovato-oblongis, acutis; receptaculo obconico, attenuato. Dickf. Crypt. brit. Fa/c. 2. pag. 2. tab. 4. fig. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 452.

Splachnum attenuatum. Brid. Mufc. 2. pag. 107.

Sa tige eft droite, un peu ramifiée ou divifée à fa bafe, longue d'environ un pouce & demi, garnie de feuilles lâches, ovales, oblongues, glabres, entières à leurs bords, un peu aiguës, mais point fcitacées à leur sommet. Leur pédoncule eft terminal, long d'un pouce & plus, glabre, filiforme, d'une couleur pâle-orangée, termine par une capsule ovale & non fphérique, appuyée fur un réceptacle menu, en forme de cône renverfé.

Cette plante croît fur les montagnes alpines. Elle eft peu différente du *Splachnum fralichianum*; elle n'en diffère que par la forme de fa capsule ovale, & par fes feuilles terminées par une petite pointe.

10. SPLANG denticulé. *Splachnum ferratum.* Hedw.

Splachnum foliis apice ferratis, receptaculo obverfè conico, capsulis ovato-cylindricis. (N.)

Splachnum (ferratum), simplex, foliis lanceolatis, extremitate ferrulatis; sporangio cylindrico, apophysi contracta. Hedw. Spec. 53. tab. 8. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 452.

Splachnum helveticum. Schleich. Crypt. Exf. 2. n°. 9. — Decand. l. c.

« C'est, dit M. Decandolle, d'après des échantillons communiqués par MM. Hedwig & Schleicher, que je réunis les deux synonymes ciues plus haut. »

Cette plante a des tiges fimples, droites, longues d'environ un demi-pouce, garnies de feuilles lancéolées, dentées en fcie vers leur sommet, & dont la nervure fe prolonge en une pointe acérée. Les pédoncules font droits, longs d'un pouce, d'un rouge-mordoré très-vif; les capsules droites, d'un brun-rouge à leur maturité, ovale-cylindriques, pofées fur une apophyse en cône renverfé, prefqu'auffi épaffe que la capsule elle-même; l'orifice ou peristome garni de dents de la même couleur que la capsule elle-même, & qui fe déjetent en dehors au point d'être appliquées fur le côté extérieur de l'urne.

Cette plante fe rencontre dans les Alpes voifines de la Suiffe, aux environs des Chalets, & dans les lieux gras & ombragés. (Decand.)

11. SPLANG rétrécé. *Splachnum angustatum.* Linn. f.

Splachnum caulefcens, foliis piliferis, pedunculo breviffimo. Linn. f. Mith. Mufc. pag. 33.

Splachnum (angulatum), cretsum, foliis variis, frangio canoides, ex apophysi gibbula cernuo. Hedw. St.-Cr. 2. pag. 37. tab. 12. — Idem, Musc. p. 51. — Brid. vol. 2. pag. 108.

Ses tiges sont simples, droites, longues d'environ un pouce ; elles sont garnies de feuilles un peu variables surtout à leurs bords, oblongues, lancéolées, alternes, très-glabres, verdâtres, terminées par un poil à leur sommet. Le pédoncule est très-court, terminal, droit, soutenant une capsule presque conique, appuyée sur une apophyse renflée en bosse & inclinée.

Cette espèce se rencontre aux lieux humides, dans la Laponnie.

12. SPLANCHUCOLÉ. *Splachnum urceolatum*. Hedw.

Splachnum truncatella, simpliciter divisoque, bifloro; foliis cochleariformibus, imbricatis, apiculatis; apophysi tumidiusculâ, obconicâ, viridante. Hedw. St.-Cr. 2. pag. 39. tab. 13. — Brid. 2. pag. 106. — Hedw. Musc. pag. 52.

Splachnum urceolatum. Dav. Crantz. Hist. groenl. vol. 3. pag. 284.

Splachnum (bryoides), foliis ovatis, nervo carinatis, sessilibus. Zoeg. Isländ. pag. 239.

Ses tiges sont droites, simples, quelquefois divi- & terminées par deux fleurs ; les feuilles imbriquées, concaves, ovales, relevées en carène sur leur dos, terminées par une petite pointe sétacée. Le pédoncule est d'une médiocre longueur, soutenant une capsule ovale dans sa jeunesse, qui devient cylindrique en vieillissant, surmontée d'un opercule conique, appuyée sur une apophyse renflée.

Cette mouffe se rencontre dans le Groënland & dans l'Islande.

13. SPLANCHUCÉ. *Splachnum setaceum*. Mich.

Splachnum caulis tomento radicali confertum coherentibus; foliis lanceolatis, sensim setaceo-acuminatis, serratis; radiculo non exserto, apophysi clavato-turbinatâ. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 288.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *splachnum angulatum* : peut-être même n'en est-elle qu'une variété. Ses tiges sont presque fasciculées, très-gêlées, hautes d'un à deux pouces, feuillées dans toute leur longueur, tellement que la partie supérieure qui constitue le pédoncule, est très-courte, à peine de la longueur des feuilles supérieures. A la base des tiges existe un duvet tomenteux qui les réunit en touffe. Les feuilles sont petites, lancéolées, très-finement denticulées en scie à leur contour, insensiblement rétrécies vers leur sommet en une pointe fine, sétacée. L'apophyse ou le réceptacle de la fleur est renflée

en poire ou en massue ; l'ouverture de la capsule divisée en huit dents jaunâtres, chaque dent légèrement bifide, la corbe conique, allongée, d'un blanc-pâle, surmontée d'une pointe capillaire, rouffâtre.

Cette plante croît dans les marais, au Canada.

* *Splachnum* (longisetum), foliis ovatis, cuspidatis; umbellula subglobosa. Schtanch, Flor. bavar. 2. pag. 441.

SPONGIEUSE (Tige). *Inanis caulis*. On appelle tige spongieuse celle dont l'axe central est rempli de moelle, comme les tiges d'un grand nombre de fouchets, *cyperus palustris*, &c.

SPRENGELIA. Voyez POIRETTA.

SQUAMULES. *Squamula*. Ce sont de petites écailles qu'on trouve souvent à l'orifice de la corolle, surtout dans les botraginées.

STAARIA. *Staavia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs agrégées, de la famille des netpruns, qui a des rapports avec les *brunia* & les *phylica*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont épaisses, fort petites ; les fleurs, réunies en têtes terminales, offrant l'aspect de fleurs radiées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs agrégées ; un calice commun, grand, coloré, en forme d'involucre ; cinq étamines insérées sur le calice ; deux styles adhérents entr'eux ; une baie à cinq semences ; un réceptacle garni de poils presque en paillettes.

Observations. Linné avoit d'abord réuni aux *phylica* la plante qu'il a ensuite nommée *brunia radiata*. Il a été reconnu depuis qu'elle ne pouvoit appartenir rigoureusement ni à l'un ni à l'autre genre : on en a, en conséquence, formé un genre particulier sous le nom de *staavia*, établi par Dahl, *Observ. bot.*, confirmé par Schreber, *Gener. Plant.* ; adopté par Willdenow, Persoon, &c. En effet, cette plante, déjà décrite dans cet ouvrage, vol. 1, pag. 475 (BRUNIE radiée), diffère des *brunia* & des *phylica* par ses fleurs en tête, mais dont le calice commun est grand, coloré, & forme une sorte d'involucre, & donne à ces fleurs l'aspect des fleurs radiées. Les étamines sont insérées sur le calice, & non sur les onglets des pétales. Il y a deux styles adhérents. Le fruit, au lieu d'être capsulaire, est une baie qui contient cinq semences couvertes d'une écorce coriace. Le réceptacle est garni de poils qui ressemblent à de petites paillettes. (Voyez, pour les autres détails, l'article BRUNIE radiée.)

Il faut rapporter également au *staavia* le *brunia glutinosa* Linn. — *Brunia foliis linearibus, triquetris* ;

ramulis glabris, calice radiante, foliis linearibus lanceolatis, trigonis, patis; radio calicis colorato, capitulo breviter. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 246. — Thunb. Prodr. pag. 41. — Pluk. Mantiss. pag. 149. tab. 331. fig. 1.?

Quoique très - ressemblante à la première espèce, cette plante paroit néanmoins devoir en être séparée, ayant les feuilles & les bractées plus longues; les feuilles linéaires, trigones; ses tiges aux glabres, & les têtes des fleurs glabres. Elle croit au Cap de Bonne-Espérance. h

STACHIDE. *Stachys*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des labiées, qui a des rapports avec les béraines & les ballotes. Il renferme des plantes la plupart indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont axillaires, verticillées, en épis; les feuilles opposées, entières.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq dents aiguës; le tube de la corolle court; le limbe à deux lèvres, la supérieure concave, l'inférieure à trois lobes, les deux latérales réfléchies; quatre étamines, les deux extérieures rejetées sur les côtés de la corolle après la fécondation.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, anguleux, persistant, à demi-divisé en cinq dents subulées, acuminées, presque égales.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, labiée; le tube court; la lèvre supérieure droite, presque ovale, concave, souvent échancrée; l'inférieure plus grande, à trois lobes, les deux latérales réfléchies en dehors; celui du milieu plus grand, quelquefois échancré.

3°. Quatre étamines didynames; deux filaments plus courts, subulés, rejetés sur les côtés de la corolle après la fécondation; les anthères simples.

4°. Un ovaire à quatre lobes; un style filiforme; de la longueur des étamines, surmonté d'un stigmate bifide, aigu.

Les semences sont nues, ovales, anguleuses, au nombre de quatre dans le fond du calice.

Observations. Si l'on excepte les quatre ou cinq premières espèces de ce genre, les autres qu'on y a réunies en diffèrent totalement par le port; elles ne s'y rapportent même que faiblement par leurs caractères généraux; elles méritent avec les *beronica*, les *phaleris*, les *glechoma*, les *galopsis*, &c.

Linné est lui-même resté en doute du genre dans lequel il les placeroit; & après les avoir rangées parmi ces différents genres, il les a enfin ramenées dans les *stachys*.

Les caractères qui constituent les *stachys* se retrouvent en partie dans les autres genres; ils sont d'ailleurs si faibles, que plusieurs semblent pouvoir être négligés sans inconvénient; ce n'est cependant que par leur réunion qu'ils concourent à la formation de ce genre si peu naturel. Dans ce cas, plus de la moitié des espèces devoient en être exclues; mais en les faisant rentrer dans d'autres genres déjà établis, on y trouve les mêmes difficultés; elles y conviennent encore moins. Etablir pour elles de nouveaux genres, c'est les multiplier, & peut-être ajouter de nouvelles difficultés aux premières; les caractères se trouvent alors plus faibles, tant il est difficile de les circoncrire d'une manière bien tranchante. Celui qui convient plus particulièrement aux *stachys*, est d'avoir les divisions latérales de la lèvre inférieure de la corolle réfléchies en arrière ou sur les côtés; celui qui vient ensuite est commun à plusieurs autres genres: il consiste dans les deux étamines extérieures, rejetées sur les côtés de la corolle après la fécondation. Enfin, le calice à cinq dents aiguës forme une grande division dans la famille des labiées. Tel est l'état de cette belle & grande famille si naturelle, que l'établissement des genres actuellement existans exigeroit une réforme générale, très-difficile sans doute, & qu'on ne pourroit guère rendre naturelle qu'autant qu'on y feroit entrer en considération les autres parties de la plante, outre celles de la fructification.

En jetant un coup d'œil sur l'ensemble des espèces qui constituent les *stachys*, & les considérant par leur port, nous trouvons qu'ils peuvent former au moins trois groupes assez bien séparés; le premier réuniroit les espèces à odeur fétide, à tiges droites; les rameaux étalés, hérissés de poils plus ou moins toides; les feuilles larges, ovales ou lancéolées, médiocrement velues, de couleur verte, peu épaisses, telles que le *stachys silvatica-pulchra-circinnata-alpina*, &c. Le second renferméroit les espèces chargées sur toutes leurs parties d'un duvet tomenteux, très épais, soyeux, blanchâtre; les feuilles molles, épaisses, &c. *Stachys germanica-lanata*, &c. Un grand nombre de *stachys* ont le même port. Enfin, le troisième groupe contiendrait les espèces à feuilles étroites, dilanées, glabres ou à peine velues, à tiges grêles ou médiocrement rameuses, &c. *stachys thymifera-annua*, &c. Viennent enfin d'autres espèces avec lesquelles les précédentes n'ont presque plus d'autres rapports que ceux qui appartiennent aux caractères génériques: telles sont le *stachys glutinosa-synopa*, dont l'extrémité des rameaux est épineuse; le *stachys artemisia*, à feuilles incisées ou pinnatifides, &c.

Les fleurs sont disposées par verticilles axillaires, terminaux. Les feuilles qui les accompagnent, sont ou semblables à celles des tiges, mais graduellement plus petites; ou bien elles en diffèrent, & sont souvent si courtes, qu'elles deviennent des bractées pour plusieurs botanistes. Mais dans d'autres espèces, outre ces feuilles florales, on y distingue encore plusieurs autres petites folioles étroites, linéaires ou sétacées, qui enlourissent les verticilles, en forme d'involucre, tels que le *Stachys germanica*, *latana*, *alpina*, &c. La plupart des autres espèces en sont privées.

ESPÈCES.

1. STACHIDE des bois. *Stachys silvatica*. Linn.

Stachys verticillis sexfloris; foliis cordatis, petiolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 811. — Flor. suec. 489. 526. — Dalib. Paris. 180. — Scopol. Carn. n°. 706. — Gunn. Norv. n°. 70. — Crantz. Austr. pag. 265. — Pollich. Palat. n°. 563. — Sabbat. Hort. Rom. 3. tab. 38. — Lam. Flor. fr. vol. 2. pag. 387. — Hoffm. Germ. 208. — Roth. Germ. vol. 1. p. 255. — vol. II. pag. 28. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 97. n°. 1.

Stachys foliis cordatis, acuminatis, petiolatis; floribus laxè spicatis. Hort. Cliffort. 309. — Royen, Lugd. Bat. 517.

Stachys silvatica. Rivin. tab. 26. fig. 2.

Cardiaca foliis cordatis, serratis; verticillis nudis, spicatis. Haller, Helv. n°. 275.

Lamium maximum, silvaticum, fatidum. Bauh. Pin. 235.

Galeopsis legitima. Clus. Hist. 2. pag. 35. — Blackw. rab. 84.

Galeopsis procerior, fida, spicata. Tourn. Infl. R. Herb. 185.

Urtica herculæa. Tabern. Icon. 536.

Vulgairement ortie puante.

Cette plante a une odeur forte, désagréable; elle se distingue par ses feuilles assez grandes, ovales, en cœur, pétioles; par ses verticilles à six fleurs, distans; par la lèvre supérieure de la corolle entière.

Ses racines sont grêles, un peu rampantes; elles produisent des tiges velues, droites, quadrangulaires, hautes de deux ou trois pieds, branchues, herbacées, garnies de feuilles opposées, pétioles, ovales, échancrées en cœur à leur base, grandes, vertes, légèrement velues à leurs deux faces, fortement dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet, longues de trois à quatre pouces, sur deux pouces & plus de large; les pétioles hérissés de poils blanchâtres.

Les fleurs forment un épi terminal, disposées par verticilles distans, surtout les inférieures, réunies au nombre de six à huit à chaque verticille, accompagnées de feuilles ou bractées étroites, lancéolées, acuminées. Les calices sont très-velus, à cinq dents presque égales, subulés. La corolle est au moins deux fois plus longue que le calice, à deux lèvres ouvertes; la supérieure entière, d'un pourpre-vif & foncé; l'inférieure purpurine, tachée de blanc.

Cette plante se rencontre dans les bois & les lieux couverts, en Europe. (V. v.)

Elle passe pour diurétique, emménagogue; on la recommande pour la blessure des tendons, étant macérée dans l'huile. Elle teint en jaune. L'écorce de ses tiges peut, dit-on, se préparer & se filer comme le chanvre. Les moutons & les chèvres mangent cette plante, mais les autres bestiaux n'en veulent pas.

2. STACHIDE à feuilles rondes. *Stachys circinalis*. Lherit.

Stachys foliis inferioribus, cordato-rotundatis, crenatis; verticillis sexfloris. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 20.

Stachys verticillis sexfloris; foliis cordato-rotundatis, crenatis. Lherit. Stirp. 1. pag. 51. tab. 26.

Stachys verticillis spicatis, sexfloris; bracteis cordatis; foliis cordatis, petiolatis, obtusis, crenato-dentatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 64. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 97. n°. 2.

Cette espèce est bien reconnoissable à la forme de ses feuilles arrondies, échancrées en cœur, & assez régulièrement crénelées, velues.

Ses tiges sont fermes, vertes ou purpurines, très-velues, quadrangulaires, couchées à leur partie inférieure, hautes au moins d'un pied, ramufes; les rameaux opposés, étalés, garnis de feuilles opposées, pétioles, assez grandes, rondes, en cœur à leur base, un peu épaisses, velues à leurs deux faces, crénelées à leur contour, obtuses; les crénelures assez régulières, obtuses; les feuilles inférieures longuement pétioles; les supérieures presque sessiles.

Les fleurs sont disposées en un épi droit, terminal, composé de verticilles peu distans, d'environ six fleurs médiocrement pédicellées, munies de bractées presque sessiles, ovales ou ovales-lancéolées, aiguës, légèrement crénelées ou presque entières, velues. Le calice est très-velu, à cinq dents ovales, aiguës, presque épineuses. La corolle est d'un rose-pâle, de la grandeur de celle du *Stachys silvatica*; la lèvre supérieure droite, très-entière, obtuse; l'inférieure à trois lobes entiers, arrondis; celui du milieu une fois plus grand que les laté-

raux; les anthères purpurines; les semences brunes, petites, ovales, à trois faces.

Cette plante croît dans l'Afrique septentrionale, dans les montagnes des environs de Tunis, & dans les fentes des rochers, sur le mont Atlas. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (P. v.)

3. STACHIDE à fleurs écarlates. *Stachys coccinea*. Jacq.

Stachys verticillis sexfloris; foliis ovatis, cordatis, crenatis & petiolis dilatatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 97. n°. 3.

Stachys verticillis sexfloris; foliis oblongo-ovatis, basi cordatis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 3. pag. 18. tab. 284.

Elle a de grands rapports avec le *salvia coccinea*, tant par la forme de ses feuilles, que par la couleur rouge écarlate de ses fleurs.

Ses tiges sont droites, herbacées, velues, quadrangulaires, hautes d'environ deux pieds, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, échanquées en cœur à leur base, velues à leurs deux faces, veinées & ridées en dessous, crénelées à leurs bords; les crénelures obtuses; les feuilles inférieures longuement pétiolées & très-obtus; les supérieures & les florales ovales & sessiles; les pétiotes un peu élargis & canaliculés.

Les fleurs sont disposées en verticilles d'environ six fleurs, formant un épi droit, terminal. Le calice est campanule, hérissé de poils, à dix ftries, divisé en cinq dents aiguës. La corolle est grande, d'une belle couleur écarlate; le tube trois fois plus long que le calice; la lèvre supérieure oblongue, obtuse, droite, entière; l'inférieure divisée en trois lobes; les deux lobes latéraux plus petits, obtus; celui du milieu entier & très-grand.

On ignore le lieu natal de cette plante, qui est cultivée dans quelques jardins botaniques d'Allemagne. 7

4. STACHIDE des marais. *Stachys palustris*. Linn.

Stachys verticillis subsexfloris; foliis lineari-lanceolatis, semi-amplexicaulibus, sessilibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 811. — Flor. suec. 490, 528. — Dalib. Paris. 180. — Pollich. Palat. n°. 564. — Loefl. I. Pruss. Icon. 41. — Blackv. tab. 273. — Hoffm. Germ. 208. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 255. — vol. II. pag. 29. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 385. n°. 426. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 98. n°. 4.

Stachys foliis linear-lanceolatis, sessilibus, basi emarginatis. Hort. Cliff. 309. — Roy. Lugd. Bat. 317.

Stachys foliis subhirsutis, elliptico-lanceolatis, breviter petiolatis; verticillis spicatis. Hall. Helv. n°. 257.

Stachys foliis subhirsutis, ellipticis, ad basim emarginatis; verticillis ad decem floris. Crantz. Austr. pag. 266.

Stachys verticillis sexfloris, foliis lanceolatis. Scop. Carn. edit. 1. pag. 463. n°. 1. — edit. 2. n°. 707.

Stachys palustris, fetida. C. Bauh. Pin. 226. — Rivin. tab. 26. fig. 1. — Meris. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 10. fig. 16.

Stachys aquatica. Tabern. Ic. 577.

Galeopsis palustris, betonica folio, flore variegato. Tourn. Infl. R. Herb. 183.

Galeopsis angustifolia, fetida. J. Bauh. Hist. 3. Append. pag. 854. *Sine Leone*.

Climenum minus Dalechampii. Dalech. Hist. 2. pag. 1357.

Vulgairement ortie morte des marais.

On distingue cette espèce à ses feuilles linéaires, allongées; à fleurs purpurines, panachées de jaunes; à son odeur forte & désagréable.

Ses racines sont épaisses, charnues, un peu noueuses; ses tiges droites, hautes de deux ou trois pieds, simples ou médiocrement rameuses, plus ou moins velues, quadrangulaires, garnies de feuilles opposées, étroites, linéaires, longues de deux à trois pouces & plus, larges de six à neuf lignes, aiguës à leur sommet, échanquées à leur base; les inférieures médiocrement pétiolées; la plupart & les supérieures sessiles, presque amplexicaules, d'un vert-foncé, régulièrement dentées en scie à leurs bords, un peu velues.

Les fleurs sont disposées par verticilles formant un épi droit, terminal, plus ou moins long; les bractées lancéolées, opposées, dentées, diminuant de grandeur à mesure qu'elles s'approchent du sommet de l'épi; les verticilles composés de six à dix fleurs. Les calices sont découpés à leur orifice en cinq dents un peu inégales, subulées, hispides; la corolle au moins une fois plus longue que le calice, de couleur purpurine, marquée ordinairement de quelques taches jaunes; la lèvre supérieure concave, entière ou un peu échanquée; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu plus grand, échanqué ou crénelé.

Cette plante croît sur le bord des ruisseaux & dans les terres cultivées & humides en Europe. 7 (P. v.)

Observations. Le port de cette plante varie beaucoup selon les localités. Ses tiges, surtout dans les terrains secs, sont souvent simples, moins hautes, hérissées de poils nombreux. Les feuilles

sont étroites, linéaires ou plus larges, presque lancéolées; les épis plus ou moins longs; ils n'ont quelquefois que trois ou quatre verticilles. On a long-tems regardé cette plante comme un puissant fébrifuge: on n'en fait aujourd'hui aucun usage. Ses racines charnues contiennent un principe nourrissant: on peut en extraire de l'amidon. Les cochons les recherchent avec avidité, & creusent la terre pour les en retirer, mais les autres bestiaux n'en veulent point.

5. STACHIDE à feuilles étroites. *Stachys tenuifolia*. Willd.

Stachys verticillis sexfloris; foliis lanceolatis, simpliciter serratis, glaberrimis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 100. n°. 11.

Cette espèce, d'après Willdenow, ressemble beaucoup au *stachys palustris*; elle en diffère par ses feuilles beaucoup plus étroites, parfaitement glabres à leurs deux faces, minces, lancéolées, dentées en scie à leur contour; les dentelures à un seul rang, toutes égales; elle a d'ailleurs le port du *veronica maritima*, à un tel point, que sans la fructification on pourroit s'y tromper. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, par verticilles composés de six fleurs.

Cette plante croît dans la Pensilvanie. x

6. STACHIDE rude. *Stachys aspera*. Mich.

Stachys caulibus erectis, retrorsum hispidiis; foliis subperfoliatis, lanceolatis, argutis serratis; spicis verticillis subsexfloris; calicibus rigidis spinosiscentibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 5.

Il existe beaucoup de rapport entre cette plante & le *stachys palustris*. Ses tiges sont droites, hérissées de poils nombreux, couchés, réfléchis vers la base des tiges, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, lancéolées, aiguës à leur sommet, finement dentées en scie à leur contour. Les fleurs sont disposées en verticilles composés d'environ six fleurs, & formant par leur ensemble un épi droit, terminal. Les calices sont terminés par cinq dents qui se prolongent en une épine roide.

Cette plante croît dans les champs, à la Caroline. (Descript. ex Mich.)

7. STACHIDE des Alpes. *Stachys alpina*. Linn.

Stachys verticillis multifloris, foliorum serraturis, apice cartilagineis; corollis lobis plano. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 812. — Flor. suec. edit. 2. n°. 527. — Miller, Dict. n°. 5. — Scopol. Carn. n°. 709. — Sabbat. Hort. 3. tab. 41. — Hoffm. Germ. 208. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 255. — vol. II. pag. 30. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 386. n°. 426. — Lapeyr. Pyren. vol. 1. pag. 14. tab. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 98. n°. 5.

Stachys verticillis duodecimfloris, caule villosa. Hort. Upsal. 170.

Stachys foliis lanceolato-ovatis, basi emarginatis; verticillis tomentosis. Hort. Clifort. 310. — Roy. Lugd. Bat. 317.

Stachys foliis hirsutis, cordatis; verticillis sub-tomentosis. Haller, Helv. n°. 166.

Stachys latifolia major; foliis obscurè virentibus; flore galecto, ferrugineo. Pluken. Aimag. pag. 356. tab. 317. fig. 4.

Stachys minor, foliis obscurè virentibus, flore ferrugineo. Motif. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 10 fig. 11.

Pseudo-stachys alpina. C. Bauh. Pin. 236. & Prodr. 113.

Galeopsis alpina, betonicaefolia, flore variegato. Tourn. Inst. R. Herb. 185.

Salvia alpina. Tabern. Icon. 372.

Lodanum segetum. Rivin. tab. 24. ?

Il existe quelques rapports entre cette espèce & le *stachys silvatica*, surtout dans la forme & la grandeur des feuilles; mais elle en diffère par des caractères nombreux, par sa couleur, par les verticilles.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds au plus, quadrangulaires, velues, souvent rougeâtres, particulièrement sur les angles, rameuses à leur partie supérieure, rarement simples; les rameaux axillaires, opposés, étalés, courts & fleuris dans leur longueur. Les feuilles sont opposées, molles, velues, pétiolées; les supérieures sessiles, grandes, ovales, presque lancéolées, d'un vert-jaunâtre-obscur, pointues à leur sommet, échancrées en cœur à leur base, dentées en scie à leur contour; les dentelures sont très-souvent noirâtres & cartilagineuses à leur pointe; les feuilles florales lancéolées, assez grandes, surtout les inférieures; les supérieures à peine dentées; d'où il résulte que les verticilles paroissent être plutôt axillaires qu'en épis.

Les fleurs sont disposées en verticilles épais, sessiles, munis d'un involucre composé de fix à huit petites folioles sétacées, velues, de la longueur des calices; ceux-ci sont grands, ovales, d'un brun-rouge & rougeâtre; le tube de la corolle plus court que le calice; son limbe divisé en deux lèvres; la supérieure horizontale & non droite, velue, d'un pourpre-obscur; l'inférieure pendante, un peu panachée à sa base, d'un rouge ferrugineux à son extrémité, divisée en trois lobes planes.

Cette plante croît en France, en Allemagne, dans les Alpes, les Pyrénées, l'Auvergne, aux lieux couverts & boisés, dans la forêt de Montmorency; je l'ai également recueillie aux environs

de Villers-Cotterêts, dans les bois du couvent de Long-Pié. (V. v.)

8. STACHIDE héracleée. *Stachys heraclea*. All.

Stachys verticillis decemfloris; calicibus inermibus; foliis cordatis; floralibus ovatis, integerrimis, sessilibus; caule hirsuto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 100. n°. 10.

Stachys (heraclea), hirsuta, foliis obscurè virantibus, elliptico-lanceolatis; verticillis decemfloris. Allion. Flor. pedem. n°. 112. tab. 84. fig. 1.

Sideriis heraclea. Colum. Euph. 1. p. 128. t. 137.

C'est une grande plante à larges feuilles, dont les tiges sont quadrangulaires, hautes d'environ un ou deux pieds, presque simples, quadrangulaires, chargées de longs poils; garnies de feuilles opposées; les inférieures longuement pétiolées, grandes, ovales-lancéolées, échancrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, lâchement dentées à leur contour, ridées, d'un vert-obscur, velues à leurs deux faces; les feuilles supérieures & florales entières, presque sessiles, beaucoup plus petites, ovales, aiguës.

Les fleurs, disposées par verticilles, occupent plus de la moitié des tiges; elles sont huit à dix à chaque verticille, munies de bractées en forme d'involucre, linéaires, lancéolées, aiguës, très-entières. Le calice est velu, tubulé, renflé à sa base, terminé par des dents épineuses; la corolle d'un rouge-foncé, velue extérieurement à son limbe; le tube glabre, de la longueur du calice.

Cette plante croît dans les environs de Nice, sur les collines, dans les lieux incultes. x

9. STACHIDE d'Orient. *Stachys orientalis*. Linn.

Stachys foliis tomentosis, ovato-lanceolatis, floralibus verticillo brevioribus. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 53. — Roy. Lugd. Bat. 318. — Mill. Dict. n°. 100. — Vahl, Symb. 2. pag. 64. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. tot. n°. 14.

Stachys orientalis, altissima, fetidissima. Tourn. Coroll. pag. 12. — Boerh. Lugd. Bat. t. pag. 154.

Stachys cretica. Forskh. Flor. conf. pag. 28. n°. 264.

Ses tiges sont hautes, quadrangulaires, pileuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, molles, fortement ridées, ovales-lancéolées, chargées à leurs deux faces de poils nombreux, crénelées à leur contour, d'un vert-blanchâtre; les feuilles supérieures beaucoup plus petites, sessiles, plus aiguës.

Les fleurs sont disposées, à la partie supérieure des tiges, en verticilles dilates, composés d'un grand nombre de fleurs. Les bractées ou feuilles

supérieures sont ovales, très-entières. Le calice est très-velu; les poils de couleur cendrée; les dents oïdes, piquantes; la corolle jaune; la lèvre supérieure très-velue en dehors.

Cette plante croît dans le Levant. (V. f. in herb. Lam.)

10. STACHIDE de Crète. *Stachys cretica*. Linn.

Stachys verticillis triginta-floris, calicibus punctatis, caule hirsuto. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 58. n°. 5. — Hort. Upf. 170. — Mill. Dict. n°. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 100. n°. 9.

Stachys folio o'scuro virente, flore purpurascente. Walh. Hort. 108. tab. 19.

Stachys cretica. C. Bauh. Pin. 236. — Prodr. 113. — Tourn. Inst. R. Herb. 186.

Toute la plante est velue & presque soyeuse, mais point tomenteuse, tellement que la couleur verte domine malgré les poils. Ses tiges sont droites, quadrangulaires, hérissées de poils fins & nombreux. Ses feuilles sont grandes, & ressemblent assez à celles du *Stachys silvestris*; elles sont ovales-lancéolées, molles, velues à leurs deux faces, crénelées de poils fins, couchés & soyeux, un peu échancrées en cœur à leur base, aiguës & même acuminées à leur sommet, pétiolées, dentées en scie à leur contour, longues de trois à quatre pouces, larges au moins de deux.

Les fleurs sont disposées par verticilles d'environ trente fleurs, réunis en une fois feuillu, munis de bractées en colletette, très-étroites, entières, linéaires, aiguës. Les calices sont très-velus; les dents courtes, presque épineuses. La corolle est grande, plus longue que le calice, un peu purpure ou blanchâtre.

Cette plante croît dans l'île de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

11. STACHIDE d'Allemagne. *Stachys germanica*. Linn.

Stachys verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis, caule lanato. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 812. — Mill. Dict. n°. 1. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 239. — Scop. Carn. n°. 710. — Poll. lich. Palat. n°. 165. — Weder. Flor. dan. tab. 684. — Jacq. Flor. austr. tab. 319. — Hoffm. Germ. 208. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 255. — Idem, vol. II. pag. 30. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 389. n°. 416.

Stachys tomentosa, foliis imis cordatis, superioribus elliptico-lanceolatis; verticillis anispermis. Hall. Helv. n°. 255.

Stachys (lanata), foliis tomentosis, albis; caule lanato; verticillis anispermis, ad basin exsertis, longè decrescentibus. Cranz. Austr. pag. 267.

Stachys

Stachys verticillis quadraginta floris, caule lanato. Hort. Upfl. 170.

Stachys foliis oblongo-cordatis, floribus verticillatis. Hort. Cliff. 309. — Roy. Lugd. Bat. 317. — Dalib. Parif. 179.

Stachys major, germanica. C. Bauh. Pin. 236. — Tourn. Inf. R. Herb. 186. — Morif. Oxon. Hift. 3. §. 11. tab. 10. fig. 1.

Stachys Fufchii. J. Bauh. Hift. 3. pag. 319. Icon. Mala. — Fufch. Hift. 766.

Stachys montana, Rivin. tab. 27. Bona.

Stachys tomentofa. Gat. Flot. montaub. 107.

Stachys Diofcoridis. Lobel. Icon. 530.

Pseudo-Stachys Matthioli. Dalech. Hift. 1. pag. 963.

Stachys alba. Latourret, Lugd. 16.

Vulgairement épi fleuri.

Cette plante eft, parmi celles de l'Europe, une des plus diftinguées de ce genre, affez agréable à la vue par le duvet laineux épais, foyeux, blanchâtre, un peu cendré, qui recouvre toutes fes parties, & par fes fleurs purpurines, difpofées en verticilles épais.

Ses tiges font carrées, droites, médiocrement rameufes, quelquefois fimples, très-velues, épaiffes, garnies de feuilles oppofées; les inférieures en cœur à leur bafe, portées fur des pétioles toides, ligneux; les fupérieures feffiles, ovales, un peu lancéolées, pointues, molles, épaiffes, foyeufes, groffièrement ridées en deffous, un peu verdâtres en deffus, dentées en fcie à leurs bords; les feuilles florales plus étroites, lancéolées.

Les fleurs font difpofées par verticilles axillaires, à l'extrémité des rameaux, très-épais, munis d'un duvet foyeux, épais & blanc, & d'un involucre à plusieurs folioles linéaires ou fétacées à mefure qu'elles approchent du fommet, fousvent réfléchies. Ces verticilles forment, par leur enfeble, un long épi feuillé. Les dents du calice font terminées par une petite pointe toide. Les corolles font purpurines, quelquefois blanches, d'une grandeur moyenne; la lèvre fupérieure très-velue en dehors, concave, échantrée; l'inférieure à trois lobes; les latéraux réfléchis; celui du milieu plus alongé, quelquefois un peu échantré.

Cette efpece croit en Europe, dans les lieux arides, fur le bord des chemins; elle paffe pour emménagogue. ♀ (P. v.)

Cette plante, cultivée, devient fousvent une fois plus grande. Ses feuilles font plus larges, moins velues, moins blanches, verdâtres.

12. STACHIDE laineufe. *Stachys lanata*. Jacq. Botaniqu. Tome VII.

Stachys verticillis multifloris, foliis lanatis, caulibus bafi procumbentibus & radicantibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 201. — Jacq. Icon. Rat. vol. 1. tab. 107. — Idem, Mifcell. vol. 2. pag. 342. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 100. n°. 8.

♂. *Stachys* (intermedia), verticillis multifloris; calicibus fubpungentibus; foliis oblongis, fubcordatis, crenatis; caule fublanato. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 201.

Stachys intermedia. Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 99. n°. 7.

Cette efpece, qui a de grands rapports avec le *Stachys germanica*, s'en diftingue au premier afpect par le duvet laineux bien plus épais, plus abondant & d'un blanc plus éclatant; par les feuilles à peine dentées ou entières.

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux pieds, épaiffes, dures, quadrangulaires, rameufes, tomenteufes, couchées & fousvent radicantes à leur bafe; les rameaux oppofés, alongés, diftus, très-roides; les feuilles oppofées, molles, épaiffes; les inférieures pétioles, ovales, lancéolées, un peu aiguës, blanches & lanugineufes à leurs deux faces, affez grandes, légèrement crénelées; les fupérieures plus petites, étroites, lancéolées, feffiles; les feuilles florales plus courtes, fousvent réfléchies & un peu obtufes.

Les fleurs font difpofées en verticilles très-ferrés à l'extrémité fupérieure de l'épi, composés de fleurs nombreufes, feffiles, enfoncées dans un duvet lanugineux, épais & d'un blanc-éclatant; les bractées forment un involucre à plusieurs folioles linéaires aux verticilles inférieurs, plus petites, & fétacées aux verticilles fupérieurs. Les calices font très-velus, à cinq dents courtes, prefque mucronées à leur fommet. La corolle eft blanchâtre ou purpurine; fa lèvre fupérieure droite, concave, entière, velue en dehors; l'inférieure à trois lobes inégaux.

La plante ♀ paroît être une variété peu différente de celle-ci, remant prefque le milieu entre elle & le *Stachys germanica*; elle eft moins lanugineufe, furtout les tiges; les feuilles font plus étroites, alongées, prefqu'en cœur à leur bafe, crénelées à leur contour, les dents calicinales un peu piquantes. Elle n'eft connue que dans les jardins: on ignore fon lieu natal.

La première croit en Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, où elle a été nommée autrefois *Stachys fibirica*. ♀ (P. v.) Elle peut être cultivée conjointement avec la précédente, comme plante d'ornement.

13. STACHIDE de Paleftine. *Stachys paleftina*. Linn.

A 22

Stochys floribus subspicatis; foliis lanceolatis, fissilibus, tomentosis, rugosis, integerrimis; calicibus muticis. Linn. Spec. Plant. pag. 1674. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 101. n°. 15. — Lam. Ill. Gen. tab. 509. fig. 2.

Stachys alba, angusto folia folio. Barrel. Icon. 179. ? Mala.

Sideritis incano olea folio; flosculis ex incarnotocandicibus montis Libani. Volk. Norib. 353. — Rai, Suppl. 306.

Sideritis molli, cinereo olea folio, coulem ambiente; flore violaceo, ex monte Carmelo. Boccon. Mus. 2. pag. 145. tab. 109. 100.

Ses tiges sont ligneuses, presque cylindriques, chargées d'un duvet-blanc, tomenteux; droites, médiocrement rameuses; les rameaux axillaires; les feuilles opposées, celles du bas à peine pétiolées, obtuses; les caulinaires & supérieures étroites, lancéolées, un peu aiguës, sessiles, assez semblables pour la forme, à celles de l'olivier; ridées, blanches, tomenteuses; la plupart un peu élargies à leur base, très-entières à leur contour.

Les fleurs forment un épi feuillé & terminal, disposées par verticilles dans l'aisselle de petites feuilles linéaires, rapprochées, peu nombreuses à chaque verticille. Le calice est pubescent, marqué d'environ dix angles; les dents à peine aiguës; la corolle d'une grandeur médiocre; la lèvre supérieure concave, entière, purpurine, munie à ses bords d'une ligne pourpre; l'inférieure également purpurine, à trois lobes; celui du milieu plus grand, concave; l'orifice tacheté de blanc.

Cette plante croît dans la Palestine. Th (V. f. in herb. Lam.)

14. STACHIDE maritime. *Stochys maritima.* Linn.

Stachys foliis cordatis, obtusis, tomentosis, crenatis; bracteis oblongis, integerrimis. Linn. Syst. Plant. vol. 3, pag. 59. n°. 10. — Mantiss. 82. — Jacq. Hort. tab. 70. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 102. n°. 16. — Lam. Flor. franç. vol. 2, pag. 388. n°. 426.

Stochys verticillis fixis; foliis radicalibus ovatis, crenatis, summis ovatis, integerrimis; corollis calice duplo longioribus. Gouan, Monip. 91.

Betonica maritima, flore ex luteo pallente. Dillen. Flitham. pag. 50. tab. 41. fig. 50. — Tournef. Inst. R. Herb. 203.

Betonica heracleo, latifolio, Dioscoridis. Donat. Venet. 84. — Boccon. Mus. 2. pag. 164. tab. 127.

Sideritis salvia folio, nigras. Magn. Botan. Monip. pag. 23.

Ses tiges sont ligneuses, particulièrement à leur base; droites, pubescentes ou lanugineuses, hautes d'environ huit à dix pouces, à peine rameuses, garnies de feuilles opposées; les radicales & inférieures longuement pétiolées, ovales, obtuses, un peu en cœur, tomenteuses, ridées, crénelées à leur contour, veinées; les supérieures & florales plus courtes, sessiles & entières.

Les fleurs sont disposées par verticilles dans l'aisselle des feuilles supérieures, au nombre de deux à six. Les calices sont grands, lanugineux, évasés, à cinq dents sans pointe, à peine aiguës; la corolle d'un jaune-pâle, au moins deux fois plus longue que le calice, velue extérieurement, divisée en deux lèvres très-écartées, presque égales; les étamines au moins aussi longues que la lèvre supérieure.

Cette plante croît en France, en Italie, dans le Levant, aux environs de Montpellier, sur les bords de la mer. Th (V. f.)

15. STACHIDE d'Ethiopie. *Stachys aethiopica.* Linn.

Stachys foliis subvillosis serratis, obtusis; floribus oppositis, subsistariis. (N.)

Stachys verticillis bifloris. Linn. Syst. Plant. vol. 3, pag. 59. n°. 11. — Mantiss. 82. — Jacq. Observ. vol. 4, pag. 2. tab. 77. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 102. n°. 17.

Sideritis crella, tenui pratenis folio, aethiopica. Pluken. Almag. pag. 245. tab. 315. fig. 3.

C'est une petite plante dont les tiges sont droites ou diffusées, hautes de trois à quatre pouces, pileuses, un peu hispides, qui offre le port du *Lamium purpureum*. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, en cœur, un peu velues, luisantes, ridées, profondément dentées en scie; les dentelures obtuses; les pétioles plus longs que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, interrompus, composés de verticilles, ou plus ordinairement de fleurs opposées, foliaires dans les aisselles des feuilles. Le calice est à cinq découpures peu profondes, presque égales, un peu subulées. Le tube de la corolle est un peu courbé, divisé en deux lèvres; la supérieure droite, courte, concave, velue; l'inférieure très-grande, étendue, partagée en trois lobes; celui du milieu très-large, plane, crénelé; les deux latéraux réfléchis; les étamines à peine de la longueur du tube; les anthères blâmes.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. Th

16. STACHIDE à feuilles ridées. *Stachys rugosa.* Aiton.

STA

Stachys verticillis sexfloris; foliis lanceolatis, hirsutis, tomentosis, rugosis, serratis; calicibus mucosis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 303. — Jacq. Icon. Rat. vol. 3. tab. 494. — Idem, Collect. vol. 7. pag. 116. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 104. n° 20. — Lam. Illustr. Gener. tab. 50. fig. 3.

On distingue cette espèce à ses feuilles fortement ridées, tomenteuses en dessous; à ses calices extrêmement lanugineux, tomenteux; à ses fleurs jaunes.

Ses tiges sont un peu coudées & presque cylindriques à leur partie inférieure, divilées en rameaux droits, opposés, peu ouverts, quadrangulaires, blanchâtres & tomenteux, garnis de feuilles opposées; les supérieures presque sessiles, longues d'un pouce, larges d'environ six lignes, ovales-lancéolées, marquées de rides profondes, d'un gros vert & pubescentes en dessous, tomentueuses, blanchâtres & à grosses nervures en dessous, lâchement dentées à leur contour, à peine aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole court.

Les fleurs sont disposées par verticilles dans l'aisselle des feuilles supérieures, au nombre de six à chaque verticille, dépourvues de bractées. Le calice est épais, tubulé, à cinq dents non épineuses, égales, chargé d'un duvet épais, blanc, tomenteux. La corolle est jaune, un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

17. STACHIDE hérissée. *Stachys hirsuta*. Linn.

Stachys verticillis sexfloris, caulibus prostratis; corollis lobis superiore oboato, divaricato, reflexo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 813. — Allioni, Flor. pedem. n° 113. tab. 2. fig. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 20. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 103.

Galopsis (hirsuta), caule piloso, calicibus lobis corolla superiore longioribus. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 580. — Allioni, Nicot. 44.

Sideritis (ocymultrum), herbacea, pilosa; foliis ovatis, obtusis; corollis lobis superiore divaricatis. Gouan, Hort. Montp. pag. 278. n° 7. Linn. Syst. 1098.

Marrubium nigrum, scandifolium. C. Bauh. Pin. 230. — Moench, Oen. 5. 11. tab. 9. fig. 15.

Galopsis arvensis, hispanica, scandifolia. Tourn. Ind. B. Herb. 186.

Ocymum valentinum. Clus. Hist. 2. pag. 42.

Narrarium hispanicum, odor fœchodis. Lobel, Icon. 519. — Alton, Oberv. 259. Icon.

Les fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles,

STA

Marrubium nigrum, hispanicum. Parkinson, Theatr. 45. Icon.

Cette plante est hérissée de poils roides, épars sur toutes les parties. Ses tiges sont couchées ou redressées, étalées, très-rameuses, quadrangulaires, longues d'environ un pied & demi; les rameaux diffus, opposés; les feuilles pétioles, opposées, ovales ou un peu arrondies, en forme de cœur, crénelées à leur contour, obtuses, arrondies à leurs deux faces de poils rares, épars; les inférieures grandes, longuement pétioles; les supérieures bien plus petites, presque sessiles ou médiocrement pétioles; les crénelures larges, obtuses.

Les fleurs sont situées, vers la partie supérieure des rameaux, en un épi droit, composé de verticilles distants; quatre à six fleurs à chaque verticille, garnis de feuilles florales ovales, plus longues que les calices, crénelées, mucronées à leur sommet; les supérieures plus petites & entières, sans autre involucres partiel. Le calice est velu, campanulé, terminé par cinq dents longues, subulées, presque égales, mucronées, épineuses à leur sommet. La corolle est jaunâtre, marquée de quelques taches purpurines; le tube un peu courbé, plus court que le calice; la lèvre supérieure droite, obtuse, à demi-bifide, de la longueur du calice; l'inférieure divisée en trois lobes plans, obtus, inégaux.

Cette plante croît dans les champs & sur les collines aux environs de Montpellier & de Nice, dans le Levant, l'Italie, l'Espagne, le royaume de Tunis. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

18. STACHIDE à feuilles de lavande. *Stachys lavandulifolia*. Vahl.

Stachys verticillis sexfloris, hirsutissima; foliis lanceolatis, integerrimis, linearis. Vahl, Symbol. 1. pag. 42. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 103. n° 19.

Zizania orientalis. Gleditsch. A. D. berol. 1766. pag. 3.

Galopsis orientalis, lavandulifolia, calice villosissimo. Tourn. Coroll. pag. 11.

Ses tiges sont droites, hautes de sept à huit pouces, simples, velues, garnies de feuilles sessiles, opposées; les inférieures conniventes à leur base; les supérieures sessiles, mais point conniventes, toutes lancéolées, très-entières, obtuses, glabres à leur face supérieure, marquées de lignes mollement pieuses en dessous; les fleurs droites, ovales, en cœur, réfléchies, plus courtes que les verticilles, glabres à leur face inférieure.

Les fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles,

dans toute la longueur des tiges; elles forment un épi composé de verticilles distans, à six fleurs. Les calices sont très-velus; leurs découpures ouvertes, fimbriées, trois fois plus longues que la partie entière du calice. La corolle est de couleur purpurine.

Cette plante, distinguée par la longueur des dents calicinales, croit dans le Levant. 7

19. STACHIDE crapaudine. *Stachys recta*. Linn.

Stachys verticillis subspicatis; foliis cordato-ellipticis, crenatis, scabris; caulibus aspidanthibus. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 60. n°. 13. — Mantiss. 81. — Pollich. Palat. n°. 507. — Gouan, Illustr. 36. — Neck. in Act. Palat. 2. pag. 474. — Gmel. Tub. p. 182. — Jacq. Flor. austr. tab. 359. — Hoffm. Germ. 209. — Roth. Germ. vol. I. pag. 216. — vol. II. pag. 31. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 104. n°. 21.

Betonica foliis hirsutis, ovatis, rotundis crenatis; bracteis ovato-lanceolatis, aristatis, integerrimis. Hall. Helv. n°. 261.

Stachys (betonica), foliis basi attenuatis, corollae galea erecta. Crantz. Stirp. Austr. pag. 264. Non descriptio.

Stachys sideritis. Villars. Dauph. vol. 2. p. 375. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 550.

Stachys procumbens. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 385. n°. 426.

Betonica hirta. Gouan, Hort. Monsp. pag. 276.

Stachys (busonia), caulibus procumbentibus, foliis sessilibus. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 295. — Dalib. Parif. 176.

Tetrahitis caulibus procumbentibus. Ges. Ger. Flor. gall. Prov. pag. 272.

Betonica decumbens. Moench. Method. 396.

Tetrahitis herbariorum. L'abel. Icon. 523. — Idem, Observ. pag. 282. Icon. ?

Tetrahitis sideritis, heraclea, Dioscoridis. Dalech. Hist. 2. pag. 118. Icon.

Sideritis flore luteo. Rivio, Mon. tab. 70.

Sideritis vulgaris, hirsuta. J. Bauh. Hist. 3. pag. 435. — Magn. bot. Monsp. 240.

Sideritis hirsuta, procumbens. C. Bauh. Pin. 233. — Tourn. Infl. R. Herb. 191. — Garid. Aix. 443.

Vulgairement la crapaudine.

Cette plante a de tels rapports avec le *sideritis hirsuta* Linn., qu'il en est résultée une grande confusion dans la synonymie de ces deux espèces. J'en ai rapporté une partie avec un peu de doute, ne pouvant avoir rien de très-certain, particulière-

ment sur celle des Anciens. Quoique les figures de Lobel, de J. Bauhin, de Dalechamp, y conviennent assez bien, les feuilles cependant sont plus étroites & plus velues.

Ses tiges sont hautes d'un pied, couchées à leur partie inférieure, velues, quadrangulaires, rameuses; les feuilles ovales-oblongues, opposées, presque sessiles, un peu ridées, verdâtres, médiocrement velues à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, presque obtuses à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, longues d'un pouce & souvent davantage; les feuilles supérieures sessiles, plus petites.

Les fleurs sont disposées en verticilles d'environ dix fleurs, un peu interrompus à leur base, formant un épi droit, terminal. Les bractées sont lancéolées, courtes, terminées par une pointe épineuse; le calice légèrement velu, un peu évasé, à cinq dents presque égales, un peu échancrées à la corolle d'un jaune-jaune avec des taches ou de petites veines rougeâtres; le tube à peine plus long que le calice; la lèvre supérieure étroite, redressée, fort écartée de l'inférieure, entière.

Cette plante croît en Europe, dans les terrains secs, sur le bord des chemins, aux environs de Paris, &c. 7 (V. v.)

20. STACHIDE des sables. *Stachys arenaria*. Desfont.

Stachys caule basi procumbente, foliis lanceolatis, obtusis; verticillis subsuperis, villosis; caulibus spinosis, corollae galea emarginata. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 21. tab. 126.

Stachys (arenaria), verticillis subspicatis, hirsutis, sexpensis; caulibus spinosis; foliis oblongis, serratis; galea bifida. Vahl, Symbol. 2. pag. 64. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 105. n°. 22.

Betonica sideritis facie, flore purpureo. Tournef. Coroll. pag. 13.

Elle a le port du *stachys recta*; elle en diffère par ses calices très-velus, une fois plus amples; par ses corolles pourpres, dont la lèvre supérieure est échancrée.

Ses tiges sont couchées à leur partie inférieure, quadrangulaires, velues, hautes d'environ deux pieds, rameuses, garnies de feuilles opposées, velues; les inférieures pétioles, ovales, oblongues, obtuses; les supérieures plus étroites, lancéolées, sessiles, crénelées à leur contour, un peu ridées; les crénelures épaisses, obtuses.

Les fleurs forment des épis terminaux. Elles sont disposées par verticilles presque sessiles, distans, composés ordinairement de six fleurs. Leur calice est velu, cylindrique, très-évasé, campanulé à son orifice, termine par cinq dents lanceo-

lées, presque égales, roides, épineuses à leur sommet. La corolle est velue, de couleur purpurine, de la grandeur de celle du *stachys recta*; la lèvre supérieure droite, échancrée; l'inférieure à trois lobes; le lobe du milieu beaucoup plus grand; le tube de la longueur du calice.

Cette plante croît dans le sable, aux environs de Biserie, dans le royaume de Tunis & dans le Levant. (Description ex Desfont.)

21. STACHIDE à feuilles de scordium. *Stachys ferdouidea*.

Stachys caule suffruticoso, foliis lanceolato-linearibus, suavisagris; floralibus incisio-spinosis, dentibus calicinis rectis, subulatis. (N.)

Ses tiges sont un peu ligneuses; elles se divisent en rameaux assez nombreux, étalés, quadrangulaires, roides, velus, surtout à leur partie supérieure. Les feuilles sont opposées, étroites, lancéolées, presque linéaires, entières, munies de quelques dents larges, irrégulières, quelquefois même incisées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, très-obtusées, rétrécies à leur base en une pétiole plane; les feuilles florales ou les bractées sessiles, presque amplexicaules, larges, glabres, assez grandes, irrégulièrement incisées ou laciniées à leur contour; chaque découpe terminée par une pointe épineuse.

Les fleurs, presque cachées par les bractées, sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en verticilles interrompus, sans involucre, composés de six à neuf fleurs droites, serrées, presque sessiles. Leur calice est tubuleux, verdâtre, strié, velu, terminé par cinq dents droites, égales, subulées, presque épineuses. La corolle est jaunâtre, un peu plus longue que le calice; la lèvre supérieure droite, presque plane, échancrée à son sommet; l'inférieure plus courte, plus large, à trois lobes arrondis, inégaux, un peu crénelés.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Je la crois originaire de l'Afrique septentrionale. (V. v.)

22. STACHIDE des champs. *Stachys arvensis*. Linn.

Stachys verticillis sexfloris, foliis obtusis, nudiusculis; corollis longioribus calice, caule asili. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 834. — Syst. veget. 448. — Œter. Flor. dan. tab. 387. — Pollich. Palat. n°. 568. — Sibbat. Hort. Rom. 3. tab. 51. — Hoffm. Germ. 109. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 256. — vol. II. pag. 32. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 106. n°. 24. — Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 187. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 551.

Cardiaca arvensis, Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 383, n°. 423.

Glechoma marrubiastrum. Vill. Plant. du Dauph. vol. 2. pag. 371.

Trixago cordifolia, Moench. Method. pag. 358.

Trixago foliis hirsutis, ovato-cordatis, rotundumatis. Haller, Helv. n°. 231.

Stachys verticillis sexfloris; foliis obtusis, nudiusculis; corollarum labio superiore integerrimo. Neck. Gallob. pag. 225.

Glechoma (arvensis), foliis cordatis, oblongis, crenatis; caule hirsuto, erecto. Linn. Spec. edit. 1. pag. 578. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 268.

Glechoma foliis cordato-oblongis, crenatis. Hort. Cliff. 307.

Sideritis calicibus subinermibus, hispida. Flor. suec. 488. 519.

Sideritis alpestris, trixaginis folio. C. Bauh. Pin. 233. & Prodr. 111.

Sideritis humilis, lato, obtuso folio. Rai, Hist. 565.

Stachys arvensis, minima. Riv. tab. 27. — Petiv. tab. 33.

Marrubiastrum vulgare. Tournef. Inst. R. Herb. 190.

g. Lamium paludosum, belgicum. Herm. Lugd. Bat. pag. 351. tab. 553.

y. Stachys (purpurea), elatior, floribus carotopurpureiscentibus, corollis calice vix duplo longioribus. (N.)

On distingue cette espèce à ses tiges foibles, presque simples; à ses fleurs un peu jaunâtres, à peine plus longues que le calice; à ses feuilles ovales, en cœur, velues, distantes.

Ses racines sont grêles, fibreuses, un peu noircies: il s'en élève plusieurs tiges droites, tendres, herbacées, jaunâtres, quadrangulaires, pileuses, hautes de huit à dix pouces & plus, quelquefois simples ou rameuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles fort distantes, opposées, pétioles, médiocrement velues, ovales, en cœur ou un peu arrondies, d'un vert jaunâtre, crénelées à leur contour, très-obtusées à leur sommet; les crénelures obtuses, arrondies. Les feuilles florales sessiles, plus étroites; point d'involucre particulier.

Les fleurs sont disposées en verticilles distans, axillaires, composés de cinq à six fleurs un peu pédicellées: il en résulte un épi droit, terminal, assez long. Le calice est médiocrement évasé, anguleux, velu, quelquefois d'un pourpre-noirâtre, divisé à son orifice en cinq découpures égales, mucronées. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, petite, à peine plus longue que le calice. La lèvre supérieure est courte, entière; l'inférieure à trois

lobes; celui du milieu plus large, entier, tacheté de pourpre. Quelquefois la corolle entière prend une teinte purpurine.

Cette plante croit en Europe, dans les champs. ○ (V. v.)

J'ai recueilli sur les côtes de Barbarie la variété *γ*, qu'on pourroit presque distinguer comme espèce. Ses tiges sont plus fortes, plus élevées, rameuses dès leur base; la plante plus velue sur toutes ses parties; les feuilles plus grandes, mais d'une même forme; les calices hérissés de poils nombreux; la corolle au moins une fois plus grande que le calice, d'un pourpre mélangé d'un bleu-clair; les deux lèvres très-ouvertes, un peu pubescentes; la supérieure droite, un peu renversée en dehors, échancrée à son sommet; l'inférieure à trois lobes très-inégaux; celui du milieu fort large & bien plus long que les latéraux.

23. STACHIDE annuelle. *Stachys annua*. Linn.

Stachys verticillata sessilis, foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, levibus, petiolatis; caule erecto. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 813. — Syst. veget. 448. — Neck. in Act. Palat. vol. 2. pag. 475. — Schol. Barb. n°. 1012. — Pollich. Pal. n°. 566. — Martusch. Sil. n°. 444. — Jacq. Flor. austr. tab. 360. — Hoffm. Germ. 209. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 256. — vol. II. pag. 31. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 551. — Gœd. Flor. dan. t. b. 587. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 187.

Stachys foliis lanceolatis, sessilibus, basi attenuatis. Hort. Cliff. 110. — Gronov. Virgin. 66. var. *β*. — Dalib. Paris. 180.

Betonica foliis ovatis, crenatis; bracteis ovato-lanceolatis. Haller, Helv. n°. 663.

Stachys annua, var. *α*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 383. n°. 426.

Betonica annua. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 573. — Mœrch. Method. 396.

Stachys nervosa. Gat. Flor. montaub. 107.

Sideritis flore albo, barbâ luteoâ. Riv. tab. 69.

Betonica verticillata, calicibus spinosis. Hort. Upsal. 165.

Sideritis arvensis, latifolia, glabra. C. Bauh. Pin. 233.

Alfium majus. Tabern. Icon. 929.

Betonica arvensis, annua, flore ex albo-flavescente. Tourn. Inst. R. Herb. 203.

Sideritis glabra, arvensis. J. Bauh. Hist. 3. p. 427. Icon.

Elle a quelques rapports avec le *stachys rella*; elle en diffère par ses feuilles glabres, & qui la

plupart ne sont crénelées qu'à leur partie supérieure.

Ses tiges sont droites ou un peu couchées à leur base, hautes de huit à dix pouces, quadrangulaires, un peu velues, très-rameuses; les rameaux étalés; les feuilles opposées, glabres, très-lisses, d'un vert-jaunâtre, munies la plupart de trois à cinq nervures longitudinales; les inférieures pétioolées, ovales-oblongues, crénelées ou un peu dentées en scie, les unes à leur contour, d'autres vers leur sommet, d'autres très-entières; les supérieures plus étroites, un peu aiguës, très-éciliées à leur base; les feuilles florales linéolées, réfléchies, ordinairement entières.

Les fleurs forment un épi droit, feuillé, composé de verticilles distans, un peu pédonculés, de quatre à six fleurs; les calices tubulés, un peu velus, à cinq dents mucronées, mais point épineuses; la corolle d'un jaune-pâle, chargée quelquefois de points ou de raies rougeâtres à la base de la lèvre inférieure; la lèvre supérieure un peu courbée, échancrée; l'inférieure à trois lobes inégaux.

Cette plante croit dans les lieux pierreux, élevés, sur le bord des chemins en Europe. ○ (V. v.)

24. STACHIDE à feuilles d'hyssop. *Stachys hyssopifolia*. Mich.

Stachys glaberrima, gracilis, erecta, foliis sessilibus, linearilanceolatis, rariore subdentatis; verticillis spica subquadris. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. pag. 4.

Cette espèce paroît avoir des rapports avec notre *stachys scordoides*; mais elle en diffère par ses feuilles sessiles, par ses fleurs bien moins nombreuses, & probablement par ses feuilles florales, dont Michaux ne parle pas, mais qu'il auroit sans doute mentionnées si elles eussent offert le même caractère que celles du *stachys scordoides*. C'est d'ailleurs une plante presque glabre dans toutes ses parties, dont les tiges sont droites, grêles, garnies de feuilles opposées, sessiles, linéaires-lanceolées, très-rarement dentées. Les fleurs forment un épi terminal, composé de verticilles qui contiennent environ quatre fleurs.

Cette plante se rencontre dans la Caroline. (Michaux.)

25. STACHIDE glutineuse. *Stachys glutinosa*. Linn.

Stachys glabra, ramifissima, ramulis spinoscentibus; pedunculis axillaribus, foliariis, unifloris, bi-bracteatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 101. n°. 12. — Vahl, Symbol. 5. pag. 76. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 549.

Stachys ramis ramiflomis; foliis lanceolatis, glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 812. — Hort. Cliff. 310. — Rozen, Lugd. Bat. 318.

Sideritis glauifolia, bitumen redolens. Mor. Oxon. Hist. 3. pag. 389.

Sideritis viscosa, cretica, bitumen redolens. Zann. Hist. 136.

On distingue aisément cette espèce à ses fleurs avillaires, solitaires, accompagnées de deux bractées. Il découle de ses sommités une humeur visqueuse & odorante.

Ses tiges sont droites, glabres, ligneuses, fouplées, grêles, très-rameuses; les rameaux opposés, chargés de beaucoup d'autres, courts, presque filiformes, dont le sommet devient épineux en vieillissant. Les feuilles sont opposées, étroites; les inférieures oblongues, médiocrement dentées; les supérieures plus étroites, linéaires, entières, glabres à leurs deux faces, excepté quelques poils rares; longues d'un à deux pouces, larges de deux ou trois lignes.

Les fleurs sont presque sessiles, opposées, solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, munies à leur base de deux bractées linéaires. Le calice est glabre, vert, tubulé, divisé à son orifice en cinq dents droites, un peu épineuses à leur sommet. La corolle est blanche; le tube presque aussi long que le calice; le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure concave, entière, velue en dehors; l'inférieure trois fois plus longue, à trois lobes arrondis; celui du milieu plus grand; les antères situées à l'orifice du tube.

Cette plante croît dans la Syrie, l'île de Crète, & dans celle de Corfée. *h* (*V. f.*)

26. STACHIDE épineuse. *Stachys spinosa*. Linn.

Stachys canescens, ramulis brachiatis, spinis terminatis; floribus axillaribus, ternis. Vahl, Symb. 3. pag. 76. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 101. n°. 13.

Stachys, ramulis spinis terminatis. Linn. Syll. Plant. vol. 3. pag. 58. — Hort. Cliff. 310. — Roy. Lugd. Bat. 318. — Mill. Dict. n°. 9.

Stachys spinosa, cretica. C. Bauh. Pin. 216. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 283. 5. 11. tab. 10. fig. 9. — Tournef. Coroll. pag. 17.

Gaidarochymum. Clus. Hist. 2. pag. 311. — Prosp. Alp. exot. pag. 87. tab. 86.

C'est un petit arbrisseau, peu élevé, qui se présente sous la forme d'un buisson épineux, qui forme une espèce très-remarquable, & qui ne doit pas être confondue avec le *Stachys glutinosa*, malgré les rapports qui existent entre ces deux plantes.

Ses tiges sont éparées, ligneuses, très-roides;

quadrangulaires, chargées de poils couchés, loyeux & cendres, particulièrement les rameaux; ceux-ci sont très-étalés, subdivisés en d'autres plus courts, très-roids, terminés par une pointe dure, épineuse; les feuilles opposées, à peine pétiolées, étroites, linéaires, lancéolées, entières, un peu pubescentes, terminées à leur sommet par une petite pointe épineuse, surtout les feuilles supérieures; les inférieures presque obtuses, plus grandes.

Les fleurs sont peu nombreuses, sessiles, quelquefois solitaires ou réunies environ au nombre de trois dans l'aisselle des feuilles, ou plutôt de petites bractées ovales, un peu concaves, acérées à leur sommet, velues. Leur calice est velu, tubulé, un peu élargi à son orifice, & terminé par cinq dents roides, très-aiguës, épineuses; l'orifice garni d'une touffe de poils droits, blanchâtres; la corolle petite, un peu plus longue que le calice.

Cette plante se rencontre dans l'île de Crète. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

27. STACHIDE à feuilles d'armoïse. *Stachys artemisia*. Lour.

Stachys verticillata multiflora, foliis incisive, caule simpliciter. Loureiro, Flor. cochinch. pag. 443. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 107. n°. 26.

On prendroit aisément cette plante pour une armoïse avant le développement de ses fleurs, tant elle y ressemble par son port & la forme de ses feuilles. Ses tiges sont droites, simples, herbacées, annuelles, tétragones, blanchâtres, filonées, hautes d'environ trois pieds; les feuilles sont grandes; les radicales arrondies, crénelées à leur contour; celles des tiges beaucoup plus longues, pinnatifides, incisées, tomenteuses à leur face inférieure, opposées, pétiolées.

Les fleurs forment un épi terminal, composé de verticilles à plusieurs fleurs. Le calice est anguleux, à cinq découpures droites; les deux inférieures plus longues & presque épineuses; la corolle oblongue, d'un blanc lavé de pourpre, divisée en deux lèvres; la lèvre supérieure ovale, concave, très-entière; l'inférieure à trois lobes, les deux latéraux réfléchis, celui du milieu échanuré.

Cette plante croît à la Chine & dans la Cochinchine. (*Descript. ex Loureir.*)

* Espèces moins connues.

* *Stachys* (patens), *ramiflora*, *ramis filiformibus*, *patentibus*; foliis lanceolatis, serratis, glabris; floribus subverticillatis. Swartz, Nov. Plant. Gen. & Spec. pag. 88.

Elle paroît avoir quelques rapports avec le *Stachys hypophylla* de Michaux. Ses tiges sont très-

rameuses; ses rameaux grêles, filiformes, très-étalés; les feuilles opposées, glabres, lancéolées, dentées en scie à leurs bords; les fleurs peu nombreuses aux verticilles. Elle croît dans l'Amérique.

* *Stachys* (canariensis), *verticillis scæfaris*; *foliis cordatis, villosis, crenatis; caulibus pubescentibus; calicibus fructiferis, campanulato-javensis*. Jacq. Plant. Rar. Icon. Centur. 1. tab. 48.

Ses tiges, inclinées ou couchées à leur base, sont droites ou redressées à leur partie supérieure; les feuilles opposées, en forme de cœur, velues, crénelées à leur contour; les verticilles composés d'environ six fleurs; les calices campanulés, très-ouverts, surtout après la floraison. Cette plante croît au Canada; elle paroît très-peu différente du *Stachys circinnata*.

* *Stachys* (latifolia), *verticillis multifloris, subspicatis; labio superiori bifido; lacinulis acutis; foliis laetis, cordatis, rugosis, pilosis*. Airon, Hort. Kew. vol. 2. pag. 303.

On ignore le lieu natal de cette plante, qui est cultivée en Angleterre. Ses feuilles sont larges, en forme de cœur, riblées, pileuses; les verticilles composés d'un grand nombre de fleurs, dont l'ensemble forme un épi terminal; la corolle à deux lèvres; la lèvre supérieure bifide; les découpures aiguës.

* *Stachys* (italica), *foliis linearis lanceolatis, tomentosis, pubescentibus; petiolis longissimis; caule fruticoso, tomentoso*. Miller, Dict. n°. 3.

Cette espèce paroît être la même plante que le *Sideritis syriaca*, ou du moins une variété. (Voyez CRAPAUDINE de Syrie, vol. 2.)

* *Stachys* (alba), *foliis oblongo-ovatis, crenatis, pilosis; calicibus pungentibus, labio superiori piloso*. Miller, Dict. n°. 4.

Stachys alba, latifolia, major. Barrel. Ic. 297.

Elle paroît se rapprocher beaucoup du *Stachys lanata* ou du *Stachys cretica*. Ses feuilles sont ovales-oblongues, crénelées, pileuses; ses calices à dents épineuses; la lèvre supérieure velue. Elle croît en Épagne.

* *Stachys* (hispanica), *foliis inferioribus ovato-oblongis, pubescentibus, subius tomentosis; calicibus spinosis*. Miller, Dict. n°. 6.

Stachys elatior, flore stavescente punctato. Aët. Phil. Lond. 383.

STADMANE à feuilles opposées. *Stadmania oppositifolia*.

Stadmania foliis simplicibus, oppositis; floribus terminalibus, racemoso-spicatis. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 312.

Vulgairement bois de fer.

C'est un grand & bel arbre qui s'élève fort haut sur un tronc droit, dont le bois est très-dur & ferré. Il se divise en branches étalées & en rameaux opposés, cylindriques, revêtus d'une écorce cendrée, un peu blanchâtre, médiocrement pubescente à l'extrémité des jeunes rameaux. Les feuilles sont simples, opposées, pétioles, ovales-lancéolées, coriaces, très-entières, obtuses à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, d'un gros vert, presque luisantes en dessus, plus pâles & un peu brunes en dessous, longues de trois à quatre pouces, larges d'un pouce ou d'un pouce & demi, soutenues par des pétioles longs d'une à trois lignes.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, disposées en épis nus, composés de petites grappes ou de fleurs, les unes solitaires, les autres en plus grand nombre, fasciculées, soutenues par des pédoncules courts, épais, roides, ordinairement uniflores, longs d'une à deux lignes, munis à leur base d'une très-petite bractée tuberculée ou un peu aiguë, persistante après la chute des feuilles.

M. Lamarck a formé de cette plante un genre particulier, consacré à M. Stadman. Ce genre appartient à la famille des favoniers, & tient le milieu entre les *Sapindus* (favoniers) & les *Euphorbia* (lichis). Il diffère des premiers par ses calices monophylles, à cinq dents; par un style très-court, à peine sensible, & de tous deux par l'absence de la corolle; & dans son port, par ses feuilles simples, opposées.

Le caractère essentiel de ce genre consiste donc dans :

Un calice d'une seule pièce, à cinq dents; point de corolle; huit étamines; un style presque nul; une baie sèche, monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, fort petit, d'une seule pièce, à cinq dents courtes, ovales, un peu aiguës.

2°. Point de corolle.

3°. Huit étamines, dont les filaments sont droits, filiformes, un peu plus longs que le calice, terminés par des anthers droites, un peu arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, surmonté d'un style très-court, à peine sensible, terminé par un stigmate triangulaire.

Le fruit est une baie sèche, globuleuse, de la grosseur d'une petite cerise, qui offre ordinairement à sa base le rudiment d'une autre baie qui avorté

avorte constamment; elle contient une seule semence globuleuse.

Cette plante croît naturellement à l'île-de-France, où elle a été observée par MM. Sradman & Joseph Martin. Son bois est employé utilement aux charpentes: il est un de ceux auxquels on a donné le nom de *bois de fer*, à cause de sa dureté. On fait avec ses bates, lorsqu'elles ne sont encore qu'à moitié mûres, d'assez bonnes confitures en gelée. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

STAPÈLE. *Stapelia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des apocinées, qui a quelques rapports avec les *periploca* & les *perularia*, & qui comprend des plantes exotiques à l'Europe, grasses ou succulentes, à tiges anguleuses, dépourvues de feuilles, ayant à leur place des dents ou des tubercules acuminés, de l'aisselle desquels sortent un ou deux pédoncules uniflores.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice court, à cinq découpures; une corolle grande, en rase; une double étoile dans l'intérieur, à cinq découpures, entourant les organes de la génération; cinq étamines; deux stigmates sessiles; deux follicules subulés.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, persistant, à cinq découpures aiguës.

2°. Une corolle monopétale, plane, très-grande, à cinq découpures élargies à leur base, acuminées.

Un double appendice plane, ouvert en étoile; la plus grande étoile à cinq découpures linéaires, déchiquetées à leur sommet; la seconde, ordinairement un peu plus petite, à découpures entières, aiguës; quelquefois un disque plane situé sous les étoiles, environnant les organes de la génération.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont pliers, droits, élargis; les anthères linéaires, attachées aux côtés des filaments.

4°. Deux ovaires ovales, planes à leur côté intérieur; point de styles; deux stigmates sessiles.

Le fruit consiste en deux follicules oblongs, subulés, à une seule loge, à une seule valve, renfermant des semences nombreuses, imbriquées, comprimées, couronnées par une aigrette.

Observations. Ce genre est très-singulier. Les espèces nombreuses qu'il renferme, considérées quant à leur port, paroissent appartenir aux *cactus* ou aux *euphorbes*. Ce sont des plantes grasses, épaisses, charnues, à tige anguleuse, & qui sont dépourvues de feuilles. Celles-ci sont remplacées par des tubercules de forme variée ou des dents

Botanique, Tome VII.

saillantes, souvent situées sur les angles des rameaux, ébrouées ou aiguës. La plupart distillent par incision un suc laiteux, d'une odeur désagréable. Les fleurs ont une forme, un aspect féduisant; elles sont grandes dans la plupart des espèces, riches en couleurs variées dans leurs teintes, mais leur beauté ne séduit que les yeux: plusieurs d'entr'elles ont une odeur fétide; les émanations en sont presque cadavéreuses.

ESPÈCES.

* *Corolle à cinq découpures ciliées ou pileuses à leurs bords.*

1. STAPÈLE ciliée. *Stapelia ciliata*. Thunb.

Stapelia. denticulis ramarum patentibus, pedunculatis; corollis supra papillis, margine ciliatis; laciniis ovatis, acutis, planis. Masson, Stapel. p. 9. n°. 1. tab. 1.

Stapelia caule aphylla, tetragono; denticulis patentibus; flore pedunculata; laciniis corollae ovatis, squamosis, ciliatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Stapelia (ciliata), corollis quinquefidis; laciniis margine pilosis, funda papillis, pedunculis corollae brevioribus; caule tetragono, rimoso, decumbente, radicante, superne flarifero. Willd. Spéc. Plant. vol. 1. pag. 1277. n°. 1.

Ses branches font couchées, radicales, longues de six à huit pouces, rameuses; les rameaux redressés, quadrangulaires, glabres, longs d'un pouce, cannelés; les angles munis de tubercules & de dents ouvertes, aiguës.

Les fleurs sont situées latéralement sur les rameaux, grandes, foliaires, pédonculées; leur pédoncule est glabre, droit, cylindrique, long d'un demi-pouce environ; le calice composé de cinq folioles glabres, lancéolées, aiguës; la corolle est rouge, glabre & d'un vert-pourpre en dessous, rude, mamelonée, d'un gris-contré en dedans; les mamelons roussâtres à leur sommet. Le limbe se divise en cinq découpures ovales, aiguës, presque longues d'un pouce, ciliées à leurs bords; les cils d'un blanc de neige, étalés, un peu capités à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les sols arides, où elle fleurit dans les mois de novembre & de décembre. *h*

2. STAPÈLE velue. *Stapelia hirsuta*. Linn.

Stapelia caule aphylla, tetragono; denticulis erectis, flore pedunculata, corollae hirsuta. Thunb. Prodr. pag. 46.

Stapelia denticulis ramarum erectis. Linn. Syst. veget. pag. 260. n°. 2. — Hort. Cliff. 77. — Roy. Lugd. Bat. 479. — Miller, Dict. n°. 2. — Kniph. Curt. 2. n°. 89. — Jacq. Miscell. vol. 1. pag. 28. Bbb

tab. 3. — Miller, Icon. 258. — Lam. Illustr. Gen. tab. 178. n°. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 213.

Stapelia (hirsuta), corollis quinquefidis, laciniis ovatis, acutiusculis, margine villosis, fundo villosis; pedunculis teretibus, longitudine corollae; ramis ascendentibus, tetragonis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1278. n°. 3.

Stapelia tuberculis crassis, oblongo-rotundis; flore ex luteo & purpureo difflando, ciliari. ? Burm. Altr. pag. 29. tab. 12. fig. 1.

Asclepias africana, aizoides, flore pulchre sumbrato. Commel. Rar. pag. 19. tab. 19. — Bradl. Succ. 3. pag. 5. tab. 23. — Roef. Inf. Musc. tab. 9.

Ses branches sont épaisses, couchées à leur partie inférieure, & pouillent des racines à leurs nœuds. Elles sont redressées à leur partie supérieure, quadrangulaires, succulentes, éralées, très-glabres, d'un vert-foncé dans leur jeunesse, tirant sur le pourpre dans l'automne, marquées de quatre sillons profonds & longitudinaux, garnis sur leurs bords de protubérances ou de tubercules profonds, redressés, acuminés à leur sommet.

De l'aisselle des tubercules sortent des pédoncules simples, épais, cylindriques, de la longueur de la corolle, un peu velus; ils supportent une grande & belle fleur monopétale, plane, ouverte, de couleur jaunâtre, épaisse, charnue, marquée de stries transverses d'un violet-foncé; les découpures grandes, ovales, aiguës, violettes à leurs bords & à leur sommet, couvertes en dedans & à leur contour de poils mous, d'un pourpre agréable; le fond de la corolle d'un rouge-pâle, & les appendices d'un rouge beaucoup plus vif. Ces fleurs sont nombreuses, & durent pendant une grande partie de l'été & de l'automne. Leur calice est court, un peu velu, à cinq découpures ovales-lancéolées, un peu aiguës, légèrement ciliées à leurs bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. M. Desfontaines l'a également observée dans le royaume de Tunis, aux environs de Keroan. On la cultive dans les serres-chaudes du Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

3. STAPÈLE téfléchie. *Stapelia revoluta*. Maff.

Stapelia ramis tetragonis, erectis, denticulatis; dentibus potentibus, corollâ glabrâ, laciniis ciliatis, acutis, revolutis. Maffon & Stapel. pag. 12. n°. 10. tab. 10.

Stapelia corollis quinquefidis, glabris; laciniis ovatis, margine pilosis, revolutis; pedunculis corollâ brevioribus; caule tetragono, basi ramofo, erecto, superne florifero. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1277. n°. 2.

Ses rameaux sont glauques, longs d'un pied, droits, denticulés, à quatre angles aigus, dentés; les dents distantes, ouvertes, aiguës dans leur jeunesse. Les fleurs naissent à la partie supérieure des rameaux. Leur pédoncule est ordinairement solitaire, unistyle, glabre, cylindrique, long de trois à quatre lignes; le calice divisé en cinq découpures glabres, ovales, aiguës; la corolle lisse, monopétale, d'un vert-jaunâtre en dehors, d'un pourpre plus ou moins clair en dedans; son tube court; son limbe partagé, jusque vers la moitié, en cinq découpures ovales, aiguës, fortement recourbées en dehors, ciliées à leurs bords; les cils terminés par une petite glande; le pistil & les étamines saillans hors du tube de la corolle.

Cette plante croît parmi les arbriffeaux, dans les champs arides, au Cap de Bonne-Espérance. h

4. STAPÈLE ridée. *Stapelia fororia*. Maff.

Stapelia ramulis divaricatis, quadrangularibus; angulis denticatis, dentibus remotis, acutis, incurvatis; corollâ unicolori, quinquefidâ; laciniis lanceolatis, planis, centro villosis, margine ciliatis. Maff. Stapel. pag. 23. n°. 39. tab. 39.

Stapelia (fototia), corollis quinquefidis, rugosis; laciniis oblongis, acutis, margine villosis, fundo villosis; pedunculis teretibus, corollâ longioribus; ramis divaricatis, tetragonis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1278. n°. 4.

Quoique très-voisine du *Stapelia hirsuta*, cette espèce en diffère par son port, par ses rameaux diffus, inclinés, à cinq angles profonds; par ses fleurs penchées & presque d'une seule couleur.

Ses tiges sont hautes d'un pied, rameuses, purpurines; ses rameaux épais, quadrangulaires; leurs angles garnis de dents écartées, aiguës, un peu recourbées à leur sommet, épaisses, charnues à leur base; les fleurs situées à la base des rameaux, portées sur des pédoncules simples, solitaires, longs de trois poudres, pendans, d'une couleur purpurine-foncée. Le calice est divisé en cinq découpures profondes, linéaires, aiguës. La corolle est grande, d'un pourpre-foncé, coupé par des rides ondulées, jaunes, transverses; velue dans son centre, à cinq découpures ovales-lancéolées, ridées, aiguës, ciliées à leurs bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

5. STAPÈLE à grandes fleurs. *Stapelia grandiflora*. Maff.

Stapelia ramis quadrangularibus, clavatis; angulis denticatis; dentibus remotis, incurvatis; corollâ magna, planâ, quinquefidâ; laciniis lanceolatis, acutis, margine ciliatis. Maff. Stapel. pag. 13. n°. 11. tab. 11.

Stapelia corollis quinquefidis, villosis; laciniis lanceolato-acuminatis, margine ciliatis; pedunculis basi incrassatis, corollâ brevioribus; ramis erectis, tetragonis, clavatis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1278. n°. 5.

Cette espèce s'élève à la hauteur d'un pied. Ses rameaux sont droits, en masse, pubescents, quadrangulaires; les angles garnis de dents écartées, un peu courbées, terminées par une petite épine molle. Les fleurs sont situées à la partie inférieure des rameaux; les pédoncules épais, charnus, plus courts que la corolle, redressés, souvent munis de trois fleurs; le calice divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle très-grande, plane, velue, d'un pourpre-foncé, à cinq découpures lancéolées, aiguës, garnies à leurs bords de poils & de cils longs, distiques, griffes, très-fins.

On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance, dans les contrées les plus chaudes. h

6. STAPÈLE douteuse. *Stapelia ambigua.* Maff.

Stapelia ramis erectis, quadrangularibus, clavatis; angulis dentatis, remotis, incurvatis; corollâ magnâ, planâ, quinquefidâ; laciniis lanceolatis, hispida, margine ciliatis. Maffon. Stapel. pag. 13. n°. 12. tab. 12.

Stapelia corollis quinquefidis, hispida; laciniis ovato-lanceolatis, acutis, margine villosis; pedunculis multifloris, ramis erectis, tetragonis, clavatis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1279. n°. 6.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un pied & demi ou deux pieds; elles sont rameuses, pubescentes; les rameaux droits, en masse, quadrangulaires; les angles dentés; les dents recourbées en dedans. Les fleurs sont situées vers la partie inférieure des rameaux, soutenues par des pédoncules à trois ou quatre fleurs, munis d'une bractée à la base de chaque pédicelle; le calice divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle grande, plane, hispide, d'un rouge-obscur, à cinq découpures lancéolées, traversées par cinq nervures, ciliées à leurs bords; les cils bifurqués.

Cette plante croît dans les plaines désertes & sablonneuses au Cap de Bonne-Espérance. h

7. STAPÈLE alstée. *Stapelia alsteria.* Maff.

Stapelia ramis pluribus erectis, tetragonis, dentatis; dentibus brevibus, erectis; corollâ magnâ, quinquefidâ; laciniis lanceolatis, margine revolutis, ciliatis. Maff. Stapel. pag. 14. n°. 14. tab. 14.

Stapelia corollis quinquefidis, laciniis ovato-acuminatis, rugosis, margine revolutis, villosis; pedunculis longitudine corollæ; ramis erectis, tetragonis,

attenuatis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1280. n°. 8.

Ses rameaux sont droits ou redressés, nombreux, inégaux, tétragones, hauts de six à neuf pouces, dentés sur leurs angles; les dents droites, petites, un peu courbées en dedans, terminées par une pointe. Les fleurs naissent à la base des jeunes rameaux. Le pédoncule est ordinairement solitaire, cylindrique, pubescent, long de deux pouces, unifoire; le calice divisé en cinq découpures linéaires, aiguës; la corolle grande, purpurine, avec des raies jaunâtres & transverses, profondément divisée en cinq découpures ouvertes, ridées, obliques, lancéolées, réfléchies & ciliées à leurs bords; le tube presque nul.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance. h

8. STAPÈLE étalée. *Stapelia pulvinata.* Maff.

Stapelia ramis ramulisque tetragonis, reclinantis, dentatis; corollâ quinquefidâ, planâ, medio villosâ; laciniis patentissimis, rugosis, acuminatis, ciliatis. Maff. Stapel. pag. 13. n°. 13. tab. 13.

Stapelia corollis quinquefidis, laciniis f. rotundis, rugosis, acuminatis, margine villosis; fundo elevato, villosis; caule tetragono, decumbente; ramis ascendentibus, floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1279.

Vulgairement rose d'Arabie.

Cette plante est basse; ses rameaux, nombreux, inclinés, radicans, ont à peine six à huit pouces de haut; ils sont tétragones, ascendants, munis de dents redressées. Les fleurs, situées à la base des rameaux, dans leur aisselle, sont ordinairement solitaires, cylindriques, au moins de la longueur des fleurs. La corolle est très-grande, belle, d'un pourpre-foncé, avec des rides blanchâtres; son centre élevé, très-velu; les découpures très-amplées, oblongues, un peu arrondies, acuminées, ridées, ciliées à leurs bords. La corolle, avant son épanouissement, est presque globuleuse, à cinq angles, renflée, à cinq nervures extérieures, concave à son sommet.

Cette espèce croît parmi les buissons, au Cap de Bonne-Espérance.

9. STAPÈLE gemmiflore. *Stapelia gemmiflora.* Maffon.

Stapelia ramis pluribus erectis, tetragonis, dentatis; dentibus suberectis, acutis; corollâ planâ, scabrâ, quinquefidâ; laciniis ovato-lanceolatis, margine ciliatis. Maff. Stapel. pag. 14. n°. 15. tab. 15.

Stapelia corollis quinquefidis, scabris; laciniis ovatis, acutis, margine ciliatis, superne quinque nerviis; pedunculis longitudine corollæ, ramis erectis,

tetragonis, inferius floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1280. n°. 9.

Cette plante n'a que six à sept pouces de haut; elle est composée de plusieurs rameaux droits, glabres, tétragones, garnis sur leurs angles de dents redressées, terminées par une petite pointe épineuse. Les fleurs sont situées à la partie inférieure des rameaux; les pédoncules réunis au nombre de deux ou trois dans l'aisselle des dents, glabres, cylindriques, longs de deux lignes; le calice se divise en cinq découpures lancéolées, aiguës. La corolle est grande, d'une couleur sombre, presque d'un noir-foncé, quelquefois parsemée de points dorés; tendre, tuberculeuse, à cinq découpures ovales, lancéolées, aiguës, ciliées à leurs bords, traversées par cinq nervures.

Cette plante croît dans les sols arides, parmi les buissons, au Cap de Bonne-Espérance. *h*

10. STAPÈLE divariqué. *Stapelia divaricata.* Millon.

Stapelia ramis pluribus tetragonis, divaricatis, glabris, dentatis; dentibus parvis, subciliis; corollâ glaberrimâ, quinquefidâ; laciniis lanceolatis patentibus, margine revolutis, ciliatis. Mass. Stapel. pag. 17. n°. 11. tab. 22.

Stapelia corollis quinquefidâ, glabris; laciniis lanceolatis, acuminatis, margine revolutis, ciliatis; pedunculis corollâ longioribus; ramis tetragonis, attenuatis, divaricatis patentibus, medio floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1280. n°. 10.

Ses tiges se divisent en branches & en rameaux très-glabres, longs de six à sept pouces, étroits, aigus, presque acuminés, très-étalés, quelquefois incurvés en dehors, quadrangulaires, garnis sur leurs angles de petites dents presque droites, distantes, obtuses. Les fleurs naissent vers le milieu des rameaux, dans l'aisselle des dents, réunies quelquefois au nombre de deux ou trois, soutenues par des pédoncules glabres, cylindriques, au moins longs d'un pouce; le calice se divise en cinq découpures linéaires, aiguës. La corolle est très-glabre, luisante, d'un vert-brun en dehors, d'une seule couleur en dedans, d'un rouge de chair, à cinq découpures très-ouvertes, un peu étroites, plus courtes que le pédoncule, acuminées, roulées & un peu ciliées à leurs bords.

Cette espèce se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h*

11. STAPÈLE rouffêâtre. *Stapelia rufa.* Mass.

Stapelia ramis ramulisque erectis, tetragonis, angustè acutatis; dentibus erectis; corollâ quinquefidâ; laciniis trian-gularibus, acutis, rugosis, margine ciliatis. Mass. Stapel. pag. 16. n°. 10. tab. 20.

Stapelia corollis quinquefidâ, rugosis; laciniis

lanccolato-acuminatis, margine ciliatis; fundo filato; pedunculis corollâ brevioribus; ramis tetragonis, erectis, hufi floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1281. n°. 11.

Ses tiges sont droites, glabres, hautes de trois à quatre pouces, divisées en quelques rameaux courts, alternes, qui prennent souvent une couleur rouffêâtre, un peu ramifiés, droits, à quatre faces, dentées sur leurs angles; les dents droites & obtuses. Les fleurs sont réunies au nombre de deux ou trois à la base des rameaux, soutenues par des pédoncules axillaires, longs d'environ un demi-pouce, cylindriques, de couleur purpurine; le calice partagé en cinq découpures linéaires, aiguës. La corolle est à peu près aussi grande que celle du *periploca grac*, plane, d'un violet-obscure, marquée de lignes transverses, d'un pourpre-foncé, divisée en cinq découpures lancéolées, acuminées, plus longues que les pédoncules, ridées, légèrement ciliées à leurs bords; le fond d'une couleur rouffêâtre, panaché.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les contrées les plus chaudes. *h*

12. STAPÈLE acuminée. *Stapelia acuminata.* Mass.

Stapelia ramis pluribus subciliis, tetragonis, dentatis; corollâ quinquefidâ, planâ, glabrâ, rugosâ; laciniis caudato-acuminatis, margine ciliatis. Mass. Stapel. pag. 15. n°. 17. tab. 17.

Stapelia corollis quinquefidâ, rugosis; laciniis ovatis, cuspidato-acuminatis, margine ciliatis; pedunculis corollâ brevioribus; ramis tetragonis, adscendentibus, medio floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1281. n°. 12.

Ses tiges se divisent en plusieurs rameaux glabres, redressés, inégaux, tétragones, hauts de six à sept pouces; dentées sur leurs angles. Les fleurs sont situées vers le milieu des rameaux. Les pédoncules sont courts, réunis au nombre de trois ou quatre, cylindriques, glabres, uniflores; le calice divisé en cinq découpures ovales, aiguës; la corolle glabre, plane, ridée, à cinq découpures étroites, longuement acuminées, ciliées à leurs bords, d'un pourpre-noirâtre vers leur extrémité, de couleur cendrée sur le reste.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

13. STAPÈLE inclinée. *Stapelia reclinata.* Mass.

Stapelia ramis pluribus tetragonis, reclinatis, dentatis; dentibus acutis, patentibus; corollâ quinquefidâ, recurvâ; laciniis patentibus, replicatis, sum-briatis. Mass. Stapel. pag. 91. n°. 18. tab. 28.

Stapelia corollis quinquefidâ; laciniis lanceolatis, margine ciliatis; fundo elevato; pedunculis corollâ longioribus; ramis patentibus, tetragonis, super bu-

fu floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 1282. n.º. 13.

Ses tiges ou plutôt ses rameaux sont glabres, longs de trois à quatre pouces, pressés, la plupart recourbés, tétragones, dentés; les dents ouvertes, aiguës. Les fleurs sont souvent solitaires, situées un peu au dessus de la base des rameaux, supportées par des pédoncules simples, ou ramifiées quelquefois en deux ou trois petites branches glabres, longs d'un pouce; le calice à cinq découpures aiguës, lancéolées; la corolle d'une grandeur médiocre, plus longue que les pédoncules, à cinq découpures lancéolées, aiguës, coudées presque à leur base, ciliées & frangées à leurs bords, d'un pourpre-foncé en dedans, glabres & verdâtres en dehors.

On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance. h

14. STAPÈLE élégante. *Stapelia elegans*. Mass.

Stapelia ramis pluribus confertis, oblongis, dentatis; dentibus patentibus, acutis; corollâ quinquefidâ; laciniis triangularibus, hispida; margine sinuatis. Masson, Stap. l. pag. 19. n.º. 27. tab. 27.

Stapelia corollis quinquefidis, hispida; laciniis lanceolatis, margine ciliatis; fundo pentagono; pedunculis corollâ longioribus; ramis distichis, oblongis, teretibus; tetragonis, medio floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1282. n.º. 14.

Cette plante est basse, rampante; ses tiges ou ses principales branches sont étendues sur la terre, nombreuses, pressées, allongées, radicales, un peu cylindriques ou médiocrement tétragones, glabres, dentées; les dents courtes, un peu épaissies, recourbées, aiguës; les fleurs réunies au nombre de deux ou trois, situées à la partie inférieure des rameaux; les pédoncules glabres, cylindriques, longs d'un demi-pouce, le calice divisé en cinq découpures presque triangulaires, aiguës; la corolle monopétale à cinq angles, un peu recourbée, partagée en cinq découpures triangulaires, pointues, hispides, frangées & roulées à leurs bords; la couleur est d'un pourpre-noirâtre; le fond de la corolle roussâtre; l'appendice à cinq rayons, d'un jaune de soufre.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. h

15. STAPÈLE touffue. *Stapelia caespitosa*. Mass.

Stapelia ramis confertis, procumbentibus, tetragonis, dentatis; dentibus acutis, patentibus; corollâ quinquefidâ, recurvatis; laciniis patentibus, repliatis, ciliatis. Mass. Stap. l. p. 20. n.º. 19. tab. 29.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis lanceolatis, acutis, margine revolutis, ciliatis; pedunculis longioribus corollâ; ramis procumbentibus, tetragonis

supra & infra floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1282. n.º. 15.

Cette espèce forme par ses tiges très-basses, nombreuses & terrestres, des gazons d'un beau vert glauque; les rameaux sont très-courts, longs d'un à deux pouces, glabres, médiocrement tétragones, dentés; les dents ouvertes, aiguës, épaissies & charnues à leur base. Les fleurs sont situées vers la partie inférieure des rameaux, réunies souvent deux ou trois dans l'aisselle des dents; leurs pédoncules glabres, cylindriques, de couleur purpurine, longs d'environ trois lignes, très-simples; les découpures du calice lancéolées, aiguës; la corolle à peine plus grande que les pédoncules, à cinq découpures ouvertes, étroites, aiguës, coudées vers leur base, un peu roulées en dehors & ciliées à leurs bords; la couleur d'un pourpre-foncé; le fond de la corolle verdâtre; l'appendice d'un jaune de soufre, à cinq rayons en otolie.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, sous les arbrisseaux. h

16. STAPÈLE aride. *Stapelia arida*. Mass.

Stapelia ramis pluribus erectis, tetragonis, dentatis; dentibus patentibus, acutis; floribus solitariis, pedunculis; corollâ laciniis planis, setaceis. Mass. Stap. l. pag. 21. n.º. 33. tab. 33.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis oblongis, acutis, apice marginis ciliatis, fundo circulari; pedunculis corollâ longioribus; ramis tetragonis, erectis, apice floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1283. n.º. 16.

Ses rameaux sont nombreux, serrés, très-droits, un peu grêles, hauts de trois à quatre pouces, quadrangulaires; les angles sinués, dentés; les dents écartées, très-ouvertes ou un peu courbées, aiguës, presque semblables à des épines. Les fleurs sont solitaires, situées à la partie supérieure des rameaux, soutenues par des pédoncules simples, droits, solitaires; plus longs que la corolle; le calice partagé en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle petite, à cinq découpures planes, ovales, lancéolées, pointues, ciliées sur leurs bords, vers leur sommet; la couleur est d'un blanc-jaunâtre; les appendices de couleur blanche.

On rencontre cette plante dans les lieux arides & déserts, au Cap de Bonne-Espérance. h

17. STAPÈLE à petites fleurs. *Stapelia parviflora*. Mass.

Stapelia ramis pluribus tetragonis, dentatis, recurvatis; corollâ parvâ; laciniis angustis, planis, patentibus, margine ciliatis. Mass. Stap. l. pag. 22. n.º. 35. tab. 35.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis lanceolâ-

is, obtusifolia, margine ciliatis; pedunculis corollæ longioribus; ramis tetragonis, patentibus, medio exsertentes floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1283. n°. 17.

Plante glabre, haute d'un pied, droite, rameuse; les rameaux quadrangulaires, dentés sur leurs angles; les dents dilatables, recourbées; les fleurs réunies au nombre de deux, quelquefois trois, à la partie supérieure des rameaux, situées sur une callosité entre les angles; les pédoncules inclinés, plus longs que la corolle; le calice divisé en cinq petites découpures aiguës. La corolle est fort petite, divisée en cinq découpures linéaires-lanceolées, planes, très-ouvertes, ridées, ciliées à leurs bords, d'un jaune-verdâtre; l'appendice à cinq rayons d'un jaune-orange; tout le reste de la plante d'une teinte purpurine.

Cette espèce croit au Cap de Bonne-Espérance, sous des arbustes, au pays des Namaquois. *h*

18. STAPÈLE subulée. *Stapelia subulata*. Willd.

Stapelia corollis quinquefidis, natisantibus; laciniis oblongis, acuminato-cuspidatis, pilosis; pilis fecundis; ramis tetragonis, attenuatis, natisantibus, subapice floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1283. n°. 18.

Stapelia (subulata), quadrangula, spithamalis. Forsk. Catalog. Plant. Arab. pag. 108. n°. 193. tab. 7.

Cette espèce s'élève fort peu, & ses tiges parviennent à peine à la hauteur de six à huit pouces; elles se divisent en rameaux à quatre faces, insensiblement rétrécies vers leur sommet, inclinées & portant à leur partie supérieure des fleurs de la grandeur de celles du *Stapelia arida*. Les corolles sont inclinées, divisées en cinq découpures oblongues, acuminées, cuspidées à leur sommet, munies vers leur pointe de poils couchés & tournés du même côté.

Cette plante a été observée par Forskhal dans l'Arabie heureuse. *h*

19. STAPÈLE mignone. *Stapelia concinna*. Moß.

Stapelia ramis ramulisque erectis, tetragonis, glaberrimis; angulis dentatis, dentibus erectis; corollâ quinquefidâ, planâ, hispidâ. Moß. Stapel. pag. 15. n°. 18. tab. 18.

Stapelia corollis quinquefidis, hispidis; laciniis ovatis, acutis, ciliatis; pedunculis longitudine corollæ; caule tetragono, erecto, superne rufoso; ramis parvis, simplicibus, basi floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1234. n°. 19.

Ses tiges n'ont guère que trois à quatre pouces de haut; elles sont glabres, divisées à leur partie

supérieure en rameaux droits, tétragones, dentés sur leurs angles; les dents droites, aiguës. Les fleurs sont situées à la base des jeunes rameaux, ordinairement réunies deux ensemble, soutenues par des pédoncules glabres, cylindriques, de couleur purpurine, longs d'un pouce; la corolle à peine aussi longue que le pédoncule, à cinq découpures ovales-lanceolées, aiguës, ridées, hispides, ciliées à leurs bords, de couleur cendrée, parsemée de poils blanchâtres, traversée par de petites taches d'un rouge-foncé; le fond de la corolle d'une couleur brune-foncée.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h*

20. STAPÈLE glanduleuse. *Stapelia glandulifera*. Moß.

Stapelia ramis pluribus suberectis, tetragonis; angulis dentatis; dentibus erectis, acutis; corollâ planâ, glandulis fecundis, clavatis testâ; laciniis ovato-lanceolatis, acutis, patentibus. Moß. Stapel. pag. 16. n°. 19. tab. 19.

Stapelia (glandulifera), corollis quinquefidis, pilis apice glanduliferis, testâ; laciniis ovatis, acutis; pedunculis corollâ longioribus; ramis parvis, tetragonis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1284. n°. 20.

Cette plante pousse de ses racines plusieurs tiges hautes de six ou sept pouces, divisées en rameaux presque droits, à quatre faces; les angles munis de grosses dents charnues, terminées par une pointe un peu obtuse, droite, glabre. Les fleurs naissent à la base des rameaux, dans leurs aisselles, au nombre de deux ou trois, soutenues par des pédoncules simples, cylindriques, de couleur purpurine. Le calice est partagé en cinq découpures velues, linéaires, aiguës; la corolle plane, plus courte que le calice, de la grandeur de celle de l'anémone des bois, à cinq découpures ovales-lanceolées, parsemées de points rougeâtres-foncés, & couvertes de glandes sécrétées en tête de clou, & de poils blanchâtres. Le fond de la couleur est d'un jaune de soufre; l'étoile du centre de couleur orangée; le fond de la corolle très-brun.

Cette espèce croît dans les lieux déserts & arides, au Cap de Bonne-Espérance. *h*

* Corolle à cinq découpures glabres à leurs bords.

21. STAPÈLE pédunculée. *Stapelia pedunculata*. Moß.

Stapelia ramis pluribus divaricatis, tetragonis, suberectis; pedunculis longissimis, corollâ quinquefidâ, laciniis lanceolatis, margine revolutis; angulis fimbriatis. Moß. Stapel. pag. 17. n°. 21. tab. 21.

Stapelia corollis quinquefidis, laciniis lanceolatis,

acuminatis, margine glandulis pedunculatis cinctis; pedunculis ramis duplo longioribus; ramis tetragonis, apice subidentatis, medio floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1284. n°. 21.

Cette espèce se distingue aisément de toutes celles de ce genre par la longueur de ses pédoncules, & par la forme particulière de ses rameaux & de ses fleurs.

Ses tiges sont droites, glabres, hautes de trois à quatre pouces, divisées en plusieurs rameaux diffus, de couleur glauque, tétragones, à angles très-obtus, marqués à leurs bords de rentiements très-obtus au lieu de dents, terminés à leur sommet par trois ou quatre tubercules à peine aigus, en forme de dents droites, un peu rougeâtres.

Les fleurs sont réunies, presque en fascicule, au nombre de quatre ou cinq à la partie inférieure des plus jeunes rameaux, supportées par des pédoncules glabres, droits, cylindriques, presque une fois aussi longs que les rameaux. Le calice est découpé en cinq parties aiguës; la corolle de la grandeur de celle du *cineraria lanata*, d'un brun-pourpre-foncé en dedans, verte ou un peu brune en dehors, à cinq découpures un peu étroites, lancéolées, aiguës, un peu ridées, roulées en dehors à leurs bords, marquées de points grisâtres à leur base, & de fascicules de glandes pédicellées; le fond de la corolle d'un brun-noirâtre. Elle varie dans ses couleurs; les fleurs sont quelquefois jaunes.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, dans les contrées sèches & arides. 75

21. STAPÈLE ouverte. *Stapelia aperta*. Maff.

Stapelia ramis pluribus divaricatis, tetragonis, densatis; dentibus obtusissimis; pedunculis longiusculis; corollâ quinquefidâ, planâ; laciniis ovatis, obtusis, rugosis. Maffon. Stapel. pag. 23. n°. 37. tab. 37.

Stapelia corollis quinquefidâ, rugosis; laciniis ovatis, obtusis, margine glabris; pedunculis ramis duplo longioribus, ramis tetragonis, apice subidentatis, hâp floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1285. n°. 22.

Elle a beaucoup de rapport avec la *Stapelia pedunculata*, mais elle en diffère par la forme de la fleur & par plusieurs autres caractères.

Ses tiges sont basses, hautes d'un pouce & demi ou deux pouces, presque uniquement composées de rameaux simples, diffus, droits, de couleur glauque, tétragones, à peine dentées sur leurs angles, terminés par trois dents très-obtuses. Les fleurs sont ordinairement solitaires, situées à la base des rameaux, supportées par des pédoncules presque une fois plus longs que les tiges. La corolle est plane, à cinq découpures ovales, obtu-

ses, ridées, ponctées sur un fond d'un pourpre-foncé, traversées par cinq nervures; un appendice circulaire cendré.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, dans le pays des Namaquois. 75

22. STAPÈLE de Gordon. *Stapelia Gordoni*. Maffon.

Stapelia ramis ramulifera teretibus, tuberculatis; tuberculis spinosis; pedunculis solitariis; corollâ magnâ, decemfidâ. Maffon. Stapel. pag. 24. n°. 40. tab. 40.

Stapelia corollis quinqueidentatis, planis, rotatis; pedunculis corollâ brevioribus, ramis apice floriferis, teretibus, tuberculatis; tuberculis spinosis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1285. n°. 23.

Cette belle espèce diffère de toutes les autres par la forme de la corolle entière & par ses follicules solitaires.

Ses rameaux sont droits, cylindriques, épais, obtus, tuberculés; les tubercules chargés dans leur milieu d'une épine droite. Les fleurs sont situées à la partie supérieure des rameaux; les pédoncules solitaires, plus courts que la corolle, simples, glabres, cylindriques, verdâtres; le calice court, à cinq divisions profondes, lancéolées, aiguës; la corolle très-grande, plane, entière, large d'environ trois pouces; son limbe très-ouvert, un peu ondulé ou obscurément lobé à ses bords, muni de cinq dents courtes, aiguës, élargies à leur base, d'un brun-jaunâtre un peu clair; le fond blanchâtre; l'appendice à cinq lobes courts, noirs dans leur milieu, blancs à leurs bords; les follicules solitaires, étroites, longues, aiguës.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, dans le pays des Namaquois, sur le bord des rivières. 75

24. STAPÈLE portepoil. *Stapelia pilifera*. Maff.

Stapelia ramis pluribus teretibus, sulcatis, tuberculatis; tuberculis piliferis; floribus sessilibus, solitariis. Maff. Stapel. pag. 17. n°. 23. tab. 23.

Stapelia corollis quinquefidâ, laciniis ovatis, cuspidato-acuminatis, margine glabris; floribus sessilibus, ramis apice floriferis, teretibus tuberculatis, tuberculis sed infimis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1286. n°. 24.

Stapelia caule tereti, mamillifero-tuberculato, mamillis apice piliferis. Linn. f. Suppl. pag. 171.

Stapelia caule aphyllâ, tereti; mamillis ciliato-erectis, flore sessili. Thunb. Prodr. pag. 46.

Vulgairement guap par les Hottentots.

Cette espèce est très-singulière & bien distin-

guées des autres par ses formes. Ses tiges sont simples, ramassées, ou bien ce sont autant de rameaux simples, qui partent presque du collet de la racine. Elles sont épaisses, très-charnues, cylindriques, ovales-oblongues, sillonnées, chargées de tubercules nombreux, saillans, terminés par un poil étacé.

Les fleurs sont solitaires, sessiles, placées entre les tubercules le long des rameaux, particulièrement vers leur sommet. Leur calice est à cinq divisions lancéolées, aiguës; la corolle assez petite, d'un pourpre-foncé, avec un cercle rougêtré dans le centre; à cinq découpures très-ouvertes, ovales, acuminées; un anneau élevé dans le fond de la corolle, environnant les parties de la fructification.

On rencontre cette espèce au Cap de Bonne-Espérance, dans les lieux déserts, sur les collines sèches & arides. η

Les Hortentors se nourrissent quelquefois de cette plante, qu'ils nomment *gadap*.

25. STAPÈLE à queue. *Stapelia caudata*. Thunb.

Stapelia caule folioso, foliis linearibus-oblongis, flore pedunculato, laciniis corollae linearibus. Thunb. Prodr. pag. 46.

Stapelia (caudata), corollae quinquefidis; laciniis linearibus, acutis; pedunculis corollae brevioribus, acaulis; caule hirsuto, folioso. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1286. n° 25.

Dans cette espèce les tiges sont hérissées de poils & garnies de feuilles linéaires, oblongues. Les pédoncules sont pendans, plus courts que la corolle. Celle-ci est glabre, divisée en cinq découpures linéaires, aiguës.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. η

26. STAPÈLE articulée. *Stapelia articulata*. Mass.

Stapelia articulis ramorum oblongis, teretibus, reticulatum obsolete verrucosis; spinulis minutis, floribus subsessilibus, corollis supra papillofis, laciniis triangularibus. Masson, Stapel. pag. 20. n° 30. tab. 30. — Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 310.

Stapelia corollis quinquefidis, papillofis; laciniis lanceolatis, floribus subsessilibus; ramis apice floriferis, teretibus, tuberculatis; tuberculis mucronatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1287. n° 26.

Cette espèce est très-distincte, remarquable par ses tiges basses, couchées, chargées de rameaux articulés, épais, courts, cylindriques, composés de tubercules très-serrés, disposés en réseau, d'un vert un peu pourpre, convexes, munis dans leur milieu d'une petite dent mucronée. Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux; les

pédoncules simples, très-courts; la corolle petite, mais plus grande que les pédoncules, à cinq découpures triangulaires, aiguës, un peu mamelonnées à leur face supérieure. La couleur est d'un pourpre-noirâtre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. η

Les naturels du pays mangent en sa'ale, assaisonnés avec du vinaigre, les jeunes rameaux de cette plante.

27. STAPÈLE mamillaire. *Stapelia mammillaris*. Linn.

Stapelia corollis quinquefidis, glabris; laciniis lanceolatis; pedunculis corollae brevioribus; ramis medio floriferis, erectis, hexagonis, tuberculatis; tuberculis spinosis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1287. n° 27.

Stapelia denticulata ramorum obtusis, mucronatis. Linn. Syst. veget. pag. 260. n° 3. — Maniuf. pag. 116.

Stapelia (mammillaris), caule aphylo, hexagono; denticulis reflexis, flore subpedunculato, laciniis corollae alatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Stapelia aphyllus, ad nodos mammillaris; flosculo rubello, siliquis pendulis. Burm. Afric. pag. 27. tab. 11.

Ses tiges sont au moins de la grosseur du poing, divisées dès leur base en quelques rameaux courts, épais, droits, à six faces, chargés de tubercules ou de mamelons obtus, mucronés, glabres, presque épineux, très-serrés, charnus; l'épine qui en occupe le milieu est forte, courte, un peu recourbée.

Les fleurs sont situées vers le milieu des rameaux, dans l'aisselle des tubercules, supportées par un pédoncule plus court que la corolle, ayant à sa base deux petites feuilles en forme d'écaillés, droites, colorées en pourpre. La corolle est petite, d'un rouge-pourpre, glabre, à cinq découpures droites, colorées en pourpre. Il lui succède deux follicules de la longueur du doigt, épais, étroits, de couleur cendrée, pendans, à une seule loge, à une seule valve, qui s'ouvre longitudinalement à un de ses côtés.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. η

28. STAPÈLE neigeuse. *Stapelia bruinosa*. Mass.

Stapelia ramis tetragonis, dentatis; denticibus recurvatis; laciniis corollae planis, ovatis, pilosis. Mass. Stapel. pag. 24. n° 41. tab. 41.

Stapelia corollis quinquefidis, pubescentibus; laciniis ovatis, acutis; pedunculis flore brevioribus; ramis erectis, tetragonis, medio floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1287. n° 28.

Ses tiges sont droites, purpurines, rameuses, hautes d'un pied & demi; les rameaux redressés, tétragones, munis de dents fort petites, courtes, recourbées; les angles arrondis. Les fleurs sont fort petites, solitaires, ou plus souvent réunies deux ou trois à la partie supérieure des rameaux; les pédoncules courts, cylindriques, d'un pourpre-rougeâtre. Le calice est divisé en cinq découpures ovales, aiguës; la corolle plus grande que les pédoncules, d'un brun très-foncé, petite, à cinq découpures planes, ovales, un peu aiguës, pileuses, couvertes de poils très-courts, blanchâtres, couchés, semblables à une poussière blanche.

Cette espèce se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, au pays des Namaquois, dans les contrées sèches & brûlantes. η

29. STAPÈLE rameuse. *Stapelia ramosa*. Mass.

Stapelia ramis pluribus erectis, tetragonis, dentatis; dentibus abbreviatis; floribus aggregatis, subsessilibus; corollarum laciniis lanceolatis, acutis, repliatis. Masson, Stapel. pag. 21. n°. 32. tab. 32.

Stapelia corollis quinquefidis, planis; laciniis lanceolatis, margine revolutis; pedunculis flore brevioribus; ramis erectis, tetragonis, media extra dentes floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1288. n°. 29.

Cette espèce s'élève à la hauteur d'un pied & plus. Ses tiges sont très-glabres; les rameaux nombreux; d'autres plus petits, tous quadrangulaires; les angles faillans, légèrement sinués à leurs bords, munis de dents très-petites, peu marquées, distantes, obtuses. Les fleurs sont ramassées plusieurs ensemble à la partie supérieure des rameaux, au dessus de leurs dents supportées par des pédoncules courts. Le calice est partagé en cinq petites découpures aiguës; la corolle plus grande que les pédoncules, à cinq découpures lanceolées, presque planes, un peu redressées, aiguës, roulées en dehors à leurs bords. La couleur est d'un pourpre-noirâtre, avec un cercle blanc dans le fond de la corolle.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, sur le bord des eaux thermales. η

30. STAPÈLE enfumée. *Stapelia pulla*. Mass.

Stapelia subhexagona, erecta; aculeis patentissimis; floribus sessilibus, aggregatis; corollarum laciniis lanceolatis, supra halocricis, repliatis. Mass. Stapel. pag. 21. n°. 31. tab. 31.

Stapelia (pulla), corollis quinquefidis; laciniis erectis, lanceolato-acuminatis, margine revolutis; pedunculis flore brevioribus; ramis erectis, subhexagonis, medio extra dentes floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1288. n°. 30.

Stapelia (fasciculata), caule apophyllo, subhexagona. Botanique. Tome VII.

gonia; denticulis patentibus, acutis; flore pedunculato. Thunb. Prodr. 46. ?

Cette espèce a des rapports avec la *Stapelia ramosa*; elle en diffère par le nombre des angles de ses rameaux, par les fleurs plus grandes, par leur position hors des dents, mais point posées sur des callosités; enfin par les découpures droites de la corolle.

Ses tiges sont hautes de six à sept pouces; les rameaux droits, presque à six angles; les angles légèrement sinués à leurs bords, & munis de dents fortes, distantes, très-ouvertes, en forme d'épines. Les fleurs sont placées vers le milieu des rameaux, réunies au nombre de trois ou quatre; les pédoncules très-courts; le calice à cinq petites découpures aiguës; la corolle profondément divisée en cinq découpures lanceolées, presque droites, aiguës, repliées extérieurement à leurs bords; la couleur d'un pourpre-noirâtre, très-foncée.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les sols sablonneux & brûlants. η

31. STAPÈLE ascendante. *Stapelia ascendens*. Roxb.

Stapelia corollis quinquefidis, glabris; laciniis linearibus, margine reflexis, acutis; pedunculis corollâ brevioribus; caule tetragono, ascendente, apice florifero. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1288. n°. 31.

Stapelia ascendens. Roxb. Coromand. 1. p. 28. tab. 30.

Ses tiges, un peu couchées à leur base, sont relevées & ascendantes, tétragones, dentées; les fleurs situées à la partie supérieure des rameaux, supportées par des pédoncules glabres, simples, plus courts que la corolle; le calice à cinq découpures courtes, aiguës; la corolle petite, de la grandeur de celle du *periplostema gracile*, de couleur jaunâtre, très-glabre, à cinq découpures linéaires, aiguës, un peu roulées à leurs bords, violettes à leur sommet.

Cette plante croît dans les sols arides & sablonneux aux Indes orientales. η

32. STAPÈLE à quatre angles. *Stapelia quadrangula*. Forskh.

Stapelia corollis quinquefidis; floribus sessilibus; caule tetragono; ramis divaricatis, apice floriferis; dentibus truncatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1289. n°. 32.

Stapelia (quadrangula), foliis linearibus subulatis, conjugatis. Forskh. Flor. ægypt. pag. 52. tab. 6.

Ses tiges sont quadrangulaires, légèrement dentées sur leurs angles, d'un vert-obscure, rameux.

C c c

ses, hautes d'un pied & demi ou deux pieds; les rameaux étalés, très-courts; ceux des cœurs à peine longs d'un pouce, munis de dents tronquées à leur sommet. Les fleurs sont petites, sessiles, très-rapprochées, finies à l'extrémité des rameaux. La corolle est d'un vert-jaunâtre, à cinq divisions ouvertes, renfermant cinq étamines, deux-êtres deux styles. Les calices sont courts, persistants, divisés en cinq dents à leur orifice. Le fruit consiste dans deux follicules longs d'environ deux pouces, quelquefois beaucoup plus longs; ils renferment des semences nombreuses, imbriquées, aiguës.

Cette plante a été observée par Forskhal, dans l'Arabie heureuse. Le suc qui en découle, est aqueux & non laiteux. *h* (*Descript. ex Forsk.*)

33. STAPÈLE incarnate. *Stapelia incarnata*, Mass.

Stapelia ramis caulis, tetragonis, dentatis; dentibus patentibus, acutis; floribus fasciculatis; corollam laciniis lanceolatis, planis. Masson, Stapel. pag. 22. n°. 34. tab. 34.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis lanceolatis, acutis; pedunculis corollis brevioribus; ramis tetragonis, sessilibus, apice extra dentes floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1289. n°. 33.

Stapelia quadrangularis, dentibus horizontalitruncatis, callosis. Linn. f. Suppl. pag. 171. — Syst. veget. pag. 260. n°. 5.

Stapelia caule aphylo, tetragono; dentibus patentibus, flore sessili, laciniis corolla obtusis. Thunb. Prodr. 46.

Euphorbium erectum, quadrangulare, spinosum; ramis laterolibus rotundis, foliosis. Burm. Afric. pag. 15. tab. 7. fig. 1.

Ses racines ne sont composées que de quelques fibres grêles, presque simples, longues de deux à trois pouces. Les tiges sont droites, rameuses, tétragones, glabres, vertes, épaisses, charnues, hautes d'un pied, dentées sur leurs angles; les dents courtes, horizontales, aiguës ou un peu calleuses; celles des rameaux sont droites, épaisses, plus alongées, aiguës, & ressemblent quelquefois à de petites feuilles charnues.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des rameaux, éparfes, point axillaires, soutenues par des pédoncules beaucoup plus courts que la corolle. Celle-ci est petite, de couleur incarnate, quelquefois entièrement blanche ou blanche en dedans, & colorée en dehors par une légère teinte pourpre; son limbe se divise en cinq découpures étroites, lancéolées, aiguës. Le calice est court, persistant, à cinq découpures lancéolées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance,

dans les champs arides & sablonneux. Elle sert quelquefois d'aliments aux naturels du pays. *h*

34. STAPÈLE ponctuée. *Stapelia punctata*, Mass.

Stapelia articulata ramorum oblongis, subtetragonis, dentatis; floribus fasciculatis; corollarum laciniis lanceolatis, acutis, patentibus, supra parvis. Masson, Stapel. pag. 18. n°. 34. tab. 24.

Stapelia corollis quinquefidis, campanulatis; laciniis patentibus, lanceolatis, acutis; pedunculis corollis duplo longioribus; ramis decumbentibus, oblongis, subtetragonis, medio floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1289. n°. 34.

Plante rampante, dont les rameaux sont presque couchés, courts, épais, très-glabres, & comme articulés les uns aux autres, médiocrement tétragones, dentés sur leurs angles; les dents charnues, épaisses à leur base, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont réunies trois ou quatre dans l'aisselle des dents, situées vers la partie supérieure des rameaux, portées sur des pédoncules glabres, cylindriques, plus longs que la corolle, de couleur pourpre, longs d'environ un pouce & demi. Le calice est divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës d'un pourpre-foncé; la corolle de la grandeur de celle du *Stapelia rufa*, presque campanulée, à cinq découpures très-ouvertes, aiguës, d'un blanc incarnat piqué de rouge; le fond du tube d'une couleur plus foncée; l'appendice étoilé, d'un jaune-orangé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans le pays des Namaquois. *h*

35. STAPÈLE gémée. *Stapelia geminata*, Mass.

Stapelia ramis oblongis, subtetragonis, dentatis; dentibus parvis; floribus geminatis; corollarum laciniis lanceolatis, acutis, margine revolutis. Mass. Stapel. pag. 18. n°. 25. tab. 25.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis lanceolatis, marginibus revolutis; pedunculis geminatis, longitudine corollae; ramis decumbentibus, teretibus, apice floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1290. n°. 35.

Cette espèce se distingue du *Stapelia punctata* par sa corolle bien moins campanulée, par ses fleurs gémées, par la forme des dents.

C'est une plante basse, dont les rameaux sont très-nombreux, couchés, étalés sur la terre, munis de petites racines, médiocrement tétragones, courts, épais, garnis de dents fort petites, aiguës, distantes, point renflées à leur base. Les fleurs sont réunies deux par deux vers l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules glabres, cylindriques; le calice partagé en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle de la

longueur des pédoncules, à cinq découpures étroites, lancéolées, très-ouvertes, glanduleuses, roulées en dehors à leurs bords; la couleur est un fond orangé, parsemé de points d'un rouge-foncé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les contrées chaudes, sous les arbres. γ

36. STAPÈLE ornée. *Stapelia decora*. Maff.

Stapelia articulata ramorum oblongis, subteretibus; floribus geminatis; corollarum laciniis lanceolatis, acutis, supra scabris, margine revolutis. Maffon, Stapel. pag. 19. n°. 26. tab. 26.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis ovato-lanceolatis, margine revolutis; fundo pentagono; pedunculis flore longioribus; ramis oblongis, decumbentibus, teretibus, obolescentibus, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1290. n°. 36.

Ses rameaux sont allongés, couchés sur la terre, munis de beaucoup d'autres, alternes, presque articulés, très-courts, épais, glabres, cylindriques, obtus, à peine tétragones, garnis de dents fort petites, aiguës. Les fleurs sont réunies deux par deux dans l'aisselle des petits rameaux, supportées par des pédoncules glabres, cylindriques, plus longs que la corolle, de couleur purpurine; le calice se divise en cinq découpures glabres, lancéolées, aiguës. La corolle est d'un jaune mélangé de points noirâtres, divisée en cinq découpures étroites, lancéolées, très-ouvertes, rudes à leur face supérieure, roulées à leurs bords. Cette espèce diffère peu du *Stapelia geminata*; elle s'en distingue par sa corolle un peu plus grande; par ses tiges noirâtres; par ses rameaux plus petits, à dents plus fortes.

Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. γ

37. STAPÈLE séduisante. *Stapelia pulchella*. Maffon.

Stapelia ramis pluribus reclinatoris, dentatis; dentibus acutis; floribus fasciculatis; corollâ quinquefidâ; laciniis triangularibus, acutis; centro orbiculato. Maffon, Stapel. pag. 21. n°. 36. tab. 36.

Stapelia corollis quinquefidis; laciniis ovatis, acutis; fundo circulari; pedunculis multifloris; ramis tetragonis, decumbentibus, supra basin floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1291. n°. 37.

Ses tiges sont glabres, rameuses; ses branches & ses rameaux fortement inclinés, tétragones; les angles dentés, les dents médiocrement ouvertes ou redressées, un peu distantes, aiguës. Les fleurs sont situées dans les aisselles des rameaux ou un peu au dessus, supportées par des pédoncules rameux, à plusieurs fleurs pédicellées, inclinées. Le calice est partagé en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle, moins grande que

les pédoncules, est large d'un demi-pouce; ses divisions triangulaires, aiguës, ponctuées: un appendice orbiculaire environne les parties de la fructification; sa couleur est d'un blanc-pâle, parsemé de petites taches rougeâtres; le sommet des découpures d'un brun-pourpre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. γ

38. STAPÈLE antique. *Stapelia vetula*. Maff.

Stapelia ramis pluribus erectis, tetragonis, glabris; angulis dentatis, dentibus apice incurvatis; corollâ planâ, globâ, quinquefidâ; laciniis lanceolatis, obtusis. Maff. Stapel. pag. 15. n°. 16. tab. 16.

Stapelia corollis quinquefidis, glabris; laciniis ovatis, acuminatis, supernâ trinerviis; pedunculis corollâ brevioribus; ramis tetragonis, erectis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1291. n°. 38.

Cette espèce est glabre, très-rameuse; ses rameaux droits, hauts de six à huit pouces, tétragones, denticulés; les dents droites, recourbées à leur sommet. Les fleurs naissent à la partie inférieure des rameaux, dans l'aisselle des dents, réunies au nombre de deux ou trois sur des pédoncules droits, glabres, cylindriques. Le calice est d'une seule pièce, à cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle plane, d'un pourpre-foncé, monopétale, glabre, à cinq divisions profondes, lancéolées, obtuses, à trois nervures, traversées par des bandes ridées, point de tube.

Cette espèce se rencontre sur les montagnes, au Cap de Bonne-Espérance. γ

39. STAPÈLE verruqueuse. *Stapelia verrucosa*. Maffon.

Stapelia ramis pluribus subteretibus; dentibus ramorum acutis, decussatis; corollâ planâ, verrucosâ, medio parum elevatâ in pentagonum, genitaliâ ambiens, scabrum. Maff. Stapel. pag. 11. n°. 8. tab. 8.

Stapelia corollis quinquefidis, verrucosis; laciniis ovatis, acutis; fundo pentagono, scabro; pedunculis corollâ longioribus; ramis ascendentibus, tetragonis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1291. n°. 39.

Ses branches sont couchées, & produisent un grand nombre de rameaux courts, inégaux, redressés, longs de six à sept pouces, garnis de dents nombreuses, éparées, presque opposées en croix, un peu brunes ou fuscées à leur sommet.

Les fleurs sont situées d'une à deux à la base de chaque rameau, supportées par des pédoncules glabres, cylindriques, longs d'un pouce. Leur calice est petit, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle plane, verruqueuse, d'un jaune-pâle,

parfemée de points rougeâtres; son limbe se divise en cinq découpures ouvertes, presque ovales, aiguës; il renferme dans son centre un appendice un peu saillant, à cinq angles, qui entoure les organes de la génération.

Cette plante se rencontre dans les sols arides, au Cap de Bonne-Espérance: elle fleurit dans les mois de septembre & d'octobre. h

40. STAPÈLE tachtée. *Stapelia irrorata*. Mass.

Stapelia ramis pluribus subsessilis, denticulatis; dentibus subpatentibus, acutis, decussatis; corollâ plana, rugosa; lacinii lanceolatis, acutis. Masson, Stapel. pag. 12. n°. 9. tab. 9.

Stapelia corollis quinquefidiis, rugosis; laciniiis ovatis, acuminatis; pedunculis corollâ longioribus; ramis erectis-patentibus, tetragonis, basi floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1291. n°. 40.

Ses racines produisent plusieurs tiges ou rameaux droits, inégaux, hauts de six à sept pouces, ramassés, glabres, de ners, les plus courts un peu couchés; les dents aiguës, un peu ouvertes, presque disposées sur quatre rangs; les fleurs situées à la base des tiges, soutenues par des pédoncules simples, souvent foliaires, glabres, cylindriques, longs d'un pouce; le calice perit, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle grande, plane, ridée, sans appendice circulaire, à cinq divisions élargies, lancéolées, aiguës; le fond de la couleur est un jaune-pâle, parsemé de points rougeâtres.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance, dans les lieux arides; elle fleurit dans les mois de septembre & d'octobre. h

41. STAPÈLE mélangée. *Stapelia mixta*. Mass.

Stapelia denticulis ramorum subrecurvis; floribus pedunculatis, nutantibus; corollis glabris, centro orbiculato elevato, papilloso; laciniiis ovatis, acuminatis, rugosis. Mass. Stapel. pag. 23. n°. 38. tab. 38.

Stapelia corollis quinquefidiis, rugosis; laciniiis ovatis, acuminatis; fundo circulari elevato, papilloso; pedunculis longitudine corollâ; ramis tetragonis, ascendentes, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1292. n°. 41.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le *Stapelia variegata*, dont elle pourroit bien n'être qu'une variété; elle en diffère par les fleurs une fois plus grandes, par les découpures acuminées, par la forme des denielures recourbées.

Elle pousse plusieurs rameaux diffus, redressés, tétragones, qui donnent des racines à leur partie inférieure, garnis de dents recourbées, aiguës. Les fleurs, situées à la partie inférieure des rameaux, sont foliaires, portées par des pédoncules cylindriques, de couleur purpurine, inclinés,

longs de trois pouces, terminés par une grande corolle glabre, à cinq découpures ovales, rugueuses, obtuses, avec une petite pointe, mamelonnées; l'appendice circulaire du centre de couleur jaune, chargés de petits mamelons pourpres; les découpures également purpurines, avec des rides transverses, jaunâtres.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance. h

42. STAPÈLE panachée. *Stapelia variegata*. Linn.

Stapelia corollis quinquefidiis, rugosis; laciniiis ovatis, acutis; fundo circulari concavo, rugoso; pedunculis corollâ longioribus; ramis tetragonis, ascendentes, basi floriferis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1292. n°. 42. — Lam. Illustr. Gener. tab. 178. fig. 1.

Stapelia denticulis ramorum patentibus. Linn. Syst. veget. pag. 200. n°. 1. — Virid. Clifflort. 20. — Royen, Lugd. Bat. 409. — Miller, Dict. n°. 1. — Jacq. Miscell. 1. pag. 27. tab. 4. — Curtis, Mag. 26.

Stapelia denticulis ramorum extrorsum prominalis. Hort. Cliffl. 77. — Hort. Upsal. 53.

Stapelia denticulis ramorum patentibus; floribus pedunculatis; corollis glabris, supra rugulosis; laciniiis ovatis, acuminatis, planis. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 309.

Stapelia caule aphylo, tetragono; denticulis patentibus, flore pedunculo; laciniiis corollâ ovatis, squamosis, maculatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Asclepias aizoides africana. Bradd. Succ. 3. pag. 3. tab. 21.

Asclepias aizoides, aphylla, flore scitillaria; siliquis longis, angustis, erectis. Morif. Hist. 3. pag. 610. 5. 15. tab. 3. fig. 4.

Apocynum humile, aizoides; siliquis erectis, africanum. Herm. Lugd. Bat. 52. tab. 53. — Stiff. Botan. 32.

Fritillaria crocea, promontorii Bona Spei. Stapel. Theophr. 335.

Asclepias africana, aizoides. Tournef. Infl. R. Herb. 94.

Stapelia foliis oblongis, dentatis; flore glabro, intus sulphureo, punctato, extus purpureo, striata. ? Burm. Afric. pag. 19. tab. 12. fig. 2.

Ses racines sont composées d'un grand nombre de fibres brunes, allongées, entortillées. Les tiges se divisent, presque dès leur base, en plusieurs rameaux coulés à leur base, redressés, étalés, peu élevés, très-glabres, quadrangulaires, charnus, n'ayant d'autres feuilles que des dents faillantes, épaisses, obtuses ou un peu aiguës.

Les fleurs sont solitaires, ordinairement situées vers la base des rameaux, soutenues par des pédoncules cylindriques, glabres, plus longs que les fleurs. La corolle est véritable en dehors, glabre, d'un jaune de soufre en dedans, marquée de rides transverses & couverte de taches irrégulières, d'un pourpre-foncé, d'un jaune-pâle & circulaire dans le fond; elle se divise en cinq découpures ovales, aiguës, presque acuminées à leur sommet. Il lui succède des follicules droits, parallèles, rapprochés, longs, étroits.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

Toutes les parties de cette plante sont remplies d'un suc visqueux & fétide. La fleur surtout, lorsqu'elle est épanouie, répand une odeur des plus désagréables, & qui approche de celle des substances animales en putréfaction.

*** Corolle à dix divisions ou à dix dents.

41. STAPÈLE campanulée. *Stapelia campanulata*. Nasion.

Stapelia ramis pluribus simplicibus, erectis, tetragonis, dentatis; dentibus potentibus, acutis; corollâ decemfidâ, campanulatâ, scârd; tubo barbato. Mass. Stapel. pag. 11. n°. 6. tab. 6.

Stapelia corollis decemdentatis, laciniis majoribus, lanceolatis; fundo campanulato; pedunculis trifloris; ramis erectis, tetragonis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1293. n°. 43.

Ses branches sont simples, droites, courtes, inégales, à quatre, quelquefois à cinq angles, vertes, parsemées de taches nébuleuses, purpurines, garnies sur leurs angles de dents aiguës, très-ouvertes. Les fleurs naissent, au nombre de deux ou trois, à la base de chaque branche, sur un pédoncule commun, qui se divise en autant de parties qu'il y a de fleurs.

Le calice est divisé, jusqu'à sa base, en cinq découpures lancéolées, aiguës. La corolle est d'un jaune de soufre, couverte sur toute sa surface intérieure d'un grand nombre de points faillans, de couleur purpurine. Elle est campanulée, sans rebord faillant à l'orifice du tube, à dix découpures très-aiguës, dont cinq alternes beaucoup plus courtes; le tube garni intérieurement de cils glanduleux à leur sommet.

Cette plante croît dans les sols arides, au Cap de Bonne-Espérance. h

44. STAPÈLE barbu. *Stapelia barbata*. Mass.

Stapelia ramis pluribus tetragonis pentagonisque, confertis, suberectis; dentibus ramorum acutis, sub-potentibus; corollâ campanulatâ, decemfidâ; laciniis

acutis, sub-potentibus. Mass. Stapel. pag. 11. n°. 7. tab. 7.

Stapelia corollis decemdentatis, campanulatis; laciniis majoribus lanceolatis, acuminatis, scabris, clavato-barbatis; pedunculis corollâ brevioribus; ramis sub-tetragonis, erectis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1293. n°. 44.

Ses branches sont très-courtes, simples, droites, fasciculées, inégales, obtuses, glabres, à quatre ou cinq angles, garnies de dents courtes, horizontales. Les fleurs sont situées à la partie inférieure des tiges, soutenues par des pédoncules rameux, longs de trois lignes, colorés, qui se terminent par deux ou trois fleurs.

Le calice est divisé en cinq découpures linéaires-lancéolées, aiguës; la corolle grande, campanulée, sans rebord faillant à l'orifice du tube, de couleur blanche, parsemée de points rudes, de couleur purpurine; le limbe rude en dessous, couvert à sa face supérieure de poils glanduleux, divisé en dix découpures, dont cinq très-courtes, cinq autres bien plus grandes, allongées, tubulées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

45. STAPÈLE gracieuse. *Stapelia venusta*. Mass.

Stapelia ramis tetragonis pentagonisque; ramulis patentissimis, divaricatis; denticulis ramorum patentibus, acutis; corollâ decemfidâ; tubo glabro, ampliato in orbiculum elevatum. Mass. Stapel. pag. 10. n°. 3. tab. 3.

Stapelia corollis decemdentatis, glabris; laciniis majoribus ovato-acuminatis; fundo concavo, orbiculo, elevato, cinâo; pedunculis corollâ longioribus deflexis; caule sub-tetragono, erecto, superne ramoso; ramis basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1294. n°. 45.

Espèce d'un aspect assez agréable, dont les branches, hautes de six à sept pouces, sont glabres, à quatre, quelquefois à cinq angles, divisées en rameaux distans, garnis de dents ouvertes, aiguës.

Les fleurs sont latérales, situées quelquefois deux ensemble dans l'aisselle des dents, soutenues par des pédoncules glabres, cylindriques, pendans, longs d'un pouce. Le calice se divise en cinq découpures ovales, aiguës. La corolle est grande, d'un jaune de soufre, parsemée de points d'un rouge de sang. Son tube est glabre; il s'élargit insensiblement en un bourrelet faillant, orbiculaire; le limbe divisé à son bord en dix dents aiguës, dont cinq plus longues & cinq autres plus courtes.

Cette plante croît dans les terrains secs, au Cap de Bonne-Espérance. h

46. STAPÈLE mouchetée. *Stapelia guttata*. Mass.

Stapelia ramis pluribus tetragonis pentagonisque, confertis, subpatentibus; dentibus ramorum acutis, patentibus; corollâ decemfidâ, lociniis acutis; tubo campaniformi-ampliato, in orbiculum elevatum. Mass. Stapel. pag. 10. n°. 4. mb. 4.

Stapelia corollis decemdentatis; laciniiis majoribus ovatis, acutis; fundo concavo, scabro; orbiculo elevato, cincto; pedunculis longitudine corollæ; ramis subpatentibus, subtetragonis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1294. n°. 46.

Cette plante diffère peu du *Stapelia venusta* : on la distingue à son port, à ses branches plus serrées, presque simples, à quatre, quelquefois à cinq angles, particulièrement dans leur jeunesse, hautes de sept à huit pouces, très-obtus, presque simples, munies de dents horizontales, aiguës.

Les fleurs, au nombre de trois ou quatre, naissent à la partie inférieure des branches. Leur pedoncule est grêle, cylindrique, de la longueur des fleurs, garni de bractées à sa base. Le calice se divise en cinq découpures linéaires, lancéolées, aiguës. La corolle est d'un jaune de soufre, parsemée de points d'un rouge de sang. Son limbe se divise en dix dents alternativement plus longues. Le tube est rude en dedans, campanulé.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, dans les terrains secs. ♀

47. STAPÈLE basse. *Stapelia humilis*. Mass.

Stapelia ramis pluribus quadri seu quinque angulatis, patentibus; corollâ orbiculatâ, decemfidâ; laciniiis quinque longioribus, quinque brevioribus, patentibus; pedunculis foliisortis. Masson, Stapel. pag. 10. n°. 5. tab. 5.

Stapelia corollis decemdentatis; laciniiis majoribus lanceolatis, acutis; pedunculis foliisortis, corollâ brevioribus; ramis subtetragonis, patentibus, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1295. n°. 47.

Ses branches sont très-basses, inégales, fasciculées, hautes de trois à cinq pouces, médiocrement redressées, à quatre ou cinq angles, divisées en quelques rameaux ouverts, très-courts, garnis de dents aiguës, courtes, horizontales.

Les fleurs sont foliaires, latérales; leur pedoncule court, long de trois lignes, glabre, cylindrique; le calice à cinq divisions linéaires, lancéolées, aiguës; la corolle d'un pourpre-noirâtre sur son disque marqué de taches blanches, ondulées; ses découpures d'un jaune de soufre, parsemées de petites taches purpurines; le limbe, large d'environ un pouce, se divise en cinq découpures alternativement plus courtes, aiguës. Le tube est campanulé, élargi en un bourlet saillant, orbiculaire.

On rencontre cette plante dans les sols arides au Cap de Bonne-Espérance. ♀

48. STAPÈLE réticulée. *Stapelia reticulata*. Mass.

Stapelia ramis pentagonis, denticulatis; dentibus patentibus, corollâ decemangulotâ; tubo iniis borbato, ampliato, in orbiculum elevatum. Masson, Stapel. pag. 9. n°. 2. tab. 2.

Stapelia corollâ decemdentatâ; lociniis majoribus, ovatis, acutis; fundo barbato, orbiculatâ, elevato, cincto; pedunculis binis, corollâ brevioribus; ramis pentagonis, patulis, basi floriferis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1295. n°. 48.

Espèce remarquable par les lignes blanchâtres qui forment sur les pétales un réseau assez agréable sur un fond d'un pourpre-foncé.

Elle pousse plusieurs rameaux rapprochés, presque droits, d'un vert-foncé, couverts de taches purpurines, à cinq angles tranchans, dentés; les dents aiguës, très-ouvertes ou un peu réfléchies. Les fleurs naissent au nombre de deux ou trois; la partie inférieure des rameaux, soutenues par des pedoncules glabres, cylindriques, uniflores, munis à leur base de trois ou quatre bractées. La corolle est d'un pourpre-foncé; son limbe presque entier, divisé à son bord en dix angles aigus, médiocrement ouverts, cinq alternativement plus courts; le tube campanulé, barbu intérieurement, insensiblement élargi & saillant par un bourlet circulaire; les parties de la fécondation situées au fond du tube.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, dans les fentes profondes des rochers. Elle fleurit au printemps & dans l'automne. ♀

* STAPELIER de la Chine. *Stapelia chinensis*. Lour.

Stapelia foliis lanceolatis, congestis; corollis rotatis. Lour. Flor. coch. pag. 205. n°. 1.

Ses tiges sont très-simples, ligneuses, allongées, inclinées, dépourvues de dents, munies de feuilles lancéolées, très-entières, glabres, charnues, nombreuses & rapprochées. Les fleurs sont blanches, axillaires, & forment des ombelles simples, assez grandes; la corolle en roue, un peu réfléchi; une double étoile à cinq rayons; les autres parties de la fructification semblables à celles des autres espèces.

Cette plante croît dans la Chine. ♀ (Ex Lour.)

Observations. Je ne dirai rien d'une autre espèce citée par Loureiro sous le nom de *Stapelia cochinchinensis*. Son port & plusieurs autres caractères peuvent faire soupçonner que cette plante pourroit bien appartenir à un autre genre. La précédente en est également éloignée par son port, quoique très-rapprochée des *Stapelia* par ses fleurs & ses fruits.

* *Espèces incertaines ou douteuses.*

* *Stapelia* (clavata), caule simolei, crasso, clavato, reticulatum obtusis verrucoso, apice frutiferum. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1295. n°. 49.

Stapelia. Patterf. Itin. edit. Germ. pag. 57. tab. 8.

On ne connoît point les fleurs de cette espèce. Les fruits ont le caractère de ceux des *Stapelia*. Le port de la plante y convient également. Les tiges sont simples, charnues, épaisses, en massue à leur partie supérieure, chargées de tubercules verrucueux. Les fleurs naissent au sommet des tiges. On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance, dans les terrains sablonneux, au-delà de Kopperberg. 7.

* *Stapelia* (anonymos), caule ramoso, multum repente, fix seu novem angulis, sulcatis; angulis dentatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 52. n°. 77.

Elle croît dans l'Arabie. Les habitants du pays assurent que cette plante, quoique desséchée depuis très-long-temps, & morte en apparence, reverdit dès que la terre est humectée. Ses tiges sont rampantes au loin, à six ou neuf angles, creusées par autant de sillons. Les angles sont dentés; les fleurs inconnues; les fruits composés de deux follicules subulés.

STAPHYLIER. *Staphylea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des nerpruns, qui a des rapports avec les fusains (*evonymus*), & qui comprend des arbres ou arbrutes, les uns exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont opposées, ternées ou pinnées; les fleurs disposées en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle à cinq pétales; cinq étamines; deux ou trois styles; deux ou trois capsules conniventes, vésiculeuses; une ou deux semences ossueuses, tronquées à leur base.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice coloré, profondément divisé en cinq découpures concaves, un peu arrondies; environné à sa base par un disque urcéolé.

2°. Cinq pétales droits, oblongs, assez semblables au calice, insérés sur le bord du disque.

3°. Cinq étamines alternes avec les pétales, insérées sur le disque, dont les filaments sont droits, de la longueur du calice, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire supérieur, partagé en deux ou

trois lobes, surmonté de deux ou trois styles simples, plus longs que les étamines, terminés par autant de stigmates rapprochés.

Le fruit consiste en deux ou trois capsules membraneuses, vésiculeuses, conniventes à leur partie inférieure jusque vers leur milieu, s'ouvrant en dedans à leur sommet, renfermant des semences ossueuses, presque globuleuses, tronquées à leur base.

Observations. Ce genre, qui jusqu'à présent renferme très-peu d'espèces, est bien tranché, fort naturel, & ne peut se confondre avec aucun autre. L'*evonymus* ou fusain est celui avec lequel il paroît avoir le plus de rapport. Les *Staphylea* sont remarquables par leur fruit capsulaire. La capsule est renflée, vésiculeuse, membraneuse; on n'est point d'accord sur son caractère, du moins quant à l'expression. La plupart des botanistes en distinguent dans chaque fleur deux ou trois réunies à leur partie inférieure, jusqu'au-delà de leur moitié; d'autres pensent que ce n'est qu'une seule capsule divisée en deux ou trois valves. Ces valves ou capsules varient en nombre d'après celui des pistils. D'ailleurs, tous les autres caractères essentiels de ce genre sont constants. Il renferme des arbres ou de grands arbrutes d'un aspect agréable, que leurs fleurs en grappes pendantes & nombreuses ont fait admettre parmi nos arbres d'ornement.

ESPÈCES.

1. **STAPHYLIER à feuilles ailées.** *Staphylea pinnata*. Linn.

Staphylea foliis pinnatis. Linn. Spec. Plant. pag. 186. — Hort. Cliff. 112. — Hort. Upsal. 69. — Roy. Lugd. Bat. 436. — Millet, Dict. n°. 1. — Hall. Hciv. n°. 841. — Duroi, Harbk. 2. pag. 439. — Willd. Arb. pag. 376. — Hoffm. Germ. 210. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 137. — Il. pag. 368. — Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 549. n°. 167. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1497. n°. 2. — Gzert. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 335. tab. 69. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 210.

Staphylocladon pinnatum. Scop. Carn. edit. 2. n°. 374.

Staphylocladon. Math. 274. — Tournef. Inst. R. Herb. 616. — Dalech. Hist. 1. pag. 103. Icon. — Duham. Arbr. vol. 2. p. 282. tab. 77. — J. Bauh. Hist. 1. pag. 174. Icon. — Camer. Epim. 171. Icon. — Bell. Eyst. Vern. Fruct. tab. 8. fig. 1.

Piflacia silvestris. C. Bauh. Pin. 401.

Nax vesicaria. Dodon. Pempt. 818. Icon.

Vulgairement le nez-coupé, faux pissachier, pissache sauvage.

C'est un arbre d'une médiocre grandeur, dont

le tronc s'élève ordinairement à la hauteur de douze à quinze pieds, revêtu d'une écorce lisse, cendrée; divisé en branches flexibles, étalées, &c. en rameaux verts, glabres, cylindriques, garnis de feuilles opposées, pétioles, ailées avec une impaire, composées de cinq ou sept folioles ovales-oblongues, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles en dessous, finement dentées à leurs bords, pointues à leur sommet.

Les fleurs sont blanches, disposées en grappes simples ou rameuses, pendantes, axillaires, terminales, de la longueur des feuilles; les pédoncules allongés, grêles, cylindriques, munis à leur base de quatre bractées longues, étroites, membraneuses, dont deux font peut-être des stipules appartenans aux feuilles. La corolle est peu ouverte; les pétales obtus; le nombre des styles varie de deux à trois. Le fruit consiste en deux capsules ovales, très-renflées, membraneuses, acuminées à leur sommet, veinées, réticulées, contenant plusieurs semences presque globuleuses, osseuses, très-lisses, tronquées à leur base.

Cette plante croît dans les terrains gras, en Europe, dans les contrées méridionales, en Italie, dans l'Alsace, dans la ci-devant Bretagne, aux environs de Fougères, où j'ai observée. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit vers le milieu du printemps. h (V. v.)

« Si l'on a soin, dit Duhamel, de retrancher les branches qui poulent avec trop de vigueur, ces arbres forment d'eux-mêmes des buissons fort jolis. On peut les réunir dans les bosquets avec les cyrises des Alpes. Comme ils fleurissent en même tems, les fleurs jaunes de ces derniers contrastent agréablement avec les fleurs blanches des premiers. Dans les climats chauds, où les semences du staphylier mûrissent parfaitement bien, on en retire une huile par expression, qui est résolutive. On forme des chapelets avec ces mêmes semences.

2. STAPHYLIER hétérophylle. *Staphylea heterophylla*. Ruiz & Pav.

Staphylea foliis ternatis, quinatis pinnatifque serratis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 29. tab. 253. fig. A.

C'est un arbrisseau de dix-huit à vingt pieds & plus, qui a le port d'un sureau, dont le tronc est droit, épais, termine par une cime extrêmement touffue; les rameaux étalés, cylindriques, articulés, spongieux intérieurement; les articulations presque engainées, ciliées en dedans; garnis de feuilles opposées, pétioles, ailées, composées de trois à cinq & même sept folioles pendantes, oblongues, lancéolées ou ovales-oblongues, aiguës ou acuminées à leur sommet, dentées en scie à leurs bords, très-glabres, luisantes à leurs deux

faces, veinées, longues d'environ six pouces; les dentelures épaisses, presque calleuses. Les pétioles communs sont longs, cylindriques, opposés, réunis à leur base; les partiels courts, canaliculés; deux glandes ovales, aiguës, noires entre chaque paire de folioles.

Les fleurs sont disposées en grappes droites, rameuses, terminales, étalées; les pédoncules, tant communs que partiels, munis de bractées fort petites, caluques, subulées. Le calice est blanchâtre, quelquefois de couleur purpurine, à cinq folioles ovales, inégales, se recouvrant l'une l'autre, concaves, colorées, plus courtes que la corolle, caduques, inférieures. La corolle est blanche; les pétales oblongs, connivens, concaves, égaux, contenant un appendice en anneau, fort petit, jaunâtre, à cinq échancrures, & qui entoure l'ovaire. Les filaments sont subulés, insérés sur le réceptacle entre les pétales & l'appendice, presque aussi longs que la corolle; les anthères ovales, un peu inclinées, à demi-bifides à leur base, à deux loges, s'ouvrant longitudinalement à leur partie antérieure. L'ovaire est arrondi, à trois lobes, surmonté de trois styles de la longueur des étamines, terminés par des stigmates simples & obtus. Le fruit est une capsule presque ronde, trigone ou presque à trois lobes, point renflée, à trois loges, terminées par trois cornes, à trois valves coriaces, séparées par des cloisons membraneuses. Chaque loge contient deux semences osseuses, luisantes, ovales, presque réniformes, convexes d'un côté, munies d'une petite fossette à leur base. Assez souvent les semences sont solitaires; quelquefois elles sont au nombre de trois dans chaque loge. Il arrive aussi qu'une ou deux folioles du calice se dessèchent & persistent avec le fruit.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts; elle fleurit en juin & en juillet. h (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

3. STAPHYLIER de la Jamaïque. *Staphylea occidentalis*. Swartz.

Staphylea foliis duplicato-pinnatis, capsulis trigonis, seminibus solitariis, caule arboroso. Sw. Prodr. pag. 55. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 566. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1497. u^e. 1.

Pruno forte officinis arbor, folio alato; flore herbaceo, pentapetalo, racemoso. Sloan, Jam. Hist. 2. tab. 210. fig. 1.

Arbor jamaicensis, fraxini alatis foliis; floribus pentapetalis, corymbois. Pluken. Alm. pag. 45. tab. 269. fig. 1.

Arbre de vingt à trente pieds, dont le tronc est lisse; les rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétioles, deux fois ailés, avec impaire; deux ou trois paires de folioles ovales,

ovales, acuminées, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, luisantes; la foliole impaire pédonculée; deux stipules recourbées, fort petites, situées entre les pinnules.

Les fleurs sont disposées en une panicule droite, terminale, un peu lâche, dont les rameaux sont opposés; les pédoncules à trois fleurs blanches, odorantes. Le calice se divise en cinq folioles concaves, arrondies, colorées; les deux intérieures de la grandeur de la corolle; cinq pétales droits, oblongs, connivens à leur sommet; les filaments dilatés à leur base, droits, de la longueur de la corolle; les anthères simples; l'ovaire à trois faces, à trois lobes à son sommet, surmonté de trois styles simples, & d'avant de stigmates obtus, connivens; une capsule trigone, de la grosseur d'une cerise, glabre, point vésiculeuse, à trois loges; des semences oblongues & foliaires.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les hauteurs. *Th* (Descript. ex Swartz.)

4. STAPHYLIER à feuilles ternées. *Staphylea trifoliata*. Linn.

Staphylea foliis ternatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 386. — Hott. Cliff. 112. — Roy. Lugd. Bat. 437. — Cold. Noveb. 62. — Miller, Dict. n°. 2. — Dutoit, Harbk. 2. pag. 441. — Willden. Arbt. 376. — Idem, Spec. Plant. vol. 1. pag. 1498. n°. 3.

Staphylea foliis trifoliatis, racemis pendulis, petalis insertis ciliatis, fructu ovato. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. pag. 184.

Staphylodendron triphyllum, vasculo tripartito. Gronov. Virg. 34.

Staphylodendron virginianum, triphyllum. Tourn. Inst. R. Herb. 616. — Duham. Arbt. vol. 2. pag. 282. — Herm. Lugd. Bat. 230.

Pifacia virginiana, silvestris, trifolia. Morif. Blœf. 295.

Cet arbre s'élève à peu près à la même hauteur que le *Staphylea pinnata*, mais son tronc & ses branches sont ordinairement un peu plus fortes, & ces dernières moins flexibles. L'écorce est lisse, de couleur grise, cendrée, d'un vert-jaunâtre sur les jeunes rameaux. Les feuilles sont opposées, pétioles, ternées, composées de trois folioles; les deux latérales presque sessiles; celle du milieu rétrécie; son pétiole articulé & renversé souvent sur le pétiole commun; ce qui rend ces feuilles très-faciles à se détacher. Elles sont d'ailleurs ovales, assez grandes, glabres à leurs deux faces, d'un vert clair en dessus, un peu blanchâtres en dessous, finement dentées en scie à leur contour, acuminées à leur sommet, munies à la base des pétioles de deux stipules droites, allongées, sétacées.

Botanique. Tome VII.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles supérieures, le long des rameaux, en grappes nombreuses, un peu courtes, épaisses, simples, pendantes, munies à la base des pédoncules, de bractées fines, sétacées. La corolle est blanche; les pétales un peu élargis, obtus, ciliés à leur partie inférieure; les styles au nombre de trois. Les capsules sont ovales, à une seule loge, à trois valves ou à trois capsules univalves, selon la manière dont on veut les considérer.

Cette plante croît en Amérique, dans la Virginie, dans la Caroline supérieure & à New-York. On la cultive au Jardin des Plantes du Patis. *Th* (V. v.)

C'est, ainsi que le *Staphylea pinnata*, un arbre d'ornement, qui peut trouver place avec lui dans les bosquets d'automne, où il croît & se multiplie très-facilement. Les fleurs paroissent vers le milieu du printemps.

Nota. *Staphylea (indica), foliis bipinnatis, infimis ternatis, summis quinis; foliolis oblongis, dentatis; cymis tripartitis*. Burm. Flor. ind. pag. 72. tab. 14. fig. 2. Cette plante est la même que l'*acutifolia sambucina*, Linn. & la *leca sambucina*, Willd. Spec. Plant.

STARKÉA. *Starkea*. Ce genre a été établi, par Willdenow, pour faire sortir de celui des *Amellus* l'*Amellus umbellatus* de Linné, qui n'a ni le port des autres espèces auxquelles il se trouve réuni, ni le caractère du genre. Celui dont il est ici question a pour caractère essentiel un réceptacle velu, des semences surmontées d'une aigrette sessile, pileuse; un calice imbriqué. Dans le genre *Amellus*, le réceptacle est garni de paillettes, les semences surmontées d'une aigrette simple, point pileuse. Le nom de *Starkea* est celui d'un savant pasteur du saint Evangile dans la Silésie, qui s'est livré à la recherche des plantes de cette contrée, & auquel Willdenow a consacré ce nouveau genre, qui ne renferme qu'une seule espèce.

ESPÈCE.

STARKEA ombellé. *Starkea umbellata*. *Starkea*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2216.

Amellus (umbellatus), foliis oppositis, triplinerviis, sústis tomentosis; floribus umbellatis. Linn. Spec. Plant. 1276. &c.

Voyez, pour la description de cette espèce, l'article AMELLE ombellifère, vol. 1, pag. 130.

STATICÉ. *Statice*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des dentelaires, qui a des rapports avec les *plumago*, & qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, dont les

D d d

tiges sont herbacées ou un peu ligneuses ; les feuilles toutes radicales dans certaines espèces, alternes dans un grand nombre d'autres ; les fleurs réunies en une tête terminale ou située le long des rameaux, entourées à leur base, d'écaillés scarieuses.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice d'une seule pièce, coloré, plissé, scarieux à son limbe ; cinq pétales onguiculés ; cinq étamines insérées ordinairement sur les onglets des pétales ; cinq styles ; une capsule enveloppée par le calice & la corolle.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice coloré, inférieur, d'une seule pièce, tubulé, persistant, membraneux, plissé à son limbe.

2°. Cinq pétales onguiculés ; les onglets réunis en tube, quelquefois adhérens ; le limbe élargi, ouvert, obtus.

3°. Cinq étamines insérées ordinairement sur les onglets de la corolle ; les filans tubulés, plus courts que les pétales ; les anthères inclinées.

4°. Un ovaire fort petit, surmonté de cinq styles filiformes, écartés, terminés par autant de stigmates aigus.

Le fruit est une capsule fort petite, à une seule loge, qui ne s'ouvre point, qui renferme une semence suspendue à un fil pendant du sommet de la capsule, & qui parvient à la base de la semence qu'il soutient dans une situation droite. Cette capsule est enveloppée par la corolle & le calice persistans.

Observations. Les statice offrent dans la nature une belle suite de végétaux, la plupart habitant les côtes maritimes, les sols arides, les pelouses. Quoique la plupart n'aient que de fort petites fleurs, ils placent par leur port, par le grand nombre de ces fleurs, par un aspect qui leur est propre, qui les distingue à la première vue des autres plantes, & les a fait admettre dans nos jardins comme plantes d'ornemens. Le *statice armeria*, *caespitosa* & quelques autres sont presque les seules qui se rencontrent dans l'intérieur des terres & sont l'ornement des prés secs. La beauté de ces fleurs consiste plus ordinairement dans le calice, dont le limbe scarieux, ample, campanulé, est souvent coloré, en couleur de rose, pourpre, blanchâtre, bleuâtre, &c.

Ces plantes forment un très-beau genre naturel, on pourroit presque dire une famille, dont les espèces sont autant rapprochées entr'elles, qu'elles s'écartent par leur port des autres genres. Elles

ont beaucoup d'affinité avec les dentelaires (*plumbago*), mais seulement dans les caractères de la fructification.

Tournefort a divisé les statices en deux genres très-distincts quant à leur port & à la disposition des fleurs, mais que les parties essentielles de la fructification ne permettent point de séparer. Dans les *statice* de Tournefort se trouvent renfermées les espèces dont toutes les feuilles sont radicales, les tiges très-simples, terminées par une tête de fleurs stériles, soutenues à leur base par une sorte de collerette composée d'écaillés scarieuses, imbriquées, réunies à l'extrémité d'une gaine cylindrique, qui enveloppe la partie supérieure des tiges. Dans les *limonium* du même auteur se trouvent comprises toutes les espèces à tiges rameuses, paniculées, sur lesquelles les fleurs sont disposées en une sorte d'épi à l'extrémité des ramifications, ordinairement très-rapprochées, tournées du même côté, sessiles, fort petites, enveloppées chacune à leur base de deux ou trois bractées écailleuses. Ces considérations forment des divisions très naturelles dans ce genre, qui conserve ensuite sous l'une & l'autre les caractères essentiels qui le constituent ; un calice infundibuliforme, dont le limbe est plissé, scarieux, campanulé, plus ou moins ouvert ; une corolle souvent plus courte que le calice ; à cinq pétales onguiculés, assez ordinairement réunis en tube par leurs onglets.

La distinction des espèces dans un genre aussi naturel offre de très-grandes difficultés, & les observations que j'ai faites sur ces plantes dans leur lieu natal, m'ont porté à croire qu'on avoit séparé comme espèces plusieurs d'entr'elles qui ne devoient être réunies comme variétés, & dont les caractères distinctifs n'étoient pas toujours constants. Je n'ai cependant pas osé hasarder cette réforme ; je me suis borné, dans l'exposition des espèces, à faire connoître les rapprochemens, & à tâcher d'apprécier la valeur de leurs caractères différentiels.

ESPÈCES.

* *STATICE*. Tourn. Feuilles toutes radicales ; fleurs réunies en tête dans un involucre commun, imbriqué, scarieux.

1. *STATICE* à grosses têtes. *Statice cephalotes*. Aiton.

Statice scapo simpliciter, capitato ; foliis oblongis, planis, acuminatis, basi attenuatis. Willd. Sp. C. Plant. vol. 1. pag. 1523. n°. 4.

Statice (lobianica) , scapo simpliciter, capitato ; foliis ovato-lanceolatis. Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 141.

Statice (pseudo-armeria) , foliis lato-lanceolatis ;

marginé cartilagineux; scapo simplici, floribus capitatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 273.

Statice (armeria, major), scapo simplici, capitato; foliis longè lanceolatis. Jacq. Hort. Vind. pag. 16. tab. 42.

Statice (pseudo-armeria). Murr. Syst. veget. pag. 300.

Statice lusitanica, scorzonera folio. Tourn. Infl. R. Herb. 341.

♂? *Statice plantaginea.* Allioni, Flor. pedem. n°. 1606.

C'est une des plus belles espèces de cette division, qui, à la vérité, offre de très-grands rapports avec le *statice armeria*, mais qui en diffère par la grandeur de ses feuilles, & surtout par la grosseur & la beauté de ses têtes de fleurs.

Ses racines sont droites, épaisses, simples, d'un brun noirâtre, presque filiformes; elles produisent plusieurs tiges ou hampes droites, cylindriques, rondes, un peu fistuleuses, glabres, striées, hautes de deux ou trois pieds. Les feuilles sont toutes radicales, nombreuses, étalées, lancéolées ou presque elliptiques, planes, élargies, glabres à leurs deux faces, vertes, un peu coriaces, entières & un peu cartilagineuses à leurs bords, obtuses & souvent mucronées à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole strié, canaliculé, qui engage les tiges. On distingue, dans la longueur des feuilles, trois ou cinq nervures blanchâtres, saillantes en dessous. Ces feuilles ont de trois à quatre pouces de long, sur environ un pouce de large.

Les fleurs sont réunies, au sommet des tiges, en une tête globuleuse d'environ deux pouces de diamètre, d'une belle couleur rouge-tendre, environnée à leur base d'un involucre composé de plusieurs écailles membraneuses, concaves, roussâtres, à peine aiguës, plus courtes que les fleurs. De leur base part une gaine membraneuse, entière, cylindrique, longue d'un à deux pouces, qui enveloppe le sommet des tiges, & se déchire à sa partie inférieure en plusieurs lanières. Le calice est membraneux, infundibuliforme, ample; son limbe ouvert, entier, teint en rose, ou quelquefois d'un blanc-argente; traversé par quelques lignes brunes; les pétales obtus, d'un rose-tendre.

J'ai recueilli cette belle espèce sur les côtes de Barbarie, dans les plaines sablonneuses, aux environs de Lacale. Elle fleurit en avril & en mai. Elle croît également en Espagne, dans le Portugal. La plante ♀ d'Allioni, recueillie dans les Alpes du Piémont, n'est probablement qu'une variété de cette espèce. x (V. v.)

2. *STATICE ARMERIA.* *Statice armeria.* Linn.

Statice scapo simplici, capitato; foliis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 394. — Hort. Cliff. 115. — Flor. suec. 253. 169. — Gronov. Virg. 150. — Roy. Lugd. Bat. 254. — Hall. Helv. 833. — Mill. Dict. n°. 1. — Gunn. Norv. n°. 113. — Pallas, Iter 3. pag. 34. — Pollich. Palat. n°. 317. — Kniph. Centr. 5. n°. 85. — Hoffm. Germ. 111. — Roth. Getm. vol. 1. pag. 141. — vol. II. pag. 374.

Statice (armeria), scapo simplici, capitato; foliis linearibus, planis, obtusis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1522. n°. 1.

Statice capitata. Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 63. n°. 701.

Limonium aphyllocaulon, gramineum; flore globoso, majus. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 601. 6. 15. tab. 1. fig. 29.

Caryophyllus montanus, major, flore globoso. C. Bauh. Pin. 211.

Gramen polyanthemum, majus. Dod. Pempt. 564. Icon.

Caryophyllus flos aphyllocaulos, vel janceus major. J. Bauh. Hist. 3. pag. 336. Icon. Secunda.

Statice lagdunensum. Tourn. Infl. R. Herb. 341.

Statice Dalechampii. Dalech. Hist. 2. pag. 1190. Icon. medicaria.

Caryophyllus montanus, sive mediterraneus. Lobel. Icon. pag. 452. fig. 2. — Idem, Observ. pag. 142. Icon.

♂? *Statice elongata.* Wedd. Flor. dan. tab. 1092.

Statice (arenaria), scapo longo, bracteis 2-3 capitato longioribus; foliis linearibus, rigidis, glabris. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 332.

Cette espèce doit être distinguée du *statice capiteosa*, que plusieurs auteurs présentent comme variétés. Celle dont il est ici question a plus de rapport avec notre *statice capiteosa*; elle en diffère par ses feuilles bien plus étroites, & par ses têtes de fleurs beaucoup plus petites.

Ses racines sont dures, épaisses, noirâtres, presque ligneuses; elles produisent plusieurs tiges droites, cylindriques, nues, très-simples, à peine striées, glabres ou quelquefois un peu pubescentes, hautes d'un à deux pieds; elles sont environnées à leur base d'un grand nombre de feuilles radicales, coriaces, linéaires, longues de quatre à cinq pouces, nervées, très-entières, glabres, larges de deux à trois lignes & plus; les unes obtuses, d'autres un peu aiguës à leur sommet, longuement rétrécies à leur partie inférieure, & formant un pétiole canaliculé, vaginifère à sa base.

Les fleurs sont blanchâtres ou plus souvent d'un rouge-pâle, réunies, à l'extrémité des tiges, en

D d d 2

une tête globuleuse, de la grosseur d'une cerise, environnée à sa base d'un involucre composé d'écaillés roussâtres, ovales, souvent acuminées & quelquefois plus longues que les fleurs; une gaine membraneuse, cylindrique, longue au moins d'un pouce, & déchirée à sa partie inférieure, entoure le sommet des hampes. Les calices, tubulés à leur base, se dilatent à leur limbe, & se divisent presque en cinq lobes, chacun d'eux traversé par une ligne plus ou moins prolongée au dehors en pointe épineuse.

Cette plante croît sur les pelouses, dans les terrains secs, sur les collines, &c. Je l'ai recueillie dans les environs de Lunn & de Saffron, où elle est très-commune. ♀ (V. v.)

3. STATICE alliaire. *Statice alliacea*. Cavan.

Statice scapo junco, capitato; foliis linearibus, acutis, inferne angustatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 2. pag. 6. tab. 109.

Statice scapo simpliciter, capitato; foliis linearibus-lanceolatis, acutis, planis. Willd. Sp. c. Plant. vol. 1. pag. 1523. n°. 5.

Ses racines sont brunes, rameuses, écaillées à leur sommet; elles produisent plusieurs hampes droites, hautes d'un pied, très-glabres, cylindriques, garnies à leur sommet d'une gaine courte, cylindrique, longue de deux ou trois lignes. Les feuilles, toutes radicales, sont glabres, linéaires, aiguës, très-étroites, insensiblement rétrécies à leur base, un peu élargies vers leur sommet.

Les fleurs sont réunies en une tête terminale, globuleuse; environnées à leur base d'écaillés ovales, scarieuses, pâles; les inférieures plus courtes. Le calice est tubulé, d'une seule pièce, dilaté à son sommet en un limbe scarieux, diaphane, à cinq dents subulées. La corolle est blanche, ouverte, à cinq pétales ovales, obtus, très-entiers, aigus à leur base; cinq filamens plus courts que les pétales; les anthères ovales. L'ovaire est tubine, surmonté de cinq styles subulés, divergens, tomenteux à leur base; les stigmates simples. Les fruits sont glabres, ovales, aigus à leur sommet.

Cette plante croît en Espagne, au pied des montagnes. ♀ (*Descript. ex Cav.*)

4. STATICE gazon d'Olympe. *Statice cespitosa*. (N.)

Statice scapo simpliciter, pubescente; foliis graminæis, angustissimis, subulatis. (N.)

Statice (montana), foliis linearibus, subulatis; squamis calicinis obtusis. Miller, Dict. n°. 2.

Statice armeria. Var. β. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 394. — Lam. Illustr. Gener. tab. 219. fig. 1.

Statice (armeria), scapo piloso; foliis graminæis, flaccidis. Hoffm. Flor. Germ. pag. 150.

Statice pubescens. Sow. English. Botan. tab. 226.

Statice montana, minor. Tournef. Inst. R. Herb. 141.

Caryophyllus montanus, minor. C. Bauh. Pinn. 211.

Gramen polyanthemum, minus. Dodon. Pempt. pag. 564. Icon.

Caryophyllus flos, aphyllaeus vel junco minor. J. Bauh. Hist. 3. pag. 336. Icon. Prima.

Caryophyllus marinus, omnium minimus. Lob. Icon. pag. 452. fig. 1. — Idem. Observ. pag. 242. Icon.

Pseudo moly Dodonæi. Dalech. Hist. 2. p. 1594. Icon. Mala.

β. ? *Statice (humilis), foliis linearibus, brevibus, rigidiusculis, bracteis plerisque acutis, inferis acutis*. Link. in Schröd. Journ. 1800. pag. 61.

Vulgairement gazon d'Olympe.

Malgré des grands rapports avec la *statice armeria*, cette plante m'en paroît trop bien distinguée pour qu'elle puisse y rester réunie, comme une simple variété; je l'ai d'ailleurs assez constamment observée toujours la même, soit sur les hauteurs ou dans les terrains secs, soit sur les bords de la mer. Quoique souvent plus petite dans la nature, on la reconnoît aisément pour le type de celle que l'on cultive dans les jardins sous le nom de *gazon d'Olympe*.

Ses racines sont dures, presque ligneuses, & se divisent à leur sommet en plusieurs fouches, qui produisent des feuilles nombreuses, toutes radicales, disposées en gazons touffus, planes, linéaires, très-étroites, larges d'environ une demi-ligne, un peu molles, longues d'un à trois pouces, égales dans toute leur longueur, élargies à leur base en une gaine courte, ovale, striée, roussâtre; obtus à leur sommet, glabres, entières. De leur centre s'élèvent plusieurs tiges ou hampes, très-simples, nues, grêles, presque filiformes, légèrement pubescentes, terminées par une tête de fleurs assez semblables, pour la forme & la grosseur, à celle de l'espèce précédente; d'un rouge-pâle; les écaillés de l'involucre ovales, concaves, obtuses, un peu plus courtes que les fleurs; les calices presque entiers à leurs bords, un peu mucronés; la gaine longue de six à huit lignes, déchirée en lanières à son bord inférieur. La plante paroît être une variété intermédiaire entre cette espèce & le *statice juniperifolia*. Ses feuilles sont rondes, linéaires, très-courtes; les écaillés de l'involucre, la plupart aiguës, surtout les extérieures; les tiges basses. On la trouve dans le Portugal.

Cette plante croît dans les terrains arides, en Europe. Je l'ai recueillie sur les bords de la mer, sur la grève du mont Saint-Michel en Normandie. (V. v.)

On fait avec cette espèce, de très-jolies bordures dans les jardins; elle porte le nom de *gazon d'Olympe*.

5. *STATICE fasciculé. Statice fasciculata. Vent.*

Statice caule frutescente, infirmo nudo; scapo simplici, capitato; foliis fasciculatis, linearibus, canaliculatis, recurvis. Vent. Hort. Cels. pag. 38. tab. 38. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 335.

Statice lufitanica, frutesca, maritima, magno flore. Tournef. Insl. R. Herb. 341. & ex Herbar. Vaillant.

Statice seu caryophyllus marinus, frutescens, flore albo. Grifl. Viridar. Lusitan.

On distingue cette espèce à ses feuilles situées au sommet d'une tige ligneuse, rapprochées en faisceau, vaginales, linéaires, & creusées d'un sillon sur leur surface supérieure.

Ses racines sont brunes, composées de grosses fibres; ses tiges ou souches droites, cylindriques, ordinairement simples, quelquefois rameuses, de couleur de rouille, de la grosseur du doigt, longues de quatre à cinq pouces, chargées de feuilles glabres, longues, très-étroites, d'un vert-gai; les inférieures recourbées, les supérieures droites. De leur centre s'élève une hampe droite, solitaire, un peu penchée à son sommet, glabre, cylindrique, longue d'un pied, enveloppée à sa partie supérieure par une gaine scarieuse & luisante, déchirée à sa base, s'ouvrant latéralement.

Les fleurs sont terminales, rapprochées en tête, pédicellées, d'un rose tirant sur le pourpre, entouré d'un involucre composé d'écaillés imbriquées, ovales-ar rondies; les intérieures oblongues, membranées & argentées à leurs bords; le calice propre en forme d'entonnoir, un peu pubescent à sa base; le limbe d'un vert blanchâtre, plissé, court, surmonté de cinq petites pointes; la corolle une fois plus longue que le calice; cinq pétales inférés sous l'ovaire, peu ouverts, presque en forme de coin; cinq étamines opposées aux pétales, également inférées sous l'ovaire; cinq styles adhérents à leur base, velus dans leur partie moyenne, plus courts que les étamines.

Cette plante croît sur les bords de la mer, en Portugal & dans les environs d'Ajaccio en Corse. Elle est cultivée dans le jardin de M. Cels. (V. Descrip. ex Vent.)

6. *STATICE à feuilles de gramin. Statice graminifolia. Aiton.*

Statice scapo paniculato; ramis triquetris; foliis linearibus, canaliculatis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 383.

Cette espèce est distinguée du *statice fasciculata* par ses tiges, qui se divisent à leur sommet en une sorte de panicule, dont les ramifications sont triangulaires, dépourvues de feuilles. Celles-ci sont toutes radicales, réunies en gazon, simples, linéaires, canaliculées à leur face supérieure. On ignore son lieu natal. Elle est cultivée à Londres.

7. *STATICE à feuilles de genévrier. Statice janiperifolia. Vahl.*

Statice scapo simplici, capitato; foliis linearibus, triquetris, rigidis, pungentibus. Vahl, Symb. 1. pag. 25. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1512. n° 2.

Statice (capitata), scapis brevibus, aggregatis, capitatis; foliis acerosis, flore albo. Tournef. Insl. R. Herb. 341. & ex Herbar. Vaillant.

Statice foliis acerosis, propaginibus numerosis, congestis. Ortega. Deca. pag. 121.

Statice maritima, humillima, folio capillaceo, rigido. Tournef. Insl. R. Herb. 341.

Cette espèce est voisine de notre *statice capitata*; mais elle a dans son port, & dans la forme & la roideur de ses feuilles courtes, piquantes, des caractères qui la distinguent.

Ses racines produisent des ramifications & des rejets nombreux, qui poussent des feuilles disposées en gazons touffus, très-étendus. Elles sont courtes, roides, glabres, longues d'environ un demi-pouce, très-étroites, presque triangulaires, terminées par une pointe roide, épaisse, très-aiguë & souvent blanchâtre. Du milieu de ces feuilles s'élèvent un grand nombre de hampes presque fasciculées, droites, courtes, roides, glabres, striées, à peine une fois plus longues que les feuilles, très-simples, soutenant une tête de fleurs d'un rouge-pâle, & qui ne diffèrent presque point de celles de l'espèce précédente.

Cette plante croît dans le Portugal & l'Espagne, sur les côtes maritimes. (V. f.)

8. *STATICE à feuilles capillaires. Statice capillifolia.*

Statice scapo simplici, capitato; foliis rigidis, longissimis, capillaceis, acutis; capite magno, globoso. (N.)

Statice lufitanica, capillaceo folio, major. Tournef. Insl. R. Herb. 341.

Cette plante a de très-grands rapports avec le *statice capitata*; elle offre cependant des différences frappantes, qui m'ont déterminé à l'en sépa-

rer. Ses tiges sont hautes de plus d'un pied, cylindriques, fermes; les racines ligneuses; les feuilles très-nombreuses, en gazon, roides, très-étroites, presque capillaires, semblables à celles du pin de Weimouth, longues de quatre à six pouces, un peu triangulaires, très-glabres. Les fleurs forment une tête terminale, au moins de la grosseur d'une cerise; l'involucre est composé d'écaillés roussâtres, larges, imbriquées, ovales, un peu concaves, obtus, terminées souvent par une petite pointe; les calices ont un tube très-grêle, filiforme, élargi & plissé à son limbe, un peu rougeâtre.

Cette plante croit en Portugal, dans les terrains arides, un peu élevés, sur les bords de la mer. &c. (V. f. in herb. Juss.)

**** LIMONIUM.** Tournef. *Taxanthema*. Neck. Feuilles souvent caulinaires; fleurs disposées le long des rameaux, garnies chacune d'écaillés scarieuses.

9. *STATICE limonium*. *Statice limonium*. Linn.

Statice scapo paniculato, tereti; foliis levibus, enerviis, jactis mucronatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 354. — Mater. medic. 90. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 380. — Blackw. tab. 481. — Kniph. Cent. 4. n°. 86. — Wæd. Flor. dan. tab. 315. — Hoffm. Germ. 111. — Roth. Germ. vol. 1. p. 147. — vol. II. pag. 375. — Lam. Ill. Gen. tab. 219. fig. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 273. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 142. — Sw. English. Botan. tab. 102.

Statice scapo paniculato, tereti; foliis margine undulatis, oblongis, glabris, obtusis, subulis mucronatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1523. n°. 6.

Statice caule nudo, ramofo. Hort. Cliff. 115. — Flor. suc. c. 254. 270. — Gronov. Virg. 15. — Roy. Lugd. Bar. 192.

Limonium (vulgaire), *foliis ovato-lanceolatis; caule tereti, nudo, paniculato*. Mill. Dict. n°. 1.

Limonium maritimum, majus. C. Bnh. Pin. 192. — Tournef. Inst. R. Herb. 541. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 600. §. 15. tab. 1. fig. 1. — Zanich. Hist. tab. 311.

Limonium majus, multis, albis behen rubrum. J. Bauh. Hist. 3. Append. pag. 876. Icon.

Limonium majus, vulgare. Parkins. Theatr. pag. 1134. Icon.

Limonium Matthioli. Dalech. Hist. 1. p. 1024. Icon.

Limonium. Msth. Comm. 696. Icon. — Camer. Epitom. 721. Icon. — Lobel. Icon. 295. — Idem. Observ. pag. 157. Icon. — Tabern. Icon. 430. — Gerard. Hist. 411. Icon.

Valeriana rubra similis pro limonio missa. Dodon. Pempt. pag. 351. Icon.

Statice maritima. Var. « Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 64. n°. 701.

g. *Eadem, foliis angustioribus, paniculâ minus ramosâ, floribus congestis*. (N.) Poir. Voy. en Barb. 1. c.

Ses racines sont fortes, épaisses, rameuses, d'un brun-rougeâtre; les tiges sont glabres, dures, nues, cylindriques, striées, paniculées à leur partie supérieure, roides, un peu fistuleuses, hautes au moins d'un pied; garnies à leur base de feuilles toutes radicales, étalées sur la terre, petiolées, alongées, assez grandes, ovales-oblongues, fermes, roides, presque coriaces, glabres à leurs deux faces, vertes & souvent un peu glauques, entières & légèrement ondulées à leurs bords, obtuses à leur sommet muni d'une pointe recourbée, longues au moins de six pouces, larges de deux & plus, rétrécies à leur partie inférieure; & légèrement décurentes en partie sur un pétiole élargi, strié, un peu canaliculé, vaginal à sa base.

À l'insertion de chaque rameau de la panicule on observe une écaille membraneuse, roussâtre, ovale, aigüe. Ces rameaux sont un peu anguleux; ils se divisent en d'autres plus courts, à l'extrémité desquels les fleurs sont disposées sur une seule série, très-rapprochées, unilatérales, tournées vers le ciel. Les dernières ramifications sont dans la même disposition; chaque fleur munie à sa base de deux ou trois écaillés imbriquées, un peu aigües, scarieuses & blanchâtres à leurs bords; le calice & la corolle d'une grandeur médiocre, d'un violet-pâle, ou blanchâtre.

La plante, que j'ai recueillie sur les côtes de Barbarie, est moins élevée; ses feuilles sont plus petites, plus étroites; ses tiges moins paniculées; les fleurs plus ramassées, plus denses; les rameaux de la panicule moins grêles, fermes, épais, moins divisés.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans la vase sablonneuse, en Europe, sur les côtes de la Barbarie, dans la Virginie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. &c. (V. v.)

Cette espèce a été autrefois en usage en médecine: sa racine, sous le nom de *herba rouge*, étoit employée comme fortifiante, astringente, & propre à arrêter les hémorragies; elle est aujourd'hui entièrement abandonnée comme plante médicale; mais on cultive cette plante dans les grands jardins, où elle se fait remarquer plutôt par son port que par la beauté de ses fleurs; elle croît d'ailleurs avec assez de facilité.

10. *STATICE* de Gmelin. *Statice Gmelini*. Willd.

Statice scapo paniculato, angulato; foliis oblongo-ovatis, emarginatis; planis, cartilagineo-mucronatis, subtus mucronatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1524. n°. 7.

Statice caule nudo, ramofo; floribus paniculatis, coeclis minimis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 220. tab. 90.

Limonium latius, floribus parvis, densè congestis, aequalis. Amm. Ru h. 128.

Cette plante pourroit n'être qu'une variété du *statice limonium*, dont elle offre les principaux caractères; elle en a cependant quelques-uns qui paroissent lui être particuliers.

Ses tiges font plus grêles, moins roides, anguleuses, particulièrement à leur partie supérieure, rudes, striées; les rameaux disposés en une panicule beaucoup plus étalée; les ramifications principales presque quadrangulaires; leurs divisions très-grêles, comprimées, à deux angles; les feuilles ovales-oblongues, planes, coriaces, glabres à leurs deux faces, presque point ondulées, assez grandes, munies d'un rebord un peu blanchâtre & cartilagineux, obtus à leur sommet, surmontées d'un point médiocrement recourbée, rétrécies à leur base; les pétiols plus étroits, fermes, striés.

Les fleurs font presque une fois plus petites que celles du *statice limonium*, disposées sur une seule série à la partie supérieure des ramifications, toutes tournées du même côté, vers le ciel, d'une couleur azurée-tendre; les écailles qui les accompagnent, plus étroites, plus aiguës, scarieuses.

Cette plante croît dans la Sibérie. Les détails que je viens de présenter ont été faits d'après un individu recueilli dans les parterres du Jardin des Plantes de Paris, & qui n'a paru appartenir à cette espèce. (V. v.)

II. STATICÉ à balais. *Statice scoparia*. Willd.

Statice scapo paniculato, tereti; foliis oblongo-ovatis, coriaceis, mucronatis, subtus punctatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1524. n°. 8.

Cette espèce ressemble beaucoup au *statice laevis*, mais elle est glabre sur toutes les parties. Ses tiges font droites, nues, cylindriques, paniculées à leur partie supérieure, offrant le même port que celles du *statice limonium*. Les feuilles font toutes radicales, pétiolées, ovales-oblongues, coriaces, mucronées à leur sommet, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, finement ondulées à leurs bords, de telle sorte qu'elles semblent crénelées; leur face inférieure parsemée de petits points faibles, qui ne font guère visibles qu'à la loupe.

Cette plante croît en Sibérie. Ses panicules,

dont les ramifications font souples, point caillantes, servent aux habitants à faire des balais. (Descript. ex Willd.)

12. STATICÉ, à larges feuilles. *Statice laevis*, Smith.

Statice scapo paniculato, ramossissimo, scabro; foliis pubescentibus, pilis fasciculato-stellatis. Smith. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. 250. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1524. n°. 9.

Statice coriaria. Pallas, Ind. Flor. taur.

Limonium folio caula, flabellis tenuissimis, ramossissimis; floribus parvis, caruleis. Gerber, mill.

Cette plante se lie au *statice limonium* par un grand nombre de rapports; elle s'en distingue par ses feuilles beaucoup plus grandes, & par les poils disposés en étoile, dont plusieurs de ses parties font chargées.

Ses racines font dures, épaisses, rameuses, presque ligneuses; elles produisent plusieurs tiges nues au toucher, chargées de poils étoilés, paniculées, très-rameuses; les rameaux grêles, effilés, diffus, presque filiformes, très-nombreux; les inférieurs stériles, comme dans le *statice reticulata*. Les feuilles font toutes radicales, pétiolées, pubescentes, particulièrement sur leurs nervures, très-grandes, larges, alongées, entières à leurs bords; les poils qui les recouvrent, rapprochés par fascicules & ouverts en étoile.

Les fleurs font disposées, en une seule série, le long de la partie supérieure des rameaux, presque toutes tournées du même côté. Elles font petites, bleuâtres, munies à leur base d'écailles aiguës, scarieuses, qui existent également à l'insertion des rameaux.

Cette plante croît en Sibérie, le long du fleuve Don, proche Azof. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

13. STATICÉ pourpre. *Statice purpurata*. Linn.

Statice caule subsolato; foliis obovato-cuneatis, trinerviis, mucronatis. Linn. Manrif. 59. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1528. n°. 22.

Statice caule foliis; foliis obovatis, mucronatis. Thunb. Prodr. 54.

Statice (peregina), scapo dichotomo, paniculato, tereti, scabro; foliis cuneiformibus, mucronatis, ovatis, glabris, subtus striatis. Berg. Plant. Cap. pag. 80.

Cette plante a quelques rapports avec le *statice limonium*, mais ses fleurs font presque une fois plus grandes, ses feuilles plus obtuses & plus petites.

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes d'environ huit à dix pouces, à peine feuillées, un

peu tuberculeuses, dichotomes, divisées en rameaux paniculés. Les feuilles, radicales en grande partie, sont ovales, presque en coin, épaisses, coriaces, entières, obtuses & souvent mucronées à leur sommet, longues d'un pouce & plus, glabres à leur face supérieure, marquées de trois nervures longitudinales, hérissées en dessous de très-petits points, rétrécies inférieurement en un pétiole vaginal à son insertion, où il laisse par sa chute une écaille noire, luisante & comme vernissée.

Les fleurs sont sessiles, rapprochées, paniculées, unilaurales; les ramifications de la panicule garnies d'écailles ovales, aiguës, membraneuses à leurs bords; les bractées, au nombre de trois pour chaque fleur, deux inférieures ovales, concaves, plus courtes, obtuses, très-brunes, scarieuses & blanches à leurs bords; la troisième plus grande, ovale, oblongue; le calice en entonnoir; son tube cylindrique, strié, velu à sa base; son limbe plissé, scarieux, enrié, d'un beau rouge ou bien un peu bleuâtre, traversé par cinq nervures rougeâtres, à cinq dents roides, subulées; la corolle purpurine; cinq pétales étroits, lancéolés, aigus, de la longueur du calice; un ovaire presque turbiné, obtus, à cinq angles.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

14. STATICE de Tartarie. *Statice tatarica*. Linn.

Statice scapo ramosa, divaricata; ramis triquetris; floribus distantibus; foliis lanceolato-ovatis, mucronatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1527. n°. 19.

Statice scapo dichotoma; foliis lanceolatis, mucronatis; floribus alternis, distantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 393. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 223. tab. 92.

Limonium tataricum. Mill. Dict. n°. 5.

Limonium orientale, plantaginis folia, floribus umbellatis. Tournef. Coroll. 25. — Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 76. tab. 76.

Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus, in aculeum terminatis; floribus albis, spicatis. Amm. Ruth. 130.

15. *Statice trigonoides*. Pallas.

16. *Statice (rubella), caule suffruticoso, ramoso, alato, nudo, paniculato; foliis radicalibus, mucronatis; floribus alternis, distantibus*. Gmel. Syst. Nat. pag. 512. n°. 19. — Gmel. Itin. 2. p. 199. tab. 34.

Ses tiges sont dures, basses, très-glabres, étalées, un peu comprimées, à deux ou trois angles membraneux, divisées en rameaux roides, très-ouverts, plus ou moins aillés sur leurs angles, nus, paniculés; les feuilles toutes radicales, couchées,

longuement pétioolées, allongées, ovales-lancéolées, ohruses, entières à leurs bords, mucronées à leur sommet par une petite poire courte & droite, fermes, glabres à leurs deux faces, un peu scarieuses à leur contour, rétrécies à leur base & décroissantes en partie sur leur pétiole.

Les fleurs sont paniculées, distantes, réunies quelquefois en paquets presque ombellés ou en épis courts, munies d'écailles & de bractées coriaces, ovales, un peu larges, aiguës, légèrement scarieuses & blanchâtres à leurs bords; le calice étroit, presque cylindrique, plissé, blanc, scarieux à son limbe, à cinq dents aiguës; la corolle purpurine, à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît dans la Tartarie & la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

La plante γ , cultivée au Jardin des Plantes de Paris & à la pépinière de Versailles, ne diffère du *Statice tatarica* que par ses feuilles plus amples, les tiges plus rameuses, plus étalées, plus fortement aillées, presque couchées; par ses fleurs plus écartées, très-nombreuses; par ses corolles rougeâtres. Comme elle a d'ailleurs tous les autres caractères du *Statice tatarica*, elle ne peut en être séparée. (V. v.)

15. STATICE élégant. *Statice speciosa*. Linn.

Statice scapo ramoso, tereti; ramis ancipitibus, alatis; floribus imbricatis; foliis obovato-cuspidatis, mucronatis, margine cartilagineis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1527. n°. 17.

Statice scapo dichotomo, ancipiti; foliis ovatis, mucronatis; floribus aggregatis. Linn. Spec. Plant. pag. 395.

Limonium foliis lanceolatis, mucronatis, radicalibus; caule ancipiti, dichotomo; stipulis simplicibus. Hort. Upl. 71. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 221. tab. 91. fig. 1.

Limonium floribus elegantissimis. Rai, Hist. 397.

Limonium elatius, plantaginis foliis procumbentibus, in aculeum terminatis; floribus albis, in capitulum congestis. Amm. Ruth. 129.

Ce statice a un aspect fort agréable, & se fait remarquer par ses fleurs blanchâtres, légèrement teintées en rose, & rapprochées en paquets globuleux à l'extrémité des ramifications de la panicule.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, striées, presque à deux angles, fermes, grêles, rameuses; les rameaux étalés, comprimés, à deux angles opposés, aillés, membranux. Les feuilles sont radicales, coriaces, ovales-lancéolées, glauques ou cendrées, chargées de tubercules peu saillans,

faillins, & qui ne sont souvent visibles qu'à la loupe; longues d'un à trois pouces, aigues, mucronées à leur sommet, cartilagineuses à leurs bords, décurentes à leur base sur un pétiole plane, élargi à son insertion.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux de la panicule, en têtes nombreuses, supportées par des ramifications très-courtes, munies à la base & le long des rameaux, d'écaillés assez grandes, ovales, acuminées, blanches & scarieuses à leurs bords; les bractées à peu près semblables, un peu plus larges, imbriquées; les calices blanchâtres, quelquefois légèrement colorés en rose, campanulés, scarieux à leur limbe, entiers, plissés, un peu frangés à leurs bords; les pétales étroits, plus courts que le calice.

Cette plante croît dans la Tartarie & dans la Sibérie. *a* (V. f. in herb. Lam.)

16. STATICE oreille d'ours. *Statice auriculifolia*. Vahl.

Statice scapo simpliciter, tereti; foliis lateralibus terminalibusque, secundis; foliis spatulatis, acutis. Vahl, Symbol. 1. pag. 25. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1525. n°. 12. — Schousb. Maroc. pag. 133.

Statice auriculata urssolia. Pourret, A&C. Acad. Tolos. 3. pag. 330.

Limonium lustranicum, auricula urssolia. Tourn. Init. R. Herb. 342.

Limonium minus, oleosifolia supino, alterum. Batrel. Icon. tab. 789.?

On distingue cette espèce à ses feuilles bien plus petites que celles du *statice limonium*, spatulées, presque semblables à celles de l'oreille d'ours, à ses fleurs très-fermées.

Ses racines sont simples, épaisses, presque suffimées; si s'en élève une tige droite, très-ferme, dure, cylindrique, glabre, striée, simple, garnie dans la longueur de deux ou trois écaillés foliaires, scarieuses; haute de huit à dix pouces, médiocrement rameuse à sa partie supérieure, un peu visqueuse à sa base; les rameaux alerms, roides, terminés par d'autres plus courts qui supportent les fleurs, munis à leur base d'écaillés brunes, aigues. Ses feuilles sont toutes radicales, cotiaces, ovales-spatulées, de couleur glauque, entières, légèrement ondulées à leurs bords, aigues à leur sommet, rétrécies à leur base en un long pétiole plane, vaginal à sa partie inférieure.

Les fleurs sont très-fermées sur les dernières ramifications, unilatérales, blanches ou un peu bleuâtres; les calices, ainsi que les bractées qui les accompagnent, sont obtus, un peu membraneux & blanchâtres à leurs bords; les ramifications

Botanique, Tome VII.

tions qui portent les fleurs, sont courtes; les infertiles horizontales ou un peu recourbées; les supérieures presque droites & en épis.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans les départements méridionaux de la France, en Barbaire, &c. Elle m'a été communiquée par M. l'abbé Pourret. *a* (V. f.)

17. STATICE à feuilles d'olivier. *Statice oleosifolia*. Scop.

Statice foliis lanceolatis, subaristatis, margine albo; calicibus dichotomis, flexuosis, subnullis. Scop. Del. 1. n°. 1. tab. 10. — Cavan. Icon. Rar. vol. 1. p. 38.

Statice (oleosifolia), scapo paniculato, ramis angulato-alatis; foliis lanceolatis, mucronato-cuspidatis, margine cartilagineis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1525. n°. 10.

Limonium maritimum, minus, oleosifolia. C. Bauh. Pinn. 192. — Tourn. Inst. R. Herb. 342.

Limonium parvum, narbonense, oleosifolia. Lobel. Icon. 297. — Idem, Adverf. pag. 123. Icon. — Rai, Hist. 1. pag. 397.

Limonium minus. J. Bauh. Hist. 3. Append. pag. 877. Icon. Bona.

Limonium narbonense, parvum. Dalech. Hist. 1. pag. 1025. Icon.

Limonium minus, oleosifolia, polycladum. Batrel. Icon. Rar. pag. 65. n°. 689. tab. 790.

Il faudroit presque avoir sous les yeux cette espèce & les deux ou trois suivantes, pour ne pas les confondre. Quoique très-rapprochées, elles se distinguent cependant par des caractères assez constants. Celle dont il s'agit ici n'a pas les feuilles rudes ou tuberculées du *statice echioides*; elle diffère du *statice reticulata* par ses tiges droites & par ses feuilles légèrement mucronées.

Ses racines sont ligneuses, brunes, souvent tortueuses; elles produisent des tiges grêles, droites, assez nombreuses, glabres, très-rameuses, striées, médiocrement cylindriques, quelquefois même anguleuses & presque quadrangulaires en partie ou en totalité, plus souvent celles des rameaux. Ceux-ci sont presque dichotomes, légèrement flexueux à leurs ramifications. Les feuilles sont toutes radicales, assez nombreuses, pétioles, petites, ovales-lancéolées, presque spatulées, glabres, lisses, très-entières, quelquefois un peu membraneuses à leurs bords; les unes aigues à leur sommet, d'autres obtuses avec une petite pointe courte, rétrécies à leur base en un long pétiole aplati.

Les fleurs sont disposées presque unilatéralement à l'extrémité des rameaux, munies, tant à l'insertion des rameaux que sous le calice, d'écaillés

E e e

brunes, un peu aiguës, membraneuses & blanchâtres à leurs bords. Les fleurs sont d'une grandeur médiocre, plus ou moins serrées, blanches ou un peu violettes.

Cette plante se rencontre sur les côtes maritimes en France, dans les départemens méridionaux, en Italie, en Espagne. Je l'ai recueillie à Marseille sur le bord de la mer. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

18. STATICE blanchâtre. *Statice incana*. Linn.

Statice scopi paniculato; *foliis lanceolatis, trixervis, subundulatis, apice mucronatis*; *panicula ramis triquetris*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 754. n°. 3. — Mantiff. 59. 114. — Vahl, Symbol. t. pag. 25. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1515. n°. 11.

Statice (speciosa), *caule subnudo, dichotomo, inferni subnicipiti, superni saepe triangulari*. Fotskh. Catal. Plant. ægypt. pag. 65. n°. 192.

Ses tiges sont droites, cylindriques, nues, paniculées, quelquefois presque à deux angles à leur partie inférieure; les rameaux glabres, triangulaires. Les feuilles, toutes radicales, sont pétioles, elliptiques-lanceolées, un peu blanchâtres, traversées par trois nervures longitudinales, entières & légèrement ondulées à leurs bords, mucronées à leur sommet. Les fleurs sont disposées vers l'extrémité des rameaux de la panicule. Leur calice est blanc, traversé par cinq stries vertes, faillantes en pointe, & la corolle blanche; chaque fleur munie à sa base de trois ou quatre bractées étalées, courtes, subulées.

Cette plante se rencontre dans l'Arabie, ainsi que dans la Sibérie. ♀

19. STATICE à feuilles en cœur. *Statice cordata*. Linn.

Statice scopi paniculato; *foliis spatulatis, retusis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 394. — Sauvag. Monsp. 15. — Allion. Niceens. 163. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 275. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1526.

Limonium cordatum. Mill. Dict. n°. 10.

Limonium maritimum, minus, foliis cordatis. C. Bauh. Pin. 192. Prodr. 99. — Tourn. Inst. R. Herb. 342. — J. Bauh. Hist. 3. Append. pag. 877. Sine leoma.

Limonium minimum, cordatum, folio retuso. Barrel. Icon. Rar. 805.

♂. *Limonium folio cordato, ficalum*. Boccon. Sic. pag. 64. tab. 34. — Desfont. l. c.

Statice maritima. Var. ♂. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 64. n°. 704.

On distingue cette espèce du *statice echinoides*, à ses feuilles qui ne font point hérissées de tubercules, & dont le sommet est, dans le plus grand nombre, échancré en cœur.

Ses tiges sont glabres, droites, fort grêles, cylindriques, rameuses, paniculées, munies seulement à leur base de feuilles pétioles, roides, cunéiformes ou spatulées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, larges, obtuses, & très-souvent échancrées en cœur à leur sommet, rétrécies en coin & décurrentes sur leur pétiole; elles varient dans leur grandeur. Dans la variété ♂, elles sont presque une fois plus grandes. Les fleurs sont disposées presque en épis courts à la partie supérieure des ramifications de la panicule, garnies d'écaillés ovales, aiguës, scarieuses tant à l'insertion des rameaux, qu'à la base des calices.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans les départemens méridionaux de la France, en Espagne, en Italie, dans la Sicile & sur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

20. STATICE à feuilles de paquerette. *Statice bellidifolia*. Gouan.

Statice foliis oblongis, spatulatis, obtusis; floribus minimis, corymbosis. (N.)

Statice (limonium, var. γ, bellidifolia), *foliis obovatis*. Gouan, Monsp. 231. — Boccon. Muf. tab. 103.

Limonium maritimum, parvum, bellidifolium minoris folio. Magn. Bot. Monsp. pag. 155. & Hort. 119. — Tourn. Inst. R. Herb. 342.

Statice bellidifolia. Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 421.

Elle se rapproche beaucoup du *statice cordata*, à ses feuilles, & paroit même se confondre avec ces espèces; elle en diffère par la petitesse de ses fleurs disposées en corymbe, par ses feuilles plus allongées, spatulées, obtuses, point échancrées; elles n'ont point les aspérités de celles du *statice echinoides*. Les rameaux ne font point autant bifurqués que ceux du *statice reticulata*.

Ses racines produisent plusieurs tiges grêles, droites, tuberculeuses, cylindriques, bifurquées. Les feuilles, toutes radicales, sont ouvertes en rosette, oblongues, élargies en spatule, obtuses à leur sommet, entières, rétrécies en pétiole à leur base, assez semblables à celles de la paquerette; les fleurs petites, ramassées au sommet des rameaux en forme de petites corymbes; la base des divisions garnie de bractées courtes, lisses, scarieuses, obtuses; le calice membraneux, scarieux, terminé par cinq dents; la corolle d'un blanc bleuâtre.

Cette plante croît sur les côtes maritimes de la Méditerranée, dans les départements mentionnés de la France. (V. f.)

21. *STATICE* réticulé. *Statice reticulata*. Linn.

Statice scapo paniculato, prostrato; ramis sterilibus, retroflexis, natis; foliis canaliculatis, mucosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 394. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1516. n°. 16.

Statice foliis obovatis ovatis; ramis nudis, humifusis, intricatis. Sauvag. Monsp. 15.

Limonium minus, virgulis reiformiter se invicem implicatis. Pluk. Almag. pag. 221. tab. 42. fig. 4.

Limonium supinum, reticulatum. Magn. Botan. Muscip. pag. 156. & Hort. 119. — Tourn. Init. R. Herb. 342. — Bocc. S. c. pag. 82. tab. 44.

Limonium reticulatum. Rai, Hist. 396.

β. *Statice* (dichotoma), *caule aphylo, dichotomo; foliis spatulatis, glabris; peraliti basi coalitis.* Cavan. Icon. Kar. 1. pag. 37. tab. 30.

γ. *Statice foliis linearibus cuneiformibus, acutiusculis; ramis glabris.* Willd. l. c.

Cette plante diffère peu du *statice echinoides*; elle a comme lui des tubercules, particulièrement sur les tiges quand elles vieillissent, mais les feuilles en sont à peine chargées, & ses bractées ne le sont point du tout, & bien moins scarieuses que celles du *statice bellidifolia*, dont elle diffère encore par ses fleurs plus allongées.

Ses tiges partent de plusieurs souches ligneuses, noires, couvertes d'écaillés imbriquées, qui sont les gaines deschettées des anciennes feuilles. Elles se divisent en rameaux grêles, étalés, diffus, plusieurs fois bifurqués, formant une sorte de réseau par leurs bifurcations nombreuses, grêles, cylindriques, glabres dans leur jeunesse, chargés avec l'âge de tubercules qui les rendent presque réticulés. Les feuilles, toutes inférieures, sont canaliculées, spatulées, obtuses, entières, un peu rudes, rétrécies en un pétiole dont la base engaine les tiges. Les fleurs sont éparées, distantes, étroites, allongées, d'un bleu-tendre ou blanchâtre; les écailles & les bractées très-sigues, scarieuses seulement sur leurs bords, très-glabres, lisses, étroites.

Cette espèce croît sur les bords de la mer, aux environs de Montpellier. Je l'ai recueillie à Marseille. (V. v.)

Nota. La plante β n'a, comme espèce, que des caractères très-peu tranches; elle peut être également rapportée au *statice aculeifolia* ou bien au *statice reticulata*, comme une variété intermédiaire entre ces deux plantes. Elle convient à la première par ses feuilles, mais plus petites; à la seconde

par ses rameaux à bifurcation nombreuses. Elle croît en Espagne. La variété γ a ses feuilles linéaires, canaliculées, un peu aiguës à leur sommet; les fleurs plus grandes, plus distantes.

22. *STATICE* flexueux. *Statice flexuosa*. Linn.

Statice scapo ramofo, flexuoso; corymbis terminalibus, foliis nervosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 395.

Statice scapo dichotomo, corymboso-fasciatis; spicis capitatis, floribus imbricatis, foliis lanceolatis, cuneiformibus, obtusis, macronatis, terrecerviis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1518. n°. 21.

Statice foliis ovalibus, mucosis, nervosis; caule nudo, alternatim ramofo, flexuoso; corymbis terminalibus. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 217. tab. 89. fig. 1.

Statice rosea. Pallas, Iter 3. pag. 260, in notis.

Ses tiges sont droites, nues, cylindriques, hautes de huit à dix pouces, souvent dichotomes, divisées à leur partie supérieure en rameaux étalés, alternes, médiocrement subdivisés en ramifications presque en zigzag, courtes, munies à leur base d'une écaille étroite, lancéolée, aiguë; les feuilles toutes radicales, ovales-lancéolées, entières, glabres à leurs deux faces, obtuses & mutiques à leur sommet, rétrécies en coin & prolongées en pétiole; souvent une feuille plus petite accompagne la base des premières divisions.

Les fleurs sont paniculées, fasciculées, presque en tête & imbriquées à l'extrémité des ramifications, où elles forment de petits corymbes; les bractées ovales, aiguës, d'un brun-noirâtre; les calices un peu pubescents; leur limbe pourpre ou légèrement teint en rose, à cinq lobes très-courts; la corolle à peine aussi longue que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie; elle est très-bien représentée, quant à son port, dans la figure qu'en a donnée Gmelin. (V. f. in herb. Lam.)

23. *STATICE* à feuilles rudes. *Statice echinoides*. Linn.

Statice foliis radicalibus, obovatis; scapo paniculato; floribus remotiusculis, sessilibus, subarcuratis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 274.

Statice scapo paniculato, tereti; foliis tuberculatis. Linn. Spec. Plant. pag. 394.

Statice scapo paniculato, tereti, articulado; foliis scabris. Syll. v. get. pag. 248.

Statice scapo paniculato, tereti; foliis caliciformibus tuberculato prostratis. Gouan. Muscip. pag. 230. & Illustr. pag. 22. tab. 2. fig. 4.

Limonium minus, annuum, bullatis foliis, vel
Ecc 2

achnoides. Magn. Bot. Monsp. pag. 157. Icon. — Tour. Infr. R. Herb. 341.

Statice aspera. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 64. n°. 701.

Les rapports de cette plante avec les précédentes sont tels, qu'on a peine à l'en distinguer au premier aspect; cependant on la reconnoît, avec un peu d'attention, aux aspérités & aux petits tubercules dont ses feuilles, même la tige & les bractées sont constamment couvertes, & la font ressembler à la vipérine. Ses tiges sont droites, hautes de huit à dix pouces & plus, cylindriques, plusieurs fois bifurquées. Les feuilles sont radicales, étendues en rosette, ovales, allongées ou en forme de spatule, rétrécies en pétiole à leur base, glabres, entières, tuberculées. Les fleurs sont terminales, paniculées, dilantes les unes des autres, étroites, foliaires, de couleur un peu purpurine, à peine plus longues que les bractées qui les accompagnent. Celles-ci sont scarieuses, étroites, aiguës, couvertes de petits tubercules sail-lans; le calice grêle, un peu arqué; les pétales très-étroits.

Cette plante se trouve vers les côtes maritimes, dans les départemens méridionaux de la France, aux environs de Montpellier, de Maricille, sur la côte de Barbarie. (V. v.)

24. STATICE spatulée. *Statice spatulata*. Desf.

Statice foliis radicalibus spatulatis, obtusa, glauca, integerrimis, longè petiolatis; scapo tereti; ramis paniculatis; floribus racemosis, secundis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 275.

Statice cordata. Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 143.

J'avois d'abord regardé cette plante, que j'ai recueillie sur les côtes de Barbarie, comme devant se rapporter au *statice cordata*. M. Desfontaines l'a distinguée comme espèce: elle a en effet des caractères qui lui sont propres. Ses tiges sont fermes, droites, glabres, cylindriques, divisées à leur partie supérieure en rameaux paniculés, médiocrement étalés, munis à leur insertion d'écaillés ter-mes, ovales, filées, acuminées; quelques-uns se trouvent aussi sur les tiges. Les feuilles sont toutes radicales, longues d'environ deux pouces, spatulées, très-fermes, épaisses, coriaces, entières, obtuses & quelquefois un peu échancrées à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole long d'un à deux pouces. Ces feuilles, ainsi que la partie inférieure des tiges, sont glauques, & prennent une très-belle couleur bleue, qu'on pourroit comparer au *prussate de fer* (bleu de Prusse).

Les fleurs sont assez grandes, disposées, à l'ex-tremité des rameaux, en grappes lâches, un peu

étalées, unilatérales. Elles sont droites, éparfes ou alternes sur les rameaux supérieurs. Les bractées sont membranées, un peu blanchâtres, de moitié plus courtes que les calices; ceux-ci presque tubulés, scarieux & presque à cinq dents à leur limbe; les pétales un peu plus longs que le calice.

J'ai trouvé cette plante sur les rochers qui avoi-sinent Lacalle, sur les côtes de Barbarie. (V. v.)

25. STATICE à rameaux nombreux. *Statice ramossima*. Poir.

Statice scapo ramossimo, paniculato; foliis spatulato-lanceolatis; floribus fasciculatis. Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 142.

Statice (globularis) foliis, acuminatis, ho-rizontalibus; paniculâ largâ; racemis terminalibus, secundis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 274.

Limonium medium, globularifolio, majus & mi-nus. Barret. Icon. Rar. tab. 793 & 794.

Cette espèce se distingue au grand nombre de ses rameaux paniculés, étalés, & à ses fleurs la plupart réunies en petits fascicules entre des bractées communes.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied & plus, grêles, cylindriques, glabres, un peu striées, divisées en un très-grand nombre de rameaux souples, alternes, munis à leur base d'une petite écaille ovale, aiguë, très-courte. Les feuilles sont radicales, glabres, membranées, petioles, ovales ou lancéolées, acuminées, quelquefois spatulées, très-entières, longues d'un pouce & plus, sur un demi-pouce de large; rétrécies & d'écu-rentes à leur base sur un pétiole comprimé, d'environ un pouce de long; les fleurs disposées en grappes unilatérales à l'extrémité des rameaux, ramifiées très-souvent par petits paquets entre quelques bractées ovales, imbriquées, presque ob-ruses, scarieuses & blanchâtres à leurs bords, ainsi que le limbe du calice & des pétales, un peu plus longs que les bractées.

J'ai recueilli cette plante dans la Barbarie, à mi-chemin de Constanine à Bone, sur le bord des eaux bouillantes d'*Hamman-Mefcutin*. (V. v.)

26. STATICE étalée. *Statice diffusa*. Pourr.

Statice foliis linearibus, deciduis; ramis diffusis, patentissimis; ramulis retroflexis. (N.)

Statice diffusa. Pourr. Aët. Acad. Tolos. 3. pag. 330. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 423. — Pluk. Almag. tab. 41. fig. 5. — Lam. Illust. Gen. tab. 219. fig. 3. *Mala*.

Ses racines sont ligneuses, cylindriques, nou-veles, épaisses à leur collet, d'où sortent un grand nombre de tiges grêles, rabattues, très-étalées, un peu flexueuses, divisées en rameaux courts,

altesnes, diftans, courbés en demi-cercle. Les feuilles, situées à la base des rameaux, sont glabres, linéaires, caduques. Les fleurs sont subsulcées, presque alternes & sessiles le long des rameaux. Elles sont, ainsi que les rameaux, garnies de petites bractées blanchâtres, nombreuses, imbriquées, membraneuses, vaginales, terminées par une pointe acérée; le calice (scarieux à son limbe; les pétales étroits, d'un blanc-bleuâtre, à peine plus longs que le calice.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans les départemens méridionaux de la France, aux environs de Narbonne, où elle a été observée par M. Pourret, qui m'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

27. STATICE nain. *Statice minima*. Linn.

Statice caule suffruticoso, foliis confertis, cuneatis, glabris, mucis; scapis paucifloris. Linn. Maniff. pag. 59. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1529. n°. 24. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 275. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 65.

Limonium maritimum, minimum. C. Bauh. Pin. 192. & Prodr. 99. — Tourn. Infl. R. Herb. 342. — Bocq. Sic. pag. 26. tab. 13. fig. 3. — Schaw. Specim. n°. 368. — J. Bauh. Hist. 3. Append. pag. 877. Sine icone.

Limonium fruticosum, minimum, glabrum. Pluk. Almag. pag. 221. tab. 200. fig. 3.

Statice limonium, var. 3. Get. Flot. gall. Prov. pag. 340.

C'est une très-petite espèce, facile à distinguer par ses tiges extrêmement courtes, ligneuses, ramifiées en buissons étalés; par ses feuilles à peine longues d'une ligne & demie, disposées en rosettes, & formant un gazon très-dense, serré. Elles sont glabres, épaisses, fermes, glauques, entières, persistantes, en cœur renversé, obtuses, un peu échanquées à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole court.

De leur centre sortent des hampes courtes, filiformes, droites, nues, à peine rameuses. Les fleurs sont peu nombreuses, disposées en une petite panicule lâche; les bractées vaginales, scarieuses, blanchâtres & obtuses à leur sommet; le calice blanchâtre, teint de rose, plissé, scarieux, à cinq dents courtes, obtuses, traversé par une nervure brune; la corolle d'un rouge-pâle.

Cette plante croît sur les bords de la Méditerranée, dans les départemens méridionaux de la France. Je l'ai recueillie aux environs de Marseille. (V. v.)

18. STATICE monopétale. *Statice monopetala*. Linn.

Statice caule fruticoso, foliis; floribus solitariis;

foliis lanceolatis, vaginantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 376. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1530. n°. 27. — Kniph. Cent. 8. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 277. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 423.

Statice foliis caulinis lanceolato-linearibus. Hort. Cliff. 116. — Roym. Lugd. Bat. 192.

Limonium ficulmum. Mill. Dict. n°. 7.

Limonium lignosum. Boccon. Sic. p. 33. tab. 17.

Limonium foliis halimi. Tourn. Infl. R. Herb. 342.

Limonium frutescens, portulaca marina folio. Dodart, Icones.

Limoniastrum articulatum. Moench. Meth. pag. 423.

Limoniastrum heiff. Fabr. Helmst. pag. 47.

Arbrisseau ordinairement peu élevé, mais qui parvient quelquefois à la hauteur de deux ou trois pieds, remarquable par les petits tubercules blanchâtres qui recouvrent presque toutes les parties.

Ses tiges sont un peu rougeâtres, rameuses, droites ou un peu couchées, quelquefois chargées de galles arrondies & garnies, dans une partie de leur longueur, de feuilles alternes, pétioles, vaginales à leur base, étroites, allongées, entières, obtuses, roides, d'un vert blanchâtre ou glauque, chagrinées ou garnies à leurs deux faces de points blanchâtres, rudes, plus nombreux en dessous; longues de deux à trois pouces, persistantes; la base des pétioles embrasse entièrement les tiges. Ces gaines existent seules à la partie supérieure des rameaux, & ne se prolongent pas en feuilles. C'est de l'aisselle de ces gaines que sortent des fleurs alternes, solitaires, sessiles, dont l'ensemble forme des épis droits, réunis en panicule. Outre l'écaille vaginale, chaque fleur offre encore deux ou trois autres écailles bractéiformes, membraneuses, imbriquées, plus longues, terminées par une petite pointe, glabres ou un peu tuberculées. La corolle est monopétale, d'un rouge-violet; le tube, long, étroit; le limbe plane, à cinq lobes; les étamines situées sous l'ovaire.

Cet arbrisseau croît en France, dans les départemens méridionaux, aux environs de Narbonne, en Sicile & dans la Barbarie, aux environs de Kérouan, dans les sables humides. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

29. STATICE axillaire. *Statice axillaris*. Forskh.

Statice caule fruticoso, foliis; paniculis spicatis, axillaribus; foliis lanceolatis, vaginantibus. Vahl. Symbol. vol. 1. pag. 26. tab. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1530. n°. 28.

Statice (axillaris), *caule fruticoso, foliis paniculatis axillaribus, dichotomis; fl. idus erectis, confertis.* Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 38. n°. 96.

Cette espèce a le port & presque tous les caractères du *statice monopetala*; elle en est bien distinguée par la disposition des fleurs, qui forment des épis axillaires, tandis qu'elles sont solitaires dans l'espèce précédente.

Ses tiges sont droites, ligneuses, étalées, feuillées, cylindriques, hautes de six à dix pouces, couvertes en grande partie d'écaillés vaginales, d'un brun-noirâtre, occasionnées par la chute des anciennes feuilles; celles-ci sont alternes, assez nombreuses, rapprochées, droites, planes, épaisses; lancéolées ou ovales-lancéolées, obtuses, entières, pétioletées; les pétioles enveloppent les tiges par leur base en gaine cylindrique.

Les fleurs, disposées dans l'aisselle des feuilles supérieures, en épis simples ou bifurqués, sont fécondes, droites, très-rapprochées; les bractées d'un brun très-foncé; le calice en forme d'entonnoir; le tube cylindrique; le limbe blanc, membraneux, plissé, traverse par cinq rayons anguleux, de couleur brune.

Cette plante croit dans les plaines de l'Arabie heureuse. ¶

30. *STATICE* à feuilles linéaires. *Statice linifolia.* Linn. f.

Statice caule fruticoso, prostrato; floribus paniculatis, secundis; foliis linearibus. Linn. f. Suppl. pag. 187. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1530. n°. 30.

Statice (linifolia), *caule fruticoso, ramo; ramis foliisque linearibus, scabris.* Thunb. Prodr. pag. 54.

On peut considérer cette espèce comme intermédiaire entre le *statice monopetala* & le *statice axillaris*; elle a le port de la première, & se rapproche de la seconde par la disposition de ses fleurs; elle diffère de l'une & de l'autre par ses feuilles linéaires, par ses fleurs disposées plutôt en panicule qu'en épis. Ses tiges sont couchées, ligneuses, divisées en rameaux linéaires; ses feuilles alternes, étroites, chargées d'aspérités; les fleurs toutes tournées du même côté, à l'extrémité des rameaux de la panicule.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance. ¶

31. *STATICE* à feuilles cylindriques. *Statice cylindrifolia.* Forskh.

Statice caule fruticoso, foliis, dichotomo; foliis teretibus, vaginantibus. Vahl, Symbol. 1. pag. 26. tab. 10. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1530. n°. 29.

Statice (cylindrifolia), *caule fruticoso, foliis, dichotomo; foliis cylindricis, acuminatis.* Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 59. n°. 98.

Limonium galliforme, foliis cylindricis. Shaw. Afric. Specim. 369.

On rencontre aisément cette espèce à ses feuilles cylindriques, sessiles & vaginales. Ses tiges sont étalées, hautes d'un pied, un peu ligneuses, feuillées, rameuses, de couleur brune, indurées, après la chute des feuilles, d'écaillés sèches, brunes, vaginal. s. Les feuilles sont droites, longues d'un pouce, sessiles, étroites, cylindriques, sèches, un peu coriaces, entières, obtuses & macronées à leur sommet, embrassant les tiges par leur base, où elles forment des écaillés vertes, lancéolées.

De l'aisselle des feuilles supérieures sortent les fleurs disposées en panicules longues d'environ trois pouces, divisées en rameaux étalés. Ces fleurs sont sessiles, très-rapprochées, petites, de couleur violette, & toutes tournées vers le ciel.

Cette espèce se rencontre dans les sols argileux, en Arabie, le long des rivages, & dans l'Afrique septentrionale. ¶

32. *STATICE* souligneuse. *Statice suffruticosa.* Linn.

Statice caule fruticoso, supernè nudo, ramo; capitulis sessilibus; foliis lancéolatis, vaginantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 169. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1529. n°. 26.

Statice foliis à lancéolato-linearibus; caulibus basi vaginantibus; capitulis alternis, sessilibus. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 216. tab. 88. fig. 2. 3.

Ses racines produisent plusieurs tiges dures, ligneuses, divisées à leur partie supérieure en deux ou trois rameaux nus; hautes de huit à dix pouces, en partie couchées à leur base, glabres, cylindriques, garnies de feuilles épaisses, petites, rapprochées, étroites, lancéolées, vaginales à leur base, d'un vert-blanchâtre, épaisses, chargées de quelques petites aspérités, très-entières, élargies & obtuses à leur sommet, longues d'un pouce; celles de la base des rameaux sont plutôt des écaillés que des feuilles; les inférieures sont souvent réunies par paquets, enveloppées d'écaillés à leur base.

Chacune des divisions des rameaux se termine par des fleurs très-rapprochées, presque en tête, sessiles, membraneuses, petites; elles forment par leur ensemble une panicule courte, serrée; les dernières ramifications très-courtes, entièrement chargées de fleurs unilatérales; les calices sont membraneux, d'un blanc presque argenté à leur limbe; la corolle est bleue, ordinairement plus courte que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. γ (*V. f. in herb. Lam.*)

33. STATICE cendrée. *Statice cinerea.*

Statice caule erecto, ramofo; foliis oblongis, radicalibus; floribus paniculatis, alternis. (N.)

Ses tiges sont droites, cylindriques, glabres, de couleur cendrée, divisées en rameaux alternes, médiocrement étalés, ridées, les ramifications roides, un peu flexueuses, légèrement anguleuses, toutes dépourvues de feuilles: celles-ci sont radicales, oblongues, glabres, nombreuses.

Les fleurs sont alternes, sessiles, le long des rameaux d'une panicule un peu serrée, munies à leur base de deux petites bractées larges, très-courtes, scarieuses & blanchâtres à leurs bords, très-obtus, très-lisses, d'un brun-noirâtre; une troisième bractée deux fois plus longue au moins que les deux précédentes, concave, presque vaginale, très-obtus, de la longueur du tube du calice qu'elle enveloppe. Celui-ci a le tube cylindrique, pubescent, grisâtre; le limbe assez grand, d'un blanc-sale, scarieux, traversé par cinq nervures brunes, divisé à son sommet en cinq lobes courts, obtus; la corolle plus courte que le calice: ces fleurs sont fort caduques; elles emportent avec elles la grande bractée; les deux plus petites restent sur la plante.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été recueillie par M. Sonnerat. γ (*V. f. in herb. Lam.*)

34. STATICE hérissée. *Statice echinus.* Linn.

Statice scapo paniculato, foliis subulatis, mucronatis. Linn. Spec. plant. vol. 1. pag. 395. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1528. n° 20.

Limonium foliis caulinis subulatis, pungentibus. Roy. Lugd. Bat. 192.

Limonium caspium, foliis cauleatis. Buxb. Centur. 2. pag. 18. tab. 10.

Limonium orientale, frutescens, caryophylli folio, in aeculeum rigidissimum abeunte. Tourn. Coroll. 25.

1. *Limonium gracum, juniperifolium.* Tournef. Coroll. 25.

Echinus seu tragacantha alena. Prosp. Alpin. Exot. pag. 57. tab. 56.

C'est une petite plante très-facile à distinguer par ses feuilles nombreuses, réunies par touffes, disposées en gazon, situées par imbrication sur les fanches ramifiées & ligneuses de la racine; elles sont dures, très-zoïdes, subulées, longues de deux à trois pouces & plus, très-glabres, presque planes en dessus, étroites, un peu raides à leurs bords, insensiblement rétrécies à leur som-

met en une pointe, dures, épineuses, larges & vaginales à leur base; les inférieures renversées en dehors; les supérieures presque droites, une fois plus petites dans la variété 1. Les tiges ou hampes sont courtes, à peine plus longues que les feuilles, cylindriques, peu rameuses, terminées par des fleurs peu nombreuses, d'un bleu-clair.

Cette plante croît dans les îles de l'Archipel, en Grèce & dans les déserts de l'Arabie. γ ? (*V. f. in herb. Juff.*)

35. STATICE dorée. *Statice aurea.* Linn.

Statice caule fruticoso, foliofo, ramofo; foliis subulatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 396. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1531. n° 31.

Statice caulibus fruticosis, teretibus; foliis subulatis, caulinis; floribus ex corymboso-fusculatis. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 218.

Limonium montanum, humile, tephedra facie; calicibus florum aureis. Anm. Ruth. pag. 152. tab. 18. fig. 2.

C'est une très-jolie espèce distinguée par ses feuilles subulées, & surtout par les calices des fleurs d'un beau jaune de soufre, dont l'éclat est relevé par les bractées noires.

Les tiges sont ligneuses, hautes de huit à dix pouces & plus, cylindriques, rameuses, feuillées surtout à leur partie inférieure, divisées en rameaux grêles, un peu comprimés, étalés, paniculés à leur sommet. Les feuilles sont alternes, nombreuses à la base des tiges, alternes le long des rameaux, étroites, glabres, subulées; celles des ramifications très-courtes, situées dans l'aisselle d'une écaille brune, ovale, scarieuse à ses bords.

Les fleurs sont disposées en une belle panicule terminale, médiocrement étalée; les ramifications bifurquées, soutenant plusieurs fleurs presque fasciculées ou en corymbe; plusieurs bractées glabres, inégales, d'un brun-noir, larges, concaves, obtuses, blanches, scarieuses à leurs bords; les calices en forme d'entonnoir; leur tube brun, étroit; le limbe ouvert, plissé, d'un jaune de soufre brillant, à cinq lobes courts, obtus; la corolle plus courte que le calice, d'un jaune-doré, fort petite.

Cette plante croît sur les hauteurs, dans la Sibérie. γ (*V. f. in herb. Lam.*)

36. STATICE à feuilles de férule. *Statice ferulacea.* Linn.

Statice caule fruticoso, ramofo; ramulis imbricatis, pates apice pilis terminatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 396. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1531. n° 32. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 276.

Limonium hispanicum, multifid. folia. Tourn. Inst. R. Herb. 342. — Griseb. Lulit. — Pluk. Almag. pag. 211. tab. 28. fig. 3-4. *Mala.*

Limonium ferulacea folio. Morif. Oxon. Hist. 3. 5. 15. tab. 1. fig. 23.

On distingue ce *Statice*, 1^o, à ses feuilles filiformes, multifides, qu'on prendroit pour autant de ramifications; 2^o, aux écaillés nombreuses des tiges & des rameaux, terminées par un filet sétacé.

Les tiges sont droites, cylindriques, presque ligneuses, hautes de dix à douze pouces, divilées en rameaux très-nombreux, filiformes, paniculés; les ramifications fasciculées, chargées d'écaillés scarieuses, imbriquées, plus grandes à la base des principales divisions, ovales ou lancéolées, aiguës, terminées par un filet sétacé. Les fleurs sont petites, imbriquées, agglomérées, jaunâtres, ascendantes, unilatérales. Dans les individus nombreux que j'ai examinés, je n'ai reconnu d'autres feuilles que des rameaux stériles, un peu inclinés, courts, très-ramifiés à la base des tiges; les ramifications courtes, nombreuses, fasciculées, un peu tortueuses, filiformes, presque articulées, & munies de très-petites écaillés scarieuses. Auroit-on pris pour feuilles ces rameaux stériles? S'il existe d'autres feuilles, je ne les connois pas.

Cette plante croît dans les lieux maritimes, dans l'Espagne, le Portugal, & sur la côte de Barbarie. *h* (V. v.)

37. *STATICE* farineuse. *Statice pruinosa.* Linn.

Statice caule flexuosa, ramosa, suffrutesca. Linn. Mantiss. pag. 59. — Vahl, Symbol. 1. pag. 26. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1531. n^o. 33.

Statice (aphylla), caule ramoso, articulado, undulato, tuberculato; foliis nullis, squamis ad genicula. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 60. n^o. 99.

Cette plante a un port qui lui est particulier; elle se divise dès sa base en plusieurs tiges droites, un peu grêles, flexueuses, très-rameuses; les rameaux alternes, soudés en d'autres très-courts, nombreux, très-ouverts, roides, cylindriques, un peu quadrangulaires; les dernières divisions articulées, obtuses, geminées ou quaternées, de couleur cendrée, chargées, ainsi que les autres parties de la plante, de très-petits tubercules un peu farineux. Il n'y a point de feuilles; elles sont remplacées, à la base de chaque rameau & aux sousdivisions, par une petite écaille très-lisse, lancéolée, subulée, de couleur brune, scarieuse & blanche à ses bords.

Les fleurs sont petites, nombreuses, situées à l'extrémité des rameaux, éparées, rapprochées; les bractées très-étroites, obtuses, concaves, noirâtres, blanches & scarieuses à leurs bords; le calice plissé en cinq angles, traversé sur chaque

angle par une nervure noire; le limbe court, plissé, élargi, entier à ses bords, d'un blanc-foncé, à cinq petites dents; la corolle plus courte que le calice.

Cette plante croît en Égypte & dans la Palestine. *z* (V. f. in herb. Juss.)

38. *STATICE* sans feuilles. *Statice aphylla.*

Statice caule fruticoso, erecto, aphylla; floribus paniculato-corymbosis. (N.)

Cette plante a de très-grands rapports avec le *Statice pruinosa*: comme lui, elle est dépourvue de feuilles, & ses tiges, ainsi que ses rameaux, sont grisâtres ou de couleur cendrée, chargées de très-petits tubercules farineux; mais ses tiges sont droites, cylindriques, point flexueuses, divisées à leur partie supérieure en rameaux alternes, un peu comprimés, légèrement flexueux vers leur sommet; les ramifications courtes, bifurquées, filiformes, articulées; toutes les divisions munies à leur base de petites écaillés ovales, blanches & scarieuses à leurs bords. Les fleurs sont plus petites que celles de l'espèce précédente, d'un blanc-foncé, très-nombreuses, paniculées, réunies par fascicules, presque en corymbe serré à l'extrémité des ramifications; le limbe du calice très-court, plissé, à cinq lobes obtus; le tube fort petit, noirâtre.

Cette espèce a été recueillie en Sibérie par M. Pattrin. *z* (V. f. in herb. Lam. & Juss.)

39. *STATICE* sinué. *Statice sinuata.* Linn.

Statice caule herbaceo, foliis radicalibus alternatim pinnato-sinuatis; caulinis ternis, triquetris, subulatis, decurrentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 396. — Hort. Upsal. 71. — Gronov. Orient. 96. — Kniph. Cent. 2. n^o. 90. — Curtis, Magaf. tab. 71. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 276.

Statice caule herbaceo, ancipiti; foliis radicalibus lyratis; caulinis linearibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1531. n^o. 34.

Statice foliis caulinis, decurrentibus. Hort. Cliff. 116.

Limonium sinuatum. Miller, Dict. n^o. 6.

Limonii species. Rauw. Itin. pag. 313. tab. 314.

Limonium peregrinum, foliis asplenii. C. Bauh. Pin. 192. — Tourn. Inst. R. Herb. 142. — Mart. Cent. tab. 48. — Schaw. Specim. n^o. 365.

Limonium Rauwolfianum. Clus. Cur. Post. pag. 61. Icon. — Park. Theatr. 1235. — H. Eyf. Æth. 7. pag. 8. fig. 1.

Limonium folio sinuato. Gerard, Hist. 412. Icon.

Elegans genus limonii. Dalech. Hist. 2. Append. 35. Icon.

Limonium

Limonium quibusdam rarum. J. Bauh. Hist. 3. Append. pag. 877. Icon.

Limonium inciso folio, buglossi flore. Barrel. Icon. Rat. tab. 1124.

Limonium syriacum, asplenii folio. Dod. Icon.

3. *Limonium caulibus alatis, asplenii folio minus asperis; calicibus acutioribus, flaviscentibus.* Shaw. Afric. Specim. n°. 363.

Espèce très-remarquable par ses feuilles lobées, sinuées, & par ses rameaux ailés. Ses tiges sont droites, dichotomes, plus ou moins pubescentes ou velues, quelquefois glabres, hautes d'environ un pied, rameuses, munies de quatre ailes courtes; les rameaux bifurqués, comprimés; leurs ailes larges, foliacées, un peu velues, quelquefois dentées, de quatre à cinq. Les feuilles caulinaires sont nombreuses, tombantes, allongées, obtuses, plus ou moins velues, insensiblement rétrécies du sommet à la base, lyrées, sinuées; les lobes obtus, arrondis; les feuilles caulinaires beaucoup plus petites, étroites, lancéolées, très-entières.

Les fleurs sont ramassées à l'extrémité des rameaux, disposées en corymbe, sessiles, environnées de bractées pileuses, concaves, membraneuses, mucronées à leur sommet; le calice en forme d'entonnoir; son tube glabre, anguleux; son limbe campanulé, d'un bleu-tendre, denticulé à ses bords; la corolle d'un jaune-pâle, plus courte que le calice; cinq pétales oblongs, obovates. On distingue quelques variétés dans cette espèce; les unes ont la partie inférieure des tiges & des rameaux cylindrique, point ailée; les feuilles plus ou moins sinuées; dans d'autres, les bractées sont glabres, obtuses.

Cette plante croît en Espagne, dans la Sicile, la Palestine, & sur les côtes maritimes de la Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 3 (V. v.)

40. *STATICE* à feuilles lobées. *Statice lobata.* Linn. f.

Statice foliis sinuatis; caulibus teretibus, aphyllis. Linn. f. Suppl. pag. 187. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1532. n°. 35.

Il existe de grands rapports entre cette espèce & le *statice sinuata*; elle en diffère en ce que ses tiges & ses rameaux sont cylindriques & bien moins élevés. Les feuilles sont sinuées, les lobes bien moins profonds; les fleurs ont des bractées semblables à celles du *statice sinuata*; leur calice s'éleve en un limbe blanc & scarieux; la corolle est bleuâtre.

Cette plante croît dans l'Afrique.

41. *STATICE* en épi. *Statice spicata.* Willd. Botanique. Tome VIII.

Statice caule tereti, aphylla; spicis alternis, cylindricis; foliis sinuatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1532. n°. 36.

Statice caule nuda, simplicissimo; spicis floram sessilibus, alternis; foliis radicalibus ex sinuato-pinnatis. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 224. tab. 91. fig. 2.

Ses racines sont tubéreuses; elles produisent des tiges droites, cylindriques, très-simples, dépourvues de feuilles. Celles-ci sont toutes radicales, approchant de celles du *statice sinuata*, presque ailées ou plutôt sinuées à leurs bords. Les fleurs sont disposées, à la partie supérieure des tiges, en épis sessiles, alternes, cylindriques. Leur calice est infundibuliforme. Leur tube est surmonté d'un limbe campanule, blanchâtre, scarieux; la corolle est également blanche.

Cette plante croît dans la Perse & dans la Sibirie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 4

42. *STATICE* mucronée. *Statice mucronata.* Linn. f.

Statice caule crispo; foliis ellipticis, integris; spicis secundis. Linn. f. Suppl. pag. 187. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1532. n°. 37. — Lhérit. Stirp. 1. pag. 25. tab. 13. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 275.

Limonium peregrinum, appendicibus crispis adaequant. Pluken. Almag. 221.

Limonium africanum, elatius & humile. Paskins, Theatr. 1235. Icon.

Limonium africanum, elegantissimum, foliis pyrrola. Broff. Catal. 45. Icones postum.

Elle a quelques rapports avec le *statice sinuata* par ses tiges ailées, mais elle en est très-distincte par ses feuilles entières, par ses ailes crépues & par la disposition de ses fleurs.

Ses tiges sont presque droites, hautes de six à huit ponce, point feuillées, médiocrement rameuses à leur partie supérieure, garnies dans toute leur longueur de membranes décurrennes, foliacées, glabres, crépues, ondulées, terminées sous les bractées en une pointe mucronée; les rameaux courts, alternes, presque simples, tournés presque tous du même côté, diminuant de longueur à mesure qu'ils se rapprochent du sommet des tiges. Les feuilles, toutes radicales, sont pétiolées, très-entières, ovales ou elliptiques, mucronées très-ordinairement à leur sommet, glabres à leurs deux faces, longues au moins d'un ponce, parsemées légèrement d'une poussière farineuse.

Les fleurs sont disposées en épis unilatéraux, un peu recourbés en dehors, à l'extrémité des rameaux, toutes tournées vers le ciel, très-ferrées, sessiles; une écaille rouffâtre, membraneuse à la base de chaque rameau; des bractées

Fff

ovales, roussâtres dans leur milieu, blanches, scarieuses à leurs bords, obtusés; les calices d'un blanc-sale, leur tube court; le limbe peu étendu, lacinié à ses bords; la corolle petite, rougeâtre, plus courte que le calice.

Cette plante croît en Barbarie, dans le royaume de Maroc. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (V. v.)

* *Espèces moins connues.*

* *Statice (scabra), foliis radicalibus obovato-oblongis, obtusis; ramis scabris.* Thunb. Prodr. pag. 54.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. Ses feuilles sont toutes radicales, oblongues, en ovale renversé, obtusés à leur sommet; les tiges rameuses, hérissées d'aspérités sur leurs rameaux.

* *Statice (tetragona), scapo paniculato, tetragono; foliis obovatis.* Thunb. Prodr. pag. 54.

Elle a des tiges quadrangulaires, divisées en rameaux paniculés. Les feuilles sont toutes radicales, en ovale renversé. On la rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

* *Statice (caroliniana), scapo paniculato, divaricato; foliis lanceolato-oblongis.* Walt. Flor. carol. pag. 118.

Ses feuilles, finées à la base des tiges, sont oblongues, lancéolées; les tiges divisées en rameaux paniculés, divariqués, très-ouverts. Elle croît dans la Caroline.

* *Statice (acerosa), foliis lineari-subulatis, rigidis, pungentibus; scapo simpliciter, fuscato.* Willden. Nov. Act. Botol. 2. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 333.

Cette espèce paroît avoir de très-grands rapports avec le *Statice echinus*, principalement avec la variété β . Elle est remarquable par ses hampes simples, terminées par des fleurs disposées en épis. Ses feuilles sont radicales, linéaires, subulées, très-rigides, aiguës & piquantes à leur sommet. On trouve cette plante dans la Galaxie.

* *Statice (obovifolia), caule paniculato, scabro, erecto; foliis obovato-linearibus.* Thunb. Prodr. pag. 54.

Ses tiges sont droites, chargées d'aspérités, divisées en rameaux paniculés; les feuilles toutes radicales, linéaires, alongées & presque en ovale renversé. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

* *Statice (penninata), caule ramisque paniculatis, striatis; foliis obovatis, petiolatis; fructu secundis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 385.

Cette plante croît aux îles Canaries; elle est cultivée dans les jardins en Angleterre. Ses tiges,

ainsi que ses rameaux, sont paniculées, à trois faces; les feuilles pétioolées, radicales, en ovale renversé; les fleurs disposées en épis à l'extrémité des rameaux, & toutes tournées du même côté.

* *Statice (ægyptica), caule herbaceo; foliis radicalibus alternis pinnatifido-finnatis; corolla lacinia intermedia linearibus; perianthio communi bicornati.* Vivian. Hort. di Negri. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 334. n°. 41.

Elle croît en Égypte. Ses tiges sont herbacées; les feuilles radicales, alternativement pinnatifides & finuées; l'involucre commun terminé par deux pointes en forme de cornes; la corolle à cinq découpures; les alternes linéaires.

STEBÉ. *Stabe*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les corysées, & plus encore avec les armoises (*seriphium*); il renferme des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont fort petites, assez semblables à celles des bruyères, les fleurs réunies en tête terminale & globuleuse.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs fasciculées; point de calice commun; les calices partiels à cinq folioles, uniflores; les corolles hermaphrodites; le réceptacle garni de paillettes; des semences à aigrettes plumées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toutes hermaphrodites, réunies sur un réceptacle commun, n'ayant d'autre calice commun que les feuilles supérieures ou les paillettes extérieures du réceptacle.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice partiel, uniflore, composé de cinq folioles droites, égales, semblables aux paillettes du réceptacle.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, divisée à son limbe en cinq découpures ouvertes.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont courts, capillaires; les anthères réunies en cylindre.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate aigu, binné.

Les semences sont solitaires, oblongues, surmontées d'une aigrette plumée.

Le réceptacle commun garni de paillettes subulées, qui se confondent avec les folioles du calice propre; le réceptacle partiel de chaque fleur nu.

Observations. Les *stabe* sont tellement rapprochées des *seriphium*, que plusieurs auteurs ont réuni ces

deux genres, dont Linné lui-même a fait passer plusieurs espèces de l'un dans l'autre. Willdenow, d'après Schreber & Thunberg, n'en a fait qu'un seul genre. M. Lamarck, dans le premier volume de cet ouvrage, a rapporté à l'article ARMOSELLE (*Seriphium*), la plupart des *Stabe*; mais ce même auteur, dans les *Illustrations des Genres*, a cru devoir les séparer, d'après de nouvelles considérations. Nous avons cru également devoir rappeler ici les *Stabe* d'après les mêmes considérations, & pour mettre cet ouvrage en concordance le plus possible avec les gravures des *Illustrations*. On ne sera donc pas étonné de trouver parmi les *Stabe*, des espèces que M. Lamarck a déjà traitées dans les armoelles. Lorsque nous n'aurons rien à y ajouter, nous nous bornerons à renvoyer, pour la description des espèces, à celle déjà donnée par M. Lamarck. Voici d'ailleurs les caractères qui séparent ces deux genres, & ceux qui les rapprochent.

Dans les *Seriphium*, ainsi que dans les *Stabe*, il n'y a point de calice commun, excepté les paillettes extérieures & imbriquées du réceptacle, qui en tiennent lieu. Le calice partiel, dans les *Seriphium*, est composé de dix folioles, cinq extérieures, plus courtes, tomenteuses, obtuses, semblables aux paillettes du réceptacle; cinq intérieures, glabres, plus longues, scarieuses, sétacées, acuminées, inégales, saillantes, & formant par leur ensemble une tête hérissée ou hérissée en chausse-trappe. Le calice propre des *Stabe* n'est composé que de cinq folioles semblables aux paillettes. La corolle est la même dans les deux genres. Dans les *Seriphium* les semences ont une aigrette très-caducue, plumeuse, en pinceau, quelque fois nulle; elle est persistante, plumeuse, ouverte en étoile dans les *Stabe*.

Les espèces ont à peu près le même port dans les deux genres. Ce sont des végétaux ligneux, de petits arbrustes dont les tiges se divisent en rameaux alternes ou opposés, qui se ramifient souvent en d'autres rameaux plus courts, fasciculés ou presque en ombelle, & qui se terminent chacun par une tête de petites fleurs sessiles. Les feuilles sont nombreuses, épaisses, sessiles, étroites, fort courtes, approchant de celles des bruyères, aiguës, subulées, & quelquefois piquantes à leur sommet, souvent courbées en demi-cercle, qui laissent sur les tiges & les rameaux les impressions de leur attache.

E S P È C E S.

1. STABÉ D'ETHIOPIE. *Stabe aethiopica*. Linn.

Stabe foliis mucronatis, subulatis, reflexis; caule erecto. Thunb. Prodr. pag. 169. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2.

Stabe foliis recurvato-uncinatis, nudis. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 948. — Hurt. Cliff. 390. —

Mill. Dict. n°. 1. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 415. tab. 167. — Lam. Illustr. Gener. tab. 722.

Conya africana, frutescens, foliis erica hamatis & incurvis. Tourn. Inst. R. Herb. 435.

Helichrysoides juniperi creberrimis odonatis foliis, floribus in ramulorum cymis. Vaillant, Act. Patif. 1719. pag. 393.

Seriphium (juniperifolium), foliis imbricatis, subulatis, recurvato-uncinatis; capitulis terminalibus, hemisphaericis. Lam. Dict. t. pag. 272.

Cette plante a des tiges droites, cylindriques, frutescentes, divisées en rameaux étalés, alternes, les supérieurs opposés, ramifiés, dichotomes ou ombellés, chargés de feuilles épaisses, sessiles, subulées, élargies à leur base, très-roides, roulées à leurs bords, un peu courbées en dedans, très-aiguës & piquantes à leur sommet, lisses, un peu pubescentes à leur base, blanchâtres en dessous, vertes à leur face supérieure.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en côtes sessiles, feuillées, & enveloppées extérieurement par les paillettes du réceptacle, subulées ou linéaires, acuminées; le calice propre à cinq folioles semblables aux paillettes; les corolles tubulées, hermaphrodites, infundibuliformes; leur limbe un peu campanulé, à cinq dents courtes, aiguës; les étamines à peine saillantes hors du tube; le style plus long que la corolle, terminé par un stigmate bifi; les semences glabres, petites, oblongues, couronnées par une aigrette plumeuse, radiée, une fois plus longue que les semences.

Cette plante croît en Afrique & dans l'Ethiopie. H. (*V. f. in her. Lam.*)

2. STABÉ COCHÉ. *Stabe prostrata*. Linn.

Stabe foliis mucronatis, lanceolatis, obliquis; caule decumbente. Thunb. Prodr. pag. 169. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2404. n°. 4.

Stabe foliis resupinatis, hirs. tomentosis; caulis prostratis. Linn. Mant. pag. 291.

Seriphium prostratum. Lam. Dict. vol. 1. pag. 273. n°. 12.

Ses tiges, grêles, presque ligneuses, sont en partie couchées, garnies de feuilles alternes, sessiles, obliques, lancéolées, fort petites, mucronées à leur sommet. (*Voyez ARMOSELLE couchée*, vol. 1.)

3. STABÉ GNAPHALOIDÉ. *Stabe gnaphaloides*.

Stabe foliis mucronatis, lanceolatis; capitulis paniculatis. Thunb. Prodr. 169. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2403. n°. 7.

Stabe foliis imbricatis, adpressis. Linn. Syst. veget. 664.

Scirpium (corymbiferum), floribus fasciculatis. Linn. Mantill. 1. pag. 119.

Graphalum (niveum), fruticosum; foliis filiformibus, tomentosis, subimbricatis; caule ramossissimo. Linn. Spec. edit. 2. pag. 1192.

Graphalum incanum, folio lineari, caule procumbente. Burm. Afric. pag. 215. tab. 77. fig. 1.

Elichrysium aethiopicum, tenuissimis stachadis, cirsia foliis confertis, ramossissimis; comis argenteis. Pluken. Mantill. 67. — Rai, Suppl. 171.

Cette espèce s'écarte par son port, de celles de ce genre ; elle a l'aspect d'un *xeranthemum*, & de grands rapports avec les *graphalum* ; mais ses caractères généraux appartiennent à ceux des *stabe*.

C'est un arbrisseau, dont les tiges sont prolifères, hautes d'environ un pied & demi, divisées en rameaux très-menus, filiformes, couverts de feuilles sessiles, ovales, lancéolées, mucronées à leur sommet, droites, fortement appliquées contre les tiges, longues au moins d'un demi-pouce, ciliées à leurs bords, tomentueuses en dedans, nues extérieurement. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en petites têtes hémisphériques, d'un blanc-argente. Les calices sont glabres, composés de folioles lancéolées, subulées ; les corolles blanches, ainsi que les étamines, les semences couronnées par une aigrette d'environ six poils plumeux ; les paillettes imbriquées, semblables aux folioles calicinales ; quatre ou cinq extérieurs forment une sorte de calice commun.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. H

* *

Thunberg, dans son *Prodrome des Plantes du Cap de Bonne-Espérance*, cite plusieurs autres espèces de *stabe*, dont quelques-unes avoient déjà été mentionnées par Linné fils. Comme ces plantes ne me sont pas connues, & que les auteurs ci-dessus n'en ont point donné de description, je dois me borner à les indiquer ici, sans pouvoir distinguer, parmi ces espèces, celles qu'il conviendra de rapporter aux *scirpium* ou aux *stabe*.

* *Stabe (incana), foliis mucronatis, filiformibus, lanatis.* Thunb. Prodr. pag. 169.

Ses feuilles sont filiformes, blanchâtres, lanigineuses, mucronées à leur sommet ; les fleurs réunies en têtes à l'extrémité des rameaux.

* *Stabe (phylloides), foliis mucronatis, lanceolatis, erectis; caule erecto.* Thunb. Prodr. pag. 169.

Ses tiges sont droites, ligneuses, divisées en

rameaux chargés de feuilles nombreuses, épaisses, droites, lancéolées, mucronées ; les fleurs terminales, agrégées, réunies en tête.

* *Stabe (scabra), foliis trigonis, ciliato-scabris.* Thunb. Prodr. pag. 170.

Stabe foliis tortis, adpressis, linearibus, exilis tuberculato-scabris, intus tomentosis; floribus racemosis. Linn. f. Suppl. pag. 391.

Petite plante ligneuse, qui a l'aspect d'une bruyère, dont les tiges sont chargées de feuilles épaisses, sessiles, linéaires, à trois faces, tomentueuses à leur face supérieure, tuberculées en dehors, rudes & ciliées à leurs bords, appliquées contre les tiges ; les fleurs terminales, ramassées en épis.

* *Stabe (reflexa), foliis filiformibus, mucronatis inermibusque; ramis reflexis.* Thunb. Prodr. pag. 169.

Stabe procumbens, foliis linearibus, spicis ovatis, ramis abscedentibus. Linn. f. Suppl. 391.

Ses tiges sont couchées, divisées en rameaux inclinés à leur partie inférieure, redressés & ascendants vers leur sommet, chargés de feuilles linéaires, filiformes, les unes obovées, d'autres mucronées ; les fleurs disposées en épis ovales, fasciculés.

* *Stabe (disticha), foliis fasciculatis, mucronatis inermibusque; spicis distichis.* Thunb. Prodr. p. 169.

Stabe foliis fasciculatis, recurvis; spicis bifariis. Linn. f. Suppl. pag. 391.

Les feuilles sont nombreuses, réunies par paquets, recourbées en dehors, les unes mucronées, d'autres sans pointe ; les rameaux terminés par des fleurs disposées sur deux épis.

* *Stabe (fasciculata), foliis fasciculatis, trigonofolulatis; spicis distichis.* Thunb. Prodr. pag. 169.

Peu différente de l'espèce précédente, elle lui ressemble par la disposition de ses fleurs sur deux épis terminaux, & par les feuilles fasciculées ; mais ces dernières sont subulées, presque triangulaires.

* *Stabe (virgata), foliis linearibus, mucis, tomentosis; spicis terminalibus.* Thunb. Prodr. pag. 170.

Cette plante, du Cap de Bonne-Espérance, a des feuilles épaisses, sessiles, linéaires, tomentueuses, point mucronées. Les fleurs sont disposées en épis terminaux.

* *Stabe (aspera), foliis linearibus, mucis, glabris, reflexis; capitulis lateralibus.* Thunb. Prodr. pag. 170.

Cette espèce est remarquable par ses fleurs latérales & non terminales, réunies en tête. Ses feuilles sont glabres, linéaires, mutiques, réfléchies.

* *Stabe* (rhinocerotis), *foliis filiformibus, muticis, glabris; ramulis tomentosis*. Thunb. Prodr. pag. 170. (Non *seriphium pufferinoides*. Lam. Dict. 1. pag. 271. ex Willd.)

Stabe foliis triquetris, adpressis; ramulis tomentosis, cernuis; racemis prostratis. Linn. f. Suppl. pag. 391.

Cette plante a des feuilles glabres, filiformes, mutiques, appliquées contre les tiges, à trois faces; les rameaux tomenteux, inclinés; les fleurs disposées en grappes prolifères. Cette espèce sert d'aliment aux jeunes rhinocéros.

* *Stabe* (cernua), *foliis ovatis, muticis, glabris, imbricatis; ramulis tomentosis*. Thunb. Prodr. pag. 170.

Ses feuilles sont éparées, très-rapprochées, imbriquées, glabres, ovales; les tiges divisées en rameaux tomenteux.

* *Stabe* (nivea), *foliis trigonis, obtusis, adpressis; capitulis terminalibus*. Thunb. Prodr. p. 170.

Ses feuilles sont obtuses, point mucronées, à trois faces; les fleurs réunies en petites têtes ou en épis courts à l'extrémité des rameaux.

STÉHÉLINE. *Stahelina*. J'ai exposé, au genre *Serratula*, les raisons qui nous ont déterminés à réunir ces deux genres. (Voyez SARRÈTE, vol. 6, pag. 547 & 556.)

STÉLIDE. *Stelis*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, de la famille des orchidées, qui a de grands rapports avec les *epidendrum* (angrec), dont il n'est qu'une division; qui comprend des herbes parasites, exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont ordinairement presque disposées en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle presque à cinq pétales; trois extérieurs, réunis à leur base; les intérieurs semblables à la lèvre, un peu concaves à leur sommet, tous enveloppant une colonne courte, qui porte les organes de la génération.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice nul; quelques écailles en forme de spathe à la base des pédoncules.

2°. Une corolle presque à cinq pétales; trois extérieurs, triangulaires, aigus, étalés, un peu planes, connivés à leur base; deux intérieurs, droits, en cœur, concaves, ou presque en capuchon, environnant les organes de la génération.

Un sixième pétale ou un appendice en forme de lèvre, de la même forme & de la même grandeur que les pétales intérieurs.

3°. Une étamine fort courte, consistant en une anthère sessile, arrondie, à deux loges, biffée à la partie inférieure, renfermant des globules folitaires dans chaque loge; une colonne très-courte, dilatée à son sommet, à trois dents; une fossette pour recevoir l'étamine.

4°. Un ovaire fort petit, inférieur, sur lequel est située la colonne qui supporte les étamines; un stigmate convexe, situé en avant des organes mâles.

Le fruit est une capsule ovale, à trois faces, à trois sillons; le sillon supérieur relevé en carène, à une loge, à trois valves; les semences nombreuses, fort petites.

Observations. Les *epidendrum* de Linné forment un genre, dont les espèces nombreuses n'avaient pas toutes les caractères attachés à ce genre; le port, plutôt que les parties essentielles de la fructification, difficiles à observer dans les plantes en herbier, avait déterminé leur place. L'examen des plantes vivantes a autorisé plusieurs botanistes voyageurs, en particulier M. Swartz, à créer de nouveaux genres aux dépens des *epidendrum*. Celui que nous présentons ici est un démembrement de ce dernier. Nous reviendrons sur les autres dans le Supplément.

ESPÈCES.

1. **STÉLIDE ophioglossifolia.** *Stelis ophioglossifolia*. Swartz.

Stelis caule unifolio, folio oblongo, lanceolato, racemum subaquante; floribus trigonis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1551.

Epidendrum (ophioglossifolia), *caule unifolio; floribus racemosi, secundis*. Linn. — Jacq. Amer. pag. 225. tab. 135. fig. 2. — Lam. Dict. vol. 1. pag. 188. n°. 42.

Epidendrum trigoniflorum. Swartz, Prodr. p. 125.

C'est une petite plante dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage, à l'article ANGREC, langue de serpent. Ses racines sont fibreuses, blanchâtres; elles produisent un grand nombre de tiges agrégées, hautes de deux ou trois pouces, cylindriques, striées, enveloppées de plusieurs gaines, portant une feuille à leur sommet. Les gaines sont amplexicaules, comprimées, obliques à leurs bords, membraneuses, reticulées; les feuilles solitaires, droites, tétrecées à leur base, canaliculées, médiocrement pétiolées, oblongues, lanceolées, élargies, entières à leurs bords, un peu grasses, légèrement carénées en dessous, glabres à leurs deux faces, longues de deux ou trois pouces.

Les fleurs sont disposées en petites grappes droites, filiformes, souvent solitaires, sortant de l'aisselle de la feuille supérieure, plus longue qu'elle; les pédoncules garnis de quelques écailles alternes, &c à leur base d'une sorte de spathe oblongue, acuminée, à deux folioles comprimées, enveloppant les grappes avant leur développement. Ces grappes sont composées de fleurs petites, alternes, presque unilatérales, d'un blanc-fale, un peu jaunâtres, à trois faces avant l'épanouissement des pétales, pédicellées; les pédicelles munis de petites bractées scarieuses, amplexicaules, aiguës.

La corolle est composée de cinq pétales; trois extérieurs triangulaires, aigus, un peu planes, étalés, roides, connivens à leur base; les deux intérieurs fort petits, droits, en cœur, concaves, carénés, obtus, d'un rouge-pâle; la lèvre ou un troisième pétale antérieur de même forme, d'un pourpre-foncé; la colonne des organes de la reproduction, très-courte, dilatée &c creusée à son sommet, à trois dents; une anthère arrondie, purpurine, à deux loges, bifide à sa partie antérieure; les globules du pollen solitaires. Le fruit est une capsule ovale, à trois faces, à une seule loge, à trois valves.

Cette plante est parasite; elle croît sur les arbres, dans les forêts des montagnes, à la Jamaïque. (Description. ex Swartz.)

2. STÉLIDE à petites fleurs. *Stelis micrantha*. Swartz.

Stelis caule unifolio; folio lato, lanceolato, racemae breviori; floribus hexagonis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1553.

Epidendrum micranthum. Idem, Prodr. pag. 125.

Cette espèce a de grands rapports avec la précédente; elle lui ressemble par ses racines, par ses tiges, par ses feuilles; mais celles-ci sont deux à trois fois plus grandes. Les fleurs sont disposées en grappes souvent une fois plus longues que les feuilles, inclinées à leur sommet. La corolle, avant son développement, forme un corps blanc, arrondi, à six faces; les trois pétales extérieurs réunis à leur base, légèrement relevés en carène sur leur dos, un peu concaves, obtus & blanchâtres à leur sommet; les intérieurs &c la lèvre d'un rouge-sanguin, semblables dans leur forme au *Helis ophoglossoides*; la colonne des parties de la reproduction, rougeâtre à son sommet; les globules du pollen de couleur jaune; les capsules petites, acuminées, oblongues.

Cette espèce croît sur les arbres &c sur la pente des rochers des hautes montagnes à la Jamaïque. (Description. ex Swartz.)

Observations. Il est à présumer qu'il faudra rapporter à ce genre plusieurs autres plantes, lorsque

les parties de leur fructification seront mieux connues, &c qui ont été placées dans les *epidendrum* de Linné.

STELLAIRE. *Stellaria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des caryophyllées, qui a de très-grands rapports avec les labiales (*arenaria*), &c qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, à feuilles simples, opposées, &c dont les fleurs sont axillaires, très-souvent terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles ouvertes; cinq pétales bifides; six étamines; trois styles; une capsule à une seule loge, à six valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en cinq folioles ovales-lancéolées, concaves, aiguës, ordinairement ouvertes, persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales planes, oblongs, bifides, qui persistent &c se dessèchent sur la capsule.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont filiformes, plus courts que la corolle, alternativement plus longs, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté de trois styles capillaires, écartés entr'eux, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit est une capsule ovale, recouverte ordinairement par les pétales &c le calice, à une seule loge, s'ouvrant en six valves, renfermant plusieurs semences arrondies, comprimées.

Observations. Ce genre, peu naturel, tient aux *arenaria* &c aux *cerafium*. Ses rapports avec ces deux genres sont tels, que plusieurs des espèces qui le composent, laissent des doutes sur celui des trois auquel ils conviennent le plus. Ses caractères sont peu constants. Il se distingue des *cerafium* par ses trois styles au lieu de cinq; mais ce nombre varie quelquefois, dans ces deux genres; des *arenaria*, par les pétales plus ou moins fendus en deux. Quelques espèces ont leurs pétales légèrement échancrés ou entiers, comme les *arenaria*; enfin, leur capsule se divise presque jusqu'à leur base en six valves. Celle des *arenaria* n'en a que cinq à son sommet; elle reste entière à sa partie inférieure: il en est de même de celle des *cerafium*, qui ne se divise en valves qu'à son sommet.

Pour rendre ce genre plus naturel, il faudrait presque borner les espèces à celles qui ont des feuilles graminiformes, &c qui lui ont en effet

servi de bafe, telles que le *stellaria hololeuca*, *graminifolia*, &c. La plupart de celles qu'on y a depuis ajoutées, s'écartent plus ou moins des premières, tant par leur port que par leurs caractères généraux. Elles forment donc aujourd'hui deux ou trois groupes, les unes à feuilles étroites, linéaires, plus ou moins rapprochées de celles des graminées, les autres à feuilles grandes, larges, ovales ou lancéolées; d'autres enfin sont munies de petites feuilles ovales ou oblongues, lancéolées. Les espèces, rapprochées par la forme de leurs feuilles, peuvent fe distinguer par les proportions de leur corolle comparée avec la longueur du calice; d'autres par les découpures des pétales profonds ou ne formant qu'une fimple échancrure.

Ce genre faisoit partie des *alfine* de Tournefort, & l'on ne peut difconvenir qu'il n'ait avec eux de très grands rapports. Sa dénomination de *stellaria* lui vient de fa fleur, qui représente, lorsqu'elle eft ouverte, une petite étoile.

E S P È C E S.

1. STELLAIRE des bois. *Stellaria nemorum*. Linn.

Stellaria foliis cordatis, petiolatis; panicula pedunculis ramofis. Linn. Spec. Plant. 603. — Flor. suec. edit. 2. n°. 391. — Scop. Carn. n°. 532. — Kniph. Cent. 10. n°. 86. — Cæder. Flor. dan. tab. 271. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 47. — Hoffm. Germ. 152. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 190. — vol. II. pag. 485. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 710.

Myofotis foliis petiolatis, cordatis; tubis ternis. Haller, Helv. n°. 886.

Alfine nemorum. Schreb. Spicil. 30.

Alfine altissima nemorum. C. Bauh. Pin. 250. — Tourn. Inst. R. Herb. 242.

Alfine montana, hederacea, maxima. Colum. Ecphr. 1. pag. 289. tab. 190.

♂. *Alfine montana, latifolia; flore latiniato*. C. Bauh. Pin. 250. — Rupp. Jen. 109. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 23. fig. 2.

Cette plante a le port du *cranthium aquaticum*, à côté duquel elle fe peut-être mieux placée: elle lui refemble tellement, qu'il eft facile de la confondre avec lui; elle s'en diftingue par trois flyes au lieu de cinq, par fes fleurs plus étroites, par fes feuilles dont les inférieures font portées fur des pétioles plus longs que le limbe des feuilles. Les deux ou trois dernières paires de feuilles font feules fétiles.

Ses tiges font tendres, herbacées, très-foibles, longues de deux ou trois pieds & plus, ordinairement renverfées, articulées, feuillées dans toute leur longueur, rameufes, garnies de feuilles op-

posées, larges au moins d'un pouce, ovales, en cœur, glabres, entières, aiguës; les inférieures longuement pétioolées, & dont les pétioles diminuent infenfiblement de longueur aux feuilles fupérieures, qui deviennent enfin fétiles ou prefque fétiles.

Les fleurs font fituées à l'extrémité des ramcaux; elles font de l'aiffelle des feuilles fupérieures, difposées fur de longs pédoncules filiformes, quelquefois un peu pubefcens, fouverit ramifiés prefqu'en panicule; les calices divifés en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle blanche, plus longue que le calice; les pétales profondément biffés. Après la floraison, les pédoncules font réfléchis.

Cette plante croît dans les bois, les lieux couverts, un peu humides, en Europe. x (V. v.)

2. STELLAIRE pubefcente. *Stellaria pubera*. Mich.

Stellaria tota minuta lanugine pubens; foliis ovalibus, ciliatis; pedicellis erectis, brevifolius; petalis calice brevioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 273. — Perf. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 501.

Toutes les parties de cette plante font couvertes d'un duvet très-fin, lanugineux; elle a d'ailleurs le port de l'*alfine media*. Ses tiges font foibles, rameufes, herbacées, garnies de feuilles oppofées, fétiles, ovales, pubefcences, ciliées à leurs bords. Les fleurs font fituées dans l'aiffelle des feuilles, fupportées par des pédoncules rameux, un peu paniculés, droits, filiformes; la calice divifé en cinq découpures ovales, ouvertes; la corolle blanche, plus longue que le calice.

Cette plante croît dans les forêts des montagnes de la Caroline feptentrionale. (Description ex Mich.)

3. STELLAIRE dichotome. *Stellaria dichotoma*. Linn.

Stellaria foliis ovatis, feffilibus; caule dichotomo; floribus foliariis; pedunculis frutiferis, reflexis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Pall. itin. vol. 1. pag. 72. & itin. vol. 3. pag. 245. — Smith, Icon. ined. 1. pag. 14. tab. 14. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 710. n°. 2.

Alfine petalis emarginatis; foliis ex cordato-ovatis, acutis. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 149.

Cette efèce a des rapports avec le *stellaria nemorum*; elle en a encore davantage avec l'*alfine media*, dont elle offre prefque le port. Elle en diffère, ainfi que de la précédente, par fes feuilles fétiles & par fes rameaux dichotomes, très-ouverts; & du *stellaria nemorum*, par les pédoncules fimples, folitaires, entièrement réfléchis après la floraison. Ses feuilles font oppofées, ova-

les, sessiles, glabres à leurs deux faces, entières ou légèrement ondulées à leurs bords, aiguës à leur sommet; les fleurs presque terminales, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, rapprochées presque en panicule, supportées par des pédoncules simples; les calices à cinq folioles aiguës; la corolle blanche, de la longueur du calice; les pétales profondément échançés, obtus.

Cette plante croît dans la Sibérie, sur les montagnes Alpines. (V. f. in herb. Juss.)

4. STELLAIRE ciliée. *Stellaria ciliata*. Pers.

Stellaria foliis parvulis, cordatis, acutis, subpetiolatis; petiolis ciliatis. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 501.

Seu tiges sont tendres, glabres, herbacées, en partie couchées, étalées, très-rameuses; les rameaux diffus, alongés, garnis de feuilles fort petites, opposées, pétiolées, ovales, en cœur, glabres, légèrement ciliées à leurs bords, acuminées, très-aiguës, longues à peine de trois lignes, sur deux de large; les pétiolés ciliés, plus courts que les feuilles; les feuilles supérieures sessiles, plus petites. Les fleurs sont blanches, solitaires, axillaires; le calice glabre, presque campanulé, à cinq découpures un peu aiguës; la corolle un peu plus longue que le calice; les pétales bifides.

Cette plante croît au Pérou; elle a été recueillie par M. Joseph Jussieu. (V. f. in herb. Juss.)

5. STELLAIRE à feuilles rondes. *Stellaria rotundifolia*.

Stellaria foliis petiolatis, rotundis; panicula terminali, ramis virgatis. (N.)

Cette plante est remarquable par ses feuilles assez grandes, arrondies; par ses fleurs disposées en une panicule terminale. Ses tiges sont longues, glabres, cylindriques, flexibles, divisées en quelques rameaux grêles, atermes, simples, effilés, longs de huit à dix pouces, garnis de feuilles distantes, médiocrement pétiolées, opposées, glabres, presque pulpeuses, arrondies, obtuses, marquées de trois nervures, presque mucronées à leur sommet, entières à leurs bords; les pétiolés filiformes, longs de deux ou trois lignes.

Les fleurs sont toutes terminales, disposées à l'extrémité d'un long pédoncule en une panicule lâche, dont les ramifications sont glabres, capillaires, munies à leurs divisions de bractées courtes, scarieuses, lancéolées; les calices glabres, à cinq folioles; la corolle blanche, à peine plus longue que le calice. Je n'ai pas pu m'affurer du nombre des styles.

Cette plante a été recueillie, par M. Commerçon, au détroit de Magellan. (V. f. in herb. Lam.)

6. STELLAIRE lancéolée. *Stellaria lanceolata*.

Stellaria foliis lanceolato-oblongis; panicula pubescente, terminali; corollâ calicibus longiore. (N.)

Cette espèce approche beaucoup des *cerastium*. N'ayant pas pu m'affurer du nombre de ses styles, je l'ai rapportée provisoirement aux *stellaria*, dont elle présente les caractères extérieurs.

Ses tiges sont droites, tendres, herbacées, presque simples, longues d'environ un pied, très-foibles, glabres, un peu pubescentes à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, sessiles, lancéolées, oblongues, très-entières, presque glabres, aiguës à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, longues d'environ deux pouces, sur trois ou quatre lignes de large. Les fleurs forment une panicule terminale, médiocre, pubescente; les ramifications principales bifurquées; les calices un peu velus, scarieux à leurs bords; la corolle blanche, un peu plus longue que le calice.

Cette plante a été recueillie par Commerçon, au détroit de Magellan. (V. f. in herb. Lam.)

7. STELLAIRE radieuse. *Stellaria radiata*. Linn.

Stellaria foliis lanceolatis, serrulatis, petalis quinque parvis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 710. n.º 3.

Alfne foliis salignis, margine scabris; petalis semiquinquepartitis. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 146.

Alfne saxatilis, angustâ & oblongo foliis folio; flore albo, tenuissimè laciniato. Amm. Ruth. pag. 83. tab. 10.

Des pétales laciniés & ordinairement découpés en cinq parties caractérisent cette espèce, dont les tiges sont garnies de feuilles opposées, assez grandes, ovales, oblongues ou lancéolées, effilées, glabres ou à peine pubescentes, sessiles, aiguës, longues d'un pouce & demi sur quatre à cinq lignes de large, assez semblables à celles des saules, un peu denticulées & rugées à leur contour, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont blanches; les pétales à cinq découpures étroites, ouvertes en rayons; les pédoncules pubescents, inégaux, presque simples, droits, un peu fasciculés à l'extrémité des rameaux.

Cette plante croît en Sibérie, dans les lieux marécageux. (V. f. in herb. Juss.)

8. STELLAIRE velue. *Stellaria villosa*.

Stellaria foliis sessilibus, ovato-lanceolatis, pubescentibus; floribus subpaniculatis, terminalibus; corollis calice longioribus; caule pedunculâque hirsutis. (N.)

Ses racines sont fibreuses, blanchâtres; ses tiges grêles, rameuses, étalées, fort tendres, médiocrement velues, garnies de feuilles opposées, sessiles,

filles, conniventes à leur base, plus courtes que les entre-nœuds, ovales-lanceolées, pubescentes, entières, aiguës à leur sommet, presque longues d'un pouce, sur trois lignes de large; un peu rétrécies à leur base.

Les fleurs sont terminales, presque paniculées, portées sur un long pédoncule velu, qui supporte à sa partie supérieure environ trois à quatre fleurs; les pédicelles courts, inégaux, velus, un peu visqueux; les calices verts, à peine pubescents, à cinq découpures ovales, point membraneuses; la corolle blanche, un peu plus longue que le calice.

Cette plante a été recueillie par Commerson, à l'île Bourbon. (*V. f. in herb. Juss.*)

9. STELLAIRE bulbeuse. *Stellaria bulbosa*. Jacq.

Stellaria foliis ovato-lanceolatis, subulis avertis; caule subdichotomo, pedunculis unifloris; radice filiformi, repente bulbifera. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 711. n°. 4.

Stellaria (bulbosa), foliis lanceolato-ovatis, caule subdichotomo, pedunculis unifloris, radice repente bulbifera. Willen. in Jacq. Collect. 3. pag. 21. — Jacq. Icon. Rar. vol. 3. tab. 468. — Hoffm. Germ. 153.

C'est une espèce très-remarquable, qui ressemble, au premier aspect, au *trientalis europæa*, dont les racines sont rampantes, filiformes, garnies de petites bulbes: il s'en élève des tiges presque simples, garnies d'un ou quelquefois deux rameaux à leur partie supérieure; les feuilles ovales, lanceolées, sans nervures apparentes, glabres, aiguës, lisses à leurs bords; les fleurs supportées par des pédoncules simples, filiformes, axillaires, uniflores, souvent terminaux, quelquefois deux ou trois situés latéralement. ♀

Cette plante croît dans les lieux ombragés & humides, sur les hautes montagnes de la Carinthie. ♀

10. STELLAIRE holostée. *Stellaria holostea*. Linn.

Stellaria foliis lanceolatis, serrulatis; petalis bifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 145. — Pollich. Pal. n°. 410. — Weder. Flor. dan. tab. 698. — Knapp. Centur. 10. n°. 85. — Scop. Carn. n°. 534. — Hoffm. Germ. 152. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 191. — Will. II. pag. 486. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 48. & Illustr. Gener. tab. 378.

A fine foliis lanceolatis. Hort. Cliff. 172. — Flor. suec. n°. 361 & 392.

A fine foliis gramineis, ciliatis. Haller, Helv. n°. 884.

Caryophyllus holosteus, arvensis, flore majore. C. Bauh. Pin. 210.

Botanique, Tome VII.

Gramen. Fusch. Hist. 136. Icon. — Camer. Epitom. 743. Icon.

A fine pratensis, gramineo folio ampliore. Tourn. Indl. R. Herb. 243.

Diversitas holostei Ruellii. Lobel. Icon. 46. & Obf. 26.

Gramen Fuschii, sive leucanthemon. J. Bauh. Hist. 3. pag. 361. Icon. Medicaris.

Elle se distingue du *stellaria graminea* par ses feuilles plus larges, & surtout par sa corolle une fois plus longue que le calice. Ses tiges sont faibles, glabres, herbacées, un peu rameuses vers leur sommet, articulées à leur partie inférieure, garnies de feuilles sessiles, opposées, presque semblables à celles des graminées, étroites, lanceolées, élargies à leur partie inférieure, rétrécies insensiblement en une pointe très-aiguë, vertes, glabres à leurs deux faces, munies, à leurs bords & sur leur nervure dorsale, de cils ou de très-petites dents peu sensibles, qui les rendent accrochantes ou dures au toucher.

Les fleurs forment par leur ensemble une sorte de panicule bifurquée, ample & terminale; elles sont supportées par de longs pédoncules filiformes, situés dans l'aisselle des feuilles supérieures, qui deviennent presque des bractées plus rapprochées, insensiblement plus petites, situées à la bifurcation des rameaux. Les calices sont lisses, d'un beau vert; les folioles concaves, ovales, aiguës, blanchâtres & membraneuses sur leurs bords; la corolle blanche, ample, au moins une fois plus grande que les calices; les pétales bifides, obtus; les pédoncules recourbés après la floraison; les capsules globuleuses, divisées en six valves profondes; les semences aff. z. grandes, d'un jauneroûssâtre, un peu orbiculaires & réniformes, hérissées de fort petites tubercules sur leur cône.

Cette plante est commune dans les haies, les bois taillis, les forêts, en Europe. ♀ (*V. v.*)

11. STELLAIRE à feuilles de graminée. *Stellaria graminea*. Linn.

Stellaria foliis linearibus, integerrimis; floribus paniculatis, petalis calicis longioribus. N. Ind. Spec. Plant. vol. 2. pag. 710. n°. 6.

Stellaria floribus linearibus, integerrimis; floribus paniculatis. Linn. Spec. Plant. pag. 604. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 145. tab. 61. fig. 2. — Pellich. Palat. n°. 421. — Weder. Flor. dan. tab. 414-415. — Knapp. Cent. 10. n°. 84. — Scop. Carn. 1°. 515. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 191. — vol. II. pag. 487. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 48.

Stellaria (arvensis), foliis linearibus, integerrimis; floribus paniculatis, minoribus; petalis ultra

Ggg

medium bipartitis. Hoffm. Germ. 152. — Erhr. Herb. 126.

Alfne foliis linearibus. Flor. lapp. 189-393. Flor. succ. 372. — Hort. Cluff. 172. — Roy. Lugd. Bat. 449.

Alfne foliis lanceolatis, lineatis; petiolis ramosis. Hall. Helv. n°. 882.

Gramini Fuschii leucanthemum affinis & similis herba. J. Bauh. Hist. 3. pag. 361. Icon. Mala.

Caryophyllus arvensis, glaber, flore minor. C. Bauh. Pin. 210.

Gramen floridum, minus. Tabern. Icon. 232.

Alfne pratensis, gramineo folio, angustiore. Tourn. Inst. R. Herb. 243.

Holcusium Raullii. Lobel. Ic. 46, & Observ. 26.

Gramen leucanthemum. Dod. Pempt. pag. 563. Icon. — Dalcq. Hist. 1. pag. 422. Icon.

g. *Stellaria (dilleniana), caule floccido, foliis linearilanceolatis; pedunculis terminalibus, bifloris; petalis bipartitis*. Moench. Hall. n°. 364. tab. 6. — Wier. Flor. dan. tab. 414. — Hoff. Germ. 152. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 191. — vol. II. pag. 489.

Cette espèce est plus petite dans toutes ses parties, que le *Stellaria holoclea*, à laquelle elle ressemble beaucoup, & dont elle diffère par ses pétales à peine de la longueur du calice, plus profondément bifides, & par ses calices marqués de trois nervures saillantes. Ses tiges sont glabres, menues, presque filiformes, hautes à peine d'un pied, lâchement rameuses, garnies de feuilles opposées, étroites, linéaires, graminiformes, aiguës, point ciliées ni denticulées, glabres à leurs deux faces, longues d'environ un pouce.

Les rameaux, très-étiles, bifurqués à leur sommet, supportent des fleurs assez petites, paniculées, dont les péduncules sont presque capillaires, simples ou rameux, très-ouverts, quelquefois biflores (dans la variété β), munis à leur base de petites feuilles ou bractées scarieuses; les folioles calicinales étroites, lancéolées, très-aiguës, à trois nervures, scarifiées à leurs bords; la corolle blanche; les pétales divisés, jusqu'au-delà de leur moitié, en deux découpures étroites, linéaires.

Cette plante croît en Europe dans les prés secs, dans les bois taillis. γ (V. v.)

12. STELLAIRE des marais. *Stellaria palustris*. Retz.

Stellaria foliis linearilanceolatis, integerrimis; floribus paniculatis; petalis bipartitis, calice majoribus. Retz. Prodr. flor. scand. edit. 2. n°. 548. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 712. n°. 7.

Stellaria foliis linearibus, integerrimis; floribus duplo majoribus, semibifidis. Hoffm. Germ. 152.

Stellaria glauca. With. bot. 420. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 794.

Stellaria media. Sibth. Oxon. 141.

Stellaria graminea. Var. β . Linn. Spec. Plant. pag. 604.

Alfne folio gramineo, angustiore, palustris. Dill. Append. 69.

Caryophyllus holoclea, arvensis, medius. Rai, Synops. 347.

On peut considérer cette espèce comme intermédiaire entre le *Stellaria holoclea* & le *Stellaria graminea*. Elle convient au premier par la grandeur de sa corolle presque deux fois plus longue que les calices; au second, par ses feuilles non denticulées.

Ses tiges sont lisses, foibles, grêles, hautes au moins d'un pied, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, sessiles, de couleur glauque, linéaires lancéolées, aiguës, lisses sur leurs bords. Les fleurs sont terminales, portées sur de longs péduncules presque sétacés & munies à leur base de petites feuilles ou bractées scarieuses; les calices traversés par trois nervures saillantes; la corolle blanche; les pétales bifides.

Cette plante croît en Europe, dans les lieux marécageux, sur le bord des toiles & des marais desséchés, à Marcouilly près de Paris. γ (V. f.)

13. STELLAIRE trompeuse. *Stellaria mantica*.

Stellaria caule frusto, subsimpli; foliis glaberrimis, linearilanceolatis; floribus terminalibus, longè pedunculatis. (N.)

Stellaria mantica. Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 394.

Cerastium manticum. Linn. Spec. pag. 619. — Lam. Dict. vol. 1. pag. 681.

Alfne caule nodoso, ramofo; foliis lanceolatis, lineatis; petiolis longissimis. Hall. Helv. n°. 883.

Alfne caryophylloides, glabra, florum pediculis longissimis. Seguer. Plant. veron. vol. 3. p. 178. tab. 4. fig. 2.

Quoique cette plante ait été déjà mentionnée, dans cet ouvrage, sous le nom de *céraïse à long pédoncule*, j'ai cru devoir la rappeler ici, ayant parfaitement le port d'un stellaire, approchant du *Stellaria graminea*.

Ses tiges sont drites, glabres, roides, presque filiformes, hautes d'un pied, presque simples, divisées seulement à la partie supérieure en deux ou trois rameaux bifurqués; les feuilles opposées,

très-distantes, droites, fort étroites, linéaires-lancéolées, longues quelquefois d'un ponce, entières, glabres, aiguës; les fleurs supportées par de très-longes pédoncules simples, presque unifiés ou munis de quelques fleurs pédicellées, situés à l'extrémité & dans la bifurcation des rameaux. Le calice est glabre; ses folioles lancéolées, aiguës, blanches & scarieuses à leurs bords, ainsi que les bractées; la corolle plus longue que le calice; les pétales presque entiers ou légèrement bilobés à leur sommet; les styles au nombre de trois, quelquefois quatre ou cinq.

Cette plante croît en Suisse, dans le Piémont, aux environs de Véronne, dans les prairies ou peu humides des collines & des basses montagnes. (V. f.)

14. STELLAIRE à feuilles grasses. *Stellaria crassifolia*. Willd.

Stellaria foliis oblongo-lanceolatis, crassiusculis, glaucis; pedunculis unifloris, foliariis, axillaribus; petalis calice majoribus, caule erecto. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 712. n° 8.

Stellaria (crassifolia), foliis ovato-lanceolatis, sessilibus, integerrimis, crassiusculis, glabris; pedunculis foliariis ex dichotomiis, floribus erectis, fructiferis, reflexis; foliolis calicinis ovato-lanceolatis, petalis molid brevioribus. Ehrh. Beitr. 3. pag. 60. — Timm. Prodr. n° 299. — Hoffm. Germ. 153.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, garnies de feuilles opposées, sessiles, un peu grasses, de couleur glauque, ovales-oblongues, lancéolées, très-entières, glabres à leurs deux faces; les fleurs foliaires situées dans l'aisselle des feuilles ou dans la bifurcation des rameaux, supportées par des pédoncules simples, uniflores, droits pendant la floraison, réfléchis lorsqu'elle est passée; le calice divisé en cinq folioles ovales-lancéolées; la corolle blanche, plus grande que le calice; les pétales biffés.

Cette plante se rencontre en Allemagne, dans les prés humides. O

15. STELLAIRE aquatique. *Stellaria aquatica*. Poll.h.

Stellaria foliis lanceolatis; petalis bipartitis, calicem longitudine aequantibus. Poll.h. Pal. n° 422. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 49. — D. cand. Flor. franç. vol. 4. pag. 799.

Stellaria (alline), foliis oblongo-lanceolatis; pedunculis subgeminatis, uni-multifloris; petalis calice brevioribus, caule decumbente. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 713. n° 9.

Stellaria (alline), caule diffuso, ramoso; foliis sessilibus; pedunculis lateralibus, petalis calice brevioribus.

rius, angustissimis, bipartitis. Hoffm. Germ. 153. tab. 5.

Stellaria (fontana), foliis oppositis, ovali lanceolatis; petalis bipartitis, calice brevioribus; pedunculis unifloris. Wulf. in Jacq. Collect. 1. pag. 327.

Stellaria (uliginosa), caule diffuso, procumbente, ramosissimo; foliis lanceolatis, basi ciliatis, angustioribus; pedunculis ternis, lateralibus, intermedio unifloro, lateralibus dichotomis, paucifloris. Roth. Germ. vol. 1. pag. 191. — vol. II. pag. 459. — Curtis. Lond. tab. 28.

Stellaria (dilleniana), floribus lanceolatis, integerrimis; caule procumbente. Leers. Herb. n° 331.

Stellaria (hypericifolia), foliis ovato lanceolatis, integerrimis; pedunculis foliariis. Wigg. Prim. pag. 34. — Allion. Flor. pedem. n° 1720.

Stellaria lateriflora. Krock. Silf. n° 677. tab. 4.

Stellaria gemina. Var. 7. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 604.

Alfne foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. Hallet. Helv. n° 881.

Alfne foliis lanceolatis, caulibus procumbentibus, ramosisissimis. Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 403.

Alfne hypericifolia. Vaill. Paris. pag. 9. — Thuill. Paris, édit. 2.

Alfne aquatica media. C. Bauh. Pin. 251. — Tourn. Inst. R. Herb. 243.

Alfne longifolia, uliginosa proveniens locis. J. Bauh. Hist. 5. pag. 365. Icon.

Caryophyllus holotus, angustifolius. C. Bauh. Pin. 210. & Prodr. 104. n° 6. — Burf. XI. 2.

Alfne fontana. Tabern. Icon. 712.

5. *Eadem, foliis latioribus, petalis calice multo brevioribus.* (N.)

7. *Eadem, caule repente, ramosisimo; ramis erectis, subsimplicibus.* (N.)

Cette plante est soumise à plusieurs variétés, & se présente sous des formes un peu différentes; ce qui sans doute lui a fait donner différents noms. Ses principaux caractères consistent dans la corolle plus courte que le calice, dans ses feuilles rétrécies à leur base, ovales-lancéolées; dans les tiges couchées, & dont les rameaux sont relevés, simples ou diffus & ramifiés.

Ses racines sont grêles, blanchâtres, fibreuses; ses tiges tendres, menues, très-glabres, couchées, rampantes ou un peu relevées; alors elles sont médiocrement rameuses; les rameaux diffus; mais quand ces tiges sont tout-à-fait couchées, elles produisent un grand nombre de rameaux droits, presque simples, sucs, hauts d'environ six po.

médiocrement ramifiés; les feuilles opposées, sessiles, oblongues, glabres à leurs deux faces, ondulées à leurs bords, aiguës à leur sommet, de la longueur des entre-nœuds, longues de cinq à six lignes. Les fleurs sont axillaires, terminales, pédonculées, réunies au nombre de deux ou trois; les pédoncules capillaires, uniflores, plus longs que les feuilles; leur calice glabre.

Cette plante croît au Japon, le long des chemins. (*Descript. ex Thunb.*) (*V. f. in herb. Juss.*)

19. STELLAIRE rampante. *Stellaria humifusa*. Swartz.

Stellaria foliis ovatis, subsecundis, sessilibus; caulibus procumbentibus, tetragonis; pedunculis solitariis, abbreviatis. Swartz. Nov. Act. Holm. 1789. pag. 111. tab. 4. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 714. n°. 15.

Stellaria (humifusa), caulibus pluribus in orbem sparsis, procumbentibus, foliis secundis, ovatis, apice connatis. Rottb. Act. Hafn. 10. pag. 447. tab. 4. — Wedd. Flor. dan. tab. 978.

Stellaria (humifusa), foliis ovatis; floribus solitariis, breviter pedunculatis; petalis bifidis, calicibus diffusis, procumbentibus. Retz. Prodr. Flor. scand. edit. 2. n°. 550.

C'est une plante dont les tiges sont nombreuses, couchées, étalées sur la terre en rosette, glabres, tétragones, garnies de feuilles opposées, ovales, sessiles, presque unilatérales, conniventes à leur sommet. Les fleurs sont solitaires, supportées par des pédoncules courts; la corolle blanche, un peu plus grande que le calice; les pétales bifides.

Cette plante se rencontre sur les montagnes alpines de la Suède & de la Norvège. ☉

20. STELLAIRE biflore. *Stellaria biflora*. Linn.

Stellaria foliis subulatis, scapis subbifloris, petalis emarginatis, germinibus oblongis, calicibus striatis. Linn. Flor. lucc. edit. 2. n°. 395.

Stellaria foliis subulatis, ramis bipartitis, petalis emarginatis, calicibus striatis. Swartz. Nov. Act. Holm. 1788. pag. 36. tab. 1. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 715. n°. 14.

Sagina ramis erectis, bifloris. Linn. Flor. lapp. 18. — Wedd. Flor. dan. tab. 12. — Rottb. Act. Hafn. 10. tab. 3. fig. 11.

Mahringia, scapis bifloris. Flor. lucc. edit. 1. n°. 316. & Anac. Academ. vol. 2. pag. 264, in nois.

Cette espèce est fort petite; elle a le port d'un *arenaria* ou d'un *sagina*. Ses tiges sont droites, filiformes, presque simples, hautes de deux ou trois pouces, bifides à leur partie supérieure. Il

n'y a guère que des feuilles radicales. Elles sont subulées, réunies en fascicule, glabres, aiguës, sessiles; deux autres feuilles opposées à la base de la bifurcation des rameaux; les fleurs terminales, deux à l'extrémité de chaque rameau, soutenues par des pédoncules filiformes, munis dans leur milieu de deux petites feuilles ou bractées opposées; les calices striés; la corolle blanche, de la grandeur du calice; les pétales légèrement échancrés; les capsules oblongues.

Cette plante croît dans les Alpes de la Laponie. ☿

21. STELLAIRE du Groënland. *Stellaria groenlandica*. Retz.

Stellaria caulibus decumbentibus, subbifloris; foliis linearibus, basi subulatis; petalis emarginatis; fructibus globosis. Retz. Prodr. Flor. scand. edit. 2. n°. 552. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 715. n°. 15.

C'est la plus petite espèce de ce genre. Ses racines sont presque simples, filiformes; elles produisent un tige qui se divise, presque dès sa base, en plusieurs petits rameaux étalés, longs d'un pouce, presque couchés, glabres, cylindriques ou un peu anguleux, bifurqués à leur sommet. Les feuilles, presque toutes radicales, sont un peu charnues, sessiles, fasciculées, linéaires, étroites, un peu obtuses, longues de trois à quatre lignes; celles des tiges rares, opposées, un peu plus étroites, quelquefois légèrement ciliées à leur base.

La bifurcation des rameaux supporte une ou deux fleurs assez grandes, soutenues par des pédoncules médiocres, capillaires, munis de deux petites bractées, courtes, opposées; les calices glabres, à cinq découpures ovales, obtuses, élargies, entourées d'un rebord d'un blanc-jaunâtre; la corolle plus grande que le calice, d'un blanc-jaunâtre; les pétales obtus, à peine échancrés à leur sommet; les capsules un peu globuleuses.

Cette plante croît dans le Groënland. (*V. f. in herb. Lam.*)

22. STELLAIRE sabine. *Stellaria arenaria*. Linn.

Stellaria foliis spatulatis; caule erecto, bifido; ramis alternis, petalis emarginatis. Linn. Spec. Plant. pag. 604. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 716. n°. 16.

Ses racines sont fibreuses; elles produisent une tige droite, cylindrique, haute de six à sept pouces, pubescente, parsemée de poils étalés, un peu visqueuse, divisée en rameaux alternes, presque aussi longs que les tiges, garnis de feuilles opposées, sessiles, spatulées, élargies en ovale à leur partie supérieure, étroites, linéaires à leur par-

tie inférieure, pileuses en dessous & à leurs bords, presque glabres à leur face supérieure.

Les fleurs sont assez grandes, terminales : il en paraît d'abord une dans la bifurcation des tiges ; les autres alternent dans l'aisselle des rameaux, soutenues par des pedoncules droits, plus longs que les feuilles ; le calice visqueux, ainsi que les autres parties de la plante ; les folioles & les bractées de couleur purpurine à leur sommet ; la corolle blanche, plus longue que le calice ; les pétales ouverts en cloche, très-obtus, à peine échancrés ; les étamines blanches, de la longueur du calice ; les anthères bleuâtres ; l'ovaire globuleux, surmonté de trois styles aussi longs que les filaments des étamines.

Cette plante croît en Espagne. ○ (*Descript. ex Linn.*)

23. STELLAIRE acule. *Stellaria scapigera*. Willd.

Stellaria aculeis, foliis linearibus lanceolatis, trinerviis ; pedunculis radicalibus, unifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 716. n° 17.

Ses feuilles sont toutes radicales, nombreuses, serrées, linéaires-lancéolées, longues d'un demi-pouce, acuminées à leur sommet, rudes à leurs bords, marquées de trois nervures peu sensibles. Les pedoncules s'élèvent immédiatement des racines ; ils sont droits, filiformes, longs d'un pouce & demi, terminés par une seule fleur de la grandeur de celle du *Stellaria graminea* ; le calice divisé en cinq folioles lancéolées, aiguës, légèrement membraneuses à leurs bords, traversées par trois nervures ; la corolle aussi longue que le calice ; les pétales linéaires, divisés en deux jusqu'à leur base ; les étamines plus courtes que les pétales ; l'ovaire globuleux, surmonté de trois styles filiformes.

Le lieu natal de cette plante est inconnu. ✕ (*Descript. ex Willd.*)

STELLÉRINE ou STELLÈRE. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des rhymélées, qui a de grands rapports avec les *Passerina*, & qui renferme des herbes indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont linéaires, épaisses ; les fleurs axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coloré, à quatre, quelquefois cinq découpures courtes, tubulé à sa base ; point de corolle ; huit étamines très-courtes ; un style ; une loge supérieurement ouverte ; une semence en bec de crocodile.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, persistant, in-

fundibuliforme ; le tube grêle, allongé ; le limbe à quatre, quelquefois cinq lobes ovales, colorés.

2°. Point de corolle. (Linné prend le calice pour elle.)

3°. Huit étamines (quelquefois dix), dont les filaments sont très-courts, insérés sur le calice, alternes, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire ovale, supérieur, surmonté d'un style très-court, persistant, terminé par un stigmate en tête.

Le fruit est une coque dure, petite, luisante, enveloppée par le calice persistant, terminée par une pointe courbée en forme de bec.

Observations. Les *Stellera*, composés d'un très-petit nombre d'espèces, forment un genre très-voisin des *Passerina*, dont elles diffèrent par leurs semences. Elles ont le port des *Stefium*, & presque la fructification ; mais dans ces derniers l'ovaire est inférieur, le fruit capsulaire, les étamines au nombre de cinq ; ils appartiennent à la famille des chalcidées.

Ce genre a été consacré, par Linné, à la mémoire de Stellère, savant botaniste, qui avoit été chargé de parcourir les provinces septentrionales de la Russie, & qui est mort au milieu de ses recherches.

ESPÈCES.

1. STELLÉRINE à fleurs axillaires. *Stellera passerina*. Linn.

Stellera foliis linearibus, floribus quadrifidis. Linn. Spec. Plant. pag. 512. — Amoen. Acad. vol. 1. pag. 400. — Jacq. Icon. tab. 80. — Haller, Helv. n° 1028. — Sauvag. Monsp. 69. — Pollich. Palat. n° 381. — Hoffm. Germ. 137. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 171. — vol. II. pag. 446. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 186. tab. 39. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 293. — Gouan, Flor. monsp. pag. 44. tab. 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 332. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 560.

Stellera foliis linearibus, floribus axillaribus, sessilibus, quadrifidis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 429. n° 1.

Passerina foliis linearibus, floribus longè spicatis, alternis, in saltorum binorum alis, sessilibus. Guett. Stamp. pag. 25. — Dalb. Paris. 118.

Thymela arvensis. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 213.

Thymela linaria folio, vulgaris. Tourn. Infl. R. Herb. 194.

Passerina. J. Euh. Hist. 3. pag. 456. Icon. — Gesner, Icon. Lign. tab. 12. fig. 103. — Ttag. 335. Icon.

Lithospermum linaria folio, germanicum. C. Bauh. Pin. 259.

Linaria altera, bracteoides, montana. Colum. Ephr. 1. pag. 82. Icon.

Lingua posserina. Tabern. pag. 818.

Lithospermum annuum, spicatum, linaria folio. Morif. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 31. fig. 9.

Vulgairement herbe à l'hiconnelle.

C'est une plante herbacée, assez semblable au *thesium linophyllum*, haute d'environ un pied, dont les racines sont grêles, droites, presque simples, blanchâtres, cylindriques ; elles produisent une tige glabre, ferme, droite, verdâtre, cylindrique, quelquefois simple, plus souvent rameuse ; les rameaux grêles, presque filiformes, élançés, alternes, quelquefois rapprochés, plus ordinairement écartés de la tige ; les feuilles éparées, alternes, courtes, très-glabres, sessiles, linéaires ou un peu lancéolées, entières, aiguës, vertes, longues d'environ cinq à six lignes, un peu serrées contre les tiges.

Les fleurs sont fort petites, situées le long des rameaux dans l'aisselle des feuilles, sessiles, un peu coniques avant leur épanouissement, solitaires ou réunies deux ou trois, d'un jaune-pâle, un peu pubescentes ; le limbe du calice divisé en quatre lobes peu profonds. L'ovaire se convertit en une petite semence très-lisse, noirâtre, de la forme d'une petite poire, renfermée dans le calice & terminée par une pointe courbée en bec crochu.

Cette plante croît dans les champs, sur les collines, en Europe & dans la Barbarie. ☉ (V. v.)

2. STELLÉRINE à fleurs terminales. *Stellera chamaejasme.* Linn.

Stellera foliis lanceolatis, floribus quinquefidis. Linn. Spec. Plant. pag. 512. — Amoen. Academ. vol. 1. pag. 400. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 27.

Stellera foliis lanceolatis, floribus terminalibus racemosis, nudis, quinquefidis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 429. n° 2.

Chamaejasme radice mandragora. Amm. Ruth. pag. 16. tab. 2.

Ses racines sont épaisses, un peu charnues, approchant de celles de la mandragore : il s'en élève des tiges droites, glabres, rameuses, garnies de feuilles éparées, sessiles, glabres, lancéolées, entières à leurs bords, aiguës. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes allongées, dépourvues de feuilles. Leur calice est infundibuliforme ; son limbe divisé en cinq lobes ; les étamines au nombre de dix.

Cette espèce se rencontre dans la Sibérie. ☿

3. STELLÉRINE altaïque. *Stellera altaica.* Persf.

Stellera foliis lanceolatis, acutis ; floribus capitato-racemosis, quadrifidis. Persf. Synop. Plant. vol. 1. pag. 436.

Cette espèce se rapproche de la précédente par la disposition de ses fleurs ; elle a, dans le nombre de ses étamines & dans les divisions du calice, le caractère de la première. Ses tiges sont garnies de feuilles éparées, sessiles, glabres, lancéolées, entières, aiguës à leur sommet ; les fleurs réunies, à l'extrémité des tiges, en grappes rapprochées en tête ; le limbe du calice divisé en quatre lobes ; les étamines au nombre de huit.

Cette plante croît sur les monts Altaïques.

STEMODIA. *Stemodia.* Geste de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des scrophulariées, qui a des rapports avec les *capraria* & les *hatteria*, & qui comprend des arbrisseaux ou des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes ou opposées ; les fleurs axillaires, solitaires, accompagnées de deux bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; une corolle tubulée ; le limbe à quatre lobes, presque à deux lèvres ; quatre étamines ; chaque filament bifide & à deux anthères ; un style ; une capsule à deux loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, divisé en cinq parties droites, égales, persistantes.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, dont le tube est de la longueur du calice ; le limbe droit, presque à deux lèvres ; la lèvre supérieure ovale, entière ; l'inférieure à trois lobes égaux, arrondis.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont presque égaux, de la longueur du tube, bifides à leur sommet, chaque découpure surmontée d'une ou de deux anthères.

4°. Un ovaire obtus, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une capsule ovale, oblongue, à deux loges, à deux valves, séparées par une cloison étroite opposée à ces valves ; des semences nombreuses, fort petites.

Observations. Ce genre n'est composé jusqu'alors que d'un très-petit nombre d'espèces, dont la plupart offrent le port des *capraria*, & ne paraissent être qu'un démemberement de ce dernier

genre : il n'en diffère en effet que par un caractère très-singulier dans les étamines, dont les filamens portent deux anthères, les uns en se bifurquant à leur partie supérieure, d'autres sans bifurcation. Tantôt ces mêmes anthères sont geminées ou à deux loges à l'extrémité de chaque filet de la bifurcation, tantôt elles sont simples. On peut ajouter à ce caractère générique une corolle dont le limbe, presque à deux lèvres, est divisé en quatre lobes. Les autres parties sont à peu près les mêmes que dans les *capraria*.

Swartz, & d'après lui Willdenow, ont rapporté à ce genre le *capraria duranifolia*, dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage. (Voyez l'article CAPRAIRE.)

ESPÈCES.

1. *STEMODIA maritime*. *Stemodia maritima*. Linn.

Stemodia foliis oppositis, semiaplexicaulis; floribus sessilibus, solitariis. Swartz, Observ. bot. pag. 242. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 344. n°. 1. — Lam. Illustr. Genet. tab. 334. fig. 1.

Stemodia foliis lanceolatis, sessilibus. Vahl, Symb. vol. 2. pag. 69.

Stemodia. Linn. Syst. veget. p. 573. — Amoen. Acad. vol. 5. pag. 399. — Jacq. Stirp. Annet. pag. 181. 174. fig. 66.

Stemodiaca maritima, odorata; foliis minoribus, sessilibus, denticulatis, hastatis; floribus solitariis, alaribus. Brown, Jam. pag. 261. tab. 22. fig. 2.

Scordium maritimum, fruticosum, procumbens. Sloan, Jam. pag. 66. Hist. t. pag. 175. tab. 110. fig. 2.

Cette plante ressemble tellement au *capraria bifera*, qu'elle pourroit aisément, au premier aspect, être confondue avec lui; mais, outre qu'elle en diffère par ses feuilles opposées & non alternes, le caractère de sa fructification, les filamens bifurqués & à deux étamines l'en distinguent suffisamment.

C'est presque un sous-arbrisseau, dont les tiges sont grêles, un peu ligneuses, en partie inclinées ou couchées, divisées en rameaux grêles, alternes, garnis de feuilles sessiles, opposées, presque amplexicaules, lancéolées, oblongues ou ovales-lancéolées, glabres, inégales, à peine d'un pouce de long, denticulées à leur contour, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont sessiles, solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures, d'une grandeur médiocre; leur calice d'une seule pièce à sa base, à cinq découpures droites, subulées; la corolle divisée à son orifice en quatre lobes presque égaux, courts, arrondis; les filamens des étamines bifurqués, & soutenant à chaque branche

deux anthères; l'ovaire ovale; le style droit; le stigmate presque en forme de croissant; une capsule ovale-oblongue, obtuse.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les côtes maritimes, dans les terrains inondés. (V. f.)

2. *STEMODIA des décombres*. *Stemodia ruderalis*. Vahl.

Stemodia foliis oblongis, petiolatis; floribus axillaribus, oppositis. Vahl, Symb. 2. pag. 69. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 345. n°. 3.

Stemodia foliis ovatis, ferratis, petiolatis. Retz. Observ. 5. pag. 25. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 243. tab. 32. fig. 5. — Lam. Illustr. Genet. tab. 334. fig. 1.

Cette plante a des tiges droites, herbacées, hautes de six à huit pouces, à quatre angles peu marqués, pubescentes, rameuses à leur partie inférieure; les rameaux très-simples, très-ouverts, un peu plus courts que les tiges, garnis de feuilles opposées, pétioles, longues d'un pouce ou un peu moins, glabres à leurs deux faces, veinées, dentées en scie; les dentelures obtuses, très-entières à leur base, aiguës, soutenues par des pétioles filiformes, plus courts que les feuilles. Les fleurs sont axillaires, opposées; les pédoncules solitaires, linéaires, pubescens; les calices pubescens; la corolle petite; les deux filamens intérieurs bifurqués, chaque filet de la bifurcation terminé par une anière simple; les deux filamens latéraux très-simples, surmonté chacun de deux anthères rapprochées.

Cette plante croît aux Indes orientales, parmi les décombres. (V. f.)

3. *STEMODIA camphrée*. *Stemodia camphorata*. Vahl.

Stemodia foliis ovatis, petiolatis; floribus racemosis. Vahl, Symb. pars 2. pag. 345. n°. 4.

Ghonorola. Herm. Mus. Zeyl. 1.

Cette plante, d'après M. Vahl, ressemble tellement à *Adiantum orientale*, qu'il soupçonne qu'elle pourroit bien être la même plante. Ses feuilles sont opposées, pétioles, ovales, longues d'un pouce & demi, linéaires & inégalement dentées en scie, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, légèrement pileuses à leur face supérieure. Les fleurs sont disposées en une grappe terminale droite, longue de cinq à six pouces; la corolle d'un vert tirant sur le jaune-citron. Il en existe une variété à feuilles beaucoup plus étroites, corolles à leur base, rétrécies à leurs deux extrémités.

Cette plante se rencontre dans l'île de Ceylan. (Descript. ex Vahl.)

4. *STEMODIA*

4. *STEMODIA* aquatique. *Stemodia aquatica*.

Stemodia foliis ternis, submersis, bipinnatis, capillaceis; emergis indivisis, lanceolatis, sessilibus; spicis axillaribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 346. n° 5.

Wajet-Kuttu Paga-dei, Tamul.

Cette plante, si distante des *stemodia* par son port, y convient par toutes les parties de la fructification, excepté que les anthères ne sont point doubles au sommet des filaments, mais seulement rapprochées par paies.

Elle croît dans l'eau. Ses tiges sont cylindriques, longues depuis un demi-pied jusqu'à deux pieds; ses feuilles inférieures, entièrement plongées dans l'eau, sont deux fois ailées; les folioles capillaires. Les feuilles supérieures, & hors de l'eau, sont ternées, sessiles, lancéolées, glabres, à trois nervures, finement dentées en scie depuis leur sommet jusque vers leur milieu; leur partie inférieure très-entière.

De l'aisselle des feuilles & du sommet des tiges sortent des épis longuement pedunculés, d'un pouce de long; ces fleurs sessiles, alternes, accompagnées d'une bractée lancéolée, de la longueur du calice; celui-ci à cinq divisions; la corolle à deux lèvres; son tube court, refermé dans son milieu; la lèvre supérieure plus grande, en cœur renversé; l'inférieure à trois lobes; l'orifice garni de poils; quatre étamines rapprochées deux par deux; les anthères petites, point geminées; l'ovaire ovale; le style filiforme & courbé; le stigmate dilaté, concave; la capsule à deux loges, à plusieurs semences.

Cette plante croît dans les eaux, proche Tranquebar, aux Indes orientales. (*Descript. ex Willd.*)

STÉMONITE. *Stemonitis*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, qui a de grands rapports avec les *trichia*. Il est composé de végétaux fort petits, qui exigent souvent l'usage du microscope pour être observés convenablement.

Leur caractère essentiel est d'avoir :

Un pédicelle dont la tête (peridium) est très-grosse, allongée, très-souvent sagittée, enveloppée de filaments capillaires, un peu fermes, réticulés, traversés par un axe ou un style auquel ils adhèrent.

E S P È C E S.

1. **STÉMONITE à style blanc.** *Stemonitis leucostyla*. Trentep.

Stemonitis gregaria, serpens, peridio ovato-violaceo, stipite caudato. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 186.

Botanique, Tome VII,

Stemonitis leucopodia. Decand. Flot. franç. vol. 2. pag. 257.

Trichia leucopodia. Bull. Champ. pag. 121. tab. 502. fig. 2.

Stemonitis (elegans), gregaria, stipite niveo; capitulo oblongo poelineque atro-rubricibus, capillitis albo. Trentepohl. in Rothii. Catal. bot. pag. 120.

Ce petit champignon croît en masse en automne, sur les branches & les feuilles d'arbre tombées; il forme des agrégats disposés par lignes un peu tortueuses, & qui cessent à leur base un élargissement blanchâtre, très-mince, un peu crustacé. Le pédicelle est très-court, blanc, ainsi que l'axe qui le termine. La tête est oblongue, chargée d'une petite poussière violette ou d'un rouge-pourpre; les filaments très-ferrés, capillaires, blanchâtres, sur lesquels sont insérés de petits globules seminaux, presque elliptiques. Cette petite tête persiste, tandis que dans le plus grand nombre des espèces elle disparaît assez rapidement. D'après M. Decandolle, cette plante croît également sur les feuilles & les tiges des graminées mortes ou languissantes, où elle est souvent disposée en lignes comme les nervures.

2. **STÉMONITE en massette.** *Stemonitis tighyna*. Pers.

Stemonitis sparsa, minor, capillitis cylindrico, obtuso, subincurvo. Pers. Observ. Mycol. t. pag. 37. — Wieg. Synopf. Meth. Fung. 187. — Willd. Flot. berol. n° 1137. — Schæff. Fung. bav. tab. 217.

Embolus pertusus. Batfch. El. Fung. Cent. 1. pag. 263. tab. 5. fig. 176.

Trichia typhoides. Bull. Champ. pag. 118. tab. 477. fig. 2.

Stemonitis typhoides. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 257.

Les pédicelles sont fort menus, luisants, de couleur noirâtre, insérés sur une membrane blanche, très-mince, étalée; ils se terminent par une petite tête cylindrique, molle, d'un blanc-laitieux, obtuse; elle prend, en vieillissant, une couleur brune ou noirâtre, persiste & s'incline médiocrement après l'émission de la poussière féminale, qui s'échappe par plusieurs crevasses latérales. Cette plante croît dans les forêts, sur les troncs pourris; elle paraît dans le courant de l'été.

3. **STÉMONITE fasciculée.** *Stemonitis fasciculata*. Pers.

Stemonitis capitisosa, major, capillitis subattenuato, cortice toto evanescente. Pers. Observ. Myc. H h h

vol. 1. pag. 16. — Idem, Synopf. Meth. Plant. pag. 187. n°. 3. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 156.

Stemonitis (fusca), aggregata, stipitata, capitulo stipitem cingente, cylindrico, fusco brunneo. Trentep. in Roth. Catal. bot. pag. 222. — Roth. Flot. germ. 1. pag. 448.

Trichia axifera. Bull. Champ. pag. 118. tab. 477. fig. 1.

Stemonitis raphana. Gmel. Syst. nat. Linn. vol. 1. pag. 1461.

Clathrus nudus. Linn. Syst. veget. pag. 1017. Bot. Fung. tab. 93. fig. 1.

Trichia nuda. Sowerb. English. Fung. tab. 50.

Embolus laevis. Hoffm. Veget. Cryptog. 2. p. 3. tab. 1. Junior. — Jacq. Miscell. vol. 1. pag. 137. tab. 6.

Ce champignon a pour base une membrane blanche qui donne naissance à plusieurs pédicelles fasciculés, grêles, cylindriques, noirs, qui se prolongent en un style persistant, & traversent une petite tête (le *peridium*) terminale, molle, un peu ovale, étroite, d'un blanc-laitieux, qui s'allonge avec l'âge & prend une couleur brune ou ferrugineuse; elle est enveloppée de quelques filaments reticulés, qui s'écartent & laissent échapper une fine poussière rouille, composée de globules atronides. On trouve cette espèce, dans le courant de l'automne, sur les troncs morts des hêtres & autres arbres, & sur les mousses.

4. STÉMONITE papilleuse. *Stemonitis papillata*. Pers.

Stemonitis atrofusca, capillitio globoso, stipitio toto penetrante. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 10. tab. 4. fig. 3. — Idem, Synopf. Fung. pag. 188. n°. 4.

Stemonitis reticulata. Trentep. in Roth. Catal. bot. pag. 223.

Ce petit champignon est d'un brun-noirâtre: son pédicelle traverse la tête, & en sort sous la forme d'une petite pointe, où il offre un petit mamelon. Cette tête est parfaitement globuleuse, un peu compacte, composée de filaments entortillés en réseau. Il croît sur les rameaux du chêne, plus ordinairement sur les branches écorcées.

5. STÉMONITE ovale. *Stemonitis ovata*. Pers.

Stemonitis capillitio laxo, subovato; stipitio ad dimidium feri penetrante. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 188. n°. 5.

Stemonitis atrofusca, stipite subulato, atro;

capillitio subovato, fusco. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 11.

8. *Stemonitis* (nigra), tota nigra. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 189.

Stemonitis nigra. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1467. — Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 57.

Le pédicelle, qui est très-court, subulé, d'un brun-noirâtre, extrêmement fin, est terminé par une petite tête fort grêle, ovale ou arrondie, composée de filaments lâches, très-déliés, & qui laissent par s'évanouir assez promptement: il ne reste alors, sur les rameaux où croît cette plante, que le pédicelle qui ressemble à une petite soie très-fine.

La variété α croît ordinairement sur les rameaux des chênes privés de leur écorce; elle est d'un brun-foncé. La variété β est entièrement noire: les filaments de la tête sont bien plus caducs: elle se trouve sur les faules creux.

* *Arcyria*. Pers.

6. STÉMONITE à tête blanche. *Stemonitis leucocephala*. Gmel.

Stemonitis receptaculo infundibuliformi; filis seminiferis, subprominulis, fuscis, albis. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1467.

Arcyria (leucocephala), gregaria; peridio infundibuliformi, rufescente, sparsito; capillitio globoso, fuscis, niveo. Pers. Synopf. Plant. pag. 183. n°. 1.

Arcyria leucocephala. Hoffm. Flot. Germ. 1. tab. 6. fig. 1.

Trichia (cinerea), gregaria, obovata, stipite rubicundo, capitulo cinereo, filamentis albis. Trentep. in Roth. Catal. botan. 1. pag. 227.

Cette espèce est très-élégante: on la trouve en automne sur les feuilles tombées ou sur les fourches arides. Elle est d'une substance sèche; elle croît par groupes. Son pédoncule est rougeâtre; la tête cendrée, un peu globuleuse ou en forme d'entonnoir, garnie de filaments d'un blanc de neige.

7. STÉMONITE élégante. *Stemonitis amana*. Trentep.

Stemonitis aggregata, sessilis; capitulo cylindrico, albo-fuscescente; capillitio longissimo. Trentep. in Roth. Catal. botan. 1. pag. 222.

Stemonitis (nutans), flavicans, stipite brevissimo; capitulo longissimo, decumbente. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1467.

Arcyria (flava), parca, flava, capillitio longis-

fimo, mutante. Perf. Obseiv. Mycol. 1. pag. 58. & Synopf. Meth. Fung. pag. 184.

Trichia nutans. Bull. Champ. pag. 122. tab. 512. fig. 3. — Sowterb. Fung. tab. 160.

Il croît sur le tronc des arbres en groupes peu nombreux ; il n'est pas commun. Son pédoncule est à peine sensible ou nul ; sa tête d'un blanc de neige dans sa jeunesse, s'en va vieillissant, cylindrique, allongée, munie de chevelus très-longs, inclinés, lâches, arqués, & qui se détachent aisément de leur réceptacle.

8. STÉMONITE cendrée. *Stemonitis cinerea.*

Stemonitis leucophaea, capitulis subcylindricis, basi complanatis. Gm. 1. Syll. Nat. vol. 2. pag. 1467. — Flor. dan. tab. 806. ?

Arcyria (cinerea), gregaria, albidia cinerea. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 184.

Arcyria albidia. Perf. Dispos. Meth. Fung. pag. 10. tab. 1. fig. 2.

Stemonitis (glauca), stipitata, sordida alba, capitulo ovato, capsitulis sublonga. Trentep. in Roth. Catal. botan. pag. 221.

Il est assez commun dans les forêts, sur le tronc des arbres ; il a beaucoup de rapport avec le *stemonitis punicea*, mais il est d'une couleur plus claire, d'une substance plus sèche, qui alors prend une couleur cendrée un peu rouilleuse. Son pédoncule est court, le mont d'une petite tête presque cylindrique, un peu aplatie à sa base, presque ovale ; les filaments médiocrement allongés.

9. STÉMONITE incarnate. *Stemonitis incarnata.* Gmel.

Stemonitis tota dilute incarnata, filis seminiferis, ovato-oblongis, forma fusilis. Gmel. Syll. Nat. vol. 2. pag. 1467. n° 6.

Arcyria (incarnata), congesta, sordida carnea, capsitulis deciduis. Perf. Synopf. Mycol. 1. pag. 38. tab. 5. fig. 4, 5.

Stemonitis (globosa & carnea). Trentep. in Roth. Catal. botan. 1. pag. 222, ex Perf.

Cette espèce est assez commune pendant l'automne ; elle croît sur les bois secs, éternus sur la terre, particulièrement sur celui du chêne ; elle pousse par groupes. Ses pédoncules sont courts & varient dans leur grandeur. Toute la plante est d'une couleur de chair un peu claire. Sa tête est oblongue, un peu ovale, garnie de filaments séminifères, caducs.

10. STÉMONITE safranée. *Stemonitis crocea.*

Stemonitis coccinea, receptaculo subitis striato, filis

seminiferis, oblongo-ovatis. Gmel. Syll. Nat. vol. 2. pag. 1467. n° 5, 2.

Stemonitis (crocata), gregaria, stipitata, purpurea, capsitulis subglobosis, capsitulis ovato, pulvere cinnabarino. Trentep. in Roth. Catal. 1. pag. 220. — Willden. Berol. pag. 408.

Arcyria (punicea), congesta, crocea-punicea. Persoon, Dispos. Meth. Fung. pag. 10. & Synopf. Fung. pag. 185. n° 5.

Trichia cinnabarina. Bull. Champ. pag. 121. tab. 502. fig. 1. b. c.

Clathrus denudatus. Linn. Syll. veget. edit. 15. pag. 1017. — Jacq. Miscell. Austr. 1. tab. 6.

Cette belle espèce se rencontre assez fréquemment, en automne & dans l'été, sur les troncs pourris. Elle est d'abord d'une substance molle, blanchâtre, de forme un peu arrondie ; elle devient ensuite ovale, & prend une couleur un peu safranée ou d'un rouge-gai ; ses filaments d'un rouge de cinabre & pulvérulents. Plus avancée en âge, toute la plante acquiert une couleur d'un brun-foncé ; ce qui forme alors la variété que Bulliard a très-bien nommée *trichia vinoso-fuscescens*, 1. c. fig. f. d.

STÉPHANIE d'Amérique. *Stephania cleomoides.* Willden.

Stephania foliis alternis, lanceolatis, integris ; floribus solitariis, axillaribus. (N.)

Stephania cleomoides. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 259.

Capparis (paradoxa), foliis lanceolatis, acuminatis, petenantiibus ; calycibus bipartitis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 1. pag. 58. tab. 111.

Plante d'Amérique, que Jacquin avait rangée parmi les *capparis*, & dont Willdenow a fait un genre particulier, qui n'a de commun avec les *capparis* qu'un ovaire pédicellé, & qu'il a consacré au savant professeur Stéphan.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de six pieds. Son tronc se divise en rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, lancéolées, luisantes, veinées, très-entières, ondulées à leur contour, acuminées à leur sommet, parsemées dans leur jeunesse de petites touffes de poils étoilés, supportées par de très-longs pétioles pubescents.

Les fleurs ont le port de celles des *cleome*. Elles sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, pendantes, formant par leur réunion à l'extrémité des rameaux une sorte de grappe foliacée. Leur pédoncule est de la longueur du calice ; celui-ci ventru, campanulé, à deux lobes, de couleur orangée ; la corolle jaune, un peu plus longue que

H h h 2

le calice, composée de quatre pétales droits. Les étamines, au nombre de six, sont droites, quatre fois plus longues que le calice; les filaments inégaux, terminés par des anthères inclinées; l'ovaire pédicellé, de la longueur des plus courts filaments; point de style; un stigmate sessile & capité; le pédoncule de la longueur de l'ovaire. Le fruit paroît être une capsule.

Le caractère essentiel de ce genre est donc d'avoir :

Un calice campanulé, à deux lobes; quatre pétales; six étamines; les deux inférieures plus longues; un ovaire pédicellé; point de style; un stigmate en tête.

Cet arbrisseau croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. *Th. (Descript. ex Willd.)*

STERCULIER. *Sterculia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des malvacées, qui a des rapports avec les *Helicteres*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples, digitées ou palmées, munies de stipules caduques; les fleurs disposées en une panicule terminale, avec des bractées aux ramifications de la panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coriace, à cinq découpures; point de corolle; environ quinze étamines attachées à un appendice urcéolé; un ovaire à cinq filons, pédonculé; un style subulé; un stigmate presque à cinq lobes; cinq capsules conniventes, à une seule loge, polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice coriace, d'une seule pièce, plane, très-ample, à cinq divisions lancéolées.

2°. Point de corolle.

3°. Dix ou quinze étamines, dont les filaments sont très-courts, nuls ou plutôt réunis en un seul corps cylindrique, urcéolé, étalé, lisse ou velu, nine fois plus court que le calice, divisé à son orifice en cinq dents, qui supportent chacune deux ou trois anthères ovales.

4°. Un ovaire globuleux, pédonculé, à cinq stries, surmonté d'un style subulé, filiforme, terminé par un stigmate presque à cinq lobes.

Le fruit est composé de cinq capsules conniventes, dont plusieurs avortent quelquefois; environnées à leur base par l'appendice urcéolé & frangé des étamines, très-écartées à leur partie supérieure, étalées, rebéchies, entières, ayant presque la forme de gouffes réniformes; chaque capsule pédicellée, à une seule loge, renfermant

plusieurs semences, s'ouvrant longitudinalement à leur suture intérieure; les semences attachées sur le bord des valves; l'intérieur des loges souvent garni de poils qui excitent des démangeaisons.

Observations. L'ovaire, dans plusieurs espèces, ne se montre & ne se développe dans les fleurs que bien long-temps après l'apparition des étamines; quelquefois même il avorte: d'où il résulte que ce genre paroît devoir appartenir à la monachie de Linné lorsque l'on ne suit pas ces développemens. Il se rapproche beaucoup des malvacées dans l'ordre naturel.

M. Ventenat en forme une famille nouvelle sous le nom des *Sterculiacées*, qui doit tenir le milieu entre les malvacées & les tiliacées, & qui est caractérisée par des étamines monadelphes & par le périsperme qui entoure l'embryon. Alors il faudra réunir dans cette famille les genres placés par M. de Jussieu dans la première section des tiliacées, & quelques-uns de ceux qui se trouvent dans les dernières sections des malvacées. *L'heritiera* d'Aiton, le *balanopieris* de Gärtner, paroissent devoir faire partie de ce nouvel ordre.

Il est très-probable que si la plupart des nouvelles espèces qui composent ce genre étoient mieux connues, on y reconnoitroit au moins deux genres réunis en un seul. Le *Sterculia longifolia*, si bien décrit par M. Palifot de Beauvois sous le nom de *Sterculia acuminata*, présente déjà des différences suffisantes, dont les principales sont : un calice court, campanulé, à six (rarement cinq) dents oblongues; vingt étamines sessiles, disposées sur deux rangs, placées circulairement sur un godet court; cinq ovaires connivents, presque sessiles; cinq stigmates réstés; point de style; cinq capsules monospermes. On peut rapprocher de cette espèce le *Sterculia colorata* & le *Sterculia urens* de Roxburg, peut-être aussi le *Sterculia grandiflora* & *nitida* de M. Ventenat, & quelques autres dont les parties de la fructification ne sont pas encore parfaitement bien connues.

Néanmoins, avant de former un nouveau genre de quelques-unes de ces espèces, il est bon d'observer qu'il n'y a de rien constant dans ce genre, que l'absence de la corolle, la situation des étamines, les capsules univalvaires, s'ouvrant longitudinalement à leur suture; mais la forme du calice, le nombre des étamines, celui des semences, varient. L'ovaire est quelquefois sessile; un style terminé par des stigmates réunis en une tête à cinq lobes; quelquefois le style nul, cinq stigmates séparés & rebéchies, cinq ovaires connivents. La plupart de ces variétés ne détruisent point le caractère essentiel du genre; un ovaire à cinq filons ou cinq ovaires connivents diffèrent peu, puisqu'il en résulte également cinq capsules. S'il y a cinq ovaires, il en résulte cinq styles ou cinq

figmâtes séparés, mais qui font corps dans les ovaires simples à cinq sillons.

E S P È C E S.

1. STERCULIER balangas. *Sterculia balanghas*. Linn.

Sterculia foliis ovatis, integerrimis, alternis, petiolatis; floribus paniculatis. Cavan. Dissert. botan. 5. pag. 286. n°. 415. tab. 143. — Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 195. — Flor. zeyl. 350.

Sterculia foliis ovato-lanceolatis, capsulis obovatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 872. n°. 2.

Nux malabarica, falcata, mucilaginosa, fabacea. Pluken. Almag. 166.

Clompanus minor. Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 169. tab. 107. ?

Cuculamm. Rheed. Malab. vol. 1. pag. 99. tab. 49. — Rai, Hist. 1754. ?

C'est un très-grand arbre, dont le tronc a presque deux pieds de diamètre, revêtu d'une écorce épaisse, cendrée; le bois blanc, filamenteux lorsqu'on le casse; les branches rapprochées en une cime rousue, étalée; les feuilles, situées vers l'extrémité des rameaux, pétiolées, alternes, ovales, lancéolées, très-entières, acuminées, glabres à leurs deux faces, lisses, longues de neuf pouces, sur trois pouces de large; les pétioles renflés à leurs deux extrémités, plus courts au moins de deux tiers que les feuilles, caduques avant l'apparition des fleurs.

Celles-ci sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une panicle médiocrement étalée; les ramifications alternes, presque fasciculées, velues. Le calice est divisé en cinq découpures profondes, très-étroites, ouvertes, aiguës, velues, ciliées à leurs bords, rapprochées à leur sommet, courbées en arc en dedans, rousueâtres ou un peu rougeâtres en dehors, d'un jaune-verdâtre en dedans, l'ovaire supporté par un long pédoncule; le fruit composé de cinq capsules pédicellées, ouvertes en étoile à l'époque de leur maturité, ovales, presque rondes, diffusant une liqueur visqueuse, qui se répand sur leur enveloppe; à une seule valve dure, épaisse, jaunâtre, glabre tant en dehors qu'en dedans; elle renferme plusieurs semences glabres, noires, oblongues ou un peu arrondies, attachées le long des deux côtés de la suture.

Cet arbre croît aux Indes, dans l'île d'Amboine, au Malabar, dans les sols arides, sablonneux ou pierreux. Il fleurit dans le courant du mois de février. ¶

2. STERCULIER à feuilles lancéolées. *Sterculia lanceolata*. Cavan.

Sterculia foliis lanceolatis; capsulis hermaphroditis, paucispermis. Cavan. Dissert. botan. 5. pag. 287. n°. 416. tab. 143. fig. 1.

Sterculia foliis lanceolatis, capsulis oblongis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 872.

Cette espèce, qui n'est encore que très-imparfaitement connue, se rapproche beaucoup, à ce qu'il paroît, du *sterculia balanghas*. Ses feuilles sont alternes, pétiolées, très-entières, lancéolées. Ses fruits sont composés de cinq capsules pédicellées, ouvertes en étoile à l'époque de la maturité des semences, ovales, oblongues, à une seule valve naviculaire, d'un rouge-vif, ne renfermant que trois ou quatre semences noitâtres, globuleuses.

Cette plante croît à la Chine. ¶

3. STERCULIER monosperme *Sterculia monosperma*. Vent.

Sterculia foliis ovato-oblongis; laciniis calicinis acutatis introflexis; capsulis ovatis, mucronatis, monospermis. Vent. Hort. Malmaï. p. 91. tab. 91.

Cette espèce se rapproche beaucoup du *sterculia balanghas*; elle en diffère par les capsules, qui ne renferment constamment qu'une seule semence.

Cet arbre a des tiges droites, hautes, rameuses, feuillées à leur sommet; l'écorce d'un brun-cendré; les rameaux alternes, munis de feuilles alternes, pétiolées, réfléchies, ovales-oblongues, aiguës, très-entières, ondulées à leurs bords, veinées en réseau, glabres, luisantes, membraneuses, d'un vert-foncé; les pétioles renflés à leur base; les stipules droites, linéaires, pubescentes, de couleur brune, très-caduques.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, nombreuses, rapprochées en tasicave, formant par leur ensemble une panicle étalée; les rameaux pubescents, d'un vert-pâle. Le calice est d'une seule pièce, en cloche, parsemé de poils courts & glanduleux, divisé jusque vers son milieu en cinq découpures lancéolées, arquées, réunies & légèrement adhérentes à leur sommet, ciliées, à bords réfléchis en d. hors; les étamines au nombre de douze; les anthères sessiles, situées sur les bords d'un tube cylindrique; l'ovaire pédonculé, globuleux, à cinq sillons, hérissé, d'un rouge de cerise; le style couché sur l'ovaire, pubescent, de la longueur du pédoncule; le stigmate renflé, tronqué, à cinq lobes; le fruit composé de cinq capsules coriaces, ovales, ventrues, striées longitudinalement, pubescentes, d'un gris-cendré, parsemées dans leur intérieur de poils peu apparents; une seule semence dans chaque capsule, adhérente par un large ombilic au bord de la suture, ovale, obtuse, de la grosseur d'un marron.

Cet arbre croît dans l'Inde, &c. se cultive au jardin de la Malmaison; il fleurit vers le milieu

du printemps, & passe l'hiver dans la serre-chaude.
 h (Nat.)

4. STERCULIER rouillé. *Sterculia rubiginosa*. Vent.

Sterculia rubiginosa-tomentosa, foliis lanceolato-oblongis, supra glabris; capsulis acuminatis, imbricatis & natis. Vent. Hort. Malmait. pag. 92.

Ses rameaux sont cylindriques, d'un vert-noirâtre à leur partie supérieure, pubescens, presque tomenteux, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, oblongues; lancéolées, membracées, très-entières à leurs bords, un peu acuminées, presque obtuses, longues de huit à neuf pouces, sur deux ou trois de large, un peu élargies vers leur sommet, glabres en dessus, tomenteuses & de couleur de rouille en dessous, à nervures saillantes, alternes, à un peu confluentes vers le bord des feuilles; d'autres nervures plus fines, réticulées, saillantes; les pétioles cylindriques & pubescens. Je n'ai pas vu les fleurs. Les fruits sont composés de capsules oblongues, un peu arquées, pédicellées, ridées & chargées extérieurement d'un duvet court, épais, de couleur de rouille, nues & ridées en dedans, s'ouvrant longitudinalement à leur côté interne.

Cette plante croît à Java, où elle a été recueillie par Commerçon. h (V. f. in herb. Juss.)

5. STERCULIER chevelu. *Sterculia crinita*.

Sterculia foliis ovatis, integerrimis, alternatim sparsis; fructibus basi crinitis. Cavan. Dissert. bot. 5. pag. 285. n°. 413. tab. 141.

Sterculia foliis ovatis trilobifide, capsulis basi crinitis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 872. n°. 3.

Sterculia (ivira), hermaphrodita, foliis ovatis trilobifide; floribus paniculatis, capsulis quinque. Swartz, Prodr. pag. 98.

Ivira pruriens. Aublet, Guian. pag. 693. tab. 279.

Sterculia ivira. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. p. 1034. n°. 2.

Cet arbre s'élève à la hauteur de soixante pieds; il est rameux à son sommet; les rameaux très-étalés, garnis de feuilles alternes, éparées, longuement pétiolées, ovales, assez grandes, très-entières, glabres en dessus, légèrement tomenteuses & rouilleuses en dessous, à trois nervures saillantes, celle du milieu rameuse; terminées à leur sommet par une petite pointe; les pétioles renflés à leur insertion avec les feuilles; les stipules courtes & caliques.

Les fleurs sont disposées en une panicule lâche, terminale, médiocrement rameuse, munie à chaque division d'une petite bractée; le calice con-

cave, à cinq découpures longues, profondes, étroites, étalées, aiguës, jaunes en dehors, rougeâtres en dedans; de leur centre s'élève un pédoncule qui les dépasse, & supporte un petit tube velu, terminé par cinq dents bifides, supportant dix anthères presque sessiles, ovales, oblongues, à deux loges; l'ovaire ovale, velu, à cinq styles, surmonté par un style recourbé, & terminé par un stigmate à cinq lobes fort petits. Le fruit est composé de cinq capsules, dont plusieurs avortent quelquefois, reniformes, pétiolées, étalées en étoile, dont la surface intérieure est couverte de poils roussâtres. Le duvet qui recouvre l'ovaire, s'accroît considérablement, & forme, à la partie inférieure, des capsules, & sur les pédoncules, une touffe de poils longs & soyeux. Les semences sont noires, ovales-oblongues, attachées aux sutures de la capsule & environnées de poils.

Cette plante croît à la Guiane, dans les forêts de Sinemari, le long du fleuve des Galibis. h (V. f. in herb. Juss.)

6. STERCULIER feuillé. *Sterculia fondosa*. Rich.

Sterculia foliis in summitate proximè congestis, oblongo-ovatis, obtusissimis, subrepandis, glabris, lucidis; paniculis axillaribus, longè pedunculatis. Rich. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. vol. 1. pag. 211.

Cette plante doit être distinguée du *Sterculia crinita* de Cavanilles, d'après les observations de M. Ventenat. Ses rameaux sont munis à leur partie supérieure de feuilles alternes, pétiolées, nombreuses, très-rapprochées, ovales-oblongues, très-obtuses à leur sommet, luisantes, glabres à leurs deux faces, un peu sinuées à leur contour. Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en panicules axillaires, longuement pédonculées.

Cette plante croît dans l'Amérique. h

7. STERCULIER à feuilles en cœur. *Sterculia cordifolia*. Cavan.

Sterculia foliis cordatis, latis, acuminatis, septemnerviis, valde venosis; pericarpio extus tomentoso, intus fetofo. Cavan. Dissert. bot. 5. pag. 286. n°. 414. tab. 144. fig. 2.

Sterculia foliis cordatis, obsolete trilobis; capsulis acuminatis, tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 873. n°. 4.

Sterculia. Collier faux, nommé *mangose*. Adanf. Herb.

Ses tiges sont ligneuses, arborescentes; les rameaux garnis de feuilles alternes, rapprochées, trois fois plus longues que leur pétiole, larges, ovales, échancrées en cœur à leur base, entières à leurs bords, acuminées & quelquefois à trois

lobes peu sensibles vers leur sommet, glabres à lents deux faces, marquées de sept nervures, dont l'intervalle est rempli par un réseau très-fin & serré; les stipules caduques.

Les fleurs n'ont pas pu être observées. Les fruits sont des capsules oblongues, assez larges, médiocrement reniformes, acuminées à leur sommet, rétrécies inférieurement en un court pédoncule, touffées & tomenteuses en dehors, revêtues intérieurement d'une membrane blanchâtre, parsemée de poils très-courts, roussâtres, plus abondants au point d'insertion des semences.

Cette plante croît au Sénégal, d'où elle a été rapportée par M. Adanson. *h* (V. f. in herb. Juss.)

8. STERCULIER fétide. *Sterculia fetida*. Linn.

Sterculia foliis digitatis, floribus laxè racemosis. Cavan. Dissert. bot. 5. pag. 284. tab. 141. — Lam. Illustr. Gener. tab. 736.

Sterculia foliis digitatis. Linn. Spec. Plant. vol. 4. pag. 191. n°. 2. — Flor. zeyl. 349. (Exclus. Rheed. Hort. Malab.) — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 874. n°. 8.

Clompanus major. Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 168. tab. 107.

Nux zeylanica, folio multifido, digitato; flore merdum olente. Pluk. Almag. pag. 266. Phytogr. tab. 208. fig. 3.

Cavalam à feuilles digitées. Sonnerat, Voyage aux Indes, vol. 2. pag. 234. tab. 132.

C'est un grand arbre dont le tronc est droit, rameux; les feuilles linéées à l'extrémité des rameaux, longuement pétiolées, amples, divisées en sept, huit ou neuf digitations lancéolées, très-entières, fortement acuminées à leur sommet, rétrécies en un pétiole court à leur base, glabres à leurs deux faces, munies à leur base de stipules courtes, larges, aiguës.

Les fleurs sont d'une odeur extrêmement fétide, disposées en une panicule lâche, terminale; les pédoncules communs axillaires, pendans, médiocrement ramifiés. Le calice est d'une seule pièce, un peu rougeâtre, pubescent en dehors, tomenteux en dedans, à cinq découpures profondes, lancéolées, très-étroites, recourbées à leur sommet, du centre desquelles s'élève un pédicelle assez long, rougeâtre, pubescent, plus court que le calice; il n'a point de corolle; à l'extrémité du pédicelle un tube uccolé ou campanulé, court, terminé par cinq pointes tridentées, supporte, au sommet de chaque dent, une étamine dont le filament est très-court, muni d'une anathère ovale, comprimée, versatile, à deux lobes. L'ovaire est globuleux, situé au fond du tube, tomenteux, à cinq sillons; le style velu & re-

courbé; le stigmate comprimé, en tête de clou; les capsules longues de trois pouces, ovales, reniformes, acuminées à leur sommet; les semences noires, ovales.

Cette plante croît dans les Indes, au Malabar & à l'île d'Amboine. *h* (V. f. in herb. Lam.)

Les semences, dépouillées de l'écorce noire qui les enveloppe, sont assez bonnes à manger, d'après l'observation de Rumphé; elles sont si grasses, qu'elles fournissent une assez grande quantité d'huile.

9. STERCULIER à feuilles de platane. *Sterculia platensis*. Cavan.

Sterculia foliis palmatis, paniculis terminalibus, ramosis, aphyllis. Cavan. Dissert. bot. 3. pag. 288. tab. 145. & Dissert. 6. pag. 352.

Sterculia foliis palmatis-quinquelobis, calicibus rotato-reflexis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 873. n°. 7.

Sterculia hermaphrodita, foliis cordatis, lobatis; floribus paniculatis. Linn. f. Suppl. pag. 423. — Vahl, Symbol. t. pag. 80.

Firmiana. Marfil. in Act. Academ. Patav. 1. pag. 106. tab. 1, 2.

Culhamia. Forsk. Flor. ægypt.-atab. pag. 96.

Hibiscus (simplex), foliis cordatis, trilobis, repandis, integerrimis. Linn. Spec. Plant. pag. 977.

Outom-chu. Lecomte, Mém. de la Chine, vol. 1. pag. 441. Icon.

Outong-chu. Duhal. Chine 2. pag. 149. Icon.

Arbre fort élevé, dont le tronc est épais, les branches revêtues d'une écorce glabre, d'un brun-obscur; les rameaux garnis vers leur extrémité de grandes feuilles alternes, longuement pétiolées, très-rapprochées, entières, échancrées en cœur à leur base, à trois ou cinq lobes à leur contour, très-glabres, traversées par cinq nervures; les lobes un peu arrondis, obtus; les pétioles glabres, cylindriques, renflés à leurs deux extrémités.

Les fleurs forment une panicule ample; les rameaux durs, presque ligneux, un peu pulvérulens; les pédoncules partiels longs d'environ un pouce, munis à leur base d'une bractée lancéolée; le calice de la grandeur de celui du *Sterculia fetida* ou un peu plus petit, glabre, jaunâtre en dehors, un peu blanchâtre en dedans, à cinq découpures en roue, un peu réfléchies en dehors; le tube intérieur plus court que le calice, supportant des anthers ovales; l'ovaire anguleux, blanchâtre, soutenu par un pédoncule filiforme, vert, très-glabre; le style blanc, filiforme; le stigmate capité & lobé; cinq capsules oblongues, acuminées,

ouvertes, velues; les semences noires, glabres, ovales, oblongues.

Cette plante croît à la Chine, dans les Indes, au Japon & dans l'Arabie. *H*

10. STERCULIER à grandes feuilles. *Sterculia macrophylla*. Venten.

Sterculia foliis cordato-subrotundis, subius tomentosis; capsulis ovalis, intus glaberrimis, dispermis. Venten. Hort. Malmaif. pag. 92.

On distingue cette espèce à ses grandes feuilles alternes, d'environ huit pouces de large, pétioles, arrondies ou un peu ovales, échanquées en cœur à leur base, entières, un peu ondulées à leurs bords, épaisses, un peu coriaces, glabres & d'un vert-foncé en dessus, rousses ou blanchâtres & tomenteuses en dessous, à nervures assez fortes, latérales, ramifiées; les pétioles cylindriques, droits, striés, renflés à leur base.

Les fleurs sont terminales, en grappes médiocrement rameuses. Les fruits sont composés de capsules pédicellées, ovales, assez fortes, rouscées, ridées, obuses: elles paroissent ne renfermer que deux semences d'un brun-noirâtre. Je n'ai point vu les fleurs.

Cette espèce croît dans les Indes orientales. (*V. f. in herb. Juss.*)

11. STERCULIER brûlant. *Sterculia urens*. Roxb.

Sterculia foliis quinquelobis, lobis acuminatis, calicibus campanulatis; capsulis ovalis, hispidis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 873. n°. 6.

Sterculia urens. Roxb. Corom. vol. 1. pag. 25. tab. 24.

Son tronc est droit, sa cime large, étalée; ses rameaux garnis à leur extrémité de feuilles un peu pubescentes, alternes, pétioles, très-amples, échanquées en cœur à leur base, divisées à leur contour en cinq grands lobes anguleux, très-aigus; les pétioles presque aussi longs que les feuilles, glabres, cylindriques.

Les fleurs sont hermaphrodites; elles forment une ample panicle terminale, étalée, à trois principales divisions, très-rameuses, couvertes d'une substance farineuse ou un peu glutineuse; les pédoncules propres très-courts, à plusieurs fleurs sessiles ou pédicellées; munies de bractées étroites, linéaires. Les calices sont tubulés, un peu campanulés, à cinq découpures courtes, ovales, aiguës; les étamines au nombre de dix, sessiles, situées sur les dents du tube alternativement plus courtes; l'ovaire pédonculé, ovale; le style épais, cylindrique; le stigmate presque plane, à cinq lobes courts; les capsules ovales, verdâtres, un peu aiguës, velues en dehors, renfermant trois à quatre semences ovales.

Cette plante croît sur les montagnes aux Indes orientales. *H*

12. STERCULIER coloré. *Sterculia colorata*. Roxb.

Sterculia foliis quinquelobis; lobis acuminatis; calicibus cylindraceo-clavatis; capsulis oblongis, glabris, coloratis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 873. n°. 5.

Sterculia colorata. Roxb. Cotomand. vol. 1. pag. 26. tab. 25.

Elle se rapproche beaucoup du *Sterculia urens* par la forme de ses feuilles; mais elle en diffère tant par la disposition que par la forme de ses fleurs.

Son tronc, assez élevé, se divise en branches nombreuses, très-irrégulières, étalées, garnies de feuilles longuement pétioles, alternes, un peu pubescentes, très-larges, en cœur à leur base, divisée en cinq lobes anguleux, aiguës; les pétioles droits, cylindriques, plus longs que les feuilles, munis à leur base de deux stipules fort petites, lancéolées, aiguës.

Ses fleurs sont nombreuses, disposées en panicules serrées, terminales, presque en épi, dont les ramifications sont courtes, alternes, d'un rouge-vif de corail, couvertes de poils étoilés, également rouges. Les calices, presque sessiles, sont oblongs, tubulés, renflés vers leur sommet en tête de clou, d'un rouge-vif, à cinq petites dents courtes, velues; les étamines presque sessiles; l'ovaire pédonculé, à cinq filons profonds, à cinq styles en stigmates recourbés; les capsules grandes, oblongues, glabres, d'une belle couleur rouge, pédicellées & coupées à leur base, obtuses à leur sommet, pendantes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, sur les montagnes. *H*

13. STERCULIER à longues feuilles. *Sterculia longifolia*. Vent.

Sterculia foliis ovato-oblongis, glabris; laciniiis calicinis erectis, intus hispidis. Vent. Hort. Malmaif. pag. 92.

Cette espèce, à dans la forme de ses feuilles, des rapports avec le *Sterculia rubiginosa*, mais elles sont parfaitement glabres à leurs deux faces; les rameaux sont alternes, cylindriques, droits, feuillés vers leur sommet, ridés, de couleur cendrée, très-glabres, garnis de feuilles alternes, pétioles, lancéolées, allongées, membraneuses, très-entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, vertes & glabres à leurs deux faces, longues de six à huit pouces, larges au moins de deux, souvent un peu réticulées à leur base, traversées par des

veines

nervures blanchâtres, saillantes, & par des veines fines, lâchement réticulées; les pétioles glabres, étroits, longs d'un pouce.

Les fleurs sont assez petites, disposées en une panicule terminale, étalée; les ramifications glabres, courtes, presque filiformes. Le calice est campanule, légèrement pubescent, court, divisé à sa partie supérieure en cinq ou six découpures droites, étroites, linéaires, un peu obtuses, velues & blanchâtres intérieurement. Les fruits ne me sont pas connus.

Cette espèce croît aux Indes orientales. *Th* (*P. f. in herb. Juss.*)

14. STERCULIER à grandes fleurs. *Sterculia grandiflora*. Vent.

Sterculia foliis ovatis, acuminatis, glabris; laciniiis calicinis patentibus; urculo subfiliis; stylis quinque reflexis. Venten. Hort. Malmaison. p. 92.

On pourroit douter si cette espèce appartient réellement à ce genre à cause de ses cinq styles qui surmontent l'ovaire; cependant il seroit possible, comme l'observe M. Ventenat, qu'ils fussent les stigmates d'un style qui ne seroit pas encore développé.

Cet arbre a des rameaux cylindriques, très-glabres, luisans, d'un brun-foncé, munis à leur sommet de feuilles alternes, pétioles, grandes, épaisses, coriaces, ovales, entières à leurs bords, longuement acuminées à leur sommet, luisantes, glabres à leurs deux faces, à nervures fortes, saillantes, avec des veines assez grosses, réticulées; les pétioles épais, longs d'environ deux pouces; les feuilles longues de six à huit pouces & plus, larges au moins de quatre.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, axillaire, à rameaux nombreux, étalés, alternes ou opposés, presque dichotomes, épais, comprimés, très-glabres, presqu'en cime; le calice grand, à cinq découpures très-ouvertes, glabres, lancéolées, colorées, le tube de l'ovaire presque sessile, surmonté de cinq styles réfléchis, ou peut-être de cinq stigmates à style court ou presque sessile.

Cette plante croît à l'île de France, d'où elle a été rapportée par Commerson. *Th* (*P. f. in herb. Juss.*)

15. STERCULIER acuminé. *Sterculia acuminata*. Palif. Beauv.

Sterculia floribus axillaribus; calice sexfido; laciniiis aqualibus; coloratis; capsulis monospermis; foliis integris, oblongis, acuminatis & longe petiolatis. Palif. de Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, pag. 40. tab. 14.

Botanique. Tome VII.

Cola. C. Bauh. Pin. 307. — J. Bauh. Hist. t. pag. 210.

Kola ou *Cola*. Lam. Dict. Encycl.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Sterculia longifolia*; mais la comparaison que j'ai faite de ces deux plantes vues sèches, la première dans l'herbier de M. de Jussieu, la seconde dans celui de M. Palifot de Beauvois, m'a donné la certitude qu'elles étoient bien distinctes. Celle dont il est ici question a ses feuilles bien plus lâchement veinées, ses fleurs plus grandes, les divisions du calice constamment au nombre de six, glabres, ovales, élargies, aiguës, outre les autres caractères mentionnés par M. Palifot de Beauvois.

C'est un arbre infiniment intéressant, & dont les fruits étoient connus depuis long-temps sous le nom de *cola*, mais on ignoroit à quel arbre ils appartenoient: nous en devons l'intéressante découverte à M. Palifot de Beauvois, qui, en rectifiant les erreurs des Anciens sur l'usage de ces fruits, nous a fourni en même temps des détails importants sur leur emploi actuel chez les Nègres de l'Afrique: je les présenterai ici après que j'aurai ajouté les observations de ce savant auteur sur les caractères particuliers à cette espèce.

Cet arbre est de moyenne grandeur: ses feuilles sont simples, alternes, oblongues, entières, acuminées; les fleurs axillaires: elles offrent un caractère très-particulier, une disparité qui se trouve rarement parmi les plantes d'un même genre & d'une même famille. Le nombre des divisions du calice est ordinairement égal, double, triple ou quadruple de celui des autres organes de la fleur; mais dans le *Sterculia acuminata* le calice porte six divisions lorsque les anthères, au nombre de dix ou de vingt, forment le double ou le quadruple de cinq, & que les capsules sont encore au nombre de cinq; les anthères au nombre de vingt, sessiles, simples, sur un seul rang, ou dix anthères didymes, placées circulairement en un double rang, sur un godet à cinq ou dix dents à son sommet; cinq ovaires sessiles, ovales, portés sur le godet, & souvent sujets à avorter; point de style; cinq stigmates simples, renversés, aigus; cinq capsules ovales, reniformes, à une seule loge, à une seule semence, s'ouvrant par la suture intérieure; les semences sont grandes, charnues, attachées à la suture des capsules, d'un rouge-tendre, tirant un peu sur le violet; les calices de même couleur.

Ces fruits se nomment dans le pays, *kola* ou *cola* (dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage, d'après les Bauhins & l'*Histoire générale des Voyages*). « Il n'y a pas de doute, dit M. Palifot de Beauvois, que le *Sterculia acuminata*, dont le fruit & les amandes ressemblent à ceux du *kola* dans la

description des anciens voyageurs & botanistes, qui croit à Oware, où il porte aussi le nom de *kola*, & dont les propriétés sont à peu près les mêmes, ne soit le *cola* ou *kola*, ne soit mentionné dans les ouvrages des deux Bauhins; mais il faut rejeter le merveilleux qu'on lui a attribué.

« J'ignore si à Sierra-Leona ce fruit a été & s'il est encore aussi précieux que le prétend l'auteur de *l'Histoire des Voyages*; j'ignore si, dans ce pays, il sert uniquement de monnaie, & si les Nègres, qui partout ailleurs ne vendent leurs esclaves que pour des marchandises européennes, dont ils se sont fait un objet de première nécessité, les prisent assez peu à Sierra-Leona, pour changer une femme contre cinquante noix de *cola* (ainsi qu'il est dit dans *l'Histoire des Voyages*); enfin j'ignore si, dans cette partie de l'Afrique, les *cauris* (petit coquillage de la famille des *cypræa*) ne sont pas, comme dans tout le reste, la seule petite monnaie courante; mais je suis assuré qu'à Oware & à Benin le *cola*, élimé en raison de la propriété qu'il a de faire trouver bonne l'eau la plus commune après qu'on a mâché ce fruit, n'est ni aussi précieux ni aussi recherché qu'on a voulu le faire croire.

« Les Nègres d'Oware mangent ce fruit avec une sorte de délices avant leur repas, non pas à cause de son bon goût, puisqu'il laisse dans la bouche une sorte d'âpreté acide, mais à raison de la propriété singulière qu'il a de faire trouver bon tout ce qu'on mange après en avoir mâché. C'est surtout sur les différences liquides, & principalement sur l'eau, que cet effet se manifeste sensiblement. Si avant d'en boire on a mâché du *cola*, elle acquiert une saveur des plus agréables. Pour vérifier ce fait j'ai souvent bu de l'eau saumâtre après avoir mâché du *cola*; elle m'a toujours paru bonne & agréable à boire; mais cet effet ne dure qu'autant que l'intérieur de la bouche est empreint de cette âpreté qu'y laisse le *cola*.

« Les naturels ne mâchent pas, comme on l'a dit, la même noix alternativement; elle n'est ni assez dure ni assez précieuse. Le cas qu'ils en font, est bien éloigné de celui que suppose l'auteur des *Histoires des Voyages*. J'en ai échangé plusieurs fois vingt à trente noix pour une poignée de *cauris*, dont deux ou trois tonnes pleines n'auraient pas payé la femme la moins parfaite. Je ne sais pas comment se faisoit autrefois le commerce des Noirs à Sierra-Leona; mais aujourd'hui il ne s'opère, dans toute l'Afrique, qu'en échange de marchandises européennes. encore faut-il qu'un capitaine soit assorti de toutes celles qu'on est en usage d'y porter. Un capitaine qui manqueroit d'une seule de ces marchandises, pourroit faire une fausse traite & un voyage très-onéreux. Il est donc évident que l'on a beaucoup exagéré les propriétés & la grande cherté du *cola*. »

Cette plante croit en Afrique, dans le royaume d'Oware & de Benin. h (V. f.)

16. STERCULIER hétérophylle. *Sterculia heterophylla*. Palif. Beauv.

Sterculia foliis amplis, trilobatis simplicibusque, longè petiolatis, alternis, irregulariter dentatis; floribus paniculatis, terminalibus.

Sterculia heterophylla. Pal. Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 7^e. liv. tab. 40.

Cet arbre, d'après les observations de M. Palifot de Beauvins, est un peu plus élevé que le *Sterculia acuminata*; il en diffère par les divisions de son calice, au nombre de cinq seulement. Ses longues & larges feuilles lui donnent un beau port: il est remarquable surtout par ces mêmes feuilles, tantôt simples, tantôt trilobées, dont le contour est quelquefois entier, quelquefois sinué, & d'autres fois fortement denté. Les anthères ne ressemblent point à celles du *Sterculia acuminata*; elles sont de même placées au dessous de l'ovaire, & au nombre de vingt, mais allongées & sur une même ligne. Je n'ai pas vu le fruit; mais l'ovaire est sessile comme dans le *Sterculia acuminata*, caractère qui sembleroit devoir séparer ces deux espèces de celles dont l'ovaire est pedonculé. (Pal. Beauv.)

Cet arbre croit au royaume d'Oware, dans l'intérieur des terres. h (V. f. in herb. Pal. Beauv.)

17. STERCULIER luisant. *Sterculia nitida*. Vent.

Sterculia foliis lanceolato-oblongis, acuminatis; lacinis calicinis patentibus, ureole subsessili. Vent. Hort. Malmair. pag. 92.

Je présume, dit M. Ventenat, que cette plante, dont Michaux m'avoit envoyé de beaux exemplaires, est dioïque, puisque je n'ai trouvé aucune apparence d'ovaire dans les fleurs que j'ai analysées. Seroit-elle congénère des *Sterculia*? Appartiendrait-elle à quelque autre genre de la même famille? Ses feuilles sont pétiolées, alternes, lancéolées, oblongues, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet; les fleurs paniculées, situées à l'extrémité des rameaux. Le calice se divise en cinq découpures étalées; l'ovaire, ainsi que l'appendice, tubulé, presque sessile.

Cette espèce est cultivée à Madagascar, à l'Île Maurice. h

STÉRÉOXYLONE. *Stereoxylon*, Ruiz & Pav. *Efcalonia*, Smith. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des onigres, qui a des rapports avec les *hackea*, & qui comprend des arbres ou arbruttes exotiques à l'Europe, la plupart résineux, dont les feuilles sont alternes, entières; les fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq dents; cinq pétales; cinq étamines; un style; un stigmate en tête, comprimé; une capsule à deux loges, couronnée par le calice; s'ouvrant à sa base en deux ou quatre parties; des semences fort petites.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, à cinq découpures supérieures, ovales, aiguës.

2°. Une corolle à cinq pétales lingués, roulés à leur sommet.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont droits, subulés, presque de la longueur de la corolle, situés entre les pétales, opposés aux divisions du calice, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire ovale, tronqué, surmonté d'un style droit, cylindrique, persistant, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate presque en rondache, échancré, presque à deux lobes.

Le fruit est une capsule ovale, tronquée, couronnée par le calice, surmontée d'un style persistant, à deux loges, s'ouvrant à sa base par deux ou quatre fentes, & dont la cloison est interrompue. Elle renferme des semences nombreuses, fort petites, oblongues, striées, attachées des deux côtés de la cloison.

ESPÈCES.

1. STÉRÉOXYLON étalée. *Stereoxylon patens*. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis obovatis, venosis, denticulato-glandulosis; pedunculis unifloris, peralis spatulatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 13. Icon. 234. fig. B.

Escallonia (myrtilloides), foliis serrulatis, mucronatis, subius venosis. Smith, Plant. Icon. Fasc. 2. pag. 30. Icon. 30. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1149. n°. 1.

Escallonia myrtilloides. Linn. f. Suppl. p. 156.

Vulgairement tasta au Pérou.

Il a déjà été question de cette espèce sous le nom d'*Escallonia myrtilloides*. (Voyez ce mot.) C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur d'environ vingt ou vingt-quatre pieds, très rameux, dont le tronc est droit, le bois, ainsi que l'écorce intérieure, de couleur purpurine-claire. Ses rameaux sont très-étalés, presque anguleux, divisés en d'autres rameaux alternes, redressés, rudes, très-résineux, garnis, à leur extrémité supérieure, de feuilles épaisses, très-serrées, médiocrement

pétiolées, en ovale renversé, veinées, glanduleuses, denticulées à leur contour, obtuses à leur sommet, surmontées d'une très-petite pointe, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, rétrécies & réfléchies à leurs bords vers leur base, soutenues par des pétioles canaliculés, glanduleux & denticulés de chaque côté.

Les fleurs sont terminales, solitaires, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, penchés, munis vers leur milieu de deux feuilles, chargés de points glanduleux. Le calice est campanulé, ouvert, à cinq découpures aiguës, finement denticulées. La corolle est blanche; les pétales spatulés, rapprochés en forme de pot, recourbés & verdâtres à leur sommet; les filaments des étamines arqués; les anthères inclinées. L'ovaire est couronné par une saillie à dix angles; le style strié & persistant; le stigmate pété, & se divise en deux lobes sur le fruit, qui consiste en une capsule comprimée.

Cette plante croît au Pérou & à la Nouvelle-Grenade. (Description, ex Ruiz & Pav.)

Son bois est très-dur, très-propre pour différents outils, pour des manches de haches, &c. Les sommets des rameaux, broyés & appliqués sur les contusions, passent pour un très-bon remède. Les feuilles ont une saveur amère.

2. STÉRÉOXYLON dentée. *Stereoxylon serrata*.

Stereoxylon foliis serratis, subulosis, subius avenis. Smith.

Escallonia serrata. Smith, Plant. Icon. Fasc. 2. pag. 31. tab. 31. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1149. n°. 2.

Arbrisseau peu élevé, très-rameux, glabre, dont le port approche de celui du *vaccinium myrtillus*. Ses rameaux sont alternes, anguleux, un peu flexueux, revêtus d'une écorce pâle & glabre; leurs ramifications vertes, redressées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, en ovale renversé, obtuses à leur sommet & même émoussées, avec une petite pointe, dentées en scie à leurs bords, lisses à leurs deux faces, un peu veinées en dessus, plus pâles & sans nervures en dessous, rétrécies à leur base en un pétiole court, sans stipules.

Les fleurs sont terminales, solitaires, très-agréables, d'un blanc de lait, soutenues par des pédoncules courts, cylindriques, glabres, un peu courbés, épaissis vers leur sommet. Le calice est divisé en cinq découpures deltoides, aiguës, glabres, un peu charnues, pâles en dessous, colorées en dessus, relevées en carène. Les pétales, au nombre de cinq, sont étalés, trois fois plus longs que le calice, en forme de lingue, obtus; les filaments des étamines ascendants, opposés aux divisions du calice, une fois plus courts que les pé-

tales, élargis à leur base; les anthères arrondies, adnées aux filaments, échanquées, tombantes, à deux loges. L'ovaire est arrondi, très-courte; le stigmate en tête, comprimé. Le fruit est une petite baie arrondie, environnée par le calice, operculée, surmontée d'un style persistant, remplie d'une pulpe à deux loges, renfermant des semences fort petites.

Cette plante a été recueillie par Commerçon, au détroit de Magellan. H

3. STÉRÉOXYLONE en corymbe. *Stereoxylon corymbosum*. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis oblongis, serrulatis; pedunculis unifloris, calicibus denticulatis, petalis oblongis. Ruiz & Pav. vol. 3. pag. 14. tab. 234. fig. A.

Vulgairement *siuba* au Pérou.

Arbre d'un aspect peu élégant, qui ressemble au myrte, dont le tronc est droit, très-rameux, haut d'environ vingt pieds & plus, & dont le bois & l'intérieur de l'écorce sont blanchâtres. Les branches sont nombreuses, étalées horizontalement, formant par leur ensemble une sorte de corymbe, garnies de rameaux ascendants, d'un brun-rougeâtre, chargés de petites glandes résineuses. Les feuilles sont presque opposées, pétioles, nombreuses, rapprochées, oblongues, dentées en scie à leur contour, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, sans nervures apparentes, supportées par des pétioles canaliculés, glanduleux & denticulés à leurs bords.

Les fleurs sont solitaires, terminales, soutenues par des pédoncules courts, droits, uniflores, munis à leur partie supérieure, presque sous le calice, d'une foliole lancéolée. Le calice est campanulé, à cinq découpures droites, denticulées, aiguës. La corolle est blanche; les pétales oblongs, ouverts, réfléchis. Les étamines sont droites & les anthères inclinées. L'ovaire est surmonté d'un style persistant, strié, terminé par un stigmate pelté, perforé dans son milieu. La capsule est comprimée.

Cette plante croît au Pérou, sur les collines élevées, froides & arrosées par des pluies fréquentes; elle fleurit dans les mois d'août & de septembre. H (*Descript.* ex Ruiz & Pav.)

Son bois est très-dur, brûle mal, & ne donne presque que de la fumée. Ses feuilles ont une saveur amère.

4. STÉRÉOXYLONE effilée. *Stereoxylon virgatum*. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis obovato-spatulatis, serrulatis; pedunculis unifloris, calicibus denticulatis, petalis obovatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 14. tab. 235. fig. B.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, dont les tiges sont très-rameuses à leur base, droites, cylindriques; les rameaux élancés, alongés, divisés en d'autres très-nombreux, rapprochés, courts, presque épineux à leur sommet après la chute des feuilles & lorsqu'ils sont vieux, feuillés dans toute leur longueur, excepté à leur base; de couleur cendrée, garnis de feuilles très-serrées, presque sessiles, éparfes, ovales, un peu spatulées, rétrécies en coin à leur base, dentées en scie à leur contour, acuminées à leur sommet, sans nervures, glabres à leurs deux faces, petites, luisantes en dessus.

Les fleurs sont solitaires, axillaires & terminales, supportées par des pédoncules très-courts, droits, uniflores, munis d'une foliole à la base du calice. Celui-ci est campanulé, ouvert, à cinq découpures denticulées, aiguës. La corolle est blanche, à cinq pétales ouverts, ovales, un peu arrondis, veines. Les filaments sont droits; les anthères inclinées; le style persistant; le stigmate pelté, à deux lobes. La capsule est ovale, tronquée, s'ouvrant en deux à sa base.

Cette plante croît au Pérou, sur les montagnes & dans les forêts humides; elle fleurit dans les mois de novembre & de décembre. H (*Descript.* ex Ruiz & Pav.)

5. STÉRÉOXYLONE résineuse. *Stereoxylon resinifolium*.

Stereoxylon foliis oblongo-ovatis, serrulatis; pedunculis racemosis, petalis obovato-oblongis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 14. tab. 235. fig. A.

Vulgairement *chacas* & *chachacoma* au Pérou.

Cet arbrisseau a un tronc droit, très-dur, haut de quinze à dix-huit pieds, d'une couleur légèrement cendrée, ainsi que l'intérieur de l'écorce, très-rameux; les branches étalées, cylindriques, un peu pendantes; les rameaux anguleux, de couleur purpurine, résineux, chargés de glandes subulées & caduques, & de feuilles sessiles, éparfes, ovales-oblongues ou lancéolées, glabres à leurs deux faces, veinées, glauques en dessous, luisantes en dessus, dentées en scie à leurs bords, rétrécies à leur base, terminées par une petite pointe.

Les fleurs sont odorantes, disposées en grappes terminales, feuillées, rameuses, chargées de glandes subulées. Les pédoncules partiels sont courts, garnis de deux folioles subulées, opposées, & d'une autre plus petite, appliquée contre le calice. Celui-ci est campanulé, à cinq dents très-entières. La corolle est blanche; les pétales veinés, ovales-oblongs, recourbés à leur sommet; les étamines droites; les anthères inclinées; l'o-

vaire surmonté d'un style perflant & d'un stigmate pelté, perforé, à deux lobes.

Cet arbrisseau croît au Pérou, sur les collines & les rochers exposés au nord ; il fleurit dans les mois de janvier, février & mars. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

Les sommités des rameaux très-résineux sont appliquées, broyées, sur les contusions comme toniques & tortifiantes : la résine répand une odeur très-agréable. Le bois, à raison de sa grande dureté, peut être employé à la fabrication de plusieurs instrumens.

6. STÉRÉOXYLONE rouge. *Stereoxylon rubrum*. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis obovato-oblongis, acuminatis, serratis; pedunculis 2-7 floris, petalis spatulatis. Ruiz & Pavon, Flor. peruv. vol. 3. pag. 15. tab. 236. fig. B.

Vulgairement nipa au Chili.

Cette espèce est un arbrisseau dont les tiges sont droites, cylindriques, très-rameuses, hautes de dix à douze pieds, & dont l'écorce se détache du tronc. Les rameaux sont, surtout dans leur jeunesse, velus, visqueux, chargés de glandes subulées, garnis de feuilles médiocrement pétioolées, alternes, ovales-oblongues, rétrécies à leurs deux extrémités, dentées en scie, à double & triple dentelure obtuse, roulées à leurs bords vers leur base, chargées en dessous de points visqueux & résineux, veinées, luisantes en dessus, & pubescentes sur leur principale nervure.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales & axillaires, composées de deux, trois ou sept fleurs, dont les pédoncules sont rougeâtres, velus, glanduleux, munis de folioles lancéolées & denticulées. Le calice est campanulé, glanduleux, à cinq découpures ouvertes, denticulées, aiguës. La corolle est rouge; les pétales spatulés, droits, rapprochés en tube, ouverts & réfléchis à leur sommet ; l'ovaire couronné par un appendice conique, à dix angles, à dix dents, rougeâtre & engainant la base du style. Les filamens sont droits; les anthères oblongues, inclinées; la capsule ovale, presque urcéolée, s'ouvrant en deux par sa base.

Cette plante croît dans les montagnes du Chili, où elle fleurit au mois de février & de mars. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

7. STÉRÉOXYLONE à feuilles roulées. *Stereoxylon revolutum*. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis obovatis, denticulatis, revolutis; racemis thyrsoideis, petalis linearis-spatulatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 15. tab. 236. fig. A.

Vulgairement lun, liun au Chili.

Son tronc est droit, haut de quinze à dix-huit pieds, divisé en rameaux droits, anguleux, fragiles, très-velus, nus dans leur vieillesse, garnis dans leur jeunesse de feuilles éparfes, médiocrement pétioolées, ovales, rétrécies à leur base, obtuses, acuminées à leur sommet, denticulées & roulées à leurs bords, pubescentes à leurs deux faces, veinées en dessous.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, rameuses, presque en thyse, droites, dont les pédoncules, tant communs que partiels, sont munis d'une petite foliole linéaire, & deux autres de même forme sous le calice. Celui-ci est campanulé, à cinq découpures droites & subulées. La corolle est blanche; les pétales droits, linéaires-spatulés, rapprochés en tube, ouverts à leur partie supérieure. Les filamens sont droits; les anthères sublongues; l'ovaire ovale, couronné par un appendice glanduleux, à cinq dents, qui engaine la base du style. Le stigmate est pelté, à deux lobes peu sensibles, ouvert dans le centre. Le fruit est une capsule ovale, à deux loges, s'ouvrant à sa base par deux fentes.

Cette plante croît au Chili, dans les lieux ombragés, proche les sources, aux environs de la ville de la Concepcion; elle fleurit depuis le mois de janvier jusque dans celui de mai. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

Ses feuilles sont d'une saveur amère.

8. STÉRÉOXYLONE pulvérulente. *Stereoxylon pulverulentum*. Ruiz & Pav.

Stereoxylon foliis oblongo-ellipticis, serrulatis; pedunculis racemoso-spicatis, petalis obovatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 15. tab. 237. fig. A.

Vulgairement mardogno au Chili.

Cette espèce a une tige ligneuse, haute de dix à douze pieds, droite, cylindrique, divisée en rameaux droits, pubescens, anguleux dans leur jeunesse, pulvérulens, garnis de feuilles éparfes, médiocrement pétioolées, ovales-oblongues, elliptiques, légèrement dentées en scie à leurs bords, très-obtusés à leurs deux extrémités, un peu mucronées à leur sommet, veinées, roulées à leur contour, pubescentes & pulvérulentes à leurs deux faces, chargées de résine dans leur jeunesse.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, droites, presque en épi, allongées, pubescentes, résineuses, pulvérulentes; les pédoncules partiels munis d'une foliole subulée. Le calice est divisé en cinq dents aiguës. La corolle est composée de cinq pétales en ovale renversé, quelquefois presque linéaires, courts, veinés ou vides. Les filamens sont droits; les anthères inclinées; l'ovaire

ovale, couronné par un disque à peine denticulé; le style persistant; le stigmate à deux lobes. Le fruit est une capsule à deux loges, s'ouvrant à sa base par une double fente.

Cet arbrisseau croît au Chili, dans les forêts, aux environs de la ville de la Concepcion. Il fleurit depuis le mois de septembre jusqu'en décembre. *h* (Description. ex Ruiz & Pav.)

Ses feuilles sont légèrement amères: la poussière qui recouvre les rameaux & les branches est nuisible aux yeux.

9. STÉROXYLONE pendante. *Steroxylon pendulum*. Ruiz & Pav.

Steroxylon foliis lanceolatis, acutissimis, integris, obovatis ferratibusque; racomis pendulis, longissimis; petalis linearibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 16. tab. 237. fig. B.

Vulgairement *magna pumachileta* au Pérou.

C'est un grand arbre qui s'élève à la hauteur de quarante à cinquante pieds, dont le tronc se divise en rameaux cylindriques, droits, étalés, nus à leur partie inférieure, feuillés, anguleux & visqueux à leur partie supérieure; garnis de feuilles épaisses, pétiolées, pendantes, lancéolées, très-euilletées ou très-légèrement denticulées en scie, aiguës ou acuminées à leur sommet, très-veinées, visqueuses à leurs deux faces, luisantes en dessus, arrondies à leur base, traversées par une nervure canaliculée.

Les fleurs sont disposées en de très-longues grappes simples, terminales, solitaires, lâches, pendantes, visqueuses, résineuses, presque longues d'un pied. Les pédoncules partiels sont courts, grêles, un peu recourbés, munis d'une foliole imbriquée, très-petite à leur base, & de deux autres alternes. Le calice est campanulé, à cinq dents courtes. Les pétales sont droits, linéaires, réunis en un tube presque urcéolé, réfléchis à leur sommet, quatre fois plus longs que les calices, de couleur rouge, marqués à leurs bords d'une ligne jaune; l'intérieur du calice garni d'un bourrelet court & entier. Les étamines sont droites; les anthères penchées; l'ovaire presque rond; le style persistant; le stigmate pelté à la capsule arrondie, un peu comprimée, à deux loges.

Cet arbre croît dans les grandes forêts du Pérou. Il fleurit en août & en septembre. *h* (Description. ex Ruiz & Pav.)

Son bois est rouge, très-dur, très propre à la fabrication de divers outils.

10. STÉROXYLONE paniculée. *Steroxylon paniculatum*. Ruiz & Pav.

Steroxylon foliis lanceolatis - oblongis, obsoletis

ferrulatis; pedunculis rucomoso-paniculatis, petalis obovatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. p. 16. n°. 9. tab. 38. fig. B.

Arbrisseau d'environ quinze pieds de haut, dont le tronc se divise en rameaux droits, anguleux & feuillés à leur partie supérieure, visqueux & résineux dans leur première jeunesse, garnis de feuilles épaisses, pétiolées, oblongues, lancéolées, médiocrement dentées en scie, visqueuses, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes latérales, axillaires & terminales, réunies en une panicule étalée, dont les pédoncules partiels sont munis de deux folioles subulées, & de deux autres alternes & plus petites vers le milieu de ces pédoncules. Le calice est campanulé, à cinq dents très-courtes. Les pétales sont ovales, veinés, ouverts & réfléchis. L'intérieur du calice est garni d'un rebord à peine sensible. Les étamines sont droites; les anthères inclinées. L'ovaire est arrondi; le style persistant; le stigmate pelté, ouvert, & se divisant en deux lobes. Le fruit est une capsule presque ronde, tronquée, à deux loges.

Cette plante croît dans les forêts du Pérou; elle fleurit en juillet, août & septembre. Son bois est très-dur. *h* (Description. ex Ruiz & Pav.)

11. STÉROXYLONE à feuilles cunéiformes. *Steroxylon cuneiformis*. Ruiz & Pav.

Steroxylon foliis cuneiformibus, ferrulatis; floribus corymbosis; petalis obovatis, obsoletis crenulatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 16. n°. 10. tab. 238. fig. A.

C'est un arbrisseau de la hauteur d'environ six à huit pieds, dont les tiges sont droites, cylindriques, d'un brun-noirâtre, divisées en rameaux étalés, rudes, garnis de feuilles très-rapprochées, sessiles, ovales, cunéiformes à leur base, légèrement dentées en scie à leur contour, très-veinées, un peu ridées, coriaces, obtuses, arrondies à leur sommet, blanchâtres à leur face inférieure.

Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux, velus, dont les pédoncules partiels sont courts, épars, munis de petites bractées ovales, aiguës. Le calice est en forme de coupe, à cinq dents fort petites. La corolle est blanche. Les pétales sont ovales, droits jusque vers leur milieu, rabattus en dehors à leur partie supérieure, médiocrement crenelées. Les anthères sont jaunes & inclinées; le stigmate en tête, tronqué, ombilicé, légèrement échancré. Le fruit est une capsule turbinée, tronquée, surmontée d'un style persistant.

Cet arbrisseau croît dans les hautes forêts des

Andes, au Pérou. Il fleurit en juin, juillet & septembre. *H* (Descript. ex Ruiz & Pav.)

STÉRIPHÉE RÉNIFORME. *Steripha reniformis*. Gærtner. de Fruët. & Sem. vol. 2. pag. 81. tab. 94. fig. 6.

Steripha reniformis. Bankf. Solander, Mff.

Cette plante, découverte par M. Solander, constitue un nouveau genre décrit par Gærtner, à fleurs dicotylédones, monopétales, qui paroît très-voisin de la famille des nerpruns, & qui offre dans sa fructification des caractères rapprochés de ceux des *schrebera*, & de ceux du *sibthorpia europæa* dans son port.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle infundibuliforme ; cinq étamines ; deux styles ; deux stigmates peltés ; deux capsules supérieures.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, d'une seule pièce, partagé en cinq découpures.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est cylindrique, plus court que le calice ; le limbe à cinq divisions oblongues, lancéolées, un peu obtuses.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont insérés sur le tube de la corolle, terminés par des anthères.....

4°. Deux ovaires supérieurs, plans, un peu convexes, surmontés de deux styles filiformes, terminés par autant de stigmates grands, en tête, peltés, concaves.

Le fruit consiste en deux capsules enveloppées par le calice, velues, membraneuses, médiocrement pélicellées, convexes en dehors, planes à leur côté intérieur, à une seule valve qui ne s'ouvre point, & qui renferme une seule semence presque globuleuse, noiâtre, ayant pour ombilic un point enfoncé.

L'embryon est presque de la grandeur de la semence, de couleur blanche, droit, plissé ; les cotylédons foliacés, très-minces, plissés en différens sens ; la radicle inférieure arrondie, presqu'en spirale.

C'est tout ce que Gærtner nous apprend de cette plante, qui croît dans les îles de la mer du Sud.

STÉRIS DE JAVA. *Steris javanica*. Linn.

Hydrolea (zeylanica), *inermis*, *foliis lanceola-*

sis, *glabris* ; *filiculis d'ignis*, *subracemosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1327. n°. 3.

Hydrolea (zeylanica), *caule inermi* ; *floribus subracemosis*, *foliis lanceolatis*. Vahl, Symbol. 2. pag. 46. — Lam. Illustr. Gener. tab. 184. fig. 2.

Nama (zeylanica), *caule erecto*, *glabro* ; *foliis linearibus*, *floribus racemosis*. Linn. Spec. Plant. pag. 327.

Nama. Amoen. Acad. vol. 1. pag. 393. — Flor. zeyl. n°. 117. tab. 2.

Steris javanica. Linn. Mant. 54.

Steris aquatica. Burm. Flor. ind. pag. 75. tab. 39. fig. 3.

Alfine veronica affinis, *gratiola folio*, *maderaspantana*. Pluk. Almag. pag. 22. tab. 130. fig. 2.

Tsien-vallet. Rheed, Malab. vol. 10. pag. 55. tab. 28.

Anagallis zeylanica, *aquatica* ; *foliis longis*, *alternis*. Herm. Zeyl. 36. — Burm. Zeyl. 19.

Cette plante doit être rapportée au genre *hydrolea*, dont elle a tous les caractères. Linné l'avoit regardée comme devant former un genre particulier, qu'il avoit établi sous le nom de *steris* ; mais il a été depuis reconnu que c'étoit la même plante que son *nama zeylanica*. Nous ne la mentionnons ici que parce qu'il n'en a point été question à l'article *COUTARDE* (*hydrolea*), & à la suite duquel elle doit être placée (sous le nom de *coutarde* de Ceilan (*hydrolea zeylanica*)). Voyez aussi l'article *NAMA*, vol. 4.

C'est une petite plante herbacée, dont les tiges sont droites, annuelles, hautes de six à huit pouces, lisses, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, en forme de lance, glabres à leurs deux faces, entières, rétrécies à leurs deux extrémités, médiocrement acuminées à leur sommet, veinées, supportées par des pétioles très-courts.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en grappes axillaires, droites, simples, pubescentes, à peu près de la longueur des feuilles. Ces fleurs sont alternes, distantes, pédicellées, munies à leur base d'une petite bractée pubescente, lancéolée, aiguë, de la longueur du pédicelle ; le calice petit, pubescent, à cinq folioles aiguës ; la corolle un peu plus grande que le calice, monopétale, en roue, à cinq lobes obtus ; cinq étamines renfermées dans le tube de la corolle ; deux styles ; une capsule à deux loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à l'île de Ceilan. O (*V. f.*)

STÉVENSIA à feuilles de buis. *Stevensia buxifolia*. Poit.

Stevensia foliis petiolatis, oblongis; floribus foliariis, axillaribus. (N.)

Stevensia buxifolia. Poiteau, Annal. du Muséum d'Hist. Nat. vol. 4. pag. 235. tab. 60.

Arbrisseau droit, rameux, haut de dix à douze pieds, d'un bois très-dur, revêtu d'une écorce cendrée & crevassee; les jeunes poudes enduites d'une résine visqueuse. Les feuilles sont opposées, pétioles, oblongues, aiguës à leurs deux extrémités, longues d'environ un pouce & demi, assez roides, glabres, luisantes en dessus, blanchâtres & réticulées en dessous, soutenues par des pétioles courts, réunis par une stipule entière, formant une petite gaine qui entoure la tige.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, blanches, odorantes, portées sur un pédoncule de la longueur du pétiole, munies à la base, immédiatement sous l'ovaire, d'une bractée caliciforme, à quatre divisions, dont deux opposées, courtes, obtuses & deux fois plus grandes, lancéolées, se changeant quelquefois en petites feuilles.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice entier, globuleux à sa base, divisé à son limbe en deux découpures lancéolées, cauques.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, légèrement foyeuse en dehors; le tube cylindrique, de la longueur des découpures calicinales, à peine renflé au sommet, terminé par un limbe à six ou sept divisions oblongues, obtuses, planes ou réfléchies en dehors.

3°. Six ou sept étamines; point de filaments; les anthères sessiles, oblongues, droites, bilobées, à deux loges, insérées vers le haut du tube de la corolle.

4°. Un ovaire globuleux, faisant corps avec la partie entière du calice, surmonté d'un style droit, de la longueur du tube de la corolle, terminé par un stigmate formé de deux lames ouvertes, très-vertes, ainsi que le style.

Le fruit est une capsule sphérique, de la grosseur d'un pois, faisant corps avec le calice, couronnée d'abord par ses deux divisions qui tombent ensuite, à deux loges, s'ouvrant par le haut en deux coques un peu ossifères, dont les rebords rentrants forment une cloison intérieure double, de sorte que chaque valve constitue sa loge propre. Ces valves se divisent encore depuis le haut jusqu'à vers la base, & alors la capsule paraît être partagée en quatre. Par cet écartement la portion du calice qui recouvre ces valves s'en détache, se divisant aussi en quatre & les laisse à nu.

Les semences sont nombreuses, menues, ovales

ou oblongues, un peu comprimées, jaunâtres, entourées d'une membrane élargie en forme d'une petite aile à la partie supérieure, & rétrécie en pointe à la base, par où elles sont attachées à un réceptacle hémisphérique, chagriné, appliqué contre le point de réunion des bords intérieurs des valves formant la cloison.

L'embryon est composé d'une radicule cylindrique, inférieure, surmonté de deux cotylédons oblongs, parallèles, & contenu dans un albumen ovale, médiocrement corné, & ayant la même direction que la semence.

Cet arbrisseau croît à Saint-Domingue, dans le département du nord, notamment sur le morne de la vigie du Cap-François. *h* (Description, ex Poit.)

Observations. Ce genre, de la famille des rubiacées, a été établi par M. Poiteau, qui l'a consacré au docteur Edouard Stevens, auquel plusieurs Français sont redevables de plusieurs services importants à Saint-Domingue, pendant son consulat dans cette île pour les États-Unis d'Amérique.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice dont le limbe est bispide, caduc; une corolle tubulée; six à sept divisions à son limbe; autant d'anthères sessiles; une capsule à deux loges, polyspermes, s'ouvrant à son sommet en quatre parties.

STEWARTIE. *Stewartia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des malvacées, qui a de grands rapports avec les *malachodendrum*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, les fleurs solitaires & fort grandes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq pétales; un seul style; un stigmate en tête, à cinq lobes; des étamines nombreuses, monadelphes à leur base; une capsule ligneuse, conique, à cinq valves; une ou deux semences dans chaque valve.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice simple, d'une seule pièce, divisé en cinq découpures ovales, concaves, persistantes.

2°. Une corolle à cinq pétales très-grands, égaux, étalés, en ovale renversé.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filaments sont disposés sur deux rangs; les intérieurs plus courts, portés sur un cylindre court qui les réunit à leur base; les extérieurs plus longs, surmontés par des anthères arrondies.

4°. Un

4°. Un ovaire velu, arrondi, formant d'un style droit, épais, terminé par un stigmate capité, à cinq lobes aigus, ouverts presque en étoile.

Le fruit est une capsule presque ligneuse, ovale-conique, à cinq valves épaisses, à cinq loges; chaque loge contient une ou deux semences ovales, un peu comprimées.

Observations. M. Cavanilles a cru devoir distinguer en deux genres des plantes que Linné avoit confondues en une seule espèce, sous le nom de *Stewartia malachodendron*; elles diffèrent entr'elles bien certainement, mais leur caractère, comme genre, est-il bien prononcé? Il paroît n'exister essentiellement que dans les styles, au nombre de cinq dans le *malachodendron*, tandis que les *Stewartia* n'en ont qu'un, ou peut-être cinq réunis en un seul formant de cinq stigmates; aussi plusieurs auteurs les ont réunis. M. Lamarck les a conservés d'après M. Cavanilles. (Voyez l'article MALACHODRE & les Illustrations.)

Ce genre a été consacré par Linné à Jean Stuart, comte de Bute, pair d'Ecosse, long-tems premier ministre en Angleterre, au commencement du règne de Georges III. Il aimoit beaucoup la botanique, & en a favorisé les progrès pendant son ministère.

E S P È C E.

STEWARTIE de Virginie. *Stewartia virginica*.

Stewartia foliis ovatis, acutis, serratis; floribus foliatis, albis; petalorum altero maculato. Cavan. Differt. bot. 5. pag. 362, tab. 158. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 593.

Stewartia (malachodendron), *floribus laceratis, subinis; calicibus ovatis, obtusis; styli coarctatis.* Lhérit. Stirp. vol. 1. pag. 153, tab. 73. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 840. n°. 1.

Stewartia virginica. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 43.

Stewartia malachodendron. Linn. Spec. Plant. pag. 982. (Exclusis pluribus synonymis.) — Ad. Upl. 1741. pag. 79. tab. 2. — Catesb. Carol. 3. p. 13. tab. 18. — Gronov. Virg. 101. — Duham. Arbr. vol. 2. p. 284. tab. 78. & edit. nov. vol. 1. p. 16.

Cette espèce avoit d'abord été confondue par Linné avec le *Stewartia malachodendron*, qui, non-seulement en est fort distinct, mais qui en a été même séparé comme genre, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

C'est un arbrisseau d'une hauteur médiocre, dont la tige est droite, revêtue d'une écorce griseâtre, crevassée, chargée de rameaux glabres, alternes, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, aigües, légèrement acuminées, d'un vert gai, glabres en dessous, pubes-

Botanique. Tome VII.

centes en dessus, minces, un peu molles, un peu ciliées & légèrement dentées en scie à leur contour; les supérieures presque entières; les pétioles courts & velus; les bourgeons également velus.

Les fleurs font latérales, axillaires, solitaires, quelquefois géminées, médiocrement pédonculées, alternes; les pédoncules courts, velus, épais, munis de deux bractées un peu au dessous du calice, petites, opposées, ovales, concaves, aigües, tomenteuses; le calice divisé en cinq découpures concaves, ovales, couvertes de poils courts, roussâtres, foyeux & luisans; la corolle grande, ouverte, de couleur blanche, à cinq pétales rachés quelquefois de rouge; les étamines violettes; un style plus court que les étamines; le stigmate à cinq lobes; une capsule velue, ligneuse, presque conique, à cinq loges, chaque loge renfermant une ou deux semences brunes, ovales oblongues, légèrement anguleuses.

Cet arbrisseau croît dans les lieux frais & ombragés, à la Caroline & dans la Virginie vers les côtes maritimes. M. Bosc m'en a communiqué des exemplaires. T. (V. f.)

STIGMATE. *Stigma*. Le stigmate est la partie supérieure du pistil. Il est placé ordinairement au sommet du style, rarement sur les côtés; & lorsque le style n'existe pas, il repose immédiatement sur l'ovaire; il prend alors le nom de *stigmate sessile*, comme les feuilles privées de pétiole & les fleurs dépourvues de pédoncule.

Le stigmate, dans l'état adulte, est humecté d'une liqueur plus ou moins visqueuse, très-sensible dans le lys de saint Jacques, *amaryllis formosissima*, où on le voit sous la forme d'un globule pendant ou d'une goutte qui paroît à chaque instant devoir être entraînée par son poids vers la terre, mais qui est pompée par le style aussitôt que la poussière fécondante s'y est agglutinée. Lorsque le pistil est parvenu à son développement complet, la surface du stigmate, qui est humectée, reçoit les globules lancés de l'anthère; ces globules s'entrouvent, le fluide spermatique en sort: ce qu'il y a de plus subtil dans ce fluide traverse les vaisseaux du style, pénètre jusqu'aux ovules, & leur donne réellement la vie, puisque leur existence doit être regardée comme un état d'incertitude dont ils ne peuvent sortir que par l'influence de la poussière fécondante.

Mais quelle est la nature de cette liqueur, qui humecte les stigmates au moment où la fécondation va s'opérer? Malpighi, qui ignoroit l'usage de cette liqueur, la regardoit comme thérébinthacée. Koelreuter n'a pas osé prononcer si elle étoit la liqueur femelle, ou si elle servoit simplement de véhicule à la liqueur mâle. Gärner a adopté cette dernière opinion, comme étant plus con-

Kkk

forme à la raison. Il est certain, dit-il, que cette liqueur est de nature huileuse & inflammable, comme celle des animaux; qu'elle se mêle très-promptement, & qu'elle se combine parfaitement avec le fluide spermatique échappé des globules des anthères; qu'elle disparoit au moment où la fécondation s'est opérée, & qu'alors les stigmates se dessèchent, & qu'on ne remarque plus aucun mouvement d'irritabilité dans les lames de ceux en qui ce phénomène se manifestoit auparavant avec beaucoup d'énergie. On doit conclure de ces observations, continue le même auteur, 1°. que la liqueur dont le stigmate est humecté, ne peut servir qu'à faciliter l'acte de la fécondation; 2°. que sa consistance onctueuse est très-propre à repousser les corps étrangers qui pourroient pénétrer dans le style par les pores du stigmate; 3°. que les stigmates desséchés ne peuvent concourir ni coopérer à la végétation; 4°. enfin, que le signe le plus certain de la maturité des fleurs est fourni par la présence de la liqueur qui transsude du stigmate.

Toutes les fleurs hermaphrodites ou femelles fertiles sont pourvues d'un stigmate. Cet organe est quelquefois simple & unique, comme dans la prime-vère, &c. Quelquefois il est biffé ou double, comme dans les composées, &c.; quelquefois même on en trouve quatre, comme dans le sébétier. Il est inutile d'observer que les fleurs qui ont plusieurs styles, comme dans le mille-peruis, ont également plusieurs stigmates.

Comme les stigmates, ou si l'on veut les styles qui leur servent de supports, répondent chacun à une loge de l'ovaire, il semble qu'on pourroit avancer que le nombre des loges d'un ovaire est égal à celui des styles dont il est surmonté. A la vérité, il arrive quelquefois qu'un fruit est divisé en deux ou plusieurs loges, quoique son ovaire n'ait été surmonté que d'un seul style; mais ne pourroit-il pas se faire qu'il eût existé plusieurs styles réunis si étroitement, qu'ils n'eussent paru en former qu'un seul?

Dans les fleurs dont l'ovaire simple est surmonté de plusieurs styles, & par conséquent de plusieurs stigmates, comme dans le mille-peruis, tous les styles & tous les stigmates ne produisent pas absolument nécessaires pour que les ovules soient fécondés. En effet, Koelreuter, ayant supprimé deux stigmates du mille-peruis ordinaire, arrosa ensuite celui qui restoit, avec le pollen de la fleur à laquelle il appartenoit; toutes les graines de cette plante furent également fécondées, quoique chaque stigmate parût conduire à une loge particulière de l'ovaire.

Ne peut-on pas conclure de cette expérience, 1°. que, quoique la fécondation s'opère plus sûrement lorsque tous les styles dont une fleur est pourvue, subsistent, néanmoins tous les ovules contenus dans l'ovaire peuvent être fécondés

quand même on retrancheroit une partie des styles? 2°. que les cloisons qui forment les loges de l'ovaire, sont d'une texture si mince & si délicate, qu'elles sont perméables à la vapeur vivifiante qui jaillit des globules que contient l'anthère? (Ventenat, *Régne végétal*.)

Le stigmate varie dans sa situation, dans sa direction, dans sa forme, dans sa surface & dans sa durée.

1°. Considéré quant à sa situation, le stigmate termine presque toujours le style. A la vérité, lorsqu'il y a plusieurs stigmates, ils sont par fois disposés symétriquement sur les côtés du style, comme dans quelques liliacées; mais il est rare de voir un stigmate unique sur le côté du style, comme dans le *lantana*.

2°. Le stigmate, considéré dans sa direction, est ordinairement droit & élevé; quelquefois il est contourné (*convolutum*) comme dans le safran; quelquefois, lorsqu'il est biffé ou double, il se recourbe ou se roule en dessous (*revolutum*) comme dans la plupart des composées.

3°. Le stigmate a diverses formes. Il est sphérique ou globuleux (*globosum*) dans les prime-vères; en massue (*clavatum*) dans le géniépier; en tête (*capitatum*) dans le nolina; acuminé (*acuminatum*) dans le marronnier; obtus (*obtusum*) dans l'andromède; en cœur (*cordatum*) dans le fumac; tronqué (*truncatum*) dans l'asphodèle; échancré (*emarginatum*) dans la pulmonaire; pelté ou en bouchier ou en plateau (*peltatum, orbiculatum*) dans le nénufar; étoilé (*stellatum*) dans le pavot; en pinceau (*penicilliforme*) dans la pimprenelle; plumeux (*plumosum*) dans les graminées; pétaliforme (*petaliforme*) dans les iris; triangulaire (*triangulare*) dans le lys; barbu (*barbatum*) dans la gesse; coulé, crochu (*refractum*) dans le *lantana*; canaliculé (*canaliculatum*) dans le colchique, &c.

4°. La surface du stigmate est également sujette à varier. Le plus souvent elle est glabre; quelquefois aussi elle est sillonnée, striée, velue, verruqueuse, mamelonée, ou criblée de pores nombreux & imperceptibles, qui sont probablement les orifices des vaisseaux intérieurs du style, & qui pompent ou aspirent le fluide spermatique.

5°. Quant à sa durée, le stigmate est caduc dans un grand nombre de fleurs, & sa chute a ordinairement lieu en même tems que celle de la corolle & des étamines, c'est-à-dire, après la fécondation; néanmoins il est persistant dans le pavot, dans le nénufar, &c.

STILAGO. Ce genre, établi d'abord d'après des caractères mal connus, a été depuis rangé parmi les *anacardiées*. Il en fera question dans le Supplément.

STILBE. *Stilbum.* Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, qui comprend de très-petits champignons pédicellés, qui ont l'apparence d'une moisissure, mais d'une consistance plus ferme, & dont le pédicelle est terminé par une petite tête solide, globuleuse, ovale ou pyriforme, d'abord aqueuse ou un peu gélatineuse, transparente, & qui devient ferme en vieillissant, solide, opaque, & qui porte les fructifications à sa surface extérieure.

ESPÈCES.

* Têtes arrondies.

1. STILBE velue. *Stilbum hirsutum.* Hoffm.

Stilbum perfrons, stipite ocreoso, hirsuto; pilis erectis, brevibus. Pers. Disp. Meth. Fung. pag. 39. & Synop. Meth. Fung. pag. 680. n°. 1. — Hoffm. Deutsch. Flor. Crypt. tab. 10. fig. 2. — Lam. Il. Gener. tab. 839.

C'est une assez belle espèce, fort petite, & néanmoins une des plus grandes de ce genre, persistante, distinguée par la roideur de son pédicelle jaunâtre, chargé de poils droits, nombreux. Sa tête est arrondie; elle est un peu rare, & se trouve sur les troncs d'arbres en putréfaction.

2. STILBE tomenteuse. *Stilbum tomentosum.* Persoon.

Stilbum parasiticum, stipite tomentoso, capitulo subrotundo. Pers. Synop. Meth. Fung. pag. 680. n°. 2. — Schrad. Journ. f. de Botan. vol. 2. pag. 65. tab. 3. fig. 1.

Cette espèce se distingue de la précédente par ses pédicelles tomenteux & non pileux. Ce duvet paraît être une autre plante, une sorte de byssus parasite, qui s'y établit au moment où cette plante cesse de végéter; & ce qu'il y auroit de plus singulier, c'est que ce stilbe lui-même est parasite, & croît sur une autre sorte de champignon, le *trichia vulgaris*, lorsque celui-ci entre en putréfaction.

3. STILBE roide. *Stilbum rigidum.* Pers.

Stilbum gregarium, stipite rigido, persistente, nigro, crassiusculo; capitulo subrotundo, primo aequofo, luto, demum compacto, griseo, deciduo. Pers. in Uster. Ann. Der. Botan. fl. 2. pag. 31. tab. 2. fig. 2. — Idem, Synop. Meth. Fung. pag. 680. n°. 3.

Stilbum rigidum. Decand. Flor. franç. vol. 2. Suppl. pag. 593. n°. 188. *

Ce champignon s'élève à peine à la hauteur d'une demi-ligne; quelquefois il parvient jusqu'à trois lignes. Il croît en masse & abondamment,

dans le courant du printemps, sur les bois qui entrent en décomposition. Son pédicelle est roide, noirâtre, persistant, cylindrique, terminé par une petite tête arrondie, d'abord blanchâtre & aqueuse, ensuite elle devient jaunâtre ou grisâtre, compacte. A l'époque de sa maturité, elle se détache du pédicelle qui persiste, & qu'on prendroit alors pour une espèce de byssus.

4. STILBE noire. *Stilbum nigrum.* Decand.

Stilbum stipite nigro, rigido; capitulo subrotundo, persistente. (N.)

Stilbum nigrum. Decand. Flor. franç. vol. 2. Suppl. pag. 593. n°. 188. *

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente par sa grandeur & sa forme; mais elle est entièrement noire, d'une consistance plus ferme, plus dure. Sa petite tête ne se détache point du pédicelle, comme dans l'espèce précédente. Dans plusieurs individus elle paraît un peu concave en dessus; & ce qui pourroit faire douter si elle appartient réellement à ce genre. On la trouve sur l'écorce du genévrier. (Decand.)

5. STILBE filiforme. *Stilbum filiforme.*

Stilbum confertum, subsalsiculare, minutissimum; stipite subulato, nigro; capitulo subrotundo, aequofo. Pers. Annal. Bot. l. c. & Synop. Plant. pag. 681. n°. 4.

Stilbum (minimum, var. «, nigripes), capitulo ovato, compresso; stipite attenuato. Tode, Fung. Meckl. 1. pag. 11. tab. 2. fig. 18.

C'est une des plus petites espèces: à peine est-elle visible sans le secours de la loupe. Son pédicelle est lisse, d'un noir-rougeâtre, capillaire, très-fin, subulé, un peu transparent, surmonté d'une petite tête aqueuse, blanchâtre, transparente, arrondie, un peu ovale, médiocrement comprimée, très-fugace, tandis que les pédicelles persistent. Elle croît en masse & en grande quantité, dans le printemps, sur le tronc mort des arbres récemment coupés.

6. STILBE gélatineuse. *Stilbum gelatinosum.* Pers.

Stilbum gregarium, albidum; stipite crassiusculo, subtereti; capitulo globoso. Pers. Synop. Plant. pag. 681. n°. 5.

Il est d'une substance très-molle. Son pédicelle est à peine long d'une ligne, un peu cylindrique, médiocrement épais, blanchâtre, terminé par une petite tête globuleuse. On le rencontre par aggrégation, en automne après les pluies, sur les troncs des arbres coupés du *fagus sivestris*.

7. STILBE citrine. *Stilbum citrinum.* Pers.

K k k 2

Stilbum subfasciculare, molle, glabrum, pallidescens-citrinum. Pers. Disp. Fung. pag. 39. & Synopf. Meth. Fung. pag. 681. n°. 6.

Les pédicelles nombreux paroissent réunis à leur base, mous, glabres, amincis à leur sommet, longs d'une demi-ligne, pâles ou de couleur de citrouille. Il croît au printemps sur le tronc des arbres en décomposition.

8. *STILBE commune. Stilbum vulgare.* Tode.

Stilbum capitulo sphaerico, stipite cylindrico, crassifusculo. Tode, Fung. Mecklenb. vol. 1. pag. 10. tab. 2. fig. 16. — Pers. Synopf. Fung. pag. 682. n°. 7.

On le distingue à peine à l'œil nu, tant il est petit. Sa couleur est blanche, & devient ensuite d'un jaune-ocracé. Son pédicelle est épais, cylindrique; il se termine par une petite tête d'une couleur un peu plus foncée; elle se couvre de semences extrêmement fines, blanchâtres & globuleuses. Ce champignon est très-commun, en automne, sur les troncs à demi putréfiés des arbres.

9. *STILBE bulbeuse. Stilbum bulbosum.* Tode.

Stilbum capitulo sphaerico; stipite attenuato, bulboso. Tode, Fung. Meckl. vol. 1. pag. 10. tab. 2. fig. 17. — Pers. Synopf. Meth. Fung. p. 682. n°. 8.

Son pédicelle est lisse, à peine sensible, foible, cylindrique, subulé, qui ensuite s'épaissit à sa base en une bulbe glabre, griâtre, hémisphérique, & enfin aplatie, qui devient jaunâtre. Ce pédicelle se termine par une petite tête sphérique, blanchâtre, couverte d'une poussière jaune très-fine. On rencontre ce champignon, après les pluies abondantes de l'automne, quelque fois sur les chaumes des graminées, plus ordinairement sur les feuilles & les tiges pourries.

10. *STILBE bicolore. Stilbum bicolor.* Pers.

Stilbum capitulo subgloboso, albido; stipite longo, conico, attenuato, pellucido, olivaceo albido. Pers. Synopf. Plant. pag. 682. n°. 9.

Ce champignon échappe à l'œil nu; c'est un des plus petits. Son pédicelle est long, conique, aminci, transparent, blanchâtre ou d'un vert d'olive; il supporte une petite tête blanchâtre, arrondie. Il croît sur le tronc des arbres.

11. *STILBE diaphane. Stilbum pellucidum.*

Stilbum stipite subulato, pellucido; capitulo subrotundo. Schrad. Journ. Bot. vol. 1. — Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 682. n°. 10.

Les pédicelles de cette espèce sont courts, subulés, très-transparens; ils supportent de petites

têtes arrondies. Elle croît sur les troncs des arbres qui commencent à se décomposer.

12. *STILBE bysse. Stilbum byssinum.* Pers.

Stilbum minutissimum, confertum, nitidum, candidum; capitulo primum rotundo, demum obovato. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 683. n°. 11.

Cette stilbe, considérée à l'œil nu, a toute l'apparence d'un petit byssus blanchâtre; elle est fort petite, en masse étalée. Ses pédicelles sont très-courts, blanchâtres, luisans. Leur tête est d'abord arrondie; elle devient ovale en mûrissant. Cette espèce croît sur l'écorce des arbres, dans les lieux humides.

** *Têtes ovales ou en forme de poire.*

13. *STILBE à pédicelle court. Stilbum micropus.* Persoon.

Stilbum gregarium, laetissimum, album; capitulo subrotundato; stipite brevi, succrefo, pellucido. Pers. Disp. Meth. Fung. pag. 39. & Synopf. Fung. pag. 683. n°. 12.

Lorsque ce petit champignon est desséché, il ressemble à un byssus. Son pédicelle est épais, très-court, transparent, de couleur blanche; il supporte une petite tête ovale, un peu rétrécie en poire à sa partie inférieure. On rencontre cette espèce, dans l'automne, sur les bois morts & entassés, sur lesquels elle forme des taches blanches, étalées.

14. *STILBE turbinée. Stilbum turbinatum.* Tode.

Stilbum capitulo turbinato, stipite cylindrico, ad capitulum contracto. Tode, Fung. Meckl. vol. 1. pag. 12. tab. 2. fig. 10. — Pers. Synopf. Fung. pag. 683. n°. 13.

Ses pédicelles sont cylindriques, gélatineux, rétrécis vers leur sommet, d'un jaune-clair, longs à peine d'une ligne; ils sont terminés par une petite tête rétrécie en poire à sa base, couverte d'une poussière féminale extrêmement fine, blanchâtre. Cette plante se rencontre, au commencement du printemps, sur le liège en décomposition du hêtre.

15. *STILBE rougeâtre. Stilbum rubicundum.* Tode.

Stilbum capitulo ovato, compresso; stipite attenuato, rubicundo. Tode, Fung. Meckl. pag. 11. tab. 2. fig. 18. — Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 683. n°. 14.

A peine cette espèce peut-elle être distinguée avec le secours de la loupe, tant elle est petite. On la rencontre ordinairement dans l'été sur les branches récemment coupées du hêtre; elle s'élève du milieu des fucs extravasés, tellement qu'on

croît que son pédicelle est pourvu à sa base d'un pécher, comme dans les hypnes. Il est d'ailleurs capillaire, atténué, un peu transparent, d'abord rougeâtre; il devient jaune avec l'âge, & se termine par une petite tête blanche, transparente, ovale, un peu complinée.

16. STILBE jaunâtre. *Stilbum lateum*. Pers.

Stilbum minimum, capitulo ovali, aureo; stipite lateo, pellucido. Pers. Synops. Meth. Fung. pag. 684. n°. 15.

Stilbum minimum, var. *β*, *flavipes*. Tode, Fung. Meckl. vol. 1. pag. 12. tab. 2. fig. 19.

Il croît dans l'été, au mois de juillet, sur le tronc pourri du hêtre; il est extrêmement petit. Son pédicelle est jaunâtre, transparent, surmonté d'une petite tête ovale, d'un jaune-doré. Cette espèce est rare.

17. STILBE pubescente. *Stilbum pubidum*. Tode.

Stilbum capitulo ovato, stipite infernè incrassato, pubido. Tode, Fung. Mecklenb. vol. 1. pag. 12. tab. 3. fig. 21. — Pers. Synops. Meth. Fung. pag. 684. n°. 16.

Ce champignon est fort petit & très-délicat. Son pédicelle est blanc, capillaire, lisse depuis sa base jusqu'à son milieu, épais & chargé à sa moitié supérieure, de poils roides, blanchâtres, semblables à un byssus filamenteux. La petite tête est ovale; ce n'est d'abord qu'une petite goutte aqueuse, claire & limpide, qui dans l'espace de vingt-quatre heures s'épaissit, perd sa transparence, se couvre d'une fine poussière blanche & séminale, qui en occupe toute la surface. Il croît au mois d'août sur les feuilles de pin en décomposition, & ne se montre ordinairement qu'après les pluies d'orage, accompagnées de tonnerre.

• STILBOSPORE. *Stilbosporum*. Genre de plantes de la famille des champignons, qui ont des rapports avec les *stilbum*, dont ils ne sont presque qu'une division à têtes scellées: ce sont des plantes presque microscopiques, à peine visibles à l'œil nu, qui ne s'offrent que sous la forme de très-petits points agglomérés, séminiformes, étendus dans une matière noirâtre attachée aux rameaux.

Il est impossible d'établir la distinction des espèces autrement que d'après la forme de ces différents points, observés avec un bon microscope; ils ne comportent point d'autre description que celle de leur forme, & de l'indication de leur lieu natal.

ESPÈCES.

1. STILBOSPORE étoilé. *Stilbospora asterosperma*. Hoffm.

Stilbospora thecis stellatis. Hoffm. Deutschl. Flor. vol. 2. tab. 13. fig. 3. — Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 13. & Synops. Meth. Fung. pag. 96. n°. 1.

Cette espèce se présente sous la forme de petits points divisés en rayons comme une petite étoile. Elle croît sur l'écorce de plusieurs arbres.

2. STILBOSPORE cylindrique. *Stilbospora macrosperma*. Pers.

Stilbosporathesis elongatis, cylindricis. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 14. tab. 3. fig. 13. — Idem, Synops. Meth. Fung. pag. 96. n°. 2.

Ce champignon présente des semences un peu plus grosses que dans les autres espèces; elles sont cylindriques & allongées. On les trouve sur les mêmes arbres.

3. STILBOSPORE ovale. *Stilbospora ovata*. Pers.

Stilbospora sporulis ovatis. Pers. Observ. Mycol. vol. 1. pag. 31. tab. 1. fig. 2. — Idem, Synops. Meth. Fung. pag. 96. n°. 3.

Stilbospora pyriformis. Hoffm. Deutschl. Flor. 2. tab. 14. fig. 4. — Lam. Ill. Gen. tab. 839.

Cette espèce est composée de petits points séminiformes, ovales ou un peu pyriformes, aigus à une de leurs extrémités, quelquefois à toutes deux; ils sont presque striés transversalement.

4. STILBOSPORE étroit. *Stilbospora angustata*. Pers.

Stilbospora sporulis ex ovato-subcylindricis. Pers. Synops. Meth. Fung. pag. 96. n°. 4.

Cette plante paroît tenir le milieu entre la précédente & la suivante; elle offre des sporules ou petites semences ovales, presque cylindriques; elle se rencontre sur l'écorce des arbres.

5. STILBOSPORE à petites semences. *Stilbospora microsperma*. Pers.

Stilbospora sporulis minutis, inaequaliteris, ovatis, utrinquè subacutis. Pers. Observ. Mycol. vol. 1. pag. 31. tab. 2. fig. 3. — Idem, Synops. Meth. Fung. pag. 96. n°. 5.

Elle croît sur les branches du hêtre & sur l'écorce du bouleau blanc. Les semences sont extrêmement petites, ovales, aigües à leurs deux extrémités, inégales à leurs côtés.

6. STILBOSPORE sphérique. *Stilbospora sphaerosperma*. Pers.

Stilbospora sporulis minutis, globosis. Pers. Observ. Mycol. vol. 1. tab. 1. fig. 6. — Idem, Dispos. Meth. Fung. pag. 14. & Synops. Fung. pag. 97. n°. 6.

Cette espèce offre de très-petites semences globuleuses ; elle couvre les chaumes desséchés de l'*arundo phragmites*, & se dirige le long des fentes qui s'y forment, tandis que toutes les espèces dont il a été fait mention plus haut, croissent sur les tameaux des arbres, particulièrement sur les branches du hêtre, du bouleau ou de l'ébène.

STILLINGUE. *Stillingia*. Genre de plantes dicorpylées, à fleurs incomplètes, unisexuelles, de la famille des euphorbes, qui a des rapports avec le *sapium*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, la cécidifère, à feuilles alternes, dont les fleurs sont disposées en épis solitaires & terminaux dans la bifurcation des rameaux ; les fleurs mâles au sommet des épis, les femelles à leur base.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques ; dans les fleurs mâles, un calice hémisphérique, contenant plusieurs fleurs ; une corolle tubulée, déchirée à ses bords ; deux étamines monadelphes ; dans les fleurs femelles, un calice uniflore, inférieur ; une corolle supérieure ; un style triloculaire ; une capsule à trois coques.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont disposées en un épi semblable à un chardon ; les fleurs mâles occupent la partie supérieure de cet épi ; les femelles l'inférieure.

* Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice (un involucre, *Juss.*) coriace, urcéolé, hémisphérique, très entier, contenant environ sept fleurs.

2°. Une corolle (un calice, *Juss.*) monopétale, tubulée, infundibuliforme, beaucoup plus étroite que le calice, qui s'agrandit insensiblement, dont l'orifice est entier, le limbe cilié & un peu déchiqueté à son bord.

3°. Deux étamines, dont les filamens sont filiformes, une fois plus longs que la corolle, écartés à leur partie supérieure, médiocrement réunis à leur base, supportant des anthères téniiformes, à deux loges.

* Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice semblable à celui des fleurs mâles, persistant, à une seule fleur, inférieur.

2°. Une corolle supérieure.

3°. Un ovaire arrondi, situé entre le calice & la corolle, surmonté d'un style filiforme, terminé par trois stigmates séparés & recourbés.

Le fruit consiste en une capsule à trois coques, presque turbinée, à trois faces, à trois loges, enveloppée à sa base par le calice agrandi.

Les semences solitaires dans chaque loge, oblongues, presque trigones, marquées en dehors par une cicatrice transversale.

ESPÈCES.

1. *STILLINGUE* des bois. *Stillingia silvatica*. Linn.

Stillingia radice crassissima ; caulibus herbaceis ; foliis sessilibus, ovalibus, serrulatis ; fasciculis masculis, squamam floralem vix superantibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 213.

Stillingia silvatica. Linn. Syst. veget. pag. 866. — Mantiss. 126.

Deux auteurs ont parlé de cette plante ; ce qu'ils en disent peut faire douter s'ils ont voulu parler de la même espèce. Comme elle ne m'est pas connue, je me bornerai à présenter la description abrégée qu'ils nous en ont donnée.

Cette plante, d'après Linné, est un arbrisseau qui pousse plusieurs tiges droites, cylindriques, hautes d'environ trois pieds, qui distillent une liqueur laiteuse, & se terminent par des fleurs en épi. Quelquefois deux rameaux s'élèvent de la base de cet épi, qui se trouve alors situé dans leur bifurcation. Les feuilles sont alternes, pétiolées, distantes, étalées, luisantes, dentées en scie à leurs bords ; les fleurs petites, de couleur jaune, disposées sur un épi terminal en forme de chardon.

La description que Michaux nous donne de cette plante dans la *Flor. de l'Amérique septentrionale*, n'est pas tout-à-fait conforme à celle que l'on vient de voir ; cependant il cite Linné avec le nom spécifique que cet auteur a donné à cette plante. Ses racines sont très-épaisses ; elles produisent plusieurs tiges herbacées, garnies de feuilles ovales, quelquefois oblongues-lancéolées, sessiles, dentées en scie à leur contour ; les fleurs mâles sont à peine plus longues que la bractée ou l'écaille florale qui les accompagne. On voit qu'il s'agit ici d'une plante à tiges herbacées, à feuilles sessiles, tandis que Linné parle d'un petit arbrisseau à feuilles pétiolées. Il est possible, comme ces feuilles varient, que lorsqu'elles sont oblongues & lancéolées, elles soient en même temps rétrécies en pétiole à leur base. D'ailleurs Linné, qui probablement n'a vu cette plante que sèche, peut très-bien s'être trompé sur la nature de ses tiges.

Cette plante se rencontre dans les forêts des pins, depuis la Caroline jusqu'en la Floride. (*Descript. ex Mich. & Linn.*)

On la regarde comme un puissant spécifique dans les maladies vénériennes.

2. *STILLINGIA* à feuilles de troëne. *Stillingia ligustrina*. Mich.

Stillingia fruticosa, foliis petiolatis, ovali-lanceolatis, utrinque acutis, integris; floribus masculis, brevissimis pedicellatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 213.

C'est un arbrisseau dont les tiges ligneuses sont garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales-lanceolées, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, rétrécies à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces; les fleurs sont terminales, disposées en épis; les fleurs mâles, situées au sommet des épis, sont légèrement pédicellées.

Cette plante croît dans la Géorgie & la Caroline, le long du bord des fleuves, dans les forêts aux lieux ombragés. (Mich.)

Observations. Aux deux espèces précédentes, Michaux a cru devoir y réunir le *croton sebiferum* de Linné, vulgairement l'arbre à suif, comme appartenant de préférence à ce genre plutôt qu'à celui des crotons. Il le caractérise en ces termes :

Stillingia (sebifera), arborescens, foliis longi petiolatis, subrhombico-ovalibus, acuminatis, infra basin glandula petiolaris; floribus masculis, pedicellatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 214.

Cet arbre si intéressant, originaire des Indes orientales, qui fournit aux Chinois la matière de leurs chandelles, est aujourd'hui cultivé en Amérique, dans les villes de Charleston & de Savannah, & presque naturalisé sur les côtes maritimes de la Caroline. (Voyez l'article CROTON PORTE-SUIF, vol. 2, pag. 209.)

STIPE. *Stipa*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *aristida* & les *avena*; il renferme des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, remarquables par leur longue arête articulée.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une balle calicinale uniflore, à deux valves; valve extérieure de la corolle terminée par une arête alongée, articulée à sa base.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice formé par une balle uniflore, à deux valves acuminées;

2°. Une corolle à deux valves : la valve extérieure terminée par une longue arête tortillée, articulée à sa base; valve intérieure linéaire, mutique;

3°. Trois étamines dont les filaments sont capitulaires, terminées par des anthères linéaires;

4°. Un ovaire supérieur, oblong, surmonté de deux styles velus, réunis à leur base, terminés par des stigmates pubescents.

Les semences sont solitaires, allongées, recouvertes par la balle calicinale adhérente.

Observations. Ce genre offre une suite d'espèces qui le rendent très-naturel; il faut cependant, sous ce rapport, en excepter quelques espèces que l'on a cru devoir y rapporter pour ne pas multiplier les genres, & qui d'ailleurs y conviennent assez bien, sinon par leur port, du moins par le caractère de leur fructification.

Les *stipes*, j'entends les espèces que je regarde comme les plus naturelles, ce sont même les plus nombreuses; les *stipes* ont des tiges grêles, souples & plantées; des feuilles étroites, la plupart roulées sur elles-mêmes à leurs bords, en forme de jonc, subulées, aiguës, coriaces, difficiles à rompre. Les fleurs sont disposées en une panicule ordinairement peu étalée, médiocrement rameuse, remarquable par des fleurs munies à la valve extérieure de la corolle, d'une arête plus ou moins longue, quelquefois très-allongée, velue ou plumeuse, roulée en spirale à sa partie inférieure : ce caractère donne de l'élégance à plusieurs espèces. Elles croissent presque toutes dans les climats tempérés, dans les sols un peu arides, pierreux, un peu élevés.

Ce genre a des rapports avec les avoines : il en diffère par ses calices constamment à une seule fleur, par l'arête de ses valves, qui est terminale & non insérée sur le dos ou un peu au dessous du sommet de ces valves. La balle de la corolle est souvent grêle, cylindrique, & ne quitte point la semence.

Les caractères spécifiques sont nombreux; ils se tirent de la disposition des fleurs, de la forme des panicules, un peu de celle des feuilles, particulièrement des arêtes glabres ou pubescentes, tantôt velues seulement à leur partie inférieure, plus ou moins tortillées, droites & filiformes à leur partie supérieure, plus ou moins longues, comparées soit à leur pédoncule ou aux valves de la corolle : ces valves sont, ou glabres, ou pubescentes, ou velues; les valves calicinales sont, ou de même longueur, ou plus longues que celles de la corolle, &c.

ESPÈCES.

1. *STIPE* empennée. *Stipa pennata*. Linn.

Stipa arifolia longissima, lanato-plumosa. Lam. Flustri. Gener. vol. 1. pag. 159. n°. 783, tab. 41, fig. 1.

Stipa arifolia lanata. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 115. — Pollich, Palat. n°. 120. — Scopol. Carn. n°. 122. — Jacq. Hort. Vindeb. 15. — Hoffm. Germ. 38. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 34. — vol. II. pag. 94.

Stipa (pennata), foliis filiformibus; aristis pennatis, inferius glabris. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 97.

Stipa ariflis plumofis. Haller, Helv. n°. 1514.

Efluca ariflis panicula circiter longitudine, plumofis. Royen, Lugd. Bat. pag. 68.

Efluca glumis unifloris; ariflis longiffimis, pennatis. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 114. n°. 50.

Gramen fpicatum, ariflis pennatis. Tournef. Inf. R. Herb. 518. — Scheuch. Gram. pag. 153. tab. 3. fig. 13. 6.

Gramen fpartum, pennatum. C. Bauh. Pin. 5. & Theatr. 71. Icon. — Monti. Prodrom. pag. 57. tab. 68.

Gramen pennatum, alifis fpartum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 512. Icon.

Avena capillaris, auftriaca, ariflis longiffimis, pennatis. Morif. Oxon. Hift. 5. 5. 8. tab. 7. fig. 9.

Gramen fpartum, pennatum, majus. Barrel. tab. 46.

Spartum auftriacum, pennatum. Cluf. Hift. 2. pag. 221. Icon. — Gerard, Hift. 42.

Gramen pennatis ariflis. Zannich. Ift. tab. 48.

Gramen plumcum. Munting. tab. 173.

Gramen nonum junceum. Dodon. Pempt. pag. 562. Sine icon.

Gramen pinnatum. Dalech. Hift. 1. pag. 431. Icon.

Gramen auftriacum. Cluf. Stirp. Pann. pag. 719. tab. 720.

Cette plante peut être confidérée comme une des plus jolies graminées que nous connoiffions en France; elle fe diftingue par les arêtes en forme d'un long panache fin & plumeux qui furmonte les fleurs.

Ses tiges font droites, menues, cylindriques, très-glabres, fufculées, hautes d'environ un pied, garnies de feuilles très-fines, capillaires, glabres, d'un vert glauque, roulées à leurs bords, quelquefois arquées, prefqu'auffi longues que les tiges: la terminale beaucoup plus large, en forme d'une très-longue fpathe ftriée, d'où fortent les fleurs. Celles-ci font difpofées en une panicule étroite, terminale, peu garnie de fleurs, dont les bales calicinales font compofées de deux valves membraneufes, aigües, fubulées; celles de la corolle coriaces, l'intérieure enveloppée par l'extérieure qui eft furmontée par une arête très-fine, longue de fix à huit pouces, articulée, anguleufe, roulée en fpirale à fa partie inférieure, plumeufe dans les trois quarts de fa longueur, arquée, nue à fa bafe. Les femences font grêles, parfaitement glabres,

prefqu'auffi longues que les valves de la corolle.

Cette plante croît dans les lieux fecs, pierreux & montagneux, en France, en Allemagne, en Suède & dans la Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 2 (V. v.)

2. STIPA barbe. *Stipa barbata*. Desfont.

Stipa foliis rigidis, hinc ftriatis; panicula laxa, elongata; ariflis longiffimis, à bafi ad apicem barbatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 97. tab. 27.

Cette efèce a des rapports avec la *stipa pennata*; elle en diffère par fes arêtes velues dans toute leur longueur, par fes feuilles plus larges.

Ses tiges font droites, hautes, cylindriques, glabres, articulées, garnies de feuilles roides, très-longues, glabres, d'un vert glauque, un peu planes, ftriées à leur face extérieure, rudes, un peu denticulées à leurs bords, fubulées & très-aigües à leur fommét, munies à l'orifice de leur gaine d'une membrane aigüe, déchirée.

Les fleurs font difpofées en une panicule lâche, terminale, allongée; les pédoncules capillaires, un peu anguleux; les pédicelles droits, inégaux; les deux valves calicinales égales, allongées, lancéolées, fubulées & longuement acuminées à leur fommét; les valves de la corolle obtufes, roulées fur elles-mêmes, au moins de la longueur du calice, moins la pointe fubulée; un peu pubefcentes à leur partie inférieure; la valve extérieure-furmontée d'une très-longue arête droite, articulée, velue depuis fa bafe jufqu'à fon fommét, tofte à fa moitié inférieure & plus.

Cette plante croît fur les collines incultes, aux environs de Mafcar & de Tlemfen en Barbarie, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. 2.

3. STIPA baffe. *Stipa humilis*. Cavan.

Stipa floribus paniculatis, fpicatis, vaginâ fubinclofa; ariflis pennatis. Perl. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 99. n°. 3.

Stipa ariflis propè bafim pennatis; floribus fpicatis, pedunculatis; calicibus femine triplo longioribus. Cav. Icon. Rar. vol. 5. pag. 41. tab. 466. fig. 1.

Ses racines font fibreufes, exapillaires; elles produifent des feui les nombreufes & des tiges droites, glabres, hautes de cinq à fix pouces, grêles, médiocrement noueufes. Les feuilles radicales font longues d'un pouce & demi, ventruës à leur bafe, roulées & fubulées à leur partie fupérieure; les caulinaires peu nombreufes; leur gaine très-ferrée, plus courte que les entre-nœuds, furmontée d'une feuille fubulée, longue d'un pouce; la terminale ventruë, fpathacée, plus longue que l'épi.

Les fleurs font terminales, difpofées en un épi ferré.

fermé, à peine long d'un pouce; les pédicelles courts & glabres; les valves calicinales blanchâtres, très aiguës, au moins trois fois plus longues que les semences; celles de la corolle inégales; l'extérieure plus longue, surmontée d'une arête droite, munie dans son milieu de poils fins, longs, très-blancs.

Cette espèce croît dans l'Amérique méridionale, au port d'Eschado, dans les terrains secs. Elle fleurit au mois de décembre. (*Descript. ex Cavan.*)

4. STIPE JONC. *Stipa juncea*. Linn.

Stipa arifolia nudis, var. flexis; calicibus albidis, femine longioribus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 157. n°. 784. & Flor. franç. vol. 3. pag. 575.

Stipa arifolia nudis, rectis; calicibus femine longioribus; foliis intus levibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 116.

Festuca arifolia circiter longitudine panicula, nudis. Roy. Lugd. Bat. 68.

Festuca juncea folio. C. Bauh. Pin. 9. & Theatr. 145. *Sine icon.* — Idem, Prodr. 19. — Scheuch. Gram. pag. 151. tab. 3. fig. 13. a. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 480. *Sine icon.*

Gramen avenaceum, maximum, utriculis cum laugine albis & longissimis arifolia. Magn. Bot. 121. — Tourn. Inst. R. Herb. 525.

4. *Stipa (juncea), foliis convolutis, filiformibus; panicula laxa, elongata; arifolia longis, pubescentibus*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 98, tab. 28.

On distingue particulièrement cette espèce à la longueur de ses balles calicinales, & à ses arêtes contournées en tout sens, glabres & un peu rudes.

Ses tiges sont droites, un peu grêles, articulées, noueuses à leur base, très-glabres, hautes de deux à trois pieds, garnies de feuilles longues, étroites, un peu blaugues, roides, roulées en dedans à leurs bords, cylindriques, subulées, assez semblables à des riges de jonc, assez souvent un peu pubescentes en dedans, glabres en dehors; la terminale élargie, allongée, en forme de spathe; l'orifice de leur gaine muni d'une membrane blanchâtre, ovale, un peu aiguë, déchirée ou divisée en deux.

Les fleurs forment une panicule allongée, médiocrement éralée, longue d'environ un pied; les pédoncules longs, capillaires, anguleux, rudes au toucher, peu garnis de fleurs; celles-ci pédicellées; leur calice composé de deux valves lâches, membraneuses, longues, subulées, très-aiguës, luisantes & blanchâtres à leurs bords; d'un vert-bleutéâtre fur leur des; les valves de la corolle presque une fois plus courtes que celles du

Botanique, Tome VII.

calice, roulées fur elles-mêmes, cylindriques, tronquées, coriaces, un peu pubescentes, particulièrement vers leur base; l'extérieure terminée par une arête longue de trois à quatre pouces droite, capillaire, un peu pubescente, qui se couronne lâchement en tout sens en vieillissant; les semences grêles & allongées.

La variété β , observée en Barbarie par M. Desfontaines, diffère de la précédente par ses feuilles filiformes, plus étroites; par ses arêtes plus visiblement pubescentes. Elle se rencontre fur les collines sèches & arides de l'Afrique septentrionale.

Cette plante croît dans les terrains élevés & pierreux des départements méridionaux de la France, & dans la Suisse. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. γ (P. v.)

5. STIPE CHEVELUE. *Stipa capillata*. Linn.

Stipa arifolia nudis, curvatis; calicibus femine longioribus, foliis intus pubescentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 116. — Pollich. Palat. n°. 121. — Pallas, Iter. vol. 1. pag. 267. — Hoffm. Germ. 38. — Rorh. Germ. vol. 1. pag. 34. — Vol. II. pag. 95. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 27.

Stipa juncea. Var. β . Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 575.

Stipa arifolia nudis, flexuosis; calice femine longiori. Hall. Helv. n°. 1513.

Festuca longissimis arifolia. C. Bauh. Pin. 10. & Theatr. 153. Icon.

Gramen avenaceum, mantanum, spica simpliciter, arifolia recurvis. Rai & Vaillant, Paris. pag. 85. ?

Cette plante est regardée, par Haller & par quelques autres botanistes, comme la même espèce que le *Stipa juncea*; elle en diffère très-peu & se rapproche beaucoup du *Stipa juncea*, var. β Desfont, dont elle se distingue par ses arêtes glabres, & du *Stipa juncea* Linn. par ses feuilles plus larges, plus pubescentes en dessus, & par ses valves calicinales, roufféâtres à l'époque de la maturité.

Ses tiges sont droites, moins élevées; ses feuilles un peu plus larges, bien moins sensiblement roulées à leurs bords, roides, plus courtes, à peine rudes à leurs bords, pubescentes à leur face intérieure. Les fleurs sont médiocrement paniculées, terminales; leurs valves calicinales longues, aiguës, subulées; la valve extérieure de la corolle plus courte que le calice, surmontée d'une arête plus courte que dans l'espèce précédente, point pubescente, contournée en différents sens.

Cette plante croit en Allemagne, en France, à Fontainebleau, dans les bois, aux lieux sablonneux. γ (P. f.)

6. *Stipa capillata*. *Stipa capillaris*. Lam.

Stipa paniculata capillata, effusâ; calice corollâ triplo breviorâ; aristis nudis. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 158. n°. 790.

Stipa (sericea), glabra, foliis cretâ-filiformibus, longissimis; summo paniculatum stipante & longitudine subséquante, pungente; panicula longâ, debili, tenuissimè capillatâ, sive sericeâ; floribus exiguis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 54.

Elle se rapproche beaucoup du *Stipa capillata* par ses feuilles & ses tiges, mais celles-ci sont plus grêles; elle en est d'ailleurs très-facile à distinguer par la forme de ses panicules, par l'extrême finesse des p-doncules, par ses fleurs très-petites, & par les balles calicinales, au moins trois fois plus courtes que celles de la corolle; & elle pourroit même rigoureusement être séparée des *Stipa* pour constituer un genre particulier. C'est un avis que je donne aux amateurs des genres nouveaux.

Ses tiges sont droites, roides, glabres, cylindriques ou un peu comprimées, hautes au moins d'un pied, presque point articulées, excepté au plus à sa base, où elle est garnie de feuilles presque aussi longues que les tiges, très-glabres, coriaces, étroites, subulées, roulées sur elles-mêmes en forme de jonc, toutes radicales & médiocrement vaginales à leur base dans les individus dont les tiges sont sans articulations.

Ses fleurs forment une panicule très-élégante, ample, étalée, d'un gris de lin; les pédoncules plus fins que des cheveux, longs, très-nombreux, touffus, à peine rameux; les valves calicinales très-courtes, en forme de deux petites écailles très-fermées contre les valves de la corolle. Celle-ci est très-petite, à deux valves aiguës, glabres, blanchâtres dans leur jeunesse; l'extérieure devient, à l'époque de la maturité, d'un brun-noirâtre; elle se termine par une arête droite, glabre, très-fine, longue d'un ponce & plus.

Cette plante a été recueillie dans la Caroline par M. Frazer. (*V. f. in herb. Lam.*)

7. *Stipa à courte arête*. *Stipa aristella*. Linn.

Stipa aristis nudis, rectis, calice vix duplò longioribus. Linn. Syst. Nat. 3. pag. 229. — Gruan, Illustr. 4. — All. Aud. pag. 39. tab. 2. fig. 4. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 28.

Stipa arilla nudis, rectis, calice vix duplò longioribus; germinibus lanatis. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 157. n°. 786.

Agrostis stipasa. Kœl. Gramin. pag. 77.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, glabres, cylindriques; les feuilles étroites; les radicales courbées en gouttière; celles de la

tige un peu planes; toutes d'un vert-cendré, fermes, glabres à leurs deux faces, munies à leurs bords de cils très-courts, qui ne sont guère visibles qu'à la loupe.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une panicule presque en épi, droite, serrée, médiocrement rameuse, point enpiquée par la feuille supérieure; les ramifications ou les pédicelles portent assez ordinairement deux ou trois fleurs; les valves calicinales de la même longueur que celles de la corolle. La valve externe de celle-ci est pubescente, & se termine par une arête courte, droite, point pubescente, à peine deux fois plus longue que le calice.

Cette plante croît en France, dans les départements méridionaux, aux environs de Nice, de Montpellier, dans les terrains pierreux. 2

8. *Stipa tortillée*. *Stipa tortilis*. Desfont.

Stipa paniculâ spicatâ, basi involutâ; calice interiore villosâ; aristis contortis, infernè villosis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 99. tab. 31. fig. 1.

Spartum spicâ & fœtulis tenuissimis, caudam equinam amulantibus. Bucc. Mus. tab. 97. — Scheuch. Gram. 152.

Gramen avenaceum, supinum, minus, spicâ densissimâ cum longis aristis, lanuginosis, tortilibus. Tourn. Inst. R. Herb. 514. & Herb.

Ses tiges sont droites, réunies en gazon, glabres, hautes d'environ un pied, garnies de feuilles glabres, roulées en dedans à leurs bords; les radicales presque capillaires; celles des tiges plus larges, plus courtes que le chaume; la terminale renflée en une sorte de spathe allongée, de laquelle sort une panicule jaunâtre, presque en épi, longue de trois à cinq pouces; les ramifications rapprochées des tiges, les fleurs pédicellées.

Le calice est composé de deux valves blanchâtres, très-étroites, fort minces, transparentes, glabres, luisantes, subulées, lâches, un peu inégales, longues d'environ un ponce, fort aiguës; la balle de la corolle fort caduque, cylindrique, à deux valves fortement nulées sur elles-mêmes; l'extérieure velue, surmontée d'une arête velue & torse en spirale à sa partie inférieure; glabre, filiforme à sa partie supérieure, geniculée à l'époque de la maturité; les semences allongées, grêles, creusées à un de leurs côtés par un sillon longitudinal.

Cette plante a été observée par M. Desfontaines dans les campagnes, sur les côtes de Barbarie. O (*V. f.*)

Ses fleurs, qui sont très-nombreuses, s'attachent aux habillemens des voyageurs, les percent, & incommode beaucoup par les piqures & les

chatouillements qu'elles excitent sur la peau. (Desfont.)

9. STIPE à petites fleurs. *Stipa parviflora*. Linn.

Stipa foliis radicalibus rigidulis, filiformibus; panicula diffusâ; aristis nudis, capillacis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 98. tab. 29.

Ses racines sont composées de longues fibres flexueuses; elles produisent plusieurs tiges ramassées en gazon, droites, grêles, hautes d'un à deux pieds, glabres, cylindriques, les feuilles sont glabres; les radicales courtes, roides, filiformes, roulées à leurs bords aiguës; les caulinaires un peu plus longues, canaliculées à leur partie inférieure.

Les fleurs sont petites, disposées en une panicule allongée, diffuse, un peu courbée en arc; les pédoncules capillaires, inégaux, longs, situés presque par verticilles à chaque nœud, ramifiés en pédicelles très-fins, allongés, inégaux. Le calice est composé de deux valves membraneuses, inégales, étroites, canaliculées, aiguës, à une seule fleur; les valves de la corolle plus courtes, glabres, fort petites, cylindriques, coriaces, roulées l'une dans l'autre; l'extérieure surmontée d'une arête capillaire, point pubescente, longue de trois à quatre pouces, un peu contournée à sa base; les semences grêles, allongées, parfaitement glabres.

Cette espèce a été recueillie par M. Desfontaines, dans le royaume de Tunis, aux environs de Mascar, sur les collines arides. (Descript. ex Desfont.) (V. f.)

10. STIPE tenace. *Stipa tenacissima*. Linn.

Stipa aristis basi pilosis, panicula spicata, foliis filiformibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 116. — Amen. Académ. vol. 4. pag. 266. — 1. œst. Itin. 118. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 188. n°. 788. tab. 41. fig. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 99. tab. 30.

Gramen sparteum, primum panicula comosa. C. Bauh. Pin. f.

Spartum herba Plinii. Clus. Hist. 2. pag. 220.

Spartum Plinii Clusio. Lobel. Ic. 88. & Observ. 45. Icon.

Gramen spartum Plinii, sive spartularum fuscum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 510. Icon.

Gramen spicatum, quod spartum Plinii. Tournet. Inst. R. Herb. 518.

LE SPARTE.

Cette graminée est infiniment intéressante par son emploi dans l'art de la sparterie. Elle ressemble

par ses feuilles, au *lygum spartum*, & par sa panicule à une avoine.

Ses tiges sont droites, ramassées en gazon, glabres, roides, nouvelles, hautes de deux à trois pieds; ses feuilles glabres, fermes, coriaces, roulées en jonc sur elles-mêmes, aiguës, longues d'environ deux pieds, élargies à leur base ou à l'orifice de leur gaine. Les fleurs sont grandes, nombreuses, disposées en une panicule longue de huit à dix pouces, droite, un peu ressemblante; les pédoncules courts, capillaires, médiocrement rameux.

Le calice est composé de deux valves longues au moins d'un pouce, un peu inégales, concaves, lancéolées, très-aiguës, scarieuses & blanchâtres à leur sommet & à leurs bords; les valves de la corolle plus courtes que le calice; la valve intérieure glabre, membraneuse; l'extérieure un peu plus longue, cylindrique, coriace, chargée de longs poils blancs, terminée par une arête geniculée, contournée & velue à sa partie inférieure, glabre & filiforme à sa moitié supérieure, longue au moins de deux pouces; les semences grêles & allongées.

Cette plante croît dans l'Espagne & sur les côtes de Barbarie, sur les collines incultes & arides. (V. f.)

Il y a peu de graminées plus utiles, plus intéressantes que celle-ci, par les divers usages auxquels on l'emploie dans les arts, d'après la nature de ses feuilles, qui sont souples, dures, tellement tenaces, qu'il est très-difficile de les rompre quand elles ont été préparées convenablement. Elles sont employées généralement dans une grande partie de l'Espagne, dans nos départements méridionaux de la France, sur les côtes de la Barbarie. A Alger on en fabrique des paniers de toute espèce, & leur souplesse permet de ficeler à leurs bords, & dans lesquels on renferme des figues & autres denrées que l'on envoie au loin: on en forme des tapis, des paillassons, des cordages, &c. Ces feuilles remplacent les joncs avec un très-grand avantage. En Espagne les habitants des campagnes en font des pantoufles d'un assez bon usage, dans les contrées chaudes & sèches. La sparterie, qui a tiré son nom du nom vulgaire de cette plante, forme une branche de commerce très-étendue, qui existoit déjà du tems de Plin. Le *lygum spartum*, que quelques botanistes avoient cru être le sparte, lui ressemble beaucoup par ses feuilles, mais elle se rompt bien plus facilement, & l'inspection des figures de J. Bauhin, Lobel, &c. quoique mauvaises, se rapportent évidemment au *stipa tenacissima*, dont on s'est toujours servi de préférence au *lygum*.

11. STIPE de Sibérie. *Stipa sibirica*. Lam.

Stipa paniculata, aristis nudis, calice duplo longior.

gioribus ; seminibus lanatis. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 158. n°. 787.

Avena (fibrica), paniculata, calicibus unifloris, seminibus hirsutis, aristis calice triplo longioribus. Linn. Spec. Plant. pag. 117.

Efluca glumis villosis, aristis calice triplo longioribus. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 113. tab. 22.

Cette plante, rangée parmi les *avena* par Linné, appartient davantage aux *stipa* par le caractère de sa fructification, quoiqu'elle ait, par son port, plus de rapport avec les *avenes*.

Ses fleurs sont nombreuses, disposées en une panicule lâche, très-ample, étalée; les pédoncules partiels un peu rudes, anguleux, glabres, presque verticillés; les pellicules courts, droits, inégaux, ordinairement uniflores. Le calice a ses deux valves presque scarieuses, luisantes, blanchâtres, oblongues, agrées; elles ne commencent qu'une seule fleur plus courte que le calice; les valves conniventes, chargées de longs poils lanugineux; la valve extérieure terminée par une arête intérieure à son sommet, un peu coulée vers la base, glabre, serrée, environ une ou deux fois plus longue que le calice.

Cette plante croît dans la Sibérie. (V. f.)

12. STIPÉ du Canada. *Stipa canadensis.*

Stipa foliis setaceis ; panicula parva ; floribus pubescentibus, breviter aristatis. (N.)

Stipa (juncea), culmis simplicibus setaceisque foliis, quasi juncea ; panicula parva, glumâ glabrâ, valvis obtusè ovalibus, florem pubescentem crassius breviusculaque aristatum aquantibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 54.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *stipa fibrica*; elle a des tiges simples, droites, glabres, menues, garnies de feuilles sétacées, roulées en dedans à leurs bords en forme de jonc. Les fleurs sont peu nombreuses, disposées à l'extrémité des tiges en une petite panicule; les valves calicinales glabres, ovales, obtuses, de la même longueur que la corolle; celle-ci composée de deux valves; l'extérieure pubescente, surmontée d'une arête courte, épaisse, aussi longue que la corolle.

Cette plante croît sur les rochers & les montagnes pierreuses, depuis la baie d'Hudson, jusque dans le Canada. Elle a été recueillie par Michaux. (Descript. ex Mich.)

13. STIPE avenacée. *Stipa avenacea.* Linn.

Stipa aristis nudis, calicibus semen aquantibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 116. — Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 158. n°. 791.

Andropogon folio superiore spathaceo ; pedunculis

lateralibus oppositis, unifloris ; aristis flexuosis. Gronov. Virgin. pag. 133.

Cette espèce a, dans sa panicule, le port d'une *avoine*. Ses tiges sont grêles, droites, cylindriques, hautes d'environ un pied, glabres, garnies de feuilles étroites, striées, parfaitement glabres; la feuille supérieure en forme de spathe ventrus, allongée, de laquelle sort une panicule presque latérale, médiocrement étalée; les pédoncules presque verticillés à chaque nœud, divisés vers leur milieu en deux autres capillaires, uniflores.

La balle calicinale est composée de deux valves égales, aussi longues que la corolle, minces, blanches, transparentes, concaves, oblongues, aiguës; celles de la corolle, étroites, roulées sur elles-mêmes; l'extérieure terminée par une arête articulée à sa base, couronnée, glabre, filiforme, de la longueur des pédoncules; les semences glabres, oblongues, roussâtres, un peu obtuses.

Cette plante croît dans la Virginie & la Caroline; elle m'a été communiquée par M. Boic. (V. f.)

14. STIPE membraneuse. *Stipa membranacea.* Linn.

Stipa pedicellis distatis, membranaceis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 116. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 158. n°. 792. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 443. n°. 11.

Ce graminé, qui a le port d'une *avoine*, s'élève à peu près à la hauteur d'un pied. Ses tiges sont très-lisses, fort menues, à peine de la grosseur d'un fil. Elles supportent une panicule simple, foible, lâche, presque en grappe; les pédoncules propres à peine divisés, presque membraneux, un peu élargis, à deux angles opposés, uniflores; la balle calicinale composée de deux valves inégales; l'une aussi longue que la corolle, l'autre beaucoup plus courte; toutes deux longuement acuminées; la valve extérieure de la corolle terminée par une arête glabre, flexueuse, un peu plus longue que la semence.

Cette plante croît en Espagne. (Descript. ex Linn.)

15. STIPE de Virginie. *Stipa virginica.* Pers.

Stipa panicula pauciflora, calicibus majusculis, corollâ fissurata, stipite barbato. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 99. n°. 12.

Stipa (barbata), panicula rariflora ; ramulis simplicibus, unifloris, geminis ; gluma valvis exterioribus majusculis, acuminatis ; valvula seminfera. Rhipite densa rassaque, barbâ obsoleta fissurata ; arista longissima, crassa, nuda. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. pag. 53.

Stipa avenacea. Walter, Flor. carol.

Il y a quelques rapports entre cette espèce & le *Stipa avenacea*. Ses tiges supportent une panicule composée de très-peu de fleurs, dont les rameaux sont simples, unilatéraux, les inférieurs ordinairement gemmés, les bales calicinales un peu plus grandes que celles de la corolle, oblongues, acuminées; celles de la corolle soutenues par un pédicelle chargé de poils épais, roussâtres; la valve extérieure surmontée par une arête glabre, très-longue, épaissie.

Cette plante a été découverte par Michaux, dans les forêts de la Virginie & de la Caroline supérieure. (*Descript. ex Mich.*)

16. STIPE du Cap. *Stipa Capensis*. Thunb.

Stipa aristis basi pilosis, paniculâ spicatâ, foliis ensiformibus. Thunb. Prodr. C. B. Sp. pag. 19. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 441. n° 7.

Cette espèce, découverte par Thunberg au Cap de Bonne-Espérance, ne m'est point connue. Les caractères qui paraissent devoir la faire distinguer, consistent dans les feuilles ensiformes, dans les fleurs disposées en une panicule qui prend presque la forme d'un épi, & dans la valve extérieure de la corolle, surmontée d'une arête pileuse à sa base.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. ♀

17. STIPE en épi. *Stipa spicata*. Linn. f.

Stipa aristis basi pilosis; racemo spicato, secundo. Thunb. Prodr. pag. 20. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 445. n° 8. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 158. n° 795.

Stipa (spicata), aristis fenuis, floribus spicatis. Linn. f. Suppl. pag. 111.

Cette plante a des racines rampantes, vivaces, d'où s'élèvent plusieurs tiges glabres, droites, lisses, hautes d'environ un pied & demi, garnies de feuilles lisses, graminiformes; la dernière beaucoup plus courte que les autres. Les fleurs sont sessiles, à peine pubescentes, venues à leur base, disposées en un épi terminal, grêle, unilatéral, long de deux à trois pouces; la valve extérieure de la corolle surmontée d'une arête longue au moins de deux pouces, torse & velue à sa partie inférieure, droite & glabre à sa partie supérieure.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. ♀ (*Descript. ex Linn. f.*)

18. STIPE étalée. *Stipa expansa*.

Stipa spiciis alternis, paniculatis, expansis; floribus sessilibus, remotis; calicibus corollâ longioribus; aristâ brevissimâ, nudâ. (N.)

Cette espèce est très-distincte, facile à reconnaître à ses petites fleurs disposées en épis alternes, paniculés, nombreux; les arêtes nues, très-courtes.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, garnies de feuilles alternes, glabres, striées, un peu glauques, légèrement roulées à leurs bords, aiguës, presque piquantes; les supérieures très-courtes, nues, roulées à leur gaine. Les fleurs sont terminales, formant par leur ensemble une panicule étalée, longue de huit à dix pouces, composée de pédoncules très-fimbriés, très-longs, glabres, filiformes, un peu anguleux, alternes, qui offrent autant d'épis grêles, nus à leur partie inférieure, supportant à leur partie supérieure des fleurs petites, alternes, très-écartées, surtout celles du bas, latérales, serrées contre le pédoncule commun.

Les valves calicinales sont étroites, presque tubulées, égales, aiguës, très-glabres, plus longues que celles de la corolle. Celle-ci est glabre, petite, aiguë; sa valve extérieure formée par une arête fort courte, droite, point tortillée, très-glabre, plus courte que les valves calicinales.

Cette espèce m'a été communiquée par M. Bosc, qui l'a recueillie dans la Caroline. (V. f.)

19. STIPE panic. *Stipa panicoides*. Lam.

Stipa paniculâ angustâ, pauciflorâ; aristis nudis, calice triplo longioribus; femine lenticulari. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 158. n° 794.

Cette graminée a un peu le port d'un panicum. Ses tiges sont droites, glabres, garnies de feuilles lisses, très-étroites, alongées, sétacées; les fleurs peu nombreuses, disposées en une panicule serrée; la valve extérieure de la corolle terminée par une barbe parfaitement glabre, sétacée, trois fois plus longue que le calice. Les semences sont lenticulaires.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Monte-Viale. (Herb. Thouin.)

20. STIPE élançée. *Stipa strida*. Lam.

Stipa paniculâ elongatâ, aristatâ; pedunculis articulis, stridissimis; aristis nudis, subsessilibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 158. n° 789.

Cette plante a beaucoup de rapport avec les *andropogon*; elle se distingue par ses panicules alongées, très-serrées, dont le rachis est triangulaire, noueux, articulé; les articulations courtes, arquées, flexueuses, très-glabres, ainsi que toutes les autres parties de la plante.

Ses tiges sont fort hautes, épaisses, assez semblaibles, ainsi que les feuilles, à celles du *carex maximus*. Les feuilles sont larges, très-longues, acuminées.

Les fleurs, assez nombreuses, ont un pédicelle court, comprimé, articulé, fortement appliqué contre le rachis dont il prend la courbure. Quelques fleurs sont stériles, un peu arquées, selon leur position contre le rachis, réunies deux ou trois au même point d'insertion, très-ferrées; elles forment des épis panicules, longs de douze à quinze pouces.

Les valves calicinales glabres, dures, coriaces, inégales, d'un brun-roussâtre, oblongues, concaves & canaliculées, un peu aiguës, un peu plus longues que la corolle. Celle-ci est composée de deux valves coriaces, brunes, presque égales, aiguës, roulées sur elles-mêmes; l'extérieure surmontée d'une arête capillaire, très-glabre, médiocrement flexueuse, à peine une fois plus longue que la corolle; les semences ovales, un peu cylindriques, glabres, d'un brun-noirâtre, point adhérentes aux valves de la corolle, qu'elles quittent lorsqu'elles sont mûres.

Cette plante a été recueillie, dans la Caroline, par M. Frater; elle piroit s'écarter des *Stipa* par son fœuice, par les semences libres & par la disposition de ses fleurs. (V. f. in herb. Lam.)

21. *STIPA fasciculé. Stipa arguens.* Linn.

Stipa arista nudis, bracteis basi barbatis; foliis ciliatis, fasciculatis. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 220. n°. 8. — Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 158. n°. 793.

Gramen arguens. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 15. tab. 6. fig. 1.

Gramen aethiopicum, panicula molli, virefcente. Pluken. Almag. pag. 176. tab. 300. fig. 1.?

Il est douteux que cette plante convienne parfaitement à ce genre; elle en diffère beaucoup par son port & par les bractées dont ses panicules sont munies. Ses tiges sont droites, garnies de feuilles molles, point roulées à leurs bords. Les panicules contiennent des fleurs réunies par fascicules; elles sont stériles, munies de bractées assez semblables aux valves calicinales, mais plus longues, couvertes en dehors de poils longs & nombreux; la valve extérieure de la corolle surmontée d'une arête noirâtre, contournée, très-glabre; les semences velues à leur base.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Description. ex Linn.)

22. *STIPA d'Ukraine. Stipa ukraine.* Lam.

Stipa arista nudis, rebus; calicibus subrotatis, semine longioribus. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 157. n°. 786.

Tirfu. Gaert. Mém. vol. 1. pag. 19. tab. 12.

Ses racines sont touffues, & produisent un grand

nombre de feuilles réunies en gazon, d'un vert gai, presque triangulaires ou cruciées en gouttière, striées, rudes à leurs bords, longues d'un pied, larges d'une ligne; les gaines roussâtres à leur base, munies à leur orifice d'une membrane triangulaire, aiguë, blanchâtre. Les tiges sont droites, cylindriques, hautes d'environ deux pieds, terminées par des fleurs nombreuses, paniculées.

Les panicules longues de huit pouces, un peu inclinées; leurs ramifications presque serrées; les pédicelles inégaux, longs d'un à deux pouces & plus.

Les valves calicinales d'un vert-roussâtre, plus longues que la corolle, subulées & blanchâtres à leur sommet; celles de la corolle cylindriques, munies de poils blanchâtres à leur partie inférieure; la valve extérieure surmontée d'une arête longue de quatre à cinq pouces, droite, nue, capillaire; les semences oblongues.

Cette plante croît naturellement dans l'Ukraine. Les chevaux sont très-avides de ses semences.

23. *STIPA jaunâtre. Stipa flavesens.* Labill.

Stipa arista nudis, corollis pilosis, foliis involuto-filiformibus. Labill. Nov-Holl. Plant. Specim. vol. 1. pag. 24. tab. 30.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes d'un demi-pied & plus; les feuilles filiformes, roulées sur elles-mêmes; l'orifice de leur gaine entier. Les fleurs forment une panicule d'un demi pied, serrée; les ramifications courtes, simples.

Les valves calicinales sont jaunâtres, un peu transparentes, presque égales, à peine plus longues que celles de la corolle; celles-ci sont pileuses, roussâtres; l'extérieure surmontée d'une arête droite, serrée, un peu contournée, articulée à la base; les anthères oblongues; le style court; les semences grêles, allongées.

Cette plante croît au Cap de Van-Diemen, où elle a été découverte par M. Labillardière. (Description. ex Labill.)

24. *STIPA élégant. Stipa elegantissima.* Labill.

Stipa arista nudis, pedicellis plumosis. Labill. Nov-Holl. Plant. Specim. vol. 1. pag. 23. tab. 29.

Très-belle espèce, dont les tiges sont hautes d'environ trois pieds & plus, ramuses, pleines, cylindriques, dures, presque ligneuses, garnies de feuilles plus courtes que les entre-nœuds, roulées à leurs bords; leur gaine ventrue.

Les fleurs sont disposées en une panicule droite, un peu serrée, étalée après la floraison; les ramaux presque dichotomes; les pédoncules longs, filiformes, velus, plumeux; les valves du calice

inégales, aiguës; la valve extérieure de la corolle, coriace, un peu ridée, pileuse à sa base, binue, terminée par une arête très-fine, presque glabre, contournée; la valve intérieure membraneuse; les filaments un peu planes; les anthères oblongues, à deux loges, quelques poils courts à leur sommet; l'ovaire oblong; les styles courts; les stigmates en pinceau; les semences oblongues, renfermées dans la balle de la corolle.

Cette plante a été recueillie par M. Labillardière au Cap Van-Diemen.

25. STIPE à feuilles planes. *Stipa micrantha*. Cavan.

Stipa aristis nudis, panicula spicaformi; seminibus glabris; foliis striatis, planis; geniculis rubro f. scis. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 42. n°. 523. tab. 467. fig. 2.

Plante haute d'environ un pied & demi, dont les tiges sont grêles, droites, munies de trois ou quatre nœuds d'un brun-rougeâtre, garnies de feuilles planes, acuminées vers leur sommet, larges d'une demi-ligne, depuis trois pouces jusqu'à un de longueur; leur gaine glabre, striée.

Les fleurs forment une panicule ressemblée en épi droit, grêle, long de quatre pouces; les ramifications courtes, inégales, presque à demi verticillées. Les valves calicinales sont transparentes, blanchâtres, inégales, très-aiguës; la corolle glabre, presque aussi longue que le calice, fort petite, surmontée d'une arête fine, nue, trois fois plus longue que le calice, coudée dans son milieu.

Cette plante se rencontre à la Nouvelle-Hollande, où elle fleurit dans le courant du mois d'avril (Description ex Cavan.)

26. STIPE bicolore. *Stipa bicolor*. Vahl.

Stipa aristis nudis; seminibus obovatis, basi herbatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 24. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 442. n°. 9.

Stipa (bicolor), aristis nudis; seminibus ovato-oblongis, stipitatis; stipite tomentoso. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. pag. 42. n°. 521. tab. 466. fig. 2.

Ses tiges sont droites, glabres, hautes d'un pied & demi, presque recouvertes par des gaines longues, striées; les nœuds distans & velus; les feuilles glabres, subulées, roulées à leurs bords, longues de trois pouces; leur gaine longue de six, cylindrique, élargie, carénée vers son orifice.

Les fleurs forment une panicule rameuse, longue de trois à quatre pouces; les rameaux un peu étalés, alternes, deux par deux, capillaires, l'un plus court que l'autre, simples, supportant à leur extrémité deux ou trois fleurs médiocrement pé-

dicellées; les valves calicinales un peu violettes & jaunâtres, acuminées, un peu plus longues que la corolle, membraneuses & blanchâtres vers leur sommet; la corolle soutenue par un pédicelle tomenteux; la valve intérieure toide, subulée; l'extérieure ovale, un peu tuberculée vers son sommet, surmontée d'une arête articulée, torse, longue de deux pouces, barbu à sa partie inférieure.

Cette plante croît au Chili; elle y fleurit au mois de janvier. (Description ex Cavan. l. c.)

27. STIPE à longue panicule. *Stipa emianis*. Cavan.

Stipa aristis nudis, seminibus tomentosis, foliis striatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 5. tab. 467. fig. 1.

Cette espèce a des tiges droites, hautes de trois pieds & plus, très-glabres, striées, garnies de feuilles striées, longues d'un pied & plus, larges d'une demi-ligne, très-aiguës vers leur sommet; leur gaine longue de trois pouces, lisse, cylindrique.

Les fleurs forment une ample panicule lâche, longue d'un pied, rameuse; les rameaux disposés presque par verticilles alternes, capillaires, inégaux, multiflores; les pédicelles courts, inégaux, lécités; les valves du calice d'un blanc-verdâtre; inégales, plus longues que la corolle, très-aiguës, transparentes à leur sommet; la valve intérieure de la corolle subulée; l'extérieure tomenteuse, terminée par une arête nue, longue d'un pouce & demi, articulée vers son milieu, très-fine, torse à sa partie inférieure.

Cette espèce croît au Mexique, aux environs de la ville de Chalma. Elle fleurit au mois d'août. (Description ex Cavan.)

STIPULACÉES (Feuilles). *Stipulea folia*.

Ce sont celles qui sont munies, soit sur leur pétiole, soit dans son voisinage, de petites folioles auxquelles on donne le nom de *stipules*, comme il est facile de le remarquer dans la plupart des légumineuses, des rubiacées, dans les rosiers, &c.

STIPULES. *Stipula*. Ce sont des productions foliacées, écailleuses ou membraneuses, qui très-souvent ressemblent aux feuilles, mais qui sont ordinairement beaucoup plus petites, & d'une forme un peu différente. Elles sont fixées à la base des feuilles, & diffèrent entr'elles par leur nombre, leur position, leur insertion & leur forme. C'est pourquoi on dir qu'elles sont :

Solitaires (*solitaria*) lorsqu'il n'y en a qu'une à la base de chaque pétiole, comme dans le *ruscus aculeatus*;

Géminées (*gemina*) lorsqu'elles sont deux à

deux, c'est-à-dire, une de chaque côté à la base des pétioles, comme dans l'*orobus* ;

Latérales (*laterales*) lorsqu'elles sont situées sur le côté des pétioles ;

Engainantes ou vaginales (*vaginales*) lorsqu'elles embrassent le contour de la tige, des rameaux ou des pétioles ;

Extrafoliacées ou en dehors des feuilles (*extrafoliacées*) lorsqu'elles sont insérées sur la tige ou sur les rameaux, plus bas que l'insertion du pétiole ; plusieurs légumineuses ;

Intrafoliacées ou en dedans des feuilles (*intrafoliacées*) lorsqu'elles sont placées sur la feuille ou sur son pétiole ;

Opposées aux feuilles (*oppositifolia*) lorsqu'elles sont entièrement opposées à l'insertion des feuilles, comme dans l'*anagyris foetida*, l'*ebenus cretica*, &c. ;

Caduques (*caduca, decidua*) lorsqu'elles ne persistent point, & qu'elles tombent avant ou avec les feuilles ;

Persistantes (*persistentes*) lorsqu'elles subsistent même après la chute des feuilles, comme celles du rosier, du *spirea*.

Elles prennent enfin, quant à leur forme, à leur contour, à leur grandeur, &c. les mêmes dénominations que les feuilles ; ainsi elles sont sessiles, cohérentes, décurrentes, subulées, lan-céolées, sagittées, en forme de croissant, droites, réfléchiées, étendues, crochues, très-entières, cennelées, dentées en scie, ciliées, &c. longues, courts, médiocres. L'on détermine leur grandeur en la comparant avec celle des pétioles ou des feuilles.

STIPULICIDE. *Stipulicida*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des caryophyllées, qui a des rapports avec les *holostem* & les *polycarpon*, & qui renferme des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées ; les fleurs terminales, fort petites, munies ordinairement de bractées sétacées & à plusieurs découpures.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales ; trois étamines ; un style ; trois stigmates ; une capsule à une loge, à trois valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, divisé profondément en cinq découpures ovales-oblongues, membracées à leurs bords.

2°. Une corolle composée de cinq pétales pres-

que de la longueur du calice, droits, oblongs, un peu cunéiformes.

3°. Deux ou trois étamines plus courtes que les pétales, dont les filaments sont capillaires, sétacés, attachés, ainsi que les pétales, sur le dique qui supporte l'ovaire, terminés par des anthères oblongues, un peu sagittées.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un seul style court, terminé par trois stigmates droits & rapprochés.

Le fruit est une capsule supérieure, ovale, enveloppée par le calice persistant, à une seule loge, s'ouvrant en trois valves, contenant quelques semences fort petites, situées à la base de la capsule, & attachées sur un réceptacle très-court, filamenteux.

Observations. Ce genre diffère peu des *holostem*. Son principal caractère consiste, 1°. dans une capsule qui se divise en trois valves, tandis que celle des *holostem* s'entrouvre, seulement à son sommet ; 2°. dans un seul style court ; 3°. dans deux, rarement trois étamines. Il y a aussi quelques différences dans le port ou dans les catéchères secondaires ; elles consistent particulièrement dans des stipules sétacées & finement incisées. C'est d'après ce caractère que Michaux a donné à ce genre le nom de *stipulicida* (stipules incisées).

Ce même auteur prétend que l'*holostem cordatum* de Linné doit être réuni à ce genre. Nous observerons à ce sujet, que les *holostem* renvoyés & réunis par M. Lamarck au genre *morgetine* (alsine), ont été oubliés lorsque j'ai traité cet article : c'est une erreur qui sera réparée, ainsi que plusieurs autres omissions, dans le Supplément que je dois donner de cet ouvrage.

ES P È C E.

1. STIPULICIDE SÉTACÉE. *Stipulicida setacea*. Mich.

Stipulicida glabra, erecta, setaceo-ramosissima ; foliis juxta radicem paucissimis, fistulatis ; floribus terminalibus, ternatis quinque fusciculatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 27. tab. 6.

Polycarpon (stipulidum), erectum, ramosissimum, ramis setosis, foliis spatulatis, floribus terminalibus, fusciculatis ; stipulis setaceo-multifidis. Persoon, Synops. Plant. vol. 1. pag. 115. n°. 2.

C'est une petite plante vivace, dont les racines sont garnies de petites fibres capillaires, qui produisent plusieurs tiges grêles, droites, très-glabres, presque sétacées, divisées par dichotomie en rameaux également bifurques, nombreux, presque nus. Les feuilles radicales sont pétiolées, peu nombreuses, glabres, ovales, spatulées entières, obtuses ; celles des tiges, filices, petites, opposées, ovales, aiguës, situées à la bifurcation des rameaux,

rameaux, &c à la base des pédoncules ou des rameaux qui en tiennent lieu ; des stipules petites, glabres, sétacées, à plusieurs découpures très-fines.

Les fleurs sont fort petites, terminales, situées par fascicules au nombre de trois à cinq, réunies à l'extrémité des rameaux simples ; elles sont sessiles ou médiocrement pédicellées ; les pétales glabres, inférieurs ; le calice court, verdâtre, à cinq découpures profondes, membraneuses à leurs bords ; la corolle fort petite, à cinq pétales un peu plus courts que le calice.

Cette plante croît dans les plaines sablonneuses & arides de la Caroline, où elle a été observée par Michaux. *γ* (*Descript. ex Mich.*)

STOBÉE. *Stobea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, fasciculées, de la famille des cynarocéphales, qui a des rapports avec les carlines, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont incisées ou pinnatifides, épineuses au sommet de leurs angles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un réceptacle hispide, alvéolé ; une aigrette composée de paillettes ; une corolle flosoleuse ; un calice imbriqué ; les écailles divisées en dents épineuses.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont terminales, composées de fleurons tous hermaphrodites. Elles offrent :

1°. Un calice commun, composé d'écailles imbriquées, lancéolées, dentées, épineuses à leurs bords.

2°. Une corolle formée de fleurons tous hermaphrodites, tubulés, divisés à leur limbe en cinq découpures égales.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments sont capillaires, terminés par des anthères oblongues, réunies en cylindre.

4°. Un ovaire court, ovale, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmat oblong, souvent bifide.

Les semences sont solitaires, un peu cylindriques, surmontées d'une aigrette composée de paillettes étroites.

Le réceptacle est alvéolé, hispide, dépourvu de paillettes.

Observations. Ce genre a été occasionné par l'examen du *carlina atrachyloides* de Linné, dont la fleurs'écartoit en plusieurs parties du caractère générique des carlines. M. Thunberg, ayant recueilli au Cap de Bonne-Espérance plusieurs autres plantes qui présentoient les mêmes caractères que le *carlina*.

Botanique. Tome VII.

lina atrachyloides, les a toutes réunies dans un même genre qu'il a nommé *Stobea*. Ce nouveau genre diffère des carlines, en ce que le calice commun n'offre point ces écailles intérieures lancéolées, entières, scarieuses & colorées, qui, dans les carlines, imitent une corolle radice ; de plus, le réceptacle est dépourvu de paillettes, mais simplement hispide & alvéolé ; enfin, l'aigrette qui couronne les semences n'est point formée de poils plumeux, mais de paillettes très-étroites.

Les espèces qui composent ce nouveau genre ne nous étant connues jusqu'à présent que d'après le *Prodrome des Plantes du Cap de Bonne-Espérance* de Thunberg, dont il n'offre qu'une seule phrase spécifique, nous ne pouvons que les mentionner ici jusqu'à ce qu'elles nous soient mieux connues. Les espèces connues jusqu'alors sont toutes originaires du Cap de Bonne-Espérance.

E S P È C E S.

1. **STOBÉE à feuilles glabres.** *Stobea glabrata*. Thunb.

Stobea foliis cordatis, amplexicaulis, oblongis, glabris. Thunb. *Prodrom.* pag. 141. — Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1703. n°. 1.

Cette espèce a des tiges garnies de feuilles sessiles, amplexicaules, oblongues, échancrées en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet.

2. **STOBÉE à feuilles de carline.** *Stobea carlinoides*. Thunb.

Stobea foliis cordato-oblongis, glabris, dentato-ronciatis, spinosis. Thunb. *Prodrom.* pag. 141. — Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1704. n°. 2.

On la distingue à ses feuilles alternes, oblongues, sessiles, glabres à leurs deux faces, échancrées en cœur à leur base, roncinées ou dentées à leur contour ; les dents épineuses.

3. **STOBÉE atrachyloïde.** *Stobea atrachyloides*. Thunb.

Stobea foliis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, dentato-pinnatifidis. Thunb. *Prodrom.* 141. — Willd. *Spec. Plant.* vol. 3. pag. 1704. n°. 3.

Carlina atrachyloides. Linn. *Spec. Plant.* vol. 2. pag. 1161. — Lam. *Encycl.* vol. 1. pag. 625. n°. 9.

Cette espèce, qui est devenue le type de ce nouveau genre, a déjà été mentionnée dans cet ouvrage sous le nom de *carlina atrachyloïde*, où M. Lamarck avait déjà exposé le caractère qui paroît devoir l'exclure du genre des carlines.

4. **STOBÉE à feuilles décurrentes.** *Stobea decurrens*. Thunb.

M m m

Stobaa foliis decurrentibus, glabris, inciso-pinnatifidis, spinosis. Thunb. Prodrum. pag. 141. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 4.

Dans cette plante les feuilles sont décurrentes sur les tiges, glabres à leurs deux faces, incisées à leur contour & même presque pinnatifides; leurs angles épineux.

5. STOBÉE laineuse. *Stobaa lanata*. Thunb.

Stobaa foliis decurrentibus, ovatis, spinosis, tomentosis. Thunb. Prodrum. pag. 141. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 5.

Ses feuilles sont décurrentes, comme dans l'espèce précédente; ovales, épineuses à leurs bords, revêtues d'un duvet tomenteux.

6. STOBÉE à tige roide. *Stobaa rigida*. Thunb.

Stobaa foliis cordatis, pinnatifidis, spinosis, tomentosis. Thunb. Prodrum. pag. 141. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 6.

Ses tiges sont roides, garnies de feuilles alternes, sessiles, échanquées en cœur à leur base, pinnatifides, revêtues d'un duvet tomenteux; les dents ou les angles terminés par une pointe épineuse.

7. STOBÉE hétérophylle. *Stobaa heterophylla*. Thunb.

Stobaa foliis tomentosis, infimis indivisis, superioribus lyratis. Thunb. Prodr. pag. 41. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 7.

Ses feuilles sont revêtues d'un duvet tomenteux, sessiles, alternes; les feuilles supérieures échanquées en lyre à leurs bords, les inférieures très-entières.

8. STOBÉE à feuilles pinnatifides. *Stobaa pinnatifida*. Thunb.

Stobaa foliis tomentosis, pinnatifidis; laciniis ovatis, supra & apice spinosis. Thunb. Prodrum. pag. 141. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1704. n°. 8.

Cette espèce a des rapports avec la précédente; toutes ses feuilles sont pinnatifides, tomenteuses; les découpures ovales, épineuses en dessus & à leur sommet.

9. STOBÉE ailée. *Stobaa pinnata*. Thunb.

Stobaa foliis tomentosis, pinnatifidis; pinnis linearibus, spinâ terminatis. Thunb. Prodrum. pag. 141. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1705. n°. 9.

Ses feuilles sont tomenteuses, pinnatifides, mais plus profondément divisées que celles de

l'espèce précédente; les pinnules sont linéaires, terminées par une pointe épineuse.

STOKÉSIE bleuet. *Stokesia cyanea*. Lhérit. Sert. Angl. pag. 28. — Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 149. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1703.

Carthamus levis. Hil. Kew. pag. 57. tab. 5.

Cette plante, rangée d'abord parmi les carthames sous le nom de *carthamus levis*, en a été retirée par M. Lhéritier, qui en a fait un genre nouveau, dont le calice est foliacé, légèrement imbriqué, renfermant des fleurs composées de fleurons hermaphrodites; ceux du centre réguliers, tubulés, divisés à leur orifice en cinq dents; ceux de la circonférence plus grands, infundibuliformes, irréguliers, imitant une fleur radiée & assez semblable au bleuet (*centaurea cyaneus*). Le réceptacle est nu, supportant des semences à quatre faces pour les fleurs régulières & centrales, surmontées d'une aigrette formée de quatre poils sétacés; les semences de la circonférence & des fleurs irrégulières, à trois faces; leur aigrette composée de trois poils.

Cette plante croît naturellement dans les contrées méridionales de la Caroline. Elle est cultivée dans les jardins botaniques en Angleterre. x

STOLONIFÈRE (Racine, tige). *Stolonifera radix*, &c. On donne ce nom aux racines lorsqu'échappant traçantes, elles poussent çà & là des rejets rampans, qui portent eux-mêmes des racines, comme dans le chiendent.

On donne encore le même nom aux tiges (*caulifera*) lorsque du collet de la racine partent des rejets particuliers qui rampent, s'étendent au loin sur la terre, s'y attachent souvent par des toupets de racines, & reproduisent ainsi de nouvelles plantes, comme dans le fraiset, la bugle rampante, la violette odorante, &c.

STRAMOINE. *Datura*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des solanées, qui a des rapports avec les *nicotiana*, & qui comprend des herbes & même des arbrustes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, à odeur forte, dont les feuilles sont géminées dans quelques espèces, les fleurs très-grandes & belles dans d'autres, fructées latéralement au dehors des aisselles des feuilles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, anguleux; une corolle infundibuliforme & plissée; cinq étamines; un style; un stigmate à deux lames; une capsule presqu'à quatre loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, oblong, tubuleux, ventru, à cinq angles, à cinq dents, caduc, dont la base est presque orbiculaire & persistante.

2°. Une *corolle* monopétale, souvent très-grande, en forme d'entonnoir, dont le tube est cylindrique, à peine plus long que le calice; le limbe un peu campanulé, à cinq plis, à cinq lobes peu marqués; les lobes acuménés.

3°. Cinq *étamines* adhérentes au tube de la corolle, dont les filamens sont subulés, plus courts que la corolle, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un *ovaire* supérieur, ovale, surmonté d'un style droit, filiforme, un peu plus long que les étamines, terminée par un stigmate un peu épais, obtus, à deux lancés.

Le fruit est une capsule un peu charnue, ovale, hérissée de pointes roides, plus ou moins piquantes ou glabres; à demi-divisée en quatre loges, posée sur la base du calice.

Des *semences* nombreuses, réniformes, attachées sur des placentas faillans, épais, convexes, ponctués, attachés à la cloison.

Observations. Les *datura* peuvent être considérés comme un genre assez naturel, quoiqu'il soit susceptible de quelques divisions qui pourroient aider l'établissement de nouveaux genres. Les capsules en fourniroient les principaux caractères; deux cloisons en croix, qui se coupent à angles droits, & dont une n'occupe souvent que la moitié inférieure de la capsule, paroissent y établir quatre loges; mais cette capsule, marquée assez généralement de quatre sillons à l'extérieur, ne s'ouvre guère qu'en deux valves dans toute sa longueur, & chacune de ces valves se fend en deux à sa partie supérieure, rarement dans toute sa longueur, de sorte que l'on pourroit dire de certaines espèces, qu'elles ont des capsules à quatre valves & à deux loges à leur moitié supérieure, à deux valves, à quatre loges à leur moitié inférieure. L'une des cloisons parvient au sommet de la capsule; l'autre n'atteint que sa moitié. Quelques variations dans la disposition des loges & l'ouverture des valves ne me paroissent pas suffisantes pour la création de genres nouveaux, surtout lorsqu'il s'agit de démembrer un genre naturel & peu nombreux en espèces.

Les *atropa*, les *physalis*, ont beaucoup de rapport avec les *datura* lorsqu'on ne considère que leur port, mais ils ont des baies pour fruits, & présentent d'autres différences non moins tranchantes dans leurs fleurs. Les *datura* font, par leur fructification, beaucoup plus rapprochés des *nicotiana*, quoiqu'ils y conviennent moins par leur port.

* *Capsules hérissées de pointes.*

1. STRAMOINE commun. *Datura stramonium*. Linn.

Datura pericarpis spinosis, erectis, ovatis; foliis ovatis, glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 235. — Hort. Cliff. 55. — Hort. Ups. 43. — Flor. suec. 185. 195. — Gronov. Virgin. 23. — Oeder. Flor. dan. tab. 436. — Blackw. t. 313. — Gmel. Itin. vol. 1. pag. 43. — Pollich, Pal. n°. 224. — Bull. Herbar. tab. 13. — Hoffm. Germ. 77. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 92. — vol. II. pag. 236. — Gært. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 243. tab. 142. fig. 4. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 8. n°. 2289. tab. 113. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 187. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1008. n°. 2. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 125. — Curtis, Flor. lond. Icon. — Flor. peruv. pag. 15.

Datura capsulis ovatis, spinosis, erectis; foliis glabris, ovatis, multangulis. Lam. Ill. l. c.

Stramonium foliis angulosis; fructu erecto, muricato; calice pentagono. Hall. Hist. n°. 586.

Solanum fetidum, pomo spinoso, oblongo; flore albo. C. Bauh. Pin. 168.

Stramonium fructu spinoso, oblongo; flore albo. Tournef. Inst. R. Herb. 119. tab. 43.

Solanum maniacum. Col. Phytob. 47. Icon.

Datura Turcarum. H. Cyth. aurum. 2. pag. 12. fig. 1.

Stramonium spinosum. Gerard. Hist. 348. Icon.

Datura. Chuf. Exot. 289. Icon.

Tatula. Camer. Epitom. 176. Icon.

Stramonium spinosum. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 256.

Stramonium fetidum. Scopol. Carn. edit. 2. n°. 252.

Stramonium vulgatum. Gært. l. c.

Stramonia eltera, major; five datura quibusdam. J. Bauh. Hist. 3. pag. 614. Icon.

Vulgairement la pomme épineuse, la stramoine. Regn. Botan. l'herbe aux forciers.

C'est une plante herbacée, mais forte & diffuse, dont les tiges sont glabres, droites, cylindriques, épaisses, creusées en dedans, très-branquées, hautes de deux ou trois pieds; les rameaux étalés, un peu comprimés, tors ou légèrement cannelés, garnis de feuilles amples, alternes, pétiolées, ovales, larges, glabres à leurs deux fa-

M m m 2

ces, vertes, molles, anguleufes & finuées à leurs bords; les angles très-pointus, inégaux.

Les fleurs font grandes, prefque folitaires, latérales; les unes dans la bifurcation des rameaux; les autres hors de l'aiffelle des feuilles, foutenues par des pédoncules épais, courts. Le calice eft long, à cinq angles, étroit, tubulé, à cinq dents aiguës; la corolle blanche ou un peu violette, en forme d'entonnoir, pliffée, une fois plus longue que le calice; la capfule droite, ovale, marquée de quatre fillons, hériffée de routes parts de pointes fortes, roides, très-aiguës, droites & piquantes, divifée inférieurement en quatre loges, & feulement en deux à la partie fupérieure; les femences noîrâtres, nombreuses, ovales, réniformes, un peu comprimées.

On foupçonne cette plante originaire de l'Amérique, aujourd'hui naturalifée partout en Europe, après y avoir été cultivée; elle eft également abondante dans les champs en Barbarie. ☉ (V. v.)

Cette plante eft un des plus puiffans narcotiques que l'on connoiffe, & en même tems un des plus dangereux. Ses femences infufées dans du vin produifent un fommeil léthargique. Les courtifans de l'Inde, & les voleurs du Malabar & de Canarie, d'après Acofta & Garer, font prendre à ceux qui ont le malheur de tomber entre leurs mains, un demi-gros de cette femence en poudre dans quelque liqueur agréable, afin de les jeter pendant quelque tems dans une forte de ftupeur léthargique, & de pouvoir profiter de leur délire pour les voler. On a prétendu il y a déjà quelques années, que des filous avoient employé à Paris cette même poudre mêlée avec du tabac, pour voler avec plus de facilité. L'on m'a affuré que les habitans de certains villages, dans la ci-devant Champagne, donnoient tous les jours plein un dex à coudre de ces femences aux cochons qu'ils vouloient engrailfer; que ces animaux acquiesçoient par-là un appétit plus vif, dormoient plus long-tems, & parvenoient en peu de tems à un embonpoint confidérable.

Les feuilles ont, ainfi que toute la plante, une odeur forte, puante, affoupiffante: leur ufage intérieur occafionne des accidens fâcheux, des vomiffemens, la foif, la léthargie, des fucs froides, des convulfions, & même la mort fi l'on n'eft promptement fecouru; que ces animaux acquiesçoient par-là un appétit plus vif, dormoient plus long-tems, & parvenoient en peu de tems à un embonpoint confidérable.

Les feuilles ont, ainfi que toute la plante, une odeur forte, puante, affoupiffante: leur ufage intérieur occafionne des accidens fâcheux, des vomiffemens, la foif, la léthargie, des fucs froides, des convulfions, & même la mort fi l'on n'eft promptement fecouru; que ces animaux acquiesçoient par-là un appétit plus vif, dormoient plus long-tems, & parvenoient en peu de tems à un embonpoint confidérable.

leur involontaires, l'épilepfie, &c. L'ufage de ce remède donne une faim très-vorace. Son extrait a été prefcrit intérieurement depuis un grain jufqu'à douze dans les maladies fpafmodiques les plus violentes, &c.; mais ce remède porte à la tête, produit la dilatation de la prunelle, rend le pouls petit & vif, caufe la foif, le refserrement de la gorge, échauffe beaucoup, & ne doit être donné qu'avec ménagement. Il faut furtout prendre garde d'augmenter la dofe lorsqu'il dilate la prunelle. Son ufage extérieur eft bien plus fouverain employé, & moins dangereux. Toute la plante, pilée avec le faindoux, fait un onguent propre à calmer les douleurs de la brûlure & celles des hémorroïdes; elle eft anodine, réfolvative & adouciffante.

2. STRAMOINE féroce. *Datura ferox*. Linn.

Datura pericarpis spinofa, erectis; spinis fummis, maximis, convergentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 255. — Amerc. Acad. vol. 3. pag. 403. — Mill. Dict. n°. 4. — Lam. Illust. Gén. vol. 2. pag. 8. n°. 1288. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1607. n°. 1.

Datura cochinejis, spinoffima. Zanon, Hift. 1. pag. 76.

Stramonium seu datura ferox, pomo crassioribus aculeis, robustioribus. Herm. Lugd. Bat. 183. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 607. §. 15. tab. 2. fig. 4. — Rai, Hift. 748.

Stramonium ferox. Bocc. Sic. 50. tab. 26. — Tourn. Infl. R. Herb. 119.

Stramonium longioribus aculeis. Barrel. Icon. Rar. n°. 109. tab. 1172.

Cette efèce diffère peu de la précédente, & pourroit bien en être une fimple variée; elle en diffère par les piquans de fes capfules plus forts, & furtout par la longueur des quatre derniers, & par fes feuilles un peu moins glabres.

Ses tiges font épaiffes, cylindriques, prefque glabres, très-rameufes; les rameaux diffus, alternes, ftriés, un peu rudes, garnis de feuilles pétioles, alternes, ovales, en général plus larges & plus courtes que celles de l'efèce précédente, moins profondément finuées, anguleufes à leurs bords; les angles courts, inégaux, aiguës; les principales nervures un peu pubefcentes; les pétioles médiocres, comprimés, un peu ciliés à leurs bords.

Les fleurs font latérales & folitaires, médiocrement pédonculées; les pédoncules un peu velus, droits, fermes; le calice tubulé, un peu pubefcent, à cinq angles peu marqués, terminés par autant de dents droites, aiguës; la corolle blanche ou un peu violette, pliffée, un peu plus petite que celle de l'efèce précédente; le limbe

terminé à chaque pli par une pointe courte; les capsules droites, ovales, armées de pointes très-fortes, épaissies; les quatre dernières convergentes, plus longues & plus fortes que les autres.

Cette plante croît à la Chine. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.) Ses propriétés sont les mêmes que celles qui ont été exposées à la suite de l'espèce précédente.

3. STRAMOINE pourprée. *Datura tatula*. Linn.

Datura pericarpis spinosis, erectis, ovatis; foliis cordatis, glabris, dentatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 256. — Mill. Dict. n°. 2. — Roth. Germ. vol. 2. pag. 237. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 108. n°. 3.

Datura capulis ovatis, spinosis, erectis; foliis glabris, angulatis; caule purpurascens. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 8. n°. 2290.

Stramonium majus, purpureum. Rai, Lint. 748.

Solanum sativum, purpureo spinoso, oblongo; flore albo. C. Bauh. Pin. 168. ?

β. *Datura* (dubia), *foliis ovato-lanceolatis, indivisis, fetuosis*. Perfoon, Synops. Plant. vol. 1. pag. 216.

Cette espèce tient, par son port, au *datura stramonium*, & par la grandeur de ses fleurs, au *datura fastuosa*; elle offre néanmoins des différences suffisantes pour la distinguer de toutes deux.

Ses tiges sont hautes, droites, cylindriques, rameuses; les tameaux dressés, allongés, étalés, de couleur purpurine, très-lisses, parsemés de points blanchâtres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, grandes, ovales-oblongues, presque en cœur, anguleuses à leurs bords, glabres à leurs deux faces; les angles plus lâches, courts, presque en dents. Les fleurs sont solitaires, latérales, terminées par cinq dents droites, aiguës; la corolle blanche, une fois au moins plus longue que le calice, de couleur blanche ou d'un bleu-pâle; le limbe plissé, chaque pli prolongé par une petite dent aiguë; les capsules droites, ovales, chargées d'épines droites, fermes, piquantes.

On la soupçonne originaire de l'Afrique; elle se cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

La plante β n'est probablement qu'une variété obtenue par la culture, & qui tient le milieu entre cette espèce & le *datura fastuosa*. Ses feuilles sont plus étroites, ovales-lanceolées, très-entières à leurs bords, pétiolées. Son lieu natal n'est pas connu; elle a été observée par M. Perfoon, dans l'herbier de M. Richard.

4. STRAMOINE fastueuse. *Datura fastuosa*. Linn.

Datura pericarpis tuberculatis, nutantibus, globosis; foliis ovatis, angulosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 256. — Mill. Dict. n°. 6. — Sabbat. Hort. 1. tab. 93. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1008. n°. 4.

Datura (fastuosa), *capulis globosis, tuberculatis, nutantibus; foliis angulatis, caulescens purpurascens*. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 8. n°. 2291.

Datura rubra. Rumph. Amboin. vol. 5. tab. 243. fig. 2.

Solanum fetidum, fructu spinoso, rotundo; semine pallido. C. Bauh. Pin. 168.

Siramonia aegyptiaca, fetida, semine pallido; pomo spinoso, rotundo; flore violaceo. Hort. Lugd. Bat.

Stramonium fructu spinoso, rotundo; flore violaceo, simplici. Tourn. Inst. R. Herb. 118.

Nux metella. Camer. Epit. 175. Icon.

β. *Solanum aegyptiacum, flore pleno*. C. Bauh. Pin. 168.

Stramonium fructu spinoso, rotundo; flore violaceo, duplici triplicite. Tourn. Inst. R. Herb. 119. — Knorr. Del. 1. tab. 5. 11.

Siramonia aegyptiaca, fetida, semine pallido; pomo spinoso, rotundo; flore violaceo, duplici triplicite. Hort. Lugd. Bat.

Datura, o vero stramonio d' Egitto, con fior pieno. Pon. Ital. 61.

Stramonium sive datura aegyptiaca, flore pleno. Pons. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 15. tab. 1. fig. 9.

γ. *Stramonium aegyptiacum, flore pleno, intus albo, foris violaceo*. Tourn. Inst. R. Herb. 119.

δ. *Solanum aegyptiacum, flore pleno*. C. Bauh. Pin. 168.

δ'. *Datura fastuosa, capulis muticis*. (N.)

Vulgairement la trompette du jugement.

Il y a beaucoup de rapport entre cette espèce & le *datura tatula*; ses fleurs sont plus grandes, remarquables par leurs couleurs, & dont la corolle est quelquefois double ou triple; les capsules globuleuses & inclinées, quelquefois presque glabres, caractères suffisants pour la faire distinguer du *datura tatula*.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, dressées en rameaux étalés, striés ou un peu anguleux, d'un brun-rougeâtre, parsemés de points ou de lignes blanches, garnis de feuilles pétiolées alternes ou presque opposées, particulièrement celles du haut; ovales, un peu oblongues, qu'acuminées à leur sommet, glabres à leurs faces, un peu rudes au toucher, meui

anguleuses à leurs bords, quelquefois presque entières ou un peu sinuées.

Les fleurs sont solitaires dans la dichotomie des rameaux, ou latérales, pédonculées; les pédoncules courts, droits pendant la floraison, recourbés à l'époque de la maturité. Le calice est un peu lâche, long, tubule, flé, anguleux, droit, glabre, verdâtre ou plus souvent de couleur purpurine, divisé à son orifice en cinq découpures ovales, élargies; la corolle grande, longuement tubuleuse, blanche en dedans, de couleur violette en dehors; le tube au moins une fois plus long que le calice; le limbe large, médiocrement ouvert, terminé par cinq pointes en lanières, acuminées; souvent une seconde & même une troisième corolle sont renfermées dans la première, qu'elles dépassent d'un à deux pouces, d'où résultent des variétés très-agréables, & qui donnent à ces fleurs l'aspect de deux ou trois trompettes contenues l'une dans l'autre. Les capsules sont inclinées, globuleuses, tuberculées, médiocrement épineuses, quelquefois entièrement muriques.

Cette espèce est originaire de l'Égypte; elle se cultive dans plusieurs jardins comme plante d'ornement. ○ (V. v.)

5. STRAMOINE pubescente. *Datura metel*. Linn.

Datura pericarpia spinosa, nasantibus; globosis; foliis cordatis, subintegris, pubescentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 256. — Hott. Cliff. 55. — Hort. Ups. 44. — Flor. zeyl. 86. — Mater. med. 64. — Roy. Lugd. Bat. 422. — Miller, Dict. n.º 3. — Fabric. Helmst. pag. 239. — L'atw. Ecl. tab. 158. — Kniph. Cent. 1. tab. 24. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1009. n.º 5.

Datura capsulis globosis, spinosis, nasantibus; calice tereti; foliis subintegris, pubescentibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 8. n.º 2292.

Datura alba. Rumph. Amb. vol. 5. pag. 242. tab. 87.

Salanum pomo spinoso, rotundo; longo flore. C. Bauh. Pinn. 163.

Stramonium fructu spinoso, rotundo; flore albo, simplici. Tourn. Inst. R. Herb. 118.

Stramonia multis diſſa, sive pomum spinosum. J. Bauh. Hist. 3. pag. 624. Icon.

Stramonia. Dod. Pempt. 460. — Dalech. Hist. 1. pag. 629. Icon.

Hummata. Rheed, Malabar. vol. 2. pag. 47. tab. 28.

Stramonium peregrinum. Lobel. Icon. 264. & Advers. pag. 136. Icon.

C'est de tous les *datura*, l'espèce qui a l'odeur la

plus désagréable; elle se distingue à ses feuilles presque entières, revêues, ainsi que les tiges, d'un duver blanchâtre, cendré.

Ses tiges sont hautes d'environ trois pieds, fortes, cylindriques, rameuses; les rameaux alternes, longs, diffus, un peu canelés, velus & pubescens, garnis de feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales, un peu aiguës, inégales à leur base, un peu pubescentes à leurs deux faces, d'un vert-blanchâtre, entières ou légèrement sinuées à leur contour, supportées par des pétioles inégaux, quelquefois presque aussi longs que les feuilles, comprimés, velus ou pubescens.

Les fleurs sont, ou latérales, ou situées dans la bifurcation des rameaux, légèrement pédonculées, longs d'un pouce & plus, épais, velus, droits pendant la floraison, penchés à l'époque de la maturité. Le calice est long de trois pouces, lâche, tubulé, cylindrique, point anguleux, d'un vert-blanchâtre, un peu pubescent, quelquefois un peu rétréci vers son orifice, où il se divise en cinq découpures lancéolées, aiguës. La corolle est fort grande & belle, très-blanche, un peu verdâtre à sa partie inférieure, traversée dans sa longueur par des stries ou des lignes jaunâtres; le tube au moins une fois plus long que le calice, insensiblement élargi; le limbe ample, plissé; chaque pli terminé par une dent courte, aiguë; les capsules inclinées, globuleuses, chargées d'aiguillons épineux.

Cette plante croît dans les Indes & en Afrique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Ce seroit une belle plante d'ornement sans son odeur forte & extrêmement désagréable. ○ (V. v.)

Ses propriétés sont les mêmes que celles dont il a été fait mention à la suite de la stramoine commune.

* * Capsules lisses ou sans aiguillons.

6. STRAMOINE lisse. *Datura levis*. Linn.

Datura pericarpia glabris, inermibus, erectis; foliis glabris; caule fistuloso, herbaceo. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 239. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1009. n.º 6.

Datura (levis), pericarpia ovatis, glabris, inermibus, erectis; caule herbaceo. Linn. f. Suppl. pag. 146. — Lam. Ill. Gener. vol. 2. pag. 8. n.º 2293.

Datura inermis. Jacq. Hott. vol. 3. pag. 44. tab. 82.

Cette espèce a le port de toutes celles que nous avons vues jusqu'à présent; elle s'en distingue par ses capsules glabres, dépourvues d'épines & de tubercules.

Ses tiges sont herbacées, verdâtres, cylindri-

ques, filiculeuses, glabres, hauteurs environ trois pieds, rameuses; les rameaux alternes, très-étalés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, amples, glabres à leurs deux faces, ovales, sinuées ou dentées à leur contour, un peu molles. Les fleurs sont latérales, solitaires, pédonculeuses, grandes, blanches, assez semblables à celles du *datura tatula*; les capsules droites sur leur pédoncule, ovales, sans apertures, très-glabres, s'ouvrant en quatre valves.

Cette plante croît en Afrique, dans l'Abyssinie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

Elle est aussi dangereuse que la plupart des précédentes.

7. STRAMOINE en arbre. *Datura arborea*. Linn.

Datura pericarpis glabris, inermibus, nutantibus, caule arboresc. Linn. Spec. Plant. pag. 157. — Mill. Dict. n°. 7. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1009. n°. 7.

Datura capsulis globofo-ovatis, inermibus, nutantibus; caule arboresc. erecto. Lam. Illustr. Genet. vol. 2. pag. 9. n°. 2294.

Stramonioideis arboreum, oblongo & integro folio, fructu lcvi. Feuillée, Peruv. vol. 2. pag. 761. tab. 46.

Brugmansia (candida), floribus pendulis. Pers. Synop. Plant. vol. 1. pag. 216.

Datura (arborea), pericarpis glabris, inermibus, oblongis, pendulis; foliis ovato-lanceolatis oblongisque, geminis; caule fruticoso. Ruiz & Pav. Flor. peruv. pag. 16. tab. 128.

C'est une des plus brillantes espèces de ce genre, qui produit un très-bel effet par ses grandes & longues fleurs pendantes, d'un blanc-éclatant. Elle forme un bel arbrisseau, dont les tiges sont droites, épaisses, cylindriques, hautes de six à sept pieds, divisées à leur partie supérieure en rameaux étalés, garnis de feuilles pétiolées, geminées, ovales-lanceolées, oblongues, glabres à leurs deux faces (cendrées & pulvérulentes dans leur pays natal, d'après Feuillée).

Les fleurs sont très-grandes, longues d'environ un pied, tout-à-fait pendantes sur leur pédoncule, blanches, répandant, surtout vers le soir, une odeur assez agréable. Leur calice est long, cylindrique, persistant; il se fend latéralement dans toute sa longueur; la corolle tubulée, infundibuliforme, élargie à son limbe, plissée, renfermant cinq étamines, dont les anthères sont agglutinées; les capsules pendantes, ovales, oblongues, très-glabres, à deux loges.

Cette plante croît naturellement au Pérou. On

la cultive aujourd'hui dans presque tous les jardins, comme un arbrisseau d'ornement. h (V. v.)

8. STRAMOINE sanguine. *Datura sanguinea*. Ruiz & Pav.

Datura pericarpis inermibus, oblongo-cylindricis, pendulis; foliis lanceolatis, angulatis, congestis; caule fruticoso. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 15.

Brugmansia (bicolor), foliis congestis, corollis varicolore. Pers. Synop. Plant. vol. 1. pag. 216. n°. 2.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de vingt-cinq pieds environ, dont la tige est droite, épaisse, très-rameuse vers son sommet; les rameaux fragiles, cylindriques, feuillés à leur partie supérieure; les feuilles réunies par fascicules au nombre de quatre, cinq ou six, pétiolées, lanceolées; les inférieures anguleuses; les supérieures très-entières, glabres & luisantes en dessus, légèrement pubescentes en dessous; les pétioles cylindriques, deux fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont grandes, solitaires, pendantes, situées à l'extrémité des rameaux; leur pédoncule simple, uniflore, recourbé; le calice ovale, à cinq angles, long d'un pouce, coloré, panaché; la corolle quatre fois plus longue que le calice, jaune depuis sa base jusque vers son milieu, rouge à sa partie supérieure, traversée par environ quinze lignes longitudinales d'un rouge de sang. Le fruit est une capsule oblongue, cylindrique, pendante, longue de trois à quatre pouces, entièrement dépourvue d'épines.

Ce bel arbre croît au Pérou, dans les lieux élevés, froids & incultes; il fleurit tout l'été. h (Descript. ex Ruiz & Pav.)

Les feuilles sont émollientes. Brochées avec de la graisse de porc, elles excitent la suppuration & détergent les ulcères. Ses semences sont narcotiques, enivantes.

9. STRAMOINE sarmenteuse. *Datura sarmentosa*. Lam.

Datura capsulis globofo-conicis, inermibus; caule fruticoso, sarmentoso, scandente. Lam. Illustr. Genet. vol. 2. pag. 9. n°. 2295.

Solanum grandiflora. Swartz, Act. Holm. Ann. 1787. pag. 300. tab. 11. — Idem, Flot. Ind. occid. vol. 1. pag. 387. tab. 9. & Prodr. pag. 42. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 936. — Pers. Synop. Plant. vol. 1. pag. 218.

Eadem, foliis utrinque globerrimis. Lam. Illustr. Genet. l. c.

C'est un très-bel arbrisseau, dont on avait cru devoir faire un genre particulier que Swartz avait

dédié à M. Solandier sous le nom de *Solandra*. Nous avons décrit sous ce nom une autre plante qui appartient à la famille des malvacées. Quant à celle-ci, elle appartient évidemment au genre des *Datura*, quoiqu'elle s'en écarte par son port.

Ses tiges sont très-longues, rameuses, farmentueuses, grimpantes, ligneuses, glabres, cylindriques, garnies de feuilles ovales, entières, glabres à leur face supérieure, pubescentes en dessous, ciliées à leurs bords, quelquefois entièrement glabres. Les fleurs sont latérales, solitaires, grandes, pédonculées; le calice allongé, cylindrique, se déchirant latéralement; la corolle très-grande, blanche, lavée d'une teinte pourpre, quelquefois un peu jaunâtre, en forme d'entonnoir; le tube long, étroit, élargi en tête de clou vers son orifice; le limbe divisé à ses bords en lobes non acuminés, crépus, frangés; les capules glabres, globuleuses, un peu coniques, sans pointes ni aiguillons, partagées en quatre loges, contenant des semences nombreuses.

Cette plante croît à la Jamaïque & au Pérou, dans les fentes des rochers, sur les grands arbres, auxquels elle s'accroche comme une plante parasite. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

10. STRAMOINE cornu. *Datura ceratocaula*. Ortega.

Datura pericarpis obovatis, inermibus, pendulis; foliis ovato-lanceolatis, undulatis, subius tomentosis; caulibus dichotomis, corniformibus. Ortega. Decand. pag. 11. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 216. n°. 7.

Datura (macrocaulis), foliis oblongis, repandis, subius sericeis; caule herbaceo, inferius piloso, superius glabro, subinflato. Roth. N. Bot. Beytt. pag. 159. & Jacq. Icon.

C'est une plante herbacée, qui produit plusieurs tiges droites, étalées, épaisses, cylindriques, rameuses, dichotomes, à deux cornes, glabres, purpurines, couvertes d'un nuage glauque, nues à leur face inférieure; les rameaux situés à leur partie supérieure, grêles, flexueux; les feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales-lancéolées, inégales à leur base, sinuées, ondulées, veinées, tomenteuses en dessous; les inférieures ovales; les supérieures ovales, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont solitaires, situées entre les feuilles & les rameaux, soutenus par des pédoncules courts, uniflores, épaissis à leur partie supérieure, droits quand les fleurs sont épanouies, réfléchis à l'époque de la maturité. Le calice est tubulé, nerveux, un peu courbé, très-entier, fendu latéralement; la corolle trois fois plus longue que le calice; le tube courbé, à cinq angles, à cinq

filons, verdâtres, le limbe grand, étalé, de couleur blanche; les angles violets; dix dents au sommet du limbe; cinq filaments un peu plus courts que la corolle; les anthères tétragones, ovale, obtuses, sans aucune pointe ni aspérité, pendante, de la grosseur d'une forte noix.

Cette plante croît à l'île de Cuba. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

STRATIOTE *Stratium*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs spathacées, de la famille des *morines*, qui à des rapports avec les *valisneria* & les *hydrocharis*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, aquatiques, dont les feuilles sont vaginales, radicales; les hampes uniflores.

Le cataclisme essentiel de ce genre est d'avoir :

Une spathe uniflore, à deux divisions; un calice trifide; une corolle à trois pétales; environ vingt étamines; six styles; une baie à six angles, à six loges; des semences nombreuses.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Une spathe comprimée, persistante, divisée en deux découpures très-profondes, courbées en carène, à une seule fleur.

Un calice adhérent avec l'ovaire, droit, monophylle, un peu tubulé, à trois découpures courtes.

2°. Une corolle adnée au calice, à trois divisions très-profondes, une fois plus grandes que le calice, planes, en cœur renversé.

3°. Environ vingt étamines, dont les filaments sont courts, insérés sur le sommet du tube de la corolle, terminés par des anthères droites, simples, allongées; souvent plusieurs filaments stériles.

4°. Un ovaire ovale, surmonté de six styles de la longueur des étamines, fendus longitudinalement, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une baie ovale, charnue, amincie à ses deux extrémités, à six faces, à six loges, qui contiennent, dans une substance pulpeuse, des semences nombreuses, un peu anguleuses, attachées aux parois des valves; l'embryon situé à la base d'un périsperme charnu.

Observations. Ce genre est aujourd'hui réduit à deux espèces. Linné en avait ajouté une troisième sous le nom de *stratium alismoides*, Rheed, vol. 11, tab. 46. Des observations postérieures ont fait reconnaître qu'elle ne pouvoit appartenir à ce genre. Elle se trouve dans Willdenow sous la dénomination de *damafonium indicum*, vol. 2, pag. 177, & dans

dans le *Synopsis Plantarum* de M. Perfoon, vol. 1, pag. 400, sous celle d'*ostia alismoides*. Son caractère générique essentiel est d'avoir une spathe d'une seule pièce, à cinq ailes; un calice lupé-rieur, à trois découpures; une corolle à trois pé-tales; six étamines; six filles; une baie à six loges, contenant plusieurs graines. Nous y revien-drons dans le Supplément, à l'article OTTEITA.

ES P È C E S.

1. STRATIOTE aloïde. *Stratiotes aloides*. Linn.

Stratiotes foliis ensiformi- triangulari, ciliato-acu-tatis. Linn. Syst. veget. pag. 506. — Spec. Plant. 754. — Miller, Dict. n°. 1. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 2. — Bergen. in Nov. Act. A. N. C. tom. 1. pag. 150. — Scholl. Barb. n°. 419. — Mattuich. Sil. n°. 388. — Miller, Illustr. Icon. — Gœrt. Flor. dan. tab. 337. — Lam. Ill. Geuer. tab. 489. — Gœrt. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 45. tab. 14. fig. 8. — Dec. Flor. franç. vol. 3. pag. 266.

Stratiotes. Zinn. Comm. Gœrt. 1753. vol. 3. pag. 425. tab. 9, 10.

Stratiotes. Flor. lapp. 221. — Flor. suec. 444. 479. — Hort. Clift. 221. — Roy. Lugd. Bat. 10. — Gœrt. Geir. 313.

Aloides. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 132.

Aloe palustris. C. Bauh. Pin. 185.

Stratiotes militaris aloïdes. Lobel. Observ. pag. 204. Icon. & Advers. 334.

Stratiotes aquaticus. Dalech. Hist. 1. pag. 1061. Icon.

Cette plante, par le port & la forme de ses feuilles, ressemble presque à un aloë; elle flotte dans les eaux stagnantes. Ses racines sont compo-sées de longues fibres simples, cylindriques, ter-minées par une touffe de chevelus. Du collet des racines sortent des feuilles nombreuses, étroites, allongées, aiguës, presque ensiformes, glabres, d'un vert foncé, épaisses, imbriquées & formant une rosette touffue, garnies à leurs bords de dents épi-neuses.

Du centre de ces feuilles s'élèvent des hampes droites, comprimées, glabres, soutenant à leur sommet une fleur blanche, droite, enveloppée à sa base par une spathe bifide, aiguë, en forme de carène, denticulée sur le dos. Le calice est ver-dâtre, à trois divisions courtes; la corolle à trois découpures profondes, élargies en ovale, obtu-ses, un peu arrondies. Le fruit se courbe forte-ment vers l'époque de sa maturité; c'est une baie charnue, aiguë à ses deux extrémités, à six angles, à six loges.

Cette plante croît dans les fossés & les canaux de la Flandre, de la Belgique, & dans plusieurs Botanique. Tome VII.

autres contrées de l'Europe septentrionale. & (V. f.)

2. STRATIOTE acoroïde. *Stratiotes acoroides*. Linn. f.

Stratiotes foliis ensiformibus, planis, glaberrimis; spathe apice barbata. Linn. f. Suppl. pag. 269.

Acorus marinus. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 191. tab. 75. fig. 2.

Ses racines, dit Linné fils, sont rampantes, mé-diocrement rameuses, articulées comme celles de l'*Acorus*; elles produisent des feuilles toutes radica-les, nombreuses, fermes, planes, linéaires, acron-dies à leur sommet, très entières, médioc-rement dentées à leurs bords, un peu coriaces, longues de quatre pieds, à bordure élevée; des gaines membraneuses, fort tendres, adnées aux feuilles. Les hampes sont très-simples, droites, solitaires, filiformes, glabres, nues, uniflores, un peu épaisses à leur partie supérieure, hautes de trois ou quatre pieds, sortant d'entre les feuilles.

La fleur est accompagnée d'une spathe linéaire, comprimée, d'un vert très-foncé, à deux folioles membraneuses, ouvertes, plées, obtuses, en ca-rène, & chargées à leur sommet de plusieurs petites fibres. Le calice, plus court que la corolle, est à trois folioles concaves, membraneuses, d'un vert-obscure, parsemées de points rougeâtres; la co-rolle composée de trois pétales mous, linéaires, aigus, blancs, ondulés & plissés, d'un rouge-foncé, particulièrement à leur sommet; des fila-mens presque nuls; douze anthères linéaires, acuminées, comprimées, alternativement plus courtes, velues, verdâtres en dedans, ponctuées de points rougeâtres; l'ovaire linéaire, comprimé, vert, jaunâtre à sa base, entouré d'écaillés im-briquées & frangées. Le fruit est un drupe ovale, comprimé, hérissé de fibres, de la grosseur d'un œuf de poule, à quatre ou six loges.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de Ceilan. (Descript. ex Linn. f.)

STRELITZ. *Strelitzia*. Genre de plantes mono-cotylédones, à fleurs irrégulières, de la famille des bananiers, qui a des rapports avec les *heli-conia*, qui comprend des herbes exotiques, dont les fleurs sont belles, grandes, spathacées; les feuilles simples, radicales; les hampes environnées de gaines alternes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Une corolle à six divisions très-irrégulières; trois extérieures plus grandes, très-aiguës; trois intérieures; deux plus longues, obtuses; la troisième très-courte, tronquée; cinq étamines; trois stigmates très-longi; une capsule à trois loges polyspermes.

Non

Chaque fleur offre :

1°. Point de *calice* ; une spathe générale , horizontale , concave , naviculaire , aiguë ; d'autres partielles , en forme de bractées petites , allongées , presque membraneuses.

2°. Une *corolle* à six divisions très-inégaux ; trois extérieures fort grandes , presque égales , allongées , acuminées , canaliculées ; la troisième écartée des deux autres ; trois intérieures très-irrégulières ; l'une plus courte , à la base des deux autres , presque en capuchon à son sommet , distillant une liqueur mielleuse ; les deux autres beaucoup plus longues , très-étroites à leur base , courbées en gouttière à un de leurs bords , munies d'un appendice à l'autre bord , ondulées & tronquées à leur sommet , conniventes & tubulées à leur base.

3°. Cinq *étamines* insérées dans l'intérieur du tube , dont les filaments sont filiformes , terminés par des anthers droites , fort longues.

4°. Un *ovaire* enveloppé par la base du tube intérieur de la corolle , surmonté d'un style simple , de la longueur des étamines , terminé par trois longs stigmates rapprochés , très-longues , subulés.

Le fruit est une capsule coriace , oblongue , à trois faces , à trois loges , à trois valves , contenant des semences nombreuses , disposées sur deux rangs & attachées à un placenta central.

Observations. Ce genre , que ses principaux caractères doivent faire placer dans la famille des bananiers , s'en écarte par ses cinq étamines au lieu de six. M. Ventenat regarde comme une sixième étamine stérile la rainure qui se trouve sur la plus courte des divisions intérieures de la corolle : il est d'ailleurs difficile de trouver un genre mieux tranché que celui-là. Le nom que portent les différentes enveloppes de la fleur dépend de la manière de voir de chaque auteur ; c'est ainsi que , pour Linné , les trois pétales extérieurs forment la corolle ; les intérieurs , le nectaire. On fait que M. de Jussieu n'admet point de corolle dans cette famille , ainsi que dans les lilacées. Ce genre , que M. Banks a fait connoître le premier , porte le nom de la reine d'Angleterre , à laquelle il a été consacré.

ESPÈCES.

1. *Strelitzia regina*. Aiton.

Strelitzia foliis parallelo-costatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1190. n°. 1. — Lam. Ill. Genet. tab. 148. — Redcuté , Liliac. tab. 77. 78.

Strelitzia regina. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 285. tab. 2. *

Strelitzia regina. Thunb. Prodr. pag. 45. *Nomen, non diagnosis.*

Heliconia alba. Linn. f. Suppl. pag. 157. *Diagnosis & patria, non nomen.*

Heliconia bihai. Linn. f. Suppl. pag. 157. *Description, nec nomen, nec diagnosis.*

C'est une plante d'une grande beauté , qui réunit la singularité des formes , & les couleurs les plus éclatantes : il s'élève de sa racine plusieurs feuillets droites , fermes , coriaces , d'un vert-pâle , ovales , oblongues , presque en forme de cuiller , glabres , un peu crépées à leur base , traversées par une forte nervure à ramifications parallèles , hautes de trois à quatre pieds ; les pétioles presque cylindriques , creusés en gouttière. Les hampe sortent du milieu des feuilles ; elles sont à peu près de même longueur , glabres , cylindriques , environnées d'écaillés vaginales , alternes , imbriquées , aiguës à leur sommet , un peu rougeâtres à leurs bords ; la dernière , qui tient lieu de spathe , se trouve dans une position horizontale par la courbure du sommet de la hampe ; elle est longue de cinq à six pouces , concave , en forme de nacelle , aiguë.

Les fleurs sortent de la spathe supérieure , disposées en une sorte d'épi court , & ne se montrent que les unes après les autres. Chacune d'elles porte à sa base une petite bractée allongée ; elles ont une corolle à six divisions ; trois extérieures fort grandes , presque égales , d'une belle couleur jaune ; deux plus rapprochées ; la troisième plus écartée , creusée en gouttière , élargie & rejetée en dehors sur les côtés , traversée par une côte longitudinale , rétrécie en une longue pointe à son sommet ; les trois divisions intérieures d'une belle couleur bleue , très-inégaux , une plus courte , cachée à la base des deux autres , presque en forme de capuchon , & contenant une liqueur mielleuse ; les deux autres beaucoup plus longues , très-rétrécies à leur base , ondulées & courbées en gouttière à un de leurs bords , munies à l'autre bord d'un appendice , tronquées à leur sommet , conniventes dans presque toute leur longueur , & formant une gaine qui renferme les organes sexuels. Cinq étamines , dont les anthers sont très-longues ; l'ovaire connivent avec les régens floraux ; le style de la longueur des étamines , terminé par trois stigmates longs , subulés , de couleur violette. Le fruit est une capsule oblongue , obtuse , coriace , à trois angles obtus , à trois valves , à trois loges ; les semences nombreuses , attachées sur deux rangs à un placenta central.

Cette belle plante est originaire de l'Afrique ; elle croit dans les contrées peu éloignées du Cap de Bonne-Espérance. On la cultive dans la plupart des jardins botaniques de l'Europe ; elle fleurit pendant l'été , & la floraison dure long-temps à

cause de l'épanouissement successif de ses fleurs.
 * (V. v.)

1. *STRELITZ* élégant. *Strelitzia augusta*. Thunb.

Strelitzia foliis costatis, reticulato-venosis. Willd.
 Spec. Plant. vol. 1. pag. 1190. n°. 2.

Strelitzia augusta. Thunb. Prodr. pag. 45. *Nomen & patria, nec diagnosi.*

Heliconia alba. Linn. f. Suppl. pag. 157. *Nomen & patria, nec diagnosi.*

Heliconia (bihai), *foliis nervosis, reticulatis, basi attenuatis; nectario hirsuto*, Linn. f. Suppl. pag. 157. *Neque nomen, neque descriptio.*

Je ne fais que mentionner ici cette espèce, qui ne m'est point connue, & que, d'après Willdenow, Linné fils a prise à tort pour un *Heliconia*. Peut-être n'est-elle qu'une variété de l'espèce précédente : elle croît comme elle, au Cap de Bonne-Espérance. *

STREPTOPE. *Streptopus*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs liliacées, de la famille des asperges, qui a des rapports avec les *convallaria*, & qui comprend des herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont alternes, simples, amplexicaules; les fleurs solitaires & axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle profondément divisée en six découpures; six étamines; un style; des stigmates très-courts; une baie à trois loges; la cicatrice des semences nue.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Point de calice.

2°. Une corolle profondément divisée en six découpures droites, oblongues, lancéolées; une fossette intérieure à la base de chaque pétale.

3°. Six étamines, dont les filaments sont très-courts, un peu élargis; les anthères oblongues, droites, plus courtes que la corolle.

4°. Un ovaire presque rond, surmonté d'un style court, divisé en trois à sa partie supérieure, surmonté d'autant de stigmates très-courts.

Le fruit est une baie presque globuleuse, lisse, à trois loges, contenant plusieurs semences ovoïdes, dont la cicatrice est dépourvue d'arilles.

Observations. L'espèce qui a servi de type à ce genre, avoit été rangée parmi les *Uvularia*. Il étoit contre tous les principes reçus de laisser cette plante dans un genre dont elle n'a point les caractères, & qui même appartient, dans l'ordre

naturel, à une autre famille. Le fruit, dans les *Uvularia*, sort des capsules; dans celle-ci ce sont des baies, caractère qui les rapproche, ainsi que leur port, des *convallaria*, & qui dénote qu'elles doivent entrer dans la famille des asperges.

Michaux en a découvert deux nouvelles espèces, qui viennent se joindre à la première déjà connue. Il a établi la réforme dont nous venons de faire sentir la nécessité, & a nommé ce nouveau genre *Streptopus*, de deux mots grecs qui signifient pied ou pédoncule tort, parce qu'en effet la plupart offrent un pédoncule courbé & contourné vers leur milieu. Peut-être faudra-t-il rapporter ici quelques autres espèces d'*Uvularia* lorsque leur fructification sera mieux connue.

ESPÈCES.

1. **STREPTOPE amplexicaule.** *Streptopus amplexicaulis*.

Streptopus foliis amplexicaulibus caulique glabris. Willd.

Uvularia amplexifolia. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 93. n°. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 247. fig. 1.

Uvularia foliis amplexicaulibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 456. — Mill. Dict. n°. 1. — Hall. Helv. n°. 1257. — Matrusch. Sil. n°. 237. — Hoffm. Germ. 118.

Uvularia foliis cordato-oblongis. Royen, Lugd. Bat. 29.

Streptopus (distortus), glaber, foliis amplexicaulibus; pedicellis solitariis, medio distorto geniculatis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 200.

Streptopus amplexifolia. Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 174.

Smilax perfoliata, ramosa, flore albo. Bartel. Icon. Rar. pag. 58. n°. 601. tab. 719 & 720.

Polygonatum latifolium, ramosum. C. Bauh. Pin. 301. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 531. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 537. §. 13. tab. 4. fig. 11.

Polygonatum ramosum. Dod. Pempt. 346. Icon. Hypoglossum. Dalech. Hist. 1. pag. 107. Icon.

Polygonatum tertium. Clus. Pann. pag. 267. tab. 166.

Polygonatum latifolium, quartum, ramosum. Clus. Hist. 1. pag. 276. Icon.

Laurus alexandrina. Camer. Epit. 936.

Vulgairement sceau de Salomon, laurier alexandrin des Alpes.

Cette plante se rapproche, par son port, du

scieu de Salomon, *convallaria polygonatum*. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, fistuleuses, feuillées, hautes d'environ un pied, racines, garnies de feuilles sessiles, alternes, fortement amplexicaules, assez grandes, minces, ovales, très-aiguës, entières, glabres à leurs deux faces, sèches, nerveuses; les nervures un peu jaunâtres, parallèles.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, petites, blanchâtres, supportées par un pédoncule glabre, filiforme, pendant, coulé & tort dans son milieu; la corolle campanulée, à six découpures profondes, lancéolées, marquées chacune d'une petite fossette à leur base intérieure; les filaments des étamines très-courts. Le fruit est une baie globuleuse, qui devient rougeâtre en mûrissant.

Cette plante croît sur les montagnes, dans les départements méridionaux de la France, dans les Alpes, les Pyrénées, au mont d'Or, dans les forêts du Canada, &c. (V. v.)

2. STREPTOPUS à fleurs roses. *Streptopus roseus*. Mich.

Streptopus glaber, lucidus, foliis amplexicaulibus, ferrulato-ciliolatis; floribus roseis; antheris brevibus, bicornibus. Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 201. tab. 18.

Cette espèce, distinguée par les fleurs de couleur de rose, a ses tiges droites, glabres, cylindriques, un peu flexueuses à leur sommet, garnies de feuilles alternes, sessiles, à demi-amplexicaules, ovales, lancéolées, luisantes, glabres à leurs deux faces, nerveuses, très-aiguës à leur sommet, très-finement dentées en scie ou un peu ciliées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires, axillaires, situées à la base des feuilles, supportées par un pédoncule simple, filiforme, pendant, long d'environ un pouce & plus, tois & coulé dans son milieu; la corolle divisée en six découpures profondes, très-étroites, lancéolées, presque acuminées; les étamines presque une fois plus courtes que la corolle; les anthers allongées, munies de deux pointes en forme de corne.

Cette espèce a été observée par Michaux sur les hautes montagnes de la Caroline septentrionale & au Canada.

3. STREPTOPUS lanuginosus. *Streptopus lanuginosus*. Mich.

Streptopus subcandicans-lanuginosus; foliis sessilibus, basi vix cordatis; pedicellis in brevissimo stipite geminatis; floribus masculinis, virgulentibus.

On distingue aisément cette espèce à ses fleurs geminées, plus grandes que dans les deux précédentes. Ses tiges sont garnies de feuilles sessiles, alternes, ovales, un peu en cœur à leur base,

micronées à leur sommet, entières à leurs bords, légèrement blanchâtres & lanugineuses. Les fleurs sont axillaires, supportées par un pédoncule très-court, qui se termine ordinairement par deux fleurs presque trois fois plus grandes que celles des autres espèces, de couleur verdâtre. Le fruit est une baie à trois loges. Les femences se réduisent, par avortement, à une ou deux au plus.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Caroline méridionale, où elle a été observée par Michaux.

STRIÉES (Feuilles, Tiges, &c.). *Striata folia*, &c. Cette dénomination s'applique à toutes les parties du végétal dont la superficie est chargée longitudinalement ou transversalement de petites côtes nombreuses, séparées par des interstices ou stries. Ainsi, la tige est striée dans l'épervière amplexicaule; les feuilles sont striées dans le galea des bouriques, dans le trèfle filiforme, dans l'asphodèle fistuleux, &c.

STRIGILIFORMES (Anthères). *Strigiliformes anthera*. On donne ce nom aux anthers lorsqu'elles ont la forme d'une brosse, comme celles des acanthes.

STRIGILIA. *Strigilia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des azedarachs, qui a des rapports avec les *tinus*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, entières, & dont les fleurs sont disposées en grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq dents; cinq pétales réunis à leur base; dix étamines; les anthers presque sessiles sur un appendice tubulé; un drupe à six loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, ovale, tubulé, terminé par cinq dents courtes.

2°. Une corolle monopétale ou composée de cinq pétales linéaires, connivens à leur base.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont linéaires, très-étroits, de la longueur de la corolle, connivens à leur base; des anthers adnées à la face intérieure des filaments, parthèmes, après l'émission de leur pollen, de points pileux, étoilés.

4°. Un ovaire supérieur, pyriforme, surmonté d'un style à trois faces, de la longueur des filaments; trois stigmates rapprochés en tête.

Le fruit est un drupe presque ovale, divisé en six loges, à une seule semence.

Observations. Ce genre a été établi par M. Cavanilles sur une seule espèce originaire du Pérou. Depuis, MM. Ruiz & Pavon ont mentionné dans leur *Système végétabilium*, qui n'est qu'un aperçu de leur belle *Flore du Pérou*, trois autres espèces qui se rapportent au genre *Strigilia* de M. Cavanilles, mais auxquelles ils ont donné un autre nom, celui de *foveolaria*. Ce dernier genre est rapporté dans le *Synopsis Plantarum* de M. Persoon, qui a substitué le nom de *tremanthus* (fleurs ponctuées) à celui de *foveolaria*.

Les espèces de MM. Ruiz & Pavon ne nous étant pas connues, nous nous bornerons à les mentionner brièvement, en leur conservant le nom générique établi par M. Cavanilles.

ES P È C E S.

1. *STRIGILIA* en grappes. *Strigilia racemosa*. Cavan.

Strigilia foliis ellipticis, alternis, subius rufo-mentisq; racemis axillaribus. (N.)

Strigilia racemosa. Cavan. Differt. bot. 7. pag. 358. tab. 201. — Linn. Illustr. Gener. tab. 349. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 551.

2. *Tremanthus* (ferruginea), *foliis oblongis, brevi acuminatis, subius lanuginosis, glandulatis; racemis foliariis, erectis.* Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 467. n°. 4.

Foveolaria ferruginea. Ruiz & Pav. Syll. veget. Flot. peruv. pag. 99.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux alternes, tomenteux & roussâtres, garnis de feuilles alternes, ovales, très-entières, glabres en dessus, tomenteuses & roussâtres à leur face inférieure; la principale nervure ramifiée en veines réticulées; les pétioles courts, épais.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, alternes; chaque fleur pédicellée; le pédicelle muni à sa base d'une petite bractée aiguë, & quelquefois d'une ou deux autres vers le milieu ou le sommet. Le calice est court, tomenteux; la corolle coriace, trois fois plus longue que le calice. Les filaments des étamines forment, par leur réunion à leur base, un petit tube court, garni à son bord intérieur d'un grand nombre de petits poils roussâtres. Le fruit est une baie ovale, à six loges; une femelle dans chaque loge.

Cette plante croît au Pérou. *Th* (*V. f. in herb. Juss.*)

Observations. La plante 2 paraît être la même espèce ou une variété. Ses feuilles sont oblongues, médiocrement acuminées, dépourvues de glandes, lanugineuses à leur face inférieure. Leur duvet est de deux sortes; l'un-exterieur, d'un brun-roux,

caduc; l'autre de couleur blanche, persistant; tous deux composés de petites touffes de poils, ouvertes en étoile. Les fleurs sont disposées en grappes droites & solitaires.

3. *STRIGILIA* à feuilles oblongues. *Strigilia oblonga*.

Strigilia foliis oblongis, acuminatis, glabris; racemis subgeminis, erectis (foveolaria). Ruiz & Pav. Syll. veget. Per. pag. 100.

Tremanthus oblonga. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 467. n°. 5.

C'est un arbre de quarante à cinquante pieds de haut, dont les rameaux sont munis de feuilles alternes, oblongues, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, parsemées de petites fossettes glanduleuses. Les fleurs sont disposées en grappes droites, axillaires, solitaires ou gémées.

Cette plante croît au Pérou. *Th*

4. *STRIGILIA* à feuilles ovales. *Strigilia ovata*.

Strigilia foliis ovato-oblongis, acuminatis, glabris; foveolis minimis, glanduliferis (foveolaria). Ruiz & Pav. Spec. Plant. pag. 10.

Tremanthus ovata. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 467. n°. 2.

Cette plante est un arbre très-élevé, dont les rameaux sont garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, ovales-oblongues, glabres à leurs deux faces, chargées de points glanduleux extrêmement petits, acuminées à leur sommet; les fleurs disposées en grappes axillaires.

On rencontre cet arbre dans les grandes forêts du Pérou. *Th*

5. *STRIGILIA* à feuilles en cœur. *Strigilia cordata*.

Strigilia foliis cordato-ovatis, acutis; foveolis glanduliferis (foveolaria). Ruiz & Pav. Syll. Plant. Per. pag. 99.

Tremanthus cordata. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 467. n°. 1.

Cet arbre croît au Pérou, dans les mêmes forêts, avec le précédent; il s'élève fort haut, & se distingue des autres espèces par ses feuilles ovales, échantonnées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet. *Th*

STROEMIA. C'est le nom que Vahl a donné à un genre de plantes qui avoit déjà été présenté & décrit par Forskall sous le nom de *cadaba*, & qui a été mentionné dans cet ouvrage, vol. 1, pag. 544, sous la même dénomination. Comme ce

changement de nom n'ajoute rien à la connaissance des espèces de ce genre, il eût été préférable de conserver la dénomination de Forskall, afin de ne pas embarrasser la science, & surcharger la mémoire de noms nouveaux & très-arbitraires. Il est malheureux que des botanistes distingués se laissent aller à cette fantaisie quand ils ont d'ailleurs tant d'autres moyens pour assurer leur réputation.

STROPHANTE. *Strophanthus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des apocinées, qui a des rapports avec les *nerium* & les *echites*, & qui comprend des arbres ou arbruttes exotiques à l'Europe, dont les riges sont droites ou grimpantes, les feuilles opposées, les fleurs souvent fasciculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; découpures de la corolle terminées par une lanière très-longue ; cinq étamines ; anthères surmontées de fils en faisceau ; un stigmate en tête ; deux ovaires.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, d'une seule pièce, à cinq divisions profondes, ovales-oblongues, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, presque campaniforme, à cinq découpures surmontées d'un prolongement très-allongé, en lanière étroite ; le tube court, évasé ; son orifice garni de dix appendices plus courts que la corolle.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont adhérens au tube de la corolle dans toute leur longueur, terminés par des anthères haillées, surmontées de fils quelquefois très-courts, rapprochés en faisceau.

4°. Deux ovaires supérieurs, surmontés d'un style court & d'un stigmate en tête.

Le fruit....

Observations. Ce nouveau genre a été établi & décrit par M. Decandolle, dans un Mémoire lu à l'Institut, qu'il a bien voulu me communiquer, & dont je présente ici l'extrait.

« Ce genre, dit ce savant botaniste, doit être placé dans la seconde division des apocinées, entre le *nerium* & l'*echites*. Il diffère de l'un & de l'autre, & même de toutes les plantes connues, en ce que les lobes de la corolle se terminent par un filer ou une lanière très-allongée, qui ressemble à une véritable vrille. Ce caractère est tellement tranché, tellement singulier, qu'il suffit pour faire reconnaître ces plantes au premier coup d'œil. C'est à

cause de cette organisation remarquable que je donne à ce genre le nom de *Strophanthus*, qui signifie fleur en lanière, de deux mots grecs, *strophos* (boudellette, vrille, lanière), & *anthos* (fleur). »

Ce caractère, qui luy est important qu'il soit, n'est pas le seul auquel les *Strophantes* puissent se distinguer. Ils diffèrent des *echites* en ce que l'orifice de leur corolle n'est pas nu, mais garni d'appendices ; ils diffèrent des *nerium*, parce que ces appendices sont simples & au nombre de dix, tandis que dans les *nerium* on n'en compte que cinq fendus en deux parties.

Tous les *Strophantes* sont des arbres ou des arbruttes à tige cylindrique, souvent grimpante. Leurs feuilles sont opposées, entières ; leurs fleurs portées sur un court pédicelle, & le plus souvent réunies en faisceau. Les boutons de ces fleurs ont une forme facile à reconnaître ; ils sont vtrus à leur base, & terminés par une longue pointe, le plus souvent tortillée sur elle-même. Au moment de l'épanouissement, cette pointe ne se déroule pas en commençant par l'extrémité, mais dans le milieu de sa longueur.

ESPÈCES.

1. **STROPHANTE sarmenteux.** *Strophanthus sarmentosus*. Decand.

Strophanthus glaber, sarmentosus, floribus glomeratis, terminalibus, cum foliis nascentibus ; corollis subcampanulatis, antheris in filum productis. Decand. Mém. mff. — Annal. Mus. d'Hist. Nat. de Paris, vol. 1. pag. 410. tab. 27. fig. 1.

Sa tige est ligneuse, cylindrique, glabre, ainsi que le reste de la plante ; brune, marquée de petits points protubérans, blancs, épars, comme on les voit dans plusieurs apocinées. Cette tige est sarmenteuse, grimpante ; les rameaux opposés. Il paroît que les fleurs naissent au même moment que les feuilles ; je ne les ai vues que dans leur jeunesse ; elles sont ovales, terminées en pointe, portées sur un court pétiole, à la base duquel on remarque de chaque côté deux petites stipules pointues.

Les fleurs sont grandes, de couleur rouge, solitaires ou disposées par faisceau, au nombre de deux, trois ou quatre ensemble. Elles sont portées sur un court pédicelle, chargée de trois ou quatre folioles ovales-lancéolées, terminées par une pointe acérée. Le calice est d'une seule pièce, à cinq divisions très-profondes, ovales-oblongues, pointues. La corolle est à peu près en forme de cloche, rétrécie par le bas, fortement évasée à son sommet ; l'orifice nu de dix appendices oblongs, terminés en lanière, non saillass hors de la corolle. On trouve même quelquefois un ou deux de ces appendices sur les divisions mêmes de la

ecroille. Ces divisions sont ovales à leur base, & se prolongent en une lanière étroite, longue de deux pouces. Au fond du tube sont insérées cinq étamines, dont les filaments sont courts, adhérents au tube dans presque toute leur longueur, & dont les anthères sont en fer de flèche à leur base, terminées par un filet, & réunies toutes cinq ensemble autour du stigmate qui est en tête, partagé en deux lobes droits & rapprochés. Le style est court, simple, & porté sur un double ovaire.

Cette plante, qui a un peu le port d'un *bigonia*, est originaire de Sierra-Leone en Afrique; on l'a été recueillie par Smeathman. *h* (*Decandolle*.)

2. STROPHANTE à feuilles de laurier. *Strophanthus laurifolia*. Decand.

Strophanthus glaber, foliis interdum semis; floribus glomeratis, terminalibus, post folia nascentibus; antheris in filum productis. Decand. Mém. mss. — Annal. Mus. d'Hist. Nat. de Paris, vol. 1. p. 411.

Cette espèce est très-voisine de la précédente; mais elle doit en être distinguée par les caractères suivans: 1°. Elle a souvent les feuilles ternées; 2°. ses fleurs sont placées au sommet des rameaux, & non le long des branches, comme dans l'espèce précédente; 3°. sa tige paraît droite & non grimpante; 4°. la corolle a l'orifice moins évasé, & les divisions plus courtes que dans le strophante grimpant; 5°. ses fleurs ne naissent que lorsque les feuilles ont déjà pris leur accroissement.

Cette plante a été découverte en Afrique par M. Sparmann. *h* (*Decand.*)

3. STROPHANTE dichotome. *Strophanthus dichotomus*. Decand.

Strophanthus glaber, ramis dichotomis, foliis mucronato-acuminatis, corollis infundibuliformibus; antheris in filum productis. Decand. Mém. mss. — Annal. Mus. d'Hist. Nat. de Paris, vol. 1. p. 411.

a. *Strophanthus dichotomus Burmanni, foliis ovato-oblongis.* Decand.

Echitis (caudata), pedunculis dichotomis, floribus filamentosis; foliis ovato-oblongis, acuminatis; caule volubili. Burm. Flor. ind. pag. 68. tab. 26.

Echitis (caudata), corollis infundibuliformibus; apicibus linearibus, longissimis. Linn. Mantill. 52.

Frutex volubilis, flagellis, &c. Kleinhof.

b. *Strophanthus dichotomus Lamarckii, foliis ovato-rotundatis.* Decand.

Nerium (caudatum), foliis rotundo-ovalibus, mucronatis; corollarum laciniis apice linearibus, longissimis. Lam. Dict. vol. 3. pag. 458.

Les deux plantes que je réunis ici, dit M. De-

candolle, sous une seule dénomination spécifique, paroissent très-différentes l'une de l'autre au premier coup d'œil, & j'ai cru pendant quelque tems qu'elles devoient réellement former deux espèces distinctes. Je me suis détrompé par la comparaison attentive des échantillons rapportés de l'Inde par M. Sonnerat, & décrits par M. Lamarck, qui a bien voulu me les communiquer, avec ceux qui ont été ramassés par M. Kleinhof dans l'île de Java, qui ont servi à la figure qu'en a donnée Burmann, ainsi qu'à la description de Linné, & que j'ai vus dans l'herbier de mon ami Delyder.

Le strophante dichotome est un arbre dont les rameaux & les pédoncules se bifurquent plusieurs fois. Sa tige est grimpante, cylindrique, glabre, ainsi que le reste de la plante. Son écorce est brune, tachetée de points ou de protuberances blanchâtres. Ses feuilles sont opposées, ovales, allongées dans la variété de Burmann, arrondies dans celle de Lamarck, terminées dans toutes deux par une pointe ferme; glabres, entières, traversées par une nervure longitudinale aplatie en dessous; rétrécies à leur base par un court pétiole. A la base de ce pétiole sont deux stipules très-courtes, qui se prolongent autour de la tige en une membrane ou une ligaz transverse.

Les fleurs naissent au sommet des rameaux au nombre de deux ou quatre, sur un pédoncule une ou deux fois bifurque, garni de quelques écailles qui sont de la même nature & presque de la même forme que les stipules de la base des feuilles. Les fleurs sont rouges, à peu près de la grandeur & de la forme de celles du laurier-rose. Leur calice est partagé en cinq divisions ovales-lancéolées, terminées par une pointe aiguë. La corolle est en entonnoir; le tube un peu évasé au sommet, presque cylindrique; l'orifice muni de dix appendices obtus, point saillans hors de la fleur; les divisions du limbe ovales, arrondies à leur base, & terminées par une lanière de trois pouces & demi de long; les filaments des étamines adhérents au tube dans presque toute leur longueur; les anthères en fer de flèche à leur base, terminées par un filet pétalesiforme, long d'environ six lignes, saillant hors de la corolle. L'ovaire est double; le style simple. Le stigmate m'a paru frangé.

Cette plante croît dans les Indes. La variété a est nommée *comonga* ou *mongocang* par les habitants de l'île de Java. *h* (*Decand.*)

4. STROPHANTE hétérid. *Strophanthus hispida*. Decand.

Strophanthus hispidus, corollis infundibuliformibus, laciniis longissimis; antheris acutis, mucosis. Decand. Mém. mss. — Annal. Mus. d'Hist. Nat. de Paris, vol. 1. pag. 412. tab. 27. fig. 2.

Cette espèce, la plus remarquable de celles

qui composent ce genre, a, au premier coup d'œil, l'aspect d'un *justia* ou d'une plante de la famille des gailiers.

Sa tige est ligneuse, cylindrique, rameuse; son écorce d'un brun-roux, hérissée de poils nombreux, un peu roides, qui ont à leur base une petite protubérance, comme ceux de *l'astagalus hispida*. Les feuilles sont opposées, & au lieu de stipules on trouve à leur base une touffe de poils très-ferrés, qui se prolonge des deux côtés d'une feuille à l'autre. Ces feuilles sont sessiles, ovales-oblongues, acérées, hérissées des mêmes poils que la tige, d'un vert plus foncé en dessus, traversées par une nervure longitudinale, convexe.

Les fleurs sont situées au sommet des rameaux, disposées en faisceau, portées sur des pédoncules plusieurs fois bifurqués, fortement hérissés, munis de folioles allongées, pointues, velues, qui entourent la base des fleurs. Le calice est partagé jusqu'à sa base en cinq divisions étroites, pointues, hérissées, longues d'environ six lignes. La corolle est rouge, en entonnoir, un peu velue à l'extérieur; le tube étroit à sa base, cylindrique, creusé en coupe à son orifice, garni lui-même de dix appendices en forme d'onglets courts & obtus. Les divisions de la corolle ne sont point arrondies à leur base, mais se rétrécissent très promptement en un filet mince, de sept pouces de longueur. Les filaments des étamines adhèrent au tube dans toute leur longueur; les anthères sessiles au fond de l'orifice, d'une consistance coriace, réunies autour du stigmate, un peu sagittées à leur base, pointues, mais dépourvues de filicis à leur sommet; l'ovaire double, hérissé de poils blancs; le style simple; le stigmate en tête, caché entre les étamines.

Cette plante a été recueillie à la Sierra-Leone en Afrique, par M. Smeathman. *H* (Decand.)

STRUMAIRE. *Strumaria*. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des narcissées, qui a des rapports avec les *leucoïum*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples & les fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle à six pétales ouverts; six étamines; un style renflé vers son milieu ou adhérent avec les filaments; un stigmate trifide; une capsule inférieure, un peu arrondie, à trois loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice nul; une spathe à deux folioles ou à deux valves inégales, ovales, aiguës.

2°. Une corolle composée de six pétales ouverts,

ordinairement les trois extérieurs relevés en cône sur le dos.

3°. Six étamines, dont les filaments sont inférés sur le réceptacle, plus courts que la corolle, égaux, subulés, terminés par des anthères ovales ou un peu arrondies.

4°. Un ovaire inférieur, à trois sillons, à trois côtes, surmonté d'un style plus long que les étamines, renflé à sa partie inférieure vers son milieu, auquel adhèrent quelquefois les filaments, subulé à sa partie supérieure, terminé par un stigmate trifide.

Le fruit est une capsule inférieure, ovale ou arrondie, à trois côtes, à trois sillons, à trois valves & autant de loges, contenant des semences arrondies.

Observations. Ce genre se rapproche beaucoup des *leucoïum*, mais les plantes qui le composent, ont en général un port différent; elles sont plus fortes, plus grandes; leurs fleurs plus nombreuses, & la plupart disposées, à l'extrémité des hampes, en une sorte d'ombelle plus ou moins étalée. Elles se distinguent de plus par leur corolle beaucoup plus ouverte, par le renflement du style à sa base ou vers son milieu, tandis que dans les *leucoïum* ce renflement existe au sommet du style. Une autre particularité, remarquable dans plusieurs espèces, consiste dans l'adhérence d'une portion du chaque filament avec le style. Le stigmate est à trois lobes; il est simple dans les *leucoïum*.

ESPÈCES.

1. *STRUMAIRE* linguée. *Strumaria linguifolia*. Jacquin.

Strumaria foliis linearibus, ensiformibus, rotundato-obtusis, planis; scapo tereti, superne compresso; filamentis longitudine corollae. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 31. n°. 1.

Strumaria stylis strumae cum filamentis connatis, utrinque acutis; foliis linguiformibus. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 356. — Idem, Collect. Suppl. pag. 45.

Ses racines produisent de leur collet plusieurs feuilles planes, glabres, linéaires, allongées, en forme de langue, obtuses & arrondies à leur sommet. De leur centre s'élève une hampe droite, glabre, cylindrique, comprimée à sa partie supérieure, soutenant vers son sommet des fleurs presqu'en ombelle.

La spathe qui les accompagne à leur base est divisée en deux valves lancéolées, aiguës, de couleur rougeâtre, deux fois plus courtes que les pédoncules. Ceux-ci sont simples, uniflores; la corolle blanche, divisée en six pétales, dont le

sommet

ſommet eſt vert extérieurement ; les filamens connivens avec la baſe du ſtyle ; celui-ci renflé par trois ſillons amincis à leurs deux extrémités.

Cette plante ſe rencontre au Cap de Bonne-Eſpérance. x

2. STRUMAIRE tronquée. *Strumaria truncata*. Jacquin.

Strumaria foliis linearibus, enſiformibus, rotundato-obtusis, planis ; ſcapo compreſſo, ſeminibus corollâ longioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 31. n°. 2.

Strumaria ſtyli ſtrumâ, cum filamentis connatis, ſuperius truncatâ ; foliis linguiformibus. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 357. — Idem, Coll. & Suppl. pag. 47.

Cette eſpèce a de grands rapports avec la précédente ; elle en eſt diſtinguée par ſes fleurs plus nombréuſes, plus étalées ; par la longueur des étamines.

Ses feuilles ſont planes, linéaires, enſiformes, glabres, obtuſes à leur ſommet ; les hampes droites, comprimées, terminées par des fleurs diſpoſées en une ſorte d'ombelle étalée, dont la baſe eſt garnie d'une ſpathé à deux valves ſcarieuſes, rougeâtres, ovales, concaves, acuminées à leur ſommet, plus courtes que les pédoncules. La corolle eſt blanche, à ſix pétales rougeâtres à leur baſe extérieurement. Les étamines ſont longues ; les filamens en partie adhérens au piſtil ; le ſtyle droit, à trois ſillons, épaïſſi à ſa partie inférieure ; les ſillons rétrécis à leur baſe, tronqués à leur partie ſupérieure.

Cette plante ſe rencontre au Cap de Bonne-Eſpérance. x

3. STRUMAIRE rougeâtre. *Strumaria rubella*. Jacquin.

Strumaria foliis linearibus, obliquè flexis ; petalis planis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 31. n°. 3.

Strumaria ſtyli ſtrumâ, cum filamentis connatis, utrinquè acutâ ; foliis linearibus obliquis. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. pag. 358. — Idem, Coll. & Suppl. pag. 46.

Ses tiges ſont droites, glabres, garnies à leur baſe de feuilles allongées, linéaires, entières, courbées obliquement. Les fleurs ſont diſpoſées, à l'extrémité des tiges ou des hampes, en une ſorte d'ombelle lâche, ſoutenue par une ſpathé préſque de la longueur des pédoncules, de couleur violette ; le pédoncule ſiſiforme, incliné, uniſlore ; la corolle d'une couleur incarnate, un peu rougeâtre, plane, diviſée en ſix pétales ouverts ; les filamens des étamines connivens avec la partie inférieure du ſtyle ; celui-ci renflé vers

Botanique. Tome VIII.

ſa baſe, rétréci à ſes deux extrémités, marqué de trois ſillons.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Eſpérance. x

4. STRUMAIRE ondulée. *Strumaria undulata*. Jacquin.

Strumaria foliis linearibus, obliquè flexis ; petalis undulatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 32. n°. 4.

Strumaria ſtyli ſtrumâ à filamentis liberâ ; petalis undulatis ; foliis latè linearibus, ſubobliquis. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 360. — Idem, Coll. & Suppl. pag. 50.

Cette plante tient le milieu entre la *Strumaria rubella* & la *Strumaria anguifolia* ; elle diſſe de tous deux par ſes étamines libres, par ſes pétales ondulés ; de la première par ſa corolle blanche ; de la ſeconde par ſes feuilles plus larges. Elles ſont glabres, linéaires, entières, clargies, préſqu'obtuſes, obliquement courbées.

Ses fleurs ſont ſituées à l'extrémité des tiges, accompagnées à leur baſe d'une ſpathé à deux valves concaves, glabres, ovales, acuminées à leur ſommet, rougeâtres, au moins une fois plus courtes que les pédoncules. Ceux-ci ſont ſimples, uniſlores ; la corolle blanche, diviſée en ſix pétales ondulés à leurs bords, avec une teinte rougeâtre à leur ſommet ; les filamens des étamines libres ; le ſtyle à trois côtes, renflé à ſa partie inférieure ; la capſule un peu ovale, à trois valves.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Eſpérance. x

5. STRUMAIRE à feuilles étroites. *Strumaria anguifolia*. Jacq.

Strumaria foliis linearibus planis, germinè triglanduloſo. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 32. n°. 5.

Strumaria ſtyli ſtrumâ, cum filamentis connatis ; glandulis tribus germinè impoſitis ; foliis linearibus. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 359. — Coll. & Suppl. pag. 48.

Ses feuilles ſont glabres, étroites, linéaires, planes. De leur centre s'élève une hampe droite, glabre, cylindrique, qui ſupporte des fleurs munies d'une ſpathé à deux valves ovales-larécées, membracées, de couleur rougeâtre, deux fois plus courtes que les pédoncules. Ces derniers ſont ſiſiformes, inégaux, garnis à leur baſe de bractées capillaires. La corolle eſt blanche, compoſée de ſix pétales ouverts, traverſés extérieurement ſur leur dos d'une ligne rougeâtre. Le ſtyle eſt droit, épaïſſi par trois ſiſtils en forme d'aile, tronqués, terminés par trois petites dents ſéparées par trois

O o o

filons, adhérentes avec les filamens des étamines; l'ovaire muni de trois glandes à sa partie supérieure.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ¾

6. STRUMMAIRE à feuilles filiformes. *Strumaria filifolia*. Jacq.

Strumaria foliis filiformibus, petalis acutis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 32. n°. 6.

Strumaria styli strumæ à filamentis liberis, foliis filiformibus. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 361.

Leucotum (Strumofum), *spatha diphyllâ, multiflorâ; floribus erectis; stylo basi inflato, globoso*. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 477. tab. 5.

Leucotum (Strumofum), *spatha diphyllâ; multiflorâ; stylo basi inflato, plicato; foliis linearis-filiformibus*. Thunb. Prodr. pag. 58. — Jacq. Collect. vol. 3. pag. 222.

Crinum (renellum), *spatha multiflorâ, corollis aequalibus, foliis filiformibus*. Linn. f. Suppl. p. 194. (Exclusif Plak. Synonymis.)

Cette espèce a des racines bulbeuses; elles produisent des feuilles toutes radicales, glabres, filiformes, un peu comprimées, plus longues que les tiges, enveloppées d'une gaine à leur base. Les tiges sont droites, cylindriques, soutenant à leur partie supérieure une ombelle peu garnie de fleurs, munie d'une spathe commune, divisée en deux valves membraneuses, lanceolées, inégales, la plus grande longue de six lignes, l'autre trois fois plus courte; point de spathe partielle.

Les fleurs sont pédonculees; les pédoncules filiformes, glabres, inégaux, longs d'un à deux pouces; la corolle blanche, composée de six pétales oblongs, lancéolés, ouverts, trois intérieurs un peu obtus, trois extérieurs marqués d'une carène verte & saillante, tous traversés par trois lignes longitudinales; six filamens égaux, subulés, blanchâtres, plus courts que les pétales, insérés sur le recepracle; les anthères brunes, petites, arrondies; l'ovaire inférieur, presque globuleux, à trois côtes; le style subulé à sa partie supérieure, à trois faces peu marquées, de la longueur des étamines, grossi à sa partie inférieure par un renflement plus épais que l'ovaire plissé à sa base; le stigmate médiocrement tréflé. Le fruit est une capsule presque globuleuse, glabre, à trois côtes, à trois loges, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ¾ (Descript. ex Ait.)

STRUMPFIA. *Strumfia*. Genre de plantes dicorollées, à fleurs complètes, polypétales, dont la place dans l'ordre naturel n'est point en-

core reconnue, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles étroites, presque verticillées, munies de stipules; les fleurs axillaires, presque en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, supérieur, à cinq dents; cinq pétales; cinq étamines réunies par leurs anthères; un style; un stigmate; une baie monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, persistant, d'une seule pièce, fort petit, à cinq dents.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ouverts, oblongs, obtus.

3°. Cinq étamines; point de filamens; cinq anthères sessiles, réunies en un corps ovale, à cinq filons; cinq dents à la base.

4°. Un ovaire inférieur, presque rond, surmonté d'un style droit, subulé, un peu plus long que les étamines, terminé par un stigmate simple, obtus.

Le fruit consiste en une baie arrondie, à une seule loge, couronnée par le calice, renfermant une semence presque globuleuse.

ES PÈ C E.

STRUMPFIA maritima. *Strumfia maritima*. Linn.

Strumfia foliis linearibus, subverticillatis, ternis; pedunculis axillaribus, multifloris. (N.)

Strumfia maritima. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1416. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 218. — Juss. Gener. pag. 436. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1152.

Thymelæa frutescens, rosmarinifolia, flore albo. Plum. Spec. Plant. Amer. pag. 17, & Burm. Amer. tab. 251. fig. 1.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur d'environ trois pieds, sur une tige droite, divisée en rameaux cylindriques, de couleur cendrée, & qui paroissent comme articulés par les impressions circulaires qui laissent les attaches des feuilles. Celles-ci sont ternées, assez semblables à celles du romarin; linéaires, presque verticillées, munies de stipules petites, aiguës, noisâtres, alternant avec les feuilles.

Les fleurs sont axillaires, réunies en petites grappes sur un pédoncule commun fort court, deux fois moins long que les feuilles; chaque fleur portée sur un pédicelle fort court. La corolle est blanche, petite, à cinq pétales. Les fruits sont des baies molles, blanchâtres, de la grosseur d'un petit pois.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. Son odeur est un peu désagréable. 7

STRUCHIUM. *Struchium*. Genre de plantes dicorylédonées, à fleurs composées, de la famille des corymbifères, qui est peu distinct des *ethulia*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes; les fleurs axillaires, agglomérées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs fasciculées; un calice étalé & imbriqué; des fleurons à trois découpures à leur limbe; les semences couronnées par un petit tube à quatre crénelures.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont composées uniquement de fleurons tous hermaphrodites.

Elles offrent :

1°. Un calice composé d'écaillés imbriquées, ouvertes, acuminées.

2°. Une corolle composée de fleurons tous hermaphrodites, rubulés; le limbe divisé en trois découpures aiguës.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts; les anthères réunies en cylindre.

4°. Un ovaire oblong, anguleux; un style plus long que la corolle, surmonté de deux stigmates réfléchis.

Les semences sont foliaires, oblongues, surmontées d'une petite couronne à quatre crénelures. Le réceptacle nu.

Observations. Ce genre est trop peu distingué des *ethulia*, pour en être séparé. Nous ne le présentons ici que parce que l'espèce qui le compose, n'a point été mentionnée à l'article *ETHULIE*. Les trois découpures du limbe des fleurons au lieu de cinq, la petite couronne crénelée qui surmonte les semences, sont les seuls & faibles caractères qui le distinguent des *ethulia*.

ESPÈCE.

STRUCHIUM d'Amérique. *Struchium americanum*.

Struchium floribus axillaribus, sessilibus, capitato-aggregatis; foliis oblongo-ovatis, subdecurrentibus. (N.)

Ethulia (Struchium), *floribus axillaribus, sessilibus; corollatis omnibus trifidis.* Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1297. — Idem, Prodr. pag. 111. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1740.

Struchium herbaceum, subaerugens, foliis oblongo-ovatis, utrinque productis; capitulis congestis ad alas. Brown, Jam. pag. 312. tab. 34. fig. 2.

Cette plante a des racines nombreuses, simples, allongées; elles produisent une tige droite ou un peu inclinée, glabre, cylindrique, lisse, presque simple, haute d'un pied, quelquefois munie de quelques rameaux rares, étalés, garnis de feuilles perloées, alternes, ovales-oblongues ou elliptiques, légèrement decurrentes sur la partie supérieure du pétiole, glabres à leurs deux faces, nerveuses, dentées en scie à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de deux à trois pouces; les pétioles élargis & à demi-amplexicaux à leur base, pubescens, longs d'un demi-pouce.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, réunies en petits paquets sessiles, presque capités. Leur calice est composé d'écaillés inégales, imbriquées, droites, un peu ouvertes; acuminées. La corolle est blanche, formée par un grand nombre de fleurons très-petits, en forme d'entonnoir; le limbe à trois découpures droites, aiguës (1.5 fleurons du centre à quatre découpures, selon Brown). Les semences sont oblongues, anguleuses, rudes, blanchâtres, un peu obliques, surmontées d'une petite couronne à quatre crénelures; le réceptacle nu & pointu.

Cette plante croît dans la Jamaïque, aux lieux humides & sur le bord des rivières. (Descript. ex Swartz.)

STRUTHIOLE. *Struthiola*. Genre de plantes dicorylédonées, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des rhymélées, qui a des rapports avec les *stellera* & les *passiflora*, & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont petites, opposées; les fleurs axillaires & foliaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux folioles : une corolle tubulée; le limbe à quatre découpures; huit écaillés à l'orifice de la corolle; une baie sèche, monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à deux folioles opposées, droites, linéaires, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, en entonnoir; le tube filiforme, allongé; le limbe plus court que le tube, à quatre découpures ouvertes.

3°. Huit écaillés ovales, obtusés, pileuses à leur base, insérées à l'orifice du tube.

4°. Quatre étamines, dont les filamens sont très-

courts, renfermés dans le tube, terminés par des anthères oblongues.

5°. Un ovaire supérieur, ovale, surmonté d'un style filiforme, de la longueur du tube, terminé par un stigmate en tète.

Le fruit est une baie sèche, ovale, à une seule loge, qui contient une seule semence un peu aigüe.

Observations. Ce genre a de grands rapports avec les stellaires : il en diffère par le nombre des étamines, par les divisions du limbe de la corolle, & par les petites écailles qui garnissent l'orifice du tube. Ses rapports avec les passerines ne sont pas moins nombreux ; elle s'en distingue à peu près par les mêmes caractères. Le port de tous ces genres est à peu près le même : ce sont de petits arbrustes dont les feuilles sont petites, nombreuses, assez communément opposées ; les fleurs axillaires & solitaires. Dans les struthioles, ces fleurs répandent une odeur très-agréable, surtout le soir & le matin. Elles se montrent dans plusieurs espèces deux fois par an. Toutes sont originaires du Cap de Bonne-Espérance.

ESPÈCES.

* Corolles velues en dehors.

1. STRUTHIOLE à longues fleurs. *Struthiola longiflora*. Lam.

Struthiola subpubescens, foliis oppositis, breviusculis, canaliculatis ; corollis longissimis, incano-tomentosis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°. 1566. tab. 78.

Struthiola foliis oppositis, cruciatis, angustis ; floribus tubulosis, spica in modum ex foliorum alis erectis. Burm. Afric. pag. 127. tab. 47. fig. 1.

Cette espèce est remarquable par la longueur du tube grêle & pubescent de la corolle, & par ses feuilles un peu plus larges & moins allongées que celles de l'espèce suivante.

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, subdivisées à leur sommet en quelques autres beaucoup plus courts, alternes, inégaux, glabres, striés, quelquefois un peu pubescents à leur partie supérieure, garnis de feuilles sessiles, épar-ses, opposées, durs, un peu courtes, à peine zigüés, plus souvent obtuses, glabres, fortement striés en dehors, concaves ou canaliculées en dedans, très-nombreuses. Les fleurs sont solitaires, axillaires ; la corolle blanchâtre, pubescente, munie d'un long tube grêle d'environ un pouce & plus, un peu serré vers son sommet, divisé à son limbe en quatre découpures ovales-obtuses.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. b (V. f. in herb. Lam.)

2. STRUTHIOLE effilée. *Struthiola virgata*. Lam.

Struthiola foliis oppositis, oblongis, canaliculatis, striatis ; ramis virgatis, nudulosis, superne villosopubescentibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°. 1567.

Struthiola (virgata), foliis lanceolatis, virgatis ; summis ciliatis, ramis pubescentibus. Thunb. Prodr. pag. 76. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 691. n°. 1. — Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 344.

Struthiola (pubescens), foliis linearilanceolatis, erectis ; bracteis calicibusque ciliatis-barbatis ; corollis extus sericeis. Retz. Observ. bot. 5. pag. 26.*

Struthiola pubescens. Linn. Mant. pag. 41.*

γ. *Eadem, floribus flavescentibus*. Willd. l. c.

Cette plante a de grands rapports avec la précédente : on l'en distingue aisément à ses fleurs une fois plus courtes, & à ses feuilles un peu plus étroites & plus longues.

Ses tiges se divisent en rameaux simples, effilés, grêles, d'un brun très-foncé, presque noirs, glabres, cylindriques, un peu pubescents vers leur sommet, particulièrement dans leur jeunesse, garnis de feuilles opposées, sessiles, oblongues, glabres à leurs deux faces, entières, striées en dehors, canaliculées en dedans, presque obtuses ; les supérieures légèrement ciliées à leurs bords ; leur point d'attache saillant, d'où vient qu'après la chute des feuilles les rameaux sont chargés de petits nœuds opposés. Les fleurs sont sessiles, solitaires, axillaires, jaunâtres ou un peu purpurines en dehors, velues, à peine plus longues que les feuilles ; leur tube grêle, cylindrique ; leur limbe à quatre découpures ovales, presque obtuses.

Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

3. STRUTHIOLE striée. *Struthiola striata*. Lam.

Struthiola pubescens, foliis oppositis, ovatis, subimbricatis, sulcatis-striatis ; corollis tomentosis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°. 1568.

γ. *Struthiola (imbricata), foliis ovatis, sulcatis, quadrifurcatis confertis, margine ciliatis ; glandulis corollinis quatuor*. Andrew. Repof. tab. 113.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont cylindriques, revêtues d'une écorce brune, glabre, presque noire ; le liber très-blanc, soyeux & luisant ; les rameaux alternes, rapprochés, diffus, subdivisés à leur sommet en d'autres beaucoup plus courts, inégaux, fasciculés, chargés à leur partie supérieure d'un duvet noirâtre ; les feuilles très-nombreuses, presque imbriquées, épar-ses, opposées, sessiles, ovales, un peu aigües, fortement striées en dehors, presque planes, entières,

ciliées à leurs bords ; les cils très-fins & un peu tortillés.

Les fleurs sont sessiles, axillaires, solitaires, jaunâtres, un peu plus longues que les feuilles ; leur tube grêle, chargé extérieurement d'un duvet blanchâtre, court & tomenteux ; le limbe à quatre divisions courtes.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

4. STRUTHIOLE ciliée. *Struthiola ciliata*. Lam.

Struthiola foliis oppositis, lanceolatis, ciliatis, erecto-imbricatis; ramis virgatis, subsimplicibus (corollis folio longioribus). Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 314. n°. 1569.

β. *Struthiola (ciliata), foliis sparsis; lanceolatis, mucronatis, ciliatis, concavis, quadrifariam imbricatis, apice incurvis*. Andrew. Repol. tab. 149.?

γ. *Struthiola (rubra), flore rubro, foliis minus incurvis*.? Andr. l. c.

Cette espèce a de grands rapports avec le *passerina ciliata* de Linné ; je n'oserois pas même assurer que ce ne soit la même plante. M. Lamarck est de ce sentiment. Il est néanmoins difficile de prononcer, à moins d'avoir sous les yeux la plante de Linné. Cette dernière, d'après la figure de Burman, paroit avoir des feuilles plus larges ; resteroit ensuite l'examen des parties de la fructification, le nombre des étamines, &c.

Ses tiges sont ligneuses ; elles se divisent en rameaux glabres, alternes, diffus, presque simples, garnis de feuilles éparfes, droites, nombreuses, imbriquées, opposées, sessiles, lancéolées, très-entières, aiguës, blanchâtres au point de leur attache ; les inférieures glabres, presque planes, un peu minces ; les supérieures plus serrées, un peu canaliculées, légèrement pubescentes & blanchâtres en dedans, garnies à leurs bords de cils très-blancs.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, un peu plus longues que les feuilles, de couleur purpurine. Leur tube est renflé vers son orifice, blanchâtre & pubescent extérieurement ; le limbe divisé en quatre découpures courtes, étroites, ovales, presque obtuses. Dans la plante β les feuilles sont un peu recourbées à leur sommet, & dans la variété γ les fleurs sont rougeâtres.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

5. STRUTHIOLE luisante. *Struthiola lucens*.

Struthiola foliis lucidis, glaberrimis, lanceolato-acuminatis; ramis erectis, corollis folium aequantibus. (N.)

Struthiola (ciliata, var. β), foliis canaliculatis, nudioribus; corollis longioribus foliorum. Lam. Illustr. Genet. n°. 1569.

Malgré les rapports de cette plante avec la précédente, je crois qu'elle doit être consignée comme une espèce distincte, toutes les feuilles étant glabres, luisantes, point ciliées.

Ses tiges sont grêles, ligneuses, très-glisses, les rameaux alternes, effilés, presque simples, quelquefois bifurqués à leur sommet, de couleur brune, garnis de feuilles nombreuses, sessiles, opposées, imbriquées, appliquées contre les tiges, roides, coriaces, un peu canaliculées en dedans, lancéolées, très-aiguës à leur sommet, & même acuminées, glabres à leurs deux faces, d'un vert-luisant, presque glauques ou un peu blanchâtres.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, le long des rameaux, à peine aussi longues que les feuilles ; leur couleur tire un peu sur le vert-olive ; le limbe d'un pourpre-foncé en dedans ; le tube cylindrique pubescent ; l'orifice du tube fermé par huit petites écailles velues.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

6. STRUTHIOLE à feuilles étroites. *Struthiola angustifolia*. Lam.

Struthiola foliis oppositis, erectis, linearibus, dorso trifurcatis; ramis compositis, villosis. Lam. Ill. Genet. vol. 1. pag. 214. n°. 1570.

Cette espèce a le port du *passerina filiformis*. Ses tiges sont droites, ligneuses, glabres, cylindriques, d'un brun-cendré, divisées en rameaux alternes, qui se ramifient en d'autres beaucoup plus courts, épars, peu distans, inégaux, blanchâtres, pubescens, garnis de feuilles sessiles, rapprochées, droites, linéaires, étroites, opposées, très-entières, presque obtuses, marquées sur leur dos de trois sillons presque glabres, munies de quelques poils rares & fins, souvent réunis en une petite touffe blanchâtre à l'extrémité des feuilles.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, axillaires, au moins une fois plus longues que les feuilles, d'un blanc-sale ou un peu jaunâtres ; le tube de la corolle pubescent, cylindrique, fort grêle ; le limbe à quatre petites découpures étroites, ovales ; l'orifice garni intérieurement de poils grisâtres, ainsi que les écailles qui en occupent les bords.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

7. STRUTHIOLE naine. *Struthiola nana*. Linn. f.

Struthiola foliis linearibus, obtusis, pilosis; floribus terminalibus, fasciculatis, tomentosis. Linn. f.

Suppl. pag. 128. — Thunb. Prodr. pag. 76. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 692. n°. 2.

Ses tiges sont droites, ligneuses, très-basses, longues de trois à quatre pouces, médiocrement rameuses, de couleur brune; les rameaux alternes, leurs divisions fasciculées; les feuilles épar- sées, sessiles, imbriquées, linéaires, obtuses à leur sommet, entières à leurs bords, rudes, médiocrement pileuses, longues d'environ un demi-pouce.

Les fleurs sont terminales, réunies presque en tête, ou fasciculées, environnées de entre-mêlées de plusieurs bractées assez semblables aux feuilles, purpurines, très-pileuses; les poils blanchâtres. Le calice est tubuleux, velu, plus long que les bractées; la corolle velue, un peu rougeâtre en dehors, d'un blanc-jaunâtre en dedans; les décou- pures du limbe ovales, aiguës, ciliées; quatre étamines insérées sur le tube de la corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espé- rance. 7)

* * Corolle glabre en dehors.

8. STRUTHIOLE droite. *Struthiola erecta*. Linn.

Struthiola foliis linearibus, glabris; ramis gla- bris, tetragonis. Thunb. Prodr. pag. 76. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 692. n°. 4. — Wendl. Ubf. bot. pag. 9. tab. 2. fig. 10.

Struthiola erecta. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 344.

Struthiola glabra. Mantzell. 41.

Struthiola (tetragona), *foliis lineari-lanceola- tis, quadrifarium imbricatis; corollis calicibusque nudis.* Retz. Observ. bot. 3. pag. 25.

Puffinra dodecandra. Linn. Spec. Plant. p. 513.

Nictandra (tetrandra), *foliis linearibus, imbric- atis, glabris; floribus lateralibus; nectariis obovatis.* Berg. Plant. Cap. pag. 133.

9. *Struthiola* (subulata), *foliis oppositis, lineari- subulatis, cuspidatis; ramis virgatis, subproliferis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°. 1565.

- Cette espèce a des rapports avec la *Struthiola juniperina*, mais les feuilles sont imbriquées, ser- rées contre les tiges & non ouvertes, lancéolées, subulées & non linéaires; ces deux plantes pa- roissent d'ailleurs avoir beaucoup de ressemblance.

Les tiges sont ligneuses, hautes d'un pied & plus, de couleur cendrée, hérissées de nœuds formés par l'attache des feuilles, munies de ra- meaux alternes, rapprochés en corymbe, quadrangulaires, garnis de feuilles glabres, sessiles, épar- sées, imbriquées, médiocrement aiguës, linéaires,

un peu concaves. Les fleurs sont solitaires; sessi- les, axillaires, parfaitement glabres, de couleur blanche; le tube de la corolle filiforme, un peu plus long que les feuilles; le limbe à quatre dé- coupures ouvertes, lancéolées, aiguës, assez lon- gues, un peu plus courtes que le tube; huit étai- les velues à l'orifice du tube; quatre étamines courtes; les anthères droites, oblongues, renfer- mées dans le tube; le stigmate capité, hérissé de poils.

La plante se me paroît être la même que la pré- cédente, ou une simple variété. Ses feuilles sont imbriquées & opposées sur quatre rangs, lancéolées, aiguës, concaves, longues de deux à trois lignes; la corolle un peu plus longue que les feuil- les; son limbe à quatre découpures très-étroites, lancéolées, aiguës, beaucoup plus longues que dans les autres espèces.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 7) (*V. f. in herb. Lam.*)

9. STRUTHIOLE à feuilles de genévrier. *Struthiola juniperina*. Retz.

Struthiola foliis linearibus, acutis, patentibus; corollis calicibusque nudis. Retz. Observ. botan. 3. pag. 26. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 692. n°. 3.

C'est, d'après Retz'us, un petit arbrisseau parfaite- ment glabre dans toutes ses parties, dont les tiges sont divisées en rameaux grêles, cylindri- ques, qui se ramifient en d'autres plus courts, quadrangulaires, garnis de feuilles sessiles, oppo- sées, très-ouvertes, linéaires, aiguës, assez sem- blables à celles du genévrier, glabres à leurs deux faces, entières.

Les fleurs sont groupées dans l'aisselle des feuilles, à la partie supérieure des rameaux; leur calice est glabre, de la longueur du tube de la corolle; celle-ci est un peu plus longue que les feuilles, glabre, de couleur blanche; le limbe divisé en quatre découpures aiguës; le tube renflé à sa partie supérieure, vers l'insertion des étamines; celles-ci plus courtes que le tube; les anthères d'un brun noirâtre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. 7) (*Descript. ex Retz.*)

10. STRUTHIOLE à feuilles de myrte. *Struthiola myrsinites*. Lam.

Struthiola glabra, foliis ovatis, acutis, plani- sculis, inferiorem alternis; corollis folio duplo lon- gioribus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 314. n°. 1563.

Struthiola (glabra), *foliis ovatis, glabris; ramis glabris, rugosis.* Thunb. Prodr. pag. 76. — Andr. w.

Repos. tab. 119. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 693. n° 5.

Struthiola (lanceolata), foliis ovato-lanceolatis corollisque nudis; calicibus pubescentibus. Retz. Observ. bot. 3. pag. 261. ?

Ces arbrisseaux à des tiges glabres, divisées en rameaux alternes, courts, inégaux, cylindriques, un peu jannétrés, ridés, très-glabres, garnis de feuilles sessiles, ovales, presque planes, glabres à leurs deux faces, coriaces, ridées, aiguës à leur sommet; les inférieures très-souvent alternes, les supérieures opposées.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, situées, dans les aisselles des feuilles, à la partie supérieure des rameaux; blanchâtres, très-glabres, presque deux fois plus longues que les feuilles. Je n'y ai reconnu d'autre calice que deux folioles opposées, concaves, fermes, lancéolées, aiguës, très-glabres, & qu'on peut considérer comme deux bractées. Le tube de la corolle est droit, fort grêle; le limbe court, à quatre divisions.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V. f. in herb. Lam.)

Le *struthiola ovata* de Thunberg me paroît bien être la même plante que celle que je viens de décrire; mais je ne pourrais pas affirmer qu'elle soit la même que le *struthiola lanceolata* de Retzius, dont les calices sont pubescents, d'après cet auteur, & les feuilles ovales-lancéolées.

II. STRUTHIOLE tuberculeuse. *Struthiola tuberculosa*. Lam.

Struthiola glabra, foliis oppositis, ovato-acutis, emarginatis, dorso substriatis; corollis folio vix longioribus. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 314. n° 1564.

Ses tiges sont droites, glabres, ligneuses, cylindriques, divisées en rameaux alternes, de couleur brune, un peu ridés, parfaitement glabres, garnis de feuilles sessiles, opposées, assez petites, ovales, un peu lancéolées, très-entières, fortement aiguës, glabres à leurs deux faces, un peu striées sur leur dos, couchées en gouttière en dedans.

Les fleurs sont sessiles, axillaires, un peu plus courtes que les feuilles; le tube est droit, cylindrique, très-grêle; le limbe fort petit, à quatre découpures lancéolées, aiguës; les étamines renfermées dans la corolle, attachées sur le tube.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V. f. in herb. Lam.)

STYLE. *Stylax*. C'est une sorte de tuyau fistuleux, la portion moyenne du pétil, plus ou moins allongé, ordinairement grêle, très-menu, qui lo

plus souvent est inséré au sommet de l'ovaire, quelquefois sur son côté ou à sa base.

Le style est formé le plus souvent de la propre substance de l'ovaire; quelquefois néanmoins il paroît naître de la substance du réceptacle, & dans ce cas, ou il fait corps avec l'ovaire, comme dans la famille des légumineuses, ou il l'enveloppe seulement sans contracter aucune adhérence, comme dans la famille des mauves.

L'existence du style n'est pas absolument nécessaire, puisqu'on trouve des fleurs, comme la tulipe, qui en sont dépourvues; le stigmate repose alors immédiatement sur l'ovaire.

Les différences que présente le style sont fournies par la forme, la surface, les divisions, la direction, la proportion & la durée de cet organe. Ainsi on examine si le style est cylindrique, filiforme, capillaire, subulé, en masse, tetrageone, ensiforme, &c.; s'il est glabre, velu, glanduleux, s'il est entier ou bifide, trifide, quadrifide, &c.; s'il est droit, arqué, décliné, &c.; s'il est plus court, aussi long ou plus long que les étamines; s'il est caduc, c'est-à-dire, s'il périt immédiatement après la fécondation ou s'il est persistant, c'est-à-dire, s'il subsiste après la fécondation, & s'il reste sur le fruit qu'il surmonte. Le style est encore appelé *simple* lorsqu'il n'y en a qu'un seul, comme dans le lys; *multiple* s'il y en a plusieurs, comme dans la famille des Caryophyllées.

La situation du style fournit aussi des différences. Gärtner nomme *style terminal* celui qui s'élève du sommet de l'ovaire, comme dans le mouton; *style latéral*, celui qui est placé sur le côté de l'ovaire, comme dans le geranium, dans les légumineuses; *style basilaire*, celui qui est inséré à la base de l'ovaire, & qui est libre dans toute son étendue, comme dans le fraiser, dans la *hirsutella*, &c.

Linné donne le nom de *monogynes*, *dignes*, *trigynes*, *polygynes*, &c. aux fleurs dont le pistil est muni d'un, de deux, de trois ou de plusieurs styles. M. de Justieu a réservé ces expressions pour désigner le nombre des ovaires, & il nous semble, dit M. Ventenat, qu'il est plus convenable d'employer avec ce savant les noms de *monostyles*, *dystyles*, &c. lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre des styles, & de réserver ceux de *monogynes*, *dignes*, &c. pour indiquer le nombre des ovaires.

STYLOSANTHE. *Stylosanthes*. Genre de plantes dicotylédonées, à fleurs complètes, polypétales, irrégulières, papilionacées, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *eschinomene*, & qui comprend des arbrustes ou des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles souvent assez généralement ternées; les fleurs disposées en épis.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, très-long, supportant la corolle ; un ovaire situé sous la corolle ; dix étamines diadelphes ; une gouffe à une ou deux articulations, un peu arquée.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice tubulé, cylindrique, très-long, divisé à son orifice en cinq découpures courtes, inégales, aiguës.

2°. Une corolle papilionacée, insérée à l'orifice du calice, composée de quatre ou cinq pétales irréguliers ; l'étendard arrondi, étalé, rabattu ; les deux ailes obliques, conniventes, obtuses ; la carène fort petite, à deux pièces, ou bifide à son sommet.

3°. Dix étamines diadelphes ou réunies en un seul paquet ; les filamens libres à leur partie supérieure ; les anthères petites, ovales ou arrondies.

4°. Un ovaire oblong, situé dans le fond du calice, inférieur à la corolle, surmonté d'un style qui traverse la longueur du tube du calice, se rend dans la corolle & se place dans la carène, surmonté d'un stigmate pubescent.

Le fruit est une gouffe allongée, un peu comprimée, à une ou deux articulations, la dernière courbée en crochet ; une semence dans chaque articule.

Observations. Ce genre, très-voisin, par le port de ses espèces, des *eschinome*, & surtout des *hesperis*, en est très-distinct par son caractère essentiel, qui est très-remarquable : il consiste dans la longueur du calice tubulé, dans la position de la corolle à l'orifice du calice, dans celle de l'ovaire, lequel, situé au fond du calice, se trouve supérieur à celui-ci, & inférieur à la corolle ; enfin, dans la longueur du style, qui est obligé de traverser le tube pour pénétrer dans la corolle, & placer son stigmat dans la carène. Les gouffes sont ordinairement peu allongées, & n'ont qu'une ou deux articulations.

E S P È C E S.

1. *STYLOSANTHE couché*. *Stylosanthes procumbens*. Swartz.

Stylosanthes foliis ovato-lanceolatis, lineatis, glabris; spicis multifloris, caule procumbente. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1282. — Klem, Act. Holm. 1789. pag. 280. tab. 11. fig. 1. — Lam. Illust. Gener. tab. 627. fig. 1.

Stylosanthes foliis ternatis, acuminatis, lineatis,

glabris; spicis multifloris, caule procumbente. Swartz, Prodr. pag. 108.

Stylosanthes (procumbens), foliis ovato-lanceolatis, glabris; spicis multifloris; bracteis levibus, mucronatis; caule procumbente, pubescente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1165. n°. 1.

Hedyosarum (hamatum, var. n°), foliis ternatis, nervosis, nudis; spicis sessilibus; leguminibus dispersis; obtusis, acumine uncinatis. Linn. Spec. Plant. 1036. — Amœn. Acad. vol. 5. pag. 403.

Trifolium procumbens, foliis ternatis; filiculis monospermis, acuminatis, quinquestriatis. Brown, Jam. pag. 298.

Anonis non spinosa, minor, glabra, procumbens, flore luteo. Sloan, Jam. pag. 75. Hill. t. pag. 187. tab. 119. fig. 2. — Rai, Hist. 467. 20.

C'est une plante basse, presque ligneuse, dont les tiges sont couchées, longues de deux à six pouces, rameuses, pubescentes, roides, cylindriques ; les rameaux presque glabres, ascendants, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées ; les folioles presque sessiles, oblongues ou ovales-lanceolées, acuminées, glabres, entières, traversées par des nervures blanchâtres ; la foliole terminale un peu pédicellée ; les pétioles courts, accompagnés à leur base de stipules vaginales, décurrentes, pubescentes, biffés à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, presque sessiles, garnis de stipules vaginales, imbriquées ; les extérieures plus grandes, supportant des feuilles ternées, pétiolées ; les intermédiaires à feuilles simples ; les intérieures ou les bractées petites, lanceolées, membraneuses, blanchâtres, enveloppant les fleurs. Celles-ci sont jaunes, presque de la grandeur de celle du *cicer arietinum*. Leur calice est droit, très-long, tubulé, filiforme, divisé à son orifice en cinq découpures inégales ; les deux postérieures conniventes, aiguës ; les deux latérales obtuses ; celle de devant lanceolée, acuminée, plus longue, toutes d'un vert-pâle, pubescentes vers leur sommet ; la corolle insérée à l'orifice du calice ; l'étendard arrondi, très-étalé, veiné, réfléchi, échancré à son sommet ; les ailes obliques, conniventes, obtuses ; la carène d'une seule pièce, bifide à son sommet ; les anthères oblongues & blanchâtres ; l'ovaire oblong, situé dans le fond du calice ; le style très-long ; le stigmate pubescent ; les gouffes un peu comprimées, courtes, composées d'une ou deux articulations relevées en bolle, un peu arrondies, anguleuses sur leur dos, la dernière courbée en crochet ; les semences solitaires, glabres, oblongues, un peu renflées.

Cette plante croît dans les campagnes, sur les pelouses, à la Jamaïque & à la Nouvelle-Espagne ; elle fleurit & fructifie presque toute l'année. (V. f. in herb. Lam.)

2. *STYLOSANTHE*

Stylosanthes (hispidia), procumbens; stipulis foliisque at saltim superioribus hispidis; capitulis bifloris trifloris. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 75.

Vat. α, nudiflora, caule folisque inferioribus glabris. Mich. l. c.

Vat. β, hispidissima, universè hispidissima. Mich. l. c.

Ses tiges sont couchées ou en grande partie dressées, rameuses, glabres, ou plus ou moins velues selon les variétés, cylindriques, quelquefois pubescentes d'un seul côté, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, quelquefois légèrement velues, particulièrement les feuillets supérieures, entières, aiguës à leur sommet; les stipules vaginales, terminées par deux dents acuminées, de la longueur des stipules.

Les fleurs sont disposées en petites grappes capitales, axillaires, très-courtes, qui ne supportent que deux ou trois fleurs; les feuilles florales, presque imbriquées, divisées en trois petites découpures, celle du milieu plus longue; ciliées à leurs bords, ainsi que les bractées. Ces fleurs ne paroissent que les unes après les autres. La corolle est jaune, les gouffes ovales. La variété β est chargée de poils sur toutes ses parties.

Cette plante croît dans la Virginie, la Caroline & la Pensilvanie. ? (V. f.)

γ. STYLOSANTHE hispide. *Stylosanthes hispidia*.

Stylosanthes diffusè procumbens, ramis pubescentibus; foliulis lanceolatis, parvis hispidis; stipulis & capitulo terminali hispidissimis. Rich. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. pag. 105.

Cette espèce me paroît avoir de très-grands rapports avec le *Stylosanthes elatior*; elle en diffère par ses fleurs réunies en une tête terminale assez épaisse, très-velue.

Ses tiges sont presque ligneuses, cylindriques, très-étalées, couchées, divisées en rameaux très-nombreux, diffus, pubescents, légèrement comprimés, grêles, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles oblongues, lancéolées, entières, très-aiguës à leur sommet, médiocrement hispides; les stipules décurrentes à la partie inférieure du pétiole, à deux dents aiguës, presque subulées, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont disposées en épis terminaux, serrés, droits, épais, longs d'un demi-pouce, velus sur toutes leurs parties.

Cette plante a été observée à Cayenne par M. Leblond. ? (V. f. in herb. Lam.)

6. STYLOSANTHE de Guinée. *Stylosanthes guianensis*. Swartz.

Stylosanthes foliolis lanceolato-acuminatis, petiolo longioribus; spiciis multifloris, villosis; caule cretto, hisuto. Swartz, Act. Holm. 1789. p. 284. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1167.

Trifolium (guianense), hisutè asperum, flore luco. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 776. tab. 309.

Ses racines sont fibreuses; les tiges presque herbacées, rameuses, hautes d'environ trois pieds, hérissées de longs poils, garnies de feuilles alternes, ternées; les folioles étroites, oblongues, lancéolées, très-entières, acuminées à leur sommet, longues d'un pouce & plus; le pétiole élargi à sa base en une stipule terminée par deux longues pointes hérissées de poils, ainsi que les pétioles.

Les fleurs sont réunies en tête à l'extrémité des rameaux, portées par de longs pédoncules; chaque fleur séparée par une bractée presque vaginale, étroite, aiguë; les pédicelles courts, munis à leur base de deux bractées plus courtes, fort petites, chargées, ainsi que les autres, de longs poils roussâtres. Le calice est partagé en cinq découpures aiguës; la corolle jaune; l'ovaire velu; le style très-long, grêle, terminé par un stigmate obtus; la gouffe fort petite, ovale, velue, à une seule semence.

Cette plante croît à Cayenne. ? (Descript. ex Aubl.)

Cette plante mérite d'être observée avec attention, & comparée avec le *Stylosanthes hispidia*, dont elle n'est peut-être qu'une variété à feuilles plus grandes.

STYPHÉLIE. *Styphelia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, régulières, de la famille des bruyères, qui a des rapports avec les *apocyn*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont petites, entières, épariées ou alternes; les fleurs petites, axillaires ou terminales, en épis ou en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles, accompagné d'écaillés imbriquées; une corolle tubulée; cinq étamines; un ovaire environné d'une écaille embrassante, ou de cinq petites écaillés; un style; un drupe à cinq loges; une ou deux semences dans chaque loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice profondément divisé en cinq découpures, environné à sa base de plusieurs écaillés imbriquées.

1°. Une corolle monopétale, tubulée, à cinq découpures, souvent réfléchies en dehors, glabres ou velus.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont courts, insérés sur le tube, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, environné à sa base d'un anneau membraneux, à cinq dents, ou de cinq écailles distichées, surmonté d'un style cylindrique, terminé par un stigmate en tête & souvent à cinq lobes.

Le fruit est un drupe ovale, divisé en cinq loges; chaque loge renfermant une ou deux semences.

Observations. Il existe, entre ce genre & les *epacris*, des rapports nombreux, & qui les rapprochent d'une manière très-naturelle; leur principale différence consiste dans les fruits capsulaires & à cinq loges dans les *epacris*, en baie dans les *styphelia*. Ce sont d'ailleurs, pour les deux genres, des arbrustes peu élevés, à petites feuilles entières, éparles ou alternes; des fleurs solitaires ou en grappes courtes; une corolle tubulée, dont le limbe se divise en cinq découpures; un calice à cinq folioles, entouré à sa base par quelques écailles imbriquées.

M. Labillardière, qui nous a fait connoître par des détails intéressans plusieurs belles espèces de *styphelia*, nous a également éclairés sur les *epacris*, qui ne nous étoient guère connus que par quelques espèces mentionnées rapidement dans les ouvrages de Forster. Nous en parlerons dans le Supplément.

Le genre *ventenatia* de M. Cavanilles est le même que celui de *styphelia*, & doit y être réuni.

ES P È C E S.

* Limbe de la corolle velu.

1. STYPHÉLIE de Riche. *Styphelia Richei*. Labill.

Styphelia corolla limbo reflexo, hirsuto; racemis axillaribus erectis; foliis oblongis, trinerviis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 44. tab. 60.

Arbrusteu qui s'élève à la hauteur de cinq à six pieds au plus, divisé en rameaux alternes, garnis de feuilles sessiles, alternes, oblongues-lancéolées, entières, glabres à leurs deux faces, rétrécies en pointe à leurs deux extrémités, marquées de trois ou cinq nervures finement striées à leur partie inférieure, longues d'environ un pouce & demi sur trois lignes de large.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, un peu plus courtes que les feuilles, à peine pédoncelées, écaillieuses à leur base. Le calice est

composé de cinq folioles ovales-oblongues, scierieuses, membraneuses à leurs bords, accompagnées de deux écailles opposées, & d'une troisième en forme de bractée persistante; le tube de la corolle à peine de la longueur du calice, divisé à son limbe en cinq découpures réfléchies en dehors, obtuses, chargées extérieurement de poils très-blancs; les filaments insérés à l'orifice du tube, alternes avec les découpures de la corolle; les anthères oblongues, mobiles, à une loge, à deux valves; l'ovaire ovale, environné de cinq écailles presque orbiculaires; le style cylindrique; le stigmate tuberculé, en tête; le drupe petit, ovale, environné d'une pulpe nourissante, contenant une noix à cinq loges; des semences solitaires, ovales, oblongues, suspendues à un axe central; l'embryon cylindrique, dans un périperme charnu.

Cet arbruste croît à la Nouvelle-Hollande, dans la terre de Van-Leuwin. *†*

Ses petits drupes ont servi de nourriture à M. Riche, qui s'étoit égaré de son chemin, & qui éprouvoit une faim dévorante. (*Labill.*)

2. STYPHÉLIE dentée en scie. *Styphelia serrulata*. Labill.

Styphelia corolla limbo patente, hirsuto; florum capitulis axillaribus; foliis linearilanceolatis, serrulatis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 45. tab. 62.

C'est un petit arbrusteu souvent courbé, dont les tiges sont longues de six à sept pouces, divisées en rameaux dressés, très-rapprochés, presque fisticulés à la partie supérieure des tiges, garnis de feuilles fort petites, sessiles, éparles, alternes, très étroites, linéaires-lancéolées, très finement dentées en scie à leurs bords, aiguës, mucronées à leur sommet, marquées en dessous de trois nervures.

Les fleurs sont petites, disposées, dans l'aisselle des feuilles, en grappes très-courtes, réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule commun, imbriqué de petites écailles orbiculaires. La corolle est courte, tubulée; son limbe plane, ouvert, hérissé de poils en dessus; les filaments supportant des anthères perites, à une seule loge; l'ovaire est ovale, marqué de cinq stries, environné à sa base d'un anneau squamiforme; le style aminci à sa partie supérieure; le stigmate un peu aigu. Le fruit est un drupe qui renferme un noyau à cinq loges, une semence dans chaque loge.

Cet arbrusteu croît au cap Van Diemen. *†* (*Labill.*)

3. STYPHÉLIE effilée. *Styphelia virgata*. Labill.

Styphelia corolla limbo patente, hirsuto; racemis
P p p

gués; deux écailles courtes, opposées; une petite bractée à la base de chaque fleur; la corolle divisée à son limbe en cinq découpures réfléchies, étroites, velues à leur face supérieure; les antères à deux loges jusque vers le milieu; l'ovaire globuleux, environné à sa base d'un anneau écailleux à cinq dents. Le fruit est un petit drupe globuleux, glabre, à cinq loges; les semences foliaires dans chaque loge; l'embryon grêle, cylindrique, enfoncée dans un perisperme blanchâtre, charnu; la radicule allongée, supérieure; les cotyledons très-courts.

Cette plante se rencontre à la terre de Van-Leuwin dans la Nouvelle-Hollande. *Th* (Labill.)

7. STYPHÉLIE à feuilles lancéolées. *Styphelia lanceolata*. Smith.

Styphelia corolla limbo revoluta, hirsuta; racemis aggregatis, terminalibus; foliis linearis-lanceolatis. Smith, Nov.-Holl. t. 1. pag. 49. — Willd. Spec. 1. Lint. vol. 1. pag. 835.

Epacris (juniperina), arborea, foliis linearibus, acutis, patentibus, sessilibus; racemis cernuis, floribus alternis. Linn. 1. Suppl. pag. 138.

Epacris (tasciculata), arborea, foliis confertis, linearibus, acuminatis; racemis spicatis, lateralibus, cernuis. Forst. Prodr. n° 72.

Ardisia acrota. Gært. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 78. tab. 94.

Styphelia acrota. Sloand. Mss.

C'est un arbre dont le tronc se divise en branches et en rameaux garnis de feuilles nombreuses, éparées ou alternes, sessiles, assez petites, linéaires-lancéolées, ouvertes, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, entières à leurs bords.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes latérales, un peu pendantes; aggrégées, semblables à des épis courts; les pédicelles courts, écailleux; le calice à cinq folioles ovales, concaves, persistants; le tube de la corolle lâche, un peu plus long que le calice; le limbe court, à cinq découpures réfléchies en dehors, velues à leur face extérieure; cinq étamines très-courtes, insérées à l'orifice du tube de la corolle; un ovaire supérieur, arrondi, entouré à sa base de cinq petites écailles oblongues; un style filiforme, un stigmate simple. Le fruit est une petite baie globuleuse, presque sèche, à cinq loges, acuminée à son sommet par le style persistant; ordinairement deux semences dans chaque loge, petites, ovales, un peu roussâtres.

Cet arbre croît dans la Nouvelle-Zélande. *Th*

8. STYPHÉLIE à longue corolle. *Styphelia tubifera*. Smith.

Styphelia corolla clavata, longissima; limbo revoluta, hirsuta; floribus axillaribus, sal. tarsiis; foliis obovata-linearibus. Smith, Nov.-Holl. t. 1. pag. 45. tab. 14. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 835. n° 1.

Cette espèce est particulièrement distinguée des congénères par la longueur des corolles ordinairement fort courtes. C'est un arbrisseau dont les tiges sont droites, glabres, cylindriques, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, linéaires, en ovale renversé, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base en une pointe qui les rend presque petiolées.

Les fleurs sont latérales, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, munies à leur base de quelques écailles imbriquées; leur calice divisé en cinq folioles droites, beaucoup plus courtes que la corolle. Celle-ci est tubuleuse, presque en forme de cleu; son tube fort long, terminé par un limbe à cinq découpures linéaires, tabarrues en dehors, velues extérieurement; cinq étamines courtes, non saillantes, insérées sur le tube de la corolle. Le fruit est un drupe presque ovale, un peu arrondi, à cinq loges.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. *Th*

9. STYPHÉLIE éricoïde. *Styphelia ericoidea*. Smith.

Styphelia corolla limbo patente, hirsutissima; racemis axillaribus, brevissimis, cretibus; foliis lanceolato-ellipticis, revolutis. Smith, Nov.-Holl. t. 1. pag. 48.

Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques, rameuses; les rameaux glabres, alternes, garnis de feuilles éparées, alternes, glabres à leurs deux faces, petites, sessiles, semblables à celles de l'*Erica*, lancéolées ou elliptiques, un peu roulées. Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes très-courtes, droites; le pédoncule garni de quelques écailles imbriquées. Le calice est divisé en cinq folioles courtes, muni à sa base d'une bractée & de deux écailles opposées; la corolle courte; son limbe partagé en cinq découpures étalées, dont la face extérieure est garnie d'un très-grand nombre de poils; les étamines insérées à l'orifice du tube.

Cette plante se trouve dans la Nouvelle-Hollande. *Th*

10. STYPHÉLIE bâtarde. *Styphelia spuria*.

Styphelia caule fruticoso, foliis ovato-mucronatis, limbo corolla revoluta; floribus axillaribus, subternis.

Epacris spuria. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 17. tab. 347. fig. 1.

Cette espèce doit être rangée parmi les *Styphelia*; elle a même de très-grands rapports avec le *Styphelia virgata*, avec laquelle, au premier aspect, il seroit aisé de la confondre; elle en diffère par ses feuilles sessiles, par des écailles nombreuses & imbriquées à la base du calice, par l'ovaire environné de cinq petites écailles distinctes, & par ses baies presque sèches.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq ou six pieds, divisées en rameaux nombreux & cylindriques, garnies de feuilles sessiles, alternes, très-rapprochées, étroites, petites, ovales-oblongues, terminées par une petite épine, roulées à leurs bords. Les fleurs sont axillaires, réunies ordinairement au nombre de trois sur un pédoncule très-court; le calice environné de six écailles fort petites, concaves, imbriquées; il se divise en cinq folioles aiguës; la corolle fort petite, rougeâtre; son tube de la longueur du calice; son limbe à cinq découpures lancéolées, aiguës, chargées en dehors d'un duvet blanc, tomenteux; les filamens des étamines très-courts; les anthères oblongues; l'ovaire globuleux, à cinq stries, environné à sa base de cinq petites écailles rougeâtres; le style de la longueur du tube; le stigmate épais. Le fruit est une petite baie sèche, presque capsulaire, ovale, à cinq loges; les semences foliaires, ovales.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, au port Jackson. h

11. *STYPHÉLIE gnidienne. Styphelia gnidium. Vent.*

Styphelia corolla limbo reflexo, hirsuto; spicis terminalibus, solitariis, ovatis; foliis linearilanceolatis, sparsis. Vent. Hort. Malm. p. 23. tab. 23.

Ses tiges sont rameuses, revêtues d'une écorce cendrée, hautes d'environ trois pieds; les rameaux un peu pubescens dans leur jeunesse, chargés de feuilles éparées, sessiles, étroites, linéaires, lancéolées, très-entières, aiguës, glanduleuses à leur sommet, d'un vert presque glauque; les supérieures droites; les inférieures très-ouvrées.

Les fleurs sont terminales, disposées en petites grappes courtes, un peu capitées; le pédoncule commun pubescent, muni d'écailles imbriquées, ovales, blanchâtres; le calice à cinq folioles, environné à sa base de deux écailles opposées & d'un bractée ovale, concave, membraneuse à ses bords; la corolle fort petite, d'un blanc de lait, répandant une odeur assez semblable à celle du lilas; le tube renflé, pentagone; le limbe à cinq découpures ovales, obtus, réfléchies, convexes & velues en dessus, de la longueur du tube; cinq étamines; les anthères linéaires, glanduleuses à leur sommet, couleur de rose; l'ovaire ovale, entouré à sa base de cinq écailles, divisé intérieu-

rement en trois loges; le style glabre, cylindrique, de la longueur du tube; le stigmate tronqué, surmonté de quelques petites glandes lorsqu'on l'examine à la loupe. Le fruit n'a pas été observé.

Cette plante croît à Botany-Bay, & se cultive au jardin de la Malmaison. Il pousse l'hiver dans l'orangerie, & fleurit au printemps. h (*Ventenat.*)

12. *STYPHÉLIE à feuilles de sapin. Styphelia abietina. Labill.*

Styphelia corolla limbo patente tuboque piloso; floribus solitariis, axillaribus; foliis linearis, acroscis, confertis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 48. tab. 68.

Cette plante s'élève à la hauteur de six à sept pieds; c'est un arbrisseau dont les tiges sont droites, striées, assez fortes, ruberulées par l'impression de l'attache des feuilles, divisées en rameaux alternes, épars, médiocrement diffus, garnis de feuilles très-nombreuses, éparées, médiocrement pétiolées, droites, très-roides, oblongues, rétrécies à leur base, très-pointues, acérées, marquées de cinq à sept lignes, longues presque d'un pouce.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, presque sessiles, environnées à leur base d'environ seize écailles; les inférieures beaucoup plus petites, imbriquées, légèrement ciliées, ainsi que les folioles du calice, marquées de trois ou cinq stries un peu roussâtres; le tube de la corolle pileux en dedans, aussi bien que le limbe qui se divise en cinq découpures ovales-lancéolées, presque brutes; les anthères à une seule loge; cinq écailles presque orbiculaires, conniventes à la base de l'ovaire; un drupe presque orbiculaire, acuminé à son sommet, revêtu d'une pulpe charnue, épaisse, à cinq loges, contenant chacune une seule semence.

Cet arbrisseau croît au cap de Van-Diemen. h (*Labill.*)

13. *STYPHÉLIE à feuilles en cœur. Styphelia cordata. Labill.*

Styphelia corolla limbo patente, piloso; floribus solitariis aut binis, axillaribus; foliis cordatis, crassiusculis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 46. tab. 63.

Petit arbrisseau qui s'élève à la hauteur de huit à neuf pouces, dont les rameaux inférieurs sont alternes, distans; les supérieurs épars, plus rapprochés, diffus, glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, fort petites, pétiolées, ovales ou en forme de cœur, roides, un peu épaisses, glabres à leurs deux faces, striées en dessous; le pétiole très-court, à demi-cylindrique.

Les fleurs sont disposées en petites grappes la-

stériles; le pédoncule commun, court, cylindrique; les fleurs sessiles, garnies d'écaillés imbriquées, orbiculaires; le calice fort petit, à cinq folioles orbiculaires; muni de deux écailles opposées, relevées en carène, & d'une bractée; la corolle petite; son tube court, garni intérieurement de quelques poils rares; le limbe à cinq découpures linéaires, obtuses, dont le sommet est chargé de poils ramassés en pinceau; les filamens renfermés dans le tube de la corolle, surmontés d'anthères à deux loges, à deux valves; l'ovaire entouré à sa base d'un anneau en forme d'écaille. Le fruit est un petit drupe acuminé; l'embryon cylindrique, environné d'un péricarpe blanchâtre & charnu.

Cette plante croît dans la terre de Van-Diemen, dans la Nouvelle-Hollande. *h* (Labill.)

14. *SYMPHÉLIE oxycedre*. *Symphelia oxycedrus*.

Symphelia corolla limbo patente, vix piloso; foliis foliatis, axillaribus; foliis lanceolatis, quinque nerviis, sparsis, reclatis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 49. tab. 69.

Cette plante a presque l'apparence du *juniperus oxycedrus*. Ses tiges sont ligneuses, assez fortes, hautes de six à sept pieds; les rameaux alternes, épars ou presque fasciculés, diffus, ramifiés, garnis de feuilles éparées, sessiles, fort étroites, entières, lanceolées, horizontales ou inclinées, aiguës à leur sommet, rétrécies presque en pétiole à leur base, de couleur cendrée en dessous, munies de cinq à sept nervures longitudinales & parallèles.

Les fleurs sont foliaires, axillaires, presque sessiles; le calice à cinq folioles courtes, ovales, légèrement ciliées à leurs bords; environné à sa base d'environ une douzaine de petites écailles imbriquées, ciliées, inégales; la corolle tubulée; le tube aussi long que le calice; le limbe à cinq découpures presque linéaires, obtuses, garni extérieurement de quelques poils rares & courts; les étamines renfermées dans le tube de la corolle; l'ovaire environné à sa base de cinq écailles orbiculaires. Le fruit est un petit drupe globuleux, surmonté d'une pointe à son sommet, environné d'une pulpe épaisse, charnue; les semences foliaires dans chaque loge.

Cette espèce a été recueillie par M. Labillardière au cap Van-Diemen. *h* (Labill.)

15. *SYMPHÉLIE daphnoïde*. *Symphelia daphnoides*. Smith.

Symphelia corolla limbo patente, subpubescenti; foliis axillaribus, foliatis; foliis ellipticis, concaviusculis. Smith, Nov.-Holl. 1. pag. 48.

Cette espèce se présente sous la forme d'un

petit arbrisseau, assez semblable par son port à un *daphne*. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, rameuses, garnies de feuilles épaisses, sessiles, alternes, oblongues-elliptiques, glabres à leurs deux faces, entières, un peu concaves. Les fleurs sont foliaires, presque sessiles, situées dans l'aisselle des feuilles, latérales, petites; leur corolle tubulée, divisée à son limbe en cinq découpures presque planes, ovales, légèrement pubescentes.

Cette espèce croît dans la Nouvelle-Hollande. *h*

* * Limbe de la corolle glabre.

Symphelia corolla limbo plano, imberbi; racemis erectis, axillaribus; foliis ovato-oblongis, inferius glaucis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Specim. pag. 45. tab. 61.

Cette espèce a quelques rapports avec le *Symphelia Richii* par la forme de ses feuilles, mais elles sont plus courtes, & la corolle glabre; ses découpures point réfléchies.

Ses tiges sont ligneuses, hautes de six à sept pieds; les rameaux presque opposés, garnis de feuilles alternes, à peine pétiolées, planes, ovales-oblongues, entières, glabres à leurs deux faces, glauques en dessous, aiguës & terminées par un petit filet sétacé, un peu rétrécies à leur base; le pétiole très-court.

Les fleurs sont disposées en petites grappes axillaires, presque en tête, droites, beaucoup plus courtes que les feuilles, nues à leur partie inférieure; chaque fleur médiocrement pédicellée, munie d'une bractée ovale, squamiforme, & de deux écailles opposées, presque carénées à la base du calice. Ce dernier est divisé en cinq folioles un peu arrondies. La corolle a un tube court, partiellement glabre, à cinq découpures droites, obtuses; les anthères ovales-oblongues, inclinées, à demi-divisées en deux lobes, de la longueur des filamens; l'ovaire supérieur environné à sa base par un anneau squamiforme, à cinq dents; le style court, épaissi à sa partie inférieure; le stigmate obtus; le drupe est petit; il contient un noyau à cinq loges, quelquefois une seule par avortement; les semences foliaires dans chaque loge.

Cette plante croît au cap Van-Diemen. *h* (Labill.)

17. *SYMPHÉLIE élanée*. *Symphelia strigosa*. Smith.

Symphelia corolla limbo patente, imberbi; fauce pilosa; racemis axillaribus terminalibusque, brevifimis, erectis; foliis subulatis. Smith, Nov.-Holl. 1. pag. 48. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 335. n.º 3.

C'est un arbrisseau médiocrement élevé, dont les tiges sont droites, rameuses, cylindriques; les rameaux alternes, grêles, élancés, garnis de feuilles nombreuses, sessiles, éparées ou alternes, très-étroites, petites, entières, glabres à leurs deux faces, subulées à leur sommet.

Les fleurs sont, les unes latérales, d'autres terminales, situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en petites grappes très-courtes, médiocrement garnies. Le calice est muni à sa base d'écaillés imbriquées, inégales; il se divise en cinq folioles courtes, assez semblables aux bractées; la corolle petite; son tube court, couvert de poils à l'intérieur de son orifice; le limbe divisé en cinq découpures ouvertes, point réfléchies, glabres à leurs deux faces. Le fruit est une petite baie médiocrement charnue, divisée intérieurement en cinq loges.

Cette plante se trouve dans la Nouvelle-Hollande. \bar{h}

18. STYPHÉLIE à balai. *Styphelia scoparia*. Smith.

Styphelia corolla limbo concavifusculo, imberbi; racemis axillaribus brevissimis, recurvis; foliis linearilanceolatis. Smith, Nov.-Holl. t. pag. 48.—Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 835. n° 4.

Ses tiges se divisent en rameaux souples, nombreux, droits, élancés, éparés ou alternes, presque fasciculés, glabres, garnis de feuilles sessiles, éparées, alternes, nombreuses, petites, étroites, linéaires-lanceolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords.

Les fleurs sont disposées en petites grappes très-courtes, latérales, un peu recourbées, situées dans l'aisselle des feuilles; le calice enveloppe à sa base d'écaillés imbriquées; la corolle petite, rubulée; le tube court; le limbe divisé en cinq découpures médiocrement ouvertes, presque ovales, concaves, glabres tant en dessus qu'en dessous; les étamines renfermées dans le tube; les filaments insérés vers son milieu; l'ovaire un peu arrondi, surmonté d'un style droit, à peine plus long que les étamines. Le fruit est une petite baie à cinq loges.

Cet arbrisseau croit à la Nouvelle-Hollande. \bar{h}

19. STYPHÉLIE à feuilles elliptiques. *Styphelia elliptica*. Smith.

Styphelia corolla limbo patente, imberbi; racemis aggregatis, subterminalibus; foliis lanceolatis-ellipticis. Smith, Nov.-Holl. t. pag. 49.—Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 836. n° 7.

On distingue cette espèce du *Styphelia daphnoides* à son port, à ses feuilles point concaves, & particulièrement à la disposition de ses fleurs. C'est

un arbrisseau peu élevé, dont les tiges sont glabres, cylindriques, rameuses, garnies de feuilles sessiles, éparées, glabres à leurs deux faces, entières, lanceolées, elliptiques, un peu aigues. Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en grappes latérales, presque terminales, réunies plusieurs ensemble, à peine pédicellées, munies à leur base de bractées écaillées; leur calice partagé en cinq découpures droites, courtes, très-profondes; la corolle petite, rubulée; le limbe divisé en cinq découpures planes, ouvertes, parfaitement glabres; cinq étamines insérées sur le tube de la corolle, à peine aussi longues; les filaments courts; les fruits petits, ovales-oblongs, un peu succulents.

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. \bar{h}

20. STYPHÉLIE à trois fleurs. *Styphelia triflora*. Andrew.

Styphelia foliis imbricatis, ovatis, mucronatis, glaucis; floribus axillaribus, ternis. Andrew, Reposit. tab. 71.—Petr. Synopf. Plant. vol. 1. p. 174. n° 2.

Cet arbrisseau a des tiges glabres, droites, rameuses, cylindriques, garnies de feuilles nombreuses, éparées, imbriquées, sessiles, ovales, très-entières, glabres à leurs deux faces, glauques en dessous, mucronées à leur sommet. Les fleurs sont latérales, situées, vers la partie supérieure des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, réunies trois par trois; le calice imbriqué à sa base par quelques écaillés inégales; la corolle rublée, très-longue, de couleur rouge, jaunâtre à son sommet, divisée à son limbe en cinq découpures étroites, linéaires. Le fruit consiste en un drupe ovale-oblong, à cinq loges.

Cette espèce croit dans la Nouvelle-Hollande. \bar{h}

21. STYPHÉLIE à feuilles de genévrier. *Styphelia juniperina*. Willd.

Styphelia arbores, foliis sparsis, linearibus, cuspidatis, serrulatis; floribus sessilibus, solitariis, terminalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 836.

Epacris juniperina. Forst. Prodr. n° 71.

Ventenatia (procumbens), caule procumbente; foliis linearilanceolatis, imbricatis, ciliatis; floribus axillaribus, solitariis. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 28. tab. 349. fig. 1.

Je ne rapporte que d'après Willdenow, cette espèce aux *Styphelia*, que Forster avoit placée parmi les *Epacris*. Apparemment qu'il aura été reconnu que cette plante avoit pour fruit des baies & non des capsules; elle nous est tout à-fait inconnue. C'est un arbre dont les rameaux sont garnis

garnis de feuilles éparées, linéaires, assez semblables à celles du genévrier commun, finement denticulées à leurs bords, roides & pointues à leur sommet. Les fleurs sont sessiles, solitaires & terminales. Le *ventenatus procumbens* de M. Cavanilles paraît avoir de très-grands rapports avec cette espèce.

Cette espèce croît dans la Nouvelle-Zélande. *h*

* *Styphelia* (*ventenatus humifusa*), *foliis linearibus, sparsis, numerosis; floribus axillaribus*. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 28. tab. 348.

SUBÈREUSE. (*Tige*). *Suberosus caulis*. Les tiges sont subéreuses lorsqu'elles sont revêtues d'une substance semblable à celle du liège; ce sont celles dont l'écorce est élastique & molle, comme dans le chêne-liège, *quercus suber*; le daphné dioïque, &c.

SUBMERGÉES (*Feuilles*). *Submersa folia*. Les feuilles sont ainsi nommées lorsqu'elles sont plongées dans l'eau, & qu'elles ne s'élèvent jamais à la surface, comme celles de la renouée aquatique, &c.

SUBSTANCE. On désigne en général, par ce mot, la matière dont sont formées les différentes parties des plantes. Ainsi les feuilles, considérées quant à leur substance, sont coriaces, membraneuses, scarieuses, grasses, épaisses, pulpeuses, &c. (*Voyez* l'ARTICLE FEUILLES, vol. II, art. 12.)

SUBULAIRE. *Subularia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des crucifères, qui a de tels rapports avec les *draba*, qu'il ne peut guère en être séparé, & qui comprend des herbes aquatiques, indigènes de l'Europe, à feuilles subulées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice médiocrement ouvert, à quatre folioles; quatre pétales en ovale renversé; six étamines didymes; une filique ovale, entière; les valves concaves; un style plus court que la filique; la cloison opposée aux valves.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en quatre folioles ovales, concaves, un peu ouvertes, caduques.

2°. Une corolle composée de quatre pétales en croix, ovales, entiers, un peu plus grands que le calice.

3°. Six étamines, dont les filaments sont plus courts que la corolle; deux opposés, plus courts, terminés par des anthères simples.

Botanique, Tome VII.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, surmonté d'un style plus court que la filique, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une petite filique ovale, un peu comprimée, entière, surmontée du style persistant, à deux valves concaves, à deux loges; une cloison opposée aux valves; des semences fort petites, arrondies.

Observations. Je n'aurois point conservé ici ce genre s'il en eût été question à l'article *DRABE* (*Draba*). Les caractères qui l'en séparent, sont trop faibles & presque nuls; ils consistent dans les folioles du calice, un peu plus ouvertes que dans les *draba*, dans les filiques ovales & moins allongées, dans les pétales plus courts, ovales & non pas oblongs, enfin dans le style un peu plus allongé; on y joint un autre caractère, celui d'avoir les cloisons opposées aux valves; mais il est reconnu que, dans les crucifères, les cloisons sont toujours parallèles aux valves, quelle que soit la forme de celles-ci. On conçoit que ces proportions de grandeur ne peuvent point former des caractères généraux. M. de Justieu, dans son *Genera Plantarum*, avoit déjà indiqué cette réforme que M. Lamarck a exécutée dans les *Illustrations des Genres*.

ESPÈCES.

1. **SUBULAIRE aquatique.** *Subularia aquatica*. Linn.

Subularia acaulis, foliis subulatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 423. n°. 1.

Subularia. Linn. Flor. lapp. 253. — Flor. suec. 527. 566. — Gort. Ingt. 101. — Æder. Flor. dan. tab. 55. — Pallas, Iter 2. pag. 100. — Roth. Germ. vol. I. pag. 175. — vol. II. pag. 79. — Hoffm. Germ. 224.

Draba. Lam. Illust. Gener. tab. 556. fig. 3.

Alyssum palustre, folio junci. Buxb. Aët. 2. pag. 369. tab. 23. fig. 1.

Graminifolia aquatica, thlaspeos capitulis rotundis, sepimento siliculam dirimens. Fluk. Almag. p. 180. tab. 188. fig. 5.

Gramen junceum, hybernum, thlaspeos capitulis. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 8. tab. 10. fig. ultima.

C'est une petite plante dont les racines sont grêles, fibreuses, très-fines, fasciculées; elle produit un grand nombre de feuilles toutes radicales, petites, inégales, sessiles, assez semblables à celles des graminées, planes, glabres, étroites, entières, aiguës & subulées à leur sommet, réunies en une petite touffe gazeuse.

De leur centre s'élèvent deux ou trois petites tiges simples, dépourvues de feuilles grêles, filiformes, hautes de deux ou trois poignées, glabres, supportant à leur partie supérieure quelques po-

tites fleurs blanchâtres, alternes, distantes, pédonculées; les pédoncules simples, inégaux, à peine aussi longs que les filiques. Le calice est glabre; à quatre folioles concaves, à demi-ovées; la corolle à peine plus longue que le calice; la filique ovale, courte, un peu comprimée, à deux valves; la cloison opposée aux valves & non parallèle.

Cette plante croît dans les lacs, les rivières & les fossés inondés de l'Europe septentrionale. ○ (V. f.)

2. SUBULAIRE des Alpes. *Subularia alpina*. Willd.

Subularia caule ramoso, foliis obovatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 475. n°. 2.

Draba (mollis), *foliis fuscarnosis, glabris; radicalibus petiolatis, ovatis, denticulatis; caulinis sessilibus, lanceolatis, integerrimis; siliculis oblongis, redivis*. Hort. Synops. 335. — Scop. Carn. n°. 789. tab. 34.

Cette plante diffère de la précédente par la forme de ses feuilles & par beaucoup d'autres caractères; elle appartient aux subulaires plutôt qu'aux araba, la cloison qui divise les valves étant contraire aux valves, & non parallèle, d'après Scapol; mais j'ai remarqué plus haut que cette distinction ne pouvoit être admise pour aucune plante crucifère.

Ses tiges sont droites, rameuses; les rameaux alternes; les feuilles radicales petiolées, ovales, denticulées à leur contour; celles des tiges sont sessiles, alternes, lancéolées, très-entières à leurs bords, un peu obtuses à leur sommet. Les fleurs sont petites, terminales; les silicules droites, oblongues, à deux valves, à deux valves, chaque valve séparée longitudinalement dans son milieu par la cloison.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Carniole. ✕

SUBULIÈRES ou en ALÈNE (Feuilles). *Subulata fo. la*. Ce sont celles qui, étant très-étroites, linéaires, sont terminées à leur sommet en une pointe aiguë, allongée, comme dans l'*arenaria tenuifolia*, &c.

SUC PROPRE DES PLANTES. On donne le nom de suc propre à des liqueurs particulières, ordinairement un peu épaisses ou qui plus souvent s'épaississent à l'air, différentes de la sève ou de la lymphe par leur couleur, par leur substance & par leur saveur, qui varient dans le plus grand nombre des plantes, & qui résident principalement dans l'écorce. Cette substance est blanche & laiteuse dans le figuier & les euphorbes, rouge dans la patience sanguine, jaune dans la chélidoine, verte dans la pervenche, la morelle noire, gommeuse

dans le cerisier, dans le prunier, dans l'amandier; résineuse dans les pins, les sapins, les térébinthes. Sa saveur est quelquefois douce, quelquefois caustique; tantôt elle est odorante, tantôt sans odeur; souvent elle est insipide.

Plusieurs auteurs, Malpighi en particulier, ont cru que chaque plante contienne une liqueur qui lui étoit propre, & ils ont pensé que c'étoit particulièrement dans ce suc propre que résidoient les propriétés des végétaux. Plusieurs faits semblent venir à l'appui de ce sentiment. En effet, la liqueur blanche qui coule du pavor, est narcotique; celle du tithymale est corrosive. La vertu diurétique & balsémique du sapin consiste dans sa térébenthine. La propriété purgative du jalap réside uniquement dans sa résine. De plus, on reconnoît peu de vertus dans les plantes où la lymphe abonde, & dans celles dont le suc propre est peu différent de la lymphe.

Quelques observations faites par Duhamel contribuent à nous faire mieux connoître la nature du suc propre. « Quand les liqueurs propres s'excrètent, dit ce savant observateur, elles ne produisent ni écorce ni bois, mais elles forment un dépôt contre nature, un amas de gomme ou de résine, ou d'autres sucs épais. Ces sortes de dépôts résineux & gommeux, & même les incisions par lesquelles on les obtient en plus grande abondance, ne leur sont pas ordinairement très-préjudiciables; quelquefois même ils leur sont utiles à certains égards, ainsi qu'on le remarque aux arbres résineux, qui ont quelquefois besoin qu'on leur procure cette évacuation. Elle tourne d'ailleurs à notre avantage, puisqu'elle nous procure des baumes, des résines de diverses espèces, & la matière de nos vernis.

» L'éruption du suc propre dans les vaisseaux lymphatiques ou dans le tissu cellulaire occasionne aux plantes des maladies qu'on peut comparer aux inflammations qui arrivent aux animaux. Les pêcheurs, les pruniers, les amandiers, &c. nous offrent de fréquents exemples d'inflammations vasculaires. Lorsque le suc propre, qui dans ces arbres est gommeux, s'est répandu trop abondamment dans les vaisseaux lymphatiques ou dans le tissu cellulaire, la branche à laquelle cet accident est arrivé, péric, à moins qu'on n'ait soin d'emporter avec la serpette l'endroit où s'est fait l'épanchement; & si cette plaie occasionne un épanchement extérieur du suc propre, cette déperdition ne fera pas autant de mal à l'arbre, que l'éruption intérieure des liqueurs propres dans les vaisseaux lymphatiques. C'est ce que l'expérience justifie tous les jours lorsqu'on entame des arbres pour en retirer le suc propre.

» Celui que l'on retire des arbres résineux s'écoule suivant certaines circonstances qui sont étrangères à l'effusion de la lymphe. Pour procurer cet

écoulement, on entame l'écorce & le bois. On remarque, 1°. que le suc suinte de toute l'étendue de la plaie, mais principalement d'entre le bois & l'écorce, quoique ce ne soit pas en cet endroit qu'on aperçoit les plus gros vaisseaux propres; 2°. que le suc propre suinte bien plus abondamment dans le tems des grandes chaleurs que quand l'air est frais, & que ce suc cesse de couler lorsqu'il fait un tems froid. 3°. On observe constamment qu'il sort plus de suc propre de la partie supérieure de la plaie, que de la partie inférieure, de sorte qu'il semble que le suc propre descend plutôt des branches, qu'il ne monte des racines vers le haut. Par exemple, si, après avoir arraché un richimale, on le coupe transversalement par la moitié, & qu'on renverse les deux parties coupées en les tenant suspendues, on observera, au bout de quelques jours, que les vaisseaux propres de la moitié supérieure se sont entièrement vidés, tandis que ceux de la moitié inférieure sont encore presque pleins.

» Il est à remarquer que les principaux vaisseaux qui contiennent le suc propre, sont différemment placés dans les arbres de différentes espèces. La térébenthine du sapin se rassemble sous l'épiderme dans des vésicules; la sandarake du genévrier s'amasse entre l'écorce & le bois; la térébenthine de la mélèze s'accumule dans le corps même du bois; la résine du pin transude de l'écorce, d'entre le bois & l'écorce, & même du corps ligneux. »

SUERCE. *Swertia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopérales, de la famille des gentianes, qui a des rapports avec les gentiana & les chidra. Il renferme des herbes la plupart exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, entières; les fleurs axillaires & terminales; les pédoncules soutenant une ou plusieurs fleurs.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle en roue; le tube très-court; deux points excavés à la base de chaque découpe du limbe; cinq étamines; un style; deux stigmates; une capsule à une loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice plane, persistant, à cinq découpures lancéolées.

2°. Une corolle monopétale, en roue, dont le tube est très-court, le limbe plane, ouvert, partagé en cinq découpures lancéolées, plus grandes que le calice; chaque découpe munie à sa base de deux points enfoncés, & entourés de cils petits & droits.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont subu-

les, ouverts, plus courts que la corolle, surmontés d'anthères inclinées, sagittées.

4°. Un ovaire supérieur, ovale-oblong, se prolongeant en un style court, terminé par deux stigmates simples.

Le fruit est une capsule presque cylindrique, acuminée, de la longueur des éramines, à une seule loge, à deux valves, renfermant des semences nombreuses & fort petites.

Observations. Quoique les espèces renfermées dans ce genre varient par le nombre des divisions de leur calice, de leur corolle, de leurs étamines de quatre à cinq, elles conservent plusieurs caractères constants qui empêchent de les confondre avec les gentiana ou les chidra. Le tube de la corolle est très-court; ses divisions planes, très-ouvertes; ce qui forme une corolle en roue. D'ailleurs, les deux follicles situés à la base de chaque division se retrouvent également dans toutes les espèces, où quelquefois elles forment par leur prolongement une foire d'éperon extérieur, comme dans le *swertia corniculata*, *umbellata*.

ESPÈCES.

* Limbe de la corolle à cinq divisions.

1. **SUERCE VIVACE.** *Swertia perennis*. Linn.

Swertia corollis quinquefidis, foliis radicalibus ovatis, petiolatis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 490. n°. 2241. tab. 109.

Swertia corollis quinquefidis, foliis radicalibus ovalibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 635. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 111. n°. 77. — Mill. Dict. n°. 1. — Jacq. Flor. austr. tab. 243. — Kniph. Cent. 7. n°. 91. — Hoffm. Germ. 86. — Roth. Germ. vol. 2. pag. 184. — Martusch. Sibir. n°. 171.

Swertia (perennis), corollis quinquefidis, pedunculis tetragonis, subulatis; caule indiviso; foliis radicalibus ovalibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1329. n°. 1.

Swertia. Hort. Cliff. 53. — Royen, Lugd. Bat. 430.

Gentiana foliis radicalibus petiolatis, ovatis; floribus paniculatis, rotatis, spicatis. Haller, Helv. n°. 636.

Gentiana carulea, paniculata, annua, pennai. Bartel. Icon. Rar. tab. 91.

Gentiana corollarum laciniis nectario gemino notatis. Monnier, Observ. 154.

Gentiana palustris, latifolia. C. Bauh. Pin. 188.

Gentiana paniculata. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 290. n°. 333.

Gentiana palustris, latifolia, flore punctato. Tournef. Infl. R. Herb. 81.

Gentiana punctata flore, subcaeruleo, pennai. J. Bauh. Hist. 3. pag. 528. Sine icon.

Gentiana xiz, punctata flore. Clus. Hist. 1. pag. 316. — Idem, Stimp. Pann. pag. 290. tab. 292.

C'est une assez belle plante, qui a le port d'une gentiane à fleurs bleues. Ses racines sont fibreuses, un peu traçantes : il s'en élève une tige droite, très-simple, glabre, presque cylindrique, fistuleuse, souvent rougeâtre à sa partie inférieure, haute d'un pied & plus, garnie de feuilles opposées ; les inférieures ou radicales ovales, lancéolées, rétrécies en un long pétiole ; les caulinares & supérieures sessiles, conniventes, lancéolées, entières, vertes, très-lisses, à peine aiguës, marquées de nervures longitudinales.

Les fleurs forment, par leur ensemble, un bel épi droit, terminal, presque paniculé. Elles sont soutenues par de longs pédoncules axillaires, opposés, tétragones, droits ; les supérieurs simples & plus courts ; les inférieurs plus longs, médiocrement rameux vers leur sommet ; les ramifications garnies à leur base de deux petites bractées opposées, lancéolées. Le calice est glabre, à cinq découpures profondes, lancéolées, acuminées ; la corolle d'un bleu-tendre, d'une grandeur médiocre ; les découpures de son limbe lancéolées, chargées vers leur base de deux points noirâtres, un peu saillans ; cinq étamines plus courtes que la corolle, insérées sur le tube ; les anthères sagittées, inclinées ; le style court, surmonté de deux stigmates. Le fruit est une capsule oblongue, acuminée, à deux loges.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, en Suisse, en Allemagne, dans la Sibérie, & dans les départemens méridionaux de la France ; elle m'a été communiquée par M. Desfoucault. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

2. Suerce difforme. *Swertia difformis*. Linn.

Swertia corollis quinquefidis, terminali sexfid, pedunculis longissimis, foliis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 328. n°. 2. — Mill. Dict. n°. 2. Lam. Illust. Gener. vol. 1. pag. 490. n°. 2242. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1330. n°. 2.

Gentiana foliis linearibus, acuminatis; pedunculis longissimis, nudis, anisofloris, oppositis. Gronov. Virgin. 30.

Cette espèce est petite ; elle ne s'élève guère qu'à la hauteur de six à huit pouces, sur une tige grêle, très-simple, à peine feuillée ; ses feuilles presque toutes radicales ou inférieures sont opposées, sessiles, glabres, linéaires, très-entières à leur contour, acuminés à leur sommet, longues d'environ trois pouces, sur une ligne & demie de

largeur ; celles des tiges, rares, situées à la base des pédoncules, pourtoient être considérées comme des bractées.

Les fleurs sont soutenues sur de très-longs pédoncules nus, opposés, très-simples, uniflores. La corolle est blanche, de couleur bleue, selon Miller ; celle des fleurs inférieures a son limbe partagé en cinq découpures lancéolées, tandis qu'aux fleurs supérieures il est ordinairement à six découpures. Le fruit est une capsule oblongue, presque cylindrique, à deux loges, qui renferment des semences fort petites.

Cette plante croît naturellement dans la Virginie.

3. Suerce couchée. *Swertia decumbens*. Vahl.

Swertia corollis quinquefidis, foliis linearilanceolatis, caulis decumbentibus. Vahl, Symbol. 1. pag. 24. — Lam. Illust. Gener. vol. 1. pag. 490. n°. 2244. — Willd. Spec. Plant. pag. 1330. n°. 3.

Parnassia (polynectaria), foliis linearilanceolatis; nectariis decem fido. Forskh. Flor. ægypt-arab. pag. 207. n°. 34, & Icon. tab. 5. fig. B.

Ses tiges sont toutes couchées, grêles, filiformes, rameuses, un peu anguleuses, longues d'environ un pied, de couleur violette à leur base, vertes à leur partie supérieure, garnies de feuilles distantes, sessiles, opposées, linéaires, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leur contour, longues d'environ un demi-pouce.

Les fleurs sont solitaires, supportées par des pédoncules simples, opposés, tetraïnus, filiformes, uniflores. Le calice est partagé en cinq découpures profondes, ouvertes, linéaires, lancéolées ; la corolle ouverte, une fois plus longue que le calice, en roue, à tube très-court ; son limbe divisé en cinq découpures ovales, aiguës, blanches, traversées par des veines violettes, tachetées de violet à leur base, marquées de deux fossettes profondes, coniques, entourées de cils à leur orifice, de couleur jaunâtre dans leur cavité, cinq filamens droits ; les anthères violettes, sagittées, obtuses. L'ovaire est cylindrique, rétréci & comprimé à son sommet ; le style presque nul ; le stigmate comprimé, à deux lobes. Le fruit est une capsule cylindrique, subulée, couronnée par le stigmate, à une seule loge, contenant, dans deux valves, des semences petites, globuleuses, très-nombreuses.

Cette plante se rencontre dans l'Arabie heureuse.

4. Suerce en roue. *Swertia rotata*. Lam.

Swertia corollis quinquefidis, foliis lanceolato-linearibus. Lam. Illust. Gener. vol. 1. pag. 490. n°. 2243. — Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 318.

Swertia corollis rotata, paniculatis; foliis lanceolatis. Linu. Syst. Plant. vol. 1. pag. 646. n°. 4. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 112. tab. 51. fig. 1. — Pallas, Iter 2. pag. 91. — Id. Flor. rossic. vol. 2. p. 98. tab. 89.

Gentiana (rotata), corollis quinquefidis, rotatis, fauce squamosis; foliis linearilanceolatis. Fenzl. Gent. pag. 105. n°. 41.

Gentiana (rotata), corollis quinquefidis, rotatis, fauce squamosis; laciniis ovatis; calicinis laciniis oblongo-ovatis; foliis ovato-lanceolatis, acutiusculis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1351. n°. 51.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec les gentianes; elle a le port du *gentiana amarella*. Ses racines sont courtes, grêles, rameuses, & produisent une tige droite, lisse, presque filiforme, roide, un peu rameuse vers son sommet, garnie de feuilles sessiles, opposées, linéaires lancéolées ou un peu ovales, glabres à leurs deux faces, entières.

Les fleurs sont axillaires & terminales, d'un bleu-vif; leur calice est divisé en cinq folioles linéaires ou lancéolées; la corolle ouverte en étoile; son tube très-court; limbe à cinq & quelquefois six découpures profondes, lancéolées, aiguës, garni de dix écailles à son orifice; les étamines d'un bleu-verdâtre; l'ovaire cylindrique, aigu, presque fusiforme; le style & le stigmate peu sensibles. La capsule est cylindrique, un peu comprimée, à deux valves, renfermant des semences noirâtres, globuleuses, fort petites.

Cette plante croît au Kamatchatka & dans la Sibérie, aux lieux bas & humides. ☉

Les Tartares de la Sibérie appliquent sur leurs bleffures les feuilles de cette plante, après les avoir machées. Les Russes font avec les fruits une infusion, dont la saveur amère & aromatique leur paroît agréable.

5. SUECE de Carinthie. *Swertia carinthiaca*.

Swertia corollis quinquefidis, caulibus unifloris, basi foliosis. Jacq. Miscell. 2. pag. 53. tab. 6. — Reiner & Hohenw. Iter, pag. 101. — Murr. Syst. Veget. pag. 266.

Gentiana (carinthiaca), corollis quinquefidis, rotatis, fauce barbatis; caulibus dichotomis; pedunculis longissimis; foliis ovatis, obtusis. Fenzl. Gent. pag. 103. n°. 41. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1350. n°. 49.

On pourroit presque soupçonner que cette plante n'est qu'une variété du *Swertia rotata*; mais elle en diffère par son port & par quelques autres caractères. Ses racines sont grêles, fibreuses, presque simples: il s'en élève une tige droite, menue, glabre, dichotome, garnie de feuilles

opposées, sessiles, très-entières, ovales, obtuses à leur sommet, vertes, glabres à leurs deux faces, plus nombreuses & rapprochées à la partie inférieure des tiges. Les pedoncules sont très-longs, & supportent une fleur d'un beau bleu, dont le tube est extrêmement court, barbu à son orifice; le limbe à cinq découpures en roue.

Cette plante croît sur le sommet des hautes montagnes, dans la Carinthie. ☉

6. SUECE sillonnée. *Swertia sulcata*. Rottb.

Swertia corollis quinquepartitis, campanulatis, macronatis, eglandulosis; germinibus compressis, utrinque sulcatis. Rottb. Act. Hafn. 10. pag. 438. tab. 1. fig. 4. — Retz. Scand. edit. 2. n°. 309.

Swertia rotata. Gunn. Norveg. n°. 1077.

Gentiana (sulcata), corollis quinquefidis, rotatis, fauce squamosis; laciniis lanceolatis; calicinis laciniis lanceolatis; foliis linearibus, obtusis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1351. n°. 50.

Gentiana corollis quinquefidis, campanulatis, calicis longiusculis; caulis fructibus ramosis, multifloris & foliosis, linearibus. Wedd. Flor. dan. tab. 345.

Cette plante appartient au moins autant aux gentianes qu'au *Swertia*. Ses tiges sont glabres, droites, rameuses; les rameaux sont nombreux & si chargés de fleurs, qu'ils semblent former des épis. Les feuilles sont opposées, sessiles, linéaires, obtuses à leur sommet, entières, glabres à leurs deux faces; les fleurs axillaires, pédunculées, situées le long des rameaux. Leur calice est divisé en cinq découpures droites, allongées, glabres, lancéolées; la corolle bleue, à peine tubulée, de la longueur du calice, ouverte en roue en cinq découpures lancéolées, aiguës; l'orifice muni de dix écailles en forme de couronne; l'ovaire est comprimé, sillonné à ses deux faces.

Cette plante se rencontre dans l'Islande. ☉

7. SUECE à feuilles de parnassia. *Swertia parnassifolia*. Labill.

Swertia corollis quinquepartitis; foliis radicalibus cordatis; caulibus lanceolatis, alternis. Labill. Nov.-Holl. Plant. Spectm. pag. 71. tab. 97.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & demi, légèrement comprimées, dichotomes, presque nues; les feuilles radicales nombreuses, longuement pétioles, ovales, en cœur, un peu sinuées à leur contour, traversées par cinq ou sept nervures glabres à leurs deux faces; les feuilles caulinaires rares, très-distantes, alternes, courtes, lancéolées, aiguës, entières; la supérieure presque en forme de bractée. Les fleurs disposées

en une panicule lâche, dichotome à ses divisions ; une bractée lancéolée à la base de chaque division & des pédicelles.

Le calice est renflé, turbiné, à cinq découpures ovales, oblongues ; la corolle jaune, pileuse en dedans ; le tube très-court ; le limbe à cinq découpures lancéolées ; cinq étamines, dont les filaments sont courts, insérés sur le tube, alternés avec les divisions de la corolle ; des anthères lancéolées, à deux loges biffées à leur base ; cinq petites glandes pré- ou orbiculaires, situées sous la corolle & opposées à ses découpures ; un ovaire ovale, un style très-court, deux stigmates aigus ; une capsule supérieure, oblongue, à une loge, à deux valves ; chaque valve biffée à son sommet ; un réceptacle longitudinal, auquel sont attachées plusieurs semences pâles, globuleuses, un peu en bourse ; l'embryon cylindrique ; le perispermé charnu.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, dans la terre de Van-Leuwin. (Labill.)

* * Limbe de la corolle à quatre divisions.

8. Suerce corniculé. *Sweria corniculata*. Linn.

Sweria corollis quadrifidis, quadricornibus. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 636. — Amoenit. Academ. vol. 2. pag. 344. — Gmel. Sibit. vol. 4. pag. 114. tab. 53. fig. 4. — Pallas, Flot. ross. 2. pag. 99. tab. 90. fig. 1. — Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 490. n°. 2145. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1330. n°. 4.

Sweria (corniculata), floribus quadrifidis, corollâ subcampanulata, tubo uteris quadrilobato. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 97.

Outre les quatre divisions de la corolle, qui distinguent cette plante de la plupart des autres espèces, elle est encore caractérisée d'une manière plus particulière par les fossètes profondes de la corolle, qui produisent au dehors, à la base des découpures, quatre cornes saillantes ; elle ressemble aussi, par son port, à la *gentiana amarella*.

Ses racines sont fibreuses, annuelles ; il s'en élève une tige presque cylindrique, obscurément quadrangulaire, haute d'un demi-pied, lisse, articulée, divisée en rameaux courts, opposés, les supérieurs très-courts ; les feuilles sont opposées, lancéolées, lisses à leurs deux faces, très-entières, marquées de trois nervures.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, supportées par des pédoncules opposés. Leur calice est à quatre divisions droites, persistantes, plus courtes que la corolle, rudes à leurs bords ; la corolle est presque campanulée, d'un vert-jaunâtre, à quatre découpures aiguës, chacune d'elles munie à sa base d'un prolongement

concave, en forme d'éperon, subulé. Les étamines sont au nombre de quatre, de moitié plus courtes que la corolle ; les anthères arrondies ; l'ovaire cylindrique ; le style presque nul ; deux stigmates filiformes. Le fruit est une capsule cylindrique, à une loge, à deux valves ; les semences sont nombreuses, arrondies.

Cette plante croît au Canada, dans les pâturages marécageux & dans la Sibérie. ○ (*V. f. in herb. Lam.*)

9. Suerce à ombelles. *Sweria umbellata*. Ruiz & Pav.

Sweria corollis quadricornibus, foliis lanceolato-linearibus, connatis ; radicalibus confertis ; caulinis remotis ; floribus terminalibus, umbellatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 21. tab. 242. fig. B.

Plante herbacée, glabre, annuelle, un peu amère, dont les racines sont fibreuses, d'un blanc-jaunâtre ; les tiges droites, hautes d'un à deux pieds, grêles, quadrangulaires, très-lisses, simples ou rameuses, garnies de feuilles opposées, linéaires-lancéolées, très-entières, à trois nervures, glabres à leurs deux faces, rudes à leurs bords, très-étroites, longues d'un à deux pouces ; les radicales ramassées, pétiolées ; les caulinaires distantes, sessiles, conniventes à leur base.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle souvent solitaire, quelquefois accompagnée de deux autres axillaires, munies d'un involucre à plusieurs folioles linéaires. Le pédoncule commun se divise à son sommet en plusieurs pédoncules simples, partiels, au nombre de cinq à dix, inégales, quadrangulaires, légèrement penchées. Le calice est jaunâtre, à quatre découpures ovales lancéolées, rapprochées, inférieures, persistantes, rudes à leurs bords. La corolle est jaune, une fois plus longue que le calice, à quatre cornes ; les découpures droites, ovales, acuminées, conniventes ; les cornes aigües, divergentes ; les filaments au nombre de quatre, subulés, épaissis à leur sommet, insérés à la base des découpures de la corolle ; les anthères tombantes, sagittées, jaunâtres, à deux loges, pubescentes. L'ovaire est ovale, aigu ; le style nul ; deux stigmates obliques, écartés, un peu élargis. La capsule est conique, surmontée des stigmates, toruleuse inférieurement, divisée en deux loges depuis sa base jusque vers son milieu ; depuis le milieu jusqu'au sommet, à deux valves aiguës, divergentes, recourbées à leur sommet, contenant plusieurs semences fort petites, lenticulaires, attachées sur deux réceptacles décroissants le long de la suture des valves des deux côtés, & dont ils forment les cloisons jusqu'au milieu de la capsule.

Cette plante croît abondamment au Pérou, sur

les hauteurs des Andes ; elle fleurit depuis le mois de juillet jusqu'en octobre. ○ (*Descript. ex Rurk & Pev.*)

10. *SUERCE* du Kamtchatka. *Swertia tetrapetala*, Pall.

Swertia corollis quadrifidis, eornibus; pedunculis erectis, foliis lanceolatis, caule simplicij. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1331. n° 6.

Swertia (tetrapetala), *corollis rotatis, quadrifidis; foliis oppositis, lanceolatis, nervosis.* Pallas, Flor. ross. 2. pag. 99. tab. 90. fig. 2.

Ses racines sont simples, grêles, fort menues, & produisent une tige droite, très-simple, filiforme, cylindrique, haute de quatre à cinq pouces, garnie de feuilles distantes, opposées, sessiles, lanceolées, glabres, nerveuses, au nombre de quatre à cinq paires au plus.

Les fleurs sont petites, opposées, solitaires, situées dans les aisselles des feuilles supérieures ; les pédoncules simples, souvent garnis de deux feuilles. Le calice est partagé en quatre folioles linéaires ; la corolle d'un bleu vif, à quatre découpures ouvertes ; une cicatrice ou une tache jaunâtre, festonnée, à l'orifice, d'un tube très-court ; les étamines roussâtres, plus courtes que la corolle. L'ovaire est cylindrique, fusiforme.

Cette plante croît au Kamtchatka. ○ (*Descript. ex Pall.*)

11. *SUERCE* dichotome. *Swertia dichotoma*, Linn.

Swertia corollis quadrifidis, eornibus. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 636. — *Amoenit. Acad.* vol. 2. pag. 344. — *Gmel. Sibir.* vol. 4. pag. 114. tab. 53. fig. 4. — *Pallas, Flor. ross.* 2. pag. 99. tab. 90. fig. 1. — *Lam. Illustr. Gener.* vol. 1. pag. 490. n° 2246.

Swertia (dichotoma), *corollis quadrifidis, eornibus; pedunculis nuncians, foliis ellipticis, caule ramoso.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1330. n° 5.

Cette plante a le port d'un *anagallis*, le caractère de la précédente dans la corolle à quatre divisions, mais point éperonnée.

Elle a des racines fibreuses, qui produisent un grand nombre de tiges diffuses, éraillées, longues de trois à quatre pouces, articulées, dichotomes, munies de rameaux opposés, presque ramifiés, plus longs que les tiges, garnis de feuilles ovales, elliptiques ; les radicales ovales, nerveuses, rétrécies, à leur partie inférieure, en un pétiole de la longueur des feuilles ; les caulinaires opposées, presque sessiles, ouvertes, très-entières, glabres à leurs deux faces, marquées de trois nervures.

Les fleurs sont terminales, situées dans la bifurcation des rameaux, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, pendans, plus courts que les entre-nœuds des rameaux. Le calice est d'une seule pièce, divisé en quatre lobes ovales, lancéolés, aigus ; la corolle monopétale, ouverte ; son limbe partagé en quatre découpures ovales, persistantes, obtuses : elle renferme quatre étamines, dont les filaments sont séparés, de moitié plus courts que la corolle, supportant des anthères arrondies. L'ovaire est ovale ; point de style ; deux stigmates un peu obtus. Le fruit est une capsule de la longueur de la corolle, un peu arrondie, comprimée, bivalve, à une loge ; les valves planes, les semences arrondies.

Cette plante croît dans la Sibérie. ○ (*Descript. ex Linn.*)

SUFFRÉNIE FILIFORME. *Suffrenia filiformis*, Bellard. Act. Academ. Turin. 7. pag. 444. tab. 1. fig. 1. — *Decand. Flor. franç.* vol. 4. pag. 411.

Polygala repens nuperorum. Lobel. Ic. tab. 416. fig. 1, & Observ. pag. 127. fig. 3.

C'est une petite plante herbacée, dont les racines sont grêles, médiocrement rameuses, fibreuses, qui produisent une tige divisée, dès sa base, en plusieurs rameaux glabres, rampans, couchés, presque simples, grêles, longs de six à huit pouces, garnis de feuilles petites, sessiles, opposées, un peu distantes, ovales-oblongues, très glabres, un peu rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet, très-entières, bien plus courtes que les entre-nœuds. Les fleurs sont sessiles, petites, jaunâtres, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette plante, découverte par M. de Suffren, botaniste plein d'activité, lui a été consacrée par M. Bellardi, qui en a fait un genre particulier, qui a des rapports avec les *glaux* & les *perlis*, & qui appartient à la famille des *salicaïres*.

Son caractère essentiel est d'avoir :

Un calice monopétale, à quatre dents ; point de corolle ; deux étamines ; un style ; une capsule supérieure, à deux valves, à une seule loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, en forme de cloche, terminé par quatre dents droites, aiguës.

2°. Point de corolle.

3°. Deux étamines, dont les filaments sont courts, opposés, insérés sur le calice ; les anthères petites, un peu ovales.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté

d'un style très-court, & terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une capsule supérieure, ovale oblongue, à une seule loge, à deux valves; les semences petites & nombreuses, attachées à un placenta central.

Cette plante croît dans le Piémont, aux environs d'Ivrée & de Verceil, sur le bord des rizières, aux environs d'Auver & de Gand; elle fleurit vers la fin de l'été. ○

SUILLE. *Suillus*. Genre de plantes acrotyle-donnes, de la famille des champignons, qui renferme un certain nombre d'espèces, d'une substance ordinairement ferme & coriace, munie d'un pédicule qui soutient un chapeau, dont la surface inférieure est munie de pores nombreux, très-ferres, allongés, tubulés, adhérens ensemble, mais faciles à détacher de la substance charnue qui leur sert de réceptacle. Ce dernier caractère est le seul qui les distingue des bolets (*Boletus* Linn.; *agaricus* Lam.), la masse des tubes ne pouvant être, dans ceux-ci, séparée de la substance charnue.

Il est aisé de reconnaître que les suilles, d'après ce caractère, ne sont qu'une division des bolets, & qu'ils ne peuvent pas en être séparés comme genre. Nous ne les présentons ici que parce qu'ils nous offrent l'occasion de rappeler plusieurs espèces qui n'ont pas été mentionnées à l'article AGARIC, dénomination qui avoit été adoptée par Tournefort, & que M. Lamarck a substituée à celle de bolet Linn. Nous nous bornerons cependant aux espèces les plus remarquables.

E S P È C E S.

1. SUILLE à collier. *Suillus annulatus*.

Suillus pileo pulvinato, campanulato, viscoso, flavescens, livido; maculis à lateribus rufis, virgato; poris luteis, stipite annulato (boletus). Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 503. n° 1.

Boletus annularius. Bull. Champ. pag. 316. tab. 332. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 127.

Boletus luteus. Schaff. Fung. 2. tab. 114. — Bolton. Fung. 2. tab. 84.

Ce champignon est de couleur jaunâtre: son pédicule s'élève à la hauteur de deux à trois pouces; il est cylindrique, un peu jaune, couronné à sa base d'un collier en anneau qui dure peu, & qui forme le principal caractère de cette espèce. Son chapeau est convexe, arrondi, presque campanulé, visqueux, d'un jaune livide, marqué de taches linéaires, rouilleuses, particulièrement sur les côtes; les tubes d'un jaune plus foncé; le réceptacle ou la chair blanche, ferme, fort épaisse.

Cette espèce croît sur la terre, pendant l'au-

tomne. On la rencontre plus particulièrement dans les forêts de pins.

2. SUILLE parasite. *Suillus parasiticus*.

Suillus pileo convexo, fusco, areolis angulosis sulcatis; stipite basi attenuato.

Boletus parasiticus. Bull. Champ. pag. 317. tab. 451. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 2. p. 127.

Cette espèce est parasite; elle croît sur la vesseloup vertueuse. Son pédicule est cylindrique, de couleur jaune, un peu aminci à sa base; en vieillissant il devient souvent écaillé; il supporte un chapeau convexe d'un brun-foncé dans sa jeunesse, uni à sa surface supérieure; il se crevasse en vieillissant, & se divise en aréoles anguleuses. Sa chair est ferme, d'un beau jaune; les tubes d'un jaune plus foncé, courts, serrés, se détachant aisément de la substance charnue qui leur sert de réceptacle.

3. SUILLE enveloppé. *Suillus cortinatus*.

Suillus stipitatus, pileo luteo, centro aurantio; carne alba, crispâ, firmâ; tubis luteis; cortinâ alba. Bolton. Fung. pag. 169. tab. 169. & tab. 84. fig. 1. — *Boletus annularius*.

Boletus cortinatus. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 503. n° 2.

Boletus flavus. Wither. Botan. arrang. edit. 3. vol. 4. pag. 320.

Son pédicule est épais, renflé à sa base, enveloppé à cette partie par une membrane blanche, en forme d'anneau. Son chapeau est un peu visqueux, jaunâtre, de couleur orangée dans son centre. Les tubes sont de couleur jaune, un peu décurrens; la substance charnue qui leur sert de réceptacle, blanche, ferme, crépue.

Cette espèce a été observée en Angleterre.

4. SUILLE cendré. *Suillus cinereus*.

Suillus pileo pulvinato, squamoso, cinereo, cortinâ appendiculato; poris canididis; stipite squamoso-fibrilloso, pileo concoloro. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 504. n° 3. (*Boletus*)

Cette espèce, qui est une des plus belles & des plus grandes, est rare, & a été observée, par M. Persoon, parmi les hêtres. Son pédicule est allongé, de couleur cendré, composé de fibres très-fines & couvert de petites écailles; il supporte un chapeau de même couleur, également couvert d'écailles droites, épaisses, un peu veuées à leurs bords, très-rapprochées, surtout celles du centre. Les pores sont blancs; la chair ferme, munie d'une membrane en forme d'appendice.

5. SUILLE orangé. *Suillus aurantiacus*.

Suillus

Suillus pileo carneo, nitido, subaurantiaco; poris minutis, candidis; stipite longo, albo; squamulis verruciformibus, aurantiis. Pers. Syn. Meth. Fung. pag. 504. n. 4. & Observ. Mycol. 1. pag. 11. (*Boletus*.)

Boletus (aurantiacus), pileo fulvo, canescente; stipite rugoso, maculato. Bull. Champ. pag. 320. tab. 136. & tab. 489. fig. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 1. pag. 127.

S. Suillus (boletus leucopodius), pileo planiusculo, ex aurantio diluto cinnamomeo, nitido; poris & stipite cum squamulis albis. Pers. l. c. & Observ. Mycol. 2. pag. 11.

S. Suillus (boletus rufus), pileo dilatato, convexo, plano, lateribus rufis, rivulosis; poris albidis; stipite longo, rugoso-lacero; squamulis nigrescentibus. Pers. l. c. & Observ. Mycol. 2. pag. 13. — Schœff. Fung. tab. 108. — Sowb. tab. 110. — Bull. Champ. tab. 489. fig. 2. — Decand. l. c.

Vulgairement rouille ou gyrole rouge.

Son pédicule est allongé, cylindrique, quelquefois renflé vers son milieu, haut de trois à six pouces, blanchâtre, moucheté de rouge ou de brun, armé de pointes rudes, écaillues, quelquefois noirâtres; il se termine par un chapeau variable dans sa grandeur, convexe, orbiculaire, large, épais, de couleur médiocrement orangée ou fauve. Les tubes sont petits, étroits, serrés, blanchâtres, assez réguliers.

Il croît dans les bois, sur la terre, parmi les hêtres, en automne. On croit pouvoir le manger sans risque lorsqu'il est jeune.

6. SUILE rude. *Suillus scaber*.

Suillus pileo subrugoso, opaco, fuligineo-cinereo; poris pallentibus-albis, circa stipitem depressis; stipite attenuato, squamulis nigrescentibus (boletus). Pers. Observ. Myc. 2. pag. 13. & Synopf. Meth. Fung. pag. 505.

Boletus scaber. Bull. Champ. pag. 319. tab. 132. & tab. 489. fig. 1. — Schrad. Spicil. Flor. germ. pag. 150. — Decand. Flor. franç. vol. 1. pag. 126.

Boletus bovinus. Schœff. Fung. tab. 104.

Ce champignon se distingue à son aspect livide & aux très-petites écailles rudes dont il est tout hérissé. Son pédicule est épais, cylindrique, un peu renflé à sa base, haut de quatre à cinq pouces & plus; les petites écailles qui le recouvrent, deviennent noirâtres en vieillissant. Le chapeau est convexe, orbiculaire, un peu rié en dessus, d'une couleur cendrée tirant sur le brun; les pores tubulés d'un blanc-pâle. Ceux qui avoisinent le pédicule sont beaucoup plus serrés.

On rencontre cette espèce, au commencement
Botanique. Tome VII.

de l'automne, dans les bois: il noircit & se durcit en se desséchant.

7. SUILE groupé. *Suillus circinans*.

Suillus gregarius, pileo viscoso, subrepando, crasso, stramineo aut flavo-livido; poris acutis, luteis; stipite subtenui, breviusculo, flavido, punctis subnigrescentibus opero (boletus). Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 17. & Synopf. Fung. pag. 505.

Boletus inquinans. Schrad. Spicil. Flor. germ. pag. 144.

Boletus flavo-rufus. Schœff. Fung. Bav. tab. 123. Junior. ?

Boletus ferrugineus. Schœff. l. c. tab. 126. Senior. ?

S. Boletus (lactifluus), tubis flavis; pileo vascino, stipite dilute flavo, sacco luteo. Wither. Bot. atrang. 3. pag. 320.

C'est une assez belle espèce, qui, selon son âge, se présente sous des couleurs & avec des formes un peu différentes. Il croît par groupes ordinairement en ronc. Son pédicule, court dans sa jeunesse, s'allonge beaucoup avec l'âge; il est un peu jaunâtre, rude & couvert de points noirâtres. Il supporte un chapeau épais, large de trois à quatre pouces, visqueux, d'un jaune-livide, un peu sinué à ses bords. Les pores sont tubulés, petits, aigus, serrés, de couleur jaune; ils répandent dans leur jeunesse quelques gouttes d'une liqueur laiteuse.

Cette espèce croît, au commencement de l'automne, sur la terre, dans les forêts de pins.

8. SUILE à tubes jaunes. *Suillus chrysenteron*.

Suillus mediocris, pileo pulverulento, convexo-plano, submentoso, gilvo, aut flavo-cinerecente; carne subinmutabili, poris maj. albis, stipite subtenui, medio rubicundo, aut unicolore lutescente (boletus submentosus). Pers. Observ. Mycol. 2. n. 12. & Synopf. Meth. Fung. pag. 506.

Boletus chrysenteron. Bull. Champ. pag. 329. tab. 393. fig. 4. & tab. 90. fig. 3. — Decand. Flor. fr. vol. 2. pag. 126.

Boletus cupreus. Schœff. Fung. tab. 133. — Michel. Gen. tab. 69. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 834. fig. 1.

S. Boletus communis. Bull. Champ. pag. 328. tab. 490. fig. 3. — Schœff. Fung. tab. 112.

S. Boletus lividus. Bull. Champ. pag. 327. tab. 490. fig. 2.

Les aspects variés sous lesquels se présente ce champignon, soit dans ses couleurs, sa figure, soit dans les dimensions de sa grandeur selon son
Rrr

âge, la saison & la température, peuvent avoir occasionné l'établissement de plusieurs espèces qui ne sont que des variétés de la même.

Son pédicule est cylindrique, grêle ou épais, quelquefois renflé à sa base, aminci à sa partie supérieure, de couleur jaunâtre ou brune, quelquefois rayé ou presque réticulé; il se termine par un chapeau arrondi, concave en dessous, un peu tomenteux ou glabre, de couleur cendrée, tirant fur le brun-foncé, large de quatre à six pouces; les tubes affez grands, alongés, plus courts dans la variété *γ*, irréguliers, de couleur jaune, très-faciles à séparer de la substance charnue. Dans sa vieillesse, son chapeau se fend en cinq à six pièces affez régulières.

Cette plante est commune pendant toute l'automne: on la rencontre sur la terre, dans les forêts & dans les endroits marécageux.

9. SUTILLE radicant. *Suillus radicans*.

Suillus pileo pulvinato, flavescens cinereo, margine involuto, subimbricato; poris citrinis; stipite levi, radicato, tomentoso, concolore Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 507. n°. 8. (*Boletus*.)

9. *Boletus pendiculatus*. Schæff. Fung. tab. 130.

La base de son pédicule est munie d'une racine épaisse, dure, velue, d'un jaune-citron; le pédicule est lisse & de la même couleur; il est surmonté d'un chapeau cendré, un peu jaunâtre, enveloppé à ses bords d'une membrane légèrement pubescente; les pores sont d'une couleur citron, tubulés. Ce champignon croit en automne, dans les forêts de Chine; il prend affez souvent une couleur bleuâtre en vieillissant; il est d'une saveur amère.

10. SUTILLE poivré. *Suillus piperatus*.

Suillus pileo pulvinato, ochraceo-fusco, glabro; poris ferrugineo-brunneis; stipite subferrugineo.

Boletus (piperatus), pileo crassiusculo, pulvinato, flexuoso, cinnamomeo; poris majusculis, convexis, rufo-ferrugineis; stipite basi intusque flavo. Pers. Dispos. Meth. Fung. pag. 27. & Synopf. Fung. pag. 507. n°. 9. — Bull. Champ. pag. 318. tab. 451. fig. 2. — Sow. ib. Fung. tab. 34. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 125.

Boletus ferruginosus. Batsch. El. Fung. pag. 179. tab. 25. fig. 128. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1432. n°. 10.

Son pédicule est jaune tant en dedans qu'en dehors, plein, affez épais, cylindrique, long de deux ou trois pouces, laissant échapper, lorsqu'on le brise, une liqueur jaunâtre; il se termine par un chapeau plane, orbiculaire, large de trois à quatre pouces, de couleur jaune, qui passe ensuite à l'orange, & puis à la couleur fauve. Les pores sont affez grands, de couleur de rouille.

foncée; la chair ferme, d'un jaune de soufre, un peu rougeâtre près des tubes; ces couleurs ne changent point, même quand on entame ce champignon.

Il croit sur la terre, vers la fin de l'automne, après les pluies; il est d'une saveur acre.

11. SUTILLE réticulé. *Suillus reticulatus*.

Suillus pileo pulvinato, dilatato, sordide flavescens, ut plurimum reticulato, rimoso; carne carulescente; poris mediocribus flavescensibus; stipite subbrevis, glabro; pileo concavo, intus sanguineo. (*Boletus*.) Pers. Synopf. Meth. Fung. p. 508. n°. 10.

Boletus reticulatus. Schæff. Fung. tab. 108.

Son pédicule est glabre, peu élevé, d'un rouge-sanguin en dedans; il supporte un grand chapeau de cinq à six pouces de large, bombé en dessus, dilaté, d'un jaune-sale, & qui se fend ordinairement en crevasses fines, disposées en réseau; les pores tubulés, médiocres, jaunâtres; la chair bleuâtre; les tubes longs d'un pouce.

Cette plante n'est pas très-commune; elle croit ordinairement dans les grandes forêts de chêne.

12. SUTILLE indigotier. *Suillus cyanescens*.

Suillus pileo lato, subuliginoso; stipite levi, ventricoso, concolore; apice nigro; poris albis, subsistantibus cyanæ.

Boletus cyanescens. Bull. Champ. pag. 319. tab. 369. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 125.

Boletus confusus. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 508. n°. 11.

Son pédicule, dit M. Decandolle, est fort épais à sa base, charnu, d'un gris un peu bistré; dans la partie qui, avant le développement du chapeau, étoit recouverte, il est plus mince & de couleur blanche. Son chapeau est épais, orbiculaire, convexe, plus large que le pédicule n'est long, de la même couleur que lui. Ses tubes, d'abord d'un blanc de lait, deviennent à la longue d'un blanc-sale. La chair est blanche comme la neige, mais elle change de couleur & passe au bleu au moment où on l'enrame, & même pour peu qu'elle ait été froissée. Ce changement de couleur se fait appercevoir dans plusieurs espèces. Saladin a prouvé qu'il n'étoit dû, ni à l'action de l'air ni à la lumière. Bulliard l'attribue à l'extraction d'un suc propre coloré, & surprenant invisible à cause de la ténuité des vaisseaux qui le renferment.

Ce champignon croit sur la terre; quelquefois sa surface est comme poudreuse. Lorsqu'il a crû dans un lieu très-humide, le changement de couleur de sa chair est peu sensible.

13. SUTILLE chicotin. *Suillus falluus*.

Stiillus stipite subreticulato, ventricoso pilosque fulvo; carne nived, mollifuscula, demum rosea; tubis ex albo fuscis.

Boletus fellus. Bull. Champ. pag. 325. tab. 379. — *Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 509. n° 12.* — *Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 125.*

Le pédoncule est droit, cylindrique, jaunâtre, un peu ventru à sa base, assez ordinairement marqué de lignes fauves en réseau, long de quatre à cinq pouces. Il supporte un chapeau de couleur enfumée, d'abord très-concave en dessous; il devient ensuite plane & même un peu concave en dessus. Les pores sont longs, tubulés, blancs dans leur jeunesse, & prennent ensuite une teinte couleur de chair; la chair est molle, blanche, peu épaisse, d'une saveur amère; elle prend un rose tendre quand on la coupe.

Cette plante se rencontre en France, sur la terre.

14. SUILE marron. *Stiillus caespitosus.*

Stiillus stipite levi, caespitose-lateritio; pileo stipiti concolore, carne nived, tubis ex albo-luteis.

Boletus caespitosus. Bull. Champ. pag. 324. tab. 328. — *Perf. Synopf. Fung. pag. 509. n° 13.* — *Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 124.*

Cette espèce est remarquable par sa couleur d'un brun-marron. Son pédicule est cylindrique, mou particulièrement à son centre, très-lisse, souvent renflé & fendu à sa base. Il est surmonté par un chapeau convexe, orbiculaire, de la même couleur que le pédicule, mais d'une teinte plus jaune sur ses bords, légèrement pubescent ou pulvérulent; les tubes d'un blanc de lait dans leur jeunesse; ils jaunissent en vieillissant; la chair est molle, blanchâtre, coroneuse.

On rencontre cette espèce sur la terre, dans les bois pendant l'été.

15. SUILE comestible. *Stiillus edulis.*

Stiillus pileo pulvinato, latissimo, fuscescente-vacino; carne immutabili; poris primò faridis, albidis, dein dilutè flavis; stipite tuberoso, subventricoso, reticulato, subfuscescente-cinereo.

Boletus edulis. *Perf. Observ. Mycol. 1. pag. 23.* & *Synopf. Fung. pag. 510. n° 14.* — *Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 124.* — *Bull. Champ. pag. 322. tab. 60. & tab. 494.*

Boletus bovinus. *Linn. Spec. Plant. pag. 1646.* — *Bolton. Fung. 2. tab. 85.*

Boletus bulbosus. *Schreff. Fung. tab. 134, 135, 85 & 103.*

Boletus (tuberosus). pileo pulvinato-fuscescente; margine coccineo; poris minutis, rotundis, flavis-

cente-albidis; stipite bulboso, albedo. *Perf. Synopf. Fung. pag. 511.*

Vulgairement gyrole, gyroule, brugnet, cèpe ou ceps.

C'est une des plus fortes espèces, dont le pédicule s'élève à la hauteur de six ou huit pouces; il est cylindrique, épais, bulbeux ou ventru, blanc ou quelquefois de couleur fauve, avec des lignes disposées en réseau. Son chapeau est large, creusé en voûte en dessous, de couleur brune, un peu ferrugineuse ou d'un rouge-cendré, quelquefois blanc ou jaunâtre, selon les variétés. Ses pores sont tubulés, blancs, allongés; ils deviennent jaunâtres & même quelquefois verdâtres, & se séparent facilement d'une chair ferme, épaisse, blanche ou tirant sur le jaune.

Ce champignon est assez commun; il croît pendant tout l'été sur la terre, dans les bois & les lieux couverts. Il est employé comme aliment & assaisonnement. Sa saveur est assez agréable.

16. SUILE bronzé. *Stiillus areus.*

Stiillus stipite longo, subequali, reticulato; pileo auro-nigricante; carne immutabili, crassissimâ, firmâ; tubis brevibus, sulphureis.

Boletus areus. *Bull. Champ. pag. 322. tab. 385.* — *Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 511. n° 15.* — *Lam. Illustr. Gener. tab. 884. fig. 2.*

Idem, carne nived sub cute vinosâ.

Idem, carne dilutè sulphureâ, ruptâ, viridiasculâ.

Vulgairement cèpe ou ceps noir.

Ce champignon, dont les couleurs sont assez variables sur plusieurs de ses parties, a son pédicule droit, cylindrique, long de trois ou quatre pouces, jaunâtre, brun ou fivue, marqué très-souvent de nervures réticulées, qui disparaissent quelquefois avec l'âge; il supporte un chapeau convexe, fort épais, orbiculaire, d'un brun très-foncé, tirant un peu sur le rouge, presque bronzé; les tubes sont courts, d'un jaune de soufre; la chair ferme, épaisse, ordinairement blanche, quelquefois un peu rougeâtre vers la peau, & jaune sur la partie qui tient aux rubes. Dans la variété où la chair est blanche, de couleur vineuse à la portion placée sous la peau; elle est d'un jaune de soufre dans la variété *y*, & prend, lorsqu'on la rompt, une teinte verdâtre.

Il croît en automne sur la terre, dans les bois. Il est, ainsi que le précédent, employé comme aliment, mais moins habituellement.

17. SUILE amer. *Stiillus amarus.*

Stiillus pileo carnosio, planiusculo, stipiteque sub-

ventricoso, levi, pallescence-albido; poris flavis; carne compactâ, subcarulescente.

Boletus amarus. Pers. Synopf. Method. Fung. pag. 511. n°. 16.

Son pédicule est cylindrique, un peu aminci vers sa base, ventru vers la partie supérieure, lisse, d'un blanc-pâle, supportant un chapeau presque plane, charnu; les pores tubulés, formant un anneau convexe, proéminent, jaunâtre autour du pédicule; la chair compacte, un peu bleuâtre.

Cette espèce se rencontre dans les grandes forêts.

18. SUILLE à tubes rouges. *Suillus rubecolarius*.

Suillus magnus, pileo pulvinato, fuscescente-olivaceo; poris aqualibus, primò rubris, demùm aurantiacis; stipite elongato, rubicundo, reticulato, subbulboso.

Boletus luridus. Pers. Comment. pag. 43, & Synopf. Meth. Fung. pag. 512. n°. 17.

Boletus rubecolarius. Bull. Champ. pag. 326, tab. 100, & tab. 490. fig. 1. — With. Britan. 4. pag. — Schoeff. Fung. tab. 105, 106, 107. — and. Flor. franç. vol. 2. pag. 123.

Boletus magnus julii mensis. Dillen. Gieff. pag. 23.

8. *Boletus (rubecolarius)*, pileo pulvinato, subhemisphærico, olivaceo, subtomentoso; poris planioribus, minimò rubris; stipite brevi, bulbosofuso, levissimulo, concolore. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 512. n°. 18. — Sowrb. Fung. tab. 150.

9. *Boletus (sanguineus)*, pileo pulvinato, exaltato, subvirescente, rugoso; poris stipiteque tuberoso, levi, apice reticulato-sanguineis. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 513.

J'ai réuni sous la même espèce plusieurs plantes qui paroissent de simples variétés, & qui ne diffèrent que par les dimensions de leur grandeur, le mélange de leurs couleurs, & un peu dans leur forme.

Ce champignon est grand; son pédicule, jaune ou un peu rougeâtre, long de trois à quatre pouces, quelquefois beaucoup plus court; épais, renflé à sa base ou bien cylindrique, plus mince, assez souvent marqué de lignes réticulées: il supporte un chapeau orbiculaire, creusé en voûte, très-ample; sa face extérieure d'un blanc-gris, plus ordinairement d'un brun enfumé; ses tubes sont longs, égaux, d'un rouge de cinabre à leur orifice, quelquefois d'un bleu-verdâtre ou jaunes, surtout en vieillissant; la substance charnue fort épaisse, assez souvent de couleur olive dans son intérieur, mais qui devient rouge, verte ou bleue quand on l'entame.

Cette plante croît dans les bois, sur la terre: on la rencontre ordinairement vers la fin de l'été.

19. SUILLE érythrope. *Suillus erythropus*.

Suillus pileo pulvinato, rufescente, subumbrino; poris minutis, aurantio-rubris; stipite subcylindrico, levi, squamuloso, rubicundo. Pers. Observ. Mycol. 1. pag. 23. & Synopf. Meth. Fung. pag. 513. n°. 19.

Son pédicule est presque cylindrique, aminci à la partie enfoncée en terre, d'un rouge-sanguin intérieurement, légèrement écailleux & sillonné à l'extérieur; terminé par un chapeau presque en forme de parasol, rouffâtre, garni en dessous de petits pores tubulés, d'un rouge-orangé.

On rencontre cette espèce vers la fin de l'été, sur les collines basses, dans les forêts.

20. SUILLE calope. *Suillus calopus*.

Suillus pileo pulvinato, subolivaceo; poris flavis & stipite tereti, fæbræni, reticulato, coccineo. Pers. Synopf. Meth. Fung. pag. 513. n°. 20.

Boletus terreus. Schoeff. Fung. tab. 315.

Son pédicule est grêle, cylindrique, d'un rouge agréable, avec des lignes en réseau, supportant un chapeau convexe, dont la face supérieure est d'un vert d'olive; l'inférieure garnie de pores tubulés, de couleur jaune. Ce mélange, de couleur rouge & jaune, donne à cette espèce un aspect fort élégant, & qui le fait distinguer de toutes les autres.

Elle croît sur les lieux montueux, dans les forêts, parmi les bruyères.

21. SUILLE du bouleau. *Suillus betulinus*.

Suillus subspissatus, moxifolus, pileo carnoso-fuberoso, reniformi; fuligineo-rufescente, subius albido.

Boletus (betulinus), gregarius, pileo pelliculd rufescente, retto. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1436. — Bull. Champ. pag. 348. tab. 312. — Bolton. Fung. tab. 159. — Sowrb. tab. 112. — Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 123.

Cette plante est munie d'un pédicule court, auquel est attaché latéralement un chapeau glabre, coriace, subéreux, à demi-orbiculaire ou presque réniforme, d'un roux-bistré en dessus ou blanc-châtre; sa chair blanche, ferme, plus ou moins épaisse; les tubes sont courts, & n'offrent guère qu'une lame poreuse & criblée, qui se détache aisément du chapeau; l'épiderme de la face supérieure se déchire & se peluche dans la vieillesse de cette plante.

On la trouve sur l'écorce du bouleau blanc; sa saveur est acide.

SUMAC. *Rhus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des tércbinthacées, qui a de grands rapports avec les manguiers, les *connarus*, &c qui comprend des arbres ou arborescences, la plupart exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, ternées ou simples; les fleurs en panicule ou en grappes épaisses.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; cinq pétales; cinq étamines, trois styles à peine séparés; trois stigmates; une petite baie supérieure; une ou trois semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice droit, inférieur, petit, à cinq découpures persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales courts, ovales, droits, médiocrement ouverts.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts, les anthères petites, point saillantes hors de la corolle.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, de la grandeur de la corolle, surmonté de trois styles très-courts, quelquefois nuls, terminés par trois stigmates courts.

Le fruit consiste en une petite baie arrondie, à une seule loge, renfermant une, quelquefois trois semences osseuses, presque globuleuses.

Observations. Ce genre, qu'on peut diviser en trois sections, comme nous le verrons plus bas, renferme un assez grand nombre d'espèces, qui se rapprochent la plupart par des propriétés qui leur sont communes, sans parler de leur caractère générique : ce sont des arbres d'une médiocre grandeur, des arborescences ou des arbustes. Presque tous exhalent, lorsqu'on les froisse entre les doigts, une odeur aromatique de térébenthine : beaucoup d'autres sont remplis d'un suc laiteux corréif, qui occasionne des inflammations, des éruptions sur les parties qu'il touche; d'autres sont dangereux, même par leurs émanations. Les feuilles de plusieurs espèces, prennent dans l'arrière-saison, avant leur chute, une couleur rouge plus ou moins vive; d'autres ont ces mêmes feuilles villoses, qu'ils conservent pendant toute l'année.

Tournefort avoit distingué les sumacs en trois genres : 1°. le *rhus* à feuilles ailées; les fleurs, dans la plupart des espèces, sont en grosses grappes serrées, peu rameuses; 2°. les *toxicodendron*; ils renferment des espèces à feuilles ternées : les fleurs forment des panicules plus ou moins étalées, souvent fort petites, axillaires, latérales ou terminales; 3°. les *coriaria* à feuilles simples; les

fleurs en panicules étalées, dont les tamifications sont fines, délicates : il n'y en a encore qu'une espèce bien connue.

Linné a réuni ces trois genres en un seul, &c en a fait trois divisions très-naturelles; toutes trois offrent le même caractère générique; qui varie peu. Les fleurs sont hermaphrodites; on en trouve cependant de monoïques, de dioïques & de polygames. Les fruits sont de petites baies, dont l'enveloppe est succulente; elle est sèche & coriace dans quelques espèces; elle enveloppe une seule semence, quelquefois trois, mais très-rarement. La dénomination de ce genre (*rhus*) vient d'un mot grec qui signifie rouge, les fruits d'un grand nombre d'espèces étant de cette couleur.

Le *rhus cominia* & le *rhus coriaria* ont été reconnus, depuis Linné, pour appartenir à un autre genre; ils doivent rentrer parmi les *ornitrophe*, genre établi par M. de Jussieu, mentionné dans Willdenow, &c qui sera présenté dans le Supplément de cet ouvrage.

ESPÈCES.

* Feuilles ailées.

1. **SUMAC des corroyeurs.** *Rhus coriaria*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, foliolis ellipticis, obtusis, dentatis, subius villosis. Willden. Arb. pag. 187. 80 Spec. Plant. vol. 1. pag. 1477. n°. 1. — Duham. edit. nov. tab. 2. n°. 46.

Rhus foliis pinnatis, obtusifoliis, serratis, ovalibus, subius villosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 179. — Mater. med. 87. — Miller, Dict. n°. 1. — Kniph. Cent. 3. n°. 74. — Lu. w. Ed. tab. 122. — Roth. Germ. vol. 2. pag. 367. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 266.

Rhus foliis pinnatis, serratis. Hort. Cliff. t. 10. — Hort. Upf. 68. — Roy. Læd. Bot. 243. — Sauvag. Monsp. 227. — Gronov. Orient. 91.

Rhus (*coriaria*). *folia pinnata; petiolus inter foliola ultima subulatus; foliola ovalia, obtusifolia, serrata, supra scabra, subius villosa*. Ehrh. Beyr. 6. pag. 88.

Rhus folio ulmi. C. Bauh. Pin. 414. — Tournef. Inst. R. Herb. 611. — Duham. Aïbr. vol. 2. pag. 218. tab. 52.

Rhus obsoniarum & coriariorum. Lobel. Icon. 2. tab. 98. — Clus. Hist. pag. 17. Icon.

Rhus, five sumach. J. Bauh. Hist. 2. pag. 555. Icon.

Coriaria. Dodon. Pempt. pag. 779. Icon. — Gerard, Hist. 1474.

Rhus. Matth. Comm. 186. Icon. — Camet. Epit.

121. Icon. — Park. Theatr. 1450. Icon. — Blackw. tab. 486.

Vaiguirement le sumac. Regn. Bot. Icon.

Arbrisseau de six à huit pieds de haut, dont les tiges se divisent en branches & en rameaux nombreux, étalés, irréguliers, diffus, revêtus d'un duvet cotonneux & roussâtre, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées; les folioles au nombre de neuf à treize, opposées ou alternes, sessiles, ovales ou ovales-oblongues, pubescentes, vertes en dessus, d'un blanc-cendré, cotonneuses, un peu roussâtres en dessous, dentées en scie à leurs bords, obtuses à leur sommet & aux dentelures, longues d'environ un pouce, sur trois à quatre lignes de large; le pétiole commun velu, un peu ailé entre les folioles supérieures. On remarque, dans l'aisselle de ces pétioles, de petits bourgeons blancs, cotonneux, qui sont les rudimens des branches qui doivent se développer l'année suivante.

Les fleurs sont petites, disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes ou en épis épais, serrés, d'un blanc-verdâtre, droites, velues, à peine de la longueur des feuilles. Le calice est court, à cinq découpures un peu aiguës; la corolle blanchâtre, à cinq pétales ovales-oblongs, obtus. Les fruits sont de petites baies recouvertes d'un duvet un peu rougeâtre.

Cet arbrisseau croît naturellement dans les départements méridionaux de la France, dans les lieux secs, pierreux, un peu montagneux, en Italie, en Espagne, dans la Syrie, la Palestine, la Barbarie, &c. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Toutes les parties de cette plante sont astringentes. Les Anciens, après les avoir réduites en poudre, s'en servoient comme de l'écorce de chêne, pour tanner les peaux. On en fait encore usage dans plusieurs contrées. Ses fruits sont employés, chez les Turcs, comme assaisonnement. On les prescrit en infusion pour le cours de ventre, à cause de leurs propriétés antiseptiques & astringentes, & à l'extérieur pour baigner les plaies.

2. SUMAC à demi ailé. *Rhus semialatum*. Murr.

Rhus foliis pinnatis, serratis; petiolis extimis internodiis, membranaceis. Murr. Comment. Goett. 6. 1784. pag. 27. tab. 3.

Cette espèce de sumac, un peu rapprochée du sumac des corroyeurs, s'en distingue par ses folioles plus étroites, aussi longues, bordées de dents plus pointues. Ses tiges sont divisées en rameaux cylindriques, velus à leur partie supérieure & sur les jeunes pousses, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, avec une impaire; les folioles ovales-oblongues, dentées en scie à leurs bords,

presque acuminées à leur sommet; les pétioles bordés d'une membrane, mais seulement entre les dernières paires de folioles.

Les fleurs sont disposées en grappes presque terminales, plus courtes que les feuilles, velues, d'un vert-jaunâtre, réunies par paquets serrés, courts, épais, un peu ovales, obtus.

Cette plante croît en Chine, dans les environs de Macao. (V. f. in herb. Juss.)

3. SUMAC nain. *Rhus pumilum*. Mich.

Rhus humile, ramis pilosiusque brevi pubescentibus; foliis pinnatis, multijugis; foliis ovalibus, vix acuminatis aut mucici, incisivo-dentatis, subtus sustomentosis; fructibus holocricis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 181.

Cet arbrisseau paroît avoir des rapports avec le *rhus coriaria*, mais il est beaucoup plus petit, & ne s'élève guère à plus d'un pied de haut. Ses rameaux sont alternes, revêtus, ainsi que les pétioles, d'un duvet court, épais, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, avec une impaire; composées de folioles ovales, incisives & dentées à leur contour, obtuses ou médiocrement acuminées à leur sommet, glabres & vertes en dessus, légèrement tomentueuses en dessous. Les fruits sont de petites baies presque sphériques, couvertes d'un duvet soyeux.

Cette plante a été observée par Michaux, dans la Caroline supérieure, au comté de Mecklenbourg. (V.)

4. SUMAC de Java. *Rhus javanicum*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, ovatis, acuminatis, serratis, subtus tomentosis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 380. — Thunb. Flor. japon. pag. 127. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1478. n°. 3.

Cette plante forme un arbre d'une médiocre grandeur, dont les rameaux, & particulièrement les jeunes pousses, sont couverts d'un duvet tomentueux, de couleur de rouille. Les feuilles sont alternes, pétioles, ailées, avec une impaire; longues d'environ un pied & plus, composées de folioles presque opposées, pédonculeuses, ovales, crénelées à leur contour, vertes, luisantes en dessus, revêtues à leur face inférieure d'un duvet très-doux, un peu jaunâtre, longues d'un à deux pouces, sur un pouce de large, pointues, acuminées à leur sommet, marquées de nervures parallèles, presque simples; la foliole terminale beaucoup plus grande, ainsi que les supérieures; le pétiole commun pubescent, cylindrique, un peu ailé, surtout entre les folioles supérieures. Les fleurs sont petites, disposées en panicule terminale.

Cette plante croît au Japon. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

5. SUMAC de Virginie. *Rhus typhinum*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, argutis ferratis, lanceolatis, subretusatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 379. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 311. — Centur. 139. Mill. Dict. n°. 2. — Duroi, Harbk. 2. pag. 291.

Rhus foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, acuminatis, argutis ferratis, subulatis pilosculis. Willden. Arb. pag. 285. & Spec. Plant. vol. 1. pag. 1478. n°. 2.

Rhus (typhinum), arborescens, ramis petiolif. que villosissimis; foliis pinnatis, multijugis; foliolis lanceolato-oblongis, argutis ferratis; rostris fructiferis, confertis; fructibus purpureis, velutinis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 182.

Rhus virginianum. C. Bauh. Pin. 517. — Tourn. Inst. R. Herb. 611. — Mill. Hort. Eltham. pag. 253. — Duham. Arb. vol. 2. pag. 218.

Vulgairement sumac amaranthe.

C'est, parmi les sumacs exotiques, un des plus généralement cultivés dans les jardins. Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds. Son tronc est droit, assez fort, livide à son sommet en branches étalées, & en rameaux dont l'écorce est ordinairement un peu rougeâtre & revêue d'un duvet doux, épais, cotonneux, particulièrement sur les jeunes rameaux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de huit à douze paires de folioles, avec une impaire; oblongues, linéolées, vertes & glabres en dessus, blanchâtres & légèrement pubescentes à leur face inférieure, longues de deux ou trois pouces, acuminées à leur sommet, arrondies à leur base, sessiles; les supérieures opposées, denrées en scie à leurs bords; les dentelures petites, distantes; les pétiolos point ailes, longs d'un à deux pieds, cylindriques, pubescents, élargis à leur base en une forte d'écaille concave.

Les fleurs sont disposées en grappes rougeâtres, épaisses, ovales-oblongues, très-ferrées, droites, velues; le pédoncule commun cylindrique, épais, très-velu, latéral ou terminal, redressé par une courbure en arc. Ces fleurs sont petites, très-nombreuses, hérissées de poils rougeâtres ou cendrés, qui les rendent presque invisibles. Il leur succède de petites baies également rouges & velues.

Cet arbre croît naturellement en Amérique, depuis la Caroline jusque dans le Canada. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Ses fruits sont acides & rafraîchissants: on en fait d'assez bonne limonade. En Amérique on emploie son écorce pour tanner les cuirs. Son bois est fort tendre, composé intérieurement de bandes alternativement vertes & d'un blanc-jaunâtre; il est très-agréable. L'ignorer s'il perd cette couleur ou si, en la conservant, il pourroit être employé

dans les meubles d'ornement. Il découle de son écorce une résine très-abondante lorsqu'on y fait des incisions. Cet arbre produit des rejetons nombreux, & se multiplie avec facilité.

6. SUMAC à feuilles glabres. *Rhus glabrum*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, lanceolatis, ferratis, utrinque nudis; floribus hermaphroditis. Ait. 1101. Kew. vol. 1. pag. 365. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1478. n°. 4. — Lam. Illustr. Gener. tab. 207. fig. 1.

Rhus foliis pinnatis, ferratis, lanceolatis, utrinque nudis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 380. — Kalm. Iter 2. pag. 211. — Mill. Dict. n°. 3. — Giffelck. Icon. Falcie. 1. tab. 5.

Rhus foliis pinnatis, ferratis. Gronov. Virg. pag. 148. — Gold. Noveb. 63.

Rhus (glabrum), prorsus glabrum, foliis pinnatis, multijugis; foliolis lanceolato-oblongis, ferratis, subulatis plus minus aluticantibus; floribus dioicis; fructibus holofericis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 182.

Rhus virginicum, panicula sparsa, ramis patulis, glabris. Willen. Hort. Eltham. pag. 253. tab. 243. fig. 314. — Catesb. Carol. 3. pag. 4. tab. 4.

Rhus angustifolium. C. Bauh. Pin. 414. — Duham. Arb. vol. 2. pag. 218. n°. 4.

Sumach angustifolium. Bauh. Prodrum. 158. — Burfet. XXII 76.

Cet arbre ressemble beaucoup au précédent, tant par son port, son élévation, que par la couleur & la disposition de ses fleurs; mais les feuilles sont parfaitement glabres, & les parties velues le sont beaucoup.

Ses rameaux sont dressés, décalés; les nouvelles pousses rougeâtres, pubescentes, garnies de feuilles longues, alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles au nombre de huit à dix paires, avec une impaire; la plupart alternes, presque sessiles, étroites, lancéolées, acuminées, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus ou moins blanchâtres en dessous, longues de deux à trois pouces, larges de six lignes; la terminale plus grande, médiocrement dentée en scie; les dentelures courtes, un peu allongées, distantes; les pétiolos cylindriques, à peine pubescents.

Les fleurs sont réunies en grappes épaisses, oblongues, serrées, un peu horizontales; les pédoncules épais, cylindriques, un peu courbés. Ces fleurs sont hermaphrodites, bien plus souvent dioïques; le calice à cinq divisions aiguës, courtes; cinq pétales petits, étroits, un peu aigus; les fruits rougeâtres, petits, pulpeux, couverts d'un duvet court, soyeux, d'un rouge-foncé.

Cet arbre croît dans les champs & les haies, à la Caroline & à la Virginie. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris.

7. SUMAC élégant. *Rhus elegans*. Ait.

Rhus foliis pinnatis, lanceolatis, serratis, utrinque nudis; floribus dioicis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 366. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1478. n°. 5.

Rhus (carolinianum), foliis pinnatis, serratis, lanceolatis, subius incanis; panicula compulsa. Mill. Dict. n°. 4. ?

Rhus glabrum, panicula speciosa, coccinea. Catesb. Carol. Append. 4. tab. 4.

Cette plante est-elle une espèce bien distinguée du *Rhus glabrum* ? N'en seroit-elle pas plutôt une variété, dont les panicules sont ordinairement plus serrées & les fleurs dioïques. Je ne connois pas cette espèce, mais j'ai remarqué que le sumac glabre a des fleurs assez souvent hermaphrodites, & peut-être plus souvent encore dioïques.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. L.

Observations. Miller, dans son Dictionnaire des Jardinières, parle d'une espèce qu'il appelle *Rhus carolinianum*, qui est peut-être la même que celle que je viens de mentionner. C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur du sept à huit pieds, & se divise en rameaux glabres, de couleur purpurine, couverts d'une poussière grise, ainsi que les pétioles qui sont pourpres. Les feuilles sont composées de sept ou huit paires de folioles avec une impaire, opposées ou alternes, longues de trois à quatre pouces fur presque autant de largeur dans leur milieu, dentées à leurs bords, terminées en une pointe aiguë, d'un vert-foncé en dessus, velues en dessous. Les fleurs naissent, à l'extrémité des branches, en panicules fort serrées, épaisses, grosses & d'un rouge brillant; elles paroissent dans les mois de juillet & d'août, & durent jusqu'à l'automne. (Miller.)

8. SUMAC à feuilles vertes. *Rhus viridiflorum*.

Rhus foliis pinnatis; foliolis lanceolato-oblongis, serratis, subius albis, subtomentosis; racemis erectis, herbaceis. (N.)

Rhus foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, serratis, villosis; floribus herbaceis. Duham. edit. nov. vol. 2. pag. 163. n°. 7.

9. *Rhus (canadense), foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, serratis, subvillosis; floribus herbaceis*. Idem. l. c. pag. 163. n°. 8.

Rhus (canadense), foliis pinnatis, obsolete serratis, lanceolatis, utrinque glabris; panicula compulsa. Mill. Dict. n°. 5. ?

Cette espèce paroît tenir le milieu entre le *Rhus thyphinum* & le *Rhus glabrum*; elle ressemble beaucoup à ce dernier par la forme de ses feuilles & par son port, ainsi que par les grappes de fleurs; elle en diffère par le duvet de ses folioles, & se distingue du premier par les grappes verdâtres, droites, plus lâches.

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze ou vingt pieds; son tronc est fort, épais, divisé en branches & en rameaux étalés, garnis de feuilles amples, alternes, ailées avec une impaire, composées de folioles presque opposées, sessiles, oblongues, lancéolées, plus ou moins étroites, un peu variables dans leur grandeur, vertes en dessus, blanches & ordinairement pubescentes en dessous, quelquefois presque glabres, dentées en scie à leurs bords, acuminées à leur sommet; les pétioles cylindriques, striés, glabres ou un peu velus, point membraneux.

Les fleurs forment une grappe, ou plutôt une panicule droite, un peu lâche, ramifiée, composée de petites grappes courtes, alternes, un peu rameuses, épaisses; les ramifications ou pédoncules velues, d'un brun-noirâtre; les pédicelles velus; les fleurs glabres, d'un vert un peu jaunâtre, petites; les calices courts; les pétales obtus.

Cet arbre, qui n'est peut-être qu'une variété du *Rhus glabrum*, est originaire de l'Amérique septentrionale. On le cultive dans les jardins de l'Europe. L. (V. v.)

Observations. Ne pourroit-on pas rapporter à cette espèce le *Rhus canadense* de Miller. C'est, d'après cet auteur, un arbrisseau à feuilles ailées, composées de sept à huit paires de folioles lancéolées, longues de quatre pouces & demi sur un de large, un peu dentées à leur scie, d'un vert luisant en dessus, blanchâtres en dessous & un peu velues. Les fleurs sont disposées en une grosse panicule composée de plusieurs petites, portées chacune sur des pédoncules séparés; elles sont d'un rouge-foncé, & la panicule entière est couverte d'une poussière grise qui semble y avoir été répandue.

9. SUMAC strié. *Rhus striatum*. Ruiz & Pav.

Rhus foliis impari-pinnatis; foliolis integerrimis, ovato-lanceolatis, subius tomentosis; racemis maximis, baccis striatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 29. tab. 252. — Pers. Synop. Plant. vol. 1. pag. 325. n°. 13.

Arbre de vingt à vingt-cinq pieds de haut, dont le tronc est droit, cylindrique, brun, surmonté d'une cime touffue, composée de rameaux étalés, cylindriques, glabres, de couleur purpurine & luisants dans leur jeunesse, garnis de feuilles alternes, ailées avec une impaire, pétioles, composées de quatre à six paires de folioles ovales-lancéolées, très-entières à leurs bords, un peu sinuées,

finuées, vertes, glabres & luisantes à leur face supérieure, légèrement tomenteuses en dessous ; les pétioles de couleur purpurine, renflés à leur base.

Les fleurs sont axillaires, striées, vers l'extrémité des rameaux, en panicules rameuses, un peu lâches, longues d'un pied ; les pédoncules inférieurs oppoés ; les pédicelles alternes ; le calice glabre, vert, fort petit ; la corolle blanche, quatre fois plus grande que le calice ; les fruits arrondis, légèrement comprimés, noirs, de la grosseur d'un pois, légèrement striés, un peu charnus, contenant une semence striée, comprimée, de couleur cendrée.

Cette espèce croît au Pérou, dans les grandes forêts. Elle fleurit en juin & juillet. \bar{h}

Son écorce fournit une belle teinture noire.

10. SUMAC pauciflore. *Rhus pauciflora*. Linn. f.

Rhus foliis pinnatis ; foliolis alternis, decurrentibus, cuneiformibus, apice serratis ; panicula sessili, pauciflora. Linn. f. Suppl. pag. 183. — Willd. Sp. Pl. vol. 1. pag. 1480. n°. 11.

Rhus foliis pinnatis ; foliolis alternis, decurrentibus, serratis. Thunb. Prodr. pag. 51.

Cet arbrisseau s'élève sur un tronc droit, divisé en rameaux étalés, garnis de feuilles ailées, pétioles, alternes, composées de folioles alternes avec une impaire, decurrentes sur le pétiole, en forme de coin, dentées en scie sur leurs bords à leur partie supérieure ; les fleurs disposées latéralement, vers l'extrémité des rameaux, en une panicule sessile, peu garnie de fleurs.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

11. SUMAC vernis. *Rhus vernix*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, integerrimis, annuis, opacis ; petiolo integro, aquali. Linn. Mater. medic. p. 87. — Duroi, Harb. 2. pag. 306. — Wangeh. Amer. 290. — Thunb. Flor. Jap. pag. 121. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1479. n°. 6. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 205. tab. 44. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 207. fig. 3.

Rhus foliis pinnatis, integerrimis ; petiolo integro, aquali. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 380. — Kalin. Iter 2. pag. 211.

Rhus foliis pinnatis, integerrimis. Hort. Cliff. 110. — Hort. Upf. 68. — Gronov. Virg. 148. — Roy. Lugd. Bat. 244. — Cold. nov. 64.

Toxicodendron (pinnatum), foliis pinnatis ; foliolis ovato-lanceolatis, integerrimis. Mill. Dict. n°. 4.

Toxicodendron carolinianum, foliis pinnatis ; floribus minimis, herbaceis. Duham. Arb. vol. 2. pag. 341. n°. 3. tab. 99.

Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboideo. Dill. Hort. Eltham. pag. 390. tab. 292. fig. 377.

Rhus (vernix), arborescens, glaberrima ; foliis pinnatis, multijugis ; foliolis ovalibus, abrupte acuminatis, integris ; panicula laxa, floribus droicis ; fructibus albis, glabris. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 183.

Arbor americana, alatis foliis, succo lacteo venenata. Pluk. Almag. pag. 45. tab. 145. fig. 1.

Arbor venenata. Kalm. Iter 2. pag. 211.

Arbor poison-wood tree. Acl. angl. n°. 367. pag. 145.

Site, feu sué-din. Kœmpf. Amoen. pag. 791. tab. 792.

Son tronc s'élève à la hauteur de dix à vingt pieds ; il est revêtu d'une écorce cendrée ou d'un brun-clair, & se divise en branches & en rameaux glabres, étalés, garnis de feuilles alternes, ailées avec une impaire, composées de folioles presque opposées, pédicellées, au nombre de cinq à six paires, ovales, très-entières, vertes & glabres à leurs deux faces, longues d'un à deux pouces, rétrécies à leur sommet en une pointe aiguë, alongées, marquées de nervures parallèles, point saillantes ; le pétiole presque à demi-cylindrique ; glabre, légèrement strié, point ailé.

Les fleurs sont disposées, vers la partie supérieure des rameaux, en une panicule lâche, d'un blanc-verdâtre, les unes composées uniquement de fleurs mâles, d'autres de fleurs femelles sur des individus séparés. Il leur succède des fruits de la grosseur d'un pois, de couleur blanchâtre, un peu arrondis, glabres, à une seule semence osseuse.

Cet arbre croît au Japon & dans l'Amérique septentrionale, depuis le Canada jusque dans la Caroline. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. \bar{h} (V. v.)

Cet arbre est très-malsaisant ; il en découle un suc blanc qui se noircit à l'air, & qui est employé par les Japonais comme un vernis qu'ils appliquent sur leurs vases, & qui, au rapport de Thunberg, est plus beau que celui de la Chine & du Siam. Avant de s'en servir, on y mêle de l'huile retirée par expression des semences du *bigonia tomentosa*, qui porte, dans le pays, le nom de *taï* ; on y ajoute quelquefois des substances colorées. Ce suc laiteux se retire de la tige par des incisions faites à l'écorce ; les rameaux, les pétioles, les feuilles, en fournissent également. Quand un arbre est épuisé, & qu'il ne produit plus qu'une très-petite quantité de suc, on le coupe près de la racine, qui produit des rejets. On retire encore,

S 33

des semences de ce même arbre, une huile employée au Japon dans la fabrication des chandelles.

12. SUMAC bâlard. *Rhus succedaneum*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, integerrimis, perennantibus, lucidis; petiolo integro, aequali. Linn. Manrif. 211. — Thunb. Flor. japon. pag. 121. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1479. n° 7.

Arbor vernicifera, spuria, glaberrima, angustifolia. Kœmpf. Ameron. pag. 794. tab. 795.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *Rhus vernix*; elle n'est pas encore parfaitement bien connue; il paroît néanmoins qu'elle en diffère suffisamment pour ne point être confondue avec elle.

Ses rameaux sont glabres, étalés, garnis de feuilles alternes, ailées, pétiolées, composées de folioles impaires; les inférieures, alternes, pétiolées, ovales, très-entières, persistantes, fermes, coriaces, vertes & luisantes à leurs deux faces, quelquefois un peu inégales à leurs bords, acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, marquées en dessous de nervures fines, latérales, parallèles, un peu sailantes; les pétioles glabres, cylindriques, un peu comprimés latéralement, finement striés, tendus à leur insertion. Les fleurs sont disposées en grappes latérales à la partie supérieure des rameaux: il leur succède des baies un peu verdâtres, de la grosseur d'une cerise.

Cet arbre croît à la Chine & au Japon. *Th* (*V. f.*)

Cette plante, au rapport de Thunberg, produit une sorte de vernis de la même qualité que celui du *Rhus vernix*, mais bien moins abondant. Ses semences, pilées, macérées dans l'eau bouillante, & soumises routes chaudes à l'action de la presse, produisent une huile concrète, qui en se refroidissant prend la consistance du suif, & s'emploie au Japon pour la fabrication des chandelles.

13. SUMAC copal. *Rhus copallinum*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, integerrimis; petiolo membranaceo, articulato. Linn. Spec. Plant. pag. 380. — Royle, Lugd. Bat. 24. — Marer. medic. 88. — Mill. Dict. n° 6. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 218. n° 7. — Duroi, Harbk. 2. pag. 258. — Fabric. Helmh. 409. — Wangerh. Amer. pag. 96. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1480. n° 9. — Lam. Ill. Gener. tab. 207. fig. 1. — Gzrtm. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 205. tab. 44.

Rhus foliis pinnatis, multijugis; petiolo alato, foliolis ovali lanceolatis, integris; floribus dioicis, racemo sessili. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 182.

Rhus elatior, foliis impari-pinnatis; petioli membranaceis, articulatis. Gronov. Virgin. 149.

Rhus virginianum lentifolii foliis. Rai, Hist. 1799.

Rhus obsoniorum similis, americana, gummi candidum fundens, non serrata, foliorum rachi medium elata. Pluken. Almag. pag. 318. tab. 56. fig. 1.

Copalli Quahuil. Hernand. Mex. 45.

R. Rhus leucantha. Jacq. Hort. Schoenbr. n° 342.

Ses racines sont traçantes, & produisent plusieurs riges ligneuses, assez fortes, hautes de six à huit pieds, de la grosseur du bras, revêtues d'une écorce brune, & divisées en branches & en rameaux de couleur grisâtre-foncée, légèrement pubescens, doux au toucher, parsemés de très-petits points sailans & noirâtres, visibles à la loupe, garnis de feuilles alternes, ailées avec une impaire, composées de six à dix paires de folioles, la plupart opposées, pétiolées, ovales-lanceolées, longues d'un pouce & plus, très-entières, presque glabres, luisantes, un peu ridées en dessus, plus pâles & pubescentes en dessous, avec des nervures sailantes, parallèles, un peu ramifiées, pointues à leur sommet; le pétiole cylindrique, pubescent, muni de deux côtés d'une membrane courte, décurrence, en forme d'aile.

Les fleurs sont dioïques, fort petites, d'un blanc herbacé, disposées, à l'extrémité des rameaux & dans l'aisselle des feuilles supérieures, en une panicule droite, touffue, épartie, composée de petites panicules partielles; les ramifications & les pedoncules pubescens & presque aussi longs que les calices. Les fruits font de petites baies ou plutôt des drupes un peu globuleuses, rougeâtres, à peine pubescens, contenant une semence réniforme.

Cet arbre croît dans les forêts de la Caroline & de la Virginie. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Th* (*V. v.*) Il fleurit vers la fin de l'été.

Le *Rhus leucantha* de Jacquin ne paroît être qu'une variété de celui-ci, dont il diffère par ses feuilles plus longues, par les panicules moins étalées, & enfin en ce que ses racines ne produisent point de jetons; il supporte bien moins le froid.

Il découle de cet arbre une résine connue dans le commerce sous le nom de *résine ou gomme copale d'Amérique*; elle est jaune, luisante, odorante, transparente. On en fait usage particulièrement pour les vernis. Il ne faut pas la confondre avec la *gomme copale orientale*, qui ressemble parfaitement à la précédente, mais qui est plus transparente, plus odorante.

14. SUMAC à sept folioles. *Rhus trijugum*.

Rhus foliis pinnatis; foliolis ovatis, coriaceis, subius pubescentibus, rufis; bacis nidis. (N.)

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux droits, cylindriques, glabres, pubescents à leur partie supérieure, garnis de feuilles alternes, ailées avec une impaire, composées très-ordinairement de trois paires de folioles ovales, très-entières, obtuses, épaisses, coriaces, glabres, d'un vert-foncé en dessus; le pétiole commun un peu plane, lirié, pubescent.

Les fleurs sont disposées en une panicle droite, courte, médiocrement étalée, située vers l'extrémité des rameaux. Les fruits sont de petites baies globuleuses, de la grosseur d'un grain de poivre, un peu pédicellées, rougeâtres, luisantes, contenant une semence solitaire, oléuse.

Cette plante a été recueillie par Commerçon au Brésil, le long du Rio-Janeiro. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

15. SUMAC à feuilles rayées. *Rhus lineatum*. Orteg.

Rhus foliis pinnatis; foliolis ovatis, dentatis, lineatis; racemis axillaribus, bacis striatis. Orteg. Decal. Plant. pag. 89. — Perf. Synops. Plant. vol. 1. pag. 315. n°. 14.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ deux pieds, droites, cylindriques, de couleur cendrée, rameuses dès leur base, garnies de feuilles étalées, alternes, ailées, composées de folioles ovales, médiocrement pétiolées, médiocrement dentées, entières vers leur base, acuminées à leur sommet, luisantes, légèrement velues, pubescentes en dessous sur les nervures; les folioles latérales obliques, médiocrement pétiolées; la terminale ovale-oblongue & plus longuement pétiolée; le pétiole commun plane, très-long.

Les fleurs sont disposées en grappes solitaires, axillaires, trois fois plus courtes que les pétiotes, ramifiées; les pédicelles de la longueur des fleurs; la corolle d'un blanc-jaunâtre; les pétales réfléchis en dehors; les stigmates bruns, inégaux; les baies glabres, arrondies, luisantes, striées longitudinalement.

Cet arbrisseau croît naturellement à l'île de Cuba. Il est cultivé à Madrid, dans le Jardin royal des Plantes. *h*

16. SUMAC ailé. *Rhus alatum*. Thunb.

Rhus foliis pinnatis; foliolis ovatis, apice serratis; petiolis intermediis, omnibus alatis. Thunb. Prodr. pag. 52. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1480. n°. 10.

Thunberg nous apprend que cette espèce, sur laquelle il nous a donné peu de détails, a des feuilles ailées, composées de folioles ovales, dentées en scie vers leur sommet, & que le pétiole commun est garni, entre l'espace d'une paire de folioles à l'autre, d'une membrane latérale en forme d'aile. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

17. SUMAC métopi. *Rhus metopium*. Linn.

Rhus foliis pinnatis, quinatis, integerrimis, subrotundis, glabris. Linn. Amoen. Acad. m. vol. 5. pag. 27. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1480. n°. 12.

Mecopium foliis subrotundis, pinnato-quinatis; racemis alaribus. Brown, Jam. 177. tab. 13. fig. 3.

Terebinthus maxima, pinnis paucioribus, majoribus, atque rotundioribus, fructu racemoso, sparsis. Sloan, Jam. 167. Hist. 2. pag. 90. tab. 199. fig. 3. — Rai, Dendr. 51.

Borbonia fructu corallino, flore pentapetalo. Plum. Amer. Icon. 61.

Cet arbrisseau, encore peu connu, a des tiges droites, rameuses; les rameaux étalés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, composées assez ordinairement de cinq folioles très-entières à leurs bords, un peu arrondies, obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, assez grandes. Les fleurs sont situées latéralement dans l'aisselle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux, disposées en grappes assez lâches; les calices courts & glabres; la corolle à cinq pétales étroits, fort petits; l'ovaire surmonté de trois styles courts, auxquels succèdent de petites baies presque globuleuses, d'un rouge-écarlate.

Cette plante croît sur les montagnes de la Jamaïque. *h*

18. SUMAC digité. *Rhus digitatum*. Linn. f.

Rhus scandens, foliis pinnatis, foliolis oblongis, integerrimis, glaberrimis. Linn. f. Suppl. pag. 184. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1481. n°. 13.

Rhus foliis quinatis, caule scandente cirrhifero. Thunb. Prodr. pag. 52.

Ce sumac, à peine connu, est un arbrisseau dont les tiges, grimpantes, rameuses, s'entortillent autour des arbres qui les avoisinent & s'y accrochent par des vrilles. Elles font elabres, cylindriques, souples, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ailées ou presque digitées, composées ordinairement de cinq folioles rapprochées, oblongues, très-entières, glabres à leurs deux faces.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été observée par Thunberg. *h*

19. SUMAC à cinq feuilles. *Rhus pentaphyllum*. Desfont.

Rhus spingum, foliis digitatis, foliolis linearilanceolatis, superius laniatis, abruptis, apice dentatis, integrifve. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 267. tab. 77.

Rhus thergera. Desf. Catal. Hort. Parif. p. 199.

Rhamnus ficulus, pentaphyllos. Boccon. Sic. pag. 43. tab. 21. — Schaw. Specim. n°. 508.

Rhamnus (pentaphyllus), spinis lateralibus, foliis salutaris, quinatis. Linn. Syst. veget. pag. 17. — Jacq. Observ. bot. 2. pag. 17. — Encycl. 1783.

Cette plante a été long-tems confondue avec les *rhamnus*, dont en effet elle a toute l'apparence; elle paroît se rapprocher aussi du *mespilus oxyacantha*. L'examen des parties de la fructification a prouvé à M. Desfontaines, qu'elle appartenoit aux *sumacs*.

C'est un arbre très-rameux, qui s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds, dont les rameaux sont diffus, garnis d'épines fortes, revêtus d'une écorce brune ou cendrée, très-glabre, garnis de feuilles alternes, persistantes, digitées, glabres à leurs deux faces, un peu velues dans leur jeunesse, composées de trois à cinq folioles obtuses, entières à leurs bords, plus larges à leur partie supérieure, inégales, longues de huit à dix lignes & plus, larges de deux ou trois, entières à leur sommet, ou dentées, ou divisées en trois lobes inégaux; le pétiole médiocrement ailé, presque de la longueur des feuilles.

Les fleurs sont dioïques, disposées en petites grappes axillaires ou terminales, courtes, serrées; le calice divisé en cinq découpures ovales; la corolle d'un jaune-pâle, divisée en cinq pétales ovales & ouverts; cinq étamines; point d'ovaire dans les fleurs mâles. Les fleurs femelles ont le calice & la corolle comme dans les premières; point d'étamines; un ovaire surmonté de trois styles courts & autant de stigmates, auxquels succède une baie arrondie, surmontée à son sommet de trois petits tubercules; rougeâtre à l'époque de sa maturité, à une seule semence; un noyau osseux & comprimé.

Cet arbre croît en Sicile, & sur les collines incultes de la Barbarie, proche Arzeau, où il a été observé par M. Desfontaines. (V. f.)

Les fruits sont acides, & d'une saveur qui n'est point désagréable. L'écorce est astringente, & peut servir pour tanner les cuirs; elle fournit aussi une couleur rouge.

* * Feuilles ternées.

20. SUMAC vénéneux. *Rhus toxicodendron*. Linn.

Rhus foliis ternatis; foliis petiolatis, angulatis, pubescentibus; caule rasicante. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 382. — Kalm. Iter 2. pag. 318. — DuRoi, Harbk. 2. pag. 303. — Kniph. Cent. 2. n°. 71. — Wangenh. Amer. 94. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. n°. 17.

Rhus foliis ternatis; foliis petiolatis, ovatis, acutis, pubescentibus, nunc integris, nunc sinuatis. Gronov. Virgin. 149.

Rhus (toxicodendron), radicans, trifoliatum, leuco-carpum; foliis ventricoso-ovalibus, integris aut sinuato-crenatis; racemis ramis & axillaribus, fissilibus, diaicis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 183.

Toxicodendron (pubescens), foliis ternatis, foliolis ovatis, incisive-angulatis, pubescentibus. Miller, Dict. n°. 2.

Toxicodendron triphyllum, folio sinuato-pubescente. Tourn. Inst. R. Herb. 611. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 341. n°. 2.

Vitis canadensis. Munt. Phytogr. tab. 60.

Hedera trifolia, canadensis. Cornut. Canad. pag. 96. tab. 97. — Barret. Icon. Rar. tab. 128.

Arbor trifolia, venenata, virginiana; folio hirsuta. Rai, Hist. 1799.

1. *Rhus toxicodendron* (vulgaris), radicans, scandens; foliolis amplis, integris, seu rariter dentatis. Mich. Flor. l. c. pag. 183.

2. (Quercifolium), non scandens, humilior; foliolis variet lobato-sinuatis, sub parvitate tamentosis. Mich. l. c. pag. 183.

3. (Mictocarpum), foliis oblongo-ovalibus, longius acuminatis, sepibus rhomboides; fructu multo minore. Mich. l. c. pag. 183.

Cet arbrisseau, qui ne s'élève guère qu'à quelques pieds de haut dans les jardins où on le cultive, est dans son pays natal une plante grimpante, que M. Boic a vu parvenir au sommet des plus grands arbres, & acquérir un tronc de quatre pouces de diamètre. D'après ce même savant, cette plante rampe d'abord sur la terre dans sa jeunesse, & ses feuilles, à cette époque, sont toujours dentelettes ou sinuées; mais dès que l'extrémité de sa tige rencontre un arbre, elle s'y cramponne par ses suçoirs radicaux, & s'élève le long de son tronc; souvent cette tige se divise en plusieurs branches qui embrassent le tronc de l'arbre. L'extrémité des branches directes fournit les racines; les latérales produisent les fleurs. Ces racines se dessèchent au bout d'une année, mais continuent à fixer la plante malgré leur dessèchement.

Les feuilles sont alternes, distantes, longuement pétioles, ternées; les deux folioles latérales pé-

dicellées ; le pédiçelle de la foliole terminale beaucoup plus long. Elles font ovales, longues d'environ trois pouces, fur deux de large, vertes, minces, glabres à leur face fupérieure, plus ou moins pubefcentes en d-fous, quelquefois prefque glabres, entières, ou anguleufes, ou même lobées, felon les variétés, reflémbant alors prefqu'aux feuilles de chêne, acuminées à leur fommét. Les fleurs font dioïques, fituées latéralement dans les aiffelles des feuilles, à la partie fupérieure des rameaux, difpofées en grappes courtes, longues d'un à deux pouces, médiocrement ramifiées, peu étalées, glabres, d'un vert-blanchâtre. Les fruits font de petites baies ou des drupes fecs, d'un blanc-jaunâtre, filonés, qui ne renferment qu'une feule femence globuleufe, ftride.

Cette plante croît naturellement dans l'Amérique feptentrionale, dans la Virginie, au Canada. On la cultive dans les principaux jardins de l'Europe. h (V. v.) Elle fleurit vers le milieu du printemps, & donne les fruits à la fin de la même faifon.

Cette efpèce, & en général toutes celles de ce genre que plusieurs botaniftes ont décrites fous le nom de *toxicodendron*, paffent pour vénéneufes ou très-malfaitantes : il en découle un fuc laiteux, qui eft beaucoup plus abondant à l'époque de la floraison, noircit à l'air, & occafionne fur la peau des éruptions, des gonflemens, des douleurs cruelles, un gonflement, la fièvre ou des puftules femblables à la gale. Pris intérieurement, il empoifonne. Si on l'applique fur une éroffie quelconque, il y imprime des taches noires, inaltérables même par l'acide muriatique oxigéné & par les alcalis cauftiques.

Des expériences modernes ont prouvé qu'on peut prendre l'extrait de cette plante à très-fortes dofes fans accident ; ce qui indique que fes principes vénéneux font volatils ou gazeux, & que plusieurs médecins ont employé avec fuccès cet extrait contre la paralyfie & les affections dartreufes. Les effets que produifoit fur le corps humain les feules émanations du fumac vénéneux, font, à ce qu'il paroît, dépendantes de la difpofition ou du tempérament de celui qui s'y expofe, ou des circonftances dans lefquelles on en reçoit l'influence. Il y a des perfonnes qui ne peuvent paffer à côté de cette plante fans éprouver une impreffion plus ou moins dégréable, tandis que d'autres la manient impunément. On a obfervé que les exhalaisons étoient plus funeftes après la pluie ou lorsque la plante eft languiffante, & qu'au contraire elle n'eft pas du tout délétère lorsqu'elle eft frappée par les rayons du foleil.

21. SUMAC radican. *Rhus radicans*. Linn.

Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis, ovatis, nudis, integerrimis ; caule radicante. Linn. Spec.

Plant. vol. 1. pag. 381. — Hort. Clifffort. 110. — Gronov. Virgin. 33. — Royen, Lugd. Bat. 244. — Kalm. Iter 2. pag. 296. 214. — Fabric. Helmt. 409. — Wangelh. Amer. 93. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1481. n°. 16.

Toxicodendron (vulgare), foliis ternatis ; foliolis obcordatis, glabris, integerrimis ; caule radicante. Miller, Dict. n°. 1.

Toxicodendron triphyllum, glabrum. Tourn. Inf. R. Herb. 611. — Duham. Arbr. vol. 2. tab. 98.

Toxicodendron apocynifolia, foliis minoribus, glabris. Dillen. Hort. Eltham. pag. 390.

h. *Toxicodendron rectum, foliis minoribus, glabris*. Dillen. Hort. Eltham. pag. 389. tab. 291. fig. 375.

Toxicodendron (glabrum), foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis, glabris ; caule erecto, fruticofa. Miller, Dict. n°. 3.

Cette efpèce doit-elle être confidérée comme effentiellement diftincte du *rhus toxicodendron* ? Il eft permis d'en douter, quand on confidère que la principale différence ne confifte guère que dans les feuilles, parfaitement glabres, tandis qu'elles font plus ou moins pubefcentes à leur face inférieure dans le *rhus toxicodendron* : on y ajouta qu'elles font conflamment très-entières à leurs bords dans celle-ci, tandis que dans l'autre ces feuilles font plus ordinairement un peu anguleufes, & même lobées. On peut ajouter, d'après l'obfervation de Duhamel, que le *rhus radicans* trace beaucoup. « Nous avons des bois, dit cet auteur, qui en ont été entièrement garnis par quelques pieds que nous y avions autrefois plantés. Le *rhus toxicodendron* ne s'étend pas autant en traçant ; il forme au contraire un petit buiffon de quantité de jets enracinés, de forte qu'une feule rousfe peut produire une cinquantaine de pieds. On confervera ces deux plantes comme efpèces, » fi l'on croit ces caractères fuffifans pour les féparer ; quant au refte, elles fe reflémbent parfaitement. »

Cet arbriffeau croît dans la Virginie & au Canada. h (V. v.)

22. SUMAC vrillé. *Rhus cirrhiflorum*. Linn.

Rhus scandens, foliis ternatis, foliolis integerrimis, glabris. Linn. f. Suppl. pag. 184. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1481. n°. 14.

Rhus foliis ternatis, foliolis ovatis, mucronatis, integris, glabris ; caule cirrhifloro scandente. Thunb. Prodr. pag. 52.

C'eft un arbriffeau grimpant, dont les tiges s'accrochent, au moyen de vrilles, aux arbres qui les avoifinent ; ils font garnis de feuilles pétioles, alternes, ternées, compofées de folioles ovales,

très-entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, mucronées à leur sommet.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

23. SUMAC à feuilles tridentées. *Rhus tridentatum*. Linn. f.

Rhus scandens, foliis ternatis; foliolis incanis, serratis; ferratis tribus ad quinque. Linn. f. Suppl. pag. 184. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1481. n°. 15.

Rhus foliis ternatis, foliolis obovatis, tridentatis, globosis; caule cirrhifero, scandente. Thunb. Prodr. pag. 52.

Cette espèce ne nous est pas plus connue que le *rhus cirrhiferum*; c'est, comme elle, un arbrisseau à tige grimpante, qui s'attache par ses vrilles aux plantes qu'elle rencontre. On la distingue à ses feuilles alternes, pétiolées, ternées, dont les folioles sont en ovale-renversé, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, munies à leur contour de trois ou quelquefois de cinq dentelures en scie.

Cet arbrisseau se trouve au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h}

24. SUMAC tomenteux. *Rhus tomentosum*. Linn.

Rhus foliis ternatis, foliolis subspetiolatis; rhombicis angulatis, subius tomentosis. Linn. Spec. Plant. pag. 166. — Mill. r. Dict. n°. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1483. n°. 24.

Rhus foliis ternatis; foliolis ovatis, utrinque dentatis, laterculibus petiolatis. Hort. Cliffort. 111.

Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis, ovatis, acutis, dentatis. Virid. Cliffort. 25. — Roy. Lugd. Bat. 244.

Rhus africanum, trifoliatum, majus, foliis obtusis & incisis, hirsutis pubescentibus. Pluken. Almag. pag. 319. tab. 219. fig. 7.

Vitex trifolia minor, indica, serrata. Commel. Hort. vol. 1. pag. 279. tab. 91.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de sept à huit pieds sur un tronc droit, cylindrique, revêtu d'une écorce brune; il produit des branches très-irrégulières, étalées, & des rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles médiocrement pétiolées, ovales, un peu rhomboidales, anguleuses, dentées à leur contour, presque obtuses à leur sommet, longues d'environ deux pouces sur un de large, glabres & d'un vert-foncé à leur face supérieure, coroneuses en dessous; le pétiole commun très-long, presque cylindrique.

Les fleurs sont situées latéralement le long des

rameaux, dans l'aisselle des feuilles, disposées en petites grappes d'un blanc-verdâtre ou herbacé; elles sont de peu de durée; il leur succède de petites baies un peu ovales, à une seule semence.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. \bar{h} On le cultive au Jardin des Plantes de Paris; il se conserve pendant l'hiver dans les serres d'orangerie.

25. SUMAC blanchâtre. *Rhus albidum*. Schousb.

Rhus foliis ternatis; foliolis sessilibus, cuneiformibus, crenatis, utrinque cano-tomentosis; petiolis marginatis. Schousb. Maroc. edit. Germ. pag. 128. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 315. n°. 26.

Petit arbrisseau dont les tiges sont droites, glabres, rameuses, cylindriques, hautes d'environ un pied, revêtues d'une écorce blanchâtre, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ternées; les folioles sessiles, coriaces, couvertes d'un duvet blanchâtre, tomenteux, très-fin; arrondies & obtuses à leur sommet, entières à leurs bords, souvent crénelées vers leur sommet, surtout lorsqu'elles sont jeunes; les deux folioles latérales plus petites, un peu décurrentes sur le pétiole, la terminale beaucoup plus grande; le pétiole plane, ailé, de la longueur des feuilles.

Les fleurs sont disposées en grappes courtes & latérales vers la partie supérieure des rameaux; elles produisent des baies arrondies, de couleur rouge, de la grosseur d'un pois ordinaire, glabres à leur surface, succulentes & un peu farineuses, d'une saveur douce, contenant une seule semence osseuse, presque orbiculaire, comprimée.

Cette plante croît dans le royaume de Maroc, aux environs de Mogador, sur les collines sablonneuses, couvertes de forêts. \bar{h}

Elle fleurit au mois d'avril, & donne ses fruits mûrs dans le courant du mois de juin; ses baies sont bonnes à manger. Cultivée dans les jardins, cette plante perd le duvet & la blancheur de ses feuilles, qui deviennent glabres, & plus fortement crénelées que dans les individus sauvages.

16. SUMAC velu. *Rhus villosum*. Linn. f.

Rhus foliis ternatis; foliolis obovatis, integerrimis, sessilibus, utrinque pilosis. Aiton. Hort. Kew. vol. 1. pag. 368. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1483. n°. 25.

Rhus coule pubescente, foliis ternatis, foliolis sessilibus, ovatis, integris, pubescenti-villosis. Linn. f. Suppl. pag. 183.

Rhus foliis ternatis, foliolis ovatis, integris, villosis. Thunb. Prodr. pag. 52.

Rhus (incanum), foliis ternatis, foliolis ovatis, subius tomentosis. Miller, Dict. n°. 8.

Rhus africonum, trifoliotum, majus, folio subrotundo, integro, molli & incano. Pluken. Almag. pag. 219. tab. 219. fig. 8.

Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques, rameuses, revêtues d'un duvet blanc & tomenteux, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles en ovale renversé ou un peu arrondies, molles, scissiles sur leur pétiole commun, très-entrées à leurs bords, velues ou pubescentes à leurs deux faces. Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en une panicule de couleur herbacée, axillaire & terminale; la corolle est petite; les pédoncules & les pédicelles pubescents. Le duvet de toutes ces parties, & celui des tiges & des feuilles, disparaît souvent par la culture, & alors cette plante est à peine légèrement velue.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris; elle est d'orangier. *h* (V. v.)

27. SUMAC finué. *Rhus sinuatum*. Thunb.

Rhus foliis ternatis, foliolis ovatis, obtuse, sinuatis, subius villosis. Thunb. Prodrum. pag. 51. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. n°. 21.

Quoique Thunberg, qui seul nous a fait connaître cette espèce, n'en ait donné qu'une seule phrase caractéristique, on peut assez facilement la distinguer de ses congénères à ses folioles finuées & velues en dessous. C'est d'ailleurs un arbrisseau dont les feuilles sont alternes, pétiolées, ternées; les folioles ovales, obtuses à leur sommet. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

28. SUMAC incisé. *Rhus incisum*. Linn.

Rhus foliis ternatis, foliolis sessilibus, cuneiformibus, inciso-pinnatifidis, subius tomentosis, venosis; calicibus tomentosis. Linn. f. Suppl. pag. 183. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1483. n°. 23.

Rhus foliis ternatis, foliolis inciso-pinnatifidis, subius tomentosis. Thunb. Prodr. pag. 52.

C'est un arbrisseau qui a, par les découpures de ses folioles, quelques rapports avec le *myrica quercifolia*. Sa tige se divise en rameaux garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles scissiles sur le pétiole commun; petites, en forme de coin, incisées & presque pinnatifides à leurs bords, glabres, de couleur verte à leur face supérieure, tomenteuses & veinées en dessous. Les fleurs sont disposées en petites panicules latérales, situées vers l'extrémité des rameaux; les calices sont pubescents.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été observée par Thunberg. *h*

29. SUMAC pubescent. *Rhus pubescens*. Thunb.

Rhus foliis ternatis; foliolis obovatis, mucronatis, glabris; ramis villosis. Thunb. Prodr. p. 52. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1484. n°. 26.

Rhus atomaria. Jacq. Hort. Schönbr. n°. 343.?

Cet arbrisseau, mentionné par Thunberg, qui s'est borné à nous en donner la seule phrase caractéristique, a ses rameaux velus, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées; les folioles en ovale renversé, glabres à leurs deux faces, mucronées à leur sommet.

Le *rhus atomaria*, figuré par Jacquin, paroît être la même plante que celle-ci. C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, dont les tiges, ainsi que les vieux rameaux, sont chargés d'aspérités nombreuses qui les rendent rudes au toucher; les plus jeunes rameaux revêtus d'un duvet tomenteux; les feuilles alternes, ternées; les folioles ovales-allongées, longues d'environ un pouce, élargies à leur partie supérieure, surmontées d'une petite pointe recourbée, & garnies à leur contour de petits aiguillons qu'on n'aperçoit bien qu'à la loupe, & d'un duvet à peine sensible. Les fleurs sont disposées en petites panicules d'un vert-blanchâtre, situées à l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

30. SUMAC aromatique. *Rhus aromaticum*. Ait.

Rhus foliis ternatis; foliolis sessilibus, ovato-rhombis, inciso-ferratis, petiolis calicibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 367. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. n°. 28. — Turpin, Annal. Mus. Paris. vol. 5. pag. 445. tab. 30.

Rhus (aromaticum); fruticulosum, quos amertaceum, nudiflorum; foliis trifoliatis; foliolis pubescentibus, rhombo-ovalibus, dentatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 184.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, dont le tronc est droit, les rameaux flexibles; le bois difficile à rompre, & repandant, ainsi que les autres parties de la plante, une douce odeur de camphre lorsqu'on les froisse. Les feuilles sont alternes, composées de trois folioles rhomboïdales, rétrécies à leur base, inégalement crénelées ou dentées en scie, quelquefois même un peu lobées, pubescentes ou légèrement velues à leurs deux faces; la foliole terminale plus grande, longue de deux ou trois pouces; le pétiole commun de même longueur. Ces feuilles ne paraissent qu'après l'épanouissement des fleurs.

Les fleurs sont disposées en épis, en forme de chatons, solitaires ou deux ou trois ensemble, dans les aisselles des feuilles de l'année précédente,

d'abord cylindriques, longs de six à huit lignes, puis ovales-oblongs, d'un beau jaune-doré, munis de bractées écaillues, en cœur, un peu ciliées; dans le milieu du disque de chaque bractée, on aperçoit un appendice divisé en deux découpures lancéolées, concaves, du centre desquelles s'élève un pédoncule plus long que l'écaille, terminé par une petite fleur d'un beau jaune, composée d'un calice persistant, à cinq découpures ovales, aiguës; de cinq pétales oblongs, cunéiformes, concaves; de cinq étamines plus courtes que les pétales, insérées sous l'ovaire, ayant entr'elles autant de glandes bilobées, attachées au même point; d'un ovaire libre, ovale, légèrement trigone, terminé par trois styles divergens, épaissis au sommet. Le fruit est un petit drupe arrondi, un peu comprimé, velu, d'un rouge très-vif, peu charnu, contenant un noyau médiocrement oléux en dehors, mou & charnu en dedans; l'embryon dépourvu de périsperme, revêtu d'une seule tunique membraneuse, & placé dans une direction horizontale à ses deux lobes oblongs; la radicle fusiforme, recourbée vers les lobes, du côté supérieur.

Cet arbrisseau croît dans l'Amérique septentrionale, & a été découvert dans la province de Kentucky par Bartram. On le cultive en Angleterre dans le jardin de Kew. *h* (*Turpin*.)

Observations. « Depuis long-temps, dit M. Turpin qui nous a fourni les détails précédents, M. Ventenar avoit observé que l'arbrisseau connu dans les jardins & dans les herbiers sous le nom de *myrica trifoliata*, avoit des fleurs complètes, qu'il devoit être un *rhus*, & peut-être le *rhus suaveolens* de Willdenow. J'ai répété depuis l'observation de M. Ventenar, & j'ai vu non-seulement que cet arbrisseau avoit des fleurs complètes, mais encore qu'elles avoient le même mode d'insertion que le *rhus aromaticum*. D'après ces observations, on peut conclure que nous ne connoissons pas le *myrica trifoliata* de Linné, & que l'arbrisseau connu sous ce nom dans les jardins & dans les herbiers, est le *rhus suaveolens* de Willdenow. »

31. SUMAC odorant. *Rhus suaveolens*. Aiton.

Rhus foliis ternatis; foliolis sessilibus, ovato-rhombicis, inciso-serratis, glabris. Air. Hort. Kew. vol. 1. pag. 368. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. n.º 19.

Toxicodendron (crenatum), foliis ternatis; foliolis ovatis, crenato-ovatis, glabris. Mill. Dict. n.º 5. ?

D'après les observations que nous avons rapportées à la fin de l'espèce précédente, & qui ont été faites par MM. Ventenar & Turpin, il est à presumer que cette espèce a été prise par plu-

sieurs botanistes pour le *myrica trifoliata* de Linné. Ne connoissant ni l'une ni l'autre de ces deux plantes, nous sommes dans l'impossibilité de prononcer. Il faut attendre de nouvelles recherches, & avoir du *myrica trifoliata* de Linné des notions plus étendues. Dans l'espèce dont il s'agit ici les feuilles sont alternes, ternées; les folioles sessiles, ovales ou rhomboidales, glabres à leurs deux faces, incisées & dentées en icie à leur contour. Elle paroît se rapprocher beaucoup du *rhus aromaticum*.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique. *h*

32. SUMAC luisant. *Rhus lucidum*. Linn.

Rhus foliis ternatis; foliolis sessilibus, cuneiformibus, levibus. Linn. Hort. Clifort. 111. — Virid. Clif. 15. — Hort. Upsal. 78. — Roy. Lugd. Bat. 243. — Mill. Dict. n.º 10. — Fabric. Helmst. pag. 40. — Cavan. Icon. Rar. vol. 2. pag. 27. tab. 132. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1485. — Jacq. Hort. Schoenb. n.º 247.

Rhus foliis ternatis; foliolis ovatis, retusis, glabris. Thunb. Prodr. pag. 52.

Rhus africanum, trifoliatum, minus, glabrum, splendens folio, subrotundo, integro. Pluk. Almag. pag. 319. tab. 219. fig. 9.

Rhus arborum, trifoliatum, latifolium. Burm. Afric. pag. 252. tab. 91. fig. 2.

Vitex trifolia, minor, indica, rotundifolia. Commel. Hort. vol. 1. pag. 181. fig. 83.

p. Idem, foliolis sublobatis, majoribus. (N.)

Cet arbrisseau, remarquable par ses folioles cunéiformes, épaisses, luisantes, s'élève à la hauteur de six à dix pieds, sur une tige droite, cylindrique, glabre, rameuse, les rameaux étalés, assez nombreux, alternes, très-glabres, striés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles sessiles, inégales, en forme de coin, fermes, épaisses, glabres à leurs deux faces, luisantes, d'un vert-foncé, plus pâles en dessous, entières à leurs bords, longuement rétrécies à leur partie inférieure, arrondies & obtuses à leur sommet; la foliole intermédiaire longue d'un pouce & plus; les deux latérales d'un tiers plus petites; le pétiole plus court que les plus petites folioles, comprimé, un peu canaliculé, légèrement ailé.

Les fleurs sont disposées en petites grappes courtes, médiocrement rameuses, situées dans les aisselles des feuilles, vers l'extrémité des rameaux. Ces fleurs sont petites, blanchâtres; il leur succède de petites baies globuleuses, de la grosseur d'un grain de poivre, très-glabres, rougeâtres.

Cet

Cet arbrisseau croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. Il est depuis long-tems cultivé dans les jardins, où il offre plusieurs variétés. Celle que j'ai indiquée est une des plus remarquables; ses folioles sont presque une fois plus grandes, & quelquefois se divisent vers leur sommet en trois ou cinq lobes plus ou moins marqués. *h* (V.v.)

33. SUMAC à feuilles d'aube-épine. *Rhus oxyacanthoides*. h. p.

Rhus spinosum, foliis ternatis; foliolis cuneiformibus, dentato-lobatis, glabris. Duham. Arbr. edit. nov. Mich. vol. 2. pag. 169. n°. 20.

Rhus (oxyacanthoides), spinosum, foliis ternatis, glabris; foliolis angustocuneiformibus, apice triobis integrisque, floribus axillaris. Dinnon, Cours bot. cult. vol. 3. pag. 368.

Cet arbrisseau ressemble tellement à l'aube-épine par son port, la forme de ses feuilles & ses épines, qu'on s'est très-porté, sans les fleurs, à le placer à côté de cette plante. Il présente l'aspect d'un buisson. Ses branches sont très-irrégulières, divisées en rameaux grêles, diffus, entremêlés, très-inégaux, glabres, d'un brun-foncé, un peu tubercules, amincis & terminés par une pointe droite, épineuse; de leurs aisselles sortent de petites épines qui souvent s'allongent & deviennent de petits rameaux feuillés. Il en est de même des bourgeons, qui offrent d'abord un paquet de feuilles qui se développent en rameaux. Les feuilles sont alternes, solitaires ou presque fasciculées, pétiolées, ternées; les folioles feuillées, inégales, cuneiformes, ordinairement divisées à leur sommet en trois ou cinq lobes obtus, inégaux, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, blanchâtres ou cendrées en dessous, entières à leurs bords; les pétioles au moins aussi longs que les feuilles, glabres ou à peine pubescens, filiformes. Les fleurs se montrent rarement dans les jardins d'Europe, où l'on cultive cet arbrisseau. Je n'ai pas pu les observer.

Cette plante croît naturellement en Afrique, au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V.v.)

On le tient l'hiver dans les serres d'orangerie.

34. SUMAC à feuilles d'alisier. *Rhus cratagiforme*. Cavan.

Rhus (oxyacantha), caule fruticoso, inermi; foliis ternatis, canis; foliolis ovato-cuneatis, medio longiore. Cavan. in Annal. Scient. nat. pag. 36. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 316. n°. 35.

Ses tiges sont droites, glabres, ligneuses, divisées en rameaux alternes, étalés, un peu diffus, dépourvus d'épines, se rapprochant un peu, par son port, du *rhus oxyacanthoides*. Les feuilles sont

Botanique, Tome VII.

alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles inégales, ovales, cuneiformes, glabres & d'un vert-foncé à leur face supérieure, blanchâtres en dessous, rétrécies à leur partie inférieure, élargies vers leur sommet, entières à leur contour; la foliole terminale beaucoup plus grande que les latérales.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

35. SUMAC cuneiforme. *Rhus cuneifolium*. Linn. f.

Rhus foliis ternatis; foliolis sessilibus, cuneiformibus, glaberrimis, sepimentatis; dentibus macro-natis. Linn. f. Suppl. pag. 184. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. n°. 22.

Rhus foliis ternatis; foliolis cuneiformibus, sepimentatis, glabris. Thunb. Prodr. pag. 52.

Cette espèce a des tiges ligneuses, qui se divisent en branches ramifiées, munies de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les trois folioles sessiles sur leur pétiole commun, en forme de coin, très-glabres à leurs deux faces, divisées à leur contour en sept dents, chaque dent terminée par une petite pointe aiguë.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

36. SUMAC denté. *Rhus dentatum*. Thunb.

Rhus foliis ternatis; foliolis obovatis, mucronato-dentatis, glabris; caule scabro. Thunb. Prodr. p. 52. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1482. n°. 20.

Cette plante a des tiges ligneuses, divisées en rameaux chargés de petites épines, & garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées. Les folioles sont glabres à leurs deux faces, en ovale renversé, dentées à leur contour, mucronées à leur sommet.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, où Thunberg en a fait la découverte, & qu'il ne nous a fait connaître que par sa seule phrase spécifique. *h*

37. SUMAC glauque. *Rhus glaucum*. Hort. Par.

Rhus foliis ternatis; foliolis obcordatis, nonnullis glauco-pulverulentis. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 326. n°. 38.

Joli arbrisseau, remarquable par le nuage glauque, bleuâtre, un peu pulvérulent, dont toutes ses parties, mais plus ordinairement la face inférieure de ses feuilles, sont recouvertes.

Ses tiges sont roides, droites, rameuses; les rameaux fermes, élanés, très-droits, chargés latéralement d'autres petits rameaux courts, al-

T 11

ternes, striés, presqu'anguleux, d'un brun-foncé, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, ternées, les folioles presque sessiles, inégales, presqu'ovales, très-entières, coriaces, épaisses, rétrécies à leur base, élargies, échancrées & obtuses à leur sommet, vertes, luisantes en dessus, glauques & bleuâtres en dessous; la foliole terminale longue d'environ six lignes; les latérales d'un tiers plus petites, souvent entières à leur sommet; les pétioles plus courts que les feuilles, planes, un peu canaliculés, striés, portant assez ordinairement à leur base intérieure le rudiment d'une jeune feuille qu'on prendroit pour une stipule. Les fleurs sont disposées en grappes ou panicules axillaires, vers l'extrémité des rameaux.

Cet arbrisseau croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. Il passe l'hiver dans l'orangerie, & conserve sa verdure & ses feuilles toute l'année. (P. v.)

38. SUMAC lisse. *Rhus levigatum*. Linn.

Rhus foliis ternatis; foliolis sessilibus, lanceolatis, levibus. Linn. Spec. Plant. pag. 1672. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1485. n°. 30.

Rhus foliis ternatis; foliolis ovatis, acuminatis, integris, glabris. Thunb. Prodr. pag. 52.

An rhus elongata? Jacq. Hort. Schoenbr. n°. 345.

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, cylindriques, très-glabres, souples, d'un brun-rougâtre, garnis de feuilles pétioles, alternes, ternées; les folioles sessiles, lancéolées, coriaces, entières, inégales, arrondies, obtuses ou un peu acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, vertes, mais point luisantes en dessus, pâles ou d'un blanc-jaunâtre en dessous; la foliole terminale longue d'un pouce & plus; les deux latérales plus courtes; le pétiole plus court que les feuilles.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, une panicule assez longue, peu étalée, dont les ramifications sont très-nombreuses, courtes, fines, délicates; ces fleurs sont petites, blanchâtres.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (P. v.) On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

Observations. Le *rhus elongata* de Jacquin paroît bien peu différer de cette espèce. Sa tige, grêle, est parsemée, ainsi que les rameaux, de points saillans; les folioles plus longues; la panicule terminale.

39. SUMAC flexible. *Rhus viminalis*. Ait.

Rhus foliis ternatis; foliolis linearilanceolatis, integerrimis, glabris, vix attenuatis; intermedia subsessilata. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 368. —

Vahl, Symbol. 3. pag. 50. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1484. n°. 27. — Jacq. Hort. Schoenbr. n°. 344.

? *Rhus (lanceum), foliis ternatis, foliolis lanceolato-subulatis, elongatis, utrinque glaberrimis*. Linn. f. Suppl. pag. 184.

Rhus (lanceum), foliis ternatis, foliolis lanceolatis, integris, glabris. Thunb. Prodr. pag. 52.

Il seroit difficile d'affirmer que cette espèce est la même que le *rhus lanceum* de Linné fils & de Thunberg, à moins d'être assuré de la connaissance parfaite de cette dernière plante; cependant elle paroît y avoir tant de rapports, qu'on peut la regarder au moins comme une variété.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de six ou huit pieds, sur une tige droite, cylindrique, qui se divise en rameaux grêles, longs, flexibles, très-glabres, garnis de feuilles pétioles, alternes, ternées, composées de folioles linéaires-lancéolées, longues de trois à quatre pouces, sur trois à quatre lignes de large, glabres & vertes à leurs deux faces, entières à leurs bords, rétrécies presqu'en pétiole à leur base, mucronées à leur sommet; la foliole terminale plus longue, médiocrement pétiolée; le pétiole commun long d'un pouce.

Les fleurs sont petites, de couleur blanchâtre, situées dans les aisselles des feuilles supérieures, vers l'extrémité des rameaux. Elles forment une panicule assez ample, droite, étalée, composée de petites panicules partielles & rameuses, dont les pédoncules sont longs & capillaires; les pédicelles très-courts, inégaux.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris; il fleurit au printemps. (P. v.)

40. SUMAC à feuilles étroites. *Rhus angustifolium*. Linn.

Rhus foliis ternatis; foliolis petiolatis, linearilanceolatis, integerrimis, subus tomentosis. Linn. Hort. Cliffort. 111. — Roy. Lugd. Bat. 244. — Thunb. Prodr. pag. 52. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1484. n°. 28.

Rhus argenteum. Mill. Dict. n°. 12.

Rhus africanum, trifoliatum, majus; foliis subius argenteis, acutis & marginis incisjs. Pluken. Almag. pag. 219. tab. 219. fig. 6.

Cet arbrisseau a ses tiges hautes de cinq à six pieds & peut être beaucoup plus, chargées de rameaux alternes, allongés, grêles, flexibles, parfaitement glabres, revêtus d'une écorce d'un brun un peu clair, lisse, à peine légèrement pubescente dans sa jeunesse. Les feuilles sont alternes, pétioles, ternées; les folioles sessiles, allongées, linéaires-

lancéolées, fermes, glabres, d'un vert-foncé & un peu luisant en dessus, d'un blanc un peu jaunâtre en dessous, couvertes d'un duvet court & cotonneux, à peine feniblée dans les individus cultivés; longues de trois à quatre pouces, larges de quatre à cinq lignes, traversées par une nervure saillante, très-brune ou jaunâtre, & par d'autres latérales & parallèles, avec des veines réticulées; enriées à leurs bords, acuminées à leur sommet, un peu aigues à leur base; le pétiole long d'un pouce & plus, grêle, un peu canaliculé.

Les fleurs sont disposées en panicules droites, médiocrement étalées, situées, vers l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles; les ramifications très-irrégulières, glabres, nombreuses; les pélicelles fort courts. Ces fleurs sont petites, d'un blanc un peu jaunâtre.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. v.)

41. SUMAC à feuilles de romarin. *Rhus romarinifolia*. Vahl.

Rhus foliis ternatis; foliolis sessilibus, linearibus, revolutis, subius ferrugineis. Vahl, *Symb.* 3. pag. 50. — Willd. *Spec. Plant.* vol. 1. pag. 1484. n°. 24

Rhus fruticosum, foliis trifidis, linearibus, acuminatis. Burm. *Afric. pag.* 251. tab. 91. fig. 1.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, effilés, garnis de feuilles médiocrement pétioles, alternes, ternées, composées de folioles sessiles, irrégulières, linéaires, très-étroites, longues au moins d'un pouce & demi, sur deux lignes de large, entières & roulées à leurs bords; ce qui leur donne quelque ressemblance avec celles du romarin; vertes & glabres en dessus, de couleur de rouille à leur face inférieure, traversées longitudinalement par une nervure saillante.

Les fleurs sont situées, dans l'aisselle des feuilles, à l'extrémité des rameaux, où elles forment de petites panicules un peu lâches, à peine rameuses; les pédoncules grêles, filiformes, irrégulières, entières glabres.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. *h*

42. SUMAC ondulé. *Rhus undulatum*. Jacq.

Rhus foliis ternatis; foliolis lancéolatis, subserratis, undulatis. Jacq. *Hort. Schoembr.* n°. 346.

Cet arbrisseau a des tiges droites, extrêmement rameuses; les rameaux alternes, diffus, élancés, parfaitement glabres, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles irrégulières, presque sessiles, lancéolées, glabres à leurs deux faces, recourbées à leur base, surmontées

à leur sommet d'une petite pointe, ondulées & même légèrement dentées en scie à leurs bords; la foliole terminale plus grande, longue au moins d'un pouce, sur deux ou trois lignes de large; les deux latérales d'un tiers moins grandes; les pétioles un peu allés, presque aussi longs que les feuilles. Les fleurs sont monoïques, & pour-être polygames; elles forment, à l'extrémité des tiges & dans les aisselles des feuilles, des panicules petites, peu étalées, longues d'environ deux pouces.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h*

*** Feuilles simples.

43. SUMAC fuslet. *Rhus cotinus*. Linn.

Rhus foliis simplicibus, obovatis. Linn. *Spec. Plant.* vol. 1. — Miller, *Dict.* n°. 15. — Jacq. *Flot.* austr. tab. 210. — Dutoit, *Harbk.* 2. pag. 300. — Pallas, *Iter* 3. pag. 590. — Kniph. *Cent.* 2. n°. 70. — Willd. *Spec. Plant.* vol. 1. pag. 1585. n°. 30. — Duham. *Arbr. edit. nov.* Mich. vol. 2. pag. 177. tab. 49.

Rhus racemis plumosis, foliis ovatis. Hall. *Helv.* n°. 827.

Cotinus foliis obversis ovatis. Hort. *Cliff.* 111. — Roy. *Lugd. Bat.* pag. 243. — Gronov. *Orient.* 92.

Cotinus coccygria. Scop. *Carn. edit.* 2. n°. 368.

Cotinus coriaria. Dodon. *Pempt.* pag. 780. Icon. — Tournef. *Inst. R. Herb.* 610. — Duham. *Arbr.* vol. 1. pag. 191. tab. 78.

Coccygia, sive cotinus putata. J. Bauh. *Hist.* 1. pag. 494. Icon.

Coccomileia, sive coccygria. C. Bauh. *Pin.* 415. — Clus. *Hist. Rar.* pag. 16. Icon.

C'est un arbrisseau assez agréable, touffu, dont les tiges, droites, cylindriques, s'élèvent à la hauteur de six à dix pieds. Leur écorce est lisse; leur bois jaunâtre; les rameaux étalés, flexibles, glabres, cylindriques, bruns ou verdâtres, garnis de feuilles simples, épaisses, pétioles, un peu arrondies ou elliptiques, ovales, d'un vert-tendre, un peu blanchâtres en dessous, glabres à leurs deux faces, longues d'un pouce & plus, obuses, entières, marquées de nervures latérales, parallèles, fines, un peu jaunâtres; les pétioles grêles, ordinairement plus longs que les feuilles.

Les fleurs sont petites, verdâtres, disposées au sommet des rameaux en panicules fines, étalées, très-rameuses; les ramifications filiformes; les dernières divisions déliées comme un cheveu, venues après la floraison, & donnant aux panicules l'aspect de grosses houppes de duvet un peu couleur de chair; une bractée étroite, filiforme, sur

petite à la base de chaque ramification. Les fruits sont des baies glabres, fort petites, presqu'en cœur. M. Deleuze a remarqué que les pédoncules & les pédicelles sont courts & parfaitement glabres au moment de la floraison; qu'ils s'allongent & divergent beaucoup après cette époque; que ceux des fleurs fertiles restent glabres, mais que ceux des fleurs stériles se chargent d'une quantité considérable de petits hérissés.

Cet arbrisseau croît dans les départements méridionaux de la France, dans l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Sibirie, &c. sur les collines & dans les sols arides. *h* (V. v.)

On attribue à cet arbrisseau les mêmes propriétés médicales qu'au sumac des corroyeurs. Son bois, qui est jaune & vert, est employé par les luthiers, les ébénistes & les tourneurs: il sert pour teindre, en couleur de café, les draps & les maroquins; les branches & les feuilles sont employées pour tanner les cuirs. Cet arbrisseau est cultivé pour l'ornement des bosquets; il résiste aux froids de l'hiver. Son feuillage, d'un beau vert & qui dure jusqu'aux premières gelées, produit un joli effet; il répand une odeur de citron assez agréable.

44. SUMAC polygame. *Rhus atrum*. Forst.

Rhus foliis simplicibus, ovato-oblongis; floribus polygamis. Forst. Prodr. pag. 142. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1486. n° 33.

Cette espèce, sur laquelle nous avons très-peu de détails, se rapproche beaucoup du *rhus cotinus*; elle en diffère par ses feuilles ovales oblongues, simples, entières, pétioolées; par ses fleurs, dont les unes sont hermaphrodites, les autres monoïques ou peut-être dioïques.

¹ Cette plante a été mentionnée par Forster, qui l'a recueillie dans la Nouvelle-Calédonie. *h*

Observations. Quelques autres espèces de sumacs sont mentionnées dans plusieurs auteurs; mais la plupart manquent de détails suffisants, & rentreroient peut-être dans quelques-unes des espèces que je viens de décrire. Je me bornerai donc à indiquer ici les principales. Miller en a cité plusieurs. Leur fructification n'étant presque point connue, ces plantes doivent rester parmi les espèces incertaines.

* *Rhus* (chinesse), *foliis pinnatis, foliolis ovatis, obtusis serratis; petiolo membranaceo, villosis*. Miller, Dict. n° 7.

Rhus sinarum, laosensis, costâ foliorum alatis. Pluk. Almag. 183.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de cinq à six pieds, & pousse plusieurs branches irrégulières, dont les plus jeunes, ainsi que les pétioles, sont

couvertes d'un duvet brun & velu. Ses feuilles sont ailées, avec impaire & composées de trois ou quatre paires de folioles ovales, d'un à deux pouces de long, sur un de large, dentées en scie à leurs bords, blanches en dessous; la foliole terminale plus grande, en cœur, acuminée à son sommet; le pétiole velu, garni de chaque côté, entre les folioles, d'une membrane qui va en s'élargissant. Cette plante ne pousse point de rejetons par ses racines. Les fleurs n'ont point été observées.

* *Rhus* (africanum), *foliis ternatis, foliolis ovatis, nervosis, marginibus apicis densatis, utrinque viridibus*. Mill. Dict. n° 11.

Rhus africanum, trifolium majus, glabrum, spleneticum, utrinque folio subrotundo, medio quadrato crenato. Boerh. Ind. alt. 2. pag. 229.

Il paroît que cette plante n'est qu'une variété du *rhus lucidum*, dont les folioles sont deux fois plus grandes, ovales, un peu dentées sur leurs bords, traversées par plusieurs veines qui s'étendent depuis la côte du milieu jusqu'aux bords; sort toides, d'un vert brillant à leurs deux faces. Elle est originaire du Cap de Bonne-Espérance.

Nota. Le *rhus radialis* de Miller, n° 13, est très-probablement un conarus, & peut-être le *conarus monocarpus* de Linné.

* *Rhus* (rigidum), *foliis ternatis, linearibus, integris, rigidis, glabris*. Mill. Dict. n° 14.

Cette espèce seroit-elle une variété du *rhus viminalis*, avec laquelle elle paroît avoir de très-grands rapports? Elle croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle forme un grand arbrisseau, mais dans les jardins en Angleterre, elle ne parvient guère qu'à cinq ou six pieds de haut. Elle est couverte d'une écorce d'un brun-clair, & munie de feuilles à trois folioles très-étroites; les pétioles très-longs, les fleurs naissent, en panicules lâches, aux extrémités des branches & aux aisselles des tiges. Elles sont petites, de couleur herbacée.

* *Rhus* (hypophodendron), *foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, subserratis; panicula composita*. Moench. Weissenf. pag. 101.

* *Rhus* (æqualis), *foliis ternatis; foliolis omnibus magnitudine æqualibus, subserratis, obovato-lanceolatis, integris; caule petiolisque puberulis*. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 326. n° 40.

* *Rhus* (æneæ), *foliis simplicibus, longè lanceolatis, serratis, subius tomentosis, albis*. Foisikh. Flor. ægypt.-arab. pag. 206. n° 28.

Ses feuilles sont simples, longuement lancéolées, dentées en scie à leurs bords, blanchâtres & tomenteuses en dessous. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, latéraux; elles produisent des bates

globuleuses, hispides. Cette plante croît sur les montagnes de l'Arabie.

SUPÉRIEUR (Ovaire). *Germen superum.* Linné a donné le nom de *supérieur* à l'ovaire, en considérant sa position relativement à celle de la corolle; il est supérieur à la corolle lorsque celle-ci est placée au dessous de lui, ou au même point sur le réceptacle commun, de sorte que l'ovaire s'élève au milieu d'elle; il est *inférieur* lorsqu'il porte la corolle vers son sommet, au fond de laquelle il ne paraît que peu ou point du tout. Linné a fait la même application à la position du calice, relativement à celle de l'ovaire; mais M. Ventenar a très-judicieusement observé que le calice est constamment placé au dessous de l'ovaire, & cette règle ne souffre aucune exception. Il est vrai que, dans plusieurs plantes dont le calice est d'une seule pièce, & dont le calice est soudé naturellement en tout ou en partie avec l'ovaire, tel que dans le poirier: il vaudrait mieux dire avec M. Ventenar, en parlant, soit du calice, soit de l'ovaire, qu'ils sont *adhérens*; & dans le cas contraire, c'est-à-dire, lorsque le calice ne se soude point avec l'ovaire, il faut dire, en parlant de l'un & l'autre organes, qu'ils sont *libres*. Cette même distinction est exprimée avec un peu moins d'exactitude par Tournefort, lorsqu'il distingue les plantes dont le calice devient fruit, & celles dont le pistil devient fruit.

Il est évident, observe M. Decandolle, que lorsque le calice est adhérent, la corolle & les étamines ne peuvent pas être insérées sous l'ovaire, & sont nécessairement placés sur la partie libre du calice ou au dessous de l'ovaire, & qu'au contraire lorsque l'ovaire est libre, les étamines & la corolle peuvent être insérées au dessous de l'ovaire, entre celui-ci & le calice. C'est cette considération qui a engagé Linné à désigner sous les noms d'*ovaire inférieur* & de *corolle supérieure* la même structure qui a été nommée plus haut *calice ou ovaire libre*. Par une conséquence de cette manière de voir, Linné a souvent donné improprement le nom d'*ovaire* à la partie qui résulte de l'aggrégation de l'ovaire avec une partie du calice, & celui de *calice* à la partie du calice restée libre, c'est-à-dire, aux seules divisions du limbe.

SUPPORTS. *Fulcra.* Outre la tige, dir M. Lamarck, qui, dans les plantes où elle existe, est comme le support commun de toutes les autres parties, un grand nombre de végétaux ont encore des supports particuliers en forme de queue, qui soutiennent les fleurs & les feuilles, & en diversifient de mille manières le port & la situation; ces espèces de queue qu'on nomme *péduncules* lorsqu'elles soutiennent les fleurs, & *pétioles* lorsqu'elles soutiennent les feuilles, méritent seules proprement le nom de *supports*. Cependant on a compris sous cette dénomination générale quel-

ques autres parties, dont les unes aident aux plantes à se soutenir, ou servent à les soutenir & à les défendre, & les autres facilitent l'excretion de quelque humeur. Outre le *pétiole* & le *péduncule*, les autres supports sont la *vrille*, les *stipules*, les *bractées*, les *épines*, les *aiguillons*, les *poils*, les *glandes*, les *écailles*. (Voyez ces différents mots.)

SURCOMPOSÉES (Feuilles). *Folia supra-composita.* Quand on considère les feuilles relativement à leur degré de composition, on dir qu'elles sont *surcomposées* toutes les fois que les seconds pétioles, au lieu de porter des folioles, se divisent en d'autres pétioles qui soutiennent les folioles. Les feuilles sont alors plus de deux fois composées; dans ce cas elles sont *trigémées*, *triternées*, *tripinnées*.

Elles sont *trigémées* (*tergemia*, *triplicato-gemina*) lorsque leur pétiole se divise en trois parties, qui soutiennent chacune à leur sommet quatre folioles séparées par paires.

Elles sont *triternées* (*triternata*, *triplicato-ternata*) lorsque leur pétiole se divise en trois parties, qui se subdivisent encore chacune en trois autres parties, chargées chacune de trois folioles.

Enfin, elles sont *tripinnées* ou trois fois ailées (*tripinnata*, *triplicato-pinnata*) lorsqu'elles sont trois fois ailées, c'est-à-dire, lorsque leur pétiole porte de chaque côté, en manière d'ailes, plusieurs folioles bipinnées, avec ou sans impaire terminale.

SUREAU. *Sambucus.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des chèvrefeuilles, qui a beaucoup d'affinité avec les viornes & les cornouillers. Il comprend des arbrustes la plupart indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont opposées, profondément découpées, presque n'ailes; les folioles dentées ou pinnatifides; les fleurs disposées en un corymbe ombellé.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions courtes; une corolle en roue, à cinq lobes; cinq étamines alternes avec les divisions de la corolle; trois stigmates sessiles; une baie à trois semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

- 1°. Un calice d'une seule pièce, fort petit, supérieur, persistant, à cinq découpures.
- 2°. Une corolle monopétale, un peu concave, en roue, à cinq découpures obtuses, réfléchies.
- 3°. Cinq étamines alternes avec les lobes de la corolle; les filaments subulés, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire inférieur, ovale ou un peu arrondi; point de style; trois stigmates obtus.

Le fruit consiste en une boîte globuleuse, à une seule loge, contenant trois amerces ridées, convexes à l'un de leurs faces, anguleuses à l'autre, attachées par leur sommet à un placenta filiforme, situé dans l'axe du fruit.

Observations. Ce genre, qui vient se placer à côté des cornouillers & des vioriers, est très-naturel & bien distinct. Les espèces qui le composent, peu nombreuses jusqu'ici, ont toutes une odeur forte, désagréable dans leurs feuilles & leur écorce; toutes jouissent à peu près des mêmes propriétés, déplaisent aux bestiaux, & n'en sont jamais atteintes. Leurs fleurs nombreuses, en gros bouquets diffus, la couleur d'un rouge assez vif des baies dans quelques espèces, sont les principaux titres qui les ont fait recevoir dans nos boîtes, encore les tient-on éloignées des lieux les plus fréquentés. Toutes ont leurs feuilles ailées avec une impaire, opposées, & leurs fleurs en cime ou en grappes épais, terminales.

ESPÈCES.

1. SUREAU commun. *Sambucus nigra*. Linn.

Sambucus cymis quinquepartita, caule arboresc. Linn. Spec. Plur. vol. 1. pag. 385. — Mat. r. medic. 89. — Queder. Flor. dan. tab. 545. — Pollich, Pat. n°. 313. — Daroi, Harbk. 2. pag. 410. — Scop. Carn. n°. 372. — Knoch, Del. 1. tab. H. — Hoffm. Germ. 109. — Roth. Germ. vol. 1. p. 137. — vol. II. pag. 366. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 268. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1495. n°. 3. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 254. tab. 65. & edit. nov. vol. 2. pag. 246. tab. 55. — Catin. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 137. tab. 27. fig. 7. — Lam. Ill.ustr. Gener. tab. 211.

Sambucus arborescens, floribus umbellatis. Hall. Heiv. n°. 670.

Sambucus caule arborescens, ramoso; floribus umbellatis. Rop. Lugd. Bat. 245. — Flor. Suec. 250. 265.

Sambucus caule perenni, ramoso. Hort. Cliff. 109.

Sambucus vulgaris. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 369. — J. Bauh. Hist. 1. pag. 544. Icon.

2. *Sambucus fructu nigro*.

Sambucus fructu in umbellâ nigro. C. Bauh. Pin. 456. — Tourn. Inst. R. Herb. 6.6. tab. 376.

Sambucus. Dod. Pempt. pag. 845. Icon. — Camer. Epit. 995. Icon. — Murr. h. Comm. 875. Icon. — Hag. 697. Icon. — Falc. Hist. 64. Icon. — Tabern. Icon. 1028. — Lobel. Icon. 2. tab. 161. — Gerard. Hist. 1412. Icon. — Paul. Dan. tab.

129. — Parkins, Theatr. 208. Icon. — Blackw. tab. 151.

3. *Sambucus fructu viridi*.

Sambucus fructu in umbellâ viridi. C. Bauh. Pin. 458. — Lobel. Icon. 2. tab. 162. — Tourn. Inst. Herb. 606.

Sambucus virefascens. Hort. Paris. & Catal. 115.

4. *Sambucus fructu albo*.

5. *Sambucus foliis variegatis*.

6. *Sambucus laciniata*. J. Bauh. Hist. 1. pag. 549. Icon.

SUREAU à feuilles de persil.

Sambucus (laciniata), foliis pinnatifidis; floribus umbellatis; caule fruticoso, ramoso. Mill. Dict. n°. 2.

Sambucus foliis pinnatis, foliolis laciniatis, floribus umbellatis, caule fruticoso. Dunal, Harbk. 2. pag. 413. — Retz. Observ. 2. pag. 30. & Observ. 6. pag. 27.

Sambucus laciniato folio. C. Bauh. Pin. 456. — Dod. Pempt. 845. Icon. — Tourn. Inst. R. Herb. 606. — Duham. Arbr. vol. 1. pag. 254. — Lobel. Icon. 2. tab. 164. — Kniph. Cent. 8. n°. 81.

Sambucus foliis ex albo variis, sem. lateo-variegatis. Duham. Arbr. vol. 2. pag. 254.

Le SUREAU. Reg. bot. Icon.

C'est un arbrisseau fort commun, dont les tiges sont droites, cylindriques, de couleur cendrée, hautes de dix à quinze pieds; le bois dur; les branches & les rameaux verts, glabres, cassans, fistuleux, remplis d'une moelle abondante, très-blanche. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ailées avec une impaire, composées de cinq à sept folioles opposées, pétiolées, ovales-lanceolées, vertes, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, acuminées à leur sommet.

Les fleurs sont blanches, petites, très-nombreuses, odorantes, disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe ample, ombellé; les principales divisions ordinairement au nombre de cinq; les ramifications partielles & supérieures plus régulièrement ombellées, glabres, verdâtres. Le calice est glabre, fort petit; la corolle monopétale, concave, à cinq lobes obtus, un peu réfléchis. Les fruits sont de petites baies un peu globuleuses, incolentes, qui de reçues deviennent noires quand elles sont mûres, marquées à leur sommet par l'impression des lobes du calice.

Cette plante fournit plusieurs variétés remarquables, les unes par leurs fruits, les autres par les découpures & les couleurs panachées de leurs feuilles. Les premières ont des fruits qui restent

blancs ou verdâtres ; les autres , plus frappantes , ont leurs folioles découpées en lanières étroites , irrégulièrement dentées , très-aigues , assez semblables aux feuilles du persil. Dans cette variété , ainsi que dans les premières , les feuilles sont quelquefois agréablement panachées de blanc , de vert & de jaune.

Cet arbrisseau croît partout en France , en Europe & même au Japon ; il est commun dans les haies & les terrains un peu humides. On le cultive , ainsi que les variétés , au Jardin des Plantes de Paris. h

« Les sureaux , dit Duhamel , forment de grands arbrisseaux très-jolis , surtout quand ils sont chargés de fleurs. Ils peuvent être employés pour la décoration des bosquets de la fin du printemps & de l'été. Il y a peu d'arbres moins délicats sur la nature du terrain , & plus faciles à multiplier. Il reprend très aisément par marcottes , & même par boutures. On trouve rarement de gros pieds de sureau , si ce n'est derrière les maisons , près des étables & dans de vieilles masure. Employé avec d'autres arbres à former des haies , le sureau leur nuit beaucoup en dévorant les suc de la terre par sa végétation rapide & vigoureuse. Il vaut mieux le planter seul. Ses branches peuvent être employées à faire des échelles pour la vigne. Le bétail n'y touche point. J'ai vu , dit Miller , de ces arbres dans les parcs qui renfermoient beaucoup de bêtes fauves , & j'ai toujours remarqué qu'elles n'y touchoient jamais , tandis que les autres arbres en étoient entièrement rongés. Duhamel conseille de le planter dans les remises , les fruits attirant les oiseaux. On peut encore le planter dans les endroits dont on ne veut point interdire l'usage au bétail : l'odeur des feuilles leur déplaît , cet arbre sera à l'abri de la dent de ces animaux ; & en bordant ces endroits avec des buissons , on les rendra agréables , & on en fera des retraites pour le gibier.

« Les jeunes branches du sureau sont remplies d'une moelle abondante : les enfans s'en servent pour faire des farbacans. On ne trouve point de moelle dans les gros troncs , & alors le bois du sureau , qui est très-dur & liant , sert à faire différents ouvrages. Les tourneurs en font des boires , & les tabletiers des peignes communs , pour lesquels , après le bois , c'est le meilleur bois qu'on puisse employer.

« L'écorce du sureau , infusée dans du vin blanc , est purgative & puissamment diurétique. Le liber est d'une saveur un peu âcre , ainsi que les fruits ; il purge avec plus de force que les baies & les racines ; il fait évacuer par la même voie beaucoup de sérosités. On l'emploie avec succès contre l'hydropisie simple & l'œdème œdémateux des jambes : on le donne depuis une demi-once jusqu'à cinq onces ; en macération au bain-marie ,

dans cinq onces d'eau ou de vin. Les feuilles ont une odeur nauséabonde & légèrement vireuse ; les fleurs une odeur forte , aromatique. Infusées dans du petit-lait , elles sont efficaces contre les maladies de la peau , contre l'eczéma , le rhumatisme & les humeurs dartreuses ; elles rétablissent la transpiration dans les ecoumens , les engorgemens carareux. On prend que les émanations de ces fleurs portent fortement leur action sur les nerfs , & causent des étourdissemens & des vertiges quand on en respire l'odeur très-long-temps ; elles sont encore légèrement diaphorétiques , résolutives , anodines & emollientes. On se fait encore de ces fleurs pour donner au vin & à la bière un doux goût de miel ; enfin , on en fait un vinaigre aromatisé assez agréable pour l'usage de la table.

« Les baies sont sudorifiques , apéritives , diurétiques , purgatives. On en fait un rob , un extrait employé contre les obstructions , dans le cours de ventre , & dans les maladies qui proviennent d'une transpiration supprimée. Les grains de la baie , macérés dans l'eau chaude & exprimés , fournissent une huile qui est très-résolutive employée extérieurement ; ils sont aussi purgatifs. Dans le Nord , on prépare une espèce de vin assez agréable avec le suc des fruits , édulcoré par le sucre ou le miel. On en fait , avec le feigle , des pâtes estimées pour arrêter les diarrhées & les dysenteries. Enfin , ces baies teignent d'un brun-verdâtre le lin préparé avec le bain d'alun lorsqu'on le plonge dans leur décoction. »

2. SUREAU du Canada. *Sambucus canadensis*. Linn.

Sambucus cymis quinquepartitis , foliis subpinnatis , caule frutescente. Linn. Sp. Pl. vol. 1. pag. 385. — Mill. Dict. n.º 6. — Duroi, Hist. 1. pag. 414. — Willden. Arb. 356. — Wangerh. Amer. 115.

Sambucus (canadensis) , humilior , ramulis petiolisque globerrimis ; foliis oblongo-ovalibus , natis glabris ; nervo medio vix purescente , longissimè angustique acuminatis ; cymis laxis. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 1. pag. 181.

Il existe bien peu de différence entre cette espèce & le *sambucus nigra* ; la principale consiste en ce que celle-ci est un arbrisseau bien moins élevé , & que ce port est assez constant dans le pays natal de cette plante , au rapport de Michaux. Dans nos jardins , cet arbuste s'élève davantage. Ses tiges sont cylindriques , rameuses ; les rameaux glabres , ainsi que les pétioles ; les feuilles pétioles , ailées ; les folioles ovales oblongues , glabres à leurs deux faces , luisantes , à peine pubescentes sur leur principale nervure , dentées en scie à leurs bords , longuement & étroitement acuminées à leur sommet. Assez souvent les folioles des

feuilles inférieures sont, ou gémées, ou ternées, quelquefois presque deux fois ailées.

Les fleurs sont blanches, inodores, disposées à l'extrémité des rameaux en une cime ombellée, lâche, ordinairement à cinq rayons à ses premières divisions. Les fruits sont des baies d'abord de couleur purpurine plus ou moins foncée, enfin d'un noir-mat.

Cette plante croît au Canada. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h ? (V. v.)

3. SUREAU à grappes. *Sambucus racemosa*. Linn.

Sambucus racemosa compoſita, ovatis; caule arboresc. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 386. — Miller, Dict. n°. 3. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 147. — Pollich, Pal. n°. 314. — Duroi, Harbk. 2. pag. 417. — Scopol. Carn. n°. 375. — Willd. Arb. 357. — Roth. Germ. vol. I. pag. 137. — vol. II. pag. 367. — Jacq. Coll. vol. 1. pag. 36. & Icon. Rar. 1. tab. 59. — H. fil. Germ. 109. — Duham. Arb. edit. nov. vol. 2. pag. 249. tab. 56. — Gärtn. de Fruct. & S. m. vol. 1. pag. 137. — Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 374. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 370. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1496. n°. 5.

Sambucus arborea, floribus spicatis. Hallet, Helv. n°. 672.

Sambucus caule arboresc. ramoso; floribus racemosis. Roy. Lugd. Bat. 243. — Sauv. Monsp. 222.

Sambucus racemosa, rubra. C. Bauh. Pin. 456. — Tourn. Inst. R. Herb. 606. — Duham. Arb. vol. 2. tab. 66.

Sambucus racemosa, acinis rubris. J. Bauh. Hist. 1. pag. 549.

Sambucus cervina. Tabern. Icon. 1029.

Sambucus montana. Camer. Epit. 976. Icon.

Sambucus montana, racemosa. Lobel. Icon. 2. tab. 163.

Arbrisseau qui ressemble assez, par son port, au sureau commun, dont le tronc est droit, cylindrique, haut de huit à neuf pieds, divisé en rameaux étalés, ou un peu pendans, striés, glabres, d'un brun-rougeâtre, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ailées, avec une impaire; composées de cinq à sept folioles ovales-lancéolées; les supérieures quelquefois à trois folioles, un peu plus étroites que celles du sureau commun, médiocrement pétiolées, opposées, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, aiguës à leur sommet, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, nerveuses, réticulées; des bourgeons opposés, ovales, presque ronds dans l'aisselle des pétioles.

Les fleurs sont d'un jaune-pâle, petites, nom-

breuses, disposées en grappes épaisses, ovales, plus courtes que les feuilles, situées à l'extrémité des jeunes rameaux courts & axillaires. Le pédoncule commun est simple, foliaire, & se ramifie à son sommet presqu'en bifurcations courtes, glabres, & en pédicelles fins & très-courts. Les fruits sont de petites baies d'un rouge assez éclatant, sphériques, de la grosseur d'un grain de poivre, tendres, pulpeuses, marquées à leur sommet d'une tache noirâtre par l'impression des lobes du calice.

Cette plante croît dans plusieurs contrées de l'Europe méridionale, sur les montagnes, dans l'Alsace, la Pologne, sur le Jura, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

On préfère, dans les jardins d'ornement, cet arbrisseau au sureau commun: il y produit un très-bel effet par ses grappes de fleurs, & surtout par les fruits d'un beau rouge, qui se montrent dans le printemps. Son bois est très-dur. Les propriétés de cette plante sont les mêmes que celles du sureau commun.

4. SUREAU pubescent. *Sambucus pubescens*. Michaux.

Sambucus cyma subracemosa, cortice verruculoso; foliis terminalibus quinatis; foliis ovali-lanceolatis, subius pubescentibus. Persoon, Synops. Plant. vol. 1. pag. 328. n°. 4.

Sambucus cortice verruculoso; foliis etiam terminalibus, quinatis; foliis subius pubescentibus, ovali-lanceolatis; cyma confertiusculis racemosa. Michaux, Flot. boreal. Amer. vol. 1. pag. 181.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le *sambucus racemosa*, surtout par la disposition de ses fleurs & par la couleur rouge de ses fruits: Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques; ses rameaux assez nombreux, étalés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ailées, avec impaire; composées de folioles au nombre de cinq, jamais de trois, quelquefois de sept sur les rameaux stériles, étroites, ovales-lancéolées, glabres à leur face supérieure, légèrement tomenteuses ou pubescentes en dessous, dentées en scie à leur contour; souvent quelques autres petites folioles à la base des pétioles.

Les fleurs sont blanches, petites, situées à l'extrémité des rameaux, disposées en une cime presqu'en grappe, touffue, serrée; les ramifications nombreuses, rapprochées; les pédicelles très-courts. Les fruits sont de petites baies presque sphériques, pulpeuses, d'un rouge assez vif.

Cette espèce croît sur les hautes montagnes de la Pensilvanie, du Canada & de la Caroline, où elle a été découverte par Michaux. h (Descript. ex Mich.)

J. SUREAU

5. SUREAU du Japon. *Sambucus japonica*.

Sambucus fruticosus, *cymis tripartitis*, *stipulis nullis*. Thunb. Flor. jap. pag. 125. — Willd. n. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1496 n°. 4. — Duham. Arbr. edit. nov. vol. 2. pag. 249.

Arbrisseau dont les riges sont droites, cylindriques; les rameaux glabres, égaux, opposés, garnis de feuilles p-tiolées, opposées, ailées, composées de 5 fr. onze ou quinze folioles ovales, opposées, longuement pétiolées, glabres à leurs deux faces, longues d'un pouce & un peu plus, dentées en scie à leurs bords, aiguës & même acuminées à leur sommet, blanchâtres & un peu cartilagineuses à leur contour; le pétiole commun glabre & cylindrique; les pétioles partiels longs d'environ 5 lignes.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, disposées en une sorte de panicule en cime, divisée en trois bifurcations, depourvue de bractées, glabre, étalée. La corolle est blanche; les étamines, au nombre de cinq, plus courtes que la corolle; le style filiforme, plus court que les étamines; un stigmate en forme de rôt; un ovaire supérieur. Ce dernier caractère mériterait un nouvel examen, & pourroit faire douter si cette plante appartient réellement à ce genre.

Cet arbrisseau croît au Japon. (Description ex Thunb.)

6. SUREAU hièble. *Sambucus ebulus*. Linn.

Sambucus cymis tripartitis, *stipulis foliaceis*, *caule herbaceo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 385. — Mater. medic. 88. — Scop. Carn. n°. 371. — Duroi, Harbk. 2. pag. 415. — Pollich, Palat. n°. 312. — Blackw. rab. 488. — Hoffm. Germ. 109. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 137. — vol. II. pag. 365. — Willd. n. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1494. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 276. — Duham. edit. nov. vol. 1. pag. 249. — Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 373.

Sambucus humilis. Lam. Flot. franç. vol. 3. pag. 370.

Sambucus herbacea, *floribus umbellatis*. Haller, Helv. n°. 8. 671.

Sambucus caule herbaceo, *simplici*. Virid. Cliffort. 25. — Flor. succ. 256. — Hort. Cliff. 110. — Royen, Lugd. Bat. 245.

Sambucus caule herbaceo, *racemoso*; *foliis dentatis*. Mill. Dict. n°. 4, & Icones, tab. 226.

Sambucus humilis seu ebulus. C. Bauh. Pin. 456. — Tourn. Inf. R. Herb. 606.

Ebulus. Fusch. Hist. 65. Ic. — Carnet. Epitom. 979. Ic.

β. *Sambucus* (*humilis*), *caule herbaceo*, *ramoso*; Botanique. Tome VII.

foliis linearilanceolatis, *acutè dentatis*. Miller, Dict. n°. 5.

Sambucus humilis seu ebulus, *folio laciniato*. C. Bauh. Pin. 456. — Tourn. Inf. R. Herb. 606.

Ebulus laciniato. Pon. Bald. Ital. 234.

Vulgairement l'hièble, petit sureau.

L'hièble a beaucoup de rapport avec le sureau commun; mais ses riges sont basses, herbacées, annuelles, glabres, fortement cannelées, hautes de deux ou trois pieds, beaucoup plus courtes dans la variété β; vertes, médiocrement rameuses, pleines de moëlle; les feuilles opposées, p-tiolées, ailées, avec une impaire; les folioles pétiolées, au nombre de sept à neuf, longues, étroites, lanceolées, d'un vert foncé, glabres à leurs deux faces, finement dentées en scie à leurs bords, aiguës, & même acuminées à leur sommet; les pétioles munis à leur base de très-petites folioles ou stipules denticulées.

Les fleurs sont blanches, nombreuses, disposées en cime ou en une sorte d'ombelle ample, terminale, d'environ cinq rayons principaux, qui se divisent à leur sommet en d'autres plus nombreux & plus courts, munis de petites bractées presque filiformes. Les fruits sont de petites baies noires, glabres, pulpeuses. Dans la variété β, les riges sont très-basses, les folioles souvent laciniées, ou plus fortement & inégalement dentées.

Cette plante croît en Europe, sur le bord des chemins & dans les fossés humides, où elle est fort commune. (V. v.)

Ses racines, son écorce & ses feuilles ont une odeur forte & désagréable; elles sont purgatives & antihydriques. Ses fleurs & ses feuilles, employées à l'extérieur, sont résolutives.

Les fleurs, prises intérieurement, sont sudorifiques & on s'en sert aussi à l'extérieur contre les entorses & les foulures, après les avoir mises en fomentation avec du vin & des roses rouges. Les graines, macérées dans l'eau chaude & exprimées fortement, donnent une huile résolutive; elles passent pour diurétiques, purgatives, & quelquefois émetiques. En général, toutes les parties de cette plante ont les mêmes propriétés que le sureau commun, mais à un degré plus puissant. On assure que, dans les Pays-Bas, le suc de cette plante entre dans la composition d'une espèce de savon noir, fort en usage parmi les habitants de cette contrée. Les bestiaux ne touchent point à l'hièble.

SUREN. *Spreus*. Rumph. Herb. Amboin. vol. 3. pag. 66. tab. 39.

Grand arbre de l'île d'Amboine, mentionné par Rumphius, qui a le port d'un frêne, dont le tronc droit, élevé, est revêtu d'une écorce légèrement

V v v

très-entières, rétrécies à leur partie inférieure, obtuses à leur sommet, un peu mucronées, presque glabres; les feuilles des branches & les inférieures des rameaux très-caduques; les supérieures plus rapprochées, presque touffues, plus durables.

Les fleurs sont axillaires, latérales, situées vers l'extrémité des rameaux, portées, au nombre de quatre à cinq, presque en petite grappe, à l'extrémité d'un pédoncule commun, long d'environ un pouce; le calice à cinq folioles ovales, acuminées, de la longueur de la corolle; les pétales jaunes, en ovale renversé, obtus à leur sommet, rétrécis en onglet; cinq capules obtuses.

Cette plante croît sur les côtes maritimes de l'Amérique méridionale, à Porto-Ricco, où elle a été recueillie par M. Ledru, qui m'en a communiqué un exemplaire. \bar{h} (V. f.)

SYMPHONIA. *Symphonia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, de la famille des azélarachs, qui a des rapports avec les *winterania*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples, les fleurs terminales, presque en ombelle.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles arrondies; une corolle globuleuse, à cinq pétales; cinq étamines portées sur un tube cylindrique; un style, cinq stigmates; une baie à cinq loges monospermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, divisé en cinq folioles fort petites, ouvertes, arrondies.

2°. Une corolle fermée, composée de cinq pétales concaves, un peu arrondis, un peu coriaces, contournés, connivens, de forme globuleuse, un peu comprimée.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont réunis en un tube cylindrique, qui entoure & presse fortement l'ovaire, supportant cinq anthères ovales, pointues, alternes avec les stigmates.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style cylindrique, un peu plus long que la corolle, surmonté de cinq stigmates oblongs, aigus, ouverts en étoile.

Le fruit est une baie globuleuse, à cinq loges, contenant chacune une semence glabre, presque globuleuse, un peu plane à sa face intérieure.

ESPÈCE.

SYMPHONIA globuleuse. *Symphonia globulifera*. Linn. f.

Symphonia foliis simplicibus, confertis, floribus subambellatis, terminalibus. (N.)

Symphonia globulifera. Linn. f. Suppl. pag. 302. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 585.

C'est un arbre dont le tronc est épais, fort élevé, divisé en branches étalées, garnies de rameaux nombreux, chargés d'autres beaucoup plus courts, glabres, couverts par les impressions de l'attache des feuilles; celles-ci sont médiocrement petiolées, très-rapprochées, surtout à l'extrémité des rameaux, de l'épaisseur & de la consistance de celles des lauriers; oblongues, lancéolées, entières à leurs bords, glauques, glabres à leurs deux faces, un peu relevées en carène en dessous, traversées par des veines très-fines, longues d'environ trois pouces; les petioles courts, à demi-cylindriques.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une sorte d'ombelle sessile, simple, peu garnie de fleurs; les pédoncules partiels droits, simples, anguleux, uniflores. Le calice est court, composé de cinq folioles obtuses; la corolle rouge, de la grandeur de celle du thé, composée de cinq pétales connivens, fermés, appliqués latéralement les uns contre les autres, & offrant une forme globuleuse, un peu déprimée au sommet. Les filamens des étamines, réunis en une gaine tubulée, d'une seule pièce, s'élèvent hors de la fleur comme une sorte de calice supérieur, enveloppent l'ovaire, & supportent cinq anthères sessiles, qui alternent avec les cinq stigmates, ouverts en étoile. Le fruit est une baie globuleuse, revêtue d'une écorce coriace, contenant dans son intérieur une substance muqueuse très-aigre. Ces semences sont recherchées avec avidité par les perroquets.

Cet arbre croît à Surinam. \bar{h} (Descript. ex Linn. f.)

Observations. Quelques auteurs pensent que cette plante est la même que celle qui a été décrite par Aublet sous le nom de *moronea cocinea*; il y a en effet de très-grands traits de ressemblance entre ces deux plantes, mais la description de Linné fils & celle d'Aublet offrent des différences assez marquées; & comme ces plantes ne me sont pas connues, j'ai présenté ici ce qu'en dit Linné. On pourra consulter dans cet ouvrage l'article MANI. On verra ce qu'Aublet en a dit, & des observations plus récentes pourront confirmer ou détruire l'identité de ces deux plantes.

SYMPHORICARPOS. Le genre *lonicera* (ohrevescuille) de Linné exigeoit une réforme bien essentielle, puisqu'il renfermoit des plantes non-seulement séparées par leur caractère générique, mais encore, pour quelques espèces, séparées par la famille à laquelle elles appartiennent dans l'ordre naturel. M. de Jussieu a établi cette réforme

dans son *Genera Plantarum*; & en disant le genre *louicera* d'après le caractère des espèces, il a appelé la plupart des genres de Tournefort. Celui de *symphoricarpos*, dont il s'agit ici, vient de Dillen. Comme les espèces renfermées dans ces différents genres ont été mentionnées dans cet ouvrage, nous renvoyons le lecteur à l'article CHÈVRE-FILET, &c, pour la distinction de ces nouveaux genres, à l'excellent ouvrage de M. de Jussieu.

SYMPHYTOGYNES, terme employé par M. Venerat dans son *Tableau du règne végétal*, pour désigner les fleurs dont l'ovaire adhère en tout ou en partie au calice. *Symphytogyne* est formé de deux mots grecs, dont l'un signifie *unie*, &c l'autre *femme*, comme si l'on disoit ovaire uni au calice; ou adhérent au calice. Le même auteur se sert du mot *éleuthérogyne* pour les fleurs dont l'ovaire est libre, & n'adhère point au calice.

« Tantôt, dit ce savant, l'ovaire est enfoncé dans le calice, de manière qu'il fait corps avec lui en tout ou en partie, comme on peut le voir dans la fleur du pomnier & dans celle du tamarinier; tantôt il est élevé au dessus du calice, & n'adhère nullement à cet organe, comme on l'observe dans la fleur du cerisier. Dans le premier cas on dit que l'ovaire est inférieur ou semi-inférieur, & dans le second cas on dit qu'il est supérieur; mais ces expressions, qui désignent la position de l'ovaire par rapport au calice, présentent des difficultés dans deux circonstances: la première, lorsqu'une partie de l'ovaire est engagée dans le calice, tandis que l'autre est libre, comme dans le lierre, le *Samolus*, &c; la seconde, lorsque les ovaires, simplement recouverts par le calice, sont supérieurs, quoiqu'ils paroissent inférieurs, & qu'ils soient recouverts par plusieurs bractées, comme dans la rose, dans l'ajonc, &c. Il nous semble que la position de l'ovaire ne seroit point embarrassante à déterminer, si l'on substituoit aux expressions d'ovaire supérieur & d'ovaire inférieur, celle d'ovaire libre & d'ovaire adhérent, ou *éleuthérogyne* & *symphytogyne*. » (Voyez le mot SUPÉRIEUR.)

SYMPLOQUE. *Symplocos*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, de la famille des plagieminières, qui a quelques rapports avec les *halisia*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, pétioles à les fleurs souvent axillaires, latérales, plus ou moins agglomérées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq ou huit pétales connexes, en tube à leur base; des étamines nombreuses, sur plusieurs rangs; un ovaire supérieur; un style; un stigmate capité, à plusieurs lobes; un drupe sec, à cinq loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, à cinq découpures courtes, droites, arrondies.

2°. Une corolle composée de cinq à huit pétales connexes, en tube à leur base, droits, oblongs, obtus, ouverts à leur partie supérieure.

3°. Des étamines nombreuses, disposées sur plusieurs rangs, à filz souvent au nombre de quatre, dont les filets sont très-courts, planes, subulés, attachés sur le tube de la corolle, supportant des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, presque ovale, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, plus court que la corolle, terminé par un stigmate capité, à plusieurs lobes (de trois à cinq).

Le fruit est un drupe sec, ovale, obtus, à cinq lobes, à une seule valve, s'ouvrant en cinq parties à son sommet, contenant des semences oblongues.

Observations. Il faut rapporter à ce genre plusieurs autres plantes déjà décrites dans cet ouvrage sous d'autres noms, & de la connaissance imparfaite de leur fructification avoit fait ranger dans des genres particuliers: tels sont le *hopsa tinctoria*, le *stemonia theaformis*, le *ciponima guianensis*. (Voyez les articles ALSTONE, CIPON, HOPSE.)

ESPÈCES.

1. **SYMPLOQUE** de la Martinique. *Symplocos martinicensis*. LAM.

Symplocos pedunculis subracemosa; foliis glaberrimis, crenatis. LHERIT. Act. Soc. Linn. Lond. t. pag. 173. — Willd. Spec. Plant. vol. 5. pag. 1435. n°. 1. — Lam. Illustr. Genr. tab. 455. fig. 1.

Symplocos martinicensis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 747. — Jacq. Amer. pag. 166. — Swartz, Observ. pag. 293. tab. 7. fig. 1.

Arbrisseau très-élevé, dont les branches sont chargées de rameaux alternes, diffus, glabres, cylindriques, striés, de couleur cendrée, garnis de feuilles pétioles, alternes, ovales, longues de trois à quatre pouces, sur deux ou trois de large; coriaces, presque luisantes, glabres à leurs deux faces, médiocrement crénelées ou presque entières à leurs bords, acuminées, presque obtuses à leur sommet; les pétioles courts, longs de trois à quatre lignes, glabres, canaliculés.

Les fleurs sont disposées en petites grappes latérales, peu garnies, situées dans l'aisselle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux; munies à leurs

divisions de petites bractées ovales, à peine pubescentes. Le calice est fort court, à cinq découpures un peu concaves, ovales, légèrement pubescentes; la corolle blanchâtre, longue de quatre à cinq lignes; les pétales droits, obtus, réunis en tube à leur base. Le fruit est un drupe ovale, obtus, à cinq loges.

Cette plante croît aux Antilles. M. Leduc l'a également reçue illic dans les forêts à Porto Rico, & a bien voulu nous en communiquer un exemplaire. *h (V. f.)*

Observations. M. Lhéritier a mentionné dans les *Mémoires de la Société linnéenne de Londres*, vol. 1, pag. 176, sous le nom de *symlocos urechta*, une plante originaire du Pérou, qui diffère peu de celle que je viens de décrire, qui paroît n'en être qu'une variété, & qui tient presque le milieu entre cette espèce & le *symlocos cydonia* (le *cydonia guianensis* d'Aubl.). Ses pédoncules sont chargés d'environ cinq fleurs; ses feuilles sont presque glabres, dentées en scie à leurs bords.

Je dois prévenir que la gravure que j'ai citée des *Illustrations des Genres*, diffère des exemplaires secs que je possède de cette plante, en ce que ses feuilles sont très-aiguës, plus crénelées; les pédoncules uniflores, tandis que la plante communiquée par M. Leduc a ses feuilles plus ovales, acuminées & obtuses à les crénelures à peine sensibles; les fleurs en petites grappes.

1. SYMPOQUE à huit pétales. *Symlocos octopetala*. Swartz.

Symlocos pedunculis subbifloris; corollis octopetalis; foliis glaberrimis, apice repando-dentatis. Willd. spec. Plant. vol. 3, pag. 1436. n° 4.

Symlocos floribus octopetalis. Swartz, Prodr. pag. 109, & Flor. Ind. occid. vol. 2, pag. 1287.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le *symlocos martinicensis*; elle en diffère par ses feuilles beaucoup plus larges, & par ses fleurs, constamment composées de huit pétales.

C'est un arbre dont le tronc s'élève à la hauteur de vingt ou trente pieds, chargé à sa partie supérieure de branches rectilignes, divisées en rameaux lisses, épars, cylindriques, fragiles, garnis de feuilles pétiolées, alternes, un peu rudes, ovales, glabres à leurs deux faces, d'un vert gai en dessus, nerveuses, veinées, dentées en scie à leurs bords; les dentelures obtuses, terminées à leur sommet par une petite pointe; les pétioles courts, cylindriques, glabres, creusés en gouttière en dessus, un peu réfléchis.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles; les pédoncules courts, soyeux, glabres, plus épais que les pétioles, à une & quelquefois à deux fleurs. Le ca-

lice est supérieur, à cinq découpures ovales, renversées, ciliées à leurs bords, persistant; à la base du calice, trois ou quatre folioles un peu arrondies, concaves, velues & ciliées à leurs bords, serrées contre le calice; la corolle de la grandeur de celle du citronnier, blanche, odorante, presque monopétale par l'adhérence des pétales à leur base; le tube très-court; le limbe divisé en huit découpures égales, oblongues, ouvertes, réfléchies, enriétés, disposées sur deux rangs, les inférieures alternes; un grand nombre d'étamines sur quatre rangs, insérées vers le milieu de la corolle; les filaments réunis en tube à leur base, tubuleux à leur sommet; les anthères petites, arrondies, à quatre loges; l'ovaire inférieur, oblong, velu vers son sommet; le style épais, persistant, de la longueur des filaments; le stigmate vert, capité, à cinq lobes. Le fruit est un drupe sec, oblong, de la grosseur d'une noisette, à cinq loges, couronné par le calice persistant; plusieurs semences oblongues.

Cet arbre croît sur les hautes montagnes, dans les contrées méridionales de la Jamaïque. *h (Descript. ex Swartz.)*

SYNGÉNÉSIE. C'est le nom que porte la dix-neuvième classe du *Système sexuel de Linné*; il est composé de deux mots grecs, qui signifient *ensemble, génération*; il désigne toutes les plantes dont les flus sont composées, munies de cinq étamines, réunies en forme de cylindre par les anthères; elles se divisent en autant d'ordres qu'il y a de différentes espèces de *polygamie* (voyez le mot *POLYGAME*) dans les fleurs composées.

Premier ordre. *Polygamie égale*, dont tous les fleurons ou les demi-fleurons sont hermaphrodites, comme dans le chardon, le salifis, la laitue, &c.

Deuxième ordre. *Polygamie superflue*, dont les fleurons sont hermaphrodites dans le centre, & les fleurons ou demi-fleurons femelles & fertiles à la circonférence, comme dans les asters, la tanaïse, &c.

Troisième ordre. *Polygamie frustrante*, dont les fleurons sont hermaphrodites dans le centre, & les fleurons ou demi-fleurons neutres ou femelles, stériles à la circonférence, comme dans la centauree, dans l'hélianthe, &c.

Quatrième ordre. *Polygamie nécessaire*, dont les fleurons du centre sont simplement mâles ou hermaphrodites, stériles; les fleurons ou demi-fleurons de la circonférence, femelles, fertiles, comme dans le filago, le fouci, &c.

Cinquième ordre. *Polygamie séparée*, dont les fleurons ou demi-fleurons forment comme plusieurs petits groupes, environnés d'écaillés ou de

paillottes qui les distinguent, comme dans le *sphaeranthus*, &c.

Sixième ordre. *Monogamie*. Ce sont les fleurs qui, sans être composées de fleurons, c'est-à-dire qui, étant simples, ont leurs étamines réunies en cylindre par leurs anthères, comme dans la violette, dans la balsamine, &c. Cet ordre est principalement distingué des précédens par les fleurs, qui sont simples & non composées, & dans lesquelles il n'y a qu'un seul mariage, d'où est venu le nom de *monogamie*.

SYNGÉNÉSIQUES ou SYNGÉNÈSES (Fleurs). C'est un assemblage de plusieurs petites fleurs ou fleurettes réunies sur un réceptacle com-

mun, & entourés d'un calice commun; chaque fleur munie de cinq étamines, dont les anthères sont réunies en un cylindrique au travers duquel passe le style, & dont le fruit consiste toujours en une semence dépourvue de péricarpe; elles diffèrent des fleurs agrégées, en ce que, dans ces dernières, les étamines de chaque fleur ne sont point réunies par leurs anthères, & qu'outre un calice commun, chaque fleur a encore un calice propre, & que le fruit est rarement une semence nue.

SYNONYMIE. (*Voyez* CONCORDANCE.)

SYSTÈMES DE BOTANIQUE. (*Voyez* MÉTHODE.)



TABERNE. *Tabernamontana*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des apocinées, qui a des rapports avec les pervenches (*vinca*) & les *cerbera*; il comprend des arbrisseaux ou arbrutes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, rarement alternes; les fleurs axillaires, solitaires ou agglomérées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; une corolle monopétale, alongée, à cinq lobes; cinq étamines; un stigmate capité; deux follicules ventruës, horizontales; des semences enveloppées d'une pulpe.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, à cinq découpures plus ou moins profondes, conniventes, caduques.

2°. Une corolle monopétale, contournée, alongée, infundibuliforme, le limbe à cinq lobes ouverts, planes, obliques, obtus.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont fort petits, insérés vers le milieu du tube, terminés par des anthères conniventes, acuminées.

4°. Deux ovaires simples, environnés à leur base de cinq glandes bifides, surmontés d'un style subulé, terminés par un stigmate oblong, en tête.

Le fruit consiste en deux follicules ventruës, écartées horizontalement, un peu réfléchies, acuminées, à une loge, à une seule valve.

Les semences sont ovales-oblongues, nombreuses, obtuses, ridées, presque imbriquées, enfoncées dans une pulpe.

Observations. Les *tabernamontana* offrent dans leurs espèces une sous-division qui doit former un genre particulier, & que Michaux a reconnu d'après Waltorius, Clayton, avant eux, l'avoit déjà signalé en donnant le nom d'*amsonia* à la plante que Linné a rangée ensuite parmi les *tabernamontana*, & qui est devenu le type de ce nouveau genre. Le caractère essentiel qui constitue ce nouveau genre consiste dans :

Une corolle infundibuliforme; l'orifice du tube fermé; le limbe à cinq lobes; cinq étamines; un stigmate en tête, entouré d'un anneau membraneux; deux follicules droites, les semences cylindriques, tronquées obliquement, point enveloppées par une substance pulpeuse.

Ce qui doit achever de déterminer les botanistes en faveur de ce nouveau genre, c'est que, outre le caractère générique assez bien marqué, ces deux genres ont un port très-différent. Les *tabernamontana* sont des plantes ligneuses, des arbrisseaux même assez élevés, à feuilles opposées; les *amsonia* sont des plantes herbacées, la plupart vivaces à la vérité, mais peu élevées, & dont les feuilles sont alternes. Je me bornerai ici à indiquer ces deux genres par une sous-division.

J'ai décrit sous le nom de *razwojska striata* (vol. VI, pag. 83, n°. 5) l'*ochrosia* de Juss., Gen. Plant. 144. Je n'avois d'abord remarqué qu'un seul fruit : depuis j'ai reconnu qu'il en avoit deux bien certainement. Ce caractère le rapproche singulièrement des *tabernamontana*, & ne permet point de le conserver parmi les *razwojska*.

ESPÈCES.

* *Tabernamontana*. Feuilles opposées; tiges ligneuses.

1. TABERNE à feuilles de citronnet. *Tabernamontana citrifolia*. Linn.

Tabernamontana foliis oppositis, ovatis; floribus lateralibus, glomerato-umbellatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 308. — Miller, Dict. n°. 1. — Jacq. Amer. 38. tab. 175. fig. 13. — Lam. Illustr. Gener. tab. 170. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 1244. n°. 1.

Tabernamontana foliis lanceolatis. Hort. Cliff. 76. — Royle, Lugd. Bat. 413.

Tabernamontana citrifolia undulatis. Plum. Gen. nov. Amer. pag. 18. tab. 30, & Ic. 143. fig. 2.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de douze ou quinze pieds, sur un tronc droit, épais, garni de branches droites, médiocrement étalées, revêtues d'une écorce lisse, grise, divisée en rameaux glabres, cylindriques, qui débilent, ainsi que les feuilles, un suc laiteux, blanchâtre, très-abondant. Les feuilles sont opposées, pétioles, fermes, épaisses, ovales-lancéolées, très-entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, longues de quatre à six pouces, sur deux de large, rétrécies à leur partie inférieure; les pétioles longs d'un pouce.

Les fleurs sont d'un beau jaune, d'une odeur agréable, disposées en petits paquets presque ombellés, situés latéralement dans l'aisselle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux. Le calice est court, à cinq dents sigués; le tube de la corolle cylindrique, renflé vers son sommet & à sa base,

long au plus d'un demi-pouce; le limbe entièrement divisé en cinq découpages linéaires, étroites, allongées, très-ouvertes, un peu obtuses. Le fruit consiste en deux follicules rectilignes, réunies à leur base, écartées horizontalement, renfermant des semences oblongues; placées les unes sur les autres, & enveloppées d'une chair molle & pulpeuse.

Cette plante croît naturellement dans les îles de l'Amérique, à la Jamaïque. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

2. TABERNE à grandes fleurs. *Tabernamontana grandiflora*. Linn.

Tabernamontana foliis oppositis, caule dichotomo; calicibus inequalibus, laxissimis. Linn. Mantiss. pag. 51. — Jacq. Stirp. Amer. pag. 40. tab. 31. — Lam. Illustr. Gener. tab. 170. fig. 2.

Cette espèce est distinguée par ses fleurs, plus grandes que dans les autres espèces, & par l'irrégularité des divisions de son calice.

Ses tiges sont fortes, divisées en rameaux glabres, dichotomes, cylindriques, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales-lanceolées, glabres à leurs deux faces, épaisses, entières à leurs bords, très-pointues à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, longues d'environ deux ou trois pouces, sur un & demi de large; les nervures latérales, fines, tamisées; les pétioles très-courts, fermes, un peu canaliculés.

Les fleurs sont situées dans la bifurcation des rameaux supérieurs, portées sur un pedoncule court, droit, presque cylindrique, muni de deux ou trois fleurs pédicellées. Le calice est ample, lâche, composé de cinq folioles très-inégaux, blanchâtres, scarieuses; les deux extérieures larges, ovales, en cœur, aiguës; les trois intérieures plus étroites; la corolle grande, munie d'un tube droit, cylindrique, allongé, terminé par un limbe plane, divisé en cinq lobes tors, amples, presque ronds, obtus; les follicules ovales, très-écartées entr'elles, terminées par une pointe allongée, un peu courbée en bec.

Cette plante croît en Amérique, dans les environs de Carthagène. (P.)

3. TABERNE à fleurs panachées. *Tabernamontana difcolor*. Swartz.

Tabernamontana foliis oppositis, ovato-lanceolatis; pedunculis axillaribus, bifloris. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 335. — Idem, Prodr. 52. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1545. n°. 7.

Cette plante a des tiges ligneuses, hautes de cinq à six pieds, revêtues d'une écorce glabre, cendrée; divisées en rameaux presque dichotomes, étalés, cylindriques; les dernières ramifi-

cations glabres & tétragones. Les feuilles sont opposées, pétioles, ovales-lanceolées, entières, glabres à leurs deux faces, médiocrement nerveuses, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, soutenues par des pétioles courts, glabres, anguleux.

Les fleurs sont terminales, axillaires; les pedoncules filiformes, longs d'un demi-pouce, terminés par deux fleurs; les pédicelles simples, uniflores, plus longs que les pedoncules. Le calice se divise en cinq découpages droits, aiguës. La corolle est blanche, un peu jaunâtre; son tube long d'un demi-pouce, ventru à sa base & dans son milieu; le limbe divisé en cinq lobes tortueux, un peu arrondis, ondulés; les filaments insérés vers le milieu du tube; les anthères ovales, non saillantes; le stigmate capité; deux follicules, renfermant des semences environnées d'une pulpe.

Cette plante croît à la Jamaïque, parmi les buissons. (P. Descript. ex Swartz.)

4. TABERNE à feuilles de laurier. *Tabernamontana laurifolia*. Linn.

Tabernamontana foliis oppositis, ovalibus, obtusifolius. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 308. — Miller, Dict. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1244. n°. 2.

Tabernamontana foliis oppositis, ovatis; pedunculis paucifloris, flaminibus inclusis. Jacq. Amer. pag. 39.

Tabernamontana frutescens, foliis suavis, ovatis, venosis. Brown. Jam. 182.

Tabernamontana laurifolia, flore albo, fructu rotundiore. Amm. Herb. 212.

Nerium arboreum, folio latiore, obtuso; flore luteo, minore. Sloan, Jam. 154. Illustr. 2. pag. 62. tab. 186. fig. 2.

Cet arbrisseau a des rapports avec la première espèce: il en diffère par les feuilles obtuses, moins lanceolées; par ses fleurs bien moins nombreuses. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de dix à douze pieds & plus; elles se divisent en branches & en rameaux glabres, redressés, cylindriques, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales, d'un vert luisant, épaisses, glabres à leurs deux faces, entières, obtuses à leur sommet, veinées & réticulées, longues d'environ quatre pouces, sur deux pouces de large; soutenues par des pétioles courts.

Les fleurs sont petites, de couleur blanche ou jaunâtre, odorantes, disposées vers l'extrémité des rameaux en petites grappes latérales, presque ombellées, peu garnies; les étamines renfermées dans la corolle; celle-ci est courte, divisée à son limbe en cinq lobes étroits, obtus. Le fruit est constitué par deux follicules écartées entr'elles, courtes,

courtes, ovales, une peu arrondies, contenant des semences imbriquées.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans quelques autres contrées méridionales de l'Amérique. *h*

5. TABERNE ondulée. *Tabernamontana undulata*.

Tabernamontana foliis lanceolato-ellipticis, acuminatis, undulatis; ramis dichotomis, floribus subcymosis, folliculis levibus. Vahl, *Egl. Amer. Faic.* 2. pag. 10.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, d'un vert-pâle, légèrement cylindriques, presque tétragones vers l'insertion des pétioles; les feuilles sont grandes, opposées, pétiolées, longues d'environ cinq à six pouces, elliptiques, lancéolées, ondulées à leurs bords, rétrécies à leur base, longuement acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, d'un vert gai en dessus, pâles, un peu jaunâtres en dessous; les nervures distantes & jaunâtres; les pétioles très-courts; une petite bordure en forme de stipule caduque qui entoure les rameaux.

Les fleurs sont disposées en petites grappes solitaires, terminales, axillaires, composées de trois à quatre fleurs médiocrement pédonculées. Le calice est divisé en cinq découpures courtes, épaisses, égales, arrondies; la corolle tubulée; le tube cylindrique, long d'un pouce, renflé vers son milieu, un peu charnu; le limbe a cinq découpures linéaires, obtuses, un peu tortes; l'orifice glabre, les anthères presque sessiles, linéaires, très-étroites; deux ovaires ovales, environnés d'une glande charnue, entière; un style de la longueur des étamines; un stigmate capité, mucroné, entouré à sa base d'une membrane très-mince. Le fruit consiste en deux follicules longs d'un pouce & demi, réfléchies, un peu arquées, lisses, sillonnées sur le dos, obtuses à leur base, un peu aiguës à leur sommet; les semences brunes, striées, imbriquées sur quatre rangs.

Cette plante croît en Amérique & dans l'île de la Trinité. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

6. TABERNE à feuilles d'amandier. *Tabernamontana amygdalisfolia*. Jacq.

Tabernamontana foliis oppositis, ovali-lanceolatis; flaminibus tubum corollae superantibus. Willd. *Spec. Plant.* vol. 1. pag. 1245. n° 6.

Tabernamontana flaminibus tubum corollae superantibus. Jacq. *Strip.* Amer. p. 39. tab. 181. fig. 15.

Cet arbrisseau, comme la plupart de ceux qui composent ce genre, distille un suc lacteux. Ses tiges sont droites, hautes de six pieds, rameuses, garnies de feuilles opposées, planes, ovales-lan-

Botaniqu. Tome VII.

céolées, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, luisantes.

Les fleurs sont latérales, blanches, très-odorantes, réunies en petit nombre sur un pédoncule commun. Le tube de la corolle renflé tant à sa base qu'à son sommet, supportant les étamines vers la partie supérieure; les anthères saillantes hors du tube. Le fruit consiste en deux follicules presque ovales ou oblongues, verdâtres, luisantes, presque acuminées, approchant beaucoup de ceux du *tabernamontana citrifolia*, mais deux & trois fois plus petites; les semences enveloppées par une pulpe jaunâtre.

Cette espèce se rencontre dans les forêts, aux environs de Carthagène, dans l'Amérique méridionale. *h* (*Descript. ex Jacq.*)

7. TABERNE à feuilles variables. *Tabernamontana heterophylla*. Vahl.

Tabernamontana foliis elliptico-lanceolatis subcordatisque, subundulatis, acuminatis, utrinque glabris; ramis dichotomis, floribus racemosis. Vahl, *Eglog. Amer. Faic.* 2. pag. 22.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, lisses, dichotomes, garnis de feuilles opposées, elliptiques, lancéolées, glabres à leurs deux faces, aiguës & longuement acuminées à leur sommet, un peu recourbées, ondulées & légèrement crénelées à leurs bords, vertes en dessus, plus pâles en dessous. Les feuilles situées à la base de la bifurcation des rameaux sont lancéolées, médiocrement pétiolées, longues de trois à quatre pouces; les autres sont sessiles, beaucoup plus courtes, presque en cœur.

Les pédoncules, situés dans la bifurcation & au sommet des rameaux, sont solitaires, glabres, filiformes, & supportent cinq à sept fleurs; les pédicelles alternes rapprochés, fort courts, munis à leur base de bractées geminées fort petites. Le calice est glabre, court; les découpures linéaires-lancéolées; la corolle longue d'un demi-pouce; le tube étroit, linéaire, un peu élargi à sa base; l'orifice garni de quelques poils foveux; les découpures du limbe lancéolées, trois fois plus courtes que le tube.

Cette espèce croît à Cayenne. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

8. TABERNE pandacqui. *Tabernamontana pandacqui*.

Tabernamontana foliis oppositis, ovato-lanceolatis, glabris, integris, acuminatis; corymbis axillaribus, subumbellatis. (N.)

Pandacqui. Sonnerat, *Voyag. en Guin.* pag. 49. tab. 19.

X x x

Non chiosocca. Linn. f. Suppl.

C'est un arbrisseau peu élevé, dont les rameaux sont glabres, cylindriques, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales-lancéolées, minces, membranacées, très-entières à leurs bords, glabres, très-lisses à leurs deux faces, vertes, acuminées à leur sommet, longues d'environ trois pouces, traversées en dessous par des nervures simples, distantes, latérales, arquées, jaunâtres; les pétioles très-courts.

Les fleurs sont blanches, réunies en petits corymbes presque ombellés dans l'aisselle des feuilles. Le calice est court, campanulé, glabre, verdâtre, à cinq dents obtuses; la corolle tubulée, longue de quatre à cinq lignes; son tube cylindrique; le limbe divisé en cinq découpures courtes, linéaires, un peu obtuses; cinq étamines renfermées dans le tube; un style de la longueur du tube, bifurqué à sa base, simple dans le reste de sa longueur; un stigmate capité.

Cet arbrisseau croît dans la Nouvelle-Guinée. *Th* (*V. f. in herb. Lam.*)

9. TABERNE à feuilles de tenouée. *Tabernamontana percuriaefolia*. Jacq.

Tabernamontana foliis oppositis, lanceolatis, acuminatis; floribus racemosis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1246. n° 8.

Tabernamontana foliis oppositis, elongatis lanceolatis, utrinque acuminatis; pedunculis ramosis, subdichotomis. Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 320. & Collect. vol. 4. pag. 159.

La description que je présente ici est faite d'après une plante de l'herbier de M. Lamarck, qui m'a paru tellement convenir à la plante de Jacquin, que je n'ai pas cru devoir en changer le nom spécifique, quoique peut-être elle puisse être un peu douteuse.

C'est un arbrisseau dont les rameaux sont grêles, élancés, glabres, lisses, alternes, garnis de feuilles nombreuses, opposées, pétiolées, étroites, lancéolées, acuminées, entières, coriaces, épaisses, longues au moins de quatre pouces sur un pouce de large, glabres à leurs deux faces, presque luisantes en dessus, plus pâles en dessous, rétrécies, aiguës à leur base; la côte principale saillante en dessous, arrondie, jaunâtre; les nervures fines, parallèles; les pétioles longs d'un pouce, presque cylindriques.

Les fleurs, d'après Jacquin, sont disposées en grappes rameuses; les ramifications presque dichotomes. Je ne les ai pas vues, mais j'ai remarqué quelques fruits isolés, axillaires, pédonculés, consistant en deux follicules ovales, tendres, de couleur cendrée, un peu aiguës à leurs deux extrémités, longues d'un pouce, contenant des semences imbriquées, enfoncées dans une pulpe.

Cette plante croît à l'île Maurice. *Th* (*V. f. in herb. Lam.*)

10. TABERNE à feuilles de laurier-rose. *Tabernamontana neriifolia*.

Tabernamontana foliis lanceolatis, oppositis; floribus subracemosis, axillaribus. Vahl, Egl. Amer. Fasc. 2. pag. 21.

Cette plante, qui a des rapports avec la *tabernamontana percuriaefolia*, a des rameaux glabres, cylindriques, dichotomes, hérissés d'aspérités par l'impression de l'attache des feuilles. Celles-ci sont pétiolées, opposées, longues de deux ou trois pouces, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, lisses & très-glabres à leurs deux faces, point de veines apparentes, entières, à peine ondulées à leurs bords, vertes en dessus, plus pâles en dessous; quelques nervures latérales, fines, distantes; les pétioles longs d'environ un demi-pouce.

Les fleurs sont réunies au nombre de trois ou quatre en petites grappes axillaires, solitaires, une fois plus longues que les pétioles; les pédoncules partiels courts, alternes, munis d'une bractée caduque, linéaire, fort petite. Le calice est glabre, à cinq découpures oblongues, aiguës; la corolle longue d'environ un demi-pouce, divisée à son limbe en cinq découpures glabres, presque cuneiformes, un peu pubescentes intérieurement vers leur base; cinq étamines saillantes hors du tube de la corolle.

Cette plante croît à Porto-Ricco. *Th* (*Descript. ex Vahl.*)

11. TABERNE de l'île Maurice. *Tabernamontana mauritiana*.

Tabernamontana foliis oppositis, membranaceis, petiolatis, ovatis, obtusis; racemis axillaribus; ramis articulatis, fragilibus. (N.)

Cette plante est remarquable par ses rameaux ligneux, cylindriques, glabres, striés, de couleur cendrée-grisâtre, articulés à l'insertion des feuilles, très-fragiles aux articulations, chargés de tubercules ovales, blanchâtres, fort petits; garnis de feuilles opposées, pétiolées, minces, membranacées, ovales, entières & un peu ondulées à leurs bords, obtuses à leur sommet, arrondies à leurs deux extrémités, longues de trois à quatre pouces sur deux pouces & demi de large, glabres, vertes, un peu luisantes en dessus, plus pâles en dessous, à peine pubescentes, très-douces au toucher, traversées par des nervures fines, parallèles, & par une grosse nervure saillante, longitudinale, un peu jaunâtre; les pétioles épais, longs de six à huit lignes.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des

rameaux, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes latérales, un peu pendantes, très-courtes, peu rameuses, glabres, peu garnies de fleurs. Le calice est fort petit, à cinq découpures presque obtuses; la corolle d'un blanc-jaunâtre, infundibuliforme; son tube long de trois à quatre lignes, rétréci dans son milieu, renflé à ses deux extrémités; le limbe court, à cinq petits lobes obtus. Je n'ai pas vu les fruits.

Cette plante a été recueillie à l'île Maurice par Commerson, & aux Indes orientales par Sonnerat. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

12. TABERNE fananho. *Tabernamontana fananho*. Ruiz & Pav.

Tabernamontana foliis oblongis, acuminatis; corymbis biquadrifidis; fructibus obovato-subrotundis, acuminatis. Ruiz & Pav. Flot. p. tuv. vol. 2. p. 22. tabl. 144.

Cette espèce s'élève à la hauteur de douze à quinze pieds & plus; son tronc se divise en branches nombreuses, munies de rameaux glabres, opposés, cylindriques, d'un blanc-cen tré, vertes & un peu comprimées dans leur jeunesse, garnies de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, oblongues ou ovales-oblongues, très-entières, longues de six à huit pouces, un peu ondulées & sinuées à leurs bords, acuminées à leur sommet, luisantes, glabres à leurs deux faces, médiocrement veinées, soutenues par des pétioles cylindriques, épaillis à leur base.

Les fleurs sont latérales & terminales, au nombre de quinze à vingt; les pédoncules communs courts, cylindriques, à quatre ou cinq divisions principales; chaque fleur pédicellée, munie d'une petite bractée arrondie, échancrée en cœur. Le calice est court, presque campaniforme, glabre, à cinq petites dents presque obtuses; la corolle assez grande, d'un blanc-jaunâtre; le tube très-long, à frites presque anguleuses; les follicules ovales, un peu arrondies, d'un blanc-pâle en d-hors, de la grosseur d'un abricot, acuminées à leur sommet, à une seule loge, renfermant plusieurs semences brunes, striées, entourées d'une substance pulpeuse.

Cet arbrisseau croît dans les grandes forêts, au Pérou; il fleurit dans les mois d'août & de septembre. *h*

13. TABERNE à fruits hérissés. *Tabernamontana echinata*. Aubl.

Tabernamontana foliis oppositis, ovato-oblongis, acuminatis; floribus glomerato-umbellatis, fructibus echinatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 124, n°. 3.

Tabernamontana (echinata), foliis oppositis,

ovato-oblongis, acuminatis; fructu echinato. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 263. tab. 103.

Sous arbrisseau dont les racines produisent plusieurs tiges droites, hautes de quatre à cinq pieds; les rameaux opposés; les feuilles à peine pétiolées, opposées, très-dilatées, ovales, lisses, entières, un peu ondulées à leurs bords, vertes en dessus, couvertes en dessous d'un léger duvet blanchâtre, longuement acuminées à leur sommet, longues de quatre à six pouces, larges de deux & plus.

Les fleurs répandent une odeur douce & agréable; elles sont terminales, axillaires, presque sessiles, ramassées au nombre de dix à douze en petits bouquets, munies chacune d'une petite bractée écailleuse. Leur calice est blanchâtre, court, à cinq petites dents aiguës; la corolle insérée sur un disque jaunâtre, dont le bord est rouge; le tube velu en dedans, jaunâtre, pointillé de rouge; le limbe divisé en cinq grands lobes jaunâtres, ondulés, aigus; les anthères filiformes. Le fruit est composé de deux follicules jaunâtres, ovoïdes, chargées de tubercules mous, aigus; les semences brunes, imbriquées, un peu comprimées.

Cette plante croît à l'île de Cayenne; elle fleurit au mois d'août; toutes ses parties distillent un suc lacteux. *h*

14. TABERNE à fleurs fasciculées. *Tabernamontana fasciculata*.

Tabernamontana foliis oppositis, ovato-acuminatis, nervosis, subumbellato-fasciculatis; ramis oppositis, articulatis. (N.)

On distingue cette espèce à ses rameaux opposés, articulés & très-cassants à l'insertion des feuilles, cylindriques, striés, glabres, presque noirs, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, un peu lancéolées, acuminées & un peu obtuses à leur sommet, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, vertes & luisantes en dessus, roussâtres en dessous, longues d'environ deux ou trois pouces, larges d'un pouce & plus, marquées de nervures fines, latérales, brunes, parallèles, confluentes vers le bord des feuilles.

Les fleurs situées latéralement vers l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles; elles sont nombreuses, fasciculées, & forment une sorte de corymbe court, un peu ombellé, incliné; les ramifications presque dichotomes, articulées, munies de petites bractées très-courtes, caduques; le calice divisé en cinq dents courtes, obtuses; la corolle petite; le tube droit, long de deux ou trois lignes; le limbe partagé en cinq découpures torsées, étroites, linéaires, obtuses. Les fruits ne me sont pas connus: s'ils étoient hérissés de tubercules, cette plante différerait peu du *tabernamontana echinata* d'Aubl.

X x x 2

Cet arbrisseau croît à Cayenne. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

15. TABERNE arqué. *Tabernamontana arcuata*. Ruiz & Pav.

Tabernamontana foliis obovatis, oblongis, acuminatis; corymbis ternis, multifloris; folliculis revolutis-arcuatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 22. tab. 143.

C'est un arbre haut de trente à quarante pieds, qui distille abondamment un suc laiteux. Son tronc est revêtu d'une écorce pâle, cendrée; il supporte une cime très-ample & rouffue, dont les branches se divisent en rameaux dichotomes, légèrement comprimés, pâles, verdâtres dans leur jeunesse, garnis de feuilles fort grandes, opposées, pétiolées, ovales-oblongues, quelques-unes oblongues-lancéolées, très-entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de huit à neuf pouces; les pétioles courts, un peu contournés.

Les fleurs sont disposées en corymbes souvent trifides, latéraux, situés dans l'aisselle des feuilles, garnis de bractées fort petites, ovales, aiguës. Le calice est campanulé, court, à cinq dents aiguës; la corolle d'un blanc-pâle; le tube renflé, presque globuleux à sa base, rétréci à sa partie supérieure; le limbe plane, à cinq lobes amples, élargis, ovales, presque ronds. Le fruit consiste en deux follicules épais, longues de trois pouces, oblongues, réniformes, acuminées, rougeâtres; elles renferment des semences rouges, ovales-oblongues, ridées, striées, enfoncées dans une pulpe d'un rouge de sang.

Cet arbre est commun dans les grandes forêts du Pérou, aux environs de Puyto. Il fleurit dans les mois de novembre & de décembre. *h*

De toutes les parties de cet arbre il découle par incision un suc laiteux, très-abondant, qui se durcit à l'air en une sorte de gomme-résine de couleur brune.

16. TABERNE à fleurs en cime. *Tabernamontana cymosa*. Linn.

Tabernamontana foliis oppositis, ovato-lanceolatis; floribus cymosis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 1245. n°. 5.

Tabernamontana foliis oppositis, floribus cymosis. Linn. Mant. pag. 53. — Jacq. Scrp. Amer. p. 59. tab. 181. fig. 14.

Arbuste d'un aspect élégant, dont les tiges droites s'élèvent depuis fix jusqu'à quinze pieds. Les feuilles sont opposées, ovales-lancéolées, longues d'un demi-pied, entières à leurs bords, légèrement ondulées, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont terminales, inodores, réunies

au nombre de quarante & plus en une cime ample, épaisse, étalée, d'un blanc-sale ou rouffâtre. Leur calice est divisé en cinq folioles planes, lancéolées, oblongues; le tube de la corolle est ventru, presqu'à cinq angles à sa base; les étamines renfermées dans la partie inférieure du tube; le stigmate muni d'un rebord à sa base; les follicules oblongues, grandes, recourbées, très-obuses, rougeâtres avec quelques taches de rouille; la pulpe qui enveloppe les semences, d'un jaune-orange.

Cette plante croît en Amérique, dans les forêts aux environs de Carthagène; elle fleurit dans les mois d'août & de juillet. *h*

17. TABERNE odorant. *Tabernamontana odorata*. Vahl.

Tabernamontana foliis lanceolato-ellipticis, acuminatis, glabris; umbellis axillaribus, subsylvestribus, subquadris. Vahl, Eglog. Amer. Falci. 2. pag. 22.

Cameraria tamaquarina Aubl. Guian. pag. 260. tab. 102.

Cameraria lutea. Lam. Dict. vol. 1. pag. 573. n°. 2.

M. Vahl, d'après des observations qui lui ont été communiquées par *Rhorius* sur cette plante que ce dernier auteur rangeoit parmi les *tabernamontana*, presume qu'elle doit appartenir à ce genre par ses fruits, qui n'ont point été observés par Aublet. Cette espèce a déjà été mentionnée dans cet ouvrage sous le nom de *camérier* à fleurs jaunes.

** *Amfonia*, feuilles alternes, tiges herbacées.

18. TABERNE à larges feuilles. *Tabernamontana amfonia*. Linn.

Tabernamontana foliis alternis, ovato-lanceolatis; caulibus herbaceis, glaberrimis. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 300. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1246. n°. 11.

Tabernamontana foliis alternis, caulibus subherbaceis. Miller, Dict. n°. 4.

Amfonia (latifolia), caule glabriusculo; foliis ovali-lanceolatis, superioribus promissè acuminatis, subius parèe puberulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 121. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. p. 269.

Amfonia (tabernamontana). foliis ovatis, utrinque acuminatis; floribus caruleis. Walter. Flor. carol. pag. 98.

— *Anonymus suffrutex*. Gronov. Virg. 26.

Apocynum virginianum, asclepiadiis folio, floribus pallidis caruleis, radice crassa. Pluken. Phytogr. tab. 115. fig. 3.

Cette espèce a dans son port quelque ressemblance avec les *cameraria*. Ses racines sont épaisses, un peu charnues; elles produisent deux ou trois tiges droites, herbacées, hautes, d'environ un pied, glabres, divisées en rameaux alternes, un peu anguleux, à peine pubescents, garnis de feuilles alternes, pétiolées ou presque sessiles, ovales-lancéolées, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, glabres à leur face supérieure, un peu pubescentes en dessous, parfaitement glabres & obscures dans les individus cultivés, rétrécies à leur partie inférieure en un pétiole très-court.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux en grappes courtes, ramifiées. Le calice est divisé en cinq découpures profondes, égales; la corolle infundibuliforme, d'un bleu pâle ou blanchâtre, point odorante; le tube est allongé, cylindrique, fermé à son orifice; le limbe partagé en cinq lobes; les étamines insérées sur le tube de la corolle, point saillantes; un style; un stigmate en tête, entouré à ses bords d'un anneau membraneux. Les fruits consistent en deux follicules droites, cylindriques, allongés, acuminés, réfléchies, à une seule loge, renfermant des semences nues, arrondies, rudes, point enveloppées dans une pulpe, tronquées obliquement à leur sommet.

Cette plante croît dans les lieux humides & ombragés des forêts, à la Caroline & dans la Virginie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

19. TABERNE à feuilles étroites. *Tabernamontana angustifolia*. Ait.

Tabernamontana foliis linearibus, sparsis; caule piloso, herbaceo. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 300. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1246. n° 12.

Amfonia (ciliata), foliis sublinearibus, ciliatis, confertis; floribus fuis, punctulatis. Walter. Flor. carol. pag. 98.

Amfonia (angustifolia), caule conspicue pubescente; foliis angustis-linearibus, crebris, erectis, pubescentibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 121. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 169.

Il y a de grands rapports entre cette espèce & le *tabernamontana amfonia*; c'est la même disposition dans les fleurs, presque le même port; elle en diffère par ses feuilles bien plus étroites. Les tiges sont herbacées, cylindriques, rameuses, évidemment pubescentes; les rameaux alternes, garnis de feuilles alternes ou éparfes, très-nombreuses, rapprochées, droites, presque linéaires, fort étroites, pubescentes particulièrement à leur face inférieure, entières & légèrement ciliées à leurs bords. Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en petites panicules ou en grappes

courtes, ramifiées; toutes les parties de la fructification diffèrent très-peu de celles de l'espèce précédente.

Cette plante se rencontre dans les sols arides & sablonneux, dans la Caroline, la Virginie & la Nouvelle-Géorgie. x

20. TABERNE à feuilles alternes. *Tabernamontana alternifolia*. Linn.

Tabernamontana foliis alternis, caule arborescente. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 308. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1246. n° 10.

Curatopala. Rheed. Malab. vol. 1. pag. 83. tab. 43. — Rai, Hist. 1754.

Ses tiges sont droites, ligneuses, hautes de six à douze pieds, revêtues d'une écorce brune, divisées en rameaux alternes, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, amples, ovales-oblongues, épaisses, très-entières, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, vertes & luisantes en dessus, blanchâtres en dessous, à nervures fortes, simples, parallèles.

Les fleurs sont disposées en une sorte de panicule courte, rameuse, étalée; la corolle blanche; le tube cylindrique; le limbe à cinq grands lobes ovales, obtus. Le fruit consiste en deux longues follicules erroires, cylindriques, pendans, d'abord d'un vert-obscure, mais d'un jaune-doré à l'époque de la maturité. Les semences sont oblongues, presque cylindriques, environnées d'un fuc laireux.

Cet arbuste croît au Malabar dans les sols sablonneux. Sa racine & son écorce, infusées dans l'eau chaude, passent pour favorables dans les dysenteries. h

20. TABERNE à feuilles elliptiques. *Tabernamontana elliptica*. Thunb.

Tabernamontana herbacea, foliis subternis, lanceolatis. Thunb. Flor. japon. pag. 111. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1246. n° 9.

Quoique très-rapprochée du *tabernamontana amfonia*, cette espèce en diffère par ses feuilles plus erroires, à peine réticulées, réunies au nombre de trois ou quatre, presque en verrucilles; par ses tiges point anguleuses; elles sont herbacées, cylindriques, glabres, simples, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles médiocrement pétiolées, éparfes, plutôt verticillées qu'opposées, réunies par trois ou quatre, elliptiques ou lancéolées, entières, acuminées, lisses, glabres, un peu plus pâles en dessous; les pétioles courts; les fleurs disposées en grappes terminales; les pédicules alternes, capillaires, unifoires, longs d'environ une ligne; le calice beaucoup plus court que la corolle, à cinq découpures futaécées; la

corolle de couleur bleuâtre, à peine longue d'un demi-pouce.

Cette plante croît au Japon. *κ* (*Descript. ex Thunb.*)

TABOURET. *Thlaspi*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyépérales, régulières, de la famille des crucifères, qui a des rapports avec les *iberis* & les *lepidium* (paillerage), qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont simples, plus rarement pinnatifides; les fleurs ordinairement blanches, en épi ou en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Quatre pétales réguliers, égaux; une silicule comprimée, échancrée au sommet, à deux valves naviculaires, la plupart à rebords tranchans sur leur dos.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles ovales, concaves, médiocrement ouvertes, droites, caduques.

2°. Une corolle à quatre pétales en croix, réguliers, égaux, en ovale renversé, une fois plus longs que le calice, rétrécis en onglets.

3°. Six étamines, dont les filamens sont de moitié plus courts que la corolle, deux opposés encore plus courts, terminés par des anthères acuminées.

4°. Un ovaire un peu arrondi, comprimé, échancré, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une petite silicule comprimée, échancrée à son sommet, orbiculaire, ovale ou triangulaire, quelquefois à deux cornes, à deux loges séparées par une cloison, à deux valves creusées en carène, munies très-souvent d'une atète tranchante sur le dos, à une ou plusieurs semences.

Observations. Une corolle régulière, dont les pétales sont tous égaux, distingue ce genre des *iberis*, & les capsules échancrées à leur sommet, de celui des *lepidium*. Ce dernier caractère, si essentiel pour ne pas confondre deux genres si voisins, devoit nécessairement faire rentrer parmi les *thlaspi* un grand nombre de *lepidium*. Quoi qu'il en soit, il faut convenir que la distinction de ces deux genres est très-peu naturelle, puisqu'elle n'est appuyée que sur un attribut qui n'a rien d'essentiel pour la fructification, qui dépend généralement d'un autre assez remarquable, & qui ne manque que dans un très-petit nombre d'espèces; c'est un appendice membraneux, pres-

qu'aillé, placé sur le dos tranchant des valves, qui ordinairement est très-étroit à sa partie inférieure, s'élargit vers son sommet, domine souvent le sommet des valves, & y forme deux lobes, d'où résulte entr'eux un vide ou une sorte d'échancrure, caractère bien faible lorsqu'il s'agit de l'employer pour distinguer un genre d'un autre. Dans les espèces où cet appendice n'existe pas, comme dans le *thlaspi bursa pastoris*, les valves sont assez souvent entourées sur leur carène d'un léger rebord, & l'échancrure est peu prononcée.

Les espèces renfermées dans ce genre ont été distribuées dans trois genres particulières, établis par M. Ventenat, qui en a fondé les principaux caractères, en partie sur le nombre des semences dans chaque loge, en partie sur la forme de la silicule. D'après ce savant botaiste, les espèces qui ont des semences solitaires sont des *nasurtium*; celles dont les loges renferment plusieurs semences, & dont les silicules sont ovales ou arrondies, des *thlaspi*; enfin les espèces qui ont des silicules triangulaires sans rebords membraneux, & plusieurs semences dans chaque loge, des *caessia*. Cette distinction est appuyée sur des caractères plus naturels; mais il est essentiel de remarquer qu'il n'est pas rare de trouver des silicules, dont les loges renferment des semences, tantôt solitaires, tantôt au nombre de deux, & souvent sur le même individu; l'avortement de quelques semences devient alors très-embarrassant lorsque l'on n'a pas à sa disposition un certain nombre d'individus. J'ai eu occasion de vérifier bien souvent cette observation, particulièrement sur les espèces dont les semences sont plus grandes que dans d'autres.

ESPÈCES.

1. TABOURET bourse à berger. *Thlaspi bursa pastoris*. Linn.

Thlaspi filiculis orbiculatis; foliis radicalibus, pinnatifidis. Linn. Spec. Plar. vol. 1. pag. 903. — Flor. lapp. 252. — Flor. suec. 532. 576. — Hort. Cliffort. 330. — Mater. medic. 159. — Roy. Lugd. Bat. 334. — Dalib. Paris. 196. n°. 2. — Scopul. Carn. n°. 808. — Pollich, Pal. n°. 612. — Blackw. tab. 5. — Ludw. Ed. tab. 186. — Ælet. Flor. dan. tab. 729. — Hoffm. Germ. 128. — Gzert. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 280. tab. 141. fig. 3. — Berger. Phyt. 3. pag. 53. Icon. — Curris, Lond. Icon. — Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 197. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 68. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 447. n°. 13. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 709. — Lam. Illustr. Gen. vol. 2. tab. 557. fig. 2.

Nasurtium bursa pastoris. Roth. Germ. vol. I. pag. 281. — vol. II. pag. 256.

Iberis burfo pofforis. Crantz. Austr. pag. 10.

Burfo. Guett. Stamp. vol. 2. pag. 158.

Capsella. Venten. Tabl. vol. 3. pag. 110.

Nasturtium filiquis triangularibus. Haller, Helv. n^o. 514.

Burfo pofforis major, folio finuato. C. Bauh. Pin. 108. — Tourn. Infl. R. Herb. 116. tab. 103. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 3. tab. 20. fig. 2.

Burfo pofforis. J. Bauh. Hist. 2. pag. 936. Icon. — Math. Comm. 429. Icon. — Trag. 215. Icon. — Lobel. Icon. 221. — Dodon. Pempt. 103. Icon. — Getard. Hist. 276. Icon. — Park. Theatr. 866. — Camer. Epitom. 840. Icon. — Fusch. Hist. 611. — Dalech. Hist. 2. 1099. Icon.

Burfo pofforis major. Tabern. Icon. 198.

β. *Burfo pofforis media*. C. Bauh. Pin. 106. — Tourn. Infl. R. Herb. 116.

Burfo pofforis minor. Tabern. Icon. 199.

γ. *Burfo pofforis major, folio non finuato*. C. Bauh. Pin. 108.

δ. *Burfo pofforis eleganti folio, infist coronapi, repentis*. Tournef. Infl. R. Herb. 116. — Camer. Hort. 32.

C'est l'espèce la plus commune, la plus répandue de ce genre, qu'on trouve partout, qui croit presque en toute saison, même pendant l'hiver ; qui offre dans ses feuilles & dans sa grandeur plusieurs variétés remarquables, mais toujours constantes & bien distinctes par la forme des filiques.

Ses tiges sont droites, presque glabres, rameuses ; les feuilles radicales étalées en rosette, longues, étroites, rétrécies en pétiole à leur base, pubescentes ou un peu velues, très-variables, tantôt presque pinnatifides, à lobes aigus ou un peu obtus, entiers ou légèrement denticulés ; tantôt sinuées, ou crénelées, ou presque entières ; les feuilles caulinaires alternes, sessiles, oblongues, plus petites, amplexicaules, entières ou denticulées, légèrement auriculées à leur base, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont blanches, terminales & fort petites, d'abord disposées en corymbe, mais dont les rameaux s'allongent en grappes simples à mesure que la fructification se développe. Les filiques sont glabres, comprimées, triangulaires, presque tronquées & échancrées à leur sommet, dépourvues de membrane ailée, mais ayant les valves un peu relevées en rebord sur leur dos. Le style persistant est très-court. Les semences sont petites, plusieurs dans chaque loge.

Elle croit en Europe, dans les lieux cultivés & dans les décombres. On la rencontre également dans la Barbarie. ○ (V. v.)

Cette plante passe pour astringente & vulnéraire ; son suc a été recommandé contre les hémorragies & contre le pissement de sang des bestiaux, qui la broutent dans les pâturages.

1. TABOURET perfolié. *Thlaspi perfoliatum*.

Thlaspi filiculis obcordatis ; foliis culinis, cordatis, glabris, subdentatis ; petalis longitudine calicis ; caule ramoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 902. — Jacq. Vindeb. 559. & Flor. austr. tab. 157. — Crantz. Austr. pag. 22. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 180. — vol. II. pag. 95. — Pollich, Palat. n^o. 611. — Hoffm. Germ. 218. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 446. n^o. 11. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 710.

Nasturtium foliis imis ovatis ; reliquis amplexicaulis, cordatis. Hall. Helv. n^o. 516.

Thlaspi foliis radicalibus ovatis ; caulibus amplexicaulis, lanceolatis. Guett. Stamp. pag. 142. — Dalib. Parif. 196.

Thlaspi alpestre. Hudf. Angl. 182.

Thlaspi montanum, var. β. Lam. Flor. fr. vol. 2. pag. 464.

Thlaspi orvense, perfoliatum, majus. C. Bauh. Pin. 106. — Barrel. Icon. 815. — Motif. Oxon. Hist. 2. §. 3. tab. 17. fig. 15.

Burfo pofforis, foliis perfoliatis. J. Bauh. Hist. 2. pag. 938. Icon.

Thlaspi alterum, minus, burfo pofforis fructu. Col. Ecphr. pag. 178. tab. 276. fig. 1.

Thlaspi oleraceum. Tabern. Icon. 462. & Hist. 851.

Pilosello filiqua. Camer. Hort. tab. 7. fig. C.

Ses racines sont blanchâtres, grêles & fibreuses ; elles produisent une ou plusieurs tiges glabres, hautes de six à huit pouces, striées, quelquefois presque simples, surtout dans leur jeunesse, mais plus ordinairement rameuses, même dès leur base ; les rameaux alternes, étalés ; les feuilles parfaitement glabres, d'un vert-tendre ou un peu glauque ; les radicales pétiolées, étalées, ovales, obtuses, légèrement crénelées à leur contour ; les feuilles caulinaires distantes, sessiles, ovales, amplexicaules, échancrées en cœur à leur base, un peu aiguës, un peu dentées en scie, quelquefois entières, principalement les feuilles supérieures.

Les fleurs sont blanches, terminales, disposées en grappes droites, simples ; les pédoncules filiformes, très-glabres, beaucoup plus longs que les filiques, ouverts horizontalement. Le calice est glabre, petit, un peu coloré ; la corolle petite, un peu plus grande que le calice ; les étamines un peu plus longues que les pétales ; les anthères jaunâtres. La filique est ovale, en cœur, aiguë à sa

baïe, échançrée à son sommet, glabre, comprimée; l'aile membraneuse qui entoure les valves, très-étroite à sa base, s'élargit vers le sommet, surmonte la silicule en s'arrondissant en deux lobes. Le style persillant est une petite pointe à peine sensible.

Cette plante croît en France, dans les campagnes, dans les prés un peu fécés. Elle est fort commune, surtout dans les contrées méridionales & sur les montagnes alpines. (V. v.)

3. TABOURET de montagnes. *Thlaspi montanum*. Linn.

Thlaspi filiculis obcordatis, foliis glabris; radicalibus subcarnosis, obovatis, integerrimis; caulinis oblongis, amplexicaulibus, sagittatis; corollis calice majoribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 445. n.º 9.

Thlaspi filiculis obcordatis, foliis glabris; radicalibus subcarnosis, obovatis, integerrimis; caulinis amplexicaulibus, corollis calice majoribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 902. — Crantz. Austr. pag. 23. n.º 7. — Pollich, Palat. n.º 620. — Hoffm. Germ. 227. — Jacq. Flor. austr. tab. 237. — Rorh. Germ. vol. I. pag. 280. — vol. II. pag. 94. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 711.

Thlaspi montanum, glastifolium minus. C. Bauh. 106.

Thlaspi montanum secundum. Clus. Hist. 2. pag. 121. fig. 2. & Stirp. Pann. pag. 467. Icon. Mediocrit.

Thlaspi pastoris montana, globularifolia. Tourn. Inst. R. Herb. 21.

Thlaspi foliis globularis. J. Bauh. Hist. 2. pag. 926. Icon. Mediocrit.

β. *Thlaspi (præcox), filiculis obcordatis, foliis carnosis, glabris, glaucis, subcrenatis, in petiolum decurrentibus; caulinis sessilibus, semiamplexicaulibus, obtusè cordato-sagittatis; petalis calice majoribus*. Wulf. in Jacq. Collect. 2. pag. 124. tab. 9.

Thlaspi montanum. Scop. Carn. n.º 811.

Thlaspi filiculis adpressis cordatis, foliis imis spatulatis; summis amplexicaulibus, sagittatis. Sauvag. Monsp. 121. — Gouan, Monsp. 317.

Lepidium caule erecto; foliis radicalibus, ovatis; caulinis amplexicaulibus, sagittatis. Haller, Hist. n.º 518.

Thlaspi montanum, bursa pastoris fructu. Col. Ecphr. 1. pag. 275. tab. 276.

Cette espèce offre beaucoup de rapport avec le *thlaspi glastifolium*; elle en diffère en ce qu'elle est bien moins glabre, que ses feuilles sont bien plus rapprochées, bien moins aiguës, & que ses silicules renferment plusieurs semences.

Ses tiges sont droites, presque simples, cylindriques, striées, glabres ou un peu pubescentes, ramifiées en panicule à leur sommet. Les feuilles sont glabres, un peu charnues, très-douces & presque pubescentes lorsqu'on les touche; les inférieures ovales, un peu oblongues, pétioles, très-entières, rétrécies à leur base & décurrentes sur leur pétiole; les feuilles caulinaires nombreuses, très-rapprochées, sessiles, amplexicaules, lancéolées, obtuses, denticulées à leurs bords, un peu ciliées lorsqu'on les examine à la loupe; les dentelures très-courtes, distantes; deux petites ocellules à la base.

Les fleurs sont terminales, disposées en grappes dont l'ensemble forme une panicule éralée; les rameaux pubescents; les pédoncules plus longs que les fleurs, très-ouverts, velus; les calices sont petits, caducs; la corolle blanche, deux fois plus longue que le calice; les étamines de la longueur du calice; les anthères jaunes; la silicule glabre, en cœur renversé, entouré d'un rebord, médiocrement échançrée à son sommet; un style persillant, aussi long que la silicule. La plante a ses feuilles plus profondément sagittées, glabres, parfaitement glabres.

Cette espèce croît sur les montagnes, dans les pâturages secs, dans les départements méridionaux de la France, en Suisse, en Italie, en Autriche. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

4. TABOURET à feuilles variables. *Thlaspi heterophyllum*. Decand.

Thlaspi foliis radicalibus subtratis; caulinis oblongis, acuminatis, basi subserratis; caulibus ascendens. (N.)

Par son port & sa floraison, cette plante, dit M. Decandolle, ne peut être rapprochée que du *thlaspi alpestre*, mais elle en diffère beaucoup par la forme de ses feuilles. Une racine cylindrique, pivotante, donne naissance à cinq ou six tiges simples, hautes de huit à dix pouces, glabres ou à peine chargées de quelques poils, un peu étalées à la base, puis ascendantes. Les feuilles sont toutes glabres. Les radicales sont pétioles, obtuses; les unes ovales & entières, les autres sinuées, la plupart découpées en lyre, avec le lobe terminal grand & arrondi. Les feuilles de la tige sont droites, appliquées contre elle, assez petites, nombreuses, oblongues, pointues, un peu dentelées dans le bas, prolongées à leur base en deux ocellules courtes, descendantes, fines & pointues. Les fleurs ne paroissent différer de celles du tabouret des Alpes que parce qu'elles font un peu plus petites. La silicule est ovale, légèrement échançrée.

Cette plante a été trouvée dans les Pyrénées voisines

voisines de l'Espagne, par M. Clément. γ (*De-
cand. ex herb. Clarion.*)

5. TABOURET des Alpes. *Thlaspi alpestre*. Linn.

*Thlaspi filiculis obcordatis, foliis subdentatis, cau-
linis amplexicaulis, petalis longioribus calicis,
caule simpliciter.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 903.
— Miller, Dict. n°. 4. — Hoffm. Germ. 228. —
Roth. Germ. vol. I. pag. 280. — vol. II. pag. 96.
— Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 711. — Willd.
Spec. Plant. vol. 3. pag. 447. n°. 12.

*Thlaspi filiculis obcordatis, foliis dentatis; radi-
calibus lanceolatis, petiolatis; caulinis sagittatis,
floribus exsertis.* Gouan, Monsp. 470. & Ill. 40.

Thlaspi montanum. Hudf. Angl. 282.

Thlaspi praeox. Schleich, Cent. 3. n°. 68.

Thlaspi minimum. Arduin, 2. pag. 33. tab. 15.
fig. 2.

*Lepidium caule erecto, foliis radicalibus, petio-
latis; caulinis ovatis, amplexicaulis.* Haller, Helv.
n°. 519.

Thlaspi perfoliatum, minus. C. Bauh. Pin. tæc.
— Tourn. Init. K. Herb. 212.

Thlaspi pumilum, tertium. Clus. Hist. 2. pag. 31.
Icon. & Pann. pag. 469. Icon. Mediceis.

La détermination de cette espèce n'est pas sans
difficulté : elle se rapproche beaucoup du *thlaspi
montanum* & du *thlaspi perfoliatum* ; elle diffère de
toutes deux par ses tiges simples, par ses fleurs
fort petites, par ses feuilles plus étroites, forte-
ment appliquées contre les tiges. La synonymie
n'offre pas moins de difficultés. Les figures qu'en
a données Clusius sont très-médiocres. Dans les
jardins cette plante se ramifie ; elle est à peine
reconnoissable. Je vais la décrire telle que je l'ai
observée dans la nature, sur les rochers du Dau-
phiné, aux environs de Grenoble.

Ses racines font grêles, simples, un peu jaunâ-
tres ; elles produisent une tige simple, grêle, cy-
lindrique, haute de huit à dix pouces, glabre,
striée, que je n'ai jamais vue ramifiée ; les feuilles
radicales nombreuses, étalées sur la terre, péti-
olées, petites, ovales, entières, glabres à leurs
deux faces, assez semblables à celles de la paque-
rette, un peu plauques ; les feuilles caulinaires ses-
siles, lanceolées, étroites, longues de six à huit
lignes, amplexicaules, à peine auriculées à leur
base, fortement appliquées contre les tiges, dis-
tantes les unes des autres d'une fois plus longues que les
feuilles.

Les fleurs forment une grappe simple, droite,
terminale, très-glabre ; les pédoncules très-lisses,
plus longs que les filiques ; la corolle blanche,
petite, à peine plus longue que le calice ; les
étamines un peu faillantes ; les anthères purpu-
rines ; les filiques très-glabres, ovales-oblongues,
obtusées, entourées d'un rebord faillant, échancré
& plus élargi au dessus de la filique qu'il domine ;
un style persistant, presque une fois plus court que
la filique ; plusieurs semences oblongues, rous-
sâtres dans chaque loge.

Cette plante croît sur les rochers, dans les prai-
ries découvertes des montagnes, sur les Alpes,
dans la Suisse, les Pyrénées, & dans les départe-
ments méridionaux de la France. \odot (*V. v.*) On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris.

6. TABOURET de Suisse. *Thlaspi alpinum*. Jacq.

*Thlaspi filiculis obcordatis; foliis caulinis cordatis,
glabris, integerrimis; petalis calice duplo longioribus,
caule simpliciter.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 446.
n°. 10.

*Thlaspi (alpinum), filiculis obcordatis, foliis gla-
bris, radicalibus subcarnosis, obovatis, integerrimis;
caulinis sessilibus, corollis calice majoribus.* Murr.
Syst. veget. 387. — Jacq. Flor. austr. vol. 3. tab.
238.

Si cette plante n'est pas une variété du *thlaspi
montanum*, elle tient du moins le milieu entre cette
espèce & le *thlaspi perfoliatum* ; elle diffère du pre-
mier par ses tiges simples, du second par ses feuil-
les point dentées ; elle a aussi beaucoup d'affinité
avec le *thlaspi alpestre*, mais la corolle est une fois
plus grande.

Les tiges, très-rarement ramifiées, sont garnies
de feuilles glabres ; les inférieures ou radicales ont
un peu charnues, pétiolées, ovales, très-entières,
rétrécies à leur base ; celles des tiges alternes,
sessiles, ovales-oblongues, échancrées en cœur à
leur base, glabres à leurs deux faces, entières.
Les fleurs forment une grappe droite, terminale.
La corolle est une fois plus grande que le calice ;
les filiques en forme de cœur renversé.

Cette plante se rencontre en Suisse sur les mon-
tagnes alpines, & dans l'Autriche. γ

7. TABOURET des champs. *Thlaspi campestre*.
Linn.

*Thlaspi filiculis subrotundis; foliis sagittatis, den-
tatis, incanis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 902.
— Hort. Cliff. 330. — Flor. suæc. 531. 575. —
Royer, Lugd. Bat. 333. — Dalib. Paris. 196. —
Cantz. Austr. pag. 23. — Scopol. Carn. edit. 2.
n°. 87. — Scholl. Barb. 523. — Gmel. 126. 197.
— Pollich. Palat. 609. — Matruich. Sil. n°. 478.
— Gouan, Illustr. pag. 40. — Deerr. Nuff. p. 532.
— Hoffm. Germ. 227. — Roth. Germ. vol. I.
pag. 280. — vol. II. pag. 94. — Willd. Spec.
Plant. vol. 3. pag. 444. n°. 8. — Poirer, Voyages
en Barbarie. vol. 2. p. 197. — Curtis, Lond. Icon.

Y y

Botanique. Tome VII.

— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 68. — Bergeter, Phytogr. 3. pag. 37. Icon.

Thlaspi hirsutum, var. *α*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 465.

Nasturtium foliis imis petiolatis, ovatis, reliquis amplexicaulis, cordatis. Haller, Helv. n°. 309.

Thlaspi arvense, vaccaria folio incano, majus. C. Bauh. Pin. 106.

Thlaspi latifolium. Fusch. Hist. 366. Icon. Bona.

Thlaspi secundum, tabernamont. Icon. 458. — Dalech. Hist. pag. 662. Icon.

Thlaspi. Trag. 87. Icon.

Thlaspi vulgatum, serrato folio. Matth. Comm. pag. 427. Icon.

Thlaspi vulgatum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 921. Icon. Superior. — Tournef. Inst. R. Herb. 212. — Roucel. Flor. du Nord. vol. 1. pag. 69.

β. *Thlaspi arvense, vaccaria incano folio, minus*. C. Bauh. Pin. 106. & Prolom. 47. — Tournef. Inst. R. Herb. 212. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 3. tab. 17. fig. 14.

Thlaspi vulgatum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 921. Icon. Inferior.

γ. *Thlaspi arvense, acetosa folio*. C. Bauh. Pin. 105. — Blackw. tab. 407.

Thlaspi primum. Matth. Comm. pag. 366. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 662. Icon.

Thlaspi alterum. Dodon. Pempt. pag. 712. Icon.

Thlaspi vulgatissimum, vaccaria folio. Lobel. Icon. 213. & Observ. 108. Icon.

Ses racines sont dures, grêles, blanchâtres, presque simples; elles produisent plusieurs tiges étalées, droites, quelquefois un peu couchées, presque simples, un peu rameuses à leur sommet, hautes de huit à dix pouces, pubescentes; les feuilles radicales pétiolées, oblongues, presque lancéolées ou spatulées, obtuses, dentées, sinuées à leur contour, quelquefois un peu pinnatifides vers leur base; les feuilles caulinaires sessiles, lancéolées, amplexicaules, en fer de flèche à leur base, nombreux, éparés, d'un aspect blanchâtre, & même un peu pubescentes; denticulées à leur partie inférieure, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont blanches, petites, disposées en grappes droites, terminales; les pédoncules grêles, velus, très-ouverts; les calices glabres, quelquefois un peu rougeâtres à leur sommet; les filiques glabres, comprimés, parsemés sur leur surface de petits tubercules, environnés d'un rebord large & obtus, médiocrement échanuré au sommet, formant d'un style très-court.

La variété *β* est moins grande dans toutes ses parties; elle a un aspect plus blanchâtre; ses feuilles sont plus petites, à peine denticulées; ses tiges ordinairement simples. La variété *γ* a ses feuilles parfaitement glabres, presque glauques, entières, rarement denticulées, très-aiguës, en fer de flèche.

Cette plante croît en Europe, dans les champs, le long des chemins, parmi les moissons; je l'ai aussi recueillie en Barbarie. J'ai trouvée la variété *α* aux environs de Fougères en Bretagne. (*V. v.*)

Cette espèce passe pour incisive, résolutive, apéritive, antiscorbutique. On se sert souvent des semences pour exciter la salivation; on l'applique en topique dans les douleurs de rhumatisme & les tumeurs humorales.

8. TABOURET à feuilles de pastel. *Thlaspi glastifolium*.

Thlaspi foliis glabris; radicalibus ellipticis, petiolatis; caulinis hastato-lanceolatis, amplexicaulis, basi dentatis; filiculis oblongis (submarginatis, medio ventricosis).

Lepidium glastifolium. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 66. tab. 147.

Cette plante a beaucoup d'affinité avec le *thlaspi campestre*, mais elle est plus grande & parfaitement glabre; ses semences solitaires. Je l'avois d'abord confondue avec une des variétés de cette espèce dans mon Voyage en Barbarie. M. Desfontaines, meilleur observateur, l'a regardée comme une espèce distincte dont il a fait un *lepidium*; mais les individus que je possède & que j'ai recueillis en Barbarie, offrent une légère échancre au sommet de leurs filiques lorsqu'elles sont entièrement mûres; ce qui m'a déterminé à faire rentrer cette plante dans les *thlaspi*, vu d'ailleurs les rapports qu'elle a avec le *thlaspi campestre*. Ses tiges sont droites, cylindriques, fortes, hautes d'un à deux pieds, glabres, simples, ramifiées en panicule à leur sommet; les rameaux pubescents; les feuilles glabres, très-lisses; les radicales pétiolées, allongées, presque elliptiques, entières ou légèrement denticulées vers leur pétiole, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, longues de quatre ou six pouces & plus; les caulinaires alternes, éparées, sessiles, presque en fer de pique à leur base, amplexicaules, aiguës à leur sommet, denticulées à leur partie inférieure; les supérieures plus petites, très-entières.

Les fleurs sont ramassées en grappes nombreuses, étalées, paniculées, terminales; les pédoncules pubescents, plus longs que les fleurs; le calice divisé en quatre folioles elliptiques, colorées, obtus; la corolle semblable à celle du *thlaspi arvense*; les pétales une fois plus longs que le calice. Les filiques sont glabres, en ovale renversé,

sees grandes, un peu comprimées, un peu renflées, longues de trois lignes, surmontées d'un style court, persistant; environnées d'une aile plane, élargie, arrondie, au dessus de la filique; bifide au sommet à l'époque de la maturité; une semence solitaire dans chaque loge, ovale-oblongue, de couleur brune.

Cette plante croît en Barbarie. M. Desfontaines l'a recueillie sur les montagnes des environs d'Alger; je l'ai également trouvée aux environs de Lacalle. (V. v.)

9. TABOURET hérissé. *Thlaspi hirtum*. Linn.

Thlaspi filiculis subrotundis, pilosis; foliis caulinis sagittatis, villosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 901. — Royen, Lugd. Bat. 333. — Sauvag. Monsp. 120. — Millet, Dict. n°. 7. — Gouan, Illust. 40. — Crantz. Austr. pag. 22. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 444. n°. 7. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 712.

Thlaspi hirsutum, var. *β*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 465.

Thlaspi capsulis hirsutis. J. Bauh. Hist. 2. pag. 921. Icon. — Tournef. Inst. R. Herb. 112.

Thlaspi villosum; capsulis hirsutis. C. Bauh. Pin. 116. & Prodrum. pag. 47. tab. 47.

Cette espèce n'est que médiocrement distinguée du *thlaspi campestre*; elle en diffère par ses feuilles caulinaires, beaucoup plus velues; par ses fleurs plus grandes & par ses filiques hérissées de poils courts.

Ses racines sont dures, presque ligneuses; elles produisent plusieurs tiges en partie couchées, difuses, cylindriques, rameuses, garnies à leur base de feuilles glabres, ovales, un peu sinuées à leurs bords, rétrécies à leur partie inférieure en un pétiole alongé; les feuilles caulinaires sessiles, amplicaulées, légèrement sagittées, velues, médiocrement sinuées ou à peine dentées. Les fleurs sont disposées en une grappe droite, terminale, trois fois plus grande que celles du *thlaspi campestre*; les filiques renflées, un peu échancrées à leur sommet, hérissées de poils blanchâtres; une seule semence touffée dans chaque loge.

Cette plante se trouve dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Montpellier, en Italie, en Autriche, dans les terrains glaiseux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

10. TABOURET psychine. *Thlaspi psychine*.

Thlaspi filiculis obovato-deltoides, stylatis; foliis lanceolatis, cordatis, dentatis, amplicaulibus, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 443. n°. 5.

Psychine (Stylosa), caule hispido, ramofo; foliis amplicaulibus, cordato-lanceolatis, inaequaliter dentatis; stylo filiculâ longiore. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 69. tab. 148.

Bursa pastoris hirsuta, cruceifolia; stylo prominente. Shaw. Afr. n°. 91. Icon. Mala.

La grandeur, la couleur jaune de la corolle & la forme de la filique déterminent particulièrement le caractère de cette espèce, dont M. Desfontaines a fait un genre nouveau d'après cette même filique, qui cependant approche beaucoup de celle des *Thlaspi*, mais qui est à peine échancrée à son sommet, munie de deux larges ailes tronquées à leur sommet.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes au moins d'un pied & demi, hérissées de poils blanchâtres, rameuses, garnies de feuilles sessiles, alternes, lancéolées, alongées, en cœur à leur base, pubescentes, inégalement dentées, longues de trois à quatre pouces, larges de six à huit lignes; les inférieures obtuses, les supérieures aiguës.

Les fleurs sont en grappe terminale, pédicellées, garnies de petites feuilles ou de bractées ovales, dentées, plus longues que les pédicelles. Le calice est pubescent, à quatre folioles linéaires, fermées, caduques; la corolle d'un jaune-pâle, de la grandeur de celle du *brassica oleracea*; le limbe des pétales, très-entier, elliptique, arrondi à son sommet, veiné, réticulé; les onglets linéaires, plus longs que le calice; le style subulé, persistant, plus long que la filique; le stigmate simple. Les filiques sont grandes, triangulaires, hérissées, relevées en bosse à chaque face dans leur milieu, à deux valves; chaque valve munie sur la carène de deux ailes roides, amples, très-élargies & tronquées à leur sommet; les semences petites, nombreuses & touffées.

Cette plante croît en Barbarie, aux environs de Mayane, sur le bord des champs; elle a été découverte par M. Desfontaines; elle fleurit au commencement du printemps. ○

11. TABOURET des champs. *Thlaspi arvense*.

Thlaspi filiculis orbiculatis; foliis oblongis, dentatis, glabris. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 901. — Flor. lapp. 251. — Flor. succ. 110, 574. — Hort. Cliff. 330. — Mater. medic. 159. — Royen, Lugd. Bat. 333. — Pollich, Palat. n°. 608. — Ludw. F.R. tab. 175. — Oeet. Flor. dan. tab. 793. — Hoffm. Germ. 227. — Roth. Germ. vol. I. pag. 279. — vol. II. pag. 92. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 442. n°. 3. — Lam. Ill. Gen. tab. 557. fig. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 709.

Nostratum filiquis orbiculatis, planis; foliis oblongis, acutatis, glabris. Haller, Helv. n°. 511.

Y y y 2

Thlaspi filiculis orbiculatis, compressis, amargi-
natis. Scopol. Carn. edit. 1. pag. 312. n°. 1. &
edit. 2. n°. 810.

Thlaspi majus. Tabern. 458. Icon. — Camer.
Epitom. 337. Icon.

Thlaspi arvense, filiquis latis. C. Bauh. Pin. 105.
— Tournet. Inst. R. Herb. 112.

Thlaspi latius. Dodon. Pempt. 712. — Blackw.
tab. 68.

Thlaspi cum filiquis latis. J. Bauh. Hist. 2. pag.
923. Icon. — Moris. Oxon. Hist. 2. 5. 3. tab. 17.
fig. 12.

Thl. fil. Dioscoridis, draba & camelina folio. Lobel.
Icon. 212. & Oberv. 108.

Vulgairement la monnoyète.

Ses tiges sont droites, hautes au moins d'un
pied & demi, un peu filiculeuses, glabres, cylin-
driques, simples ou rameuses, garnies de feuilles
alternes, ovales; les radicales longues, rétrécies
à leur base; celles des tiges amplicaulaires, alon-
gées, lâchement dentées ou un peu sinuées, lisses
à leurs deux faces, d'un vert un peu glauque, la
plupart obtuses.

Les fleurs sont disposées en longues grappes
droites, terminales, très-glabres, soutenues par
des pédoncules grêles, cylindriques, situés pres-
qu'horizontalement; les calices courts, d'un vert-
jaunâtre, un peu ouverts, à quatre folioles ob-
tuses; la corolle blanche, petite; les filiques planes,
larges, vertes, glabres, presque orbiculaires, échan-
crées à leur sommet, bordées sur les angles de
leurs valves d'une large membrane saillante, à re-
bords arrondis; les semences nombreuses, petites,
noirâtres, ovales, arrondies, avec des stries fines,
citrinaires.

Cette plante croît en Europe dans les champs
cultivés; elle est fort commune. ○ (P. v.)

Ses semences passent pour sudorifiques, antisepti-
ques, & se rapprochent par leur acrimonie de
la moutarde: on en exprime une huile bonne à
brûler. Toute la plante est antiscorbutique: on en
recommande l'application sur les membres affectés
de rhumatisme. On la soupçonne propre, par ses
émanations, à chasser les insectes & les charançons
des blés. Il n'y a que les vaches, les chèvres & les
cochons qui la mangent; les autres bestiaux n'en
veulent point.

12. TABOURET à odeur d'ail. *Thlaspi allia-*
cum. Linn.

Thlaspi filiculis subovatis, ventricosis; foliis ob-
longis, obtusis, acutatis, glabris. Linn. Spec.
Plant. vol. 2. pag. 901. — Roy. Lugd. Bat. 334.
— Mill. Dict. n°. 6. — Crantz. Austr. pag. 22.

n°. 3. — Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 121. &
Miscell. vol. 2. pag. 330. — Hoffm. Germ. 127. —
Roth. Germ. vol. 1. pag. 280. — vol. 11. pag. 95.
— Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 445. n°. 4. —
Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 710.

Thlaspi arvense, var. 5. Lam. Flor. franç. vol. 2.
pag. 464.

Scorodo-Thlaspi Ulyssii Alarvandii. J. Bauh.
Hist. 2. pag. 932.

Thlaspi allium redolens. Moris. Oxon. Hist. 2.
pag. 207. 5. 3. tab. 18. fig. 18. — Tournet. Inst.
R. Herb. 112.

Il se ressemble beaucoup au *thlaspi arvense*;
mais on l'en distingue aisément à l'odeur d'ail qu'il
émane de ses feuilles, & à ses filiques tendues &
non comprimées.

Ses racines sont blanches, fibreuses, & pro-
duisent un grand nombre de feuilles radicales. Ses
tiges sont droites, glabres, cylindriques, hautes
d'environ un pied, rameuses vers leur sommet &
même à leur base; les feuilles radicales 5, ovales,
pétiolées, rétrécies en spatule à leur base, sou-
tenues par un pétiole de même longueur; les cau-
linaires oblongues, sessiles, glabres à leurs deux
faces, légèrement dentées à leurs bords, ou un
peu ondulées, obtuses à leur sommet, vertes,
sans nervures apparentes.

Les fleurs sont disposées en grappes claires &
droites, à l'extrémité des rameaux; leur pédi-
cell: glabre & filiforme; la corolle petite & blan-
che; les filiques ovales, ventrues, un peu ren-
flées, entourées d'un rebord fort étroit; termi-
nées par une échancrure peu profonde, surmon-
tées d'un style très-court, persistant; elles con-
tiennent plusieurs semences fort petites, d'un
brun-foncé.

Cette plante croît dans les contrées incultes
de l'Europe, dans le Piémont, en France,
aux environs de Lyon, en Lorraine, en Bour-
gogne, &c. ○ (P. v.) On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris.

Ses feuilles, infusées dans du lait, se donnent
aux enfans pour tuer les vers & appaiser les tran-
chées. Cette plante donne au lait des vaches qui
la mangent, une odeur d'ail très-désagréable. On
s'en est servi quelquefois pour déterger les vieux
ulcères gangreneux. On prétend que ses semences
sont bonnes pour adoucir les aigreurs.

13. TABOURET des rochers. *Thlaspi saxatile.*
Linn.

Thlaspi filiculis subrotundis; foliis lanceolato-li-
nearibus, obtusis, cernosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2.
pag. 901. — Suvag. Monsp. pag. 53, 71. —
Gouan, Monsp. 316. — Crantz. Austr. pag. 24.
— Jacq. Flor. austr. tab. 236. — Kniph. Centur. 1.

n°. 92. — Roth. Germ. vol. I. pag. 180. — vol. II. pag. 93. — Hoffm. Germ. 217. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 444. n°. 6. — Decand. l. flor. franç. vol. 4. pag. 7. 0.

Nasturtium foliis pulchris, ellipticis; siliculis alatis, emarginatis. Il. Her. Helv. n°. 512. — Gært. 245.

Thlaspi siliculis subrotundis; foliis integris, glabris, lanceolato-linearibus; radicalibus ovatis. Corder. Flor. gall. Prov. pag. 348.

Thlaspi filiquis ellipticis; foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, illeceberris. in Act. Petrop. 5. p. 310. fig. 6.

Thlaspi montanum, cingui folio, carneo flore, planis & cordatis filiquis. Bartel. Icon. 845.

Thlaspi parvum, saxatile, flore rubente. C. Bauh. Pin. 107. — Tournef. Inst. R. Herb. 212. — Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 3. tab. 18. fig. 29.

Lithonchlaspi parvum, carneo, rotundo folio. Col. Ecephr. 1. pag. 279. tab. 277. fig. 2.

Cette plante a le port de l'*iberis saxatilis*; elle s'en distingue par les parties de la fructification, particulièrement par la forme de ses filiques. C'est une des espèces les plus remarquables de ce genre par ses petites feuilles glabres, presque charnues, très-nombreuses.

Ses racines sont dures, épaisses, blanchâtres, presque ligneuses; elles produisent plusieurs tiges roides, presque simples, dures, cylindriques, très-glabres, hautes de huit à dix pouces, quelquefois rameuses vers leur sommet, garnies de feuilles nombreuses, petites, éparées, sessiles, un peu charnues, lancéolées, très-glabres, d'un vert-glauque, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet; les inférieures elliptiques; les supérieures plus étroites, un peu aiguës.

Les fleurs sont disposées en un épi court, terminal, droit, qui s'allonge après la floraison; les pédicelles presque capillaires; le calice glabre, verdâtre; la corolle petite, de couleur rose, quelquefois blanchâtre; les filiques comprimées, assez grandes, un peu orbiculaires, garnies d'un large rebord arrondi, échancré à son sommet, formé d'un style très-court.

Cette plante croît sur les rochers, en Suisse, en Italie, dans les départements méridionaux de la France, dans l'Autriche. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♂ (V. v.)

14. TABOURET DE MAGELLAN. *Thlaspi magellanicum.*

Thlaspi foliis integris, glabris; radicalibus petiolatis, spatulatis; caulinis semialexicaulibus, ovato-lanceolatis, obtusis; siliculis ovatis. (N.)

Thlaspi foliis radicalibus integerrimis, glabris, in petiolum attenuatis; caulinis semialexicaulibus, spatulatis corymbosis, siliculis oblongis. Commert. Herb.

Il s'élève des mêmes racines une ou plusieurs tiges glabres, cylindriques, très-fines, simples ou un peu rameuses dès leur base, droites, hautes de six à huit pouces. Les feuilles sont très-entières, glabres à leurs deux faces; les radicales nombreuses, ramassées en gazon, presque spatulées, longues d'environ un pouce, pétioles, ovales-oblongues, arrondies & obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base en un long pétiole filiforme; les feuilles caulinaires, alternes, sessiles, peu distantes, à demi amplexicaules, poir auriculées, ovales, presque lanceolées, très-entières, obtuses à leur sommet, longues de quatre à six lignes, larges de deux.

Les fleurs sont blanches, petites, disposées en une grappe droite, terminale, courte, en corymbe avant leur entier développement; les panicules glabres, épais, horizontaux, filiformes. Les filiques sont comprimées, un peu rétrécies, ovales, lisses, médiocrement échancrées à leur sommet, surmontées d'un style court, épais, à deux valves sans rebord membraneux; plusieurs semences fort petites, roussâtres.

Cette plante a été recueillie par Commerçon, au détroit de Magellan. ☉ (V. f. in herb. Juss.)

15. TABOURET ÉTRANGER. *Thlaspi peregrinum.* Linn.

Thlaspi filiculis suborbiculatis; foliis lanceolatis, integerrimis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 901. — Hort. Cliff. 330. — Royen, Lugd. Bat. 344. — Miller, Dict. n°. 5. — Scopol. Carn. n°. 809. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 442. n°. 1.

Thlaspi capsula cordata, peregrinum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 927. Icon. — Morif. Hist. 2. pag. 297. 5. 3. tab. 18. fig. 30. — Tournef. Inst. R. Herb. 212.

C'est une petite plante dont les racines sont grêles, dures, garnies de quelques fibres; les tiges sont droites, basses, presque simples, hautes de quatre à dix pouces, quelquefois médiocrement rameuses même dès leur base, glabres, cylindriques, garnies de feuilles alternes, sessiles, ovales-lancéolées, très-entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, d'un vert-glauque, obtuses à leur sommet, à peine rétrécies à leur base.

Ses fleurs sont situées, à l'extrémité des tiges ou des rameaux, en un épi droit, simple, un peu lâche; chaque fleur supportée par un pédicule plus long que la corolle. Le calice est divisé en quatre folioles glabres, concaves; la corolle petite, purpurine ou blanchâtre. Les filiques sont un peu larges, comprimées, ovales, arrondies,

entourées d'une membrane finement denticulée à ses bords, d'un beau vert; séparées en deux valves échancrées à leur sommet, à peine rétrécies à leur base, contenant plusieurs semences petites, oblongues, jaunâtres.

Cette plante se trouve sur les collines sèches & arides de la Carniole, & dans la Sicile. *z* (V. f. in herb. Juss.)

Ses feuilles ont une saveur amère & brûlante; ses semences sont âcres.

16. TABOURET d'Arabie. *Thlaspi arabicum*. Vahl.

Thlaspi filiculis ovalibus, stylatis; foliis inferioribus cuneatis, superioribus cordatis, oblongis, amplexicaulis. Vahl, Symb. 2. pag. 76. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 442. n°. 2.

Iberis (arabica), herbacea, foliis ovatis, glabris, integerrimis; filiculis basi apiceque bilobis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 906. — Amœn. Acad. vol. 4. pag. 278.

Subularia (purpurea), foliis cordato-oblongis, subdentatis. Foisik. Flor. ægypt.-arab. pag. 117.

Thlaspi humile, spicis purpureis. Buxb. Centur. 1. pag. 2. tab. 2. fig. 1.

Ses racines produisent plusieurs tiges glabres, diffuses, cylindriques, hautes d'environ un pied & demi, garnies de feuilles alternes; les inférieures très-entières, glabres à leurs deux faces, rétrécies en coin à leur partie inférieure; les supérieures amplexicaules, oblongues, presque ovales, en forme de cœur, vertes, sans nervures apparentes.

Les fleurs sont blanches ou un peu purpurines, disposées en épi ou en grappes simples à l'extrémité des rameaux. Le calice est glabre; la corolle à quatre pétales réguliers; une glande entre les étamines les plus courtes; les siliques comprimées, ovales, biffées & obtuses à leur sommet, surmontées par le style persistant, échancrées en cœur à leur base, divisées en deux loges naviculaires, munies sur leur dos d'une membrane verte & saillante, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît dans l'Arabie & la Cappadoce. ○

17. TABOURET cornu. *Thlaspi ceratocarpum*. Linn. f.

Thlaspi glaberrimum, caule sulcato; foliis sagittatis, lanceolatis, subserratis; filiculis bilobatis. Linn. f. Suppl. pag. 295. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 448. n°. 14.

Thlaspi (ceratocarpum), filiculis oblongis, sursum utrinque membranaceo-coriatis; foliis superioribus

oblongis, sagittatis, amplexicaulis; inferioribus ovalibus, petiolatis. Murr. Comment. Gœtt. 1774. pag. 26. tab. 1.

Lepidium ceratocarpum, Pallas, Itin. vol. 2. pag. 740. tab. U.

C'est une plante fort petite, dont les tiges sont droites, hautes d'environ six à sept pouces, très-glabres, striées, simples, ramifiées en corymbe à leur sommet, garnies de feuilles alternes, sessiles; les inférieures ovales, rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures & caulinaires amplexicaules, oblongues, en fer de flèche à leur base, entières ou légèrement dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces, veinées.

Les fleurs sont blanches, petites, en grappes droites, simples à l'extrémité des rameaux, formant un corymbe par leur réunion. Les siliques sont ovales, à deux loges, environnées d'une membrane qui s'arrondit en deux lobes au dessus de la capsule, & dont les lobes se prolongent en deux cornes. Les semences sont oblongues, comprimées, semblables à celles du *ceratocarpum*.

Cette plante croît en Sibérie, dans les terres pénétrées de sel. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. f.)

18. TABOURET creux aileois. *Thlaspi sativum*.

Thlaspi filiculis orbiculato-ovatis, compressis; foliis glaberrimis, oblongis, variegatis incisif. (N.)

Lepidium (sativum), floribus tetradynamis; foliis oblongis, multifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 899. — Virid. Clifort. 63. — Hort. Upfal. 189. — Flor. suec. vol. 2. n°. 57. — Mater. medic. 119. — Royen, Lugd. Bat. 335. — Miller, Dict. n°. 10. — Hoffm. Germ. 226. — Ludw. Éd. tab. 166. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 278. — vol. II. pag. 89. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 435. n°. 10.

Lepidium foliis variegatis incisif. Hort. Clif. 331.

Nasturtium sativum. Crantz. Austr. pag. 21.

Thlaspi sativum. Desf. Catal. Hort. Paris. pag. 133. — Decand. Flor. fr. vol. 4. pag. 78.

Nasturtium hartenense, vulgatum. C. Bauh. Pin. 103. — Tournef. Inlt. R. Herb. 213. — Morif. Oxon. Hill. 2. §. 3. tab. 19. fig. 1.

Nasturtium hartenense. Dodon. Pempt. 711. Ic. — Blackw. tab. 23.

Nasturtium vulgare. J. Bauh. Hist. 2. pag. 912. Icon.

Cardamon, nasturtium hortenense. Lobel. Icon. 212.

Nasturtium hortenense, crispum. C. Bauh. Pin.

104. & Prodr. pag. 44. tab. 43. — Tourn. Inst. R. Herb. 213.

Nasturtium crispum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 913. Icon.

Nasturtium hortenfe, crispus, angustifolium. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 301. §. 3. tab. 19. fig. 4.

Nasturtium hortenfe, latifolium. C. Bauh. Pin. 103. — Tourn. Inst. R. Herb. 213. — Morif. Hist. 2. §. 3. tab. 19. fig. 2.

Nasturtium latifolium, diofcorideum. J. Bauh. Hist. 2. pag. 913. Ic.

Vulgairement cresson aленоis, cresson des jardins, nastort.

Ses racines sont grêles, blanchâtres, à peine fibreuses; les tiges droites, glabres, cylindriques, médiocrement rameuses; les feuilles radicales très-nombreuses, droites, longuement pétiolées, très-glabres, tendres, d'un vert glauque, un peu charnues, très-irrégulièrement découpées, échiquetées ou pinnatifides, larges & entières dans la variété γ , plus ou moins crépues dans la variété β , d'ailleurs de forme très-variée; les feuilles caulinaires alternes, pétiolées; les inférieures échiquetées & à découpures linéaires; les supérieures étroites, presque entières.

Les fleurs sont blanches, petites; elles semblent d'abord former de petits corymbes, qui s'allongent en grappes droites, simples après la floraison. Le calice est glabre, un peu jaunâtre, obtus; la corolle un peu plus grande que le calice; les pédoncules filiformes, glabres, à peine plus longs que les fruits; les siliques comprimées, ovales, un peu arrondies, très-glabres, légèrement bordées, surtout à leur sommet; un peu échançrées, le style très-court, à peine sensible; les semences solitaires, oblongues, comprimées.

On ne connoît point la patrie de cette plante: elle est depuis long-tems cultivée dans tous les jardins potagers, où elle se sème d'elle-même. (V. v.)

Cette plante est antiscorbutique, diurétique, dépurative: on la mange en salade; elle est d'un saveur un peu âcre, piquante. Marcegrave en a retiré du phosphore en la frottant à un feu violent, par le moyen d'une retorte exactement fermée. Ambroise Paré préparoit avec les feuilles & les semences une pommade efficace contre la gale & la teigne des enfans. Une végétation curieuse, dit M. Willemer, & facile à obtenir, c'est d'envelopper une bouteille d'une couche de coton cardé, dont les franges trempent dans le gouteau, & de semer sur ce coton la graine du cresson aленоis. En peu de jours on ne voit plus qu'une forêt de plaftules qui couvrent la bouteille.

19. TABOURET de Buenos-Ayres. *Thlaspi bonariense*.

Thlaspi floribus diandris, tetrapetalis; foliis omnibus pinnato-multifidis.

Lepidium bonariense. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 901. — Miller, Dict. n°. 13. — Murray. Prodr. 165. — Pallas, Itin. vol. 2. pag. 329. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 441. n°. 28.

Lepidium foliis pinnatifidis, incisfis. Royen, Lugd. Bar. 335.

Thlaspi bonariense, multis ciffum; flore invisibili. Dillen, Hort. Elth. pag. 281. tab. 236. fig. 370.

Ses tiges sont droites, glabres, médiocrement rameuses, cylindriques; les feuilles & le port lui donnent presque l'apparence du *thlaspi fativum*; ses feuilles sont alternes, toutes ailées; les folioles profondément divisées, irrégulières, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en grappes à l'extrémité des rameaux & des tiges, soutenues par des pédoncules plus longs que les fruits. La corolle est blanche, fort petite, à peine sensible, & manque quelquefois. Les étamines ne sont fort souvent qu'au nombre de deux; les quatre autres avortent, & ne se montrent que rarement; Murray assure les avoir observés. La siliques est petite, comprimée, un peu ovale, légèrement échançrée à son sommet, surmontée d'un style très-court, persistant.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, à Buenos-Ayres. ☉

20. THLASPI étalé. *Thlaspi divaricatum*.

Thlaspi foliis pinnatifidis; caule ramossissimo; siliiculis ovatis, submarginatis.

Lepidium divaricatum. Aiton, Hort. Kewen. vol. 2. pag. 375. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 441. n°. 25.

Je ne connois pas cette espèce, qui doit appartenir au *thlaspi*, d'après l'échancrure de ses siliques. Ses tiges, selon Aiton, sont divisées en rameaux alternes, étalés, très-nombreux. Les feuilles sont pinnatifides; les siliques petites, ovales, légèrement échançrées à leur sommet.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance; elle est cultivée dans les jardins botaniques en Angleterre. ☿

Nota. J'ai observé dans l'herbier de M. de Jussieu une plante recueillie au Pérou par Joseph de Jussieu, qui offre tous les caractères de celle que je viens de citer. Ses racines sont dures, presque simples; ses tiges basses, divisées en quelques rameaux très-étalés, roides, divariqués, glabres, cylindriques, garnis de feuilles pinnatifides, al-

ternes, assez petites; les pinnules courtes, étroites, entières ou incisées ou légèrement denticées, glabres, presque obtuses. Les fruits sont blanches, petites, disposées en grappes à l'extrémité des rameaux, qui quelquefois se bifurquent à leur sommet; les siliques petites, ovales, arrondies, glabres, d'un vert-blanchâtre, un peu échanquées à leur sommet, sans rebord membraneux; les semences foliaires dans chaque loge.

21. TABOURET des décombres. *Thlaspi ruderales*.

Thlaspi floribus diandris, apetalis; foliis radicalibus, dentato-pinnatis; ramiferis linearibus, integerrimis.

Lepidium ruderales. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 900. — Flor. suec. 534. 572. — Hort. Cliff. 331. — Roy. Lugd. Bat. 335. — Mill. Dict. n°. 12. — Gorr. Ingr. pag. 102. — Reyg. Géd. t. p. 164. — Pallas, itin. vol. 1. pag. 213. — Pollich, Palat. n°. 606. — Éd. r. Flor. dan. tab. 184. — Hoffm. Germ. 226. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 279. — vol. II. pag. 91. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 440. n°. 23.

Nasturtium apetalum, foliis pinnatis, radicalium pinnis semipinnatis; caulibus simplicibus. Hall. Helv. n°. 508.

Iberis (ruderalis), floribus vix conspicuis; foliis imis multifidis; superioribus linearibus, integerrimis. Crantz. Auflr. pag. 21.

Nasturtium ruderales. Scop. Carn. edit. 2. n°. 811.

Thlaspi ruderales. Allion. Flor. pedem. n°. 917. (Excluse *Gerara* synonymo). — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 707.

Thlaspi tenuifolium. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 467.

Nasturtium silvestre, spidi folio. Bauh. Pin. 105.

Nasturtium angustifolium. Fusch. Hist. 307. Icon.

Ses tiges sont hautes d'environ un pied, droites, glabres, cylindriques, rameuses; les feuilles radicales nombreuses, oblongues, ailées dans leur moitié supérieure, composées de pinnules alternes, finement découpées; les feuilles caulinaires éparçues, presque sessiles, linéaires, alongées, étroites, glabres, très-entières, presque obtuses à leur sommet, rétrécies presque en pétiole à leur base.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, de petites panicules composées de grappes courtes; elles sont glabres, fort petites; souvent les pétales manquent ou tombent de très-bonne heure. Il arrive aussi très-fréquemment qu'on ne compte que deux petites étamines; les autres avortent ordinairement. Les siliques sont glabres, fort petites, comprimées, un peu convexes à leurs deux

faces, obtuses, légèrement échanquées à leur sommet, dépourvues d'ailes à leurs bords; les semences foliaires, très-petites.

Cette plante croît en France & dans plusieurs autres contrées de l'Europe, parmi les décombres, sur le bord des chemins & auprès des murs. ○ (V. v.)

22. TABOURET de Virginie. *Thlaspi virginianum*.

Thlaspi floribus subtriandris, tetrapetalis; floribus linearibus, pinnatis.

Lepidium virginicum. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 900. — Mill. Dict. n°. 6. — Kniph. Cent. 10. n°. 55. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 440. n°. 24.

Lepidium (virginicum), foliis radicalibus pinnatis; caulibus linearibus-lanceolatis, plus minus incisio-ferratis; floribus tetrapetalis, divaricatis; siliquis centiformibus. Michaux, Flor. boreal. Am. r. vol. 2. pag. 28.

Lepidium foliis lanceolato-linearibus, ferratis. Gronov. Virg. 76.

Lepidium foliis omnibus linearibus-lanceolatis, ferratis. Roy. Lugd. Bat. 334.

Thlaspi virginianum, foliis ibericis ampliaribus & ferratis. Tourn. Inst. R. Herb. 213.

Iberis humillior, annua, virginiana, ramifera. Morif. Hist. 2. pag. 111. §. 3. tab. 21. fig. 2. — Sloan, Jam. So. Hist. 1. pag. 195. tab. 123. fig. 3. — Raf, Hist. 827.

Iberis virginiana, latifolia, ramosa. Morif. Prælect. 277.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, cylindriques; les feuilles radicales pinnatifides; celles des tiges alternes, presque sessiles, linéaires-lanceolées, longues d'un pouce & plus, larges de deux à cinq lignes, glabres à leurs deux faces, plus ou moins incisives ou denticées en scie à leur contour, un peu aiguës à leur sommet, rétrécies presque en pétiole à leur base; les supérieures beaucoup plus étroites.

Les fleurs sont blanches, petites, disposées en grappes à l'extrémité des rameaux; les pédoncules glabres, alongés, capillaires; les calices fort petits; la corolle à peine plus longue que le calice, à quatre pétales obtus; souvent il ne s'y trouve que deux étamines; les autres avortent. Les siliques sont petites, comprimées, arrondies ou lenticulaires, médiocrement échanquées à leur sommet; le style persistant à peine sensible, point de rebord membraneux; les semences foliaires dans chaque loge.

Cette plante croît dans les terrains glaiseux, à la

la Jamaïque, à la Virginie, &c dans le pays des Illinois. (V. f.)

23. TABOURET multifide. *Thlaspi multifidum*.

Thlaspi foliis pinnato-multifidis, subvillosis, racemis elongatis; siliculis subrotundis, parvis, vix marginatis; caule hispido. (N.)

6. *Idem, foliis caulinis linearibus-oblongis, integris.*

Ses racines sont grêles, presque simples, d'un blanc jaunâtre; elles produisent quelques tiges étalées, rameuses, cylindriques, médiocrement velues; les rameaux alternes, diffus, garnis de feuilles pétioles, ailées; les folioles pinnatifides ou incisées, à découpures étroites, inégales; un peu velues, vertes à leurs deux faces, un peu ciliées; les feuilles supérieures moins composées, entières, linéaires, oblongues dans la variété β .

Les fleurs sont blanches, petites, disposées à l'extrémité des tiges & des rameaux en grappes simples, allongées, droites, pubescentes; les pédoncules & les calices revêtus d'un léger duvet, sensible à la loupe; la corolle à peine plus longue que le calice; les filiques petites, ovales-arrondies, glabres, comprimées, un peu échancrées à leur sommet; le style à peine sensible; les valves dépourvues d'un rebord membraneux; les semences foliiformes dans chaque valve, orbondées, comprimées.

Cette espèce a été recueillie par Commerçon dans l'Amérique méridionale, à Monte-Video. (V. f. in herb. Juss.)

24. THLASPI cardamine. *Thlaspi cardamines*.

Thlaspi foliis radicalibus pinnatis, caulinis lyrtatis.

Lepidium cardamines. Linn. Amoen. Acad. vol. 4. pag. 278. — Læfchin. Itin. 37. — Act. Stockh. 1755. pag. 273. tab. 8. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 434. n°. 8.

Lepidium foliis inferioribus alternis-pinnatis, carnosis, glaucis; superioribus sessilibus, dentatis, apicè ovatis. Arduin, Spec. 1. pag. 19. tab. 18.

Nofurium niliaceum, fapinum. Lippi, Mff. & Herb.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, ordinairement couchées, surtout à leur partie inférieure, rameuses. Les feuilles sont un peu charnues, glabres à leurs deux faces, d'un vert un peu glauque; les feuilles radicales longuement pétioles, ailées; les folioles distantes, peu nombreuses, arrondies; les inférieures fort petites; la terminale beaucoup plus grande, très-entière; les caulinaires inférieures pinnatifides, ou fortement incisées ou échancrées en lyre; les supérieures entières, sessiles.

Botanique. Tome VII.

filles, linéaires-lancéolées, à peine denticulées, obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont fort petites, blanches, nombreuses, disposées en petites panicules à l'extrémité des tigeaux, dont l'ensemble forme une panicule étalée à petites grappes courtes; les ramifications glabres, presque capillaires. La corolle est à peine plus longue que le calice; les pétales obtus; les filiques fort petites, glabres, comprimées, sans rebord, membraneuses, ovales, en cœur, presque rondes, échancrées à leur base, beaucoup moins à leur sommet, surmonté d'un style persistant très-court; chaque loge renfermant une seule semence.

Cette plante croît dans les terres argileuses en Espagne & dans l'Égypte. (V. f. in herb. Juss.)

25. TABOURET épineux. *Thlaspi spinosum*.

Thlaspi foliis pinnatis; foliolis lunatis, exterioribus elongatis; ramis mucronatis.

Lepidium spinosum. Linn. Mantiff. pag. 253. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 434. n°. 9.

Lepidium spinosum, foliis pinnatifidis, sursum cristatis; spiciis subulatis. Arduin, Specim. 2. p. 34. tab. 16.

Ses tiges sont roides, un peu épaisses, glabres, subulées, hautes d'environ sept à huit pouces, rameuses à leur partie inférieure; les tigeaux alternes, très-fermes, simples, subulés, épineux à leur sommet; les feuilles radicales pétioles, longues de trois pouces, ailées, décurrentes sur leur pétiole, composées de folioles inégales; les inférieures arrondies, échancrées presque en croissant à leur base, palmées à leur partie antérieure; les folioles extérieures beaucoup plus grandes, à demi-pinnatifides; les découpures linéaires; la foliole impaire & terminale très-entière; les feuilles caulinaires peu nombreuses, droites, linéaires, rarement découpées.

Les fleurs sont blanches, éparfes, latérales, soutenues par des pédoncules roides, très-courts. Le calice est fort petit, droit, ovale, pâle, entrouvert, caduc; la corolle une fois plus longue que le calice; les pétales ovales, très-ouverts; alternant avec les divisions du calice; les étamines de la longueur du calice; les anthères simples; les filiques cunéiformes, presque sessiles, comprimées & bifides à leur sommet.

Cette plante croît dans le Levant. (V. f. in herb. Juss.)

26. TABOURET à tige nue. *Thlaspi nudicaule*. Desf.

Thlaspi scapo subnudo, foliis radicalibus pinnatis. Z z z

foliis, pinnis subrotundis, filiculis subovatis, marginatis. (N.)

Thlaspi scapo nudo, foliis radicalibus lanceolatis, apice sinuato-erratis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 67. — Bergeret, Phytogr. 3. pag. 28. Icon. Bona. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 708.

Lepidium foliis filiformibus, apice pinnatifidis, caule nudo. Sauvag. Monsp. 228. 281.

a. *Lepidium* (nu ticaule) *scapo nudo, simplicifloro floribus tetrandris; foliis pinnatifidis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 8. 8. — Læf. Iter. 155 — Miller, Dict. n°. 8. — Gouan, Illustr. pag. 40. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 432. n°. 3.

Nasturtium minimum, vernal, foliis tantum circa radicem. Magn. Monsp. 187. tab. 186.

b. *Iberis* (nudicaulis), *herbacea; foliis sinuatis, caule nudo, simplicifloro.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 898. — Flor. suec. 536. 581. — Hort. Cliff. 328. — Iter Ælud. 139. — Royen, Lugd. Bat. 316. — Miller, Dict. n°. 5. — Rev. Ged. 2. pag. 108. — Pollich, Palat. 615. — Eder, Flor. dan. tab. 323. — Hoffm. Germ. 230. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 276. — vol. II. pag. 82. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 458. n°. 17.

Iberis foliis pinnatis; pinnis ovatis, acutis. Haller, Helv. n°. 521.

Bursa pastoris minor, foliis incisifs. C. Bauh. Pin. 108.

Nasturtium petraum, foliis bursa pastoris. C. Bauh. Pin. 104. — Tournef. Inst. R. Herb. 214.

Bursa pastoris media, minima. Morif. Oxon. Hist. a. 5. 3. tab. 20. fig. 4.

Bursa pastoris parva, foliis glabro, spisso. J. Bauh. Hist. 2. pag. 937. Icon.

Pastoria bursa, minor. Dodon. Pempt. 103.

Nasturtium petraum. Tabern. Icon. 451.

Pastoria bursa, minor. Lobel. Icon. 221.

Ces deux plantes ont trop de rapport pour être séparées, encore moins pour être placées dans deux genres différents. Leurs siliques échanquées les ramènent nécessairement parmi les *thlaspi*, & leurs pétales égaux ne permettent pas l'admission de la variété *a* dans les *iberis*.

Des racines grêles, fibreuses, fort menues, donnent naissance à un grand nombre de petites feuilles glabres, toutes radicales, nombreuses, ramassées en gazon, médiocrement étalées en rosette, inégales, un peu alongées, pinnatifides, presque ailées, les pinnules fort petites, plus grandes à mesure qu'elles se rapprochent du sommet des feuilles, un peu arrondies, quelquefois aiguës; de leur centre s'élèvent deux ou trois tiges très simples, hautes

de deux ou trois pouces & plus, grêles, filiformes, glabres, cylindriques, dépourvues de feuilles, ou munies quelquefois de deux ou trois petites folioles distantes, étroites, un peu laccolées, sessiles.

Les fleurs sont blanches, petites, disposées en une grappe courte, un peu lâche, simple, terminale; la corolle un peu plus longue que le calice; les pétales égaux, ovales, très-entiers, aigus à leur base; le style très-court; les siliques ovales, un peu orbiculaires, comprimées, échanquées à leur sommet, environnées d'une membrane très-courte, un peu plus large vers son sommet; une & souvent deux semences petites, arrondies, dans chaque loge. La variété *a* est plus petite; ses feuilles plus étroites; ses lobes linéaires, souvent aigus; ses tiges plus courtes.

Cette plante croît en France, en Espagne, dans la Barbarie, aux lieux sablonneux, stériles. ☉ (V. v.)

27. *THLASPI* à feuilles de graminée. *Thlaspi graminifolium.*

Thlaspi foliis linearibus; superioribus integerrimis; caule paniculato, virgato; floribus hexandris.

Lepidium graminifolium. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 900. — Hoffm. Germ. 226. — Roth, Germ. vol. 2. pag. 90. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 438. n°. 19. (Excluse Tournefortii synonymo.)

Cette plante, très-voisine par son port de l'*iberis linifolia*, en est cependant très-différente d'après Linné; elle se rapproche du *thlaspi sativum*. Ses tiges sont divisées en rameaux panicules, très-lisses, élancés, cylindriques; les premières feuilles radicales sont pinnatifides ou presque en lyre; les feuilles caulinaires inférieures seulement dentées en scie; les supérieures linéaires, très-entières. Les fleurs sont blanches, petites, à six étamines; les calices de couleur purpurine; les siliques ovales, échanquées à leur sommet.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. ☿ (Descript. ex Linn. & Willd.)

28. *TABOURET* piscicide. *Thlaspi piscidium.*

Thlaspi foliis elliptico-oblongis, acutis, integerrimis; floribus tetraënymis.

Lepidium piscidium. Forst. Prodr. n°. 249. — Ejusd. Plant. escul. pag. 70. n°. 39. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 437. n°. 17.

Ses tiges sont hautes de deux pieds, herbacées, glabres, cylindriques, rameuses; les rameaux étalés, ascendants, alternes, lisses, cylindriques, garnis de feuilles à peine pétiolées, alternes, oblongues, elliptiques, ouvertes, distantes, très-entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces,

longues d'environ deux pouces; les feuilles caulinaires inférieures, rétrécies presqu'en pétiole à leur base.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes solitaires, très-simples. La corolle est blanche, petite; les pétales spatulés, plus étroits & plus longs que les divisions du calice; six glandes situées entre les filamens des étamines. Le fruit est une petite silique ovale, comprimée, échancrée à son sommet, à deux valves, à deux loges; les semences presque solitaires dans chaque loge.

Cette plante croît à la Baie botanique & dans la Nouvelle-Hollande. ○ (*Descript. ex Forst.*)

29. TABOURET potager. *Thlaspi oleraceum*.

Thlaspi foliis elliptico-oblongis, acutis, serratis; floribus tetrandris.

Lepidium oleraceum. Forst. Prodrum. n°. 248. — Eudl. Plant. escl. pag. 60. n°. 48. — Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 374. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 437. n°. 16.

Lepidium bidentatum. Montin. in nov. Act. A. N. C. 6. pag. 324. tab. f. 2.

Cette plante a des tiges lisses, herbacées, cylindriques, droites ou ascendantes, rameuses, hautes d'un à trois pieds; les rameaux alternes, paniculés, garnis de feuilles alternes, oblongues, elliptiques, étalées, glabres à leurs deux faces, rétrécies à leurs deux extrémités, profondément dentées en scie à leurs bords, longues d'environ trois pouces; les feuilles supérieures plus petites, & dentées seulement à leur partie supérieure.

Les fleurs sont blanches; les pétales médiocrement arrondis, entiers, concaves, une fois plus grands que les calices; tétrecis à leur base en un onglet linéaire, une fois plus court que la lame. Les étamines sont au nombre de quatre; les siliques ovales, échancrées en cœur, renfermant deux semences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, dans le sable, le long des rivages. ○ (*Descript. ex Forst.*)

30. THLASPI de Pollich. *Thlaspi Pollichii*.

Thlaspi foliis inferioribus lato-lanceolatis, serratis; superioribus linearibus, subintegerrimis; siliculis orbiculatis, emarginatis.

Lepidium Pollichii. Roth, Germ. vol. 2. p. 91. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 441. n°. 27.

Lepidium iberis. Pollich, Palat. n°. 607.

Iberis nasturtii folio. C. Bauh. Pin. 91. — Morif. Oxon. Hist. 2. f. 3. tab. 21. fig. 3.

Nasturtium silvestre, tenuiter incisum, minoris fructu. Tourn. Infl. R. Herb. 214.

Ses racines sont presque simples, un peu épaissies, légèrement fibreuses; les tiges droites, glabres, rameuses, même dès leur base, cylindriques; les rameaux alternes, étalés; les feuilles glabres; les radicales & inférieures élargies, lancéolées, incisées ou profondément dentées en scie, rétrécies presqu'en pétiole à leur base; les feuilles caulinaires alternes, sessiles, plus étroites, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, plus ou moins irrégulièrement dentées en scie; les supérieures presqu'entières, fort étroites.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales presque simples, quelquefois deux ensemble, les pédoncules horizontaux, capillaires, plus longs que les fleurs; le calice glabre, fort petit; la corolle blanche, un peu plus longue que les calices; les pétales égaux, obtus & arrondis à leur sommet; les étamines plus courtes que la corolle; les siliques glabres, petites, presqu'en cœur, un peu arrondies, sans rebord membraneux, un peu échancrées à leur sommet, surmonté d'un style très-court, persistant.

Cette plante se trouve dans l'Allemagne. ○

31. TABOURET apétale. *Thlaspi apetalum*.

Thlaspi foliis lanceolato-linearibus, integerrimis; floribus apetalis; caule procumbente.

Lepidium apetalum. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 437. n°. 20.

Cette espèce a des tiges longues d'environ un demi-pied, couchées, relevées seulement à leur partie supérieure, munies à peine d'un ou de deux rameaux. Les feuilles sont alternes, distantes, sessiles, linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords. Les fleurs sont ordinairement dépourvues de pétales; les siliques sont petites, comprimées, échancrées à leur sommet, divisées en deux valves relevées en carène, contenant une seule semence dans chaque loge.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie. ○ (*Descript. ex Willd.*)

32. TABOURET d'Alep. *Thlaspi chalcopense*.

Thlaspi foliis sagittatis, sessilibus, dentatis.

Lepidium chalcopense. Linn. Amœn. Acad. vol. 4. pag. 321. — Centur. 169. — Miller, Dict. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 442. n°. 29.

Draba chalcopensis, repens, humilior, foliis minus cinereis, & quasi viridibus. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 314.

Lepidium humile, minus, incanum, alepicum. Tourn. Infl. R. Herb. 216.

Z z z 2

Ses racines sont dures, rampantes, & s'étendent au loin; elles donnent naissance à des tiges basses, couchées, médiocrement rameuses, presque ligneuses, garnies de feuilles sessiles, alternes, longues, étroites, en forme de flèche à leur base, dentées en scie à leur contour, glabres à leurs deux faces, d'un vert un peu cendré.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes claires; elles sont blanches, petites, pédonculées; le calice glabre; la corolle à peine plus longue que le calice; les pétales obtus; les filiques petites, glabres, ovales, un peu échanquées à leur sommet, renflées à leurs deux faces.

Cette plante croît dans le Levant. ✕

TACCA. *Tacca.* Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, qui a quelques rapports avec la famille des narcissées, & qui se rapproche un peu des *Aspermeria*, qui comptent des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont pinnées ou pinnatifides, les fleurs presque disposées en ombelle.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice à six divisions; six pétales insérés sur le calice; six anthères sessiles, insérées sur les pétales; un stigmate en étoile; une baie sèche, inférieure, polyssperme, à six angles.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice supérieur, monophylle, à six découpures persistantes, oblongues, conniventes.

2°. Une corolle composée de six pétales insérés à la base des divisions du calice, élargis à leur partie inférieure, dilatés & fortement recourbés en capuchon à leur partie supérieure, échanqués en deux lobes à leur sommet.

3°. Six étamines sessiles, ou dont le filament se confond avec les pétales; des anthères oblongues, à deux loges, insérées dans la partie concave & recourbée des pétales.

4°. Un ovaire inférieur, surmonté d'un style droit, court, simple, épais, terminé par un stigmate orbiculaire, en étoile, divisé en six rayons un peu obtus, convexes à leur face supérieure.

Le fruit est une baie sèche, inférieure, ovale, à six ftries, couronnées par les divisions du calice, revêtue d'un péricarpe membraneux, contenant une pulpe aqueuse.

Les semences nombreuses, presque ovales, assez grandes, striées longitudinalement, d'un tour-pâle, attachées sur les parois intérieures du péricarpe.

Observations. La partie des fleurs à laquelle on a donné le nom de *pétales*, est regardée par M. de Jussieu comme devant constituer les véritables filaments des étamines, considérablement élargis, & recouvrant les anthères par leur partie supérieure, allongée & recourbée en capuchon.

ESPÈCES.

Tacca pinnatifida. *Tacca pinnatifida.* Linn. f.

Tacca foliis tripartitis, pinnatifidis; floribus subumbellatis. (N.)

Tacca pinnatifida. Linn. f. Suppl. pag. 251. — Forster, Plant. escul. n°. 18, & Prodr. n°. 209. — Gzert. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 43. tab. 14. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 251. — Juss. Gener. Plant. pag. 36. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 200.

Leontice (leontopetaloides), *foliis simplicibus, tripartito-multifidis; corollis monopetalis, caliculatis.* Linn. Spec. Plant. pag. 448.

Leontopetaloides. Amman. Acl. Petrop. 8. p. 211. tab. 113.

Tacca littorea. Rumph. Amboin. vol. 5. p. 308. tab. 114.

Tacca sativa. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 324. tab. 112.

Katu-schena. Rheed, Malab. vol. 12. pag. 41. tab. 21.

Vulgairement tavoulou de Madagascar.

Ses racines sont épaisses, tubéreuses, garnies de fibres presque capillaires; elles donnent naissance à des feuilles toutes radicales, pétioles, fort amples, assez semblables à celles du *dracontium polyphyllum*, ordinairement à trois grandes divisions, chacune d'elles pinnatifide, composée de tois-jets confluentes ou plutôt décurrens sur le pétiole commun, opposées, sessiles, lancéolées, allongées, très-étroites, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet; une foliole impaire & terminale. Quelquefois les feuilles sont simplement palmées, à très-longues digirations.

Du centre des feuilles s'élève une hampe droite, simple, très-haute, nue, terminée par des fleurs réunies en une sorte d'ombelle simple, les uies pédonculées, d'autres presque sessiles; les pédoncules simples, mégas, capillaires, entre-mêlés de flets très-longs, preique stériles, penchans; un involucre extérieur, composé de plusieurs grandes folioles sessiles, vaginales à leur base, un peu inégales, beaucoup plus longues que les fleurs, étroites, lancéolées, longuement acuminées. Le fruit est une sorte de baie sèche, ovale-oblongue, rétrécie à ses deux extrémités, relevée de six grosses

flries saillantes, & dont le péricarpe est membraneux; les semences striées, situées dans une pulpe aqueuse.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à l'île de Malacca, où elle porte le nom de *tavoulou*. (V. f. in herb. Juss.)

TACHI. *Tachia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des gentianées, qui a des rapports avec les *lisianthus* & les *chironia*, & qui comprend des arbrustes exoriques à l'Europe, dont les rameaux sont opposés, ainsi que les feuilles; les fleurs axillaires & solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à cinq dents; une corolle tubulée; le limbe à cinq découpures; quatre étamines; cinq glandes à la base de l'ovaire; un style; une capsule à deux loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, oblong, tubulé, cylindrique, divisé à son orifice en cinq dents droites, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, un peu dilatée à son orifice, divisée à son limbe en cinq découpures ovales, pointues, rabattues en dehors.

Cinq petites glandes environnant la base de l'ovaire.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont filiformes, attachés à la partie inférieure du tube, plus longs que lui, surmontés d'anthères droites & oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, muni d'un style filiforme, plus long que les étamines, terminé par un stigmate à deux lames.

Le fruit est une capsule oblongue, simple, à deux lozes, à deux valves, recouverte par le calice persistant.

Les semences sont nombreuses, fort petites, visqueuses, adhérentes à la cloison.

ES PÈCE.

TACHI de la Guiane. *Tachi guianensis*. Aubl.

Tachia foliis petiolatis, oppositis; floribus solitariis, axillaribus; ramis farmentosis. (N.)

Tachia guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 75. tab. 29. — Linn. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 322. n°. t. 93. tab. 80. — Juss. Gen. Plant. pag. 142.

Myrmecia scandens. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 623. — Schreb. Gen. Plant. n°. 177.

C'est un arbrisseau grimpant, dont les tiges sont glabres, quadrangulaires, hautes de cinq à six pieds, creules, un peu jaunâtres, garnies de rameaux noueux, opposés, retragés, lisses, farmenteux, munis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, presque lanceolées, vertes, moles, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, à peine rétrécies à leur base, longues de trois à quatre poncees, larges d'environ deux poncees & plus, garnies de nervures laterales, divisées en veinules très-fines, sinuées; les pétioles courts, épais, un peu canaliculés.

Les fleurs sont solitaires, opposées, situées dans l'aisselle des feuilles, à peine pédonculées. Leur calice est glabre, au moins long d'un ponce, cylindrique, un peu renflé à sa base, divisé à son sommet en cinq dents réfléchies, presque lanceolées, aiguës; la corolle tubulée, un peu plus longue que le calice, de couleur jaune. Son tube se dilate à sa partie supérieure, & se termine par un limbe court, divisé en cinq découpures ovales, aiguës, rabattues en dehors; les filaments droits, filiformes, un peu plus longs que le tube; les anthères droites, allongées, saillantes hors de la corolle. L'ovaire est appuyé sur un disque un peu charnu, garni de cinq petites glandes. La capsule est presque cylindrique, enveloppée, presque dans toute sa longueur, par le calice, qui persiste avec elle; elle s'ouvre longitudinalement en deux valves séparées par une cloison, à laquelle sont attachées des semences nombreuses, fort petites, jaunâtres, enduites d'une matière visqueuse.

Cet arbrisseau croît dans les grandes forêts de la Guiane, le long des bords des ruisseaux. Des nombreuses fourmis l'agent ordinairement dans le creux du tronc & des branches. (V. f.)

TACHIBOTE. *Tachibota*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptalées, affilié à la famille des cistées, qui a des rapports avec les *piparea* & les *piriqueta*; il renferme des arbrustes exoriques à l'Europe, dont les rameaux sont opposés, les feuilles alternes, munies de stipules; les fleurs disposées en épis axillaires & terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle à cinq ptalées; cinq étamines, point de style; trois stigmates; une capsule à trois lozes, à trois valves; plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, inférieur, divisé profondément en cinq découpures lanceolées.

2°. Une corolle composée de cinq pétales, alternes avec les divisions du calice, insérés sur le réceptacle, à peine plus longs que le calice.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont insérés sur le réceptacle, filiformes, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères fort petites, arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, presque globuleux; point de style; trois stigmates courts, écartés entr'eux.

Le fruit est une capsule ovale-arrondie, de la grosseur d'un très-gros pois, à trois angles, enveloppée par le calice persistant, à trois valves, à trois loges; les valves separent jusque vers leur milieu par une cloison, contenant un grand nombre de semences fort petites, anguleuses, aigues.

ESPÈCE.

TACHIBOTE de la Guiane. *Tachibota guianensis*. Aublet.

Tachibota foliis ovato-lanceolatis; stipulis linearibus, hirsutis; floribus racemosis. (N.)

Tachibota guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 287. tab. 112. — Lam. Illust. Gen. tab. 208.

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux alternes, épars, cylindriques, velus, de couleur roussâtre, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, ovales-oblongues, glabres à leurs deux faces, très-entières à leur contour, à peine pétiolées ou légèrement rétrécies à leur base, acuminées à leur sommet, longues de deux à trois pouces & plus, larges d'environ un pouce & demi, garnies de nervures latérales, simples, parallèles, très-fines, inégales, & de petites veines réticulées, munies de deux petites stipules très-étroites, courtes, linéaires, velues, très-caduques.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en grappes simples, allongées, latérales & terminales, peu garnies; chaque fleur médiocrement pédonculée; les pédoncules velus, à peine de la longueur des fleurs, garnis à leur base de bractées assez semblables aux stipules. Le calice est petit, presque glabre, à cinq découpures profondes, lancéolées, presque obtuses; la corolle blanche, petite, à peine plus longue que le calice, à cinq pétales étroits, lancéolés, aigus; cinq étamines; trois stigmates courts, sessiles; une capsule globuleuse, à trois angles, divisée en trois valves, à trois loges, contenant un grand nombre de semences fort petites, anguleuses.

Cette plante croît dans les grandes forêts de la Guiane. *h*

TACHIGALE. *Tachigali*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *aperua*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, les fleurs disposées en épis paniculés, terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice turbiné, à cinq lobes; cinq pétales inégaux; dix étamines libres; trois filaments plus courts; une gousse comprimée; plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, inférieur, persistant, divisé à son orifice en cinq lobes arrondis, presque égaux.

2°. Une corolle régulière, composée de cinq pétales inégaux, cingulés, presque ovales ou arrondis & obtus à leur limbe.

3°. Dix étamines libres; les filaments insérés sur le calice, inégaux, un peu velus, saillans hors de la corolle; les trois supérieurs plus courts; les anthères petites, globuleuses ou un peu ovales.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, un peu comprimé, velu, surmonté d'un long style filiforme, termine par un stigmate aigu.

Le fruit consiste en une gousse longue, coriace, comprimée, velue, renflée au dessus des semences, rétrécie à sa base, un peu acuminée à son sommet, renfermant six à sept grosses semences ovales, obtuses, longues d'environ un pouce & plus.

ESPÈCES.

1. TACHIGALE paniculée. *Tachigalia paniculata*. Aublet.

Tachigalia foliis pinnatis, foliolis oppositis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 372. tab. 143. fig. 1. — Lam. Illust. Gener. tab. 339.

Cubaa paniculata. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 530.

Tachia paniculata. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 460.

C'est un assez grand arbre, dont le tronc supporte une cime vaste, touffue, très-rameuse; les rameaux divisés en d'autres plus petits, glabres, à trois faces, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, sans impaire, composées ordinairement de six paires de folioles opposées, pédicellées, ovales, entières ou légèrement sinuées à leur contour, acuminées à leur sommet, veinées & réticulées; les folioles inférieures plus petites.

Les fleurs sont disposées en épis simples, droits, situés à l'extrémité des jeunes rameaux, rapprochés presque en panicule; chaque fleur médiocrement pédicellée, munie d'une petite bractée très-courte, persistante. Le calice est glabre; la corolle un peu plus grande que le calice; les étamines saillantes, beaucoup plus longues que les pétales; les anthères petites, globuleuses; les gouffes épaisses, longues, coriaces, velues, médiocrement relevées; les semences au moins de la grosseur & de la forme d'une fève.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la Guiane. η

2. TACHIGALÉ trigone. *Tachigalia trigona* Aublet.

Tachigalia foliis pinnatis, foliolis alternis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 374. tab. 143. fig. 2.

Cubaa trigona. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 530. n°. 2.

Nachia trigona. Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 460. n°. 2.

Il est très-probable que cette espèce n'est qu'une variété de la précédente, à laquelle elle ressemble beaucoup. La principale différence consiste dans les folioles plus grandes, alternes & non opposées, comme celles de la première espèce. Les rameaux sont trigones ou à trois faces dans les deux; les fleurs ont la même disposition & le même caractère.

Cet arbre se rencontre dans les grandes forêts de la Guiane. η

TACSONE. *Tacsonia*. Genre de plantes dicotylédones, voisin de la famille des cucurbitacées, qui a été distingué par M. de Jussieu du genre des grenatilles (*passiflora*), avec lequel il a de très-grands rapports, dont il diffère par un calice très-grand, long, tubulé; le limbe coloré, divisé en dix découpures; les ailetes extérieures mucronées à leur sommet, les ailetes intérieures obtuses; un petit calice urcéolé, à trois divisions, formant un involucre à la base du calice; point de couronne intérieure, mais à sa place plusieurs glandes sessiles à l'orifice du tube, & deux rides profondes, intérieures & circulaires sous la série des glandes; le pélicule, qui soutient l'ovaire, très-allongé, égal au calice. Les autres caractères sont les mêmes que dans les *passiflora*.

Ce genre se trouve être dans cet ouvrage une espèce de *passiflora* mentionnée par M. Lamarck. (Voyez GRENADILLE à longues fleurs, vol. 3, pag. 59. n°. 28.)

TAGÈTE, ŒILLET D'INDE. *Tagetes*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs radiées, de la

famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *othonna* & les *pezie*, & qui comprend des herbes toutes exotiques de l'Europe, la plupart d'une odeur forte, désagréable, à feuilles alternes, la plupart pinnatifides, presque charnues, percées de points transparents; les fleurs terminales, solitaires, réunies en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice d'une seule pièce, denté à son limbe; des fleurs radiées; des semences surmontées de cinq filets roides; le réceptacle nu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont radiées, composées de fleurons hermaphrodites dans le centre, & de demi-fleurons femelles à la circonférence. Elles offrent :

1°. Un calice commun très-simple, d'une seule pièce, oblong, tubulé, anguleux ou toteux, terminé à son orifice par autant de dents qu'il y a d'angles.

2°. Une corolle composée de fleurons hermaphrodites dans le centre, & de demi-fleurons femelles, ordinairement au nombre de cinq à la circonférence.

Les fleurons sont tubulés, droits, plus longs que le calice, divisés, jusque vers leur moitié, en cinq découpures linéaires, souvent un peu velues en dedans.

Les demi-fleurons plus longs que les fleurons, élargis, presque ovales, obtus à leur limbe, rétrécis en tube à leur base, peu nombreux.

3°. Cinq étamines dans les fleurs hermaphrodites; les filaments capillaires, très-courts; les anthères réunies en cylindre.

4°. Des ovaires dans les fleurs hermaphrodites & femelles, oblongs, surmontés d'un fil filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate bifide, grêle, réfléchi en dehors.

Le calice persistant renferme des semences oblongues, comprimées, un peu plus courtes que le calice, surmontées de cinq filets roides, droits, glabres, inégaux, subulés.

Le réceptacle est plane ou un peu convexe, parfaitement nu, glabre, ponctué.

Observations. En considérant ce genre d'après les espèces qui le composent, on le trouvera peu naturel, à moins qu'il ne soit réduit à trois ou quatre espèces, qui offrent sans exception les caractères essentiels qui le constituent; la plupart des autres semblent n'y avoir été ajoutées que parce qu'ayant beaucoup plus de rapport avec ce genre qu'avec aucun autre, elles ne pouvoient être placées ailleurs, à moins d'établir pour cha-

cune d'elles un genre particulier. Il sera difficile de s'en dispenser pour le *tagetes papposa* de Michaux, qui n'a presque aucun des caractères essentiels des *tagetes*. Les trois espèces de Cavanilles s'y rapportent davantage, mais elles en sont très-éloignées par leur port; elles ne pourroient être réunies dans un même genre, & leur calice monophylle les introduit parmi les *tagetes*, ainsi que leur corolle, mais non l'aigrette de leurs semences.

E S P È C E S.

1. TAGÈTE droite. *Tagetes erecta*. Linn.

Tagetes foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, ciliato-serratis; pedunculis unifloris, ventricoso incrassatis; calicibus angulatis; caule erecto. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2127. n°. 3.

Tagetes caule simpliciter, erecto; pedunculis nudis, unifloris. Linn. S. fl. vege. pag. 770. — Hort. Cliff. 418. — Hort. Upsal. 267. — Royen, Lugd. Bat. 180. — Mill. Dict. n°. 1. — Knorr. Del. tab. S. 6. a. — Lam. Illustr. Gen. tab. 684.

Tagetes major. Gertn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 437. tab. 172. fig. 4.

Tanacetum africanum, majus, simpliciter flore. C. Bauh. Pin. 135.

Tagetes maximus, rectus, flore simpliciter, ex luteo pallido. Tournef. Inst. R. Herb. 488. — J. Bauh. Hist. 1. pag. 100. Icon.

Flos africanus, major, flore simpliciter. Tabern. Icon. 13. — Lobel. Icon. 714.

Caryophyllus indicus. Camer. Epitom. 406.

3. *Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 100. Ic. — Tourn. Inst. R. Herb. 488. — Knorr. Del. t. tab. S. 6.

Othonna major, polyanthos. Lobel. Icon. 713, & Obsev. pag. 410. Icon.

Flos africanus, major, aureus, multiflorus. Tabern. Icon. 13.

4. *Tagetes mexicanus, flore fistuloso, simplex*. Col. Ecphr. 2. pag. 47. tab. 46. fig. 1.

Tagetes indicus, flore simpliciter, fistuloso. Tournef. Inst. R. Herb. 489.

5. *Tagetes mexicanus, alter, polyanthos, fistuloso flore*. Col. Ecphr. 2. pag. 48. tab. 46.

Tagetes indicus, flore fistuloso, duplicato. Tourn. Inst. R. Herb. 489.

Les principaux caractères qui distinguent cette espèce du *tagetes patula*, consistent particulièrement dans les calices à plusieurs côtes anguleuses, & dans le port de la plante, dont les tiges sont

droites, presque simples ou médiocrement rameuses, plus élevées, très-droites, glabres, striées, fistuleuses, garnies de feuilles alerées, pétiolées, ailées; les folioles nombreuses, la plupart alerées, très-étroites, linéaires-lancéolées, sessiles, glabres, un peu grasses, dentées en scie & un peu ciliées à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires, terminales; les pédoncules droits, fistuleux, renflés & ventrus à leur partie supérieure; les calices simples, glabres, à plusieurs côtes anguleuses, terminés par autant de dents aiguës. La corolle est d'un jaune plus ou moins foncé, selon les variétés; les demi-fleurons planes, un peu recourbés, très-larges, un peu sinués à leur sommet; les semences linéaires-oblongues, médiocrement comprimées, glabres, anguleuses, striées, noires, terminées à leur base par une pointe blanchâtre, surmontées de cinq filers roides, tubulés, inégaux; le réceptacle un peu convexe. Cette plante le double très-aisément, & produit dans nos jardins des variétés fort agréables.

Cette espèce croît naturellement au Mexique. ○ (V. v.)

2. TAGÈTE touffue. *Tagetes patula*. Linn.

Tagetes foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, ciliato serratis; pedunculis unifloris, subincrassatis; calicibus levibus; caule patulo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2126. n°. 2.

Tagetes caule subdiviso, patula. Linn. Syst. vege. pag. 770. — Hort. Cliff. art. 418. — Hort. Upsal. 267. — Royen, Lugd. Bat. 180. — Miller, Dict. n°. 2. — Kniph. Centur. 10. n°. 90. — Knorr. Del. 1. tab. S. 7.

Tanacetum africanum, seu flos africanus, minor. C. Bauh. Pin. 132.

Flos africanus. Dodon. Pempt. 255. Icon. — Lobel. Icon. 713, & Obsev. 410. Icon.

Flos africanus, minor, flore simpliciter. Tabern. Icon. 12.

Tagetes indicus, minor, flore simpliciter, five caryophyllus indicus, five flos africanus. Tourn. Inst. R. Herb. 488. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 98. Icon.

6. *Tagetes indicus, minor, multiplicato flore*. Tourn. Inst. R. Herb. 488. — Knorr. Del. 1. tab. S. 8.

Flos africanus, minor, multiflorus. Tabern. Ic. 12.

Tagetes minor, flore fulvo, maculato. Dillen. Eltham. pag. 273. tab. 279. fig. 361.

Tanacetum africanum, five flos africanus, minor, flore pleno. C. Bauh. Pin. 133.

7. *Tagetes*

y. Tagetes indicus, minor, flore pleno, luteo-rufescente. Tournef. Inst. R. Herb. 488.

Cette espèce ressemble beaucoup au *tagetes* *reda* ; on l'en distingue à ses calices à côtes renflées, point anguleuses ; à ses tiges qui se divisent en rameaux nombreux, touffus, étalés. Elles sont glabres, cylindriques, striées, un peu fistuleuses, peu élevées ; les rameaux alternes, ouverts, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées ; les folioles distantes, assez nombreuses, alternes, glabres à leurs deux faces, étroites, linéaires-lancéolées, denticulées à un peu ciliées à leurs bords ; les dentelures distantes, très-courtes.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, portées sur un pédoncule droit, fistuleux, médiocrement renflé vers son sommet. Le calice est ample, très-glabre, d'un vert-jaunâtre, à grosses côtes arrondies, terminées chacune par une dent courte, large, aiguë. La corolle est jaune, assez ample, variée dans ses couleurs ; les demi-fleurons de la circonférence larges, un peu crénelés à leur sommet.

Cette plante croît naturellement au Mexique ; elle est cultivée dans presque tous les jardins, ainsi que le *tagetes* *reda*, & offre comme elle plusieurs variétés, soit dans la grosseur des fleurs, soit dans le mélange des couleurs. ○ (*V. v.*)

3. TAGÈTE allongée. *Tagetes elongata*. Willd.

Tagetes foliis pinnatis, foliolis apice serratis, superiorum linearibus, inferiorum cuneiformibus ; pedunculis unifloris, elongatis, subincrassatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2127. n°. 4.

Ses tiges sont droites, glabres, striées, hautes de six à huit pouces, simples ou munies à leur partie inférieure d'un ou de deux rameaux au plus. Les feuilles sont ailées ; les supérieures composées de folioles linéaires, légèrement dentées vers leur sommet ; les folioles des feuilles inférieures ovales, lancéolées, rétrécies en forme de coin à leur base, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur partie supérieure ; les dentelures terminées par une petite pointe un peu roide.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, soutenues par un pédoncule simple, presque de la longueur des tiges, glabre, trisé, un peu renflé vers son sommet. Le calice est d'une seule pièce, denté à ses bords ; la corolle raillée, d'un jaune-rouge, semblable, par sa forme & sa grosseur, à celle du *tagetes* *pauca*.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. ○ (*Descript. ex Willd.*)

4. TAGÈTE à fleurs blanches. *Tagetes minuta*. Linn.

Tagetes foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, serratis ; serraturis inferioribus, elongatis ; caule paniculato ; pedunculis alternis, unifloris ; calicibus clavatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. 7.

Botanique. Tome VII.

ratis, terminalibus subdecurrentibus ; pedunculis multifloris, squamosis ; floribus corollatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. 5.

Tagetes caule simpliciter, recto ; pedunculis squamosis, multifloris. Linn. Hort. Cliff. 419. — Miller, Dict. n°. 3.

Tagetes multiflora, minuta flore, albicante. Dill. Hort. Eltham. pag. 374. tab. 280. fig. 362.

Cette plante s'élève fort haut. Ses tiges sont droites, simples, glabres, striées, cylindriques, un peu rameuses à leur sommet, garnies de feuilles alternes, ailées, composées de folioles lancéolées, très-étroites, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour ; les folioles terminales un peu décurrentes sur le pétiole commun, routes perforées par des points transparents.

Les fleurs sont petites, blanchâtres, nombreuses, réunies par paquets très-serrés à l'extrémité des petits rameaux & des tiges ; soutenues par des pédoncules courts, très-inegaux, ramifiés, chargés de petites bractées en forme d'écaillés ; les calices rubulés, d'une seule pièce, dentés à leur limbe ; la corolle radiale, peu de demi-fleurons à sa circonférence.

Cette plante croît au Chili. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (*V. v.*)

5. TAGÈTE de Caracas. *Tagetes caracasana*. Humb.

Tagetes foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, apice serratis ; caule corymbofo, erecto ; pedunculis elongatis, unifloris, erectis ; calicibus cylindraceis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. 6.

Tagetes caracasana. Humboldt.

Ses tiges sont droites, glabres, cannelées, divisées, vers leur sommet, en rameaux réunis en corymbe. Les feuilles sont alternes, ailées, composées de folioles linéaires lancéolées, glabres à leurs deux faces, dentées en scie vers leur sommet, point ciliées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires, terminales, formant, par leur ensemble, une sorte de corymbe ; les pédoncules simples, droits ; fort allongés, unifoires ; les calices glabres, cylindriques, tubulés, dentés à leur sommet.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, dans la province de Caracas. ○ (*Descript. ex Willd.*)

6. TAGÈTE à petites feuilles. *Tagetes tenuifolia*.

Tagetes foliis pinnatis, foliolis linearibus, serratis ; serraturis inferioribus, elongatis ; caule paniculato ; pedunculis alternis, unifloris ; calicibus clavatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. 7.

A 222

Tagetes caule ramoso, floribus patulis, subcorymbosis; pedunculis foliosis. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 54. tab. 169.

Vulgairement chinchimali.

Ses tiges sont cylindriques, médiocrement cannelées, très-rameuses, hautes de deux à trois pieds; les rameaux étalés, glabres, un peu rougâtres; les feuilles inférieures presque opposées; les supérieures alternes, toutes ailées, glabres à leurs deux faces; les folioles étroites, linéaires-lanceolées, alternes, dentées en scie à leurs bords.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux, réunies presque en corymbe, assez nombreuses; les pédoncules allongés, feuillés; les folioles étalées. Le calice est simple, oblong, tubulé, à cinq faces, à cinq dents; la corolle radiée, d'un jaune-foncé; les fleurons divisés en cinq découpures aiguës, réfléchies, velues; les demi-fleurons de la circonférence au nombre de cinq, arrondis à leur limbe, échancrés à leur sommet, les semences linéaires, comprimées, un peu plus courtes que le calice, surmontées de cinq filets roides, jaunâtres, aigus, quelquefois comuven; le réceptacle nu.

Cette plante croît au Pérou; elle est cultivée dans le Jardin botanique de Madrid, où elle fleurit au mois de décembre. ○ (*Descript. ex Cavan.*)

7. TAGÈTE à petites fleurs. *Tagetes micrantha.* Cavan.

Tagetes foliis pinnatis, foliis filiformi-subulatis, integerrimis; caule ramoso, aëroso; pedunculis unifloris, foliatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2128. n°. 8.

Tagetes caule tereti, humili; foliis oppositis, laciniatis; laciniis linearibus; flore minuto. Cavan. Ic. Rar. vol. 4. pag. 31. tab. 352.

Cette espèce a le port d'un petit. Ses tiges sont dures, cylindriques, hautes d'environ un pied, très-rameuses; les rameaux glabres, opposés, très-étalés; les feuilles opposées, ailées, les folioles longues, entières, très-étroites, glabres à leurs deux faces, presque filiformes et tubulées, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont solitaires, très-petites, situées à l'extrémité des rameaux, dans leur bifurcation & dans l'aisselle des feuilles supérieures, soutenues par des pédoncules grêles, simples, allongés, uniflores, à peine épaissis à leur partie supérieure. Le calice est glabre, étroit, cylindrique, tubulé, terminé par cinq petites dents aiguës; la corolle composée ordinairement de cinq fleurons dans le centre; leur limbe à quatre divisions aiguës; deux demi-fleurons à la circonférence, petits, un peu ovales, échancrés à leur

sommet; les semences grêles, striées, surmontées de deux filets roides, tubulés.

Cette plante croît au Mexique & dans la Nouvelle-Espagne. ○

8. TAGÈTE luisante. *Tagetes lucida.* Cavan.

Tagetes foliis simplicibus, lanceolatis, reviviscens ferratis, basi ciliatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2126. n°. 1.

Tagetes foliis simplicibus, connatis, ovatis, argenteo ferratis, ciliatis. Cavan. Ic. Rar. vol. 3. pag. 33. tab. 164.

C'est une espèce fort élégante, très-bien distinguée des autres par ses feuilles entières, opposées; agréable par le grand nombre de ses petites fleurs, d'un beau jaune-foncé.

Ses tiges sont droites, roides, glabres, cylindriques, un peu dures, striées, hautes d'environ deux pieds, très-rameuses; les rameaux nombreux, épars, divisés en panicule à leur sommet, garnis de feuilles opposées, schiles, presque connées à leur base, particulièrement les feuilles supérieures, lanceolées, très-entières, glabres à leurs deux faces, finement dentées en scie à leurs bords, un peu ciliées vers leur base, rebutes ou aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont terminales, très-nombreuses, petites, réunies en corymbe, soutenues par des pédoncules presque filiformes, glabres, ramifiés, garnis de petites folioles ou bractées filiformes, épaisses. Les calices sont longs, glabres, cylindriques, point anguleux ni toruleux, terminés à leur antice par des dents courtes, aiguës; les corolles d'un beau jaune-foncé; les demi-fleurons un peu arrondis, légèrement crénelés à leur sommet. Les semences sont grêles, striées, presque anguleuses, allongées, surmontées à leur sommet d'une petite membrane blanchâtre, presque tubulée, inégale à ses bords, traversée par deux filets droits, tubulés, caractères qui rapproche cette espèce des *heterosperma* de Cavanilles, ou peut-être la range dans un genre particulier.

Cette espèce croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 2 (V. v.)

9. TAGÈTE aigrettée. *Tagetes papposa.* Mich.

Tagetes foliis oppositis, subpinnatis; calicibus caliculatis; seminibus papposis; pappo simplicibus. (N.)

Tagetes foliis anguste duplicato-pinnatifidis; pedunculis brevissimis, foliosis; calicibus involucreculatis; radiis fasciatis; seminibus pappo fusculato piloso. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 132.

Cette plante s'écarte des autres espèces de ce

genre par plusieurs caractères particuliers qui pourroient le servir de base à l'établissement d'un genre nouveau, d'autant plus qu'elle n'appartient que très-faiblement aux tagètes.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & demi à deux pieds, glabres, cylindriques, très-rameuses; les rameaux droits, élancés, épars, très-rapprochés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, ailées; les folioles très-étroites, allongées, glabres à leurs deux faces, pinnatimées ou finement incisées; les découpures aiguës, presque tubulées.

Les fleurs sont jaunes, axillaires, latérales, les unes solitaires, d'autres réunies en petits paquets: les pédoncules sont très-courts, simples ou un peu rameux, glabres, feuillés. Le calice est divisé profondément en plusieurs découpures oblongues, linéaires, presque obtuses, un peu anguleuses sur leur dos, entourées de quelques folioles étroites, qui forment presque un second calice, à peu près de la même longueur que le calice commun. La corolle n'est presque composée que de filets: on y observe rarement de demi-fleurons à la circonférence. Les filamens sont bruns, oblongues, petites, anguleuses, un peu pubescentes, surmontées d'une arête de pois simples, roides, un peu rosciformes.

Cette plante croît en Amérique, sur les rives sablonneuses & inondées du Mississipi. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

TALAUUMA. C'est un arbre de l'Amérique, qui ressemble beaucoup aux magnoliers, tant par son port que par les caractères de sa fructification, mais qui cependant en diffère en plusieurs points essentiels, qui ont déterminé M. de Jussieu à en former un genre particulier, en lui conservant son nom. Cet arbre n'est encore connu que par le dessin qui se trouve dans les manuscrits de Plumier, vol. 6, planche 90, & par un exemplaire que M. de Jussieu possède en herbier. Les fleurs ressemblent beaucoup à celles des magnoliers. Le calice, les pétales, les étamines, & peut-être les ovaires, n'en sont point différens; mais le fruit est en forme de cône ou de pomme de pin, grand, ovale, composé à l'extérieur d'écaillés épaisses, granuleuses, tuberculeuses, persistantes; son intérieur est d'une substance dure, ligneuse, percée, dans son contour, de plusieurs cavités en forme de loges, dans chacune desquelles se trouve une semence solitaire. Les feuilles sont amples, grandes, coriaces; les fleurs très-grandes, solitaires, terminales, très-odorantes. (Jussieu, *Gener. Plant.* pag. 281.)

TALIGALE. *Taligalea.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, tubulées, de la famille des gaulthiées, qui a des tap-

ports avec les *spilmannia*, & qui comprend des herbes ou arbrutes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, les fleurs disposées en épis terminaux, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle tubulée; le limbe à cinq découpures; quatre étamines didynames; un stigmate bifide; une base à quatre semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, à cinq divisions aiguës, persistantes.

2°. Une corolle tubulée; le tube cylindrique, dilaté à la partie supérieure; le limbe presque plane, à cinq découpures un peu inégales, réfléchies, aiguës.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont insérés à la base du tube de la corolle, saillans, deux plus courts, filiformes, terminés par des anthères sagittées.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, surmonté d'un style droit, filiforme, de la longueur de deux plus longues étamines, terminé par un stigmate à deux divisions aiguës, divergentes.

Le fruit est une baie presque globuleuse, sèche, enveloppée à la partie inférieure par le calice persistant, à une seule loge, renfermant quatre semences presque ovales.

ESPÈCES.

1. **TALIGALE champêtre.** *Taligalea campestris.* Aublet.

Taligalea foliis lanceolatis ovatis, subserratis, scabris; bracteis sessilibus, flore longioribus.

Taligalea campestris. Aublet, Guian. vol. 2, pag. 625. tab. 252. — Lam. Ill. Gen. tab. 543.

Amasonia erubra. Linn. f. Suppl. 294. — Vahl, Fl. bot. 2. pag. 51. — Lam. Dict. vol. 1. pag. 125. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 394. n°. 1.

Cette plante, qui est bien du même genre que l'*amasonia* de Linné fils, parait aussi être la même espèce; elle a déjà été mentionnée dans cet ouvrage, à l'article *AMASONIA*, & M. Lamarck avoit également soupçonné qu'elle ne pouvoit différer des *taligalea* d'Aublet.

Ses tiges sont droites, herbacées, cylindriques, simples, garnies de feuilles alternes, pétiolées, assez grandes, ovales-lancéolées, rudes au toucher, lâchement dentées en scie à leur contour, rétrécies presque en coin à leur base, acuminées à leur sommet, longues d'environ trois pouces sur

un pouce & demi ou deux pouces de large, chargés de nervures peu saillantes, presque opposées, parallèles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une grappe droite, terminale, simple; les pédoncules courts, pubescens, chargés d'une, mais plus ordinairement de trois fleurs pédicellées; à la base de chaque pédoncule, une bractée ovale, entière, plus longue que les fleurs; les bractées inférieures médiocrement pétioolées; les supérieures sessiles & plus perites. Le calice presque glabre, divisé à son orifice en cinq découpures droites, ovales, aiguës. La corolle est jaune, tubulée; le limbe plane, plus court que le tube, à cinq lobes aigus & réfléchis à leur sommet. Le fruit est une baie sèche, ovale, arrondie, très-glabre, de la grosseur d'une petite noisette.

Cette plante croît dans la Guiane & à Surinam.

2. TALIGALE pourprée. *Taligala punicea*.

Taligala foliis lanceolato-ovatis, serratis, levibus; bracteis sessilibus, flore longioribus.

Amafina punicea. Vahl, *Eglog.* 2. pag. 51. — *Wild. Spec. Plant.* vol. 3. pag. 394. n°. 2.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, en diffère par ses tiges ligneuses, par ses stigmates simples, par ses fruits à quatre semences.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont hautes de deux ou trois pieds, rameuses; les rameaux droits, longs d'un pied, cylindriques, très-simples, de couleur brune, un peu pubescens, garnis de feuilles écartées, pétioolées, elliptiques-lancéolées, longues de deux ou trois pouces; les inférieures ovales, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, inégalement dentées en scie, velues en dessous dans leur jeunesse, glabres à leurs deux faces dans leur vieillesse, velues seulement à leurs bords; les dentelures presque mucronées.

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale, longuement pédonculée, longue de deux ou trois pouces & plus; les fleurs alitrines, presque unilatérales; les inférieures réunies au nombre de trois sur le même pédicelle; les supérieures solitaires; des bractées ovales, pétioolées, mucronées, dentées en scie, velues en dessous, ainsi que les pédoncules; de couleur écarlate en dessous, un peu plus longues que les pédicelles. Le calice est pubescent, à cinq découpures ovales, acuminées & ciliées à leur sommet; la corolle d'un rouge écarlate; le tube un peu comprimé; la découpure supérieure du limbe un peu plus étroite; les autres ovales; quatre filaments inclinés, plus longs que la corolle; les anthères oblongues; un ovaire globuleux; un style filiforme; un stigmate aigu. Le fruit est une baie oblongue, un peu plus

grosse qu'un pois, renfermant quatre semences convexes en dehors.

Cet arbrisseau croît à l'île de la Trinité. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

TALIN. *Talinum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des portulacées, qui a de grands rapports avec les pourpiers, & qui comprend des arbrisseaux ou arbrutes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont grasses, épaisses, la plupart alitrines, quelquefois pileuses dans leurs aisselles; les fleurs terminales, paniculées ou en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux folioles; cinq pétales; environ douze étamines; un style; trois stigmates; une capsule à trois valves; plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, divisé profondément en deux découpures comprimées.

2°. Une corolle à cinq pétales planes, ouverts, obtus ou un peu aigus, plus longs que la calice.

3°. Une douzaine d'étamines environ, dont les filaments sont inégaux, plus courts que la corolle, terminés par des anthères petites, ovales.

4°. Un ovaire ovale ou arrondi, inférieur, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par trois stigmates aigus.

Le fruit consiste en une capsule ovale, à une seule loge, à trois valves concaves, contenant un grand nombre de semences petites, un peu arrondies, attachées à un réceptacle filiforme & central.

Observations. Les talins avoient d'abord été confondus avec les pourpiers, dont ils ont les attributs extérieurs dans leur port; ils en diffèrent néanmoins en ce que les pourpiers sont des plantes herbacées, la plupart annuelles, tandis que les talins sont des arbrisseaux ou des arbrutes; mais le caractère qui les distingue essentiellement des pourpiers consiste dans leur capsule, qui est partagée en trois loges longitudinales, au lieu que celle des pourpiers n'a qu'une seule loge, qui s'ouvre transversalement. Au moyen de cette réforme, les limites de ces deux genres sont beaucoup mieux tracées, & ces genres eux-mêmes deviennent naturels, & ne laissent aucun embarras, aucune incertitude dans la détermination des espèces de l'un ou de l'autre genre. Les talins jouissent des mêmes propriétés que les pourpiers: leurs feuilles, grasses, épaisses, sont un peu acres, diurétiques,

antiscorbutiques; elles peuvent être employées comme assainissement. Mangées cuites, elles rafiaichissent.

E S P È C E S.

1. TALIN triangulaire. *Talinum triangulare*.

Talinum foliis planis, canaliculatis, cuneiformibus, emarginatis, mucronatis; racemo simplici; pedunculo triquetro. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 862. n°. 1.

Portulaca (racemosa), foliis obovatis, planiusculis; racemo simplici, triquetro. Linn. Spec. Plant. edit. 2. pag. 640.

Portulaca (triangularis), pedunculis multifloris, triangularibus. Jacq. Amer. 147, & Obierv. vol. 1. pag. 35. tab. 23.

Rulingia (triangularis), foliis obovatis, planiusculis; racemo simplici; pedunculo triquetro. Ehrh. Beitr. 3. pag. 134.

Chamaecissus americana, portulacae-folio, flore albo. Herm. Paradis. pag. 21.

Helianthum frutescens, portulacae-folio. Plumier, Amer. Spec. 7. tab. 150. fig. 2.

Cette plante a des tiges frutescentes, glabres, cy indriques, épaisses, presque couchées ou renversées, garnies de feuilles alternes ou éparies, épaisses, charnues, presque ovales, rétrécies à leur base en forme de coin, élargies à leur partie supérieure, mucronées & échancrées à leur sommet, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, planes, un peu canaliculées.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en une grappe simple, droite. Les pédoncules sont glabres, triangulaires; ils soutiennent plusieurs fleurs pédicellées. Le calice est lisse, verdâtre, à deux folioles un peu planes, presque obtuses. La corolle est blanche ou jaunâtre, composée de cinq pétales ouverts, un peu oblongs; les étamines inégales, plus courtes que les pétales; l'ovaire glabre, presque globuleux; il lui succède une capsule à une seule loge, qui se sépare en trois valves concaves, renfermant plusieurs semences planes, fort petites, attachées à un placenta central.

Cette plante croit en Amérique, sur les rives maritimes. h

2. TALIN à feuilles épaisses. *Talinum crassifolium*.

Talinum foliis planis, obovatis, mucronatis; corymbo elongato; pedunculis triquetris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 862. n°. 2.

Portulaca (crassifolia), foliis lanceolatis, planis; racemis triquetris; caule erecto. Murray, Syst. veget. edit. 14. pag. 466. — Jacq. Hort. 3. tab. 52.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la *Talinum triangulare*; elle s'en distingue par ses feuilles plus allongées, point échancrées à leur sommet; par ses fleurs en corymbe & non en grappe simple. Ses tiges sont droites, ligneuses, glabres, garnies de feuilles alternes, épaisses, succulentes, planes, en ovale renversé, plus larges & plus allongées que celles de l'espèce précédente, entières à leurs bords, point échancrées à leur sommet, mucronées, rétrécies à leur base.

Ses fleurs forment de petits corymbes à l'extrémité des tiges, peu garnis, composés de pédoncules grêles, triangulaires, supportant quelques fleurs pédicellées. Le calice est divisé en deux folioles courtes; la corolle rouge, plus longue que le calice; une capsule à une seule loge, s'ouvrant en trois valves.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. On la cultive à Vienne. h

3. TALIN à feuilles d'orpin. *Talinum anacampseros*.

Talinum foliis ovatis, subius convexo-gibbis; racemo simplici; pedunculo tereti. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 862. n°. 3.

Portulaca (anacampseros), foliis ovatis, gibbis; pedunculo multifloro; caule fruticoso. Miller, Dict. n°. 3.

Rulingia (anacampseros), foliis ovatis, gibbis; racemo simplici; pedunculo tereti. Ehrh. Beitr. 3. pag. 133.

Anacampseros foliis ovatis, convexis, acutiusculis. Hort. Upsal. 146.

Anacampseros foliis acuminatis. Hort. Cliff. 207. — Royen, Lugd. Bat. 412.

Telephium folio globoso. Dillen. Hort. Elch. pag. 375. tab. 281. fig. 363.

Portulaca africana, sempervirens, flore rubicunda. Commel. Hort. 2. pag. 177. tab. 89. — Rai, Suppl. pag. 507.

Oxalis affinis, planta aphylla, mammillaris. Burm. Afric. pag. 76. tab. 30. fig. 2. *Mediocris*.

On distingue cette plante à ses feuilles extrêmement épaisses & presque globuleuses, & aux petites touffes de poils situées dans leurs aisselles. Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques, épaisses, hautes d'environ trois à cinq pieds, garnies, principalement à leur partie inférieure, de feuilles tres-succulentes, glabres, ovales, un peu arrondies, fortement convexes, surtout à leur face inférieure, vertes, un peu pointues à leur sommet, pileuses dans leurs aisselles.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges,

en une grappe simple, allongée, peu garnie; les pédoncules glabres & cylindriques, soutenant plusieurs fleurs; le calice divisé en deux folioles concaves, aiguës; la corolle rougeâtre, ouverte, à cinq pétales assez grands, en cœur renversé, élargis, obtus à leur sommet, un peu aigus à leur base; les étamines nombreuses; les capsules divisées en trois valves.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Hy (V. v.)*

4. TALIN ligneux. *Talinum fruticosum*.

Talinum foliis obovatis, planis, emarginatis; corymbis terminali; calicibus pentaphyllis; caule erecto. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. n^o 7.

Portulaca (fruticosa), foliis obovatis, planiusculis; pedunculis racemosis; calicibus pentaphyllis; caule fruticoso. Linn. Syst. veget. pag. 371.

Portulaca (paniculata), foliis ovatis, planis; panicula racemosa. Linn. Spec. Plant. pag. 640.

Portulaca americana, latifolia, erecta, foliis alous. Commel. Hort. vol. 1. pag. 7. tab. 4.

Portulaca facie maritima, fruticosa, erecta, americanâ. Sloan, Jam. pag. 87. Hist. 1. pag. 205.

Anacampseros foliis radicalibus, mollibus, ovatis, glabris; caulis assurgenti, paniculato. Brown, Jam. 234.

Ses tiges sont droites, glabres, ligneuses, garnies, particulièrement à leur partie inférieure, de feuilles grasses, molles, épaisses, glabres à leurs deux faces, planes, larges, en ovale renversé, très-entières à leurs bords, obtuses, échancrées à leur sommet, rétrécies presque en pétiole à leur base.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges; elles forment une panicule étalée, composée de ramifications qui sont autant de grappes partielles; les fleurs pédicellées; le calice glabre, divisé en cinq folioles courtes, ovales-lancéolées; la corolle blanche; les pétales plus longs que le calice. Le fruit est une capsule fort petite, sphérique, à une seule loge, à trois valves, s'ouvrant de leur base à leur sommet, renfermant des semences arrondies, lenticulaires, très-glabres, luisantes & noires.

Cette plante croît dans l'Amérique, le long des côtes maritimes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Hy (V. v.)*

5. TALIN paniculé. *Talinum patens*.

Talinum foliis ovatis, planis; panicula terminali; pedunculis dichotomis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 863. n^o 4.

Portulaca (patens), foliis lanceolata ovatis, planis; panicula ramosa; calicibus diphyllis. Jacq. Hort. tab. 151.

Portulaca (paniculata), floribus paniculatis. Jacq. Stirp. Amer. 148.

Rulingia (patens), foliis lanceolata ovatis, planis; panicula ramosa. Ehrh. Beitr. 3. pag. 135.

Cette plante a des tiges droites, ligneuses, flexibles, hautes d'environ un pied, garnies de rameaux lisses, alternes, tétragones; les inférieurs plus allongés; les feuilles alternes, médiocrement pétioles, un peu succulentes, ovales lancéolées, fragiles, très-entières, relevées en carène, planes à leur face extérieure, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux surfaces.

Les fleurs forment une panicule terminale, ample, très-étalée, allongée; les rameaux filiformes, dichotomes; les pédicelles courts, inégaux. Le calice est glabre, rougeâtre, à deux folioles; la corolle rouge, composée de cinq pétales ovales, obtus, plus longs que les calices; les filaments plus courts que les pétales, les anthères jaunes, le style divisé en trois; une capsule globuleuse, à une seule loge, à trois valves, contenant plusieurs semences noires.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Hy (V. v.)*

6. TALIN jaune. *Talinum reflexum*. Cavan.

Talinum foliis lanceolato-ovatis, sessilibus, oppositis; floribus panicula ramosa. Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. 1. tab. 1. — Lam. Ill. Gen. tab. 402.

Cette espèce se rapproche beaucoup du talin paniculé; elle en diffère par ses feuilles opposées & par ses fleurs jaunes. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, presque ligneuses; quelquefois elles ne durent qu'un an. Les feuilles sont opposées, presque sessiles, ovales-lancéolées, épaisses, entières, glabres à leurs deux faces, rétrécies en pétiole à leur base, un peu aigus à leur sommet, longues d'environ deux pouces, tendres & caissantes.

Les fleurs sont disposées en une ample panicule terminale, lâche, ramifiée; les rameaux opposés, ramifiés, presque filiformes, quelques-uns inférieurs, sortant de l'aisselle des feuilles; les pédoncules partels, courts, inégaux; le calice glabre, à deux folioles courtes, ovales, un peu obtus; la corolle jaune; les pétales au moins une fois plus longs que le calice, ovales, un peu arrondis, obtus à leur sommet, aigus à leur base; les filaments plus courts que la corolle; les anthères fort petites; le stigmate divisé en trois découpures subulées, aiguës; celle du milieu un peu plus longue; la capsule glabre, ovale-elliptique, à trois valves;

les semences très-petites, nombreuses, pélicellées, insérées sur un placent central, filiformes.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (*V. v.*)

7. TALIN cunéiforme. *Talinum cuneifolium*.

Talinum foliis cuneiformibus, panicula terminali, pedunculata trifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. n°. 5.

Portulaca (cuneifolia), foliis cuneiformibus, planis; pedunculis inferioribus racemi trifloris; calicibus diphyllis. Vahl, Symbol. 1. pag. 33.

Orygia (portulacifolia), foliis alternis, cuneatis, glabris. Forsk. Descript. 103.

On distingue cette espèce du *talinum patens* à ses pédoncules beaucoup plus épais, les inférieurs terminés par trois fleurs pédicellées.

Ses tiges sont droites, ligneuses, hautes d'environ trois pieds, garnies de feuilles alternes, sessiles, épaisses, cunéiformes, planes, longues d'un pouce, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, souvent mucronées, rétrécies en coin à leur base.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, étalée, dont les rameaux inférieurs supportent une petite grappe de trois fleurs; les supérieurs presque ombellés. Le calice est glabre, divisé en deux folioles caduques, inégales, ovales, obtuses, un peu mucronées, la plus longue plus fortement obtuse; la corolle d'un violet rougeâtre; les pétales ouverts, un peu arrondis, plus longs que le calice; les filamens verdâtres, nombreux, filiformes, plus courts que les pétales; les anthères oblongues, inclinées, jaunes, à deux loges; l'ovaire globuleux; le style filiforme; trois stigmates aigus, divergens, rougeâtres; une capsule globuleuse, à une seule loge, à trois valves; plusieurs semences glabres, noirâtres, petites, comprimées.

Cette plante se rencontre dans l'Arabie heureuse. *h*

8. TALIN couché. *Talinum decumbens*.

Talinum foliis obovatis, planis, mucronatis; racemis axillaribus; calicibus pentaphyllis; caule decumbente. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 864. n°. 6.

Portulaca (decumbens), foliis obovatis, mucronatis; calicibus pentaphyllis; caule frutesco, decumbente. Vahl, Symbol. 1. pag. 33.

Orygia (decumbens), caule decumbente, fruticoso; foliis ovatis, natis, subsarinateis. Forsk. 1 flor. ægypt. arab. pag. 103.

Cette plante n'appartient guère à ce genre que par son port & par quelques caractères généraux; elle s'en écarte par le nombre des parties de la corolle, du calice, des valves de la capsule. Ses tiges sont inclinées, presque couchées, ligneuses, garnies de feuilles planes, ovales, bleuâtres & un peu farineuses, entières, rétrécies à leur base, aigues & mucronées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires; le calice divisé en cinq folioles vertes, ovales, aigues; la corolle d'un rouge violet; les pétales presque au nombre de vingt, lancéolés; cinq styles filiformes, terminés par des stigmates simples & violets; une capsule globuleuse, environnée, à la partie inférieure, par le calice persistant; à cinq loges, à cinq valves, renfermant un grand nombre de semences fort petites.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. *h*

TALISIER. *Tulipa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs polygames, polypétales, de la famille des savoniers, qui a des rapports avec les *spindus*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, ailées avec une impaire; les fleurs disposées en grappes paniculées, latérales ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs polygames; un calice à cinq divisions; une corolle à cinq pétales extérieurs, cinq autres pétales intérieurs; huit étamines; un style court; une capsule à quatre loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice campanulé, à cinq découpures oblongues, aigues.

2°. Une corolle à cinq pétales extérieurs, linéaires, oblongs, plus longs que le calice; cinq intérieurs, en forme d'écaillés ou de seconde corolle, insérés sur les pétales extérieurs, vers leur base, de la même longueur, un peu velus.

3°. Huit à dix étamines, dont les filamens sont courts, insérés sur le réceptacle, terminé par des anthères ovales.

Un corps charnu, en anneau, filant, lobé, situé entre les étamines & la corolle.

4°. Un ovaire (dans les fleurs hermaphrodites; nul dans les fleurs males) ovale, velu, supérieur, surmonté d'un style plus court que la corolle, terminé par un stigmate presque à deux lobes.

Le fruit est une capsule à cinq angles, à quatre (ou cinq) loges.

1. TALISSIER à grappes. *Talisia henaphylla*.

Talisia racemis simplicibus; calicibus petalis squamatis. Vahl, Egl. Amer. Fasc. 2. pag. 29.

Cet arbre à des rameaux cylindriques, revêtus d'une écorce cendrée, glabres, couverts de points faillans, très-nombreux, divisés en d'autres rameaux alternes, très-étalés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, composées de quatre ou six paires de folioles opposées ou alternes, pétiolées, oblongues ou lancéolées, acuminées, très-entières, glabres à leurs deux faces, luisantes & veinées, de la consistance de celles des lauriers, longues de quatre à six pouces; le pétiole arrondi, mucroné à son sommet.

Les fleurs forment des grappes axillaires, simples, longues de deux à trois pouces, réunies au nombre de six ou huit : ces fleurs sont géminées, alternes, polygames. Le calice est campanulé, à cinq découpures lancéolées, un peu obtuses, un peu pubescentes; la corolle double; chacune à cinq pétales; les extérieurs onguiculés, glabres, linéaires, de moitié plus longs que le calice; les cinq intérieurs insérés sur le milieu des extérieurs, de même longueur, roussâtres & velus à leur côté inférieur; huit étamines appliquées contre l'ovaire; les anthères petites, droites, oblongues; l'ovaire ovale, velu, blanchâtre, un style un peu plus court que la corolle; le stigmate légèrement échancré. Les fleurs mâles offrent les mêmes caractères, mais elles n'ont point d'ovaire.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. *h* (*Descript. ex Vahl.*) Elle diffère du *Talisia rosea* par ses folioles moins nombreuses, plus rapprochées, plus étroites.

2. TALISSIER rose. *Talisia rosea*.

Talisia racemis decompositis; calicibus petalis brevioribus. Vahl, Egl. Amer. Fasc. 2. pag. 30.

Talisia guianensis. Aubl. Guian. pag. 349. tab. 136. — Lam. Illustr. Gen. tab. 310.

Ses tiges se divisent en rameaux anguleux, d'un brun pourpre, garnis de feuilles alternes, pétiolées, longues d'un pied, ailées, composées au moins de six paires de folioles pétiolées, les inférieures alternes, les supérieures opposées, elliptiques, glabres à leurs deux faces, très-entières, acuminées à leur sommet, un peu luisantes, finement veinées & réticulées, longues de cinq à six pouces; le pétiole commun cylindrique, d'un pourpre-foncé, glabre, mucroné à son sommet; les pédicelles courts, épais.

Les fleurs forment une panicule terminale, étalée, longue d'un demi-pied; les ramifications anguleuses, garnies de bractées ou de folioles sub-

lées, les inférieures longues d'un pouce, dentées en scie; les dentelures tomenteuses. Les fleurs hermaphrodites ont un calice à cinq découpures oblongues, à peine pubescentes, obtuses, trois fois plus courtes que la corolle; celle-ci est double; les cinq pétales extérieurs linéaires, oblongs, plans, glabres; les intérieurs insérés à la base des premiers, lancéolés, de la même longueur, couverts intérieurement de poils roussâtres; un rebord charnu, faillan, lobe, situé entre les étamines & la corolle; huit à dix filaments insérés sur le réceptacle. Le fruit est une capsule à cinq angles.

Cette espèce croît dans la Guiane. *h*

TAMAGALI. *Karin-kara.* Rheed, Hort. Malab. vol. 4. pag. 49. tab. 23.

Arbre du Malabar, d'une médiocre grandeur, dont la famille & le genre ne sont pas connus, qui paroît avoir, par ses fleurs & ses fruits, des rapports avec les *gongias*, & appartenir à la famille des légumineuses; mais il s'écarte des unes & des autres par son port, par la forme de ses feuilles: il nous manque d'ailleurs des détails trop essentiels à connoître, & d'après lesquels seuls on peut se permettre de prononcer.

D'après Rheed, ses racines sont roussâtres, revêtues d'une écorce blanche; son tronc peu épais, divisé en rameaux étalés, garnis de feuilles épaisses, médiocrement pétioles, simples, très-entières, épaisses, ovales-oblongues, acuminées, glabres à leurs deux faces, d'un vert-foncé, luisant, un peu jaunâtres en dessous, marquées de nervures latérales, simples, faillantes.

Les fleurs sont disposées en grappes médiocres, presque simples, latérales & terminales; elles sont blanches, assez semblables à celles du genêt. Le calice est vert, à cinq découpures acuminées; la corolle composée de cinq pétales irréguliers; le supérieur (la carène) plus grand que les autres, redressé, concave, contenant les étamines. Le fruit est une baze globuleuse, arrondie, de la grosseur d'une noix ordinaire, ltrée, chargée de deux protubérances à son sommet. Son écorce est d'un vert jaunâtre, rempli d'une chair blanchâtre, molle, épaisse, renfermant un noyau à deux ou trois divisions.

Cet arbre se rencontre dans les grandes forêts du Malabar. Ses fleurs sont odorantes, leur saveur aigre. *h*

TAMALASSIER. *Alliaria.* *Caja baweng.* Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 81. tab. 20.

C'est un très-grand arbre, dont le tronc est très-épais, les branches nombreuses, étalées, chargées de rameaux glabres, verdâtres, ltrés, un peu anguleux, fournissant des feuilles alternes, pétioles, ovales-lancéolées,

ovales-lancéolées, glabres à leurs deux faces, vertes, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, marquées en dessous de nervures simples, latérales, alternes, longues de six à neuf pouces, sur trois ou quatre de large, répandant une forte odeur d'ail, surtout lorsqu'on les froisse entre les doigts.

De la base des rameaux sortent de longues grappes de fleurs, qui produisent des fruits de la grosseur d'une moyenne prune, charnus, blancs ou un peu verdâtres en dedans, renfermant d'un à trois noyaux, qui ont également une très-forte odeur d'ail; ils achèvent de mûrir, & tombent dans les mois de février & de mars, & sont très-recherchés par les sangliers. Les habitants de l'île d'Amboine les substituent souvent à l'ail pour le même usage; ils emploient aussi les feuilles dans l'assaisonnement de leurs ragoûts. Néanmoins l'usage en est bien plus rare aujourd'hui. Le bois, léger & assez durable, est travaillé & employé à la construction des maisons & à la couverture des toits.

Cet arbre n'est pas très-commun. On le rencontre isolé dans les grandes forêts de l'île d'Amboine. Sa fructification n'est pas assez connue pour déterminer à quelle famille ou à quel genre il appartient. h

TAMARINIER. *Tamarindus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les caroubiers (*ceratonia*) & les *parkinsonia*; il comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, les fleurs disposées en grappes terminales, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre divisions; trois pétales; trois étamines monadelphes; une gousse pulpeuse.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice turbiné à sa partie inférieure, divisé à son limbe en quatre découpures profondes, ovales-oblongues, colorées, caduques.

2°. Une corolle composée de trois pétales ovales-oblongs, ondulés, presque égaux, ascendants, avec un épace vide pour en recevoir un quatrième & inférieur, qui manque toujours.

3°. Trois étamines fertiles, monadelphes à leur base, insérées dans la partie vide du calice; les filaments subulés, arqués vers les pétales; quelques autres filaments stériles, fort petits, placés parmi les premiers; les anthères ovales.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, un peu pédonculé.

Botanique. Tome VII.

cellé, surmonté d'un style arqué & subulé, terminé par un stigmate un peu épais.

Le fruit est une gousse allongée, un peu comprimée, obtuse, ayant une écorce double, remplie de pulpe entre les deux écorces, à une seule valve, d'une à trois loges.

Les semences sont luisantes, comprimées, anguleuses, assez grandes, souvent au nombre de trois.

ES PÈ C E.

TAMARINIER des Indes. *Tamarindus indica*. Linn.

Tamarindus foliis pinnatis, multijugis; floribus racemosis. (N.)

Tamarindus. Linn. Syst. veget. pag. 81. — Hort. Cl. f. 18. — Mater. medic. 41. — Hort. Upf. 15. — Flor. zeyl. 14. — Royen, Lugd. Bat. 461. — Rumph. Amboin. 2. pag. 99. tab. 23. — Loxfler, Iter, 210. — Brown, Jm. 125. — Jacq. Amer. pag. 10. tab. 10. & 179. fig. 98. — Barm. Flor. Ind. pag. 15. — Tournef. Act. gall. ann. 1699. pag. 69. — Blackw. tab. 201 & 221. — Mill. Dict. — Swartz, Observ. 24. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 577. — Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 95. n°. 417. tab. 15.

Tamarindus occidentalis. Gaertner, de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 310. tab. 146. fig. 2.

Siliqua arabica, quæ tamarindus. C. Bauh. Pin. 403.

Tamarindus. Rai, Hist. 1743. — Tournef. Inst. R. Herb. 660.

Tamarindi. J. Bauh. Hist. 1. pag. 422. Icon.

Balam-pulli. Rheed. Malabar. vol. 1. pag. 39. tab. 25. — Rumph. Amboin. vol. 2. tab. 23.

Cet arbre parvient à une assez grande hauteur; son tronc est épais, revêtu d'une écorce brune; il se divise en branches étendues au loin, & en rameaux diffus, alternes, un peu cendrés, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées avec une impaire, composées de folioles très-nombreuses, au nombre de quinze à dix-huit paires, linéaires, presque sessiles, opposées, entières, longues d'un demi-pouce à un pouce, très-obtuses & quelquefois échancrées à leur sommet, glabres à leurs deux faces ou à peine pubescentes dans leur jeunesse, d'un vert luisant, marquées de nervures simples, latérales, confluentes vers le bord des feuilles.

Les fleurs sont disposées en petites grappes lâches, un peu pendantes, garnies d'environ cinq à six fleurs, les unes latérales, d'autres terminales; les pédoncules filiformes, un peu arqués, alternes, plus longs que les fleurs. Le calice, sur-

B b b

biné & strié à sa base, se divise à son limbe en quatre folioles colorées, un peu pubescentes, très-caduques; la corolle composée de trois pétales presque égaux, relevés, ondulés, obtus; les étamines réunies en un seul paquet à leur base, trois fertiles, quatre autres plus petites, stériles, & deux filaments stériles. L'ovaire est pédicellé; les gouffes allongées, comptinées, obtuses, remplies, entre une double écorce, d'une pulpe épaisse; longues de trois à cinq pouces & plus, constamment fermées, contenant d'une à trois semences dans les individus nés en Amérique, plus nombreuses dans ceux des Indes orientales.

Cet arbre croît dans les deux Indes, en Égypte, dans l'Arabie. M. Ledru m'en a communiqué un exemplaire, qu'il a recueilli à l'île de Saint-Thomas. (P. f.) On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. h

La pulpe des gouffes du tamarinier est d'une acidité agréable au goût, & la partie mucilagineuse, qui est très-abondante, la rend laxative. On la connoît sous le nom de *tamarin*, qui peut être employé avec la casse lorsqu'il s'agit de lâcher doucement le ventre : on le mêle aussi avec des purgatifs plus puissans pour en corriger l'acrimoine. Outre la vertu purgative, cette pulpe a encore la propriété de tempérer l'effervescence des humeurs & de la bile, & de s'opposer à la putréfaction. On peut en préparer une boisson saine & agréable dans les maladies putrides; mais on ne doit s'en servir qu'avec précaution dans les maladies de poitrine, parce que l'acide qui y domine, irrite & excite la toux.

Le tamarinier produit quelquefois, dans les étés fort chauds, une certaine substance visqueuse, acide & rouilleuse, qui, lorsqu'elle est sèche, imite la crème de tarte par sa dureté & par sa blancheur. Bèlon rapporte que, lorsque les Turcs & les Arabes sont sur le point de faire un long voyage pendant l'été, ils font provision de tamarin pour se rafraîchir; ils font confire dans le sucre ou dans le miel des gouffes de tamarin, soit vertes, soit mûres, pour les emporter avec eux lorsqu'ils voyagent dans les déserts de l'Arabie.

TAMARIX. *Tamarix*. Genre de plantes dicotyledones, à fleurs complètes, polypétalées, qui a de grands rapports avec la famille des portulacées, se rapproche des *telephium* & des *rosetta*, & ressemble des arbrisseaux ou arbuscules, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont le port approche de celui des cyprès ou de la sabine, ayant des feuilles petites, alternes, presque en forme d'écaillés; les fleurs en épis simples ou paniculés.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; cinq pétales; cinq à

dix étamines; trois stigmates sessiles; une capsule triangulaire, à une loge, à trois valves; les semences revêtues d'un duvet laineux.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq divisions droites, obtuses, persistantes, de moitié plus courtes que la corolle.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ovales, concaves, obtus, ouverts, alternes avec les divisions du calice.

3°. Cinq à dix étamines libres, quelquefois monadelphes, dont les filaments sont capillaires, les anthères attardées.

4°. Un ovaire libre ou supérieur, triangulaire, acuminé; point de style; trois stigmates oblongs, roulés en dehors & plumeux.

Le fruit consiste en une capsule oblongue, triangulaire, acuminée, à une seule loge, à trois valves.

Plusieurs semences couvertes d'un duvet laineux, petites, attachées à des placenta linéaires, à thores au milieu des valves; point de périsperme; l'embryon droit; la radicle inférieure.

Observations. Les tamarix sont de très-jolis arbrisseaux qui garnissent le bord des ruisseaux & des rivières voisins des côtes maritimes, & où ils produisent un très-bel effet par leur élégance & leur délicatesse. Leurs branches se divisent en rameaux souples, touffus, très-nombreux, chargés à la vérité de très-petites feuilles, mais d'un vert agréable, relevés par des épis de fleurs blanches, paniculées, d'où résulte un massif de verdure qui se meut par ondulations au moindre souffle des vents, & ajoute, par ce léger mouvement, à la fraîcheur de l'ombre que vient y chetcher le voyageur accablé de chaleur.

Ce genre est très-naturel, & les espèces qu'il renferme, ont toutes le même caractère de famille; mais cette famille lui peut-être pas celle à laquelle M. de Jussieu les a rapportées, puisqu'elles diffèrent des portulacées par l'absence du périsperme, de celle des cierge par leur fruit capsulaire. Elles ont plus de rapport avec les *reaurmia*, ainsi que l'observe M. Decandolle; mais elles en diffèrent encore par leur capsule, qui n'est qu'à une loge dans les *tamarix*, à cinq loges dans les *reaurmia*.

E S P È C E S.

1. TAMARIX de France. *Tamarix gallica*. Linn.
Tamarix floribus pentandris, spicis lateralibus;

foliis lanceolatis, amplexicaulis, imbricatis.
Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1498. n° 1.

Tamarix floribus pentandris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 186. — Hort. Cliff. 111. — Royen, Lugd. Bat. 436. — Sauvag. Monsp. 45. — Mater. medic. pag. 89. — Miller, Dict. n° 1. & Icon. tab. 261. fig. 1. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 116. — Medic. in Obs. Soc. Econ. Lutr. 1774. p. 278. — Blackw. tab. 331. fig. 2. — Willd. Arbr. 380. — Pallas, Flor. ross. vol. 2. pag. 72. — Lam. Ill. Gener. tab. 219. fig. 1. — Desfont. Flor. atlant. v. 1. pag. 269.

Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris.
Hort. Upfal. 99.

Tamarix altera, folio tenuiore, seu gallica. C. Bauh. Pinn. 485.

Tamariscus narbonensis. Lobel. Icon. 218.

Tamariscus pentandra. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 73.

Tamariscus gallicus. Allion. Flor. ped. n° 1597.

Tamarix major, sive arborea, narbonensis. J. Bauh. Hist. 1. pag. 351.

4. *Tamarix foliis cauleque tomentoso-canis.* Pall. Flor. ross. vol. 2. pag. 72. tab. 79.

Cet arbrisseau est d'un port très-élégant; il s'élève à douze ou quinze pieds. Ses branches sont médiocrement étales, un peu élançées, garnies de rameaux flexibles, grêles, élançés, presque fistigés, revêtus d'une écorce glabre, d'un brun-rougeâtre; les feuilles sont petites, très-nombreuses, courtes, imbriquées ou très-rapprochées, glabres, très-entières, aiguës à leur sommet, assez semblables à celles des bruyères, d'un vert quelquefois un peu cendré.

Les fleurs sont disposées en épis nombreux, terminaux, allongés, serrés; ces fleurs pédicellées, petites, de couleur blanche ou légèrement purpurines, munies de bractées petites, plus courtes que les pédicelles; le calice à cinq divisions obtus; les pétales ouverts, concaves, obtus; cinq étamines saillantes hors de la corolle; le style divisé en deux ou trois stigmates; la capsule triangulaire, à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît en France, le long des fleuves, dans les prés, aux bords de la mer. Je l'ai recueillie en Normandie, sur les bords du Coënon, près le mont Saint-Michel. T. (F. v.) On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

L'écorce de la racine & des branches de cet arbrisseau passe pour diurétique, sudorifique, apéritive & même rafraîchissante, selon Rhazès. Les habitants du Danemarck mettent dans leur bière du tamarix en place de houblon. Le bois est regardé comme sudorifique, & peut être substitué

au gaiac en cas de nécessité. Le chimiste Montel a fait voir que ce tamarix pouvoit fournir une grande quantité de sel de Glauber (sulfate de soude). Ses fruits peuvent être employés à la teinture, d'après M. Willemet.

2. TAMARIX d'Allemagne. *Tamarix germanica.* Linn.

Tamarix floribus decandris, siccis terminalibus; foliis sessilibus, linearis-lanceolatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1499.

Tamarix floribus decandris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 387. — Hort. Cliffort. 111. — Roy. Lugd. Bat. 436. — Mill. Icon. tab. 262. fig. 2. — Gunn. Norveg. n° 152. — Æder. Flor. dan. tab. 214. — Blackw. tab. 331. — Duroi, Harbk. 2. pag. 448. — Willd. Arbr. 384. — Hoffm. Germ. 210. — Pallas, Flor. ross. 2. pag. 75. tab. 80. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 291. tab. 61. fig. 1. — Lam. Ill. Gen. tab. 213. fig. 2.

Tamariscus decandrus. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 74.

Tamariscus germanicus. Allion. Flor. pedem. n° 1598. — Scop. Carn. edit. 2. n° 375.

Tamariscus spicis foliosis. Hall. Helv. n° 948.

Myrica. Camer. Epitom. 74. Icon.

Myrica pannonica. Clus. Pann. pag. 26, 27, 28. Icon.

Tamarix fruticosa, folio crassiflore, seu germanica. C. Bauh. Pin. 485.

Tamariscus germanica. Lobel. Ic. 218. — Tourn. Inst. R. Herb. 661. — Duham. Arbr. 1.

Tamarix germanica, sive minor, fruticosa. J. Bauh. Hist. 1. pag. 351.

Cette espèce a des rapports avec le *tamarix gallica*; elle en diffère par les feuilles plus grandes, moins rapprochées. Ses tiges sont droites, les rameaux nombreux, les plus jeunes filiformes, paniculés, garnis de feuilles petites, éparfes, nombreuses, glabres, entières, d'un vert glauque, à peine aiguës.

Les fleurs sont disposées en épis droits, un peu lâches à l'extrémité des rameaux, presque deux fois plus grandes que celles du *tamarix gallica*; le calice divisé en cinq folioles allongées, linéaires; la corolle blanchâtre, les étamines au nombre de dix, plus courtes que la corolle; le stigmate presque sessile, simple, orbiculaire; il lui succède des capsules oblongues, glabres, triangulaires, deux fois plus longues que le calice; les semences petites, nombreuses, ovales-oblongues, légèrement comprimées, d'un roux-pâle, surmontées de poils fins, blancs, rameux, pédicellés.

B b b b 2

Cet arbrisseau croit en Alsace, dans le Danemark, en France, aux environs de Lyon & dans les départements méridionaux de la France, sur le bord des rivières & des fleuves. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.) On lui soupçonne les mêmes propriétés qu'au *tamarix gallica*.

3. TAMARIX d'Afrique. *Tamarix africana*. Poirer.

Tamarix floribus pentandris, confertissimis; spicis crassis, brevibus. Poirer, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 139, & edit. germ. vol. 2. pag. 171.

Tamarix (africana), foliis imbricatis, minimis; floribus pentandris; sepalis teretibus, densissimis; pedunculis squamatis; stylo triplo. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 269.

Tamarix gallica. Var. v. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1498. n°. 1.

On distingue cet arbrisseau du *tamarix gallica* à son port, ayant des rameaux plus roides, cylindriques, revêtus d'une écorce très-fine, d'un brun-noirâtre; les plus jeunes rameaux très-courts, filiformes, fasciculés. Les feuilles sont imbriquées, un peu élargies, très-courtes, aiguës, fortement appliquées contre les feuilles, en forme d'écailles, presque membraneuses, légèrement scarieuses à leurs bords, surtout à leur sommet.

Les fleurs sont disposées latéralement, le long des rameaux, en épis un peu pédonculés, épais, courts, serrés, cylindriques, garnis de bractées sèches, scarieuses, petites, ovales, aiguës; le calice à cinq divisions blanchâtres, scarieuses, droites, presque obtuses; la corolle d'un blanc quelquefois un peu lavé de rouge, roris & presque quatre fois plus grande que celle du *tamarix gallica*; les étamines à peine plus longues que la corolle.

J'ai découvert cet arbrisseau dans la Barbarie, aux environs d'Hippone, proche les bords de la mer. M. Desfontaines l'a également recueillie aux environs d'Alger. (V. v.)

4. TAMARIX articulé. *Tamarix articulata*. Vahl.

Tamarix floribus pentandris, spicis lateralibus, foliis brevissimis, vaginatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1498. n°. 2.

Tamarix (articulata), ramis articulatis; articulis turbinatis, mucronatis; spicis racemosis. Vahl, Symbol. 2. pag. 48. tab. 32.

Tamariscus aegyptiacus, gallicifera. J. Bauh. Hist. 1. pag. 352.

Tamarix (orientalis), floribus pentandris, ramis ramuliferae articulatis; vaginis cylindricis, in squa-

mam acuminatis. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 499. — Forsk. Flor. aegypt.-arab. pag. 206. n°. 29.

Thuya (aphylla), floribus quadrivalvibus, foliis turbinatis, vaginantibus, hinc mucronatis; frondibus imbricatis. Linn. Spec. Plant. pag. 1422. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 295. (Exclusio synonymo.)

Tamarix chinensis.? Loureiro, Flor. coch. pag. 128.

Vulgairement arlé.? Sonnini, Voyage égypt. vol. 2. pag. 4. tab. 9. fig. 2.

Cet arbre est remarquable par ses rameaux articulés; les articulations munies de guignes courtes, cylindriques, surmontées d'une pointe en forme d'écaille; les jeunes rameaux très-allongés, nus, également articulés & garnis d'écailles courtes, vaginales, qui tiennent lieu de feuilles.

Les fleurs sont disposées en épis latéraux; elles renferment cinq, quelquefois six étamines; les capules s'ouvrent en quatre valves.

Cette plante croit en Égypte, dans l'Arabie, aux Indes orientales. (V.)

Observations. Cet arbre est-il le même que celui dont parle M. Sonnini dans son Voyage de l'Égypte, & qui se nomme arlé? Il le rapporte au *tamarix orientalis*. Voici ce qu'en dit ce savant voyageur.

« Le *tamarix* d'Orient, nommé arlé en Égypte, est un arbre qui devient aussi gros & aussi grand que le chêne: ses feuilles sont alternes, très-étroites & d'un vert-pâle.

« Ces arbres sont pour l'ordinaire chargés de galles adhérentes aux branches. J'ai observé qu'avant qu'elles ne fussent desséchées, ces galles étoient remplies d'une liqueur d'un rouge-ponceau. Les arts pourroient peut-être en tirer un bon parti, car les galles sont extrêmement multipliées, & les arbres qui les portent, croissent par toute l'Égypte, dans la haute comme dans la basse. Il n'est aucun ou presque aucun village de l'Égypte inférieure qui, parmi les arbres qui l'environnent, n'ait plusieurs arlés.

« Le bois de cet arbre sert à divers usages: l'on en fait aussi du charbon. C'est le seul bois un peu commun que l'on ait en Égypte, soit pour brûler, soit pour travailler: aussi les habitants disent-ils que si l'arlé manquoit, le monde iroit mal. »

5. TAMARIX de Sibérie. *Tamarix sibirica*. Pallas.

Tamarix floribus oöandris decandrisque, axillariibus, subspicatis; foliis carnosiss, obtusis, triquetris. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1499. n°. 3.

Tamarix (sibirica), floribus oöandris decandrisque; foliis filiformibus, carnosiss, Pall. Nov. Act. Acad. Petrop. 10. pag. 374. tab. 10. fig. 4.

Cet arbruste est assez bien distingué comme espèce; il se divise en branches droites, cylindriques, garnies de rameaux altrages, nombreux, glabres, munis de feuilles éparées, sessiles, petites, charnues, filiformes, presque triangulaires, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles, presque en épis latéraux; elles contiennent huit à dix étamines.

Cette plante croît en Sibérie, dans les terrains salés. η

6. TAMARIX herbacé. *Tamarix herbacea*. Pall.

Tamarix caule herbaceo, annuo; flore minore. Pall. Flor. ross. vol. 2. tab. 8. fig. 6.

Cette espèce nous paroît avoir tous les caractères du *tamarix germanica*, dont elle ne peut être distinguée que par ses tiges herbacées & annuelles, & par les fleurs plus petites. Cette plante se rencontre sur les bords de la mer Caspienne. γ

TAMBOUL. *Ambora*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monoïques, de la famille des orties, qui a des rapports avec les *dorstenia* & les figuiers, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, d'où découle un suc laiteux, dont les feuilles sont presque opposées, persistantes, entières; les fleurs en grappes, rarement solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un involucre ou calice commun, à quatre divisions, à demi-fermé, contenant les semences; un grand nombre d'étamines & de pistils; un fruit globuleux, comprimé; les semences arillées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice ou involucre commun, d'abord ovale, connivent, entier, se divisant ensuite en quatre découpures ouvertes.

2°. Point de corolle.

3°. Un très-grand nombre d'étamines presque sessiles, qui recouvrent toutes les parois internes du calice; les anthères petites, ovales.

Dans les fleurs femelles :

1°. Un involucre ou calice ovale, creux en dedans, entier, percé d'un ombilic à son sommet.

2°. Point de corolle.

3°. Un très-grand nombre d'ovaires, insérés sur les parois internes du calice, qu'ils recouvrent presque entièrement; autant de styles & de stigmates.

Le fruit consiste en autant de capsules qu'il y a eu d'ovaires, renfermées dans le calice considérablement augmenté, & qui leur sert de récep-

tacle; chaque capsule contenant une seule semence ovale, ossifiée, un peu comprimée, revêtue d'un arille pulpeux.

ES PÈ C R.

TAMBOUL quadrifide. *Ambora quadrifida*.

Ambora foliis ovato-lanceolatis, suboppositis, interstis; floribus racemosis. (N.)

Tambourissa quadrifida. Sonnerat, Iter Ind. vol. 2. pag. 137. tab. 134. — Gmelin, Syll. Nat. vol. 1. pag. 16.

Ambora. Lam. Ill. Gen. tab. 784. — Juss. Gen. Plant. pag. 401. — Commers. Herb.

Vulgairement bois-tambour.

C'est un arbre qui se divise en branches médiocrement étalées, munies de rameaux alternes, glabres, cylindriques, qui distillent de leur écorce, ainsi que les autres parties de la plante, un suc laiteux, un peu épais. Les feuilles sont presque opposées, pétioles, ovales-lancéolées, entières, persistantes, obtuses à leur sommet, un peu ondulées à leurs bords, presque glabres à leurs deux faces, d'un vert presque luitant, marquées de nervures latérales, simples, parallèles; les pétioles longs à peine d'un demi-pouce; les feuilles longues de trois à quatre pouces, sur un pouce & demi ou deux de large.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, rarement solitaires, à peine plus longues que les feuilles, situées vers l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles; les fleurs mâles réunies sur les mêmes grappes avec les fleurs femelles : ces dernières plus rares. Le calice, dans les fleurs mâles, est d'abord entier, de forme ovale; ensuite il se partage en quatre découpures, dont les parois internes sont entièrement recouvertes par les nombreuses étamines. Dans les fleurs femelles, le calice est creux, d'une seule pièce, ombiliqué à son sommet; il est en même temps le réceptacle d'un très-grand nombre d'ovaires, qui se convertissent en autant de capsules contenues dans l'épaisseur de ce calice. Les semences sont solitaires dans chaque capsule, ovales, un peu ossifiées, enveloppées d'un arille pulpeux. Il résulte de leur ensemble un fruit assez gros, oblong, comprimé à ses deux extrémités.

Cet arbre croît dans les Indes & à l'île de Madagascar. η (V. f. in herb. Juss.)

TAMINIER. *Tamus*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs dioïques, de la famille des asperges, qui a des rapports avec les *discorea* & les *rejania*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à tiges grimpantes, à feuilles simples, alternes; les fleurs disposées en épis axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques ; un calice campanulé ; point de corolle ; six étamines ; un style ; trois stigmates ; une baie inférieure ou adhérente , à trois loges ; deux ou trois semences dans chaque loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles sont séparées des fleurs femelles sur des individus différens.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice, dont la partie inférieure est adhérente à l'ovaire, renforcée à son orifice ; le limbe divisé en six découpures profondes, campanulées, ovales-lancéolées.

2°. Point de corolle.

3°. Six étamines, dont les filamens sont rapprochés, simples, plus courts que le calice, retraits par des anthers droites.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice semblable à celui des fleurs mâles.

2°. Point de corolle.

3°. Six étamines stériles.

4°. Un ovaire adhérent, ovale-oblong, surmonté d'un seul style cylindrique, de la longueur du calice, terminé par trois stigmates aigus, réfléchis.

Le fruit est une baie ovale, à trois loges, chaque loge renfermant trois semences globuleuses ou deux par avortement.

ES PÈ C E S.

1. TAMINIER commun. *Tamus communis*. Linn.

Tamus foliis cordatis, acutis ; floribus laxè spicatis ; caule volubili. (N.)

Tamus foliis cordatis, indivisi. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1458. — Hort. Cliff. 458. — Royen, Lugd. Bat. 228. — Gronov. Orient. 317. — Hall. Helv. n°. 1620. — Miller, Dict. 1. & Ill. Ic. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1220. — N. ck. Gallob. 400. — Gisek. Icon. Fascic. 1. tab. 22. Maf. — Sabbat. Hort. 1. tab. 59. Maf. — Regn. botan. Ic. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 262. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 366. — Lam. Illustr. Gener. tab. 817. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 136. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 181.

Bryonia levis, sive nigra, racemosa, cujus bacca ruptisunt seu nigrescunt. C. Bauh. Pin. 297.

Bryonia levis, seu nigra, racemosa (mas). C. Bauh. 297.

Bryonia levis, seu nigra, baccifera (femina). C. Bauh. Pin. 297.

Vitis silvestris ; seu tamus. Dodon. Pempt. 400.

Tamus racemosa ; flor. luteo, palléscente. Tourn. Inst. R. Herb. pag. 103. tab. 28.

Vitis nigra. Camer. Epitom. 983. Ic. — Tabern. Icon. 892. — Marth. Comm. 883. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 1. §. 1. tab. 1. fig. 6. — Dalech. Hist. 2. 1412. Ic.

Bryonia nigra. Blackw. tab. 457.

Vulgairement taminier, fceau de Notre-Dame, fceau de la Vietge.

Ses racines sont grosses, tubéreuses ; elles produisent des tiges glabres, foibles, grimpantes, striées, longues de cinq à six pieds & plus, s'enrouillent autour des plantes qui les avoisinent, & sont garnies de feuilles alternes, sessiles, pétiolées, assez grandes, larges, en cœur, aiguës & même acuminées à leur sommet, très-entières à leurs bords, molles, luisantes, glabres à leurs deux faces, marquées de plusieurs nervures longitudinales, un peu saillantes & jaunâtres ; les pétioles glabres, minces, striés, ordinairement plus longs que les feuilles.

Les fleurs sont dioïques, disposées en grappes lâches, latérales, axillaires ; celles des fleurs mâles plus longues, plus lâches ; les calices divisés à leur limbe en six découpures d'un blanc-jaunâtre, ouvertes, un peu campanulées, ovales, un peu obtuses. Les fleurs femelles produisent de petites baies rouges, ovales, un peu aiguës, à trois loges, contenant chacune deux ou trois semences globuleuses.

Cette plante se rencontre en France, en Europe, dans les haies & les bois ténus. Je l'ai recueillie également en Barbarie, parmi les buissons. (V. v.)

Les racines de cette plante passent pour diurétiques, résolutives & vulnéraires ; elles sont acres. On les ratisse, on les éscale, & on les applique sur les contusions & les meurtrissures. Les Turcs & les Arabes mangent crues & en salade les jeunes pousses du taminier.

2. TAMINIER de Crète. *Tamus cretica*. Linn.

Tamus foliis trilobis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1458. — Miller, Dict. n°. 2.

Tamus cretica, trifido folio. Tourn. Coroll. 3.

Tamus communis. Vat. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 136.

Cette plante, quoique citée comme espèce par Linné, ne paraît être qu'une variété de la précédente, qui n'en diffère que par ses feuilles plus

larges, divisées en trois lobes ; ce qui arrive assez ordinairement, d'après l'observation de M. Gerard, lorsque cette plante croît à l'ombre. Les fleurs ont le même caractère, la même forme que celles du taminier commun. J'ai recueilli en Barbarie des individus de cette plante, dont les feuilles très-amplées étoient presque à trois lobes, celui du milieu lancéolé, longuement acuminé.

Cette plante a été observée dans l'île de Crète par Tournefort. ✕

TAMONÉE. *Tamonea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des gattiliers, qui a des rapports avec les taligales & les verveines ; il renferme des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs disposées en épis axillaires, opposées ; munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice monophyllé, à cinq dents subulées ; une corolle tubulée, à quatre ou cinq lobes inégaux ; deux étamines fertiles ; deux plus petites, stériles ; une noix à quatre loges, à quatre semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, adhérent, divisé à son orifice en cinq dents larges, aigues, subulées, persistantes.

2°. Une corolle monopétale, tubulée ; le tube renflé à sa base, rétréci vers son orifice, divisé à son limbe en quatre, quelquefois cinq lobes ovales, inégaux.

3°. Quatre étamines, dont deux plus longues, fertiles, écaillées vers leur milieu ; deux autres beaucoup plus petites, stériles ; les filaments plus courts que la corolle ; les anthères petites, ovales.

4°. Un ovaire ovale, arrondi, petit, surmonté d'un style droit, cylindrique, de la longueur du tube de la corolle, terminé par un stigmate à quatre lobes.

Le fruit est une baie sèche, enveloppée par le calice persistant, resserré à son orifice, contenant une noix globuleuse, un peu ovale, à quatre loges, à quatre semences.

Observations. Ce genre est très-voisin des verveines ; il en est distingué par le caractère de ses fruits & plusieurs autres particularités. Quelques plantes rangées parmi les verveines lui appartiennent.

ESPÈCES.

1. TAMONÉE en épi. *Tamonea spicata*. Aubl. *Tamonea frutibus mucis, foliis tomentosis.*

Tamonea spicata. Aubl. Guian. pag. 2. tab. 268. — Lam. Illustr. Gen. tab. 542. — Jufl. Gen. Plant. pag. 109.

Tamonea mutica. Swartz, Prodr. pag. 94.

Ghinia mutica. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 114. n°. 2.

C'est une plante herbacée, dont les racines sont fibreuses, les tiges droites, glabres, dures, hautes d'un pied & demi, presque quadrangulaires, garnies de feuilles opposées, pétioles, ovales, un peu arrondies, crenelées à leur contour, presque obtuses à leur sommet, légèrement tomenteuses, longues d'environ un pouce, soutenues par des pétioles grêles, presque de la longueur des feuilles.

Les fleurs sont disposées en épis lâches, opposés, situés dans l'aisselle des feuilles ; les pedoncules propres sont courts, munis à leur base d'une petite bractée aigüe. Le calice est divisé à son orifice en cinq dents larges, aigues ; la corolle petite, de couleur bleue, un peu plus longue que le calice, tubulée ; son tube grêle ; son limbe partagé en quatre lobes ovales, inégaux ; le supérieur élevé, l'inférieur plus large, un peu échancré à son sommet ; les latéraux plus petits & plus courts. Le fruit est une baie sèche, enveloppée par le calice, noirâtre, ovale, un peu arrondie, de la grosseur d'un pois, renfermant un noyau globuleux, à quatre loges ; une semence dans chaque loge.

Cette plante croît dans la Guiane, à l'île de Cayenne, sur les bords des sentiers & des chemins. ○

2. TAMONÉE épineuse. *Tamonea spinosa*. Sw.

Tamonea frutibus quadrifloris, foliis glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 114. n°. 1.

Tamonea spinosa. Swartz, Prodr. 94.

Verbena (curassavica), diandra, spicis longis, calicibus aristatis, foliis ovatis, argutis serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 28. — Mill. Dict. n°. 17. — Swartz, Observ. 17.

Zapania (curassavica), spicis longis, calicibus aristatis, foliis ovatis, argutis serratis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 59. n°. 250.

Veronica similis fruticosa, curassava, teneris foliis, flore galericulato. Herm. Patad. pag. 240. tab. 240.

Viola surculta, latiore folio, speciei peregrina. Pluken. Phytogr. tab. 234. fig. 4.

Ses tiges sont droites, grêles, très-rameuses, hautes d'environ trois pieds, glabres, presque quadrangulaires, garnies de feuilles opposées, pétioles, ovales, glabres à leurs deux faces, petites, aigues, acuminées à leur sommet, hne-

ment dentées en scie à leur contour, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires, opposées, lâches; les pédoncules grêles, les pédicelles très-courts, glabres; le calice terminé par quatre dents longues, épineuses; la corolle d'un bleu assez vif, presque une fois plus grande que celle de l'espèce précédente, tubulée; les divisions du limbe inégales. Le fruit est une baie sèche, renfermant un noyau à quatre loges, à quatre semences, dont souvent deux avortent.

Cette espèce croît à l'île de Curaçao, &c. ☉

3. TAMONÉE lappulacée. *Tamonea lappulacea*.

Tamonea calicibus frutigeris, subrotundis, inflatis; seminibus echinatis.

Verbena (lappulacea), calicibus subrotundis, erectiusculis; seminibus echinatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 28.

Zapania (lappulacea), calicibus frutigeris, inflatis, subrotundis; seminibus echinatis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 59. n° 251.

Verbena foliis cordato-ovatis, floribus spicatis, calicibus inflatis, seminibus echinatis. Brown, Jam. pag. 116. n° 5.

Bafferia. Loefl. Itet. 1794. n° 69.

Scorodonia floribus spicatis, purpureiscentibus, pentapetalodis. Sloan, Jam. 66. Hill. t. pag. 174. tab. 110. fig. 1.

Blairia. Houfl. Amm. Herb. 277.

Ses tiges sont droites, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, en cœur, dentées en scie à leurs bords. Les fleurs sont disposées en épis axillaires & latéraux. Le calice est persistant; la corolle tubulée, purpurine, divisée à son limbe en cinq lobes inégaux. Le fruit est une capsule tétragonue, chaque angle terminé par une pointe épineuse; ovale & rétrécie à sa partie inférieure, recouverte par le calice renflé, s'ouvrant en deux parties, divisée en quatre loges, qui contiennent autant de semences oblongues.

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Martinique, dans les décombres & les terrains pierreux.

TAMPOA de la Guiane. *Tampos guianensis*. Aubl. Guian. vol. 2. Suppl. pag. 55. tab. 388.

Vulgairement bois portugais.

On ne connoît encore de cette plante aucune autre partie de sa fructification, que les fruits observés par Aublet. « C'est un arbre, dit cet auteur, dont le tronc s'élève de vingt-cinq à trente pieds, sur un pied de diamètre. Son écorce est

lisse & cendrée; son bois jaunâtre, dur, compacte: il pousse à son sommet de longues branches rameuses, qui se répandent en tout sens; elles sont garnies de feuilles pétioles, alternes, longues, ovales, entières, fermes, aiguës, vertes & lisses en dessus, plus pâles en dessous; les plus grandes, longues de dix pouces, sur deux & demi de largeur; leur pétiole cylindrique, long d'un pouce. »

Les fruits sont situés dans les aisselles des feuilles, disposées en grosses grappes; ils sont de la forme & de la grosseur d'une pomme moyenne, à plusieurs côtes jaunâtres, lisses, charnues intérieurement, remplies d'une substance gélatineuse & fondante, dans laquelle est renfermé un grand nombre de pépins blancs, dont l'amande repand une odeur d'ail. Le calice, composé de cinq petites folioles ovales, aiguës, persiste avec le fruit. Quoique je le soupçonne placé à la base du fruit, cependant, comme Aublet n'en parle pas, je n'ose prononcer d'après la figure qu'il en donne.

Cet arbre croît en Guiane, dans les plaines de Caux, submergées dans les tems pluvieux. (Description ex Aubl.)

Son bois est employé pour la construction des bâtimens de ce canton; il est nommé *bois portugais* par les Nègres: ses fruits paroissent dans le mois de janvier. Ses feuilles déchirées & son écorce entamée répandent un suc épais & jaunâtre.

TANÆCIUM. *Tanacium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, affilié à la famille des solanées, qui à des rapports avec les *crenatis* (calebassiers), qui comprend des arbres ou des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont souvent grimpantes, les feuilles simples ou aitées; les fleurs presque solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice cylindrique & tronqué; une corolle tubulée, à cinq découpures presque égales; quatre étamines didynames; le rudiment d'un cinquième filament; un style; une baie très-grosse, à écorce épaisse.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, cylindrique, tronqué, très-entier.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, oblongue; le tube cylindrique, élargi à sa partie supérieure; le limbe divisé en cinq parties presque égales.

3°. Quatre étamines didynames, dont les filamens sont plus courts que la corolle, presque égaux en

en longueur; le rudiment d'un cinquième; les antères à deux lobes.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un style simple, terminé par un stigmate à deux lobes.

Le fruit est une baie très-grosse, revêtue d'une écorce fort épaisse, pulpeuse dans son intérieur; plusieurs semences éparées dans la pulpe.

Observation. Ce genre a été formé de plusieurs plantes, rangées d'abord par quelques auteurs parmi les *crefcentia*, auxquels elles paraissoient appartenir par leur port, par la forme & la grosseur de leurs fruits. L'analyse plus détaillée des parties de la fructification les en a fait séparer pour les réunir dans un genre particulier. Les principales différences qui existent entre ces deux genres consistent, pour les *tanacium*, en un calice d'une seule pièce & tronqué, en une corolle tubulée; quatre étamines, avec le rudiment d'un cinquième filament stérile, &c.

ES PÈ C E S.

1. *TANÆCIUM* à feuilles ailées. *Tanacium pinnatum*. Willd.

Tanacium foliis pinnatis, floribus pentandris, caule arboreo. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 312. n°. 3.

Crefcentia pinnata. Jacq. Collect. vol. 3. p. 203. tab. 18.

C'est un grand arbre, qui supporte à l'extrémité de son tronc une cime ample, vaste, composée de branches étalées, de rameaux diffus, épars, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées de folioles presque opposées, ovales-oblongues, glabres à leurs deux faces, un peu aiguës à leur sommet, dentées en scie à leurs bords.

Les fleurs sont presque solitaires, latérales, éparées, pédonculées. Leur calice est d'une seule pièce, campanulée, divisée à leur orifice en cinq découpures inégales; la corolle en forme d'entonnoir; son tube droit, dilaté à sa partie supérieure; le limbe divisé en découpures ovales, aiguës; cinq étamines, dont quatre didymes, & une cinquième beaucoup plus courte; le stigmate divisé en deux lobes. Le fruit est une baie pulpeuse, au moins de la grosseur de la rête, ovale, un peu arrondie, revêtue d'une écorce épaisse, coriace; les semences éparées dans la substance pulpeuse.

Cette plante croît dans la Mozambique. *h*

2. *TANÆCIUM* jatoba. *Tanacium jatoba*. Swartz.

Tanacium foliis inferioribus ternatis, superioribus geminatis; cirrhis interpetiolaribus, terminalibus; caule scandente. Swartz, Prodr. pag. 92. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 312. n°. 2.

Botanique. Tome VII.

Crefcentia scandens, foliis inferioribus pinnatis, superioribus geminatis, claviculâ interpositis. Brown, Jam. 267.

Cucurbitifera fruticosa, triphylla, scandens. Sloan, Jam. 207. Hist. 2. pag. 175.

Jaroba. Marteg. Brasil. 25. — Pif. Brasil. 173.

Ses tiges sont nombreuses, glabres, cylindriques, souples, ligneuses, grimpantes, garnies de feuilles pétiolées, les inférieures ternées, les supérieures geminées. De l'aisselle des pétioles sortent des vrilles, par le moyen desquelles cette plante s'accroche aux corps qui l'avoiennent. Ses fleurs sont presque solitaires. Leur calice est oblong, tubulé, très-entier, tronqué à son orifice; la corolle tubulée, longue d'environ sept pouces; son tube étroit, cylindrique, un peu élargi à son orifice, dilaté en un limbe à cinq découpures ovales, presque égales; les filaments connivens avec le tube de la corolle, libres à l'orifice; les antères oblongues, à deux lobes; l'ovaire arrondi; le style de la longueur des étamines, soutenant un stigmate à deux lobes obtus. Le fruit est une baie fort grosse, oblongue, à une loge, pulpeuse dans son intérieur.

Cette plante se trouve au Brésil & à la Jamaïque.

3. *TANÆCIUM* parasite. *Tanacium parasiticum*. Swartz.

Tanacium foliis ovatis, coriaceis, caule scandente, fruticosa, radicante. Swartz, Prodr. pag. 92. — Jacq. Hort. Schoenb. vol. 1. pag. 61. tab. 115. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 312. n°. 1.

Crefcentia scandens, sarmentis crassioribus, foliis majoribus, ovatis, nitidis, oppositis. Brown, Jam. pag. 266.

Quoique les tiges de cet arbrisseau se soutiennent assez bien d'elles-mêmes, cependant elles sont plus ordinairement grimpantes, surtout par leurs rameaux très-épais, toutes les fois qu'elles le trouvent dans le voisinage des autres plantes; elles deviennent aussi radicales. Les feuilles sont grandes, opposées, simples, ovales, épaisses, coriaces, très-entières, glabres à leurs deux faces, luisantes.

Les fleurs sont solitaires, latérales, médiocrement pédonculées; leur calice glabre, ventru, monophylle, tronqué, entier à son bord; la corolle la monopétale, campanulée, un peu comprimée, resserrée à sa base; son limbe divisé en cinq crenelures; les filaments presque égaux, un cinquième stérile; les antères en cœur; l'ovaire arrondi, presque à quatre lobes; le style simple, de la longueur du tube de la corolle, terminé par un stigmate à deux lobes. Le fruit est une grosse baie arrondie, couverte d'une écorce épaisse, con-

Ccc

nant plusieurs semences éparées dans une pulpe charnue.

Cette plante croît sur les montagnes de la Jamaïque. h

TANAISIE. *Tanacetum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs strobiliformes, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *hippia* & les *artemisia*, & qui comprend des herbes exotiques ou indigènes de l'Europe, à feuilles simples ou ailées, & dont les fleurs sont la plupart disposées en corymbes terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs strobiliformes ; les fleurs femelles de la circonférence à trois découpures ; ceux du disque hermaphrodites, à cinq découpures ; le réceptacle nu ; les semences couronnées par une membrane presqu'entière ; le calice hémisphérique, imbriqué.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toutes composées de fleurons, hermaphrodites dans le centre, femelles à la circonférence.

Chaque fleur offre :

1°. Une *calice* commun, imbriqué, hémisphérique, composé d'écaillés serrées, compactes.

2°. Une *corolle* composée à la circonférence de fleurons femelles, profondément divisée en trois découpures, & dans le disque de fleurons hermaphrodites nombreux, tubulés, infundibuliformes, divisés à leur limbe en cinq découpures réfléchies.

3°. Cinq *étamines* dans les fleurs hermaphrodites, dont les filamens sont très-courts, capillaires ; les anthères réunies en cylindre.

4°. Un *ovaire* dans les fleurs femelles & hermaphrodites, oblong, surmonté d'un style simple, terminé par deux stigmates réfléchis.

Les *semences* sont foliacées, oblongues, couronnées par une membrane presqu'entière.

Le *réceptacle* est nu & convexe.

Observations. Pour rendre ce genre naturel & le circonscrire dans les caractères qui lui sont assignés, il faudroit le réduire à un très-petit nombre d'espèces, dont la tanaïsie commune seroit le type : celles qu'on y a ajoutées s'écartent plus ou moins des attributs qui le constituent. On a remarqué que, parmi les espèces qu'il offroit d'abord, plusieurs d'entr'elles avoient toutes leurs fleurs strobiliformes & hermaphrodites, & tous les fleurons à cinq divisions ; ce qui a déterminé M. Desfontaines à établir pour ces espèces le genre *halsamita*, dont nous faisons ici une division. Son caractère essentiel est d'avoir :

Un calice commun, composé d'écaillés imbriquées, linéaires, très-serrées ; une corolle formée de fleurons tous hermaphrodites, tubulés, égaux ; leur limbe divisé en cinq dents ; des semences couronnées par un rebord membraneux ; le réceptacle nu.

Plusieurs espèces de ces deux genres ont de grands rapports avec les *athanasia*, & n'en diffèrent qu'en ce que, dans ce dernier genre, le réceptacle est garni de paillettes. Le *perizia* de Thunberg, qui est le *tanacetum flabelliforme* de L'heritier, ne peut constituer un genre différent de celui des *halsamita*.

ESPÈCES.

* *Tanacetum*. Fleurs hermaphrodites & femelles.

1. **TANAISIE commune.** *Tanacetum vulgare*. Linn.

Tanacetum foliis bipinnatis, incisiss, serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1148. — Hort. Cliff. 398. — Flor. succ. 666. 730. — Mater. medic. 182. — Royen, Lugd. Bat. 155. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 131. tab. 65. fig. 1. — Scop. Carn. n°. 1011. — Pollich, Palat. n°. 779. — Blackw. tab. 464. — Knorr, Del. 2. tab. T. 2. — Hoffm. Germ. 290. — Roth. Germ. vol. I. p. 353, & vol. II. p. 308. — Lam. Illustr. Gen. tab. 696. fig. 1. — Gertn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 395. tab. 165. fig. 7. — Wier. Flor. dan. tab. 871.

Tanacetum foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, acutis dentatis. Haller, Helv. n°. 131.

Tanacetum foliis pinnatis, planis ; pinnis serratis. Flor. lappon. 295.

Tanacetum vulgare, luteum. Bauh. Pin. 131. — Tourn. Inst. R. Herb. 461.

Tanacetum vulgare, flore luteo. J. Bauh. Hist. 3. pag. 131. Ic.

Tanacetum millefolii foliis. Lobel. Ic. 749.

Athanasia, seu tanacetum. Dalech. Hist. 1. pag. 955. Ic.

Artemisia monoclonos. Fuf. b. Hist. 46. Ic.

2. *Tanacetum crispum, foliis crispis.* C. Bauh. Pin. 131. — Tourn. Inst. R. Herb. 461.

Tanacetum crispum, flore luteo. J. Bauh. Hist. 3. pag. 133. Ic.

Speciosum tanacetum, cristatum, anglicum. Lobel. Icon. 749.

Tanacetum crispum. Dodon. Pempt. pag. 36. Ic.

Vulgairement tanaïsie, burbotine.

C'est une plante d'un beau port, d'un aspect très-agréable, qui brille dans nos campagnes par

l'éclat doré de ses fleurs nombreuses, réunies en corymbe. Ses tiges sont droites, rapprochées en touffes, rameuses, cylindriques, glabres, striées, hautes d'environ deux pieds, roides, quelquefois un peu velues, garnies de feuilles amples, pétiolées, alternes, les inférieures deux fois ailées, les caulinaires simplement ailées, planes, glabres, d'un vert foncé; les folioles presque alternes, sessiles, étroites, linéaires, allongées, incisées, aiguës, un peu décurrens sur le pétiole commun: ces feuilles sont plus ou moins crépues dans la variété *β*.

Les fleurs sont nombreuses, disposées en corymbes à l'extrémité des rameaux, d'un jaune brillant; les ramifications munies de petites bractées courtes, aiguës. Les calices sont hémisphériques, d'un vert un peu jaunâtre, composés d'écailles serrées, imbriquées, étroites, glabres; la corolle à peine plus longue que le calice. Le réceptacle est presque conique, convexe, pointu, nu; les semences petites, presque pentagones, en cône renversé, couronnées par une membrane fort petite, à cinq petites dents à peine sensibles.

Cette plante croît en France, en Europe, dans les terrains pierreux, un peu humides. (P. v.)

La variété *β* se cultive dans les jardins comme plante d'ornement.

La tanaisie est amère, tonique, vermifuge, astringente & fébrifuge. On la prend en infusion dans la cachexie & les vapeurs qui proviennent de la suppression des règles. On l'unit à la germandrée dans les fièvres intermittentes: ses semences remplacent comme vermifuge le *semen-cabra*. Les habitants du Nord font usage de cette plante pour assaisonner leurs alimens: on l'ajoute aux gâteaux pour leur donner plus de faveur. Les Finlandais en retirent une couleur verte; elle déplaît aux bestiaux; cependant les vaches & les moutons la mangent.

2. TANASIE à une seule fleur. *Tanacetum monanthos*. Linn.

Tanacetum caulis simplicifloris, unifloris, longitudine foliorum. Linn. Manrifl. pag. 111. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1813. n°. 15.

Tanacetum monanthemum, chamemeli folio & facie. Vaitl. Aët. 337.

Cette espèce a le port de la millefeuille, mais ses tiges sont très-basses, longues à peine de deux pouces, plus courtes que les feuilles, droites, roides, très-simples, médiocrement velues, uniflores. Les mêmes racines produisent ensuite d'autres tiges, les unes couchées, les autres ascendantes, plus longues, diffuses, également simples. Les feuilles radicales sont de deux fois ailées, nombreuses, longues de deux ou trois pouces; celles

des tiges alternes, rares, pétiolées, simplement ailées ou pinnatifides, ou divisées en dents très-profondes.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des tiges, portées sur un pédoncule simple, allongé. Le calice est oblong, composé d'écailles imbriquées, serrées, pubescentes. La corolle est petite, de couleur jaune; les semences nues; le réceptacle également nu.

Cette plante se rencontre dans l'Orient. O

3. TANASIE à fleurs de corolla. *Tanacetum cotuloides*. Linn.

Tanacetum foliis densato-pinnatis, acuminatis; caule ramossimo; floribus subpaniculatis. Linn. Mant. pag. 182.

Cette plante a l'aspect d'une camomille: ses tiges sont hautes de six à huit pouces, droites, très-rameuses; les rameaux ascendans, étalés, de la longueur des tiges, garnis de feuilles petites, alternes, pinnatifides; les pinnules divisées en sept ou neuf dents opposées, lancéolées, acuminées à leur sommet.

Les fleurs sont presque paniculées, réunies à l'extrémité de tous les rameaux, au nombre de neuf à douze, inégalement pédonculées, chacune d'elles pédicellées. Leur calice est hémisphérique, composé de dix folioles médiocrement imbriquées, lâches, elliptiques, presque égales; la corolle globuleuse, de couleur jaune, composée de filicrons tubulés, divisés à leur limbe en cinq coupures égales.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. O

4. TANASIE blanchâtre. *Tanacetum incanum*. Linn.

Tanacetum foliis pinnatis, incanis; pinnis digitato-partitis, confertis; corymbis coarctatis, subpaniculatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1813. n°. 9.

Tanacetum foliis bipinnatis, tomentosis; corymbo ovato, composito. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1183.

Artemisia caule simplici, corymbo composito, ovali, terminati. Hort. Cliff. 404.

Asinthium orientale, incanum, tenuifolium; floribus luteis, in capitulum congestis, & sursum spectantibus. Tourn. Coroll. pag. 24.

Cette espèce a des tiges droites, simples, striées, rarement rameuses, seulement à leur partie supérieure, où elles se divisent en un corymbe terminal. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, blanchâtres, quelquefois deux fois ailées, surtout les radicales, tomenteuses, composées de folioles

Cccc 2

presqu'opposées, étroites, presque linéaires, très-rapprochées, digitées ou découpées en plusieurs parties; les supérieures moins composées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un corymbe composé, ramassé en tête, rameux, très-droit; les ramifications blanchâtres, inégales, cylindriques; le calice composé d'écaillés imbriquées, inégales, étroites, linéaires. La corolle est de couleur jaune, composée de fleurons tubulés.

Cette plante croît dans le Levant. ♀

5. TANAISIE de Sibérie. *Tanacetum sibiricum*. Linn.

Tanacetum foliis pinnatis, pinnis lineari-filiformibus, integerrimis; corymbo fastigiato, glabro. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1810. n°. 6.

Tanacetum foliis pinnatis, laciniis lineari-filiformibus; corymbo gloriois; caule herbaceo. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1183. — Miller, Dict. n°. 2.

Tanacetum foliis pinnatis, multifidis; laciniis linearibus, trifidis. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 134. tab. 65. fig. 2.

Cette plante a des racines dures, fibreuses, qui produisent des tiges droites, cylindriques, herbacées, striées, rameuses, hautes de plus de quatre pieds. Ses feuilles sont alternes, étroites, linéaires, ailées; les pinnules linéaires, filiformes, très-entières, quelquefois divisées, à leur partie supérieure, en deux ou trois découpures aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont petites, disposées, tant à l'extrémité des rameaux que dans l'aisselle des feuilles, en corymbes peu garnis, glabres, fastigiés. Les calices sont hémisphériques, composés d'écaillés étroites, imbriquées, inégales. La corolle est jaune.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit en juin & en juillet. ♀ (V. v.)

6. TANAISIE d'Orient. *Tanacetum orientale*. Willd.

Tanacetum foliis sericeis, incanis; radicalibus pinnatis; pinnis tripartitis, lineari-filiformibus, acutis; caulibus tripartitis, lanceolatis; panicula glomerata, corymbosa. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1812. n°. 11.

Asiathum orientale, incanum, capitulaceo folio, floribus in capitulum congestis. Tourn. Inst. R. Herb. Coroll. 34.

Ses tiges sont droites, rameuses; toutes les feuilles blanchâtres, opposées; les radicales, ainsi

que celles des rameaux stériles, longuement pétiolées, ailées; les pinnules à trois découpures linéaires, filiformes, aiguës; les feuilles des tiges florifères plus larges, point ailées, lancéolées, linéaires, divisées, jusqu'à leur base, en trois découpures entières ou bifides.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe paniculé; plusieurs fleurs sessiles & agglomérées, sur un pedoncule commun; le calice hémisphérique, tomentueux; le réceptacle nu. Les semences n'ont point été observées.

Cette plante croît dans l'Orient. ♀ (Descript. ex Willd.)

* * Balsamita. Toutes les fleurs hermaphrodites.

7. TANAISIE balsamite. *Tanacetum balsamita*. Linn.

Tanacetum foliis ovatis, integris, serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1184. — Hort. Cliffort. 358. — Hort. Upf. 255. — Mater. medic. 192. — Royen, Lugd. Bat. 154. — Mill. Dict. n°. 3. — Kniph. Cent. 2. n°. 92. — Haller, Helv. n°. 133. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 66.

Balsamita (vulgaris), caule herbaceo, foliis ellipticis, dentatis, inferioribus petiolatis; superioribus sessilibus, basi auriculatis; floribus corymbosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1802. n°. 4.

Balsamita (major). Desf. A&S. Soc. Hist. Nar. Paris. vol. 1. pag. 3. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 187.

Mentha hortensis, corymbifera. C. Bauh. Pin. 226.

Coffus hortensis. Dalech. Hist. 1. pag. 678. 1c.

Balsamita major. Dodon. Com. 259.

Balsamita mas. Blackw. tab. 98. *

Mentha corymbifera, sive coffus hortensis. J. Bauh. Hist. 3. pag. 144. 1c.

Tanacetum hortense, foliis & odore mentha. Hort. Lugd. Bat. Append. — Fourn. Inst. R. Herb. 461.

Vulgairement coq des jardins, menthe-coq, coq.

Cette plante a une odeur très-agréable. Ses tiges sont droites, fermes, presque ligneuses, quelquefois un peu velues, hautes de trois à quatre pieds, très-ramées, striées, blanchâtres; les rameaux grêles, alongés, paniculés; les feuilles alternes, entières; les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles, souvent auriculées à leur base, ovales, fermes, d'un vert-blanchâtre, obtuses à leur sommet, dentées en scie à leur contour, glabres en dessus, à peine pubescentes en dessous, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs sont jaunes, disposées en corymbe à l'extrémité des rameaux; les ramifications nombreuses, grêles, blanchâtres, pubescentes, munies de quelques petites bractées entières. Les calices sont glabres, d'un blanc-jaunâtre, ouverts, imbriqués; tous les fileurs tubules, hermaphrodites, divisés en cinq découpures courtes, aiguës, un peu redéchis. Le réceptacle est nu. Les semences surmontées d'une petite membrane à peine sensible.

Cette espèce croît en Suisse, en Italie, dans les départements méridionaux de la France. On la cultive dans la plupart des jardins. (V. v.)

Elle passe pour stomachique, carminative, vulnérinaire, antihistérique; ses semences sont vermifuges. On prépare avec cette plante une huile par infusion, appelée *huile de baume*, employée pour les plaies & les contusions. On s'est servi plusieurs fois de ses feuilles pour relever le goût des sauces.

8. TANAISSIE annuelle. *Tanaetum annuum*. Linn.

Tanaetum foliis radicalibus bipinnatis; caulinis confertis; innatis; pubescentibus; pinnis linearibus, acutis, mucronatis; corymbis fastigiatis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1812. n°. 12.

Tanaetum foliis bipinnatifidis, linearibus, acutis; corymbis tomentosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1183. — Roy. Lugd. Bat. 155. — Lam. Flor. Franç. vol. 3. pag. 639.

Balsamita annua. Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 187.

Tanaetum floribus corymbosis, ramis summis primordiales, caule longioribus; foliis rosetulibus, bipinnatis; caulinis ramisque aiformibus. Gouan. Illustr. 66.

Tanaetum annuum, villosum, alysinthis austriaci folio. Vaill. Aët. Paris. ann. 1716. pag. 181.

Santolina corymbis simplicibus, foliis linearibus, confertis. Miller, Dict. & tab. 227. fig. 1.

Helyochrysum foliis abrotani. C. Bauh. Pin. 264.

Helyochrysum quorundam, foliis abrotani. J. Bauh. Hist. 3. pag. 150. 1c.

Helyochrysum. Dodon. Pempt. pag. 267. 1c.

Alysinthium corymbiferum, annuum. Tourm. Inst. R. Herb. 458.

Elychrysum. Clus. Hist. 1. pag. 325. tab. 376.

Cette espèce est voisine de l'*athanasia annua*; elle en diffère par l'absence des puilleux. Elle a une odeur forte, aromatique; presque toutes ses parties sont couvertes d'un léger duvet. Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, rameuses, voi-

des, striées, cylindriques; les rameaux très-longs, nombreux, diffus; les intérieurs souvent plus longs que les tiges, garnis de feuilles alternes, deux fois ailées, surtout les inférieures; celles des tiges pinnatifides, presque réunies par faisceaux; les pinnules en lanières étroites, linéaires, acérées; les feuilles supérieures à cinq ou à trois découpures.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des rameaux & des tiges, en un corymbe serré; chaque corymbe composé de trente-six à quarante petites fleurs jaunes, toutes féculentes. Les fileurs, tant ceux de la circonférence que ceux du centre, sont tous hermaphrodites. Le réceptacle est nu, un peu convexe.

Cette plante se rencontre dans les départements méridionaux de la France, dans les environs d'Arles, de Beaucaire, d'Avignon, aux lieux incultes & sablonneux, en Espagne, en Italie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

9. TANAISSIE pileuse. *Tanaetum pilosum*. Berg.

Tanaetum foliis parvis, pinnatifidis, pubescentipilosis; corymbis pubescentibus, simplicibus, terminalibus. B. rg. Plant. capens. pag. 244. n°. 4.

Tanaetum laciniatum, foliis superioribus trifidis, minus. Vaill. Aët. Paris. 1719. pag. 337.

Santolina corymbis simplicibus, fastigiatis; foliis linearibus, confertis. Miller, 1c. pag. 152. tab. 227. fig. 1. Cultu.

Helychrysum trifidis foliis, hispanicum, minus. Barrel. Icon. Rat. pag. 88. tab. 190. — Boccon. Mus. part. 1. tab. 8. fig. 4.

Tanaetum asperiusculum, laciniatum, foliis superioribus trifidis. Vaillant, Aët. Paris. 1719. pag. 337.

Helychrysum trifidis foliis, hispanicum, majus. Barrel. Icon. Rat. pag. 88. tab. 189.

Elychrysum trifidis foliis, asperiusculis, sculm. Boccon. Mus. 2. pag. 45. tab. 37. — Tourn. Inst. R. Herb. 452.

Cette espèce a de grands rapports avec le *tanaetum annuum*; elle en diffère en ce qu'elle s'élève beaucoup moins, que ses rameaux sont droits & non diffus, étalés, les feuilles simplement pinnatides, les corymbes de fleurs, pubescents & non tomentueux.

Ses racines, d'après Bergius, sont fibreuses & diffuses; les tiges herbacées, cylindriques, un peu glabres, très-rameuses, droites, hautes de six à huit pouces; les rameaux filiformes, élancés, très-droits, divisés en d'autres de même forme, pubescents, chargés de poils allongés. Les feuilles sont nombreuses, éparées, fort petites, longues

d'environ deux lignes, pinnatifides, souvent trifides, ouvertes, pubescentes, munies de poils longs & rares; les découpures linéaires, cœcates, subulées, aiguës.

Les fleurs sont terminales, disposées, à l'extrémité des rameaux, en corymbes simples, presque ombellés, pubescens, contenant environ huit à dix fleurs. Le calice est hémisphérique, composé d'écaillés serrées, imbriquées; les extérieures linéaires, pubescentes, un peu rudes; les intérieures ovales-aiguës, un peu membraneuses; la corolle jaune, convexe, entièrement composée de fleurons tous hermaphrodites, à peine plus longs que le calice, rubulés, cylindriques, filiformes; le limbe à cinq découpures réfléchies; cinq filaments capillaires; les anthers tubulées; l'ovaire fort petit, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines; le stigmate bifide; le réceptacle nu. Elle varie par la grandeur de ses tiges & de ses feuilles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la trouve également en Espagne, en Italie, dans la Sicile. ? (*Descript. ex Berg.*)

10. TANAISE sous-arbuste. *Tanacetum suffruticosum*. Linn.

Tanacetum foliis pinnatis, pinnis linearibus, dentatis, pubescentibus; corymbo suffigato, basi folioso; caule suffruticoso. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1810. n°. 5.

Tanacetum foliis pinnatis, multifidis; laciniis linearibus, subaovatis, acutis; caule suffruticoso. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1183. — Berg. Plant. Cap. pag. 243. n°. 2. — Miller, Dict. n°. 5.

Tanacetum foliis pinnato-multifidis; laciniis linearibus, divisis, acutis; floribus suffigatis. Hort. Cliff. 398. — Roy. Lugd. Bat. 155.

Tanacetum foliis pinnatis, villosis; pinnis linearibus, acutis; panicula suffigata. Thunb. Prodr. 146.

Abrotanum africanum, frutescens, multiflorum; foliis tanacetii, decuplo minoribus. Comm. Hort. 2. pag. 199. tab. 100. Cuita. — Vaillant, Act. Paris. 1719. pag. 336.

Millefolium camphoratum, aureum, monomota-pense. Pluken. Mantiss. pag. 150. & Almath. pag. 147. tab. 450. fig. 7. *Spontanea*.

Ses racines sont dures, ligneuses, jetant de longues fibres; elles produisent des tiges simples, hautes d'un pied, presque ligneuses à leur partie inférieure, droites, pubescentes, anguleuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, anguleuses, ailées, à découpures nombreuses, hérissées de poils rudes au toucher; les folioles opposées, pinnatifides ou incisées profondément; les découpures aiguës.

Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux, fastigiés, munis de bractées cailloteuses ou feuillées. Leur calice est presque glabre, un peu arrondi, composé d'écaillés imbriquées, serrées, égales; les inférieures plus petites, aiguës; les supérieures oblongues, un peu obtuses, concaves, presque courbées en carène, d'un jaune-clair. La corolle est composée entièrement de fleurons tous hermaphrodites, planes, jaunes, tubulés, infundibuliformes; le tube court, le limbe à cinq découpures réfléchies; les filaments courts & capillaires; les anthers ovales, cylindriques; l'ovaire oblong, un peu courbé, enroulé par un léger rebord membraneux; le style filiforme, de la longueur des étamines; deux stigmates réfléchis, légèrement pubescens; le réceptacle nu.

Cette espèce cultivée (d'après Bergius) est à peine reconnoissable. Ses tiges sont plus élevées, presque entièrement herbacées, très-ranunculées; les rameaux épais, relevés, chargés des rudimens de beaucoup de feuilles & d'autres rameaux; les feuilles pétiolées, épaisses, ailées, à divisions nombreuses; les pétioles amplexicaules, munis à leur base de stipules ou de folioles incisées, appendiculées. Le corymbe est ample, terminal, composé de plusieurs autres parties; les pédoncules allongés, filiformes, pubescens.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance. Son odeur est forte, pénétrante, s'approche de celle de la tanaisie commune. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

11. TANAISE à grandes fleurs. *Tanacetum grandiflorum*.

Tanacetum cand. herbaceum, unifloro, simpliciter; foliis serratis, radicalibus, ovatis; caulinis lanceolatis, fissilibus, inciso-serratis.

Balsamita (grandiflora), foliis dentatis; radicalibus spatulato-ovatis, oblongis, caulinis lanceolatis; caule simplici, hirsuto, unifloro. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 162. & Act. Soc. Hist. Nat. Paris. vol. 1. pag. 1. tab. 1.

Balsamita grandiflora. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1810. n°. 1.

C'est une très-belle espèce, remarquable par la grandeur de ses fleurs, solitaires à l'extrémité des tiges, & que l'on cultive aujourd'hui comme plante d'ornement dans plusieurs jardins de l'Europe.

Ses tiges sont droites, presque simples ou chargées de deux ou trois rameaux, velues, striées, hautes de deux ou trois pieds, tendres, herbacées, chargées de poils blanchâtres & crépus. Les feuilles sont épaisses, presque kiliées; les racines ovales-oblongues, presque spatulées, un peu charnues, presque feuilées, obtuses à leur sommet,

inégalement dentées en scie à leurs bords, vertes, chargées en dessous de quelques poils rares ; les feuilles caulinaires, sessiles, lancéolées, obtuses, dentées en scie ou presque incisées, longues de trois pouces, larges d'environ six lignes, rétrécies presque en petiole à leur base ; la partie supérieure des tiges nue.

Les fleurs sont solitaires, solitaires, terminales, larges d'environ un demi-pouce, de couleur jaune ; le calice ouvert, composé d'écaillés imbriquées, foliacées, serrées, disposées sur trois ou quatre rangs ; les extérieures subulées, les intérieures linéaires, membraneuses à leur sommet &c. à leurs bords, les fleurs tous hermaphrodites, petits, tubulés, à cinq dents ; les anthères petites, à peine plus longues que la corolle ; les semences petites, glabres, oblongues, striées, couronnées par une petite membrane unilatérale, tronquée ; le réceptacle légèrement convexe, filonné, muni quelquefois de quelques petites folioles rates.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines parmi les moissons, aux environs d'Alger ; elle fleurit au commencement du printemps. On la cultive au Jardin d. s. Plantes de Paris. ♂ (V. v.)

12. TANASIE en éventail. *Tanacetum flabelliforme*. Lher.

Tanacetum corymbis simplicibus, foliis deltoidibus, apice serratis. Lherit. Sert. Angl. 21. — Lam. Illustr. Gen. tab. 696. fig. 2. — Curtis, Magaf. n°. 212.

Pentzia crenata. Thunb. Prodrum. pag. 145. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1808.

Gnaphalium (dentatum), fruticosum, foliis cuneiformibus, sessilibus, dentatis ; corymbis simplicibus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1194. — Roy. Lugd. Bat. t. 51.

Coma aurea, incana, foliis obtusis, tridentatis ; capitulis oblongis. Eurm. Afric. pag. 185. tab. 68. fig. 3.

C'est un fort petit arbrisseau, entièrement blanchâtre, dont les tiges sont droites, ligneuses, fort grêles, hautes de six à huit pouces, cylindriques, rameuses ; les rameaux élancés, alternes, soyeux &c. un tomenteux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, deltoides, presque cuneiformes, étalées & plissées en éventail, petites, blanchâtres, épaisses, veinées, simples, entières, rétrécies à leur base, élargies, très-obtusées, tronquées & dentées inégalement en scie à leur sommet, blanchâtres & soyeuses à leurs deux faces, souvent réunies par paquets.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en corymbes peu garnis, médiocrement rameux. Leur calice est hémisphérique, un peu allongé, composé d'écaillés imbriquées,

très-inégales, fort petites, un peu membraneuses, presque obtusées ; la corolle d'un jaune doré & luisant, entièrement composée de filements tous hermaphrodites, courts, tubulés ; leur limbe presque campanulé, divisé à son orifice en cinq dents aiguës ; les semences glabres, fort petites, couronnées par une membrane laciniée à ses bords. Le réceptacle est nu.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance. h (V. f.)

* Espèces moins connues.

* TANASIE à feuilles imbriquées. *Tanacetum vestitum*. Thunb.

Tanacetum foliis filiformi-trigonis, imbricatis ; panicula terminali. Thunb. Prodrum. pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1809. n°. 1.

Ses tiges sont garnies de feuilles épaisses, imbriquées, filiformes, entières, à trois faces, presque triangulaires ; les fleurs disposées en une panicule terminale. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

* TANASIE à longues feuilles. *Tanacetum longifolium*. Thunb.

Tanacetum foliis lineari-filiformibus, racemo terminali, fastigiato. Thunb. Prodrum. pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1809. n°. 2.

Cette espèce a ses tiges garnies de feuilles simples, très-étroites, linéaires, longues, presque filiformes. Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une grappe fastigiée. On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

* TANASIE à fleurs axillaires. *Tanacetum axillare*. Thunb.

Tanacetum foliis connatis, lineari-filiformibus ; floribus axillaribus, sessilibus. Thunb. Prodr. pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1810. n°. 4.

On distingue cette espèce à ses feuilles opposées, conniventes à leur base, simples, entières, linéaires, filiformes. Les fleurs sont sessiles, situées dans l'aisselle des feuilles. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

* TANASIE à folioles obtuses. *Tanacetum obtusum*. Thunb.

Tanacetum foliis bipinnatis, glabris ; pinnulis linearibus, obtusis ; floribus solitariis, glabris. Thunb. Prodrum. pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1813. n°. 13.

Ses feuilles sont alternes, deux fois ailées, composées de folioles glabres, linéaires, obtuses

à leur sommet. Les fleurs sont glabres & solitaires. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

* TANASIE à fleurs tomenteuses. *Tanacetum grandiflorum*. Thunb.

Tanacetum foliis bipinnatis, villosis; pinnulis linearibus, acutis; floribus solitariis, tomentosis. Thunb. Prodr. pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1813. n°. 14.

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles & ses fleurs velues. Les feuilles sont alternes, deux fois ailées, composées de folioles linéaires, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont solitaires & tomenteuses. On la rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

* TANASIE multiflore. *Tanacetum multiflorum*. Thunb.

Tanacetum foliis bipinnatis, villosis; pinnulis acutis; paniculis compositis, fissigatis. Thunberg. Prodr. pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1814. n°. 16.

Ses tiges sont garnies de feuilles deux fois ailées, alternes, velues, composées de folioles aiguës. Les fleurs sont disposées en panicules composées, rameuses, latigées. On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

* TANASIE à feuilles de lin. *Tanacetum linifolium*.

Tanacetum foliis lanceolatis, canaliculatis; racemo terminali, fissigato. Thunb. Prodr. pag. 147. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1809. n°. 3.

Aphanasa (linifolia), foliis linearibus, corymbisomphici. Linn. f. Suppl. 361. ? — Lam. Dict. vol. 1.

Cette espèce parait être la même que celle de Linné fils, dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage, à l'article ATHANASIE. Ses feuilles sont linéaires-lancéolées, un peu canaliculées; ses fleurs disposées en grappes terminales; les tiges ligneuses. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance. b

Observations. Plusieurs auteurs, & particulièrement Willdenn, rapportent au genre *tanacetum* plusieurs espèces d'*achillea* qui ont déjà été mentionnées dans cet ouvrage, à l'article l'ACHILLEE, telles que, 1°. la tanasie argentée (*tanacetum argenteum* Willd.), *achillea argentea*, Lam. Encycl. vol. 1, pag. 291. 2°. la tanasie anguleuse (*tanacetum angulosum* Willd.), *achillea filipendulina*, Lam. Encycl. l. c. ; 3°. la tanasie volant-d'eau (*tanacetum myriophyllum* Willd.), *achillea bipinnata*, Lam. Encycl. l. c.

Il convient aussi de rapporter au genre *balsamita*,

misita, que j'ai présentée ici comme une division du genre *tanacetum*, 1°. le *mauricaria virgata*, Lam. Encycl., qui est le *chrysanthemum flosculosum*, var. *β*. Linn.; le *costa granata*, Jacq. Observ. 4, pag. 4, tab. 81; le *chrysanthemum discoidesum*, All. Pedem. n°. 687, tab. 11, fig. 1, & enfin le *balsamita virgata*, Desfont. Act. Soc. Hist. Nat. Paris. vol. 1, pag. 2. — 2°. Le *mauricaria rigida*, Lam. Encycl., qui est le *chrysanthemum flosculosum*, var. *α*. Linn., & le *balsamita ageratifolia*, Desf. Act. Soc. Paris. vol. 1, pag. 2.

TANI. Rheed, Hort. Malab. vol. 4. pag. 13. tab. 10.

Myrobolanus bellirica. Breyn. Icon. 18. tab. 4. — Blackw. Herb. tab. 401. fig. 1. Malt. — Gærtner de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 90. tab. 97. fig. 2.

C'est, d'après Rheed, un grand arbre du Malabar, dont le tronc est épais, portant à son sommet une cime étalée, composée de rameaux glabres, d'un vert-cendré; le bois d'un blanc-jaunâtre; l'écorce glabre, épaisse, cendrée en dehors, jaune en dedans. Les feuilles sont éparées, situées à la partie supérieure des rameaux, longuement pétioles, amples, épaisses, oblongues, un peu arrondies, entières à leurs bords, légèrement acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, d'un vert-foncé & luisant en dessus, plus clair en dessous, marquées de nervures simples, alternes, latérales, soutenues par de longs pétioles glabres, cylindriques.

Les fleurs sont petites, odorantes, disposées en grappes latérales, d'un vert-blanchâtre, chacune d'elles divisée en cinq découpures oblongues, à peine ouvertes, renfermant dix étamines courtes, d'un blanc-jaunâtre; il leur succède des fruits en forme de poire, assez fenêtrables à nos grosses prunes, charnues, revêtues d'une écorce mince, rougeâtre, glabre & luisante; la partie charnue, verte, succulente, insipide, renfermant un osselet oblong, arrondi, qui contient un noyau blanc, d'une saveur agréable, de la grosseur d'une noisette.

Cet arbre croît au Malabar, dans les terrains sablonneux; il est toujours vert, fleurit & fructifie presque en tout temps. Son bois est employé avantageusement pour la construction des navires. Les Indiens fabriquent avec le tronc, de petites barques d'une seule pièce, qu'ils appellent *manjous*. Les noyaux des fruits sont bons à manger; on en retire une huile qu'on prétend être bonne pour fortifier & faire croître les cheveux. Le suc de l'écorce & des racines, ajouté au riz cuit au lait, appaie les fortes douleurs de la colique.

Observations. J'ai présenté cet arbre intéressant tel qu'il se trouve décrit dans Rheed. Gærtner décrit un fruit qu'il regarde comme devoir appartenir

à ce même arbre ; il en forme un genre sous le nom de *myrobolanus*, auquel il rapporte deux autres espèces ou variétés ; mais il n'y a encore, jusqu'à présent, que les fruits de bien connus dans ce nouveau genre, qui paroit devoir appartenir à la famille des chéales & avoir des rapports avec les badamiers (*terminalia*), & qui offre pour caractère essentiel :

Un drupe en baie, dont l'enveloppe (*putamen*, Gært.) est un peu arrondie, anguleuse, sillonnée, à une seule loge, contenant une semence amygdaloïde, inversée ; les cotylédons foliacés, contournés en spirale.

Dans la plante dont il est ici question, que Gærtner nomme *myrobolanus bellirica*, le fruit est un drupe ovale, un peu globuleux, à angles très-peu sensibles, de couleur brune ou de suie, rempli d'une chair épaisse, brune, poreuse, durcie dans les vieux fruits. L'enveloppe est très-dure, épaisse, à cinq faces peu marquées, sans valves, à une seule loge arrondie, presque triangulaire, contenant une semence à trois faces, obtuse, élargie à sa partie inférieure, acuminée à son sommet, d'un jaune-pâle ; l'embryon laiteux, de même forme que la semence ; les cotylédons épais, foliacés, roulés en une spirale triangulaire dans la longueur de la semence ; la radicule supérieure, courte, arrondie, recouverte par les cotylédons.

Gærtner rapporte au même genre le *terminalia* (*chebula*), *foliis ovatis, nudis ; petiolis supra biglandulosis ; racemis simplicibus*. Retz. *Calic. 5*, pag. 31, & auquel il a consacré le nom de *myrobolanus chebula* que lui a donné Blackwel, tab. 401, fig. 2. (*Medicaris*.) Son fruit, plus gros que celui de l'espèce précédente, est de forme ovale, s'aminçant à ses deux extrémités ; il est de couleur brune-foncée, à dix angles ; les angles alternes, plus grands. Sa chair est dure, brune, fragile ; elle a l'aspect luisant d'une résine. L'enveloppe est osseuse, à une seule loge arrondie, dans laquelle est renfermée une semence ovale-oblongue, acuminée à sa partie supérieure, un peu comprimée, noirâtre, munie à sa base d'un cordon ombilical, filiforme. L'embryon a la même forme que la semence ; les cotylédons roulés en spirale ; la radicule supérieure & arrondie.

La troisième espèce, *myrobolanus citrina*, pourroit bien n'être, d'après le même auteur, qu'une variété de la précédente. Son drupe est ovale-oblong, plus grêle, jaunâtre, irrégulièrement anguleux, toujours ridé entre ses angles ; la chair & l'enveloppe de même nature que la précédente, ainsi que les semences ; l'embryon charnu, foliacé, roulé en spirale. (Voyez pour quelques autres *myrobolans*, les articles MOMBIN & PHYLANTANE.)

TANIBOUCHIER. *Tanibouca*. Genre de plantes dicotylédones, de la famille des chéales, qui a

Botanique. Tome VII.

des rapports avec les *pames*, qui comprennent des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, les fleurs disposées en épis axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice urcéolé, à cinq découppures, soutenu par une bractée ; dix étamines ; un ovaire inférieur ; un style ; un stigmate ; le fruit comprimé, orbiculaire, dilaté.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice adhérent avec l'ovaire, divisé à son sommet en cinq découppures ovales-aiguës ou un peu arrondies, ouvertes ; muni d'une bractée à sa base.

2°. Une corolle nulle.

3°. Dix étamines, dont les filamens sont courts, insérés sur le calice, alternes avec ses divisions, terminés par des anthères ovales, à deux loges.

4°. Un ovaire renfermé dans le calice, velu, pyriforme, surmonté d'un style grêle, verdâtre, incliné, terminé par un stigmate aigu.

Le fruit est une capsule comprimée, monosperme, assez grande, orbiculaire, environnée d'une aile membraneuse. (*Ex herbar. Juss.*)

E S P È C E.

TANIBOUCHIER de Guiane. *Tanibouca guianensis*.

Tanibouca foliis alternis, floribus axillaribus, spicatis. (N.)

Tanibouca guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. tab. 178. — Juss. Gen. Plant. pag. 76. — Pers. Synop. Plant. vol. 1. pag. 486.

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt pieds & plus : son tronc a environ deux pieds de diamètre ; son bois est blanc, cassant, peu compacte ; son écorce cendrée ; il pousse à son sommet des branches droites, d'autres horizontales, qui se repandent en tout sens, chargées de rameaux tortueux, garnis vers leur sommet de feuilles pétioles, alternes, lisses, fermes, très-entières, ovales, terminées en pointe ; les plus grandes, longues de sept pouces fur trois de largeur, soutenus par un pétiole long d'un pouce, convexe en dessous, creulé en gouttière en dessus.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en épis ou en petites grappes simples ; leur odeur approche de celle du bois de Sainte-Lucie. Le pedoncule commun est simple, grêle, cylindrique, plus court que les feuilles ; il soutient des fleurs presque sessiles, alternes, fort petites. Leur calice est velu, verdâtre, adhérent avec l'ovaire, évasé, à son limbe, en cinq découppures.

D d d

pures égales, élargies à leur base, terminées en poire, blanches & couvertes en dedans de poils très-fins. Il n'y a point de corolle; mais à la base de chaque fleur existe une bractée petite, ovale, un peu velue. Les étamines sont au nombre de dix, presque aussi longues que les découpures du calice; les filamens courts; les anthères jaunes.

Cet arbre croît en Guiane, dans une île de la Crique des Galibis, & entre Courou & Sinémat, dans les lieux marécageux; à quelque distance des bords de la mer; il perd ses feuilles tous les ans, & fleurit dans le courant du mois de mai. *h*

TANJOU. *Tamonnus litorea*. Rumph. Hort. Amboin. vol. 2. pag. 193. tab. 64.

Grand arbre de l'île d'Amboine, qui s'élève perpendiculairement sur un tronc droit, cylindrique, très-épais, chargé de rameaux nombreux, très-étalés, revêtus d'une écorce cendrée, brune ou noirâtre, d'où découle un suc épais, mais peu abondant. Les feuilles sont alternes, éparées, pétiolées, simples, assez grandes, ovales ou un peu oblongues, très-entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, aiguës & un peu acuminées à leur sommet, longues de quatre à cinq pouces, sur environ deux lignes de large.

Les fleurs sont latérales, disposées dans l'aisselle des feuilles supérieures, solitaires ou réunies quelques-unes ensemble, portées par des pédoncules simples ou bifides, beaucoup plus courts que les feuilles. Le calice est jaunâtre, composé de quatre découpures ouvertes; les pétales blancs, nombreux, accumulés, fort petits, plus courts que le calice, exhalant une odeur foible, mais très-agréable. Le fruit est une baie ou un drupe de la forme & à peu près de la grosseur d'une olive, de couleur jaune à mesure qu'elle mûrit, soutenu à sa base par le calice persistant. L'écorce est sèche, fragile, couvrant une substance pulpeuse, charnue, dans laquelle est renfermé un noyau glabre, très-aigu, qui contient une amande blanche, épaisse, visqueuse.

Cet arbre croît sur les rivages stériles & pierreux de l'île d'Amboine. Son bois est blanc à l'extérieur; il prend une teinte rouge d'aurant plus foncée, que le bois est plus intérieur. On l'emploie agréablement pour des meubles & plusieurs usages de ménage; il sert aussi dans la construction des barques.

TANROUGE. *Weinmannia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, régulières, affilée à la famille des Saxifragées, qui a des rapports avec les *canonia*, & qui comprend des arbres ou arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes ou plus souvent opposées, simples ou ailées; les fleurs disposées en longues grappes terminales ou axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre découpures profondes; quatre pétales; huit étamines; deux styles; une capsule bivalve, à deux loges, à deux pointes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice profondément divisé en quatre découpures ovales, étalées.

2°. Une corolle composée de quatre pétales égaux, plus grands que le calice.

3°. Huit étamines, dont les filamens sont courts, droits, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire un peu arrondi, surmonté de deux styles, de la longueur des étamines, terminés par autant de stigmates aigus; un disque composé de huit glandes, environnant la base de l'ovaire.

Le fruit est une capsule à deux loges, divisées en deux valves à leur partie supérieure, dont les rebords rentrants forment la cloison, & renferment environ six à huit semences un peu arrondies.

Observations. Ce genre assez naturel, très-voisin des *canonia*, dont il diffère par deux parties de moins dans chacune de celles de la fructification, appartient à la famille des Saxifragées par ces mêmes parties; mais il en diffère singulièrement par le port, les Saxifragées ne renfermant que des plantes herbacées ou à peine sous-ligneuses, à feuilles alternes, tandis que les *Weinmannia* sont des arbres ou arbrisseaux à feuilles opposées, & très-souvent ailées avec une impaire. Leurs fruits les rapprochent aussi des *icea*, & leur donnent par conséquent des rapports avec les rosagées.

ESPÈCES.

1. TANROUGE glabre. *Weinmannia glabra*. Linn. f.

Weinmannia foliis pinnatis, foliolis obovatis, crenatis, levibus. Linn. f. Suppl. pag. 228. — Lam. Illustr. Gener. tab. 313. fig. 1. — Swartz, Observ. pag. 151. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 436. n°. 1.

Weinmannia pinnata. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 515.

Arbuste dont les rameaux sont opposés; les plus jeunes légèrement pubescents, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ailées avec une impaire; la nervelle commune, ailée entre les folioles, se divisant en articulations ovales-oblongues; les folioles au nombre de onze à treize, petites, ovales, opposées, sessiles, glabres à leurs deux faces, rétrécies à leur base, très-obtusées à leur sommet, un peu plus étroites à un de leurs côtés, dentées en

scie à leur contour, munies, entre chaque paire de pétioles, de stipules foliaires, caduques, ovales, presque de la grandeur des folioles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes foliaires, très-glabres; pédoncules, droites, simples, plus longues que les feuilles; elles sont chargées de fleurs nombreuses, petites, pédicellées; les pédicelles uniflores, presque fasciculés. Le calice est composé de quatre folioles blanchâtres, oblongues, ouvertes; la corolle est blanche; les pétales lancéolés, trois fois plus longs que le calice; l'ovaire ovale, marqué de deux sillons; deux styles blancs & filiformes; les stigmates capités; une capsule petite, ovale, acuminée, à deux loges, divisée en deux valves jusque vers son milieu.

Cette plante croît à la Jamaïque. *Th* (V. f.)

2. TANROUGE trichosperme. *Weinmannia trichosperma*. Cavan.

Weinmannia foliis impari-pinnatis; petiolo communi alato; articulis quadrangulatis, racemis axillaribus. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 45. tab. 567.

Cette espèce diffère du *weinmannia glabra* par ses articles quadrangulaires & non ovales, par ses grappes axillaires. Ses tiges sont ligneuses, hautes de dix pieds, presque articulées à l'insertion des rameaux; ceux-ci sont opposés, chargés de poils roussâtres, garnis de feuilles opposées, pétioles, ailées avec une impaire, composées de neuf à onze folioles ovales, larges de deux ou trois lignes, longues d'un demi-pouce, rétrécies en pointe à leur base, dentées en scie, vertes & luisantes à leur face supérieure, ferrugineuses à leur face inférieure, sessiles, accompagnées de deux stipules ovales; le pétiole commun nu à sa base, ailé entre les folioles par des membranes quadrangulaires; l'angle inférieur aigu, le supérieur obtus, les latéraux droits; les stipules caduques, ovales.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, axillaires, foliaires, opposées, presque de la longueur des feuilles. Les capsules sont glabres, ovales, à deux pointes en bec, à deux loges, renfermant des semences ovales, réniformes, couvertes de poils ferrugineux.

Cette plante croît au Chili, à Saint-Charles. Elle porte ses fruits dans le mois de février. *Th* (*Descript. ex Cavan.*)

3. TANROUGE hérissé. *Weinmannia hirta*. Sw.

Weinmannia foliis pinnatis, foliolis ovatis, serrato-crenatis, subius racemisque hirsutis. Sw. *hirta*. Prodr. pag. 63. — Flor. Ind. occid. vol. 2. p. 691. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 437. n.º 2.

Weinmannia fruticosa, foliis subrotundis, serratis, per pinna cordato-alatas; racemis terminalibus, pinnis & ramis oppositis. Brown, Jam. 212.

Cette plante a de très-grands rapports avec le *weinmannia glabra*; elle s'en distingue principalement par les poils & le duvet qui recouvrent plusieurs de ses parties.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux opposés & pubescents, garnis de feuilles opposées, pétioles, composées de folioles sessiles, un peu arrondies, obuses, crénelées ou lenticées en scie à leurs bords, glabres en dessus, hérissées de poils en dessous, un peu rétrécies à leur base; les pétioles garnis, entre chaque foliole, d'une aile décurrense, presque en cœur.

Les fleurs sont terminales, disposées en grappes épaisses, allongées, velues; les pédicelles simples, réunis par fascicules; le calice à quatre découpures profondes; la corolle blanchâtre, beaucoup plus longue que le calice; les capsules petites, ovales-oblongues, terminées par deux longues pointes en forme de bec.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, dans les contrées méridionales de la Jamaïque. *h*

4. TANROUGE tomenteux. *Weinmannia tomentosa*. Linn. f.

Weinmannia foliis pinnatis, foliolis ovatis, integerrimis, subius tomentosis; stipulis caducis. Linn. f. Suppl. pag. 227. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 437. n.º 3.

Arbre très-rameux & chargé d'un grand nombre de feuilles, revêtu d'une écorce roussâtre. Les feuilles sont opposées, pétioles, ailées avec une impaire, vertes, glabres à leur face supérieure, tomenteuses en dessous, composées d'environ onze à treize folioles petites, un peu épaissies, ovales, très-entières, régulières, extrêmement tomenteuses à leur face inférieure; le pétiole commun ailé de chaque côté, entre les folioles, de forme ovale; des stipules caduques, foliaires, plus grandes que les folioles, situées à la base des pétioles.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux & des tiges, en grappes simples, très-épaisses, presque en forme d'épis touffus, chaque fleur soutenue par un pédicelle très-court; le calice divisé en quatre découpures très-profondes; la corolle composée de quatre pétales, les étamines environnées par une membrane très-entière, campanulée.

Cette plante se rencontre dans la Nouvelle-Grenade. *h*

5. TANROUGE trifolié. *Weinmannia trifoliata*. Linn. f.

D d d d 2

Weinmannia foliis ternatis, foliolis ellipticè lanceolatis, serratis, glaberrimis; paniculis compositis. Linn. f. Suppl. pag. 227. — Lam. Illustr. Gener. tab. 313. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 438. n°. 4.

Weinmannia foliis ternatis, foliolis ellipticis, serratis. Thunb. Prodr. pag. 77.

Cet arbrisseau a des tiges droites, glabres, ligneuses, divisées en rameaux opposés, glabres, cylindriques, garnis de feuilles opposées, longuement pétiolées, ternées, composées de trois folioles ovales, petites, presque lancéolées, rétrécies presque en pétiole à leur base, arrondies & obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, crénelées à leur contour; les crénelures presque obtuses; les pétioles très-longs.

Les fleurs sont disposées en grappes droites, épaisses, cylindriques, obtuses, plus longues que les feuilles, pédonculées, situées latéralement dans l'aisselle des feuilles, très-glabres, composées d'un très-grand nombre de fleurs serrées, médiocrement pédicellées, fort petites; les calices à quatre de coupures profondes; la corolle plus longue que le calice; les étamines plus courtes que les pétales; l'ovaire arrondi, un peu velu, surmonté d'un style court, divisé à son sommet en deux filigates épais, divergents, un peu courbés en dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

6. TANROUGE à grappes. *Weinmannia racemosa.* Linn. f.

Weinmannia foliis simplicibus, obovato-ellipticis, obtusis, dentatis; racemis glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 438. n°. 5.

Weinmannia foliis simplicibus, ovatis, serratis, utrinque glaberrimis; stipulis nullis. Linn. f. Suppl. pag. 227.

Weinmannia foliis simplicibus, ovatis, serratis, petiolatis; racemis axillaribus, solitariis. Foster, Prodr. pag. 173.

Arbrisseau dont les rameaux sont glabres, cylindriques, divisés en d'autres beaucoup plus petites, d'égal forme, garnis de feuilles opposées, pétiolées, très-simples, ovales elliptiques, obtuses à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, dentées à leur contour; les dentelures obtuses; les pétioles dépourvus de stipules.

Les fleurs sont latérales, situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en grappes solitaires ou geminées, souvent terminales, fort longues, très-glabres; chaque fleur soutenue par un pédicelle court, presque sessacé.

Cet arbrisseau croît à la Nouvelle-Zélande. (V.)

7. TANROUGE à petites fleurs. *Weinmannia parviflora.* Forstl.

Weinmannia foliis simplicibus, oblongis, acuminate, dentatis; racemis hirs, terminalibus, paniculatis. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 438. n°. 6.

Weinmannia foliis simplicibus, ovatis, serratis, subsessilibus; racemis terminalibus, ternis quinifidis. Forstl. Prodr. n°. 174.

Cette espèce a des rapports avec le *Weinmannia racemosa*; elle en diffère par la forme de ses feuilles, par ses grappes & les rameaux pubescents, par les fleurs quatre fois plus petites.

Ses tiges sont droites, cylindriques, munies de rameaux également cylindriques, très-glabres, divisés en d'autres rameaux plus petits, pubescents. Les feuilles sont opposées, médiocrement pétiolées, très-simples, oblongues, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, dentées à leurs bords; les dentelures écartées, aiguës. Les fleurs sont disposées en grappes pubescentes, situées à l'extrémité des rameaux, réunies de trois à six en une sorte de panicle.

Cette plante croît dans l'île d'Otaïti. (V.)

8. TANROUGE paniculé. *Weinmannia paniculata.* Cav.

Weinmannia foliis simplicibus, lanceolatis, serratis; floribus paniculatis. Cavan. Icon. Har. vol. 6. pag. 44. tab. 565.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de dix à douze pieds, dont les rameaux sont opposés, filonés, un peu nœux, garnis de feuilles opposées, pétiolées, glabres, lancéolées, très-simples, glauques à leur face inférieure, dentées en scie à leurs bords, longues de deux ou trois pouces, à peine larges d'un pouce; les pétioles courts, longs de deux ou trois lignes, munis de stipules lancéolées, caduques.

Les fleurs sont disposées en panicules axillaires, solitaires, dont les ramifications sont opposées, fleurées à leur sommet; les pédicelles courts, munis, à leur base, de stipules ovales, aiguës, caduques; le calice à quatre folioles ovales, étalées, caduques; la corolle d'un jaune-rougâtre, un peu plus grande que le calice, composée de quatre pétales insérés sur le calice, ovales, rétrécis en onglet à leur base; huit étamines, dont les filaments sont un peu plus longs que les pétales, insérés sur les glandes qui accompagnent l'ovaire; quatre intérieurs alternes; les anthères arrondies; un ovaire libre, ovale, velu, environné d'un disque composé de huit glandes; deux styles blanchâtres d'abord, réfléchis, puis droits, persistants;

deux stigmates simples. Le fruit est une capsule ovale-oblongue, velue, à deux loges, à deux valves, renfermant plusieurs semences oblongues, comprimées, attachées à un réceptacle court & central.

Cette plante croît au Chili, sur les côtes maritimes, proche la ville de Talcahuano. Elle fleurit au mois de février. *h* (*Descript. ex Cavan.*)

Observations. Quelquefois les fleurs ont cinq pétales, trois styles; un calice à cinq folioles; une capsule à trois valves, à trois loges.

9. TANROUGE à feuilles ovales. *Weinmannia ovata*. Cav.

Weinmannia foliis simplicibus, ovatis, crenatodentatis; floribus racemosis. Cav. Icon. Rar. vol. 6. pag. 45. tab. 166.

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ dix-huit à vingt pieds. Ses rameaux sont opposés, ltrés, légèrement noueux, renflés à l'opposition des feuilles: celles-ci font médiocrement pétioles, opposées, ovales-oblongues, crénelées, roides, glabres, à une nervure ramifiée de chaque côté & développée en veines réticulées, nombreuses, crénelées à leurs bords; les crénelures souvent dentées, longues de deux pouces, larges de plus d'un pouce; les pétioles bruns, longs d'une ligne, épais à leur base, munis de stipules courtes, ovales, caduques, interfoliacées.

Les fleurs sont petites, disposées en grappes simples, terminales, foliaires, axillaires, quelquefois géminées & plus. Le calice est divisé en quatre folioles ovales-aiguës; la corolle ferrugineuse dans l'état de dessiccation; les pétales ovales, plus longs que le calice; huit étamines plus longues que les pétales; les anthères arrondies. L'ovaire est ovale, environné d'un disque à huit glandes à peine sensibles; deux styles rétrécis.

Cette plante croît au Pérou, non loin de la ville de Saint-Bonaventure, dans un fossé creusé par les alluvions. *h* (*Descript. ex Cavan.*)

TAPIER. *Cratava*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des capriers, qui a des rapports avec les *fosida* & les *morifosia*, qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles ternées, & dont les fleurs font terminales, paniculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre divisions; quatre pétales; seize étamines & plus; un ovaire pédiculé; un stigmate sessile, capité; une baie à une loge, polyperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre ::

1°. Un calice d'une seule pièce, plane à sa partie inférieure, caduc, divisé en quatre découpures ovales, ouvertes, inégales.

2°. Une corolle composée de quatre pétales ovales-oblongs, tous inclinés du même côté, de la longueur du calice; des onglets très-courts, insérés sur les découpures du calice.

3°. Environ seize étamines & plus, dont les filaments sont feracés, inclinés du côté opposé aux pétales, beaucoup plus longs que la corolle, insérés sur le pédicelle de l'ovaire, terminés par des anthères droites, oblongues.

4°. Un ovaire ovale, supporté par un pédicelle très-long, filiforme; point de style; un stigmate sessile en tête.

Le fruit est une baie charnue, globuleuse, très-grosse, en forme de pomme ou un peu ovale, longuement pédicellée, à une seule loge, revêtue d'une écorce mince, un peu coriace.

Les semences font nombreuses, éparées dans l'intérieur de la substance pulpeuse, ovales ou arrondies, un peu échancrées.

ESPÈCES.

1. TAPIER commun. *Cratava tapia*. Linn.

Cratava foliolis ovatis, acuminatis; petalis ovato-subrotundis, obtusis; germinibus globosis. Vahl. Symbol. 3. pag. 61. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 852. n°. 2.

Cratava inermis, foliis integerrimis; foliolis lateralibus, basi antica brevioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 637. — Mill. Dict. n°. 1.

Cratava inermis. Flor. Zeyl. 211, & Spec. Plant. 1. pag. 444. — Hort. Cliff. 484.

Apiosorodon, seu arbor americana, triphyllus, altius odore, poma ferens. Pluken. Aimag. pag. 34. tab. 137. fig. 7.

Malus americana, trifolia, fructu pomi aurantis instar colorato. Commel. Hort. 1. pag. 129. tab. 67.

Tapia arborea, triphylla. Plum. Gener. Amer. pag. 22. tab. 21.

Tapia. Marçgr. Brasil. 89. — Pison. Brasil. pag. 68. tab. 69.

C'est un arbre fort élevé, dont le tronc est très-gros, droit, haut de trente à trente-six pieds & plus, revêtu d'une écorce verte, divisé vers son sommet en plusieurs branches, qui forment une cime étalée & touffue; les rameaux nombreux, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles ovales, inégales, vertes, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet; les deux late-

rales plus petites, étroites; la foliole terminale beaucoup plus grande, ovale-oblongue, large d'environ deux pouces & demi, longue de cinq pouces & plus; le pétiole glabre, très-long.

Les fleurs sont situées, à l'extrémité des rameaux, sur de longs pédoncules alternes, glabres, cylindriques, formant, par leur ensemble, une sorte de panicule terminale, lâche, étalée. Leur calice est d'une seule pièce à la base, divise en quatre découpures ovales, à peine aiguës, beaucoup plus courts que la corolle. Les pétales sont ovales, un peu arrondis, obtus, ouverts, réfléchis tous du même côté; les étamines plus longues que la corolle; les filaments filiformes, attachés sur le pédicelle de l'ovaire; les anthères oblongues, de couleur purpurine; l'ovaire globuleux, longuement pédicelle, surmonté d'un stigmate sessile, capité, obtus; il lui succède un fruit arrondi, de la grosseur d'une orange, revêtu d'une écorce brune, dure, renfermant une pulpe farineuse, un peu ferme, remplie de semences nombreuses, en forme de rein.

Cette plante croît à la Jamaïque, au Brésil, &c. &c.

2. TAPIER à feuilles ovales. *Cratæva obovata*. Vahl.

Cratæva foliis petalisque obovatis, germine oblongo. Vahl, Symbol. 3. pag. 61. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 853. n°. 3.

Il y a de très-grands rapports entre cet arbre & le *Cratæva tapia* : il en diffère par la forme de ses folioles, de ses pétales, par les découpures de son calice, & par les filaments plus longs.

Son tronc est divisé en branches à son sommet, chargé de rameaux glabres, nombreux, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées; les folioles inégales, en ovale renversé, glabres, très-entières, à peine rétrécies à leur base, portées sur un long pétiole commun. Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules simples, longs, alternes, étalés en panicule. Le calice se divise en quatre découpures oblongues; les pétales au nombre de quatre, allongés, en ovale renversé, longuement onguiculés; l'ovaire oblong, pédoncule. Le fruit est une baie semblable à celle du *Cratæva tapia*.

Cet arbre croît à l'île de Madagascar. &c.

3. TAPIER gynandrique. *Cratæva gynandra*. Linn.

Cratæva foliis membranaceis, ovatis, integerrimis; petalis lanceolatis. (N.)

Cratæva inermis, foliis integerrimis, floribus gynandris. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 636. —

Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 852. n°. 1. — Swartz, Observ. 191.

Cratæva arborea, triphylla, foliis ovatis, glabris; racemis terminalibus. Brown, Jam. 246.

Anona trifolia, flore flamineo, fructu spherico, ferrugineo, scabro, minori, alii odore. Sloan, Catal. 206. Hilt. 2. pag. 170. — Rai, Hilt. 3. pag. 78.

Arbor americana, triphylla, numerosa flaminibus, purpureis apicibus præditis, floetis umbilicem occupantibus. Pluken. Phytogr. 147. fig. 6.

Cette espèce tient presque le milieu entre les deux précédentes. Le caractère spécifique qui la distingue d'abord, disparaît, puisqu'il lui est commun avec la plupart des autres espèces, qui ont également les étamines gynandriques, c'est-à-dire, insérées sur le pédicelle de l'ovaire; celle-ci se distingue par ses feuilles minces, membranées, point épaisses; par ses pétales lancéolés & non ovales. C'est un arbre dont les rameaux sont glabres, nombreux, garnis de feuilles pétioles, alternes, à trois folioles ovales, très-entières, glabres à leurs deux faces; les fleurs disposées, vers l'extrémité des rameaux, en grappes paniculées, dont les pédoncules sont simples, uniflores, épars; les anthères purpures; l'ovaire supporté par un pédicelle de la longueur du calice. Le fruit est une baie sphérique, brune, d'une odeur d'ail.

Cette espèce croît à la Jamaïque, parmi les buissons, dans les terrains arides. &c.

4. TAPIER niervale. *Cratæva religiosa*. Forst.

Cratæva foliis petalisque lanceolato-ellipticis, utrinque acutis. Vahl, Symbol. 3. pag. 62. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 853. n°. 4. — Lam. Illustr. Gener. tab. 395.

Cratæva (religiosa), inermis, foliolis subquadri-lobis. Forst. Prodr. n°. 203. Plant. succul. 45.

Niervala. Rheed, Malab. vol. 3. pag. 49. tab. 42. — Rai, Hilt. 1644.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, longuement pétioles, ternées; les folioles presque égales, médiocrement pédicellées, ovales-lancéolées, entières à leurs bords, aiguës à leur base, un peu acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs forment, par leur ensemble à l'extrémité des rameaux, une sorte de panicule lâche, soutenue par des pédoncules longs, cylindriques, simples, glabres, uniflores. Les calices sont courts, divisés en quatre folioles petites, ovales, caduques; la baie du calice persistante sur le pédicelle du fruit; les pétales étroits, lancéolés, aiguës, beaucoup plus longs que les calices; une douzaine

d'étaimines; les filamens une fois au moins aussi longs que la corolle; les anthères épaissies, oblongues; l'ovaire ovale, soutenu par un pédicelle plus long que les étaimines; un stigmate sessile, capité. Le fruit est une baie pulpeuse, globuleuse, de la grosseur d'une petite prune; l'enveloppe coriace; les semences nombreuses, oblongues, presque réniformes, éparées dans la substance pulpeuse.

Cette plante croît dans les Indes orientales & dans les îles de la Société. *h*

5. TAPIER marmelos. *Cratava marmelos*. Linn.

Cratava spinosa, *foliis ferratis*. Linn. Flor. zeyl. n°. 212. — Mill. Dict. n°. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 853. n°. 5.

Cucurbitifera trifolia, *spinosa*, *medica*, *fructu pulpae cydoniae amulæ*. Pluken. Almag. pag. 125. tab. 170. fig. 5.

Cydonia exotica. C. Bauh. Pin. 425.

Bilanus. Rumph. Amboin. vol. 1. pag. 197. tab. 81.

Covalam. Rheed, Hort. Malab. vol. 3. pag. 37. tab. 37. — Burm. Flor. ind. 109.

Cette plante n'appartient que médiocrement aux *cratava*; elle paroit devoir constituer un genre particulier, qui auroit beaucoup plus d'affinité avec la famille des orangers, qu'avec celle des capriers. Les fleurs n'ont point de corolle; leur calice est divisé en cinq découpures; les étaimines au nombre de soixante.

C'est un arbre qui s'élève à une grande hauteur, muni d'un tronc fort épais, qui soutient, vers son sommet, plusieurs grosses branches chargées de rameaux glabres, nombreux, cylindriques, armés d'épines longues, aiguës, disposées par paires, distantes les unes des autres, placées entre les feuilles: celles-ci sont pétiolées, alternes, ternées; les folioles oblongues, un peu dentées en scie à leurs bords, terminées en une pointe aiguë, glabres à leurs deux faces, soutenues par un pétiole commun très-long.

Les fleurs sont réunies, sur un pédoncule commun & un peu rameux, en petites grappes terminales, chaque pédoncule supportant six à sept fleurs d'une odeur agréable; elles n'ont point de corolle. Leur calice est divisé en cinq découpures aiguës, réfléchies, verties en dehors, blanchâtres en dedans, contenant un très-grand nombre d'étaimines. Le fruit est une baie de la grosseur d'une orange, couverte d'une peau dure, renfermant une pulpe visqueuse, épaisse, de couleur jaune, dans laquelle sont placés plusieurs semences oblongues.

Cet arbre croît dans les Indes orientales & à l'île de Ceilan. *h*

Les Indiens aiment beaucoup les fruits de cet arbre: lorsqu'ils sont bien mûrs, ils ont un goût très-agréable. On les sert sur les tables, & on les mange avec du sucre & des oranges dans tous les desserts, comme des fruits très-délicats.

TAPIRIE. *Tapiria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des térebinthacées, qui à des rapports avec les *salsifera* & les *poupartia*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées avec une impaire, les fleurs disposées en panicules axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice à cinq divisions; cinq pétales insérés sur le disque de l'ovaire; six étaimines; point de style; cinq stigmates; une capsule à cinq côtes réunies, à cinq valves; une semence ailée dans chaque valve.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice divisé en cinq découpures profondes, ovales, obtuses.

2°. Une corolle composée de cinq pétales insérés sur le disque saillant de l'ovaire, ovales, obtus, un peu aigus à leur base, de la longueur du calice.

3°. Dix étaimines insérées sur le disque de l'ovaire, opposées aux divisions du calice & de la corolle, dont les filamens sont capillaires, plus courts que la corolle, terminés par des anthères ovales, obtuses, à deux loges.

4°. Un ovaire supérieur, à cinq côtes; point de style; cinq stigmates épais, obtus.

Le fruit est une capsule à cinq côtes, à cinq sillons, presqu'à cinq coques, à cinq valves concaves, aiguës, renfermant chacune une semence ovale, obtuse, ailée.

E S P È C E S.

1. TAPIRIE de Guiane. *Tapiria guianensis*. Aublet.

Tapiria foliis alternis, impari-pinnatis, glabris; floribus paniculatis. (N.)

Tapiria guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 470. tab. 188. — Lam. Illustr. Gener. tab. 386.

Tanqueria paniculata. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 750.

C'est un arbre très-élevé, dont le tronc épais parvient à la hauteur de cinquante ou soixante

pieds, & porte à son sommet une cime touffue, composée de branches fortes, étalées, divisées en rameaux épars, nombreux, glabres, cylindriques, garnis de feuilles éparies, alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées de trois à cinq paires de folioles ovales-lanceolées, longues de trois à quatre pouces & plus, opposées, pétioles, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet; les nervures & les veines très-fines; la foliole terminale plus grande, pétiolee.

Les fleurs sont petites, disposées en panicules axillaires & terminales, plus longues que les feuilles, droites, rameuses, étalées, très-glabres; les pédicelles courts, setacés. Le calice est glabre, à cinq découpures profondes, obtuses; la corolle blanche, petite, à peine plus longue que le calice, composée de cinq pétales ovales, obtus, inférés, aussi que les étamines, sur un disque relevé en boutonnet, qui sert de réceptacle à l'ovaire: celui-ci est ovale, à cinq côtes, surmontées de cinq stigmates féconds, obtus; la corolle est une capsule de la grosseur d'une petite noix ovale, presque globuleuse, obtuse; à cinq grosses côtes & autant de filons, très-glabre; divisée en cinq valves, renfermant chacune une semence ovale, obtuse, munie d'une enveloppe propre.

Cette plante croît dans les grandes forêts de la Guiane. Elle fleurit dans le mois de novembre.

TAPOGOME. *Tapogomea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, régulières, de la famille des crucifères, qui a des rapports avec les *canephora* & les *morinda*, & qui comprend des arbrutes ou herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées & les fleurs réunies en une tête souvent terminale, dans un involucre commun.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Des fleurs réunies en tête dans un involucre commun; un calice fort petit, à cinq dents; une corolle presque entonnoir; le limbe à cinq lobes; cinq étamines; un stigmate bifur; une baie à deux semences; le réceptacle garni de paillettes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont agrégées sur un réceptacle commun, environnées d'un involucre presque écaillé, à plusieurs folioles.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice propre fort petit, à cinq dents très-courtes, un peu aiguës.

2°. Une corolle monopétale, un peu en forme d'entonnoir, dont le tube, souvent un peu court, se divise à son limbe en cinq petites découpures.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont courts, inférés sur le tube de la corolle, terminés par des anthères non saillantes.

4°. Un ovaire ovale, fort petit, adhérent au calice, couronné par deux glandes, d'où sort un style droit, filiforme, beaucoup plus long que la corolle, terminé par un stigmate à deux divisions ouvertes.

Le fruit est une baie fort petite, ovale, contenant deux petites semences osseuses, planes d'un côté, convexes de l'autre.

Le réceptacle est garni de paillettes membranueuses, colorées, qui ne sont que les bractées persistantes, qui, à l'époque de la floraison, séparent les fleurs.

ESPÈCES.

1. **TAPOGOME violette.** *Tapogomea violacea*, Aublet.

Tapogomea capitulis globosis, terminalibus; involucri pentaphyllis; foliis oblongis, glabris.

Tapogomea (violacea), capitula florum globosa, squamosa; flore & fructu violacea. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 157. tab. 60. — Lam. Illustr. Genet. tab. 152. fig. 1.

Cephalis (violacea), capitulis globosis, terminalibus; involucri pentaphyllo; foliis nervosis, glabris. Swartz, Prodr. pag. 455. & Flot. Ind. occid. vol. 3. pag. 439.

Cephalis violacea. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 977. n°. 1.

Arbuste dont les tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, un peu flexueux, garnis de feuilles opposées, pétioles, très-simples, oblongues-lanceolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, nerveuses & reticulées, longues d'environ trois ou cinq pouces & plus, larges d'un pouce & demi, un peu rétrécies à leur base & décourcées sur un pétiole court, muni de stipules vaginales, larges, ovales, acuminées, ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont agrégées, réunies en une tête globuleuse à l'extrémité d'un long pedoncule glabre, presque simple, à peine cylindrique, axillaire & terminal; l'involucre commun composé de cinq folioles ou écailles purpurines, ovales, obovées, concaves, grandes, accompagnées, entre les fleurs, de petites bractées ovales, colorées, un peu aiguës; les caïcs très-petits, à cinq dents très-courtes, la corolle violette, fort petite, à peine tubuleuse; le limbe divisé en cinq lobes obtus; les étamines filiformes vers la base du tube; les anthères petites, ovales-oblongues, linéaires, presque filiformes; le style droit, alongé, terminé par un stigmate bifide, divergent; une petite

petite baie ovale, glanduleuse à son sommet, renfermant deux semences. Le réceptacle est garni de paillettes lancéolées, aiguës, qui sont les petites bractées persistantes des fleurs.

Cette plante croît dans la Guiane & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique. ♀

2. TAPOGOME tomenteuse. *Tapogomea tomentosa*. Aublet.

Tapogomea capitulis globosis, tomentosa, corymbosis, terminalibus; involucri diphyllo; foliis oblongis, villis.

Tapogomea (tomentosa), floribus capitatis; involucri amplo, purpureo-violaceo ovato-latis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 160. tab. 60. — Lam. Illustr. Gener. tab. 152. fig. 2.

Cephalis (tomentosa), hirsuta, capitulis pedunculatis, axillaribus terminalibusque; involucri apophyllis, cordatis, acuminatis. Vahl, Egl. 1. pag. 19.

Cephalis tomentosa. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 977. n° 2.

Ses tiges, longues de trois ou quatre pieds, se divisent en rameaux cylindriques, pubescents, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, très-entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, épaisses, velues, rétrécies à leur base, longues de quatre à huit pouces & plus, larges au moins de quatre pouces, marquées de fortes nervures simples, latérales, parallèles, & de veines fines, réticulées, munies, à la base des pétioles, de stipules lancéolées, acuminées, de la longueur des pétioles.

Les fleurs sont terminales ou latérales, sortant de l'aisselle des feuilles, soutenus par un long pédoncule simple, velu, cylindrique, terminé par une tête de fleurs globuleuse; l'involucre commun composé de deux grandes folioles d'un pourpre-violet, enveloppant toutes les fleurs; deux petites écailles ou bractées ovales-lancéolées, velues à la base du pédoncule; les calices partiels courts, à cinq découpures ovales; la corolle purpurine, tubulée; son tube cylindrique, plus long que le calice, divisé à son limbe en cinq dents aiguës; les étamines presque sessiles, insérées vers l'orifice du tube; le style saillant; le stigmate à deux découpures divergentes. Le fruit est une baie ovale, rétrécie en pointe à sa base, tronquée à son sommet; le réceptacle garni de paillettes lancéolées, obtuses.

Cet arbrisseau croît dans les grandes forêts de la Guiane & dans l'île de la Trinité. ♀

3. TAPOGOME écarlate. *Tapogomea punicea*.

Tapogomea glaberrima, capitulis terminalibus, sessilibus; involucri diphyllo; foliis glabris. Botanique, Tome VII.

Cephalis punicea. Vahl, Egl. vol. 1. pag. 19. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 977. n° 3.

Ses rameaux sont médiocrement cylindriques, très-glabres, d'une couleur pourpre-pâle, garnis de feuilles opposées, pétiolées, lancéolées elliptiques, longues de trois à cinq pouces, luisantes à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, rétrécies à leurs deux extrémités, aiguës à leur sommet, légèrement veinées en dessous, presque sans veines apparentes en dessus, traversées par une côte jaunâtre; le pétiole long d'environ un pouce, muni à sa base de quelques poils crépus & caducs; des stipules courtes, tubuleuses, entières, situées à la base des pétioles.

Les fleurs sont agrégées, réunies en une tête de la grosseur d'une noix ordinaire, à l'extrémité d'un long pédoncule terminal, situé entre deux rameaux, roide, long de quatre pouces, anguleux, de couleur purpurine, un peu plus épais que les rameaux latéraux; l'involucre composé de deux grandes folioles ovales, en cœur, de couleur écarlate, à peine veiné; la corolle violette; les baies petites, ovales, aiguës; le réceptacle garni de paillettes oblongues, les extérieures plus grandes.

Cet arbrisseau se rencontre dans les forêts de la Jamaïque. ♀ (*Descript. ex Vahl.*)

4. TAPOGOME à fleurs axillaires. *Tapogomea axillaris*.

Tapogomea capitulis axillaribus, sessilibus.

Cephalis axillaris. Swartz, Prodr. pag. 45, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 441. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 978. n° 5.

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux glabres, médiocrement cylindriques, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, glabres à leurs deux faces, très-entières, vertes en dessus, plus pâles en dessous, nerveuses, acuminées à leurs deux extrémités, soutenues par des pétioles glabres, allongés, munis à leur base de stipules opposées, ovales, membraneuses. Les fleurs sont réunies, dans l'aisselle des feuilles, en petites têtes sessiles, garnies à leur base d'un involucre composé de quatre à six folioles ovales, membraneuses; les intérieures ovales & de la longueur des fleurs, qu'elles séparent. Leur calice est court, à cinq dents; la corolle petite & tubulée.

Cette plante croît en Amérique, à l'île Saint-Christophe. ♀ (*Descript. ex Swartz.*)

5. TAPOGOME étalée. *Tapogomea elata*.

Tapogomea capitulis globosis, terminalibus; pedunculatis elongatis; involucri diphyllo; foliis glabris.

Cephalis elata. Swartz, Prodr. pag. 45, & Flor. E. c. c.

Ind. occid. vol. 1. pag. 437. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 978. n. 4.

Cet arbrus s'élève à la hauteur de douze à quinze pieds : ses branches se divisent en rameaux glabres, tétragones, fragiles, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, très-entières, glabres à leurs deux faces, luisantes, membraneuses, un peu acuminées à leur sommet, longues de six pouces & plus, marquées de nervures arquées & de veines très-fines ; les pétioles courts, canaliculés en dessus, accompagnés de stipules glabres, convexes, obtusés, à deux dents.

Les fleurs sont réunies en une tête terminale, à l'extrémité d'un pédoncule commun, droit, simple, long d'un demi-pied. L'involucre est composé de deux grandes folioles en cœur, un peu arrondies, entières, membraneuses, conniventes & concaves à leur base, d'un rouge-pourpre, & de plusieurs autres plus petites, roides, ovales, colorées, placées entre les fleurs. Leur calice est terminé par cinq petites dents droites ; le tube de la corolle un peu rétréci à sa base ; le limbe à cinq découpures ovales, épaissies ; l'ovaire velu ; l'ovaire oblong, anguleux ; le style épais, bifié ; le stigmate charnu, pubescent. Le fruit est une baie oblongue, renfermant deux semences striées, oblongues, planes, convexes.

Cet arbrisseau croît sur les hautes montagnes, dans les contrées méridionales de la Jamaïque. *Th* (Descript. ex Swartz.)

6. *TAPOGOME* glabre. *Tapogomea glabra*. Aubl.

Tapogomea capitulis terminalibus, nudis ; foliis oblongis, glabris ; caulibus erectis ; ramulis villosis.

Tapogomea (glabra), foliis ovatis, acutis, glabris ; capitulo florum hirsuto. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 168. tab. 63.

Cephalis glabra. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 979. n. 8.

Ses racines sont fibreuses, ramifiées ; elles produisent une tige cylindrique, velue, ligneuse, droite, haute de deux ou trois pieds, munie de rameaux de même forme, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, très-entières, glabres à leurs deux faces, terminées en pointe à leur sommet, vertes en dessus, plus pâles en dessous ; les plus grandes, longues de cinq pouces & plus, sur deux poncees & demi de largeur ; les pétioles courts, munis de deux stipules vaginiales, opposées, bifiées, étroites, alongées, aiguës.

Les fleurs sont ramassées en tête à l'extrémité des rameaux, soutenues par un pédoncule long d'environ un pouce, hérissé de poils rouilleux ; dépourvues d'involucre extérieur, mais chaque fleur séparée par des écailles étroites. Leur calice

est d'une seule pièce, à cinq dents courtes, aiguës ; la corolle bleue, monopérale ; son tube alongé, renflé, partagé à son limbe en cinq lobes aigus ; cinq filaments courts, soutenant des anthères oblongues, à deux loges. L'ovaire se convertit en une baie bleue, oblongue, striée, renfermant deux semences ossées, appliquées l'une contre l'autre.

Cette plante croît dans les grandes forêts de la Guiane, surtout dans les endroits un peu découverts. Elle fleurit dans les mois de juillet & d'août. *Th*

7. *TAPOGOME* à fleurs blanches. *Tapogomea alba*. Aubl.

Tapogomea capitulis terminalibus ; foliis ovatis, subius pubescentibus ; caule repente, glabro.

Tapogomea (alba), caulibus decumbentibus, foliis ovatis, supra parum viridibus, parvis pubescentibus, subius cinereis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 164. tab. 62. fig. 4.

Cephalis alba. Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 978. n. 7.

Ses tiges, ainsi que ses rameaux, sont rampans, étalés à la surface de la terre, noueux, un peu velus, poussant de chaque nœud des racines capillaires. A chaque nœud croissent des feuilles opposées, pétiolées, ovales, très-entières, vertes à leur moitié inférieure, ordinairement rougeâtres à leur partie supérieure, glabres en dessus, cendrées & pubescentes en dessous, aiguës à leur sommet ; leur pétiole court, canaliculé en dessous, muni de deux stipules lancéolées, aiguës, opposées.

Les fleurs réunies en tête à l'extrémité des rameaux, entourées d'un involucre à cinq folioles rouilleuses & frangées ; chaque fleur séparée par une écaille longue, étroite ; le calice divisé à son limbe en cinq petites dents courtes, aiguës ; la corolle rougeâtre, quelquefois blanche ; le tube court, le limbe partagé en cinq lobes aigus ; cinq filaments inférieurs un peu au dessous de l'orifice du tube, courts, supportant des anthères à deux loges ; l'ovaire oblong, couronné par deux petits corps glanduleux, d'où sortent deux styles, terminés par un stigmate obtus. Le fruit est une baie rouge, visqueuse en dedans, à deux semences.

Cette plante croît dans les grandes forêts de la Guiane ; elle fleurit & fructifie en juillet. *Th*

8. *TAPOGOME* purpurine. *Tapogomea purpurea*. Aublet.

Tapogomea capitulis terminalibus, nudis ; foliis oblongis, piliis, subius villosis ; caule repente, tomentoso.

Tapogomea (purpurea), *caulibus repensibus*, *foliis lanceolatis*, *linde albâ supra notatis*, *subius hirsutis rufiscentibus*. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 162. tab. 63. fig. 3.

Cephalis purpurea. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 978. n°. 6.

Ses tiges font rampantes, noueuses, étalées sur la terre, poussant de chaque nœud des racines menues, fibreuses, capillaires, & des rameaux qui s'étendent en tout sens, chargés de poils rouffâtres, garnis de feuilles opposées, indécrochantes pétioles, ovales-oblongues, entières, aiguës à leur sommet, vertes en dessus, & partagées dans leur milieu par une bande blanchâtre, veinée de rouge, couvertes en dessous de poils rouffâtres, ciliées à leurs bords; le pétiole court, coudé, velu, muni de deux bractées opposées.

Les fleurs naissent en forme de tête, à l'extrémité des rameaux, entre deux feuilles. Leur pédoncule est court, portant à son sommet deux petites écailles tomenteuses, d'entre lesquelles sortent cinq folioles rouffâtres; les fleurs séparées les unes des autres par des bractées en écailles longues, étroites. Le calice est court, pubescent; la corolle purpurine; son tube court; le limbe à cinq découpures; aiguës; cinq anthers oblongues, à deux loques; l'ovaire couronné de deux glandes, d'où sort un style bifié; les stigmates obus. L'ovaire se convertit en une bâte purpurine, remplie d'une substance visqueuse, renfermant deux semences osseuses.

Cette plante croit dans les grandes forêts de la Guiane. ♀

9. *TAPOGOMEA* carapiche. *Tapogomea carapichea*.

Tapogomea capitulis terminalibus, *globofis*; *involucro tetraphyllo*, *inaequali*; *foliis oblongis*, *acuminatis*. Lam. Illustr. Gen. tab. 152. fig. 3.

Carapichea guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 168. tab. 64. — Lam. Encycl. vol. 1. pag. 621.

Cephalis involucreta. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 979. n°. 9.

Cette espèce se distingue aisément aux quatre folioles de son involucre, dont deux opposées, très-longues, lancéolées; deux autres également opposées, beaucoup plus courtes. Cette plante a déjà été mentionnée dans cet ouvrage, à l'article *CARAPICHE*. Elle doit être réunie à ce genre, dont elle offre tous les caractères, excepte que son fruit est une petite baie sèche, capsulaire, anguleuse.

Elle croit dans les forêts de la Guiane. ♀

Observations. Le *morinda maff:sa*, Jacq. Amer., décrit dans cet ouvrage à l'article *MORINDE*

MOUSSEUSE, ne peut être séparé de ce genre; il se trouve mentionné dans Willdenow, sous le nom de :

Cephalis (muscosa), *capitulis subrotundis*, *subfissilibus*, *terminalibus*; *paleis dentatis*. Swartz, Prodröm. pag. 46, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 412. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 979. n°. 12.

Ses fruits sont de petites baies à deux loges, renfermant chacune une femence. Les fleurs sont réunies en petites têtes presque globuleuses, presque sessiles, terminales; le réceptacle commun garni de paillettes dentées. La description des autres parties se trouve au mot *MORINDE MOUSSEUSE*, vol. 4, pag. 315.

Willdenow a cru devoir ajouter à ce genre le *parabeu coccinea* Aubl. & l'*avea guianensis* Aubl., dont il a déjà été fait mention dans cet ouvrage. Leurs fruits ne sont pas encore connus; ils offrent bien le port des *tapogomes*, mais ils ont tous deux quatre étamines, quatre divisions au calice & à la corolle.

TAPURE. *Tapura*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, dont la famille naturelle n'est pas encore bien déterminée, qui paroit avoir des rapports avec celle des *scrophulariées* ou des *viçagées*, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples, alternes, les fleurs axillaires, fort petites.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice campanulé, à six divisions, trois bractées à sa base; une corolle à cinq découpures profondes, à deux lèvres; quatre étamines inégales; une cinquième très-longue; un style; un stigmate à trois lobes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice campanulé, divisé en six découpures petites, muni de trois bractées à la base.

2°. Une corolle monopétale, située sous l'ovaire, divisée en deux lèvres, à cinq découpures profondes; la lèvre supérieure droite, plus longue, concave, à trois découpures; la lèvre inférieure plus courte, plus large, divisée en deux lobes.

3°. Cinq étamines situées sur les pétales, dont quatre dialymines, situées sous la lèvre supérieure; une cinquième étamine très-longue, insérée à la base de la lèvre inférieure.

4°. Un ovaire supérieur, triangulaire, surmonté d'un style filiforme, très-long, terminé par un stigmate à trois lobes.

Le fruit n'est pas encore connu.

Ecc e a

TAPURE de Guiane. *Tapura guianensis*. Aubl.

Tapura foliis simplicibus, alternis; pedunculis foliatis, multifloris, axillaribus. (N.)

Tapura guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. p. 126. tab. 48. — Juss. Gener. Plant. pag. 419.

Rohria petioliflora. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 186.

Vulgairement bois de golette.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de douze pieds & plus, dont les tiges se divisent en rameaux très-nombreux, flexibles, diffus, garnis de feuilles alternes, très-imples, pétioles, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, oblongues, acuminées à leur sommet, veinées, réticulées, munies à leur base de deux stipules caduques. Les pédoncules sont axillaires, insérés sur le pétiole, solitaires, chargés vers leur sommet de plusieurs fleurs velues, très-petites, au nombre de quatre ou six, disposées en petites grappes très-courtes. Leur calice est velu, un peu campanulé, à six petites découpures, muni à sa base de trois petites bractées velues. La corolle est de couleur jaune, un peu plus longue que le calice, monopétale, divisée, presque jusqu'à sa base, en cinq découpures, séparées en deux lèvres; la supérieure droite, plus longue, concave, à trois découpures profondes; l'inférieure plus large, plus courte, à deux lobes profonds, obtus; quatre étamines didynames, insérées sur la corolle & renfermées dans la lèvre supérieure; une cinquième étamine beaucoup plus longue, insérée à la base de la lèvre inférieure. L'ovaire est supérieur, triangulaire; le style beaucoup plus long que la corolle, surmonte par un stigmate à trois lobes. Le fruit n'a pas été observé.

Cet arbrisseau croit dans les grandes forêts de la Guiane. Les Créoles le nomment *bois de golette*. C'est le nom qu'ils donnent ordinairement aux bois dont ils se servent pour cluser les murs & les cloisons de leurs maisons. Il fleurit dans le mois d'août.

TARALEA. *Taralea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, irrégulières, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *coumarouna* & les *pariour*. Il comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées sans impaire; les fleurs disposées en panicule terminale & axillaire.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures inégales; cinq pétales inégaux, presque papilionacés; six étamines monadelphes; une gousse coriace, comprimée, bivalve, monosperme.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, d'une seule pièce, trébiné, divisé à son limbe en cinq découpures inégales.

2°. Une corolle composée de cinq pétales irréguliers, inégaux, presque papilionacés, dont les deux inférieurs sont connivés & en forme de carène; les trois supérieurs relevés, dont deux latéraux, plus étroits.

3°. Dix étamines monadelphes, dont les filaments sont réunis par leur base en un seul paquet, terminés par des anthères petites, ovales.

4°. Un ovaire supérieur, pédicellé, oblong, comprimé, renfermé dans la gaine des étamines, surmonté d'un style allongé, courbé, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une gousse ovale, un peu arrondie, épaisse, coriace, comprimée, à deux valves, contenant une seule semence obronde, un peu allongée.

E S P È C E.

TARALEA à feuilles opposées. *Taralea oppositifolia*. Aubl.

Taralea foliis abruptis pinnatis; floribus oppositis, paniculatis. (N.)

Taralea oppositifolia. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 745. tab. 298.

Dipterix oppositifolia. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 910. n°. 2.

C'est un très-grand arbre, dont le tronc s'élève à la hauteur de plus de soixante pieds, sur deux pieds & demi de diamètre, dont le bois est blanc, dur, compacte; l'écorce blanche, membraneuse, & se détache naturellement par parties plus ou moins larges. Il se divise vers son sommet en branches fortes, étalées, très-longues, munies de rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles pétioles, opposées, ailées, composées de quatre ou cinq paires de folioles sans impaire, pédicellées, presque opposées, fermes, oblongues-lanceolées, entières à leurs bords, vertes, glabres & veinées à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, longues de six à huit pouces, sur environ deux pouces & demi de large.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des tiges, en panicules, les unes terminales, d'autres axillaires, rameuses, la plupart des ramifications opposées, chaque fleur médiocrement pédicellée. Le calice est glabre, trébiné, divisé à son orifice en cinq découpures inégales, aiguës; deux supérieures, vertes, plus grandes, concaves, distantes; trois inférieures écartées, fort petites, celle du milieu un peu plus longue; la corolle violette, assez semblable à une fleur papilionacée, à cinq

pétales inégaux, un supérieur, large, relevé, échancré; deux latéraux, oblongs, étroits; les deux inférieurs connivens, en carène, courbés en faux, tous onguculés; les étamines réunies, à la base des filaments, en un seul paquet. Le fruit est une gouffe pédicelle, verdâtre, glabre, coriace, un peu arrondie, comprimée, un peu épaisse, à deux valves, renfermant une semence oblongue, un peu arrondie.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de Cayenne. h

Observations. Willdenow a réuni à ce genre la *coumarouna odorata* d'Anlet, mentionné dans cet ouvrage à l'article COUMAROU, vol. II, p. 145; cependant des caractères particuliers paroissent devoir le tenir éloigné de ce genre. Son fruit est une gouffe ou une forte de noix, dont l'écorce est dure, drupacée & tomenteuse en dehors, à une seule valve, monoperme; les étamines au nombre de huit; le calice turbiné, à trois lobes; la corolle papilionacée; les feuilles alternes, ailées sans inspire. Ce sont les semences de cette plante qui ont la forme d'un fève, & que l'on vend à Paris sous le nom de *fèves de Tonca*, avec lesquelles on parfume le tabac, & qui lui donnent une odeur très-agréable.

TARANI. *Tjira*. Rheed, Hort. Malab. vol. 9. pag. 153. tab. 78.

Plante aquatique du Malabar, dont le genre & la famille naturelle ne sont pas encore déterminés. Ses racines sont composées de fibres blanchâtres, nombreuses, fasciculées; elles produisent plusieurs tiges hautes d'environ un pied & plus, cylindriques, articulées, épaisses, spongieuses, striées, rétrécies insensiblement vers leur sommet, rameuses, garnies de feuilles opposées, sessiles, oblongues, lancéolées, étroites, vertes, glabres, lisses, luisantes, aiguës à leur sommet, dentées en scie à leur contour.

Les fleurs sont sessiles, portées, agrégées, presque verticillées dans l'aisselle des feuilles; leur calice composé de cinq folioles persistantes, vertes, en forme de pique; la corolle blanchâtre ou un peu verdâtre, à cinq pétales ouverts, fort petits, ovales, obtus; dix étamines; les anthères arrondies, jaunâtres; un ovaire supérieur, globuleux, à cinq styles. Le fruit est une capsule fort petite, un peu rougeâtre, qui renferme des semences nombreuses, extrêmement petites, d'abord blanchâtres, qui deviennent rougeâtres en mûrissant.

Cette plante croît dans les eaux au Malabar.

TARCONANTE. *Tarconanthus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs strobileuses, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *calas*, & qui comprend des arbrustes exo-

tiques à l'Europe, dont les feuilles sont tomentueuses & entières; les fleurs disposées en panicule terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs strobileuses; un calice monophylle, turbiné, à sept découpures; les semences entourées de poils; le réceptacle velu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toures strobileuses, hermaphrodites, fertiles.

Chacune d'elles offre :

1°. Un calice commun, d'une seule pièce, turbiné, divisé jusqu'à sa moitié en sept découpures, colorées en dedans, plus courtes que la corolle, un peu aiguës, persistantes.

2°. Une corolle composée de fleurons tous fertiles, hermaphrodites, égaux, infundibuliformes, à cinq dents.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments sont capillaires, très-courts, les anthères tubulées, réunies en cylindre, de la longueur de la corolle, un peu prolongées en queue à leur base.

4°. Un ovaire inférieur (supérieur), oblong, surmonté d'un style presque une fois plus long que la corolle, terminé par deux stigmates saillans.

Les semences sont oblongues, solitaires, entourées de poils lanugineux, point aigrettées à leur sommet, mais souvent couronnées par les fleurons persistans.

Le réceptacle est chargé de poils un peu plus courts que le calice.

Observations. Bergius a remarqué que, dans la première espèce, l'ovaire étoit supérieur. M. DeCandolle m'a assuré avoir vérifié cette remarque : j'ignore si ce caractère, étranger aux syngénèses, se retrouve dans les autres espèces.

ESPÈCES.

1. TARCONANTE camphrée. *Tarconanthus camphoratus*. Linn.

Tarconanthus foliis integerrimis, foliis tomentosis. Thunb. Prodrum. pag. 145. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1792. n°. 1.

Tarconanthus foliis oblongis, planis; calice monophyllo, quinquefidio. Linn. f. Suppl. pag. 461. — Syst. veget. pag. 740. — Cixrtn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 392. tab. 166. fig. 12. — Lam. Illustr. Gen. tab. 671.

Tarconanthus. Hort. Cliff. 158. — Roy. Lugd. Bat. 152. — Mill. Dict. — Fabric. Helmst. 429. — Berg. Plant. Cap. p. 236. — K. iph. Cent. 2. n°. 94.

Elichrysum, arbor africana. Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 121.

Elichryso affinis arbor africana, flore purpureo-violacea, folio folvia, odore rosmarini. Herm. Lugd. Bat. 227. tab. 229. — Pluk. Almag. 134. tab. 174. fig. 1. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 96.

Conyza africana, frutescens, folio folvia, odore camphoræ. Tournef. Inst. R. Herb. 455.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de dix à douze pieds & plus, sur une tige forte, qui se divise à son sommet en plusieurs branches assez souples, munies de rameaux nombreux, élancés, plans, cylindriques, irrégulièrement anguleux, blanchâtres, pubescens, garnis de feuilles épar- sées, pétiolées, oblongues, très-entières, ovales-lancéolées, à peine aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, épaissies, d'un vert-pâle & ridées en dessus, blanchâtres & tomenteuses en dessous, longu. s d'environ trois pouces, sur un pouce & plus de large, à nervures latérales, simples, parallèles, finissantes; les pétiols courts, canaliculés, tomenteux.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des riges & des rameaux, en une panicule étalée, rameuse, un peu foliacée; chaque fleur pédicellée. Le calice est monophylle, uniséolé, à demi divisé en cinq ou sept découpures droites, aiguës; blanchâtre & tomenteux en dehors, glabre & noirâtre en dedans; la corolle petite, d'un pourpre-violet; elle tirement composée de fleurons hermaphrodites & fertiles, enfoncés dans des rousfes de poils laineux; l'ovaire supérieur; le stigmate saillant, à deux divisions divergentes; les semences ovales-oblongues, petites, accompagnées souvent par les fleurons persistans, point aigretées, environnées de poils laineux en touffe; le réceptacle pileux.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. Il répand une forte odeur de camphre. h (V. v.)

1. TARCONANTE denté. *Tarhonanthus dentatus*. Thunb.

Tarhonanthus foliis oblongis, integerrimis densatisque, subius obsolète tomentosis. Thunb. Prodr. pag. 145. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1793. n° 5.

Tarhonanthus (glyber), *foliis glâris, integris densatisque*. Linn. f. Suppl. 360.

Cette espèce ressemble beaucoup par son port à *Tarhonanthus camphoratus*, mais elle n'a point une odeur de camphre: ses feuilles, ainsi que ses autres parties, sont glabres. Ses riges sont droites, ligneuses, cylindriques, divisées en rameaux diffus, simples, alonées, un peu anguleux, très-glabres, garnis de feuilles éparées, alternes, pétiolées, oblongues-lancéolées, glabres à leurs

deux faces, veinées, nerveuses, un peu aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, entières à leurs bords, un peu variées dans leur forme, les unes plus larges, d'autres plus étroites, entières ou dentées, soutenues par des pétiols courts.

Les fleurs forment une panicule terminale, médiocrement étalée, dont les ramifications, ainsi que les calices, sont glabres; ces derniers monophylles, à environ sept découpures; les fleurs composées de fleurons tous mâles ou hermaphrodites, fertiles; les semences environnées d'une touffe de poils aigretés; le réceptacle plane, étroit, couvert de poils.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h (V. f.)

3. TARCONANTE à feuilles de bruyère. *Tarhonanthus ericoides*. Linn. f.

Tarhonanthus foliis acroftis, calicibus tetraphyllis. Linn. f. Suppl. pag. 360. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1793. n° 6.

Cet arbrisseau n'est encore que médiocrement connu. Ses riges, d'après Linné fils, rétrécies en pointe à leur sommet, se divisent en rameaux roides, garnis de feuilles très-serres, linéaires, fort courtes, entières, acérées, ainsi semblables à celles des bruyères. Les fleurs sont latérales, enraffées, plus longues que les feuilles, soutenues par des pédoncules courts; leur calice composé de quatre toioles ovales; les corolles petites, composées d'un petit nombre de fleurons caducs, perdus en quelque sorte dans les touffes de poils très-blancs, plus longs que les fleurons, & qui garnissent le réceptacle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

* Espèces moins connues.

* TARCONANTE à feuilles elliptiques. *Tarhonanthus ellipticus*. Thunb.

Tarhonanthus foliis ellipticis, denticulatis, subius tomentosis. Thunb. Prodr. pag. 145. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1793.

Cet arbrisseau a ses rameaux garnis de feuilles simples, elliptiques, denticulées à leur contour, glabres à leur face supérieure, tomenteuses en dessous. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

* TARCONANTE à feuilles lancéolées. *Tarhonanthus lanceolatus*. Linn. f.

Tarhonanthus foliis ellipticis, integerrimis, glâbris. Thunb. Prodr. pag. 145. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1793. n° 4.

Cette espèce, qui paroît très-rapprochée de la

précédente, en diffère par les feuilles elliptiques-lancéolées, très-embrassées & non dentées à leurs bords, glabres à leurs deux faces. Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

TARENNE de Ceilan. *Tarenna zeylanica*. Gaertn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 139. tab. 28. fig. 3.

Tarenna. Zeylonens. & Collect. Sem. Hort. Lugd. Bat.

On ne connoît encore de cette plante que les fruits, disposés en une sorte de panicule, dont les ramifications sont un peu flexueuses. C'est une baie pédicelée, sphérique, de la grosseur d'un grain de groseille, noirâtre, luisante, un peu ridée, marquée de huit à dix stries, divisée en deux loges, à une seule valve ; surmontée par un calice persistant, à quatre découpures linéaires, oblongues, aiguës, réfléchiées. Cette baie contient une substance charnue, fongueuse, adhérente aux deux côtés de la cloison, & environnant les semences : celles-ci sont au nombre de quatre ou six dans chaque loge, striées horizontalement, épaisses, bombées à une de leurs faces, comprimées & rétrécies en coin à l'autre face, noirâtres & ridées ; elles contiennent deux cotylédons foliaires, presque orbiculaires. La radicule est cylindrique, une fois plus longue que les cotylédons, recourbée, très-éloignée du centre, & dirigée vers la circonférence de la cloison. « La position des radicules dans ce fruit est très-remarquable, dit Gaertner, en ce que celle de la première semence se dirige à droite, celle de la seconde à gauche, celle de la troisième à droite, & ainsi de suite alternativement ; en outre, les semences sont attachées au centre, & non aux parois du fruit. »

Ces fruits appartiennent à une plante qui croît à l'île de Ceilan.

TARGIONE. *Torgionia*. Genre de plantes acotylédones, de la famille des hépatiques, qui a des rapports avec les *anthoceros* & les *jagermannia*, & qui comprend des herbes dont les expansions sont membraneuses, véritables, fort petites, adhérentes à la terre par des fibrilles très-grêles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une sorte de calice à deux valves, ou un péricarpe qui renferme une capsule globuleuse, remplie de très-petits filaments granuleux.

Observations. Les organes mâles de ce genre ne sont pas encore suffisamment connus. On est aujourd'hui généralement d'accord sur les organes femelles, qu'on croit être constitués par les capsules globuleuses, recouvertes par deux valves qui ne s'ouvrent qu'à l'époque de la maturité des graines. On aperçoit dans leur intérieur quelques styles avortés & caducs. Schreber a pris pour l'organe mâle une petite callosité qui existe à la

base de la membrane interne du calice ; mais d'autres naturalistes n'ont pu admettre cette opinion. Sprengel, en particulier, assure avoir observé cette callosité persistante sans aucune altération ; jusqu'à la maturité des fruits. Ce dernier prend pour organes mâles, des corpuscules épars sur cette même membrane, & qui le flétrissent avant la maturité des fruits.

ES PÈCES.

1. TARGIONE hypophille. *Torgionia hypophylla*. Linn.

Torgionia calicibus dehiscentibus ; frustificationibus solitariis. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1353.

Torgionia hypophylla L. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1604. — Lam. Flor. franc. vol. 1. pag. 73, & III. Gen. tab. 877. — Decand. Flor. franc. vol. 2. pag. 419. — Spreng. Bullet. phil. n°. 52. pag. 27. tab. 2. fig. 2.

Torgionia minima & vulgaris. Michel, Gen. 3. tab. 3. — Næker, Galioib. pag. 497.

Lichen petraeus minimus, fructu orb. C. Bauh. Pin. 362. — Dillen. Musc. 332. tab. 78. fig. 9.

Lichen alter, acaulos, hypophylloscarpus. Col. Ecphr. 1. pag. 331. fig. 333.

Lichen terristris, minor, seminifer. Durbaum. Centur. 1. pag. 41. tab. 61. fig. 4.

Cette plante développe sur la terre de petites feuilles étalées, presque planes, assez semblables à celles des *marckantia*, fortement adhérentes au sol par des fibrilles noirâtres ; elles sont un peu étroites, allongées, vertes en dessus, parsemées de petits tubercules de couleur pâle, d'un brun foncé en dessous, un peu échancrées, élargies presqu'en spatule vers leur sommet, qui se tendent en dessous & produisent un fruit capsulaire, comprimé, arrondi, composé de deux valves d'un pourpre-noirâtre, qui ne s'ouvrent qu'à l'époque de la maturité des semences. Cette capsule est recouverte de deux membranes en forme de talice, l'une externe, de couleur purpurine ; l'autre interne & transparente, portant à sa base une callosité purpurine.

Cette plante croît dans les lieux couverts, un peu humides, sur la terre & sur les rochers. Je l'ai recueillie dans les environs de Fougères en Bretagne. On la rencontre également dans les départemens méridionaux de la France, à Meudon, dans les Alpes, en Alsace, &c. (P.-v.)

2. TARGIONE sphérocarme. *Torgionia sphaerocarpa*. Dickl.

Torgionia calicibus apice perforatis ; frustificationibus aggregatis. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1353.

Targionia sphaerocarpus. Dickf. Crypt. 2. pag. 8.
— Decand. l'lor. franç. vol. 2. pag. 419.

Sphaerocarpus Michellii. Bellard. Aq. Tur. 5. pag. 258.

Sphaerocarpus terrestris, minima. Michel. Gen. 4. tab. 3. fig. 2. — Dillen. Musc. tab. 78. fig. 17.

■ Cette espèce, dit M. Decandolle, forme une inferté d'un vert-clair, arrondie, adhérente par son centre, au moyen de radicules fines & blanchâtres. Les feuilles sont arrondies, tronquées au sommet, presque transparentes; on aperçoit à la loupe les cellules qui les composent. Sur cette feuille naissent quelques paquets de huit à dix corpuscules, d'un pourpre-foncé, en forme de toupie, presque cylindriques, rapprochés par le pied, périclées au sommet, & qui sont les organes reproducteurs. Michellii a vu ces éruis s'ouvrir en deux valves égales, concaves & divergentes. Dans le centre se trouve un globe sphérique & sessile, qui est une capsule pleine de graines. M. Decandolle dit qu'en examinant au microscope les échantillons desséchés de cette plante, il n'a pas vu cette séparation des valves dont parlent Michellii & Dillenius.

Cette espèce est rare; elle croît sur la terre humide & sablonneuse, dans le Piémont, la Touraine, à Cambon, département de la Somme.

TARIRI de la Guiane. *Tariri guianensis*. Aubl. Guian. vol. 2. Suppl. pag. 37. tab. 390.

Tariri arbor tinctoria, foliis alternis, ovatis violaceis. Barrer. Franc. equinox. 106.

On ne connoît de cette plante, ni les fleurs ni les fruits; elle paroît, d'après son port, se rapprocher des *comelodias*. C'est un arbrisseau qui s'élève à environ dix pieds de haut. Son tronc, d'après Aublet, a trois pouces de diamètre; son écorce est brune & lisse, son bois blanc; il devient violet quelque temps après qu'il a été exposé à l'air. Ce tronc pousse à son sommet quelques branches droites, garnies de feuilles alternes, ailées, composées de folioles alternes, en nombre impair, de treize à dix-sept, vertes, lisses, entières, velues dans toute leur circonférence, variables dans leur forme, ovales ou un peu arrondies, rétrécies en pointe, obtuses à leur sommet; le pétiole commun, long d'environ neuf pouces. On aperçoit au dessus de la naissance de chaque feuille un petit corps glanduleux.

Cet arbrisseau croît dans les grandes forêts de la Guiane. Les Galibis le nomment *tariri*. b (Description, ex Aubl.)

Les folioles, en se desséchant, prennent une couleur de pourpre-violet. Lorsqu'après les avoir écartées toutes vertes ou machées, on les presse dans un morceau de toile de coton, elles lui com-

muniquent d'abord une teinture verte, qui devient, peu de temps après, de couleur violette. (Voyez l'article BRÉILLON, vol. 1. pag. 462, dont cette plante paroît être une espèce.)

TECK. *Theka*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, de la famille des gattiliers, qui a des rapports avec les *gmelina* & les *avicennia*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les rameaux sont quadrangulaires, les feuilles opposées, les fleurs paniculées, à ramifications opposées, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice campanulé, à cinq ou six lobes; une corolle à tube court; le limbe à cinq ou six découpures; cinq étamines; un style; un drupe sec, globuleux dans un calice en veste; un noyau à trois ou quatre loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, persistant, divisé en cinq, quelquefois six lobes ovales, à demi ouverts.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, de la longueur du calice; le tube court; le limbe à cinq, quelquefois six découpures planes, ovales.

3°. Cinq étamines insérées à l'entrée du tube de la corolle; les filaments très-courts, terminés par des anthères globuleuses & saillantes.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, velu, entouré d'une glande courte & urcéolaire, surmonté d'un style filiforme, droit, un peu plus long que le calice, terminé par un stigmate à deux ou trois divisions obtuses.

Le fruit est un drupe presque globuleux, un peu comprimé, sec, velu, lubréux, à quatre lobes, renfermé dans un calice ample, renflé & membraneux. Ce drupe contient un noyau presque globuleux, terminé par un tubercule arrondi, à quatre loges; l'axe creux intérieurement; des sinences comprimées, solitaires dans chaque loge.

ESPÈCES.

TECK des Indes. *Theka grandis*. Lam.

Theka foliis simplicibus, oppositis; floribus paniculatis, pedunculis oppositis, ramis tetragonis. (N.)

Theka grandis. Lam. Ill. Gen. vol. 2. pag. 121. n°. 2744. tab. 136. — Juss. Gen. Plant. pag. 108.

Tedona grandis. Linn. f. Suppl. pag. 151. — Thunb. Dissert. nov. Plant. Gener. 4. pag. 71. — Gærtner, de Fruct. & Semin. vol. 1. tab. 57. — Roxb.

— Roxb. Coromand. 1. pag. 10. tab. 6. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1088.

Jatav. Rumph. Amboin. vol. 3. p. 34. tab. 18.

Theska tekka. Rheed. Hort. Malab. vol. 4. pag. 57. tab. 17.

Vulgairement bois de teck, theck, theca.

Cet arbre, si intéressant par son emploi dans les arts, s'élève fort haut. Son tronc est droit, très-gros; son bois dur, ferré; son écorce rude, épaisse, gristâtre; ses branches étalées, divisées en rameaux quadrangulaires, articulés, un peu pubescens à leur partie supérieure, d'un gris cendré, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, amples, ouvertes, un peu pendantes, presque ovales, rétrécies à leur base & décurrentes sur le pétiole, aiguës à leur sommet, entières à leurs bords, d'un vert-foncé en dessus & parsemées de points blanchâtres; veloutées en dessous, traversées par des nervures latérales, parallèles, presque simples, un peu saillantes, & dont l'innerville est coupé par des veines fortes, point réticulées.

Les fleurs sont disposées en une ample & belle panicule terminale, très-étalées; toutes les ramifications constamment opposées, d'un gris-cendré, chargées de poils très-fins, glanduleux à leur sommet, & qui ne s'aperçoivent bien qu'à la louppe; des bractées opposées, sessiles, lancéolées, aiguës, situées à la base de chaque division; chaque fleur pédonculée; le calice tomenteux, d'un blanc-cendré, campanulé, à cinq, quelquefois fixé dépourvus ovales. La corolle est blanche, odorante, à peine plus longue que le calice, pubescente en dehors, parsemée de points noirs; l'ovaire veu, blanchâtre, entouré d'un rebord glanduleux, d'un rouge-orangé. Le fruit est un drupe de la grosseur d'une noisette, contenu dans le calice renflé & persistant. Il renferme un noyau presque arrondi, surmonté d'un tubercule globuleux, divisé en quatre loges; une semence dans chaque loge.

Cet arbre croît dans les Indes orientales, au Malabar, au Coromandel, dans les grandes forêts, dans les îles de Ceylan & de Java, &c. M. Labillardière m'en a communiqué un exemplaire. h (V. f.)

Le bois de teck est employé avec un très grand avantage dans la construction des navires; il est dur & se conserve long-temps. Les Indiens en font également usage pour les charpentes de leurs maisons & de leurs temples. Les feuilles fournissent une liqueur qui sert à teindre les cotons & les soies en pourpre; on fabrique encore avec ces mêmes feuilles un sirop propre pour les aphtes. Les fleurs, bouillies avec du miel, passent pour un bon remède dans les rétentions d'urine & l'hydropysie.

Botanique. Tome VII.

« Le teck, dit M. Thonin, est un des plus grands & des plus beaux arbres de l'Inde, le plus utile & le plus intéressant pour nous s'il pouvoit croître en pleine terre en France. Son bois a une propriété qui le fait rechercher pour la construction des plus gros navires; il est solide & léger; de plus, il n'est attaqué ni par les vers ni par les autres insectes qui détruisent en peu d'années les vaisseaux européens les mieux conditionnés. Des bâtimens construits avec le bois de cet arbre durent trois fois plus long-temps que ceux qui l'ont été avec toute autre espèce de bois connu; mais cet arbre croît dans l'intérieur de l'Inde, sur les bords du Gange & de la Cochinchine, où il paroit circonscrit, & la nature de ces pays, leur climat, semblent devoir faire perdre l'espérance de pouvoir le naturaliser en France. Cependant s'il est reconnu que les gemmes ou boutons de cet arbre soient couverts d'écailles ou d'enveloppes particulières, ce sera un indice qu'il a été pourvu par la nature des moyens de défendre ses jeunes bourgeons d'une température plus froide que celle des pays où il croît.

« A ce premier indice il s'en joint un autre qui est encore plus important; c'est la faculté qu'a le teck de dormir chaque année, à la manière de nos arbres indigènes, pendant un certain espace de tems, c'est-à-dire, de perdre ses feuilles comme les nôtres, & de rester dans une inaction au moins apparente pendant plusieurs mois; ce qui semble indiquer que ses fluides descendent vers les racines, ou se condensent pendant ce tems; alors il y auroit beaucoup moins à craindre, puisqu'il paroit prouvé que les gelées n'ont d'action sur les végétaux, qu'autant que leurs vaisseaux seux sont remplis de fluide.

« Il est donc présumable, d'après le caractère extérieur de son organisation, que le teck pourra se naturaliser dans l'Europe méridionale, & particulièrement dans les pays où le cultiver en plein air les dattiers, les orangers & les citronniers, parmi lesquels il vit dans l'Inde. La partie de la France où ces arbres croissent, est fort limitée; elle n'est composée que de quelques cantons des départemens du Var, des Alpes maritimes & de l'île de Corse. Pour procéder avec succès à la naturalisation de cet arbre utile, il est bon de savoir, 1°. qu'il croît généralement dans les plaines & sur les coteaux peu éloignés des grands fleuves, dont les eaux se débordent assez régulièrement chaque année; 2°. qu'il pousse avec plus de vigueur & s'élève à une plus grande hauteur dans les terrains profonds, de nature argileuse, mêlés de sable, & de consistance ferme; 3°. enfin, que ses semences perdent promptement leur propriété germinative, puisque le tems nécessaire pour leur trajet en Europe suffit pour les empêcher de lever. » (Thonin, *Annal. de Mus. d'Hist. natur.* vol. 2, pag. 82.)

Ffff

TÉLÈPHE. *Telephium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des portulacées, qui a des rapports avec les *corrigiola*, qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, dont les tiges sont couchées, alternes ou opposées, stipulacées; les fleurs disposées en corymbes terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq divisions; cinq pétales aussi longs que le calice; cinq étamines; point de style; trois stigmates; une capsule triangulaire, à trois valves; plusieurs semences sur un placenta central.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, divisé en cinq folioles oblongues, concaves, obtuses, relevées en carène.

2°. Une corolle composée de cinq pétales oblongs, obtus, droits, rétrécis à leur base, de la longueur du calice, insérés sur le réceptacle.

3°. Cinq étamines dont les filaments sont subulés, plus courts que la corolle, terminés par des anthers inclinés.

4°. Un ovaire triangulaire, supérieur, aigu; point de style; trois stigmates aigus, ouverts.

Le fruit est une capsule courte, triangulaire, à trois valves, à une seule loge; plusieurs semences arrondies, portées sur un placenta central, libre, de moitié plus court que la capsule.

ESPÈCES.

1. **Télèphe d'impérati.** *Telephium imperati*. Linn.

Telephium foliis alternis. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 388. — Hort. Upsil. 72. — Haller, Helv. n°. 841. — M. B. Dist. — Kniph. Cent. 2. n°. 95. — Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 1506. n°. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1, pag. 270. — Lam. Illustr. Gener. tab. 113. — Decand. Flor. franç. vol. 4, pag. 400.

Telephium foliis oblongo-ovatis; racemis secundis, terminalibus. Virid. Cliff. 20. — Hort. Cliff. 73. — Royen, Lugd. Bat. 454.

Telephium repens. Lam. Flor. franç. vol. 3, pag. 71.

Telephium alternifolium. Moench. Méthod. pag. 231.

Telephium D'osfordis. Imérat. 665. — Tournef. Inst. R. Herb. 248. tab. 128.

Telephium repens, folio non deciduo. C. Bauh. Pin. 287.

Telephium legitimum. Cliff. Hist. 2. pag. 67. Icon. — Gerard, Hist. 520. Icon.

Cette plante pousse des mêmes racines plusieurs tiges grêles, couchées, cylindriques, foibles, longues d'environ un pied, presque simples ou légèrement rameuses, garnies dans tout leur longueur de feuilles alternes, à peine pétiolées, petites, ovales, d'un vert-glauque, très-entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, arrondies & obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base en une pointe ou en un pétiole très-court; munies de petites stipules courtes, caduques.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en plusieurs corymbes très-épais; les pédoncules glabres, cylindriques; les pédicelles très-courts, inégaux. Leur calice est vert, persistant, à cinq folioles aiguës, relevées en carène sur leur dos, membraneuses à leurs bords; la corolle composée de cinq pétales blancs, de la longueur du calice; les filaments des étamines comprimés, plus courts que la corolle; trois styles filiformes, communs à leur base. La capsule est petite, triangulaire, à trois valves, à une seule loge, remplies de semences petites, presque réniformes, insérées sur un réceptacle libre & central.

Cette plante croît dans les lieux secs & montagneux, dans les départements méridionaux de la France, dans les Alpes, l'Italie, la Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. & (V. v.)

2. **Télèphe à feuilles opposées.** *Telephium oppositifolium*. Linn.

Telephium foliis oppositis. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 388. — Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 1506. n°. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1, pag. 270.

Telephium myosoidis, foliis oppositifolius, conjugatis. Schaw. Atric. Specim. n°. 572. fig. 572.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; elle en est suffisamment distinguée par ses feuilles plus grandes, opposées & non alternes. Elle croît dans la Barbarie.

TÉMO du Chili. *Temus moschata*. Molin.

Temus foliis alternis; floribus pedunculatis, terminalibus; caule arborico. (N.)

Temus moschata. Molin. Hist. natur. Chili. pag. 153. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1, pag. 831. — Juss. Gen. Plant. pag. 435.

Ce genre, établi par Molina, est composé d'une seule espèce; il renferme des plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales,

dont la famille naturelle n'est pas encore connue. Son caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à trois divisions ; dix huit pétales linéaires, très-longs ; vingt-six étamines plus courtes que les pétales ; les anthères globuleuses ; deux ovaires supérieurs, autant de styles & de stigmates ; une baie à deux coques ; les semences arillées.

C'est un arbre dont les rameaux sont chargés de feuilles nombreuses, alternes, pétioles, ovales, très-lisses, longues de deux pouces, vertes, luisantes. Ses fleurs sont d'une odeur très-agréable, pédonculeuses, terminales ; le calice divisé en trois découpures obtuses ; la corolle jaune ou blanche, composée de dix-huit pétales étroits, longs de deux ou trois pouces, les filaments setacés, une fois plus courts que la corolle ; les styles & les stigmates simples. Le fruit est une baie à deux coques, assez semblable à celle du café, très-amère.

Cet arbre croît au Ch'li. La dureté de son bois le rend propre à être employé dans un grand nombre d'ouvrages. Ses feuilles ont l'odeur de la muscade. *fr*

TÉPALI. *Mouli-ila seu moul-elavou*. Rheed, Mart. Malab. vol. 5. pag. 67. tab. 34.

Arbre du Malabar, d'une grandeur moyenne, qui s'élève à la hauteur de douze ou quinze pieds sur un tronc épais, cylindrique, qui supporte des branches & des rameaux très-étalés, diffus, alongés, presque disposés en rond, revêtus d'une écorce d'un vert-foncé, d'une saveur acre, aromatique, armée de fortes épines dures, éparées, recourbées, aiguës. Les feuilles sont médiocrement pétioles, opposées, molles, ovales-oblongues, presque lancéolées, aiguës, un peu acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, d'un vert-foncé en dessus, d'un vert plus clair, presque luisant à leur face inférieure, traversées par quelques nervures simples, alternes, latérales, souvent un peu confluentes vers le bord des feuilles ; les pétioles courts, épais, très-glabres.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, une panicule très-ample, étalée, dont les ramifications nombreuses sont opposées, sans feuilles, ni bractées. Ces fleurs, d'après Rheed, se divisent en quatre petites découpures un peu verdâtres, oblongues, presque obtuses ; elles renferment quatre étamines, du centre desquelles s'élève un pistil court & verdâtre ; il leur succède des fruits globuleux, arrondis, revêtus d'une écorce épaisse, d'un vert-foncé, dont la saveur & l'odeur ressemblent à celles de l'écorce de citron, mais plus acre & presque brûlante, renfermant une pulpe succulente & acide.

Cet arbre croît au Malabar : on le cultive avec

soin dans les jardins ; il conserve ses feuilles toute l'année, fleurit & fructifie presque tout l'année. Ses fruits servent d'assaisonnement, & remplacent le limon & le poivre : adoucis par le sucre ou le miel, on les mange pour faciliter la digestion & pour tuer les vers.

TERGEMINÉES (Feuilles). *Tergemina, triplicato-gemina folia*. On donne ce nom aux feuilles lorsque, considérant leur degré de décomposition, leur pétiole se divise en trois parties qui soutiennent chacune à leur sommet quatre folioles séparées par paires.

TERMES. (*Termini*.) La botanique, comme les autres sciences, a ses termes propres : ce sont les mots qu'elle emploie pour désigner les différentes parties des plantes. Depuis long-temps les parties les plus apparentes des végétaux sont connues, & ont reçu différents noms, tels que les racines, les tiges, les branches, les feuilles, les fruits, &c. Mais à mesure qu'on les a observées avec plus d'attention, on y a découvert un très-grand nombre d'organes, de formes, d'attributs, auxquels il a fallu nécessairement donner des noms particuliers. Il est évident que, plus les observations se multiplient, plus la science se perfectionne, plus par conséquent le nombre de termes qui lui sont propres doivent augmenter. Cette partie des sciences n'en est pas toujours la plus agréable ; mais elle leur est tellement essentielle, qu'il est impossible de les étudier sans la connoissance préliminaire des termes qui lui sont particuliers. La difficulté pour ceux qui cherchent à perfectionner les sciences, est de créer des mots qui puissent rendre clairement les idées qu'on veut exprimer, & les faire comprendre aux autres. La formation de ces mots nouveaux doit avoir les règles dictées par le bon goût, & l'on doit principalement consulter le génie de la langue dont on fait usage.

Comme on abuse de tout, il n'est pas étonnant que l'on ait peut-être porté trop loin la nécessité d'établir des termes techniques : on ne devoit se le permettre que lorsqu'il n'en existe réellement pas qui puissent rendre parfaitement notre idée ; c'est ainsi que, pour les formes si variées des feuilles & des fruits, on a fait un heureux usage de termes déjà consacrés en géométrie ; mais, d'un autre côté, combien de mots barbares, déagréables à l'oreille, rudes à la prononciation, n'a-t-on pas imaginé pour exprimer beaucoup d'autres parties des plantes ? On peut dire, avec assez de vérité, que le mauvais goût dans le choix des expressions rétrir en quelque sorte l'éclat des plus belles fleurs, & rebute souvent d'une étude qui a tant de charmes en elle-même : c'est un jardin enchanteur, mais dans lequel on ne peut pénétrer qu'au travers de haies très-épaisses de ronces & d'épines.

Depuis long-tems la langue grecque a joui du droit presque exclusif de nous fournir des termes techniques ; nous ne connoissons en effet aucune autre langue qui se prête plus facilement à réunir plusieurs expressions en une seule, laquelle devient en même tems une sorte de définition de l'objet que l'on veut peindre ; mais ces mots nouveaux, qui plaisent tant aux sçavans, épouvantent presque toujours les oreilles délicates qui les entendent pour la première fois, & qui ne sont point initiés dans les principes de la langue grecque. On doit donc être très-attentif à les définir & à en indiquer l'Étymologie, surtout lorsqu'on les emploie en français ; & peut-être vaudroit-il mieux encore les traduire par deux ou trois termes connus lorsqu'ils ne sont pas trop longs, & qu'ils ne forment point de phrases. Par exemple, *monandrie*, *monogynie*, se tendroient aussi bien par une étamine, un pistil, &c. Au reste, tous ne sont pas aussi doux à l'oreille que ceux que je viens de citer, & nécessitent davantage d'être traduits par périphrase, autant qu'il est possible. Il n'y a que le goût qui puisse guider dans cette sorte de travail ; mais, ou reste, on ne peut trop rappeler aux sçavans, dans quelque genre que ce soit, de ne point hérisser l'entrée des sciences de trop de difficultés, d'en faciliter plutôt l'accès par des dehors séduisans, par la pureté du langage, par un style moins sec, un peu plus orné, & d'être bien persuadés que les ornemens placés avec goût ne peuvent nuire à la sévérité de leurs principes.

TERNÉES (Feuilles). *Ternata folia*. Les feuilles portent le nom de ternées lorsque, considérées quant à leur degré de composition, elles ont un pétiole commun, qui supporte trois folioles insérées sur le même point en manière de digitations.

TERNSTROME. *Ternstromia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des orangiers, qui a des rapports avec les *Simonia* & les *thea*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, coriaces, entières ou dentées, les fleurs solitaires, latérales, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle monopétale ; le limbe campanulé, à cinq ou six divisions ; des étamines nombreuses insérées sur la corolle ; un stigmate capité ; une baie sèche, à deux loges polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq divisions

coriaces, persistantes, accompagné extérieurement de la base de deux petites écailles.

2°. Une corolle monopétale, campanulée, divisée en quatre ou six découpures profondes, ovales ou arrondies, concaves, à peine plus longues que le calice.

3°. Un grand nombre d'étamines insérées à la base de la corolle ; les filamens disposés sur plusieurs rangs, plus courts que la corolle, quelquefois élargis ; les anthères droites, linéaires, appliquées contre les filamens.

4°. Un ovaire supérieur, un peu arrondi, surmonté d'un style droit, cylindrique, de la longueur des étamines, terminé par un style capité.

Le fruit est une baie sèche ou une capsule presque sphérique ou ovale, un peu acuminée, à deux loges, à une seule valve, contenant plusieurs semences.

ESPÈCES.

1. *Ternstromia méridionale.* *Ternstromia meridionalis*. Linn. f.

Ternstromia foliis obovatis, emarginatis, integerrimis ; pedunculis axillaribus. Vahl, Symbol. 2. pag. 60. — Willden. Sp. c. Plant. vol. 2. pag. 1128. n°. 1.

Ternstromia foliis obovatis, integerrimis ; pedunculis terminalibus. Swartz, Prodr. v. pag. 81. & Observ. botan. 207.

Ternstromia meridionalis. Linn. f. Suppl. p. 264.

C'est un arbre dont les branches sont chargées de rameaux simples, glabres, roides, revêtus d'une écorce cendrée, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, coriaces, persistantes, ovales, glabres à leurs deux faces, rétrécis à leur base, obtusés & légèrement échancrés à leur sommet, très-entières, un peu roulées à leurs bords, sans nervures sensibles, dépourvues de bractées.

Les fleurs sont solitaires, latérales, axillaires ; les pédoncules simples, épais, comprimés, à deux tranchans, inclinés, une fois plus courts que les feuilles. Le calice est roide, presque cartilagineux, à cinq ou quelquefois six divisions ; deux petites écailles concaves, situées à la base du calice ; la corolle blanche, d'abord globuleuse avant son entier développement, puis campanulée, à cinq, quelquefois six découpures profondes. Le fruit est une baie sèche, capsulaire, à une seule valve, à deux loges, contenant environ huit semences convexes d'un côté, planes de l'autre, d'un rouge-sanguin, foveolées.

Cet arbre croît à Saint-Domingue, à la Jamaïque, à la Nouvelle-Grenade, &c. 17

2. **TERNSTROME** à feuilles elliptiques. *Ternstroemia elliptica*, Vahl.

Ternstroemia foliis ellipticis, acutis, integerrimis; pedunculis lateralibus. Vahl. Symbol. 2. pag. 61. — Swartz, Prodr. 81. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1128. n° 2.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente; elle en diffère particulièrement par la forme de ses feuilles. Cet arbre a des rameaux chargés de feuilles alternes, très-glabres à leurs deux faces, très-entières, point échancrées, lancéolées, elliptiques, à peine aiguës à leur sommet, rétrécies en un pétiole court à leur base. Les fleurs sont solitaires, latérales, axillaires; les pédoncules simples, uniflores.

Cette plante croît dans les Indes occidentales. h

3. **TERNSTROME** ponctuée. *Ternstroemia punctata*, Swartz.

Ternstroemia foliis oblongis, integerrimis, submarginatis, margine punctatis; pedunculis axillaribus. Swartz, Prodr. 81. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1128. n° 3.

Taonabo (punctata), foliis ovato-oblongis, emarginatis; fructu majore. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 571. tab. 128. — Lam. Illustr. Gener. tab. 456. fig. 2.

C'est un arbre dont les rameaux sont glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales-oblongues, un peu épaissies, glabres à leurs deux faces, obtuses, échancrées à leur sommet, rétrécies en pointe à leur base, munies à leurs bords de petits points qui les rendent comme finement denticulées, marquées de nervures fines, presque simples, confluentes vers le bord des feuilles; les pétioles courts, un peu épaissies.

Les fleurs sont latérales, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules glabres, cylindriques, un peu plus courts que les feuilles. Le calice est glabre, divisé en cinq découpures ovaires, ovales, acuminées, coriaces, persistantes; la corolle à peine plus longue que le calice; les étamines nombreuses, insérées sur la corolle à la base; l'ovaire ovale-oblong, aigu. Le fruit est d'un grosier médiocre, ovalaire, à une seule valve, à cinq loges, selon Aublet, que M. de Jussieu soupçonne n'avoir que deux loges renfermant trois à quatre semences.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la Guiane, sur le mont Serpent. h

4. **TERNSTROME** dentée. *Ternstroemia dentata*, Swartz.

Ternstroemia foliis oblongis, acuminatis, denticu-

feratis; pedunculis axillaribus lateralibusque. Sw. Prodr. pag. 81. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1129. n° 5.

Taonabo (dentata), foliis ovato-oblongis, denticulatis; floribus flavo-crenatis; fructu minore. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 569. tab. 127. — Lam. Illustr. Gener. tab. 456. fig. 1.

Cet arbre se divise en rameaux cylindriques, très-rapprochés, glabres, alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales-oblongues, firmes, un peu épaissies, glabres à leurs deux faces, dentées en scie & presque incisées à leur contour, acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, longues de trois à quatre pouces, larges de deux pouces.

Les fleurs sont latérales, solitaires, situées, ou dans l'aisselle des feuilles, ou un peu au dessus, supportées par un pédoncule simple, glabre, cylindrique, uniflore, à peine de la longueur des pédoncules, un peu courbé. Le calice se divise en cinq folioles ouvertes, ovales, entières, acuminées à leur sommet; la base du calice garnie de deux petites écailles ovales, concaves, aiguës. La corolle est un peu jaunâtre, partagée en cinq, quelquefois quatre pétales connivens à leur base; les étamines très-nombreuses, attachées à la base de la corolle; les filaments un peu élargis dans leur milieu, appliqués par imbrication contre l'ovaire; les anthères oblongues, adnées à la partie intérieure des filaments; un ovaire ovale, aigu; un style terminé par un stigmate en tête; un fruit capsulaire, petit, presque sphérique, acuminé, soutenu par le calice persistant, à deux loges (cinq, d'après Aublet, contenant cinq à six semences osseuses).

Cet arbre se rencontre dans les grandes forêts de la Guiane. h

5. **TERNSTROME** du Japon. *Ternstroemia japonica*, Thunb.

Ternstroemia foliis ovato-lanceolatis, apice serratis; pedunculis lateralibus. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1129. n° 4.

Ternstroemia (japonica) foliis acuminatis, exsiccis. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 335.

Cleyera japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 224.

Mokohf. Koenig. Amen. pag. 873. tab. 774.

Cet arbre se divise en branches dont les rameaux & leurs divisions sont fasciculés, presque verticillés, très-glabres, cylindriques, supportant vers leur sommet des feuilles épaissies, très-rapprochées, presque verticillées ou fasciculées, épaissies, toujours vertes, ovales-lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leur partie inférieure, denticulées en scie vers leur sommet.

Les fleurs sont solitaires, latérales, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules simples, uniflores; le calice à cinq découpures obtuses; la corolle composée de cinq pétales connivens à leur base; environ trente étamines plus courtes que les pétales; les filaments un peu adhérens par leur base; les anthères à deux loges; un ovaire supérieur, surmonté d'un style filiforme, terminé par un stigmate échancré. Son fruit est capsulaire, de la grosseur d'un pois, à deux loges, soutenu à sa base par le calice persistant.

Cette plante croît au Japon. β

TERRETTE, ou **LIÈRE TERRESTRE**. *Glechoma*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des labiées, qui a des rapports avec les *mentha* & les *lamiæ*. Il renferme des herbes indigènes de l'Europe, dont les tiges sont ordinairement rampantes, les feuilles opposées, pétiolées, & les fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice cylindrique, à cinq découpures; une corolle une fois plus longue, à deux lèvres, la supérieure bífide, l'inférieure à trois lobes, celui du milieu plus grand, échancré; quatre étamines; les anthères rapprochées deux à deux en forme de croix.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice cylindrique, tubulé, strié, persistant, fort petit, divisé à son orifice en cinq dents inégales, acuminées.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, à deux lèvres, une fois plus longue que le calice; la lèvre supérieure redressée, obtuse, bífide; l'inférieure plane, plus grande, obtuse, à trois lobes, celui du milieu plus grand, échancré.

3°. Quatre étamines didyennes, placées sous la lèvre supérieure; deux filaments plus courts; les anthères petites, rapprochées deux à deux en forme de croix.

4°. Un ovaire à quatre lobes, surmonté d'un style filiforme, placé sous la lèvre supérieure, incliné, terminé par un stigmate bífide, aigu.

Quatre styles nus, courtes, ovales, renfermés dans le fond du calice.

ESPÈCES.

1. **TERRETTE** à feuilles réniformes. *Glechoma hederacea*. Linn.

Glechoma foliis reniformibus, crenatis, Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 827. — Hort. Cliff. 307. —

Flor. suec. 481. 518. — Royen, Lugd. Bat. 320. — Mater. med. 149. — Pollich, Pal. n°. 514. — Gort. Ingr. 92. — Ludw. &c. tab. 62. — Knorr. Del. 2. tab. G. 1. — Hoffm. Germ. 205. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 246. — vol. II. pag. 3. — Lam. Ill. Gener. tab. 505. — Bull. Herb. tab. 241. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 85. n°. 1. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 538.

Chamaelea caule procumbente, radiato; foliis reniformibus, rotundè crenatis. Hall. H. IV. n°. 245.

Calamintha hederacea. Scopol. Carn. n°. 730.

Chamaelea hederacea. Moench. Method. pag. 393.

Glechoma caulibus procumbenti-erectis, radicatis; foliis renum aut cordis forma, crenatis. Crantz. Austr. pag. 247.

Hedera terrestris, vulgaris. C. Bauh. Pin. 306. — Blackw. tab. 225. — Riv. tab. 67.

Chamaeifusa. Fusch. Hist. 8. 6. Icon.

Calamintha humilior, folio rotundiore. Tournef. Inst. R. II. tab. 194.

Chamaeifusa, sive hedera terrestris. J. Bauh. Hist. 3. Append. 855. Icon.

Hedera terrestris. Dodon. Pempt. pag. 394. Icon.

Chamaelea vulgaris, major, minus & medium. Vaill. Paris. pag. 33. tab. 6. fig. 4. 5. 6.

β . *Flora albo*.

Vulgairement le lierre-terrestre.

Ses racines sont grêles, fibreuses; elles produisent des tiges grêles, quadrangulaires, simples ou un peu rameuses, longues d'environ un pied, un peu velues, couchées sur la terre, relevées à leur partie supérieure, surtout au moment de la floraison; garnies de feuilles opposées, pétiolées, réniformes, un peu arrondies & en cœur, vertes, un peu velues, crénelées à leur contour; les crénelures obtuses; les pétioles velus, ceux des feuilles inférieures très longs.

Les fleurs sont opposées & réunies au nombre de deux à quatre & plus dans les aisselles des feuilles, soutenues par des pédoncules courts, sétacés, pubescens, appuyés sur un pédoncule commun très-court, munis de quelques petits bractées très-fines, subulées. Le calice est court, strié, tubulé, velu, à cinq dents inégales, très-aiguës; la corolle purpurine ou rougeâtre, quelquefois blanche, au moins deux fois plus longue que le calice, glabre, légèrement cinée sur le dos, à deux lèvres; la supérieure relevée, bífide; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu plus large, échancré.

Cette plante croît en Europe le long des haies

& dans les lieux couverts, un peu humides. 2° (V. v.)

Le lierre-terrestre est astringent, vulnérinaire, béchique, diurétique, incisif. Son infusion est très-favorable dans les toux catarrhales, la phthisie asthmatique, les difficultés d'uriner. Sa poudre, mêlée avec l'avoine, fait rendre beaucoup de vers aux chevaux; ses feuilles, infusées dans de la bière fermentée, ont la propriété de rendre cette boisson d'une grande limpidité. Les troupeaux sont peu avides de cette plante, qui n'est guère broutée que par les moutons & les chevaux.

1. TERPETTE à grandes fleurs. *Glechoma grandiflora*. Decand.

Glechoma foliis ovatis, pubescentibus, crenatis; corollis calice triplo longioribus. (N.)

Glechoma grandiflora. Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 538.

Cette espèce, dit M. Decandolle, est intermédiaire entre les *glechoma* dont elle a le port, & les *fidetis* dont elle a le calice.

Sa tige est herbacée, grêle, hérissée de poils blancs, divisée dès la base en deux ou trois rameaux grêles, redressés, longs de quatre ou six pouces; les feuilles pétiolées, pubescentes, ovales, chargées de cinq ou sept larges demeurures arrondies. Les fleurs sont solitaires aux aisselles des feuilles supérieures, portées sur un court pédicelle; le calice est hérissé, cylindrique, divisé en cinq lanières oblongues, qui se terminent par une épine aiguë & un peu cornée. La corolle est blanche, trois fois plus longue que le calice; le lèvre supérieure échancrée au sommet, l'inférieure divisée en trois lobes; le calice se détache en bas à la maturité des semences.

Cette plante a été trouvée en Corse par MM. Labillardière & Miot. (*Descript. ex Decand.*)

TERRE-NOIX. *Bunium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des ombellifères, qui a des rapports avec les *cicuta* & les *anisi*, qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à feuilles plusieurs fois ailées, à folioles linéaires, très-étroites; les ombelles à rayons nombreux, les ombellules courtes, les fleurs très-petites.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Cinq pétales égaux, en cœur, réfléchis; les fleurs ombellulées serrées; les fruits ovales.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Une ombelle universelle, d'environ vingt

rayons; les ombelles partielles courtes, serrées.

Un involucre universel à plusieurs folioles courtes, linéaires, qui manquent quelquefois; les involucre partielles linéaires, de la longueur des ombellules.

Un calice entier, à peine sensible.

1°. Une corolle composée de cinq pétales, tous égaux, réfléchis & en cœur.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont plus courts que la corolle, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire oblong, inférieur, surmonté de deux styles réfléchis, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit est ovale, & se divise en deux semences ovales, convexes d'un côté, planes de l'autre.

ES P È C E S.

1. TERRE-NOIX à collerette. *Bunium bulbocostanum*. Linn.

Bunium foliis uniformibus, involucre polyphylo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1394. n°. 1.

Bunium involucre polyphylo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 349. — Hort. Cliff. 91. — Royen, Lugd. Bat. 107. — Mill. Dict. n°. 1. — Hall. Helv. n°. 783. — Œler. Flor. dan. tab. 220. — Pollich. Palat. n°. 274. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 124. — vol. 11. pag. 326. — Hoff. Germ. 94. — Decand. Flor. fr. vol. 4. pag. 325. — Lam. Illustr. Gen. tab. 197.

Bunium bulbo globofo. Sauvag. Monsp. 256.

Bunium (minus), *foliis uniformibus; involucre polyphylo, fructibus sabtylindricis, apice crassifloribus; stylis reflexis, deciduis*. Gouan, Illustr. 10.

Bulbocostanum majus, folio apii. C. Bauh. Pin. 162. — Tourn. Inst. R. Herb. 307. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 30. Icon. — Moris. Oxon. Lull. 3. §. 9. pag. 294. tab. 2 fig. 1.

Nucula terrestris. Lobel. Icon. 745.

Bulbocostanum. Dodon. Pempt. 334. Icon.

Vulgairement Terre-noix, Suron, Moisson.

Ses racines sont composées d'une bulbe sphérique, charnue, blanche en dedans, noire en dehors, de la grosseur d'une cerise, munie de quelques fibres simples; il s'en élève une tige glabre, cylindrique, lisse, un peu rameuse, qui varie dans sa longueur depuis un demi-pied jusqu'à deux pieds, garnie de feuilles alternes, pétiolées; deux & trois fois ailées, partagées en découpures glabres, étroites, linéaires, un peu aiguës; les pétioles membranés & en gaine à leur base.

Les flétes sont blanches, disposées en ombelles assez amples; l'ombelle universelle munie d'un involucre composé de sept à huit petites folioles courtes, linéolées, aiguës. Les ombelles partielles ont leur involucre également à plusieurs folioles presque aussi longues que les rayons, qui sont très-courts, nombreux, serrés. Les fruits sont glabres, cylindriques, un peu épaissis à leur sommet, terminés par deux styles réfléchis, & qui tombent avant la maturité des semences.

Cette plante croît en France, dans les champs & dans les pâturages un peu humides. 2. (P. v.)

Les racines de cette plante fournissent de l'amidon, & une nourriture légère & adoucissante. Les habitants du nord les mangent cuites ou bien ils les font cuire dans du bouillon, après en avoir enlevé l'écorce. Les semences sont âpres, aromatiques, & approchent beaucoup de celles du carvi.

2. TERRE-NOIX, sans collerette. *Banum denudatum*.

Banum foliis caulinis angustifolius, involucri nullo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1394. n°. 2.

Banum denudatum. Decand. Flot. fr. vol. 4. pag. 355.

Banum (majus), *foliis caulinis angustifolius, involucri universalis nullo; fructibus ovatis, acuminatis; stylis persistantibus*. Gouan. Illustr. pag. 10.

Banum flexuosum. Willd. Brit. 191. — Smith, Flor. britan. vol. 1. pag. 301.

Banum bulboosum. Curtis, Lond. tab. 24.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente; elle a, comme elle, des racines bulbueuses, noirâtres, arrondies. Les tiges sont plus grêles, cylindriques, glabres, moins rameuses, chargées de moins de fleurs, nées à leur partie inférieure, un peu flexueuses; les feuilles alternes, pétiolées, ailées; les folioles glabres, très-étroites, linéaires, aiguës.

Les fleurs sont disposées en ombelles terminales, semblables à celles de l'espèce précédente; mais l'ombelle universelle est ordinairement dépourvue d'involucre, ou quelquefois munie d'une ou deux folioles avortées. Les fruits sont ovales, un peu plus gros à la base qu'au sommet, surmontés de deux styles droits & persistans.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, dans les Cévennes, au Mont d'Or; elle jouit des mêmes propriétés que la précédente. 2.

3. TERRE-NOIX aromatique. *Banum aromaticum*. Lam.

Banum involucrellis triphyllis. Lion. Mantiff. pag.

218. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1394. n°. 3.

Ammi aëterum, semine apii. C. Bauh. Pin. 159.

Ammi odore origani. J. Bauh. Hist. 3. pag. 23.

Ses tiges sont droites, lisses, un peu rameuses; les rameaux alternes, garnis de feuilles plusieurs fois ailées, assez semblables à celles du *carum carvi*; les folioles ou découpures sont lisses, filiformes; l'ombelle universelle longuement pédonculée, composée de dix à douze rayons striés; les ombellules courtes, un même nombre de rayons; l'involucre général composé d'environ six folioles très-courtes, subulées; les involucre partielles de deux à trois folioles, de la longueur des ombellules. La corolle est blanche; les pétales égaux, en forme de cœur, réfléchis; les semences petites, ovales, à cinq côtes un peu rudes au toucher.

Cette plante croît dans l'île de Crète & dans la Syrie. 0

TÊTE (Fleurs en). *Capitati flores*. On nomme ainsi les fleurs qui sont ramassées & réunies à l'extrémité d'un pédoncule commun, en forme d'épi très-court, plus ou moins arrondi; telles sont celles du *psoralea bituminosa*, du *trifolium globosum*, de l'*anthyllus vulneraria*, &c.

TETRACERA. *Tetracera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des rosacées, qui a des rapports avec les *suriana*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges sont souvent sarmenteuses; les feuilles simples, munies de stipules; les fleurs axillaires, terminales, la plupart en grappes paniculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à six ou quatre découpures profondes; quatre à six pétales; des filamens nombreux; quatre styles; avant de causer univulves, s'ouvrant à leur base supérieure.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant d'une seule pièce, divisé profondément en quatre ou six lobes inégaux, arrondis, ouverts; les alternes plus courts.

2°. Une corolle composée de quatre à six pétales, quelquefois très-caducs.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filamens sont simples, persistans, de la longueur du calice ou plus courts; les anthères simples; quelquefois les filamens sont élargis vers leur sommet, ayant une anière de chaque côté.

4°. Quatre ovaires ovales, supérieurs, écartés entr'eux,

entr'eux; surmontés par autant de styles courts, subules, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit consiste en quatre capsules ovales, acuminées à leurs deux extrémités, très-ouvertes, même réfléchies, à une seule loge, s'ouvrant à leur suture supérieure & interne, ne renfermant guère qu'une seule semence ovale ou arrondie, arillée.

Observations. Ce genre, très-variables dans les parties de la fructification, se trouvoit cependant avec des caractères constants dans ses quatre capsules, lorsqu'il a été d'abord établi par Linné; à la vérité, il se bornoit alors à une seule espèce, le *tetracera volubilis*. Vahl & quelques autres botanistes ont jugé convenable de réunir à ce genre plusieurs autres genres d'Aublet, qui offrent en effet de grands rapports avec les *tetracera*, mais dont la plupart en diffèrent suffisamment pour en être séparés. Par cette réunion, le caractère essentiel disparoit presque en partie; le nombre des divisions du calice, de la corolle, celle des capsules, n'est plus le même: on n'y trouve qu'un seul ovaire; quelques-unes des espèces sont dioïques. Le seul caractère qui réduit alors à une capsule à une seule loge, à une valve, s'ouvrant longitudinalement d'un seul côté, ne renfermant guère qu'une semence, quelquefois plusieurs.

La plupart des genres ajoutés à celui-ci ont été déjà mentionnés dans cet ouvrage, tels que le *delima farmentosus* Linn., *foramia guianensis* Aubl. &c. (Voyez aussi l'article TIGAREA & les *deliocarpus*, dans les Suppléments.)

Le genre *calinea* d'Aublet, qui est le *tetracera calinea* Willd., est une plante dont le fruit n'est pas encore bien connu. On soupçonne qu'il se divise en deux loges, contenant chacune deux semences. C'est un arbrisseau frumentueux & nouveau, dont les feuilles font alternes, oblongues, acuminées, glabres, très-entières; les fleurs axillaires ou éparpillées, latérales; les pedoncules munis de plusieurs fleurs, & garnis à leur base de deux bractées. Le calice est divisé en cinq folioles; les deux extérieures plus courtes, en forme d'écaillés; la corolle composée de trois pétales denticulés; des étamines nombreuses; les filaments dilatés à leur sommet, & supportant une anthère de chaque côté; un ovaire supérieur; un style terminé par un stigmate concave, élargi.

Peut-être faudroit-il réunir au *calinea* d'Aublet le *tetracera (nitida)*, *foliis lanceolatis-oblongis, scabris, integerrimis; floribus monogynis*. Vahl, Symbol. 3. pag. 70.

ESPÈCES.

1. TETRACERA grimpant. *Tetracera volubilis*. Linn.

Botanique. Tome VII,

Tetracera foliis scalariformis, serratis; floribus monogynis. Vahl, Symb. vol. 3. pag. 71. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1242. n°. 10.

Tetracera volubilis. Hort. Cliff. 214. — Miller, Dict. 1. — Linn. Illustr. Gener. tab. 485. fig. 2. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 336. tab. 69. fig. 3.

Petræa floribus spicatis, scabris laurifoliis. Amm. Hort. 381.

Fagus americana, ulmi amplissimis foliis; capsulis bigemellis. Pluk. Amalth. pag. 87.

Arbor americana, convolvulacea, platyphyllos, ba-budenstus dida; foliis serratis. ? Pluk. Almag. pag. 48. tab. 146. fig. 1.

Ses tiges, longues de douze à quinze pieds, sont revêtues d'une écorce glabre, cendrée, & se divisent en rameaux grêles, souples, allongés, qui se roulent autour des arbrisseaux qui les avoisinent. Les feuilles font alternes, médiocrement pétiolées, ovales, longues d'environ six pouces sur à peu près trois pouces de large, tudes à leurs deux faces, glabres, de couleur cendrée à leur face supérieure, un peu brunes en dessous, dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet, marquées de nervures transversales, alternes, presque simples; des stipules à la base des pétioles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes paniculées, composées de trois ou quatre grappes simples, courtes, épaisses, inégales. Le calice se divise en six découpures glabres, profondes, ovales, acuminées; les trois extérieures & alternes plus courtes, un peu plus étroites; la corolle de couleur purpurine, composée de six pétales très-caducs, de la longueur du calice; des étamines nombreuses de la longueur de la corolle; quatre ovaires qui se convertissent en autant de capsules ovales, acuminées à leurs deux extrémités, très-glabres, divergentes, réfléchies, coriaces, couleur de chair pâle foncée, à une seule loge, à une seule valve, contenant une seule semence ovale, un peu ridée, noirâtre, luisante, presque anguleuse, un peu pointue, arillée; les cotyledons très-courts; la radicule arrondie & inférieure.

Cet arbrisseau croit dans plusieurs contrées de l'Amérique méridionale, à la Veta-Cruz, &c. h (V.f.)

2. TETRACERA à feuilles d'aune. *Tetracera alnifolia*.

Tetracera foliis oblongis, acutis, subintegerrimis, subtus scabriusculis; panicula terminali. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1243. n°. 12.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées,

Ggg

oblongues, coriaces, glabres & luisantes en dessus, un peu rudes à leur face inférieure, rétrécies à leur base, arrondies à leur sommet, terminées par une pointe, très-entières à leurs bords, ou munies quelquefois à leur partie supérieure d'une ou de deux dents peu marquées, veinées ; les veines parallèles, réticulées.

Les fleurs sont disposées en panicule à l'extrémité des rameaux. Leur calice est glabre, divisé en quatre folioles. La corolle paroît avoir cinq pétales. Les filaments sont un peu dilatés à leur sommet, portant une anthère de chaque côté. Les capsules, au nombre de quatre, ne renferment chacune qu'une seule semence noirâtre, entièrement recouverte par un arille blanc.

Cette plante se rencontre dans la Guinée. *Th* (*Descript. ex Willd.*)

L'offa indica Houttey, Linn. Pl. Syst. vol. 4. pag. 40. tab. 26, paroît être, d'après Willdenow, une espèce qui doit être réunie à ce genre.

3. TETRACERA à feuilles lisses. *Tetracera levis*. Vahl.

Tetracera foliis oblongis, levibus, subintegerrimis, acuminatis ; floribus terminalibus. Vahl, Symb. 3. pag. 71. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1242. n°. 11.

Arbrisseau dont les rameaux sont glabres, chargés de feuilles alternes, pétioles, lisses, glabres à leurs deux faces, oblongues, rétrécies à leur base, acuminées à leur sommet, presque entières, dentées à leur partie supérieure, longues de deux ou trois pouces, veinées, réticulées ; les dentelures en scie, peu marquées, distantes ; les pétioles très-courts.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, disposées presque en grappes très-lâches, n'ayant qu'un seul ou deux pédoncules communs, longs d'environ un ponce ; les pédicelles à une ou quelquefois deux fleurs. Le calice est divisé en six folioles arrondies ; des étamines nombreuses ; deux styles subulés. Les capsules sont au nombre de quatre, longues d'un demi-pouce, arrondies, ventrues, très-glabres, luisantes, mucronées à leur sommet. Elles renferment une semence fort petite, noirâtre, luisante, recouverte jusque vers son milieu d'un arille blanchâtre, dont les bords sont denticulés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *Th*

4. TETRACERA du Malabar. *Tetracera malabarica*.

Tetracera foliis ovatis, levibus, subdenticulatis, acutis ; capsulis subrotundo-ventricosis, acuminatis. (N.)

Tetracera. Lam. Illustr. Gener. tab. 485, fig. 1.

Acara Pastjoi. Rheed, Malab. vol. 5. tab. 8.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *tetracera levis* de M. Vahl ; il est même douteux qu'elle en soit bien distincte. Ses tiges sont droites, peu élevées, rameuses ; les rameaux glabres, cylindriques, quelquefois un peu flexueux à leur partie supérieure ; les feuilles alternes, médiocrement pétioles, coriaces, ovales, lisses & glabres à leurs deux faces, presque entières à leur contour, ou médiocrement dentées en scie, aiguës à leur sommet, marquées en dessous de nervures simples & latérales, veinées, réticulées, ridées à leur face supérieure.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, axillaire, assez ample ; le pédoncule commun allongé, divisé en plusieurs autres partiels, courts, presque dichotômes, uniflores, munis vers leur milieu de deux petites bractées opposées, courtes, subulées, caduques. La corolle est blanche, très-odorante, composée de quatre pétales un peu arrondis, très-obtus, concaves ; le calice à quatre folioles verdâtres ; des étamines nombreuses, beaucoup plus courtes que la corolle ; quatre ovaires ; autant de styles persistans ; quatre capsules arrondies, sensées, très-glabres, de la grosseur d'une très-petite noisette, mucronées par le style persistant, à une seule valve qui s'ouvre latéralement, & renferme deux semences arrondies, un peu comprimées.

Cette plante croît au Malabar, dans les Indes orientales, dans les lieux montagneux & pierreux. *Th* (*V. f. in herb. Lam. Ex Sonnerat.*)

5. TETRACERA à trois styles. *Tetracera euryandra*. Vahl.

Tetracera foliis oblongis, obtusis, levibus, integerrimis ; floribus trigynis. Vahl, Symb. 3. pag. 71. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1242. n°. 9.

Euryandra scandens. Forst. Prodr. n°. 218, & Gener. n°. 41. — Juss. Gener. Plant. pag. 28c. — Lam. Illustr. Gener. tab. 485.

M. Vahl a cru devoir rapporter aux *tetracera* cette plante dont Forst. avoit fait un genre particulier, & qui diffère des *tetracera* par le nombre des parties de sa fructification. C'est un arbrisseau dont les tiges sont grimpantes, munies de rameaux alternes, glabres, cylindriques, garnis de feuilles pétioles, alternes, oblongues, lancéolées, longues de deux pouces & plus, lisses, glabres à leurs deux faces, vettes en dessus, plus pâles en dessous, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet.

Les fleurs, disposées en panicules terminales, ont un calice monophylle, divisé en cinq folioles, ovales, concaves, obtuses ; une corolle composée

de trois pétales plus longs que le calice, lancéolés, obtus, rétrécis en languette à leur partie supérieure; un grand nombre d'étamines, dont les filaments sont dilatés vers leur sommet, supportant de chaque côté une anthere; trois ovaires ovales, adnés à leur base; trois styles droits, à peine de la longueur des étamines, surmonté chacun d'un stigmate bifide. Le fruit est composé de trois capsules ou follicules divariquées, ovales, aiguës, à une seule valve, à une seule loge, renfermant plusieurs semences.

Cet arbrisseau croît à la Nouvelle-Calédonie, où il a été découvert par Forster. h

TÉTADIUM dichotôme. *Tetradium dichotomum*. Loureiro.

Tetradium foliis pinnatis, racemis trichotomis. Lour. Flor. cochin. pag. 115.

C'est un arbre d'une médiocre grandeur, dont les rameaux sont ascendants, garnis de feuilles ailées, avec une impaire, composées de folioles glabres, lancéolées, très-entières; les fleurs blanches, disposées, vers l'extrémité des rameaux, en grappes très-amplées.

Cette plante, qui forme un genre, d'après Loureiro, paroit le rapprocher beaucoup des *brucea*, & peut-être, selon M. de Jussieu, n'en est-elle qu'une espèce à fleurs hermaphrodites. Elle appartient à la famille des térébinthacées.

Son caractère essentiel est d'avoir :

Un calice inférieur à quatre folioles; quatre pétales; quatre étamines; quatre styles; autant de capsules monospermes; les semences ailées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, fort petit, ouvert, persistant, divisé profondément en quatre folioles aiguës.

2°. Une corolle composée de quatre pétales ovales, plus longs que le calice, presque droits, courbés en dedans.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont épais, subulés, pileux, aussi longs que les pétales, terminés par des anthers ovales, à deux loges.

4°. Un ovaire arrondi, à quatre lobes; point de style; quatre stigmates droits, subulés.

Le fruit est composé de quatre capsules presque rondes, monospermes, s'ouvrant à leur sommet; les semences ailées, luisantes, arrondies.

Ce genre a le son nom du mot grec *tetradion* (quaternus), à cause de chaque partie de ses fleurs divisées en quatre.

Cet arbre croît sur les hautes montagnes de la Cochinchine.

TÉTAGONIE. *Tetragonia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, apétales, de la famille des ficoides, qui a des rapports avec les *mesembryanthemum*, & qui comprend des herbes ou des sous-arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, quelquefois geminées; les fleurs axillaires solitaires ou en grappes terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice de trois à cinq découpures; point de corolle; de dix à vingt étamines; quatre à cinq styles; un drupe inférieur à quatre ailes, contenant une noix à quatre ou cinq loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en quatre découpures, quelquefois trois ou cinq, colorées, planes, rabattues, roulées à leurs bords, persistantes.

2°. Point de corolle.

3°. De dix à vingt étamines, dont les filaments sont capillaires, plus courts que les folioles calicinales, terminés par des anthers oblongues, inclinées.

4°. Un ovaire presque rond, inférieur, à cinq angles, surmonté de quatre ou cinq styles, subulés, recourbés, de la longueur des étamines, souvent pubescents.

Le fruit est un drupe sec, coriace, à quatre ou cinq angles ou ailes, les deux opposés plus étroits; ce drupe ne s'ouvre point; il renferme une noix osseuse, à quatre ou cinq loges, renfermant chacune un noyau oblong; l'embryon arrondi, oblong, recourbé.

Observations. Les *tetragonia* présentent un genre fort naturel, & qui se lie aux *mesembryanthemum* par un grand nombre de rapports; ils s'en distinguent en ce que ces derniers sont munis d'une corolle composée de pétales nombreux, & disposés sur plusieurs rangs; les *tetragonia* en sont privés; ils se distinguent encore par leurs fruits drupacés & non capsulaires. Le nombre des divisions du calice, celui des étamines, des pistils, des loges & des semences est variable; mais les caractères essentiels sont constants dans toutes les espèces. Leur port est le même que celui de la plupart des *mesembryanthemum*; cependant les feuilles sont jusqu'alors alternes dans toutes les espèces connues, grasses, épaisses, succulentes; la plupart recouvertes de petites vésicules aqueuses, cristallines. Les fleurs, quelquefois solitaires, pédonculées ou sessiles, sont plus ordinairement réunies en petites

grappes courtes, peu garnies; les inférieures situées dans les aisselles des feuilles, les supérieures non feuillées. Ces fleurs sont petites & n'ont point d'éclat, quoique les calices soient souvent colorés, particulièrement dans leur intérieur. La forme des drupes est variable; ils sont munis, dans plusieurs espèces, d'angles ou de larges ailes coriaces, nues dans l'une, quelquefois surmontées par les dents du calice, qui rendent ces fruits cornus. Quelques espèces sont ligneuses, d'autres herbacées & même annuelles.

E S P È C E S.

1. TETRAGONIE ligneuse. *Tetragonia fruticosa*. Linn.

Tetragonia fruticosa, foliis linearibus, fructibus alatis. Aiton, Hort. Kewens. vol. 2. pag. 176. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 123. n°. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 437. — Gzinn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 204. tab. 127. fig. 1.

Tetragonia, foliis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 687. — Royle, Lugd. Bat. 250. — Miller, Dict. n°. 1. & Icon. tab. 163. fig. 2. — Hort. Cliff. 126. — Hort. Upsal. 126. — Kniph. Centur. 4. n°. 57.

Tetragonocarpus africana, rutilans; foliis longis & angustis. Commel. Hort. 2. pag. 205. tab. 103.

Evonymo affinis africana, portulaca folio. Seba. Thesaur. 2. pag. 13. tab. 11. fig. 8.

Ses tiges sont grêles, ligneuses, presque cylindriques, longues de trois à quatre pieds, glabres, rameuses, revêtues d'une écorce grise, divisées en un grand nombre de rameaux alternes, lisses, souvent jaunâtres, ordinairement couchés ainsi que les tiges, garnis de feuilles alternes, sessiles, linéaires, oblongues, charnues, glabres à leurs deux faces, entières, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, longues d'environ un pouce sur deux ou trois lignes de large, contenant quelquefois dans leurs aisselles des fascicules de feuilles plus petites, qui sont des rameaux naissans, point développés.

Les fleurs inférieures sont axillaires, presque solitaires; leur pédoncule simple ou divisé en deux, quelquefois formant de petites grappes ordinairement plus courtes que les feuilles: chaque rameau est de plus terminé par une grappe de fleurs allongée, non feuillée, composée d'autres petites grappes courtes; les pédoncules cylindriques, presque glabres; les calices à quatre découpures, quelquefois cinq, ovales, un peu aiguës, un peu réfléchies, vertes en dehors, jaunes en dedans, sans corolle, contenant un grand nombre d'étamines terminées par des anthères oblongues, inclinées; quatre styles un peu courbés, de la longueur des étamines. Il

leur sucçède un drupe sec, entier, à quatre grandes ailes coriaces, comprimées, arrondies; quatre autres petites, bien moins larges, alternes avec les premières, renfermant, vers leur partie supérieure, une noix osseuse, ovale, un peu globuleuse, ailée comme le drupe, à quatre loges, contenant chacune une semence très-dure, ovale-oblongue, aiguë, très-glabre, d'un brun-foncé.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive dans plusieurs jardins de l'Europe: elle fleurit dans les mois de juillet & d'août. *h* (V. v.)

2. TETRAGONIE tombante. *Tetragonia decumbens*.

Tetragonia fruticosa, pruinosa; foliis obovatis, fructibus alatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 177. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1023. n°. 2.

Tetragonia (decumbens), foliis ovatis, integerrimis; caule fruticosa, decumbente. Miller, Dict. n°. 3. — Icon. 176. tab. 263. fig. 1.

Cette espèce approche de la précédente; elle s'en distingue par les feuilles, beaucoup plus longues & plus larges. Ses tiges sont ligneuses, plus longues, étendues sur la terre, divisées en rameaux nombreux, couchés, épais, cylindriques, presque de la grosseur du petit doigt, garnis de feuilles alternes, en ovale renversé, longues d'environ deux pouces sur un de large, rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet, épaisses, charnues, glabres à leurs deux faces, & couvertes des deux côtés, ainsi que les rameaux & les tiges, de petites vésicules transparentes.

Les fleurs sont disposées à peu près comme celles de l'espèce précédente, mais plus grandes, formant de petites grappes allongées, composées de trois à quatre fleurs pédicellées. Les calices sont divisés en quatre folioles d'un jaune de soufre, ovales, aiguës, contenant des étamines nombreuses; les anthères oblongues, d'un jaune-pâle & les fruits ailés, peu différens de ceux du *tetragonia fruticosa*.

Cette espèce se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris: elle fleurit dans les mois de juillet & d'août. *h* (V. v.)

3. TETRAGONIE velue. *Tetragonia villosa*.

Tetragonia procumbens, foliis sub ovato-oblongis, subvillosis; floribus racemosis, axillaribus terminalibusque; calice hirsuto. (N.)

Cette plante a beaucoup de ressemblance avec le *tetragonia fruticosa*; elle en diffère par les poils courts qui la recouvrent en partie. Ses tiges sont couchées, grêles, presque herbacées, un peu velues, garnies de rameaux alternes, réfléchis &

munis de feuilles alternes oblongues, un peu ovales, légèrement velues, épaisses, charnues, très-entières à leur contour, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, longues de six à huit lignes sur deux de large, garnies quelquefois dans leurs aisselles d'autres petites feuilles très courtes.

Les fleurs sont en partie axillaires, en partie terminales; les premières solitaires ou réunies deux ou trois sur des pédoncules souvent très simples, quelquefois réunis à leur base, velus, plus courts que les feuilles; les fleurs terminales forment une grappe un peu touffue, droite, sans feuilles; les calices pubescens, blanchâtres, à quatre folioles un peu concaves, ovales, aiguës; les étamines nombreuses, presque aussi longues que le calice; les anthères allongées, étroites, inclinées. Je ne connois point les fruits.

J'ignore le lieu natal de cette plante; elle a été cultivée, il y a quelques années, au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

4. TETRAGONIE hérissée. *Tetragonia hirsuta*. Linn. f.

Tetragonia herbacea, hirsuta, procumbens; foliis ovatis, villosis; floribus axillaribus, ternis, sessilibus. Linn. f. Suppl. pag. 258. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1023. n°. 4.

Cette espèce est facile à distinguer par ses fleurs sessiles, axillaires. C'est une plante herbacée, dont les tiges sont étendues sur la terre, hérissées de poils, rameuses; les rameaux également couchés, garnis de feuilles alternes, sessiles, ovales, velues. Les fleurs sont sessiles, situées dans l'aisselle des feuilles, assez ordinairement réunies au nombre de trois.

Cette plante a été découverte, par Thunberg, au Cap de Bonne-Espérance.

5. TETRAGONIE herbacée. *Tetragonia herbacea*. Linn.

Tetragonia herbacea, levis; foliis ovatis, petiolatis; fructibus alatis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 177. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1023. n°. 3.

Tetragonia foliis ovatis. Linn. Spec. Plant. pag. 687. — Roy. Lugd. Bar. 450. — Mill. Dict. n°. 3. — Flor. Leyd. Prodr. 250.

Tetragonocarpus africana, radice magna, crassa & carnosa. Commel. Hort. vol. 2. pag. 203. tab. 102.

Ses racines sont grosses, épaisses, charnues; elles produisent des tiges faibles, herbacées, traînantes, glabres, cylindriques, divisées en rameaux alternes, lisses, couchés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, lancéolées, longues d'en-

viron un pouce, sur six lignes de large, peu épaisses, à peine succulentes, glabres à leurs deux faces, entières, très-lisses, souvent garnies d'autres feuilles plus petites dans leurs aisselles. Les fleurs sont situées dans les aisselles des feuilles, soutenus par des pédoncules grêles & allongés, au nombre de trois, simples, uniflores. Leur calice est de couleur jaunâtre, à quatre découpures ovales, un peu aiguës; les étamines nombreuses; les fruits aillés.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

6. TETRAGONIE à épis. *Tetragonia spicata*. Linn. f.

Tetragonia glabra, herbacea, erecta; foliis inferioribus ovatis, supremis lanceolatis, glabris; floribus racemosis. Linn. f. Suppl. pag. 258. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1024. n°. 5.

Nous n'avons que très-peu de détails sur cette espèce; c'est une plante herbacée, dont les tiges sont droites, glabres, garnies de feuilles de deux sortes, alternes, glabres à leurs deux faces; les inférieures ovales; les supérieures lancéolées. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en épis composés de petites grappes particielles.

Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été observée par Thunberg.

7. TETRAGONIE échinée. *Tetragonia echinata*. Aiton.

Tetragonia foliis rhombo-ovatis, fructibus echinatis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. par. 177. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1024. n°. 6.

Cette plante a des tiges herbacées, qui se dressent, un peu au dessus des racines, en rameaux diffus, étalés, à peine longs d'un pied, anguleux ou légèrement aillés par la décurrence des pétioles, garnis de feuilles alternes, pétiolées, très-étalées, épaisses, charnues, ovales, presque rhomboïdales, glabres à leurs deux faces, entières à leur contour, un peu obtuses; les pétioles décurrens, une fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires, pendantes, couvertes de gouttes cristallines, situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules simples, filiformes, chargés de petites vésicules luisantes, de couleur purpurine. Leur calice est profondément divisé en trois ou quatre découpures d'un vert-jaunâtre en dedans; il ne renferme que trois, rarement quatre étamines. L'ovaire est plane en dessous, à trois faces, hérissé de plusieurs pointes coniques, anguleuses. Les styles sont au nombre de trois, & les drupes contiennent une noix à trois loiges.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

8. TÉTROGONIE étalée. *Tetragonia expansa*.

Tetragonia herbacea, foliis ovato-rhombicis, fructibus quadricaribus. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 178. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1024. n°. 7.

Tetragonia (expansa), herbacea, ramis expansis, elongatis; foliis parabolicis, floribus plerumque solitariis, fructu cornuto. Murr. in Conn. Gært. 1783. pag. 13. tab. 5. — Scopol. Delic. infus. 1. pag. 32. tab. 14. — Thunb. Adt. Linn. Soc. Lond. 1. pag. 335. — Murr. Syst. veget. pag. 467.

Tetragonia cornuta. Banck. in litt. — Gært. d. Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 483. tab. 179. fig. 3.

Tetragonia (halimifolia), herbacea, papuloso; foliis elliptico-rhombicis, petiolatis; pedunculis axillaribus, unifloris, subsolitariis; fructu cornuto. Forst. Prodr. n°. 223. & Plant. Ecul. pag. 67. n°. 37.

Tetragonia (halimifolia), herbacea, divaricata; foliis carnosis, alternis, petiolatis, subcordatis; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus. Roth. Abhand. pag. 48. tab. 8.

Tetragonia (japonica), foliis subcordatis, ovatis, punctatis; floribus axillaribus, solitariis. Thunb. Flor. japon. pag. 208.

Demidoria tetragonoides. Pallas, Hort. Demidôr. pag. 150. tab. 1.

Ses tiges sont herbacées, divisées, presque dès leur base, en rameaux étalés, alongés, tendres, fistuleux, glabres, verdâtres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, rhomboïdales, charnues, succulentes, longues presque de deux pouces, sur environ un pouce & demi de large, glabres à leurs deux faces, entières, un peu obtuses à leur sommet, rétrécies & légèrement décourbées sur la partie supérieure des pétioles, parsemées de petits points cristallins, qui deviennent blanchâtres par la dessiccation; les pétioles planes, un peu striés, presque de moitié plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, un peu inclinées, soutenues par des pédoncules très-courts, épais, simples, uniflores. Le calice est divisé à son orifice en quatre dents un peu larges, aiguës; les étamines nombreuses, presque de la longueur du calice; les anthères jaunes, ovales. Le fruit est un drupe sec, presque turbiné, rhomboïdal, un peu comprimé, enveloppé par le calice persistant, qui le couronne par quatre dents en cornes, presque égales, & quatre autres petites pointes plus basses; il renferme une noix à six ou huit loges, & autant de semences solitaires dans chaque loge, d'un brun-rougeâtre,

fortement recourbées en hameçon; l'embryon jaunâtre, de même forme.

Cette plante croît à la Nouvelle-Zélande, dans l'Île-des-Amis, au Japon. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

9. TÉTROGONIE cristalline. *Tetragonia cristallina*. Lheritier.

Tetragonia herbacea, pruinosa; foliis ovatis, sessilibus; fructibus inermibus. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 178. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1023. n°. 8.

Tetragonia (cristallina), foliis ovatis, cristallino-papillofis; floribus axillaribus. Lhétit. Stimp. vol. 1. pag. 81. tab. 39.

Ses tiges sont en partie couchées, herbacées, divisées en rameaux glabres, alongés, striés, presque cylindriques, garnis de feuilles alternes, sessiles, ovales-oblongues, très-entières, glabres à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, longues d'environ un pouce, sur deux à quatre lignes de large, parsemées de petits globules cristallins.

Les fleurs sont situées la plupart dans l'aisselle des feuilles, le long des rameaux, réunies trois ou quatre en petites grappes plus courtes que les feuilles; chaque rameau est également terminé par plusieurs petites grappes non feuillées. Les pédoncules sont presque simples, cylindriques, pubescents, ainsi que les calices. Ceux-ci se divisent en quatre folioles lancé-olées, obtuses. Les étamines sont nombreuses, plus courtes que le calice; les anthères oblongues, inclinées, d'un jaune de soufre. Les fruits sont des drupes dépourvus de pointes à leur sommet.

Cette plante croît au Pérou. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

TÉTANTHE littoral. *Tetranthus littoralis*. Swartz, Prodr. pag. 116. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2402.

Tetranthus foliis petiolatis, oppositis, subovatis; pedunculis uniporis, axillaribus. (N.)

C'est une plante herbacée, annuelle, dont M. Swartz a fait un genre particulier, qui a presque le port d'un *mitschlin*, dont les tiges sont rampantes & hisiformes, les feuilles pétioles, opposées, un peu arrondies, ovales ou presque en cœur, membraneuses, glabres à leurs deux faces, longues d'environ six lignes, marquées de trois nervures. Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, solitaires, supportées par des pédoncules plus longs que les feuilles, uniflores. Ces fleurs ont un calice d'une seule pièce, coupé obliquement à son bord; une corolle tubulée; cinq étamines syngénèses; un pistil; des semences solitaires, couronnées par

les bords ciliés du calice, portées sur un réceptacle nu. Le calice commun est composé de cinq folioles, & renferme quatre fleurs.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Espagne. ○

TÉTAPHIS (*Voyez* MNIMUM.) Genre établi par Hedwig, qui est un démembrement de celui des *minium*, & qui est caractérisé par une capsule terminale, oblongue, & dont le péristome ou l'ouverture est simple, muni à ses bords de quatre dents pyramidales. Les *tétraphis* sont dioïques. Les fleurs mâles sont toujours terminales, rarement pédonculées & en forme de coupe, tantôt sessiles & ramassées en tête. La capsule est recouverte par une coiffe entière, & qui se détache latéralement. Il faut rapporter à ce genre le *minium pellucidum* Linn., &c.

TÉTAPILE. *Tetrapilus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioïques, monopétalées, régulières, de la famille des jasnées, qui a des rapports avec les *troènes* (*Lipsum*), & qui comprend des arbrutes exotiques à l'Europe, à feuilles entières, opposées, dont les fleurs sont disposées en grappes courtes, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques ; dans les fleurs, tant mâles que femelles, un calice à quatre découpures ; une corolle à quatre lobes ; deux étamines ; un style ; une baie à deux loges polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont dioïques ; les fleurs mâles séparées des femelles sur des pieds différents.

* Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice campanulé, fort petit, persistant, à quatre découpures aiguës.

2°. Une corolle campanulée, dont le tube est très-court, à quatre sillons ; le limbe divisé en quatre lobes recourbés en capuchon.

3°. Deux étamines, dont les filaments sont courts, épais, terminés par des anthères ovales, à deux loges.

* Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs mâles.

2°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style court, épais, terminé par un stigmate charnu, bide.

Le fruit consiste en une baie ovale, petite, à deux loges, renfermant plusieurs semences arrondies.

Observations. Les quatre découpures du limbe de la corolle, courbés en capuchon, offrent l'éry-

mologie du nom de ce genre, composé de deux mots grecs, *tetra* (quatre), *pilos* (écailles), quatre capuchons. Il diffère du *troène* par une baie à deux loges, renfermant des semences en nombre indéterminé.

ESÈCE.

TÉTAPILE branchu. *Tetrapilus brachiatus*, Loureiro.

Tetrapilus ramis brachiatis, foliis ovato-lanceolatis, roseis axillaribus. Loureiro, Flor. coch. pag. 750.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges s'élèvent à la hauteur d'environ cinq pieds, & se divisent en rameaux branchus, très-étalés, garnis de feuilles simples, opposées, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, légèrement dentées en scie à leurs bords. Les fleurs sont blanches, petites, placées dans l'aisselle des feuilles, disposées en grappes axillaires & courtes.

Cet arbrute croît à la Cochinchine, parmi les brousses. (Description, ex Lour.)

TÉTAPIGONE. *Tetrapogon*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, polygames, monoïques, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *canchras*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont disposées en épis terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice bivalve, à trois fleurs ; les deux latérales hermaphrodites ; celle du centre stérile, pédonculée ; la valve extérieure de la corolle aristée ; celle de la fleur stérile, toutes deux aristées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont sessiles, disposées en épi ; les unes hermaphrodites, d'autres stériles. Elles offrent :

1°. Un calice à trois fleurs ; deux latérales, sessiles, hermaphrodites ; celle du milieu pédonculée, stérile ; les valves calicinales membraneuses, oblongues, inégales, mutiques.

2°. Une corolle (dans les fleurs hermaphrodites) à deux valves ; l'extérieure relevée en carène, velue, tronquée, surmontée d'une arête ; l'intérieure plus petite, membraneuse, sans arête (dans la fleur hermaphrodite) ; une corolle bivalve ; les valves presque égales, tronquées à leur sommet, terminées toutes deux par une arête.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, très-courts ; les anthères bides à leur sommet, vacillantes.

4°. Un ovaire supérieur, ovale (dans les fleurs

hermaphrodites), fort petit, surmonté de deux styles velus, réfléchis en dehors, terminés par des stigmates simples.

Les semences sont solitaires, fort petites, ovales, obtuses.

ES PÈ C E.

TÉTAPOGONE velue. *Tetapogon vill. sum.* Desfont.

Tetapogon culmo compresso, floribus densè spicatis, corollæ glumis villosis, floribus omnibus aversatis. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 389. tab. 255.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, grêles, noueuses, comprimées, glabres, filiformes, très-filiformes, garnies de feuilles alternes, étroites, glabres à leurs deux faces, lisses, allongées, aiguës à leur sommet, d'environ une ligne de large, munies d'une gaine relevée en carène sur le dos, lisse, finement striée, plus courte que les entre-nœuds, garnie à son orifice d'une petite membrane courte.

Les fleurs sont petites, très-nombreuses, & forment un épi terminal, épais, long de deux à trois pouces; elles sont fécondes, disposées sur quatre rangs le long d'un rachis filiforme & flexueux, enveloppé à sa base & dans presque toute sa longueur d'une feuille dont la gaine est élargie, renflée en forme de spathe, d'un jaune-pale. Leur calice est composé de deux valves membraneuses, lâches, presque égales, oblongues, étroites, mutiques, d'un blanc-argenté, glabres, aiguës: elles renferment trois fleurs; deux latérales hermaphrodites, dont la corolle est formée de deux valves; l'extérieure velue, en carène, tronquée à son sommet, terminée par une arête très-fine, droite, setacée, jaunâtre, longue de cinq à six lignes, insérée un peu au dessous du sommet; la valve intérieure membraneuse, mutique, enveloppée par l'extérieure. La fleur centrale est stérile, pédicellée; sa corolle composée de deux valves fort petites, presque égales, tronquées à leur sommet, toutes deux velues & aristées.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans la Barbarie, où elle croît dans le sable, proche Casfa. (*Descript. ex Desfont.*)

TÉTATHÉCA jonciforme. *Tetatheca juncea.* Smith.

Tetatheca glabra, foliis alternis, lanceolatis; caule acutangulo; ramis elongatis, nudisculis. Smith. Nov.-Holland. vol. 1. p. 5. tab. 2.—Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 321.

C'est une plante de la Nouvelle-Hollande, qui forme seule un genre particulier établi par M. Smith. Ses tiges sont glabres, droites, comprimées en un angle tranchant, garnies de ra-

meaux alternes, allongés, presque nus, un peu ressemblants à des tiges de jonc. Les feuilles sont alternes, lancéolées. Les fleurs ont un très-bel aspect; elles varient par leur couleur rose ou blanche.

Leur calice est inférieur, à quatre découpures; la corolle composée de quatre pétales renfermant huit étamines, dont les filaments supportent des anthères à quatre lobes, un ovaire surmonté d'un style auquel succède une capsule supérieure, à deux loges, à deux valves, chaque valve séparée par une cloison jusqu'à sa moitié. Elles renferment ordinairement deux semences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande.

TÉTAPTERIS. Cavan. Ce genre nous paraît trop peu distingué des *trippteris* pour en être séparé. Voyez *TRIPPTERIS*.

THALIE. *Thalia.* Genre de plantes monocotylédones, à fleurs irrégulières, polyptères, de la famille des balisiers, qui a de très-grands rapports avec les *marantia*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont terminales, lâchement paniculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice supérieur à trois folioles; une corolle à cinq, quelquefois six pétales réunis en tube à leur base; les deux intérieurs plus petits & roulés en cornet; une étamine; un style; un drupe renfermant un noyau à une ou deux loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à trois folioles fort petites, lancéolées, membraneuses. ?

2°. Une corolle composée de cinq pétales irréguliers, rapprochés en tube à leur base; trois plus grands, concaves, ovales, obtus; deux plus petits, intérieurs, roulés en cornet.

3°. Une seule étamine, dont le filament est inséré sur le tube, membraneux, aigu, terminé par une anthère attachée à la partie supérieure du filament, à deux divisions.

4°. Un ovaire inférieur, ovale, surmonté d'un style simple, terminé par un stigmate incliné, obtus.

Le fruit consiste en un drupe ovale, renfermant un noyau à deux ou à une seule loge; une semence dans chaque loge.

Observations. Nous n'avons encore, sur ce genre, que des notions imparfaites. Il faudroit, pour circonscrire les caractères essentiels qui lui conviennent, pouvoir observer vivantes les plantes qui le composent.

composent. Quelques auteurs leur donnent un calice à trois folioles ; d'autres n'en parlent pas. La corolle offre également quelques incertitudes ; les autres parties de la fructification auroient également besoin d'un nouvel examen. Il paroît qu'en général les genres *thalia*, *alpinia*, *curcuma*, *maranta*, diffèrent peu entr'eux, & qu'étant mieux connus, ils pourroient bien ne former qu'un seul genre. M. de Lamarck, dans les Illustrations des Genres, a réuni les *thalia* & les *curcuma* aux *maranta*. Il est en effet très-difficile d'assigner les caractères qui les différencient, surtout d'après les incertitudes que l'on a sur l'existence de quelques-unes de leurs parties.

ES PÈCE.

THALIE géniculée. *Thalia geniculata*. Linn.

Thalia foliis ovato-oblongis, petiolis geniculatis, corollis pentapetalis. (N)

Thalia corollis pentapetalis, nectario lanceolato. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 15. n°. 1.

Thalia geniculata. Linn. Syst. Plant. vol. 1. p. 6. — Roy. Lugd. Bat. 11. — Rotb. Collect. — Hall. 2. pag. 249. tab. 2. — Swartz, Obferv. pag. 8.

Miranta (geniculata), caule folioso, petiolis geniculato infructibus, spathis glaniformibus, corollis tubo brevissimis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 9. n°. 23. tab. 1. fig. 2.

Cortusa arundinacea, amplis canaliculatis. Plum. Gener. Amer. 26, & Icon. 108. fig. 1.

Canna indica, radice alba, alexipharmaca. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 253. tab. 149. fig. 2. — Rai, Suppl. 573. ?

Canna indica, angustifolia, pediculis longis ad imum folium nodo singulari geniculata. Pluk. Almag. 79.

Aguti-guepo-obi. Marcgr. Brasil. 53. — Rai, Hist. 1203.

Ses racines sont épaisses, blanchâtres ; elles produisent une tige droite, très-simple, glabre, cylindrique, haute de six à sept pieds, garnie de feuilles alternes, pétioles, ovales-oblongues, presque en cœur, glabres, très-lisses, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, traversées par des nervures parallèles, soutenues par des pétioles cylindriques, glabres, élargis à leur base en forme de gaine membraneuse, munis d'une articulation.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicle très-lâche, peu garnie ; elles sont munies d'une spathe en forme de balle, ovale-oblongue, concave, acuminée à son sommet, renfermant deux fleurs. La corolle est très-fugace, composée de cinq pétales inégaux, ondulés, mais

Botanique. Tome VII.

seulement lorsqu'ils commencent à se faner, d'après l'observation de M. Lamarck ; les trois pétales extérieurs plus grands, ovales-oblongs, concaves, obtus à leur sommet ; les deux intérieurs beaucoup plus courts, roulés en cornet, tous rapprochés à leur partie inférieure en un tube court. Le fruit est un drupe inférieur, ovale, obtus, renfermant un noyau à deux lobes, chaque lobe à une seule semence, quelquefois une des deux lobes ouverte, & plus souvent encore une des deux semences.

Cette plante croît dans plusieurs contrées de l'Amérique méridionale. ✕

Ses tiges fournissent aux Indiens de quoi fabriquer les flèches avec lesquelles ils vont à la chasse des animaux.

* *Thalia (canniformis), corollis hexapetalis ; nectario bifido, erecto.* Forst. Prodr. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 16. n°. 2.

THAPSIE. *Thapsia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des ombellifères, qui a des rapports avec les *passiflora*, les *loxosiphium*, & qui comprend des herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont plusieurs fois ailées ; les fleurs jaunes ; les collerettes nulles dans la plupart des espèces.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice presque entier ; cinq pétales lanceolés, recourbés ; le fruit oblong, comprimé, échancré à ses deux extrémités, muni de quatre ailes membraneuses.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont disposées en une ombelle universelle, ample, composée d'environ une vingtaine de rayons presque égaux, sans collerette dans la plupart ; les ombellules courtes, munies d'un nombre égal de rayons ; point de collerette.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice propre, souvent entier, à peine sensible.

2°. Une corolle composée de cinq pétales lanceolés, recourbés.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont capillaires, de la longueur des pétales, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire oblong, surmonté de deux styles courts, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit est composé de deux semences assez grandes, oblongues, comprimées, convexes & striées en dessus, planes à leur face inférieure, munies chacune de deux ailes larges, membraneuses, échancrées à leurs deux extrémités.

H h h h

Observations. Ce genre se rapproche beaucoup des *lasierpitium* par les caractères de sa fructification. Dans ces derniers, les semences sont garnies de huit ailes membranées; les ombelles & les ombellules munies de collettes. Les semences des *thapsia* n'ont que quatre ailes, & leurs ombelles sont privées de collettes dans le plus grand nombre des espèces. Quelquefois les sries dont leur surface extérieure est filonnée, sont si minces, tellement comprimées, qu'on pourroit les regarder comme de petites ailes, mais très-courtes & point à comparer aux grandes ailes des *lasierpitium*. On fait d'ailleurs que la plupart des genres établis parmi les ombellifères sont peu naturels, & qu'ils auroient besoin d'une grande réforme.

E S P E C E S.

1. THAPSIE turbith. *Thapsia garganica*.

Thapsia foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. Linn. Mant. pag. 57. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1464. n°. 4. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 138. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 262.

Thapsia foliis tripinnatis, foliolis alternis, lineari-lanceolatis, integerrimis, bifidisve decurrentibus. Gouan, Illustr. 18. tab. 10.

Thapsia five turbith garganicum, semine latissimo. J. Bauh. Hist. 3. pag. 50. Icon. — Tournef. Inst. R. Herb. 322. — Schaw. Specim. n°. 576.

Thapsia thalictri folio. Magnol, Monsp. pag. 287. tab. 286.

Thapsia libanotis folio, glutinosa, glabra. Pluken. tab. 67. fig. 3. Mala.

Vulgairement le turbith des Anciens, turbith de montagne, turbith bittard, faux turbith.

C'est une très-belle espèce, dont les racines sont grosses, épaisses, allongées, blanches en dedans, grisâtres en dehors, remplies d'un suc laiteux & caustique; il s'en élève une tige droite, glabre, épaisse, légèrement striée, fistuleuse, surmontée d'une parrie supérieure, haute d'un pied & plus, munie de quelques rameaux lâches, étalés, garnis de feuilles plusieurs fois (deux ou trois fois) ailées, glabres, luisantes à leur face supérieure; les feuilles qui lui montrent les premières sont longuement pétiolées, ovales ou ovales-lancéolées, très-entières; il leur succède d'autres feuilles dont les unes sont à trois, d'autres à cinq folioles; enfin des feuilles deux & trois fois ailées, composées de folioles opposées, sessiles, même un peu décurrentes sur le pétiole commun, entières, lancéolées, aiguës, vertes & luisantes en dessus, plus pâles, nerveuses & ridées en dessous; les pétioles glabres, cylindriques, élargis à leur base en une ample gaine longue; membraneuse, qui souvent

existe seule à la partie supérieure des tiges, surtout à leurs dernières divisions.

Les fleurs sont disposées en plusieurs ombelles terminales, très-amples, composées de huit à douze rayons, sans collettes, supportant chacun une ombelle un peu arrondie, à rayons nombreux, inégaux, sans collettes. Les calices sont courts, ayant cinq petits lobes à peine sensibles; la corolle jaune, un peu palé; les pétales réguliers; deux semences oblongues, comprimées, striées, entourées chacune de deux ailes larges, jaunâtres, membraneuses, échancrées à leurs deux extrémités; les sries souvent un peu membraneuses.

J'ai recueilli cette plante sur les côtes de Barbarie, dans les campagnes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

On a donné à cette plante le nom vulgaire de faux turbith, &c. parce que ses racines ressemblent un peu à celles du turbith, & qu'elles en ont quelques unes des propriétés. Le vrai turbith est un liferon, *convolvulus tarpetum* Linn. Les racines de celui dont il est ici question, sont très-âcres & corrosives. On la fait fêcher pour la conserver, après en avoir ôté le cœur: son action est trop violente pour qu'on en fisse usage intérieurement, quoiqu'on prétende qu'elle purge de la pierre; elle est employée à l'extérieur dans les onguens pour les maladies de la peau & pour dissoudre les rumeurs.

2. THAPSIE velu. *Thapsia villosa*. Linn.

Thapsia foliis dentatis, villosis, basi coadunatis. Linn. Spec. Plant. pag. 376. — Hort. Cliff. 105. — Roy. Lugd. Bat. 113. — Mill. Dict. n°. 1. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. p. 138. — Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 262. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1464. n°. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 266. — Decand. Flor. fr. vol. 4. pag. 142. — Gzert. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 88. tab. 21. fig. 6.

Thapsia lasifolia, villosa. C. Bauh. Pin. 148. — Tournef. Inst. R. Herb. 322. — Moris. Oxon. Hist. 3. §. 9. tab. 18. fig. 3, & Umbell. tab. 1. fig. 11. 11.

Thapsia quorundam hirsuta & aspera, cicutæ folio, flore luteo, semine alato, alius f. scili petoposiacum. J. Bauh. Hist. 3. pag. 185. Icon.

Thapsia. 1. Clus. Hist. 2. p. 192. Ic. — Gerard, Hist. 1530. Icon.

Thapsia carota folio. Parkinson, Theatr. 878. Icon. *Peloponense sessile majus.* Lebel. Icon. 736.

Vulgairement malherbe.

Ses racines sont épaisses, presque simples, cylindriques, un peu noueuses, d'un jaune-clair en dehors, blanches en dedans, terminées à leur par-

tie inférieure par un grand nombre de filaments simples, fasciculés, elles produisent une tige presque simple, haute de deux & même de trois pieds, cylindrique, striée, glabre, épaisse, chargée d'une poussière glauque. Les feuilles sont alternes, pétiolées, fort amples, plusieurs fois ailées, velues & un peu blanchâtres à leur face inférieure, glabres, d'un vert-foncé en dessus, composées de folioles inégales, pinnarides, alternes, sessiles, décurrentes à leur base; les découpsures courtes, irrégulières, un peu larges, obtuses ou presque aiguës, légèrement recourbées à leurs bords; les pétioles velus, striés, élargis à leur base en une gaine ample, alorgée, membraneuse, concave, entière, qui se retrouve également, mais sans feuilles, à l'insertion des pédoncules communs.

Les fleurs sont terminales, disposées en ombelles étalées, composées de douze à quinze rayons égaux, glabres, cylindriques, presque filiformes. La corolle est jaune; les semences grandes, oblongues, comprimées, glabres, striées, ailées à leurs bords, couronnées par les cinq petites dents du calice persistant; les styles point membraneux, mais très-comprimés. M. Desfontaines en a observé une variété sur les côtes d'Afrique, dont les semences étoient une fois plus petites.

Cette plante croît dans l'Espagne, le Levant, en Italie, dans les départements méridionaux de la France, & sur les côtes de Barbarie, aux lieux stériles, sablonneux, où je l'ai recueillie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Ses racines sont au moins aussi corrodatives que celles du *thapsia garganica*. J'ai rencontré un Arabe qui s'en étoit trotté le visage pour faire passer quelques dartres qu'il avoit sur la figure. Quelques heures après, la joue étoit devenue enflée & très-enflammée. Il me fit voir la plante dont il avoit fait usage, & qui passoit parmi eux pour être propre à guérir les dartres.

3. THAPSIE fétide. *Thapsia fetida*. Linn.

Thapsia foliolis multifidis, basi angustatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 375. — Hort. Cliff. 105. — Roy. Lugd. Bat. 113. — Blackw. tab. 459. — Miller, Dict. n°. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1464. n°. 2.

Thapsia carota folio. C. Bauh. Pin. 148.

Thapsia carota effigie. J. Bauh. Hist. 3. pag. 187. Icon. — Motif. Oxon. Hist. 3. pag. 319. §. 9. tab. 18. fig. 7.

On distingue à ses folioles, rétrécies à leur base, cette espèce, qui a beaucoup de rapport avec le *thapsia villosa*; ses racines sont charnues; ses tiges droites, presque simples, fortes, striées, velues, cylindriques, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles amples, pétioolées, alternes, deux

& trois fois ailées, assez semblables à celles de la carotte, composées de folioles étroites, incisées irrégulièrement, rétrécies à leur base, aiguës, point confluentes, opposées, sessiles, rudes, légèrement velues.

Les fleurs sont terminales, disposées en ombelles dont les rayons, au nombre de douze à quinze, sont tous égaux, fermes, cylindriques, dépourvus de collerette, soutenant des ombellules à rayons presque capillaires. Les fleurs sont jaunes, les semences comprimées, oblongues, striées, bordées de quatre ailes planes, membranacées, échancrées.

On rencontre cette plante dans l'Espagne & l'Italie. x

4. THAPSIE de la Pouille. *Thapsia asclepium*.

Thapsia foliis digitatis, foliolis bipinnatis, sesecae multifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 375. — Hort. Cliff. 106. — Roy. Lugd. Bat. 113. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1464. n°. 3.

Thapsia apulia. Miller, Dict. n°. 4.

Thapsia foliis pinnatifidis, linearibus, ad pedunculum communem radiatis. Royen, Lugd. Bat. 114.

Thapsia tenuifolia, petiolis radiatis. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 319. §. 9. tab. 18. fig. 9.

Panax asclepium apulum. Colum. Echph. 1. pag. 87. tab. 86.

Thapsia tenuiore folio, apula. Tournef. Inst. R. Herb. 322.

Exlude isferpitium hirsutum. Lam. Dict. vol. 3. pag. 325. n°. 7.

Cette plante ne doit pas être confondue avec le *Isferpitium hirsutum*, déjà mentionné dans cet ouvrage, & auquel M. Lamarck a rapporté le *Thapsia asclepium* Linn. Elle est très-reconnaissable par l'extrême finesse de ses folioles, & par la division inférieure de ses pétioles communs, en quoi elle diffère du *Isferpitium hirsutum* ou *halleri*, ainsi que par ses fleurs jaunes & ses semences à quatre ailes.

Ses racines sont épaisses, charnues, à peu près de la grosseur du pouce, fusiformes, blanches en dedans, remplies d'un suc acre & laiteux, revêtues d'une écorce jaunâtre, ridée. Les tiges sont simples, droites, glabres, cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, ordinairement dépourvues de feuilles caulinaires, garnies seulement de quelques gaines membraneuses, alternes. Ses feuilles sont radicales, pétioolées, plusieurs fois ailées; le pétiole commun membraneux, élargi à sa partie inférieure, se divise en pétioles partiels réunis quatre ou six au même point d'insertion, étalés en étoiles, supportant des feuilles deux fois ailées; les fo-

Hhhh 2

lioles sont extrêmement fines & courtes, élégamment découpées, un peu velues.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges & de quelques rameaux ou pédoncules communs nus, seulement munis à leur base d'une gaine membraneuse. L'ombelle universelle est ample, formée de douze à quinze rayons égaux, dépourvus de collette, ainsi que les ombellules. La corolle est jaune, à cinq pétales un peu réfléchis; cinq étamines; deux styles persistants; les semences comprimées, oblongues, striées sur leur dos, bordées de quatre ailes membraneuses, obtuses, échancrées à leurs deux extrémités.

Cette plante croît en Italie, dans la Pouille & le Levant. (V. f.)

5. THAPSIE polygame. *Thapsia polygame*. Desf.

Thapsia foliis decompositis, foliolis acutis; involucro apice pinnatifido, floribus centralibus evanidis. Desfont. Flot. atlant. vol. 1. pag. 261. tab. 75.

Laserpitium (polygamum), *foliis pinnatis, foliolis pinnatis, brevibus; umbellâ polygamâ, semibus coronatis*. Lam. Dict. vol. 3. pag. 425. n°. 8.

Laserpitium gallicum. Var. Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 136.

Cette plante, déjà décrite dans cet ouvrage par M. Lamarck, sous le nom de *laser polygame*, est la même que M. Desfontaines a nommée *thapsia polygame*, & que j'avois déjà mentionnée dans mon *Voyage en Barbarie* comme variété du *laserpitium gallicum*; elle doit être rangée parmi les *thapsia*, dont elle offre tous les caractères de la fructification; elle n'en diffère que par les ombelles munies d'une collette de cinq à sept folioles linéaires quelquefois entières, plus souvent à trois divisions à leur partie supérieure, & même pinnatifides. La collette des ombellules n'a que des folioles simples, très-menues, entières, aiguës, plus courtes que les rayons; le calice est terminé par cinq petites dents assez apparentes. La corolle est d'un jaune pâle; les fleurs centrales des ombellules plus petites que les autres, stériles, ne contenant que des étamines; leurs rayons plus courts que ceux des fleurs de la circonférence; les styles sont divergens, assez longs, aigus, persistants; les semences munies de quatre grandes ailes membraneuses, un peu crépues à leurs bords, & d'autres petites ailes très-courtes sur les stries de chaque semence. (Voyez, pour les autres parties, la description qu'en a donnée M. Lamarck à l'article cité.)

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, vers les bords de la mer, dans les environs de Lacalle & de Bonne. (V. v.)

6. THAPSIE trifoliée. *Thapsia trifoliata*. Linn.

Thapsia foliis ternatis, ovatis. Miller, Dict. n°. 5.

— Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 262. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1465. n°. 5.

Sium folio infimo cordato; caulibus ternatis, omnibus ternatis. Gronov. Virg. 31.

Cette espèce appartient d'abord aux *selinum* qu'à *thapsia*, ayant les semences fortement striées, mais non aillées; elle se rapproche beaucoup du *selinum monieri* ou *corvisolia*, mais la privation de collette l'a fait placer parmi les *thapsia*.

Ses racines sont grêles, fusiformes, assez semblables à celles du persil; elles produisent une tige droite, simple, purpurine, articulée, haute d'environ deux pieds, grêle, cylindrique, garnie de feuilles alternes, pétiolées; les radicales simples & en forme de cœur, les supérieures ternées, à trois folioles ovales, crénelées à leur contour. Les fleurs sont disposées en ombelles à l'extrémité des tiges, de couleur purpurine; elles produisent des semences oblongues, comprimées & cannelées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale; à Philadelphie, dans la Virginie.

* *Thapsia* (altissima), *foliis decompositis; lobis maximis, lucidis; umbellâ maximâ*. Miller, Dict. n°. 6.

Thapsia montana, omnium maxima; foliis lobatis. Hort. Pis. 164.

Cette plante pourroit bien appartenir aux *laserpitium*. D'après Miller, sa racine est grosse & cylindrique; les tiges s'élèvent à près de huit pieds de haut; ses feuilles, qui s'étendent circulairement près de terre, sont divisées en plusieurs lobes, & sousdivisées en plusieurs autres larges, luisants, & placés alternativement sur de courts pétioles. Les tiges sont terminées par une ombelle de fleurs jaunes, auxquelles succèdent des semences comprimées & bordées.

Cette espèce se trouve dans la Pouille. (Description de Miller.)

THÉ. *Thea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des oranges, qui a des rapports avec les *ronaba* & les *camellia*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, les fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq ou six folioles; cinq à neuf pétales; des étamines nombreuses; trois styles connivens; une capsule supérieure, à trois coques.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur à cinq ou six divisions

profondes, courtes, planes, arrondies, obtuses, persistantes.

1°. Une corolle composée de cinq à neuf pétales assez grands, arrondis, concaves; trois pétales extérieurs plus courts dans les fleurs à neuf pétales.

3°. Des étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle, dont les filaments sont filiformes, plus courts que la corolle, terminés par des anthers à deux lobes, arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, à trois côtes, surmonté de trois styles rapprochés & connivens en un seul corps, subulés, de la longueur des étamines, terminés par trois stigmates simples.

Le fruit est une capsule globuleuse, à trois coques réunies à leur partie inférieure, à trois loges, renfermant chacune une semence globuleuse, anguleuse à une de ses faces.

Observations. Ce n'est guère que vers le milieu du dix-huitième siècle que le thé a été connu en Europe. On assure que vers ce tems des aventuriers hollandais, sachant que les Chinois faisoient leur boisson ordinaire avec les feuilles d'un arbrisseau de leur pays, voulurent essayer s'ils seroient quelque cas d'une plante européenne, à laquelle on supposoit de très-grandes vertus, & s'ils voudroient la recevoir comme un objet de commerce; ils leur portèrent donc de la sauge, plante que l'école de Salerne vanitoit autrefois comme un puissant préservatif contre toutes sortes de maladies. Les Chinois payèrent la sauge avec du thé que les Hollandais portèrent en Europe; mais l'usage de l'herbe européenne ne dura pas long-tems à la Chine, & la consommation du thé augmenta chaque jour dans nos climats. On ignore l'époque & les motifs qui engagèrent les Chinois à se servir du thé infusé. Il est vraisemblable que leur première intention fut de corriger l'eau, qu'on dit être fumée & de mauvais goût dans plusieurs parties de la Chine. En 1641, Tulpius, médecin hollandais, fit le premier connoître cette plante dans une Dissertation qu'il en donna. En 1677, Jonquet, médecin français, l'appela *herbe divine*, & la compara à l'ambrosie. En 1679, Cornelius Benteke, médecin hollandais, publia un Traité sur le thé, le café & le chocolat; il s'y déclara le partisan du thé, & il assura que cette boisson ne pouvoit faire aucun mal à l'estomac, quand même on en prendroit deux cents tasses par jour; mais il faut observer qu'il étoit premier médecin de l'électeur de Brandebourg, & que son opinion n'étoit pas indépendante de la politique hollandaise. Plusieurs de ses compatriotes furent encore au-delà de ces éloges; ils en firent une panacée universelle. Comme les feuilles du thé furent d'abord rares & peu connues, plusieurs personnes crurent avoir trouvé en France

& en Europe ce qu'on alloit chercher si loin. Ainsi Simon Pauli nous donna le Piment royal (*myrica gale* Linn.) pour le véritable thé de la Chine; d'autres retrouvoient les vertus merveilleuses du thé dans les plantes de nos contrées, telles que l'origan, la véronique, le myrte, la sauge, l'ail-gremon, &c. mais on a fini par accorder la préférence au véritable thé de la Chine & du Japon.

Le célèbre Linné fit tous ses efforts pour procurer cet arbrisseau à l'Europe; il en sema vingt fois des graines sans aucun succès. Osbeck en avoit apporté un pied de la Chine; mais étant en-deçà du Cap de Bonne-Espérance, un tourbillon de vent s'éleva tout-à-coup, emporta ce pied de thé de dessus le gaillard d'arrière & le jeta dans la mer. Lagarström apporta au Jardin d'Upsal deux arbrisseaux pour le vrai thé, qui se portèrent bien pendant deux ans, mais lorsqu'ils fleurirent on reconnut que c'étoit le *camellia*. Quelque tems après on étoit parvenu, avec de grandes difficultés, à en apporter un à Gothenbourg. Les matelots, empressés de descendre à terre, mirent le soir le thé sur une table de la chambre du capitaine: pendant la nuit les rats du bâtiment le maltraitèrent & le mirent tellement en pièces, qu'il en mourut. Enfin Linné engagea le capitaine Ekeberg à en mettre des semences fraîches dans un pot rempli de terre, au moment où il seroit voilé de la Chine, afin que pendant le voyage, lorsque le vaisseau auroit passé la ligne, elles pussent germer; ce qui réussit fort bien, & le navire étant mouillé à Gothenbourg, toutes les plantes levèrent. La moitié fut de suite envoyée à Upsal, & périt dans le transport: le capitaine y porta l'autre moitié le 3 octobre 1763. Les corolles ou feuilles féminales étoient encore adhérents à chacun de ces pieds, & la Suède le glorieux d'avoir fait connoître à l'Europe le véritable thé de la Chine. Il n'y a pas encore cent ans que la compagnie des Indes anglaise, d'après la relation du lord Macartney, ne vendoit pas annuellement plus de cinquante mille livres pesant de thé, & il n'en étoit en outre importé clandestinement qu'une très-petite quantité. Aujourd'hui les ventes de la compagnie s'élèvent à vingt millions pesant de livres; ce qui, en moins d'un siècle, fait une augmentation de quatre cents fois la même quantité.

On est partagé sur les avantages & les dangers d'un usage habituel & journalier du thé en infusion. Quelques personnes prévenues contre cette boisson la condamnent comme étant universellement pernicieuse; d'autres, au contraire, voudroient que leur expérience particulière eût l'extension d'une loi générale. Il est difficile au reste, sans louer ni décrier universellement cet usage, de déterminer jusqu'à quel point il peut être utile ou nuisible. Beaucoup de personnes dis-

ferentes d'âge, de sexe, de tempérament en font usage avec confiance pendant le cours d'une longue vie; d'autres au contraire en éprouvent plusieurs inconvéniens.

Les expériences chimiques qu'on peut faire sur cette plante ne peuvent nous fournir des notions exactes. Les parties qui semblent produire des effets opposés nous échappent, & l'analyse ne nous en dévoile que les parties les plus grossières. Le docteur Cookley mit dans une infusion d'excellent rhé bou & le vert deux drachmes de viande de bœuf six depuis deux jours; il en mit autant dans de l'eau simple: la chair plongée dans le vase qui contenoit l'eau simple entra en putréfaction dans quarante-huit heures; celle qui étoit dans l'infusion de rhé n'annonça de la putréfaction qu'environ soixante-douze heures après. Il est évident que le rhé a une vertu antiseptique & attrahante sur la fibre d'un animal mort. Il injecta dans la cavité de l'abdomen & dans le tissu cellulaire d'une grenouille vivante environ deux drachmes de l'eau odorante distillée du rhé vert; en vingt minutes une des parties de derrière de la grenouille parut fort affectée; survint bientôt après une perte totale de mouvement & de sensibilité; l'affection du membre continua pendant quarante heures, & l'engourdissement universel dura environ neuf heures, après quoi l'animal recouvra par degrés sa première vigueur. Il injecta quelques gouttes de l'eau distillée odorante sur les nerfs sciatiques nus à nu, ainsi que la cavité de l'abdomen d'une autre grenouille: dans l'espace d'une demi-heure les extrémités devinrent paralytiques & insensibles, & environ une heure après elle mourut. Dans ces deux cas le résidu de la distillation n'a jamais produit aucun effet sensible; ce qui semble prouver que les parties relâchantes ou sédatives du rhé dépendent beaucoup de ses principes volatils, odorans, qui abondent surtout dans le rhé vert, dont le parfum est plus exalté.

Le plus grand nombre des personnes qui jouissent d'une bonne santé ne se trouvent point sensiblement affectées de l'usage du rhé; elles le regardent comme un restaurant agréable qui les rend propres au travail, retablit leurs forces épuisées. Il y a des exemples de gens qui en ont bu depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, qui ont toujours mené une vie active, sans supporter de grands travaux, & qui ne se sont jamais aperçus que leur coutume d'usage leur fût nuisible; d'autres au contraire, d'une complexion moins robuste, se sentent agités; leur main est moins ferme pour écrire ou pour tout autre exercice qui exige de la précision dans les mouvemens, lorsqu'ils ont pris du rhé à déjeuner. Il s'en trouve qui n'en font point incommodes le matin; mais s'ils en boivent après leur dîner ils éprouvent des agitations & une sorte de tremblement involontaire. En général,

les tempéramens délicats souffrent du fréquent usage du rhé; ils sont très-souvent atteints de douleurs d'estomac, d'entrailles, d'affections spasmodiques, accompagnées d'une grande effusion d'urine pâle & limpide, & d'une disposition à être inquiétés & déconcertés par le moindre bruit.

Plus le rhé est de bonne qualité, plus ses effets sont sensibles: on observe que les gens riches en font plus souvent incommodes que la classe du peuple, obligée de se contenter du rhé le plus commun. On doit dans tous les cas entendre l'usage du rhé aux enfans & aux jeunes personnes; il affecte leur estomac, altère la faculté digestive & engendre plusieurs indispersions.

En médecine on donne rarement le rhé comme remède. Dans les cas néanmoins où il est nécessaire de délayer, de faciliter les sécrétions, il pourroit avoir au moins autant d'utilité que la plupart des infusions; car indépendamment de ses autres vertus, il semble contenir quelques qualités sédatives dans ses principes, assez appréciables d'un opiat. Lorsqu'il est nécessaire de produire une transpiration abondante, on peut administrer très-efficacement & très à propos une décoction de rhé. Il provoque en général la transpiration, sans troubler ni irriter le système nerveux. On dit qu'au Japon & à la Chine la pierre est une maladie très-rare, & que ces peuples supposent que le rhé a la vertu de la prévenir en rendant l'eau plus douce & de meilleure qualité. On observe que des personnes, après un violent exercice, ou épuisées par les fatigues d'un long voyage, & affectées d'une sensation douloureuse, d'un mal-aïse général, accompagné de soif & d'une chaleur ardente, en buvant quelques tasses de rhé avoient éprouvé un soulagement subit.

Les Chinois préparent un extrait de rhé, qu'ils débirent comme une médecine diluée dans une grande quantité d'eau, & lui attribuent plusieurs effets merveilleux dans les fièvres & autres maladies où ils veulent procurer une transpiration abondante. Ils fabriquent quelquefois cet extrait en petits gâteaux qui ne sont pas si grands qu'une pièce de six sous, ou en rouleaux d'une grandeur considérable.

Kœmpfer croit que le rhé fraîchement cueilli nuirait à ceux qui le prendroient; il ajoute que la tortuosité n'ôte pas entièrement aux feuilles leur qualité narcotique, & qu'elle ne se perd qu'avec le tems. Les Japonais n'en font usage qu'au bout de dix mois, & encore le mêlent-ils avec du vieux thé.

Cet arbrisseau, devenu très-commun dans les jardins botaniques de l'Europe, a été cultivé par les Chinois & les Japonais de tems immémorial. Kœmpfer nous apprend que ces peuples ne lui ré-

servent aucun terrain particulier, & qu'il est cultivé sur les lisières des campagnes, sans aucun égard au sol. Dans le nord de la France, il n'épige que l'orange; il passeroit même en pleine terre dans les hivers doux; mais il n'y a plus aucun doute que dans l'intérieur & dans le midi, exposé au sud & dans un bon sol, il n'y réussit parfaitement. Il préfère une terre douce, sablonneuse, ni compacte ni légère: pendant l'été, il se trouve mieux dans une situation demi-ombragée, qu'en plein soleil. On le multiplie par les marcottes, par les boutures & par leurs rejetons quand ils en donnent d'enracinés. Les premières sont long-temps à faire des racines: les boutures réussissent assez facilement, et ont faites au printemps.

Dans la Chine, on met plusieurs semences dans un trou, à quatre ou cinq pouces de profondeur, & à une certaine distance les uns des autres. Ces graines contenant une grande quantité d'huile, qui bientôt devient rance, à peine en germe-t-il une cinquième partie. Dans l'espace d'environ sept ans, le thé parvient à la hauteur d'un homme; mais comme, dans cet état, il ne porte que peu de feuilles, & qu'il croît lentement, on le rabatte. Cette opération donne naissance à un si grand nombre de nouvelles feuilles & de rejetons l'été suivant, que les propriétaires sont abondamment dédommages de ce sacrifice: quelques-uns diffèrent de les rabatter jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à la dixième année. Lors de la saison propre à la cueillette des feuilles du thé, on loue des ouvriers qui, accoutumés à ce travail, qui leur fournit les moyens de subsister, sont très-habiles & très-prompts à remplir cette tâche; ils ne les arrachent pas par poignée, mais une à une, en observant de grandes précautions. Quelque minutieux que ce travail puisse paroître, ils en ramassent depuis quatre jusqu'à dix ou quinze livres par jour. La première saison où l'on cueille ces feuilles, arrive à la fin de notre hiver: on leur donne alors le nom de *ficki-tjiaa*, ou thé en poudre, parce qu'on les pulvérise & qu'on les met tremper dans l'eau chaude. Ces feuilles, jeunes & tendres, n'ont que quelques jours de pousse quand on les cueille, & eu égard à leur rareté & à leur prix, elles sont réservées pour les princes & les gens riches: cette espèce est appelée *thé impérial*. On donne aussi ce nom à une variété du thé qui croît auprès d'*Utsi*, petite ville du Japon. Dans le district de cette petite ville se voit une montagne agréable qui porte le même nom: elle passe pour avoir le terrain & le climat les plus favorables à la culture du thé; aussi est-elle ensemencée de haies & environnée d'un fossé fort large pour la plus grande sûreté. Ces arbrisseaux forment, sur cette montagne, un plan régulier, espacé par des allées. Il y a des personnes préposées pour veiller sur ce lieu, & garantir les feuilles de la poussière & de toute injure de l'air. Les ouvriers qui doivent en

cueillir les feuilles, quelques semaines avant qu'on commence cette besogne, s'abstiennent de toute espèce de nourriture grossière, & de tout ce qui pourroit porter aux feuilles quelque dommage: ils les cueillent avec l'attention la plus scrupuleuse. On prépare ensuite cette variété de thé impérial, & il est escoré par le surintendant des travaux de cette montagne, avec une forte garde & un nombreux cortège jusqu'à la cour de l'empereur, pour l'usage de la famille impériale.

La seconde cueillette se fait dans le commencement du printemps. Quelques-unes des feuilles, à cette époque, ont atteint leur perfection; d'autres ne sont pas encore arrivées à leur entière croissance, mais cependant on les cueille toutes indifféremment, & après on les trie & assortit dans différentes classes, selon leur âge, leur proportion & leur bonté; on separe avec un soin particulier les plus jeunes, & on les vend souvent pour la première cueillette ou pour le thé impérial. Le thé cueilli dans ce temps s'appelle *rou-tjiaa* ou thé chinois, parce qu'on en fait une infusion, & qu'on le prend à la manière chinoise. Il est partagé par les marchands & négocians en quatre sortes, qu'ils distinguent par autant de dénominations.

La troisième & dernière cueillette se fait vers le milieu de l'été, lorsque les feuilles sont touffues & qu'elles sont parvenues à leur dernière croissance. Cette sorte de thé, appelée *ban-tjiaa*, est la plus grossière; elle est réservée pour le peuple. Les Chinois cueillent le thé vraisemblablement comme les Japonais, en ce que ces peuples ont entr'eux une fréquente correspondance, & qu'ils ont un commerce considérable ouvert les uns avec les autres. Les Chinois, en quelques endroits, emploient un moyen singulier pour cueillir les feuilles des thés situés sur le revers des montagnes, dans des lieux escarpés, & où il est communément dangereux & souvent impossible d'approcher; ils agacent, ils irritent une espèce de grands singes qui les habitent: ces animaux cassent les branches, dit-on, pour se venger; alors on les ramasse facilement, & on en cueille les feuilles. Quelques peintures grossières de cette contrée semblent confirmer cette anecdote, d'ailleurs rapportée par des gens dignes de foi.

Au Japon, il y a des bâtimens publics, des cabarets à thé pour le préparer. Toute personne qui n'a pas les commodités convenables, ou qui manque de l'intelligence nécessaire pour cette opération, peut y porter les feuilles à mesure qu'elles sechent: ces bâtimens contiennent depuis cinq jusqu'à dix ou vingt petites fourneaux, hauts d'environ trois pieds; chacun d'eux porte une platine de fer large & plate, ronde ou carrée, attachée sur le côté qui est au dessus de la bouche du fourneau; ce qui garantit tout-à-la-fois l'ouvrier de

la chaleur du fourneau & empêche les feuilles de tomber. Des ouvriers assis autour d'une table longue & basse, couverte de nattes sur lesquelles on met les feuilles, sont occupés à les rouler. La platine de fer étant échauffée jusqu'à un certain degré par un petit feu allumé dans le fourneau qui est dessous, on met sur cette platine quelques livres de feuilles nouvellement cueillies. Ces feuilles, fraîches & pleines de sève, périssent quand elles touchent la platine, & c'est l'affaire de l'ouvrier de les remuer avec toute la vivacité possible & avec les mains nues, jusqu'à ce qu'elles deviennent si chaudes, qu'il ne puisse pas aisément en supporter la chaleur; alors il enlève les feuilles avec une sorte de pelle assez ressemblante à un éventail, & les verse sur des nattes: ceux destinés à les mêler, en prennent une petite quantité à-la-fois, les roulent dans leurs mains & dans une même direction, tandis que d'autres les éventent continuellement, afin qu'elles puissent se refroidir le plus tôt possible, & conserver leur frisure plus long-temps.

Ce procédé est répété deux ou trois fois & plus souvent, avant qu'on mette le thé dans les magasins, afin de faire disparaître toute l'humidité des feuilles, & qu'elles puissent conserver plus parfaitement leur frisure à chaque répétition. On chauffe moins la platine, & cette opération s'exécute plus lentement & avec précaution; alors le thé est trié & déposé dans le magasin pour l'usage domestique ou l'exportation. Comme les feuilles du thé *tsi-ki* ou *imperial* doivent être ordinairement réduites en poudre avant qu'on en fasse usage, elles doivent être rôties à un plus grand degré de sécheresse: quelques-unes de ces feuilles étant cueillies fort jeunes, tendres & petites, on les plonge d'abord dans l'eau chaude; on les ôte sur-le-champ, & on les fait sécher sans les rouler. Les gens de la campagne ne prennent pas tant de précaution; ils préparent leurs feuilles dans des vases de terre. Cette opération toute simple répond à toutes les autres indications, leur occasionne moins d'embarras, moins de dépenses, & leur facilite les moyens de le vendre à meilleur marché. Pour compléter la préparation de celui qu'on destine à être exporté, on le tire des vases où on l'avait renfermé, & on le sèche une seconde fois sous un feu doux, afin qu'il soit dépouillé de toute l'humidité qui pourroit s'y trouver encore, ou qu'il auroit pu contracter depuis sa première opération.

Au Japon le thé commun est conservé dans des pots de terre dont l'ouverture est étroite; mais la meilleure sorte de thé, celui dont font usage l'empereur & les grands de l'Empire, est renfermé dans des vases de porcelaine. Le *bunfai* ou le thé le plus grossier est mis, par les gens de la campagne, dans des corbeilles de paille, faites en forme de batis, qu'ils placent sous le toit de leur maison,

près de l'ouverture par où la fumée s'échappe, & s'imaginent que le thé n'en souffre aucun dommage. Dans la Chine, on met les sortes de thé les plus précieuses dans des vases coniques, semblables à des pains de sucre, faits de lutenaque, d'éraim ou de plomb, revêtus de fines nattes de bambou, ou dans des boîtes de bois carrées, & recouvertes de plomb laminé, de feuilles sèches & de papier; c'est de cette manière qu'il est exporté dans les pays étrangers.

Le thé commun est mis dans des pots, dont on le retire pour l'emballer dans des boîtes ou dans des caisses aiusitôt qu'il est vendu aux Européens. Lorsque la moisson du thé est finie, chaque famille ne manque pas d'en témoigner sa reconnaissance à l'Être bienfaisant de qui ils tiennent cette précieuse récolte.

Il est inutile, dit M. Fougereux, de s'élever contre un propos répété sans fondement en France. On y dit communément que les Chinois ne nous envoient que le thé qui, pour leur usage, a déjà souffert une infusion. Il faudroit que cet arbre fût bien rare dans ces provinces pour que ceux qui en font un commerce immense, le ménagèrent à ce point. Ce qui peut avoir donné lieu à cette fable, c'est peut-être l'opération de la vapeur de l'eau bouillante qu'on lui fait subir, & qu'on a mal-à-propos pris pour une infusion.

On connoît en général dans le commerce trois variétés de *thé vert*, & cinq de *thé bou*. 1°. *L'imperial* ou *fleur de thé*; il a des feuilles larges, déliées, d'un vert gai, d'une odeur faible, délicate. 2°. *Hy hiaun* ou *hi-kiang*, que nous connoissons par le nom de *thé hyson*, ainsi appelé d'un marchand des Indes orientales, le quel est le premier qui l'ait apporté en Europe; ses feuilles sont étroitement roulées & petites, d'une couleur verte, tirant sur le bleu. 3°. Le *thé singlo* ou *junglo*, qui reçoit son nom, comme plusieurs autres thés, du lieu où il est cultivé. Les variétés suivantes appartiennent au thé bou; savoir: 4°. *Souchou* ou *tsi-chong*, que les Chinois appellent *tsaiyang* ou *tsai-ana*; il donne une infusion couleur vert-jaunâtre. 5°. *Cambo* ou *saumlo*, ainsi appelé du lieu où il est cueilli; c'est un thé qui a un grand parfum & une odeur de violette: son infusion est pâle. 6°. *Conge* ou *bong-so*; il a une feuille assez large: il ressemble au thé bou par la couleur de sa feuille. 7°. *Pecko* ou *peko*, appelé par les Chinois *back-ho* ou *pack-ho*; on le connoît aux petites fleurs blanches qu'on y a mêlées. 8°. Le thé bou commun, appelé *moji* par les Chinois, a les feuilles d'une seule couleur. On apporte aussi de la Chine une sorte de thé d'une forme différente, & disposé en gâteaux ou en boules de diverses couleurs. (*Dukum. nouv. édit.*)

ES PÈCES.

1. THÉ vert. *Thea viridis*. Linn.

Thea

A. Thea foliis lanceolato ovatis, crenatis; floribus enneapetalis. (N.)

Thea floribus enneapetalis. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 735. — Hill, Exot. tab. 22. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 2, pag. 83, tab. 95, fig. 1. — Lam. Ill. Genet. tab. 474, fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2, pag. 1180, n° 2. — Desfont. Annal. du Mus. d'Hill. nat. Paris. vol. 4, pag. 20.

Thea cantoniensis. Lourteiro, Flor. coch. pag. 414.

Thea finensis. Blackw. tab. 351.

B. Thea foliis ovato-lanceolatis, serratis; floribus pentapetalis. (N.)

Thea floribus hexapetalis. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 734. — Hort. Cliff. 204. — Mater. medic. 136. — Amerc. Acad. vol. 7, pag. 259, tab. 4. — Hill, Exot. tab. 22. — Blackw. tab. 352. — Thunb. Flor. japon. pag. 225. — Lam. Illustr. Genet. tab. 474, fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2, pag. 1180, n° 1.

Vulgairement thé bou.

a. Thea (liva), foliis elliptico-oblongis, rugosis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2, pag. 250.

Thea. Kœmpf. Jap. pag. 605, tab. 606.

Thea frutes. Bart. Ait. 4, pag. 1, tab. 1. — Bont. Javan. pag. 89, tab. 88. — Lessm. Dissert. Lugd. Bat. 1769, tab. 1, fig. 1, 2.

Thea frutex chinensis, thea japonensis. Bartel. Icon. Rat. pag. 118, tab. 904.

Thea finensis, thea japonensis. Breyn. Cent. 111, tab. 112. Icon. 17, fig. 3. — Boccon. Mus. 114, tab. 94.

Chaa. C. Bauh. Pin. 147.

Evonymo affinis, arbor orientalis, nucifera, flore rosea. Pluken. Almag. pag. 139, tab. 88, fig. 6.

β. Thea (strida), foliis lanceolatis, planis. Aiton, Hort. Kew. vol. 2, pag. 251.

Linnæus & d'après lui, plusieurs autres botanistes ont cru devoir distinguer deux espèces de thé, le thé bou & le thé vert, parce que, suivant eux, l'un a six pétales & l'autre neuf. Linnæus ajoute encore que les feuilles du premier sont plus allongées que celles du second : tels sont les seuls caractères qui en établissent la différence ; mais, d'après les observations de Lettson, publiées à Londres en 1799, le nombre des pétales du thé vert & du thé bou est sujet à varier depuis trois jusqu'à neuf, de sorte que le principal caractère indiqué par Hill & par Linnæus n'est pas admissible, & Lettson, n'ayant pu en découvrir aucun autre, regarde avec raison le thé vert & le thé bou comme deux variétés dues à l'influence du

Botanique, Tome VII.

sol ou du climat. Thunberg, dans sa *Flora du Japon*, n'en admet non plus qu'une espèce, & il pense que le thé vert est une variété du thé bou. Kœmpfer n'en reconnoît pareillement qu'une seule, qui, comme toutes les plantes cultivées, a produit plusieurs variétés. Les observations que j'ai faites, dit M. Desfontaines, sur quelques individus que l'on cultive au Muséum, & dont deux ont fleuri abondamment, ont servi à me convaincre de l'exactitude de celles de Kœmpfer, de Thunberg & de Lettson.

Le thé est un arbrisseau rameux & toujours vert, qui croît à la hauteur de cinq à six pieds, suivant Kœmpfer & Thunberg, quoique d'autres voyageurs assurent qu'il s'élève jusqu'à trente. Ses feuilles sont alternes, dures, ovales-allongées ou elliptiques, d'un vert un peu luisant, entières près de leur base, dentées en scie dans le reste de leur longueur, & portées sur un pétiole court, demi-cylindrique ; les bourgeons sont aigus, & accompagnés d'une écaille qui se détache & tombe à l'époque de leur développement.

Les fleurs naissent ou solitaires ou plus tatement deux à deux dans les aisselles des feuilles sur des pédoncules courts & un peu épais. Leur calice est petit, persistant, à cinq divisions obtuses. La corolle est plus ordinairement composée de six pétales blancs arrondis & ouverts, les deux extérieurs plus petits, inégaux. Les étamines, au nombre de plus de deux cents, sont plus courtes que la corolle & attachées sur l'ovaire, supportant des anthères à deux loges ; l'ovaire d'une forme triangulaire, arrondie, surmonté d'un style partagé en trois stigmates filiformes ; il devient une capsule à trois loges rondes, monoépismes, réunies par la base, & s'ouvrant longitudinalement d'un seul côté. Les semences sont sphériques, anguleuses intérieurement, de la grosseur d'une aveline, revêtues d'une peau mince, luisante, un peu dure, de couleur marron. Elles renferment un noyau huileux, d'une saveur amère & désagréable, qui excite la salivation & occasionne même des nausées.

Cet arbrisseau croît en Chine & au Japon. On le cultive dans plusieurs jardins de l'Europe, où il fleurit souvent ; mais il est rare qu'il y fructifie. (V. f.)

Le thé se cultive depuis Canton jusqu'à Pékin, où l'hiver, d'après les observations des missionnaires, est plus rigoureux qu'à Paris. « Il seroit sans doute possible, dit M. Desfontaines, d'élever & de propager en France cette plante précieuse, si l'on pouvoit se procurer un assez grand nombre d'individus pour en faire des essais de culture dans différents sols & sous des climats différens. » Cet objet mérite l'attention du Gouvernement, parce que la consommation du thé est immense, & que le commerce de cette denrée s'élève tous les ans

1111

à des sommes très-considérables, donc l'Europe s'est rendue tributaire envers la Chine. Les graines de thé qui nous viennent de ce pays, se rancissent & se gâtent à la mer; de sorte que sur des milliers, il en lève à peine quelques-unes. Il faudroit que les voyageurs qui vont à la Chine, s'en procurassent de bien fraîches, & qu'ils eussent la précaution de les semer dans des caisses remplies d'une terre légère avant de les embarquer; elles leveroient pendant la traversée il suffiroit de les arroser de temps en temps, & de les préserver de l'eau de la mer; alors les jeunes plantes pourroient arriver à bon port.

« Le thé frais, dit M. Desfontaines, a une propriété enivrante, qui agace & irrite les nerfs, & que la torréfaction ne lui fait pas perdre entièrement: on prétend même qu'il n'en est totalement privé qu'à bout de dix à douze mois; alors il est sain, agréable, & donne de la gaieté. Les Japonais ne le boivent jamais frais sans y mêler une égale quantité de vieux thé. Il lève les obstructions, excite les urines, aide la digestion en donnant de l'action à l'estomac, & on ne connoît point de plantes dont on puisse boire l'infusion si fréquemment, en si grande quantité & sans dégoût. Les Chinois le regardent comme très-salubre. Ils n'y mêlent ni lait, ni sirop, ni liqueurs fortes; ils le prennent pur avec un peu de sucre candi qu'ils tiennent dans la bouche, & l'usage habituel que ces peuples en font depuis tant de siècles, prouve qu'il n'a pas de qualités nuisibles quand il est bien préparé. Ils en retirent aussi un extrait qu'ils prennent délayé dans une grande quantité d'eau, & auquel ils attribuent d'excellens effets dans plusieurs maladies. Kalm assure que le thé est très-utile pour corriger la mauvaise qualité de l'eau, qu'il ranime les forces, & qu'il lui a été d'un grand secours dans ses voyages.

« L'usage du thé en Chine remonte à la plus haute antiquité, & il est tellement répandu parmi toutes les classes de citoyens, que le lord Macartney assure que quand bien même les Européens abandonneraient le commerce, cela n'en seroit pas diminué de beaucoup la valeur dans le pays.

« Les Japonais attribuent au thé une origine miraculeuse. Ils disent que *Darma*, prince très-religieux & troisième fils d'un roi des Indes, nommé *Kousjuso*, aborda en Chine l'an 510 de l'ère chrétienne; qu'il employa tous ses soins à répandre dans ce pays la connoissance du vrai Dieu & de la vraie religion, & que, voulant exciter les hommes par son exemple, il s'imposoit des privations & des mortifications de tout genre, vivant en plein air, & consacrant les jours & les nuits à la prière & à la contemplation. Il arriva cependant qu'après plusieurs années, excédé de fatigues, il s'endormit malgré lui; mais croyant avoir

violé son serment, & pour le remplir fidèlement à l'avenir, il se coupa les paupières, & les jeta sur la terre. Le lendemain, étant retourné au même lieu, il les trouva changées en un arbrisseau que la terre n'avoit pas encore produit; il en mangea des feuilles; elles lui donnèrent de la gaieté, & lui rendirent sa première vigueur. Ayant recommandé le même aliment à des disciples & à ses fratriques, la réputation du thé se répandit, & depuis ce temps on a continué à en faire usage. Kompter, dans ses *Aménités exotiques*, a donné l'histoire & le portrait de ce fait fort renommé à la Chine & au Japon. On voit sous les pieds de *Darma* un roseau, qui indique qu'il avoit traversé les mers & les fleuves. » (Desfont.)

THÉLA. *Thela*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, régulières, qui comprend des sous-arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges font grimpantes, les feuilles alternes, entières, les fleurs disposées en épis presque terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice extérieur, à trois folioles; l'intérieur tubulé & papilleux; une corolle hipocratifforme; cinq étamines; un style; un stigmate à cinq découpures; une baie supérieure, monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double; l'extérieur à trois folioles ovales-lancéolées; l'intérieur tubulé, persistant, souvent coloré, à cinq lobes peu marqués, chargé de petits mamelons pédicellés.

2°. Une corolle monopétale, en soucoupe, dont le tube est cylindrique, une fois plus long que le calice; le limbe plane, à cinq lobes presque ronds, acuminés.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont capillaires, de la longueur du tube, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthères oblongues, point vacillantes.

4°. Un ovaire ovale-oblong, surmonté d'un style filiforme, plus long que les étamines, terminé par un stigmate à cinq découpures oblongues, réfléchies.

Le fruit est une petite baie oblongue, à cinq côtes, à une seule loge, à une seule semence.

Observations. Le calice intérieur, papilleux ou parsemé de petits mamelons pédicellés, indique l'étymologie du nom de ce genre, qui vient du mot grec *telé* (*papilla*), papille ou mamelon. Le calice extérieur, composé de trois folioles, ne pourroit-il pas être considéré comme une sorte d'involucre ou comme des bractées?

1. THÉLA à fleurs écarlates. *Thela coccinea*. Loureiro.

Thela caule scandente, foliis amplexicaulis, calicibus corolla concoloribus. Lour. Flor. cochinch. pag. 147. n^o. 1.

Ses tiges sont presque ligneuses, très-longues, grimpantes, striées, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, à demi-amplexicaules, ovales linéolées, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet. Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des tiges, en longs épis très-simples. La corolle est d'un rouge-écarlate, en forme de soucoupe; le calice intérieur de la même couleur que la corolle.

Cette plante croît à la Chine & à la Cochinchine, parmi les hies de roseaux autour desquels elle s'entortille. *h*? (*Descript. ex Lour.*)

2. THELA à fleurs blanches. *Thela alba*. Lour.

Thela caule scandente, foliis petiolatis, calicibus discoloribus. Lour. Flor. cochinch. pag. 147. n^o. 2.

Ses tiges sont grêles, grimpantes, presque ligneuses, glabres, allongées, presque simples, garnies de feuilles médiocrement pétiolées, alternes, ovales-lancéolées, d'un vert-obscure, glabres à leurs deux faces, très-entières, ondulées à leurs bords. Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des tiges, en épis courts & simples. Le calice intérieur est long, tubulé, muni de papilles, point coloré; la corolle blanche, hippocratéiforme.

Cette plante croît parmi les roseaux dans les Indes orientales, à la Chine & à la Cochinchine. *h*? (*Descript. ex Lour.*)

THÉLÉBOLE. *Thelobolus*. Genre de plantes acotylédones, de la famille des champignons, qui se rapprochent des moisissures, & qui renferment de très-petites plantes, à peine sensibles, la plupart microscopiques, aussi difficiles à reconnoître qu'à déterminer.

Les théléboles sont composés de petites champignons sessiles, solides, un peu gélatineux. Leur réceptacle est cortical, arrondi, globuleux, entier sur les bords; il renferme dans sa jeunesse une vésicule qu'il rejette ensuite en dehors. Cette vésicule, d'après l'observation d'Hedwig, contient un grand nombre de capsules libres, allongées, pointues, remplies de semences nombreuses.

M. Decandolle cite une espèce qui lui a été communiquée par M. Chailler, qu'il nomme *thélébole hérissé* (*thelobolus hirsutus*, Flor. franç. vol. 2, pag. 272). Cette plante croît sur l'écorce des vieux arbres; elle forme une expansion mince,

membraneuse, de couleur grise, analogue à celle de trichies. Sur cette base naissent plusieurs petits champignons blanchâtres, globuleux, de moitié plus petits que des têtes de camions, hérissés d'un duvet court & comme pulvéulent, ouverts au sommet en un orifice arrondi par lequel s'échappe la matière interne qui renferme les graines.

Cette plante se rapproche beaucoup du thélébole ridé (*thelobolus rugosus*, Hedw. Fung. ined. tab. 20), mais elle en diffère par la membrane commune, qui se trouve à la base du réceptacle. Ce dernier caractère la rapproche du *thelobolus stercorarius* de Tode (Fung. Mexkl. vol. 1, pag. 41, tab. 7, fig. 56), mais elle en diffère par la couleur, la station & le duvet qui couvre ses réceptacles. (*Decand. l. c.*)

THÉLÉPHORE ou AURICULAIRE. *Thelophora*, Will. Perf. *Auricularia*, Lam. Genre de plantes acotylédones, cryptogames, de la famille des champignons, qui a des rapports avec les bolets, & qui comprend un assez grand nombre d'espèces parasites, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un chapeau sessile, coriace, de forme variable, attaché sur le tronc des arbres par le côté ou par le dos; la surface inférieure ordinairement garnie de papilles ou lifs; point de pores tubulés.

Observations. Ce genre a de grands rapports avec les *hydium* : ces derniers sont d'une substance plus épaisse, chatneuse, f-béreuse, garnis en dessous de pointes ou de papilles nombreuses. Il diffère également des *boletus*, ceux-ci étant munis en dessous de pores tubulés. Les théléphores naissent sur les arbres, appliqués contre les troncs par leur surface stérile; ils s'en détachent en se développant davantage, & se renversent de manière à se trouver dans une position horizontale; de sorte que la surface qui porte les semences, se trouve être l'inférieure.

Les théléphores ont été divisés, par quelques auteurs modernes, en plusieurs autres genres, considérés relativement à leur mode d'insertion. Il renferme les *craterella*, les *stercum* & les *coricium* de M. Persoon, les *auricularia* de Bulliard. C'est aussi sous ce dernier nom qu'il a été gravé par M. Lamarck, dans les *Illustrations des Genres*. Nous eussions préféré cette dénomination beaucoup plus agréable, sans l'ordre alphabétique, qui aurait renvoyé ce genre dans les Suppléments. Nous lui avons conservé celui de *thelophora*, qui lui a été donné par MM. Persoon & Willdenow. Les espèces qui composent ce genre offrent un très-grand nombre de variétés, la plupart dépendantes de l'âge & de leur développement plus ou moins avancé; ce qui a probablement occasionné l'établissement de beaucoup d'espèces incertaines. Nous nous bornerons à ne présenter que celles qui ont

été observées avec le plus de soin, & nous nous servons pour soudivisions des genres tentatives dans celui-ci.

* *Craterella*. Chapeau en forme d'entonnoir, entier, attaché par le centre.

1. THÉLÉPHORE cariophyllée. *Thelephora cariophylla*.

Thelephora subspicata, imbricata, floecosa, fusciata, fusca; margine lacinioso, albidus.

Thelephora (cariophylla), varia, pileo infundibuliformi, tenui, fusco-purpureo, margine ut plurimum inequo, subcripo. Pers. Synops. Meth. Fung. pag. 565.

Craterella amigua. Pers. Observ. Mycol. vol. 1. pag. 36. tab. 6. fig. 3. & 10. — Comment. pag. 128.

Helvella cariophylla, subfissilis, coriacea, castipitosa; pileo infundibuliformi, fusco, radiatim floecoso-friato, margine inequo. Dickf. Plant. crypt. Brit. 1. pag. 20.

Auricularia cariophylla. Bulliard, Champ. p. 284. tab. 483. fig. 6. 7. & tab. 278. — Lam. Illustr. Gen. tab. 886. fig. 1.

Thelephora (mesenteriformis). Willd. Prodrum. Flor. botol. tab. 7. fig. 15.

Thelephora cariophylla. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 103.

Helvella cariophylla. Schöff. Fung. 4. tab. 325. — Batich. El. Fung. tab. 24. fig. 41.

a. *Auricularia lateritia.* Bull. Champ. Var. 1. tab. 483. fig. 6.

β. *Auricularia cinerea.* Bull. Champ. Var. 2. tab. 483. fig. 7.

γ. *Auricularia fusca.* Bull. Champ. Var. 3. tab. 178.

Ce champignon est d'une substance un peu molle, épaisse, charnue, quelquefois simple, plus souvent disposé par imbrication, se recouvrant les uns les autres comme les tuiles d'un toit, adhérens au tronc des arbres tantôt par leur côté, qui se rétrécit quelquefois en un pédicule court, plus souvent attaché par son centre. Leur face supérieure est zonée & comme floconneuse; l'inférieure lisse, ondulée, couverte de petits globules rapprochés quatre par quatre, & visibles seulement au microscope. Les bords sont quelquefois entiers, plus ordinairement déchirés.

Cette plante offre plusieurs variétés dans ses couleurs, citées par Bulliard. La première est d'un rouge de brique, & se convertit en vieillissant en une couleur brune; la seconde, d'abord d'une

couleur cendrée, un peu roussâtre, devient d'un brun-rougeâtre; enfin la troisième, d'une couleur de brique claire, passe à un brun de rouille.

On rencontre cette espèce sur les troncs d'arbres à leur base, sur les souches pourries, & même sur la terre. ○ (V. v.)

2. THÉLÉPHORE pâle. *Thelephora pallida.* Pers.

Thelephora castipitosa, suberosa, pallida, pileo excavato, strigoso, squamoso. Pers. Synops. Meth. Fung. pag. 565.

Craterella pallida. Pers. Icon. & Descript. Fung. pag. 3. tab. 1. fig. 3.

Il est rare; il croît par groupes, sur la terre, dans les lieux humides, dans les grandes forêts. Son pédicule est très-court, un peu velu à sa base, subéteux, d'un blanc-pâle; son chapeau est concave, strié, un peu écaillé, hérissé en dessous de petits poils très-courts, qu'on n'aperçoit qu'avec le secours de la loupe.

* * *Stereum*. Demi-chapeau attaché par le côté.

3. THÉLÉPHORE tremelle. *Thelephora tremelloides.*

Thelephora acaulis gelatinoso-coriacea, imbricata, tortuosa, supra villosa, fasciata, subius glabra, violacea.

Thelephora tremelloides. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 104.

Thelephora mesenterica. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1440.

Auricularia tremelloides. Bull. Champ. pag. 278. tab. 290. — Mich. Gener. tab. 66. fig. 4.

a. *Auricularia violacea.* Bull. Champ. Var. 1. tab. 290.

Thelephora mesenterica. Pers. Synops. pag. 571. ?

β. *Auricularia fusca.* Bull. Champ. Var. 2.

γ. *Auricularia fusca.* Bull. Champ. Var. 3.

Thelephora (purpurea), imbricata; subtremelloides, zonata, tomentosa, albidus, subius purpureus. Pers. Synops. pag. 571. & Dispos. Fung. pag. 30.

Cette plante se rapproche beaucoup des *méduses* & de quelques *rézines*; elle en diffère par le renversement qu'elle éprouve dans son développement; elle est d'une substance transparente, cartilagineuse, assez semblable à celle des *tremelles*; elle se présente d'abord comme une croûte crevasse, étendue sur le bois mort, dont elle se détache insensiblement par le haut & se renverse; alors elle devient ciliée & zonée à sa face supérieure, glabra, lacuneuse & plissée irrégulièrement à sa face inférieure; elle prend la forme d'une

trompette, tantôt entière par la soudure de ses bords, plus souvent coupée longitudinalement par le milieu.

Elle offre plusieurs variétés dans ses couleurs ; elle est, dans la première, de couleur de brique en dessus, violette ou de couleur vineuse en dessous ; dans la seconde, blanche, un peu cendrée en dessus, d'un bleu-terne en dessous ; dans la troisième, sa face supérieure est d'un blanc sale, grisâtre, d'un gros rouge-brun très-foncé en dessous.

Cette plante croît sur les bois morts. (P. v.)

4. THÉLÉPHORE TANNÉE. *Thelophora ferruginea*.

Thelophora acaulis, imbricata, rubiginosa, utrinque fasciata, glabra. (N.)

Thelophora ferruginea. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 104.

On distingue cette espèce du *thelophora reflexa*, en ce qu'elle est glabre à ses deux faces. M. Persoon, ainsi que l'observe M. Decandolle, l'a confondue avec l'*helvella rubiginosa*, Dickson, Crypt. pag. 20, qui doit être rapportée au *thelophora reflexa*, & il a appliqué le nom de *thelophora ferruginea* à deux autres espèces, dont l'une est l'*auricularia tabacina*. Sow. & l'autre, le *corticium ferrugineum*. Pers. Observ. Mycol. 2. pag. 18.

Cette plante est mince, d'une substance coriace, glabre à ses deux faces, assez souvent imbriquée, d'une couleur brune, un peu ferrugineuse, quelquefois presque noirâtre, zonée à sa face supérieure ; les zones moins marquées en dessous. Sa face inférieure paraît poreuse lorsqu'on l'examine à l'œil nu ; mais, vue à une forte loupe, on reconnoît que ces prétendus pores sont de véritables papilles fort petites, agglutinées les unes aux autres.

Cette espèce croît en assez grande abondance sur les vieilles fouches à demi pourries. (P. v.)

5. THÉLÉPHORE RÉFLÉCHI. *Thelophora reflexa*.

Thelophora acaulis, imbricata, coriacea, supra villosa, fasciata, variegata, subius glabra, pallida.

Thelophora reflexa. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 105.

Auricularia reflexa. Bull. Champ. pag. 282. tab. 174. & tab. 483. fig. 1. 6. — With. Britan. 3. pag. 434. — Sow. & l'autre, le *corticium ferrugineum*. Pers. Observ. Mycol. 2. pag. 18.

Thelophora hirsuta. Pers. Synopf. pag. 570. — Gmel. Syst. Nat. pag. 1410.

Helvella pincti. Linn. Syst. Nat. Edit. XII. vol. 2. pag. 725.

Boletus auriformis. Bolton, Fung. tab. 82.

Stereum hirsutum. Pers. Observ. Mycol. vol. 2. pag. 90. — Mich. Gener. tab. 66. fig. 2. 6. 7.

a. *Auricularia lutea*. Bull. Champ. Var. 1. tab. 274.

β. *Auricularia fuliginosa*. Bull. Champ. Var. 2. tab. 483. fig. 3.

γ. *Auricularia fusca*. Bull. Var. 3. tab. 483. fig. 2.

Helvella rubiginosa. Dickf. Crypt. 1. pag. 20.

δ. *Auricularia cinerea*. Bull. Champ. Var. 4. tab. 483. fig. 4.

ε. *Auricularia variegata*. Bull. Champ. Var. 5. tab. 483. fig. 5.

ζ. *Auricularia amethystea*. Bull. Champ. Var. 6. tab. 483. fig. 1.

C'est une des espèces qui offre le plus grand nombre de variétés, tant dans ses dimensions que dans ses couleurs. Elle est d'une substance mince & coriace ; sa face supérieure est constamment velue & zonée ; sa face inférieure parfaitement glabre & lisse, sans zones, quelquefois légèrement zonée.

Sa couleur, dans la première variété, est d'abord jaune, & devient fauve en dessous, d'un blanc-cendré à sa face supérieure ; la seconde est cendrée en dessus, d'un bistre-fauve en dessous ; la troisième couleur de brique en dessus, & d'un brun-ferrugineux à sa face inférieure, tandis que, dans la quatrième, la couleur est cendrée tant en dessus qu'en dessous, un peu noirâtre à la base ; la cinquième est zonée ou bigarrée de jaune & de brun à sa face supérieure, l'inférieure, d'abord jaune, devient brune avec l'âge ; enfin, la sixième variété est cendrée ou un peu couleur de brique en dessus, violette & ensuite vin-rose en dessous.

Cette plante se rencontre ordinairement sur les vieux bois & sur les arbres morts. (P. v.)

*** Corticium. Chapeau adhérent par sa surface inférieure.

6. THÉLÉPHORE DES MOUSSES. *Thelophora muscigena*.

Thelophora aggregata, membranacea, albidula, supra subrugosa. (N.)

Thelophora (muscigena), minuta, gregaria, carnoso-membranacea, candida. Decand. Flor. fr. vol. 2. pag. 105. — Pers. Synopf. pag. 572.

Cette espèce est fort petite ; elle n'a guère que deux à trois lignes de diamètre ; elle croît ordinairement par groupes, & adhère, par la surface inférieure ou par son bord, aux corps sur lesquels elle

se trouve. Sa substance est fort mince, membraneuse, un peu ridée à sa face extérieure, de couleur blanche, arrondie & ordinairement entière à ses bords.

On rencontre cette espèce sur les tiges des grandes espèces de mouffe.

7. THÉLÉPHORE papyracée. *Thelephora papyrina*.

Thelephora membranacea, tenuissima, supra glabra, carnea, subtus tomentosa, nivea.

Thelephora papyrina. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 106.

Thelephora papyracea. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441. — Schrad. Fung. med. var. 3.

Auricularia papyrina. Bull. Champ. pag. 279. tab. 402.

Thelephora (levis), abido-carnea, laet effusa, levissima; margine byssino. Pers. Synops. 375.?

Corticium leve. Pers. Disp. Meth. Fung. p. 30.?
Thelephora (glabra), levis, exalbida. Willd. Prodr. Flor. berol. n°. 1104.?

a. *Auricularia alba*. Bull. Var. 1. tab. 402.

β. *Auricularia rubra*. Bull. Champ. Var. 2.

γ. *Auricularia cinerea*. Bull. Champ. Var. 3.

Ce champignon varie beaucoup dans ses formes & ses dimensions : sa substance est mince, un peu molle, à peine membraneuse ; sa face supérieure est zonée & ordinairement velue ; l'inférieure, d'abord lisse & glabre, devient ensuite zonée, creusée de pores de diverses grandeurs, qui donnent à cette plante l'aspect d'un bulet. Elle forme d'abord une croûte mince & se renverse ensuite.

Dans la première variété la face supérieure est blanche, l'inférieure fauve ou d'un jaune-rougeâtre ; la seconde est d'un rouge-clair en dessus, rouilleâtre en dessous ; la troisième, d'une substance plus épaisse, est cendrée en dessus, d'un gris-bistre à sa face inférieure.

Cette espèce croît sur le tronc des vieux arbres. La troisième variété pourroit peut-être former une espèce particulière. ○

8. THÉLÉPHORE corticale. *Thelephora corticalis*.

Thelephora membranacea, supra glabra, carnea, subtus tenuissimè tomentosa, nigra.

Thelephora corticalis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 106.

Thelephora carnea. Cmel Syst. vol. 2. pag. 1441.

Thelephora (quercina), res-pinata, longitudinalis,

coriacea, rugosa, subcarnea; margine subinvoluta, subtilissime umbrino. Pers. Synops. pag. 373.

Auricularia corticalis. Bull. Champ. pag. 285. t. b. 436. fig. 1.

Sa substance est mince, membraneuse, un peu coriace, glabre à sa face supérieure, d'un blanc-rouilleâtre à sa face inférieure, qui devient ensuite d'un rouge-tendre, & passe insensiblement à une teinte plus rembrunie, souvent noirâtre sur les bords, quelquefois légèrement tomenteuse, attachée par sa face supérieure.

Cette espèce croît à la partie inférieure des branches d'arbres, mortes & étendues sur la terre. 4

9. THÉLÉPHORE phylactère. *Thelephora phyllactis*.

Thelephora membranacea, plicata, supra glabra, fuliginoso-fusca, subtus tomentosa.

Thelephora phyllactis. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 106.

Auricularia phyllactis. Bull. Champ. pag. 286. tab. 436. fig. 2.

Cette espèce est une des plus remarquables de ce genre par sa grandeur : elle croît sur la terre, & y adhère par sa base ; mais si dans son voisinage il se trouve une pierre ou un tronc, elle s'élève en s'y appliquant. Elle est d'une substance membraneuse, plissée à sa base, glabre à sa surface supérieure, tomenteuse en dessous ; elle est d'un blanc-jaunâtre dans la jeunesse, ensuite elle brunit & finit par devenir noirâtre. Sa surface est parsemée de globules réunis quatre par quatre, que l'on regarde comme les semences, & qui ne sont visibles qu'avec le microscope.

Cette plante se rencontre sur la terre, sur les pierres & aux pieds des fougères. 5

10. THÉLÉPHORE bleu. *Thelephora caerulea*.

Thelephora rugosa, coriacea, intensè caerulea, deinat fusca. (N.)

Thelephora caerulea. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 107. — Schrad. ex Schlecht. Crypt. ex S.

Byssus (caerulea), pulverulenta, crustacea, intensè caerulea. Lam. Dict. vol. 1. pag. 524, & Flor. franç. vol. 1. pag. 103.

Cette plante, présentée d'abord pour une espèce de *byssus* dans cet ouvrage, dont elle a en effet l'apparence, a été reconnue depuis pour un *thelephora*. Elle se présente d'abord sous la forme d'une plaque tomenteuse, presque pulvérulente, d'un beau bleu d'outre-mer, étalée irrégulièrement sur le bois ou l'écorce des arbres à demi pourris. « En l'examinant de près, dit M. Decandolle, on remarque que cette plaque est un

véritable *thelephora*, dont la surface stérile, lorsqu'elle est implantée en un seul point, est cependant tellement appliquée contre l'arbre, qu'on ne peut la distinguer. La surface fructifère est ridée, étalée, couverte d'un duvet bleu, excessivement court, visible principalement sur les bords. A la fin de la vie de la plante, cette surface devient brune comme l'autre..

Cette plante croît sur des arbres morts, sur des bois à demi pourris, sur des planches. (V. v.)

11. THÉLÉPHORE de Persoon. *Thelephora Persoonii*.

Thelephora membranacea, *rubiginosa*, *glabra*; *subius levissime pulverulenta*, *sapipapillata*. (N.)

Thelephora Persoonii. Decand. Flor. franç. vol. 2. pag. 107.

Thelephora (*ferruginea*), *suborbicularis*, *tomentosa*, *late effusa*, *ferruginea*. Persoon, Synops. pag. 378.

Corticium ferrugineum. Persoon, Observ. Mycol. vol. 2. pag. 18.

Sa forme est arrondie ou oblongue, sa substance mince, membraneuse, presque entière, appliquée sur les vieux bois par sa surface stérile; elle est couleur de rouille, brune, approchant de celle du tabac; la surface exposée à l'air est munie de quelques papilles peu sensibles; son aspect est pulverulent.

Cette espèce se rencontre sur les fissures des vieux bois & des troncs pourris.

* Espèces douteuses ou moins connues.

* *Thelephora* (*lilacea*), *acaulis*, *ochraceo-pollida*, *suprà tomentosa*, *spadiceo-fusciata*; *marginis eximo suprà subiusque rosco-lilacino*. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1440.

Helvella lilacina. Batrch. El. Fung. Centur. 1. p. 187. fig. 131.

* *Thelephora* (*sericea*), *acaulis*, *imbricata*, *coriacea*, *suprà sericea*, *fasciata*, *pallens*, *subius glabra*, *flavescens*. Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*striata*), *acaulis*, *subimbricata*, *coriacea*, *suprà striata*, *tomentosa*, *fusco-ferruginea*, *subius piloso-exalbida*. Schrader, Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*variegata*), *acaulis*, *imbricata*, *membranacea*, *suprà sericea*, *fasciata*, *variegata*, *subius pilosa*, *ochracea*. Schrader, Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*fusca*), *acaulis*, *subimbricata*, *membranacea*, *suprà tomentosa*, *fusciata*, *fusca*, *sub-*

ius nivea. Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*undulata*), *coriaceo-lignosa*, *suprà glabra*, *carnea*, *subius undulata*, *fusco-purpurea*. Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*applanata*), *appressa*, *coriaceo-lignosa*, *suprà glabra*, *flava*, *subius tomentosa*. Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*ferruginosa*), *membranacea*, *suprà albidula*, *subius tamentosa*, *ferruginea*. Schrad. Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*alutacea*), *membranacea*, *tenuissima*, *suprà exalbida*, *subius tomentosa*, *albidula*. Schrader, Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

* *Thelephora* (*crocea*), *tenuis*, *fragilis*, *totac crocea* (*expansa*). Schrader, Fung. ined. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1441.

THÉLIGONE. *Theligonum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des orties, ou plutôt des chénopodées, selon M. Venter, qui a des rapports avec les *betula* & les *chenopodium*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à feuilles alternes, charnues; à fleurs sessiles, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles : Un calice bispide; onze étamines & plus; point de corolle. Dans les fleurs femelles : Un calice bispide, plus petit, persistant; un style; une capsule uniloculaire, monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques; les fleurs mâles supérieures, les femelles inférieures.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice turbiné, d'une seule pièce, à deux découpures roulées en dehors.

2°. Point de corolle.

3°. Douze à vingt étamines, dont les filaments sont droits, de la longueur du calice, terminés par des anthères simples.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice plus petit que celui des fleurs mâles, persistant, monophylle, à deux découpures droites.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire supérieur, presque globuleux, surmonté d'un style long, filiforme, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une capsule coriace, globuleuse, univalve, à une seule semence.

Les semences globuleuses, solitaires, munies à leur base d'un tubercule; un perispermé globuleux, charnu, à deux lobes; l'embryon courbé, filiforme; la radicule inférieure.

Observations. « Ce genre, dit M. Decandolle dans la *Flore française*, a été placé par M. de Jussieu dans les urticées, dont il se rapproche en effet par le nombre indéfini des étamines & par la séparation des sexes; mais, d'après les observations de MM. Ventenat & Gærtner, il semble plus voisin des chénopodiacées, à cause de l'existence du périsperme, de la structure de l'embryon & de l'unité du style: son port même paroit ressembler moins aux parisiennes, dont les anciens botanistes l'avoient rapproché, qu'aux bettes & aux autres chénopodiacées, qui ont, comme le thélégone, des feuilles glabres, entières & charnues. »

ES PÈ C E.

THÉLÉGONE charnu. *Theligonum cynoerambæ*. Linn.

Theligonum foliis simplicibus, inferioribus oppositis; superioribus alternis, floribus axillaribus, caule diffusæ. (N.)

Theligonum cynoerambæ. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1411. — Sauvag. Monsp. 129. — Gouan, Monsp. 489. — Mill. Dict. — Fabric. Helmit. 367. — Kniph. Cent. 4. n°. 89. — Destont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 346. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 399. — Lam. Illustr. Gener. tab. 77.

Theligonum alsinoidum. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 198. n°. 173.

Cynoerambæ prostrata. Gærtner. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 362. tab. 75. fig. 9.

Cynoerambæ. Tourn. Inst. R. Herb. tab. 485.

Parietaria affinis, cynoerambæ dista, floribus mucosæ. Pluk. Almag. pag. 280.

Cynoerambæ Dioscoridi. C. Bauh. Pin. 122, & Prodr. 59. tab. 59. — Magn. Caract. 150.

Cynoerambæ alsinifolia. Bartel. Icon. 335.

Alysses facie planta nova. Col. Phyt. 121. tab. 36.

Alysses scitida, fabio columna discoridica. J. Bauh. Hist. 3. pag. 365. Ic. — Rai, Hist. 206.

Plante herbacée, dont les tiges sont étalées, cylindriques, succulentes, glabres, un peu tortueuses, longues d'environ un pied, divisées en rameaux grêles, alternes, diffus. Les feuilles sont ovales, pétiolées, très-entières, glabres à leurs deux faces, un peu obtuses à leur sommet, charnues, un peu rugées à leurs bords; les inférieures

opposées; les supérieures alternes, marquées de nervures fines, latérales, simples, opposées, parallèles; les pétioles longs, dilatés à leur base en une sorte de stipule presque vaginale, dentée.

Les fleurs sont petites, verdâtres, disposées dans l'aisselle des stipules le long des rameaux, presque opposées aux feuilles; les fleurs mâles situées à l'extrémité, ordinairement deux à deux, pédicellées; les fleurs femelles sessiles, axillaires, placées à la partie inférieure des rameaux. Le fruit est une capsule globuleuse, coriace, petite, très-glabre, à une seule loge, dans laquelle est renfermée une seule semence.

Cette plante croit dans les départemens méridionaux de la France, en Sicile, en Italie, sur les côtes de Barbarie, &c. O. (V. f.)

THÉLIMITRA. Genre de plantes établi par Forster, & sur lequel cet auteur ne nous a donné que quelques-uns des caractères de la fructification sans autres détails. Il appartient à la famille des orchidées, & paroît se rapprocher des *limodorum* de Linné. Le calice est divisé en six découpures ovales, concaves; la découpure inférieure semblable aux autres. Le style, qui est un nectaire, d'après Forster, est aplati, tronqué, & se prolonge en un bourrelet sur les bords du stigmate; des deux loges de l'anthere sort une masse de pollen en pinceau à son sommet.

THÉMÉDA polygame. *Themeda polygama*. Forsk. Flor. ægypt-arab. pag. 178. n°. 92. — Juss. Gener. Plant. 447. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 149.

Cette plante, de la famille des graminées, & qui a des rapports avec les *andropogon*, forme un genre établi par Forskall, dont les fleurs sont polygames, & qui a pour caractère essentiel :

Des fleurs mâles pédicellées, musiques; le calice à deux valves; trois étamines; une fleur hermaphrodite, sessile, intérieure; le calice univalve; la corolle bivalve; une arête très-longue, partant du réceptacle.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, presque capités, contenant des épillets où se trouvent des fleurs mâles & hermaphrodites; les mâles au nombre de deux, pédicellées, munies de trois étamines; point de style, point d'arête; une fleur hermaphrodite, sessile, à trois étamines, & un ovaire fertile. Du fond des valves s'élève une arête fine, très-longue; dans les unes & les autres le calice n'a qu'une valve, & la corolle est composée d'une balle à deux valves; les chaumes ramifiés à leur partie supérieure, enveloppés de gaines larges, comprimées, ensuantes. La dernière renferme, avant leur épanouissement, les rameaux & les épis, auxquels elle tient lieu de spathe.

Cetto

Cette plante croît dans l'Arabie. (*Descript. ex Forsk.*)

THÉSION. *Thesium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des chalcifères, qui a des rapports avec les *osyris*, & qui comprend des herbes ou arbrustes, les uns exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont diversement disposées, les feuilles petites & entières.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice monophyllé, à quatre ou cinq divisions ; point de corolle ; cinq étamines ; un style ; une capsule monosperme, recouverte par le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, divisé, jusque vers son milieu, en cinq découpures droites, ovales, un peu ouvertes, colorées en dedans.

2°. Point de corolle.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont courts, subulés, opposés aux divisions du calice, insérés à sa base, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire enveloppé par la base entière du calice, arrondi, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus, un peu épais.

Le fruit est une capsule globuleuse, crustacée, à une seule loge, sans valve, enveloppée par le calice persistant, contenant une seule semence arrondie.

* *Observations.* Les *thesium* peuvent être considérés comme formant un genre naturel, rapprochés des *osyris*, dont ils diffèrent par leurs fruits capsulaires & non en baie, par leurs fleurs hermaphrodites & non dioïques, par le nombre des étamines & des stigmates ; ils se rapprochent encore des *quinchamalium*, mais ceux-ci s'en distinguent par un double calice. La plupart des espèces se rapprochent toutes par leur port : ce sont des plantes quelquefois herbacées, plus ordinairement ligneuses, en forme de petits arbrustes peu élevés, tamenteux, à tige grêle, chargés de feuilles alternes, fort petites, sessiles, entières ; les fleurs peu apparentes, sans corolle, disposées en panicule, en grappes, en épis ordinairement feuillés, & chaque fleur axillaire, munie de deux bractées opposées. Les semences sont solitaires, renfermées dans la partie inférieure du calice, qui devient une enveloppe capsulaire, à une seule loge.

Le *thesium colpoen* de Linné fils, Suppl. pag. 161, adopté par Willdenow, a été conservé par M. Lamarck parmi les fusains, genre dans lequel Linné botanique. Tome VII.

l'avoit placé. (*Voyez l'article FUSAIN* *enonymus*), dans lequel M. Lamarck développe les raisons qui ne lui ont pas permis d'adopter la réforme de Linné fils.)

ESPÈCES.

1. THÉSION à feuilles de lin. *Thesium linophyllum*. Linn.

Thesium caulibus superne paniculatis, foliis linearibus, floribus pedunculatis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 122. n°. 2772. tab. 142. fig. 1.

Thesium paniculatum foliaceum, foliis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 301. — Hort. 41. — Dalib. Paris. 75. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 38. — Pollich, Pal. n°. 239. — Moench. Hall. n°. 204. — Scop. Carn. 172. — Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 205. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1211. n°. 1. — Decand. Flot. franç. vol. 3. pag. 352.

Thesium caule erecto, subramoso ; panicula foliacea, floribus pedicellatis, bracteis ternis, foliis linearibus. Pers. Synops. vol. 1. pag. 211. — Hayn. in Schrad. Botan. Journ. 1800. pag. 32.

a. *Thesium* (pratense), caule erecto ; foliis linearibus, obsolete trinerviis ; panicula foliacea. Schrad. Spic. Flor. germ. 1. pag. 26. — Hoffm. Germ. 82.

Thesium floribus sparsis. Sauvag. Monsp. 48.

Linaria montana, flosculis albicanibus. C. Bauh. Pin. 213.

Alechemilla linaria folio, calice floribus albo. Tournef. Inst. R. Herb. 509. — Schaw. Afric. Specim. n°. 13.

Anonymus linifolio. Clus. Hist. 1. pag. 342. Icon.

Linaria adulterina. Tabern. Icon. 826.

Sesamoides procumbens, montana, linaria folio, floribus albicanibus. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 601. §. 15. tab. 1. fig. 3.

Linaria similis. J. Bauh. Hist. 3. pag. 461. Icon.

Thesium caule erecto, paniculato ; foliis lanceolatis. Haller, Helv. n°. 1573.

β. *Thesium* (intermedium), caule striato ; foliis linearibus lanceolatis, trinerviis ; panicula foliacea. Schrad. Spicil. Flor. germ. 1. pag. 27. — Decand. Flot. franç. vol. 3. pag. 352.

γ. *Thesium* (montanum), caule flaccido ; foliis lanceolatis, trinerviis ; panicula foliacea. Schrad. Spicil. Flor. germ. 1. pag. 27. — Ehrh. Herb. n°. 2. — Decand. Flot. franç. vol. 3. pag. 352. — Hoffm. Germ. 82.

Thesium (bavarum), ramis virgatis ; foliis lanceolatis, trinerviis. Schrank. Bavar. n°. 420. — Decand. Flot. franç. vol. 3. pag. 352.

Kkkk

Ses racines sont blanchâtres, dures, presque ligneuses; elles produisent des riges droites, hautes d'environ un pied, glabres, menues, anguleuses, feuillées, divisées à leur sommet en rameaux courts, paniculés, variables dans leur port; à riges roides, droites, fort grêles dans la variété β ; foliées, tombantes dans la variété γ . Les feuilles sont alternes, épaisses, sessiles, très-étroites, glabres, entières, marquées souvent de trois lignes, vertes à leurs deux faces, linéaires, aiguës, longues au moins d'un pouce & demi; quelquefois un peu plus élargies, lancéolées-linéaires.

Les fleurs sont petites, médiocrement pédonculées, nombreuses, disposées en panicules feuillées; chaque fleur munie à la base du pédoncule de deux bractées sessiles, opposées, aiguës, souvent inégales. Les calices se divisent ordinairement en cinq découpures courtes, qui persistent & couronnent une capsule petite, un peu striée, ridée, ovale, à une seule semence arrondie.

Cette plante croît en Europe, en France, sur les collines, & dans les prés secs & montagneux. (V. v.)

2. THÉSION des Alpes. *Thesium alpinum*. Linn.

Thesium caulis caespitosus, simplicibus; foliis linearibus; floribus axillaribus, sessilibus, quadrifidis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 122. n°. 1773. tab. 142. fig. 1.

Thesium racemo foliato, foliis linearibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 351. — Jacq. Vind. 400. — Pollich. Palat. 240. — Scopol. ann. 2. pag. 44. & Carn. n°. 173. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 110. — vol. II. pag. 282. — Czern. de Fruct. & S. m. vol. 2. pag. 40. tab. 86. fig. 6. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 352. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 206. — Jacq. Flor. austr. 5. tab. 416.

Thesium floribus subsessilibus, pedunculis foliosis, foliis linearibus. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 422. tab. 17. fig. 1.

Thesium caulis prostratis, simplicibus; racemo foliato, secundo; floribus sessilibus, bracteis obvallatis. Hayne, in Schrad. Botan. Journ. 1800. pag. 32. tab. 6.

Thesium caule procumbente, foliis linearibus, racemo foliato, floribus tetrandris. Schrad. Spic. Flor. germ. vol. 1. pag. 25.

Thesium caule diffuso, floribus alaribus, foliis linearibus. Haller, Helv. n°. 1574.

Linophyllum collinum, lignosum, minus; flore albicans. Pont. Ant. 261. — Seguier, Plant. Ver. vol. 3. pag. 90.

Alchimilla alpina, linaria foliis, calice florum albo in foliorum alis. Litt. Pis. 6.

Alchimilla linaria folio, floribus & vasculis in foliorum alis sessilibus. Schaw. Afric. Spec. n°. 14.

β . *Thesium (ramosum), caule erecto, ramo; racemis foliatis, elongatis; floribus sessilibus, bracteis obvallatis*. Hayne, Journ. Schrad. 1801. pag. 31. tab. 7. fig. 1.

Cette espèce, très-voisine de la précédente, avec laquelle on pourroit aisément la confondre, s'en distingue par les fleurs à quatre divisions, presque solitaires & alternes dans les aisselles des feuilles supérieures. Ses racines produisent des riges nombreuses, fasciculées, presque simples, droites ou un peu couchées, fort menues, glabres, anguleuses, hautes de huit à dix pouces, garnies dans toute leur longueur de feuilles épaisses, sessiles, linéaires, fort étroites, glabres, entières, aiguës; les supérieures au moins aussi longues que les inférieures.

Les fleurs sont solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, presque sessiles, fort petites, verdâtres, formant à l'extrémité des tiges des épis simples, longs & feuillés; les pédoncules très-courts, accompagnés souvent de deux bractées opposées, semblables aux feuilles, mais beaucoup plus étroites & au moins de moitié plus courtes. Le calice est ordinairement divisé à son limbe en quatre découpures droites, oblongues, qui persistent & couronnent les capsules en forme d'un tube alongé. Ces capsules sont globuleuses, de la grosseur d'une graine de coriandre, très-glabres, point striées ni ridées, renfermant une semence petite, arrondie.

Cette espèce croît en Suisse, dans les départements méridionaux de la France, dans les Pyrénées, l'Auvergne, & sur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

3. THÉSION à tiges basses. *Thesium humile*. Vahl.

Thesium foliis linearibus, subcaernosis; floribus axillaribus, sessilibus, quinquefidis. Vahl, Symbol. 3. pag. 43. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1212. n°. 3.

Peu différente du *thesium alpinum* ou de quelques-unes de ses variétés, cette espèce en diffère par ses fleurs à cinq & non à quatre divisions. Ses tiges sont droites, herbacées, longues à peine de trois pouces, glabres, rameuses dès leur base; les rameaux anguleux, médiocrement feuillés, de la longueur des riges, garnis de feuilles air mes, linéaires, un peu charnues, longues d'environ un pouce & demi, entières, aiguës à leur sommet, très-nombreuses. Le calice est divisé, presque jusqu'à sa base, en cinq découpures courtes, point alongé comme celui du *thesium alpinum*. Les fruits sont rides, globuleux, de la grosseur d'une semence de coriandre.

Cette espèce a été observée, par M. Vahl, dans les champs cultivés aux environs de Tunis. ○ (D. script. ex Vahl.)

4. THÉSÉON rayé. *Thesium lineatum*. Thunb.

Thesium foliis linearibus, caule tereti, angulato, inferius aphyllis; ramis erectis, divaricatis; floribus axillaribus, pedunculatis. Linn. f. Suppl. 162. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1212. n° 4.

Thesium (lineatum), foliis lanceolatis, remotis; ramis striatis, erectis. Thunb. Prodr. pag. 45. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 124. n° 2786.

Ses tiges sont droites, anguleuses, cylindriques, dépouillées de feuilles à leur partie inférieure, divisées en rameaux alternes, tendres, écartés des tiges, striés, garnis de feuilles distantes, épar- ses, sessiles, étroites, linéaires-lanceolées. Les fleurs sont petites, axillaires, pédonculées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

5. THÉSÉON à fleurs nues. *Thesium ebrazeatum*. Hayne.

Thesium caule erecto, simpliciter; racemo foliato; floribus pedicellatis, ebracteatis. Pers. Synop. Plant. vol. 1. pag. 211. — Hayne, in Schrad. Botan. Journ. 1800. pag. 33. tab. 7.

Ses tiges sont droites, glabres, feuillées, ordinairement simples, garnies de feuilles alternes, épar- ses, sessiles, glabres à leurs deux faces, linéaires, oblongues, concaves, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont dis- posées le long des tiges, vers leur extrémité, en une grappe feuillée, allongée; nulles ou stériles au sommet, soutenues par des pédoncules très- courts, situées dans l'aisselle des feuilles, dépou- vées de bractées.

Cette plante croît aux environs de Berlin, dans les pâturages des grandes forêts.

6. THÉSÉON rude. *Thesium squarrosum*. Thunb.

Thesium foliis linearibus, recurvato-reflexis; caule tereti; floribus axillaribus, sessilibus. Linn. f. Suppl. pag. 162. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1213. n° 5. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 124. n° 2787.

Thesium (squarrosum), foliis lanceolatis, reflexis; floribus axillaribus, pedunculatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Cette espèce est rude au toucher sur toutes ses parties. Ses tiges sont droites, cylindriques, ra- meuses, garnies de feuilles épar- ses, alternes, ses- siles, linéaires, très-entières, subulées à leur som- met, fortement recourbées en dehors. Les fleurs sont sessiles ou à peine pédicellées, situées dans l'aisselle des feuilles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

7. THÉSÉON unilatéral. *Thesium filifera*. Thunb.

Thesium floribus subsessilibus, secundis, ciliato-lanatis; foliis subulatis. Linn. Mant. pag. 213. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 123. n° 2775. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1213. n° 6.

Thesium (filifera), foliis linearibus-lanceolatis, caule decumbente, floribus spicatis. Thunb. Prodr. p. 46.

Ses tiges sont simples, fermes, dures, très- basses, hautes d'environ trois pouces, en partie couchées, garnies de feuilles alternes, ouvertes, sessiles, linéaires, tubuleuses, entières, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en une grappe ou plu- tôt en un épi terminal; elles sont unilatérales, alternes, sessiles, très-rapprochées, axillaires, mu- nies de deux bractées opposées, latérales. Leur calice se divise en cinq découpures lanceolées, concaves, ciliées, tant à leur sommet qu'à leurs bords; de petites fibres recourbées & imitant un duvet laineux recouvrent le disque du calice; les étamines sont insérées dans sa cavité. Le fruit est une capsule presque ovale, fortement ridée, de la grosseur d'une semence de coriandre, couronnée par les divisions du calice persistant & velu dans sa partie concave.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

8. THÉSÉON effilé. *Thesium virgatum*. Lam.

Thesium ramis erectis, virgatis, nudiusculis; foliis subulatis, brevibus, remotissimis; floribus subum- bellatis, terminalibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 123. n° 2779.

Ses tiges sont droites, ligneuses, glabres, cy- lindriques; elles se divisent en rameaux nombreux, alternes, ramifiés, allongés, droits, effilés en ba- guettes, très-glabres, striés, presque nus, garnis seulement à de grandes distances de très-petites feuilles courtes, un peu concaves, très-entières, presque subulées, appliquées contre les tiges en forme d'écaillés. Les fleurs sont petites, disposées à l'extrémité des rameaux presque en ombellules, dont les pédoncules sont courts, presque égaux, très-glabres, munis à leur base de quelques pe- tites bractées assez semblables aux feuilles, mais plus étroites. Les fruits sont glabres, ovales, ri- dés extérieurement, plus petits qu'un grain de poivre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été recueillie par M. Sonnerat. h (V. f. in herb. Lam.)

9. THÉSÉON allongé. *Thesium fenale*. Linn.

Thesium floribus spicatis, corollis ciliatis, caule Kkkk 2

fruticosa; foliis subulatis, brevissimis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1213. n°. 7.

Thefum foliis lineari-lanceolatis, acutis; ramis striatis, elongatis; floribus subsessatis. Thunb. Prodr. pag. 45. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 123. n°. 2776.

Cette plante est remarquable par son port: c'est un petit arbrisseau dont les tiges presque nues, souples, plantées, lui donnent l'aspect du *resfia Capensis*; elles se divisent en rameaux nombreux, alternes, élargies, très-rapprochées, simples, striées, presque filiformes, cylindriques, garnis de feuilles alternes, distantes, fort petites, entières, linéaires-lanceolées, très-étroites, subulées, aiguës. Les tiges & les rameaux se divisent à leur sommet en deux ou trois ramifications qui forment à leur extrémité autant d'épis grêles & courts, qui supportent des fleurs alternes, unilatérales, petites; les divisions du calice ciliées à leurs bords; les bractées fort petites, aciculées.

Cet arbrisseau se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. h

10. THÉSION en épis. *Thefum spicatum.* Linn.

Thefum floribus spicatis, levibus; foliis subulatis, brevissimis, remotissimis. Linn. Mant. pag. 214. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 123. n°. 2777.

Cette espèce, qui a des rapports avec le *thesium furiale*, surtout par la petitesse de ses feuilles, en est cependant très-distincte, en ce que ses tiges n'ont point la grande souplesse de celles de ce dernier, que ses épis sont bien moins grêles, & les bractées qui les accompagnent point aciculées.

Ses tiges sont droites, striées, un peu anguleuses, fermes, roides, souvent prolifères, hautes d'environ trois pieds, de la grosseur d'une plume d'oie, munies de rameaux alternes, garnis de feuilles très-distantes, fort petites, un peu grasses, subulées, aiguës, lisses, sessiles, entières. Les fleurs sont situées à la partie supérieure des rameaux, disposées en épis oblongs, de la grosseur du petit doigt, axillaires, accompagnées de deux bractées acuminées, membranées à leurs bords; la feuille qui les accompagne, est semblable aux bractées; les calices sont courts, très-lisses.

Cette plante croît sur les montagnes, au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in *Herb. Lam.*)

11. THÉSION à fleurs en tête. *Thefum capitatum.* Linn.

Thefum floribus capitatis, sessilibus, terminalibus; foliis triquetris, levibus; bracteis ovatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1214. n°. 9. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 123. n°. 2778.

Thefum foliis trigonis, macronatis, levibus; capitatis terminalibus, bracteis ciliatis. Thunb. Prodr. pag. 46.

Thefum floribus capitatis. Royle, Lugd. Bat. 4.

On distingue aisément cette espèce à la disposition de ses fleurs réunies en tête, & à ses bractées ovales-ciliées. Ses tiges sont dures, ligneuses, divisées en rameaux alternes, distans, inégaux; les supérieurs plus longs que les inférieurs, chargés d'autres petits rameaux courts, presque fasciculés, garnis de feuilles alternes, sessiles, petites, épaisses, linéaires, à trois faces, entières, lisses à leurs deux faces, subulées, macronées à leur sommet, très-étroites.

Les fleurs sont terminales, sessiles, réunies entières, munies de bractées ovales, ciliées à leurs bords; les calices divisés en découpures longuement acuminées, & garnies de poils sur toute la longueur de leur face intérieure.

Cette espèce croît en Afrique & au Cap de Bonne-Espérance. h (V. f. in *Herb. Lam.*)

12. THÉSION à corymbes. *Thefum stridum.* Linn.

Thefum ramis stridis, nudisculis; floribus corymbosis; foliis lineari subulatis, remotis, decurrentibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 124. n°. 2790.

Thefum floribus umbellatis; foliis linearibus, decurrentibus. Linn. Mant. pag. 214. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1214. n°. 10.

Thefum (stridum), floribus umbellatis; foliis linearibus, acutis, stridis, decurrentibus; caule striato, angulato, fruticosa. Berg. Plant. Capenf. p. 73. n°. 2.

Thefum foliis lanceolatis, decurrentibus; floribus terminalibus, subumbellatis. Thunb. Prodr. pag. 45.

Ses tiges ressemblent à celles d'un genêt; elles sont droites, anguleuses, striées, rameuses à leur partie supérieure; les rameaux simples, alternes, paniculés, roides, glabres; les supérieurs plus allongés, garnis de feuilles roides, glabres, sessiles, linéaires, très-étroites, presque subulées, aiguës, longues à peine de six lignes, plus courtes que les entre-nœuds, un peu décourbées à leur base.

Les fleurs sont presque ombellées, disposées en corymbes courts, terminaux & latéraux. Les pédoncules ramifiés, munies à leur base d'une sorte d'involucre universel à trois folioles linéaires, & à la base de chaque division de bractées étroites, linéaires, subulées. Leur calice est glabre tant en dehors qu'en dedans, coriace, à cinq découpures droites, concaves, aiguës, persillantes; cinq étamines dont les filamens sont capillaires, très-courts. Les anthers arrondies, un peu anguleuses; un ovaire turbiné, surmonté d'un style de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple; une capsule couronnée par les divisions du calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.
b. (*V. f. in Herb. Lam.*)

13. THÉSTON ombellé. *Thefum umbellatum*. Linn.

Thefum foliis oblongo-ovatis, umbellis pedunculatis, trifloris, cymam terminalis effusiuscula. Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 123. n°. 2780.

Thefum floribus umbellatis, foliis oblongis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302.

Centaurium luteum, ascyroides, virginianum. Pluk. Mantiss. pag. 43. tab. 342. fig. 1.

Thefum (corymbulosum), erectum, foliis ovali-lanceolatis, fasciculis florum corymbuloso-terminalibus. Mich. Flot. boreal. Amer. vol. 1. pag. 112.

A l'aspect de ses feuilles on prendroit cette espèce pour l'*Hysericum perforatum*, mais elles s'en alternent & point perforées. Ses tiges sont droites, glabres, chargées, à leur partie supérieure, de rameaux alternes, garnis de feuilles sessiles, alternes, ovales-lancéolées, glabres, très-entières à leurs bords. Les fleurs sont petites, blanches ou jaunâtres, disposées, à l'extrémité des rameaux, en ombelles pédonculées, soutenant des ombellules à trois ou cinq fleurs, dont l'ensemble forme une cime terminale; elles sont munies à leur base d'un involucre à quatre petites folioles. Le calice est coté, presque en forme d'entonnoir (son limbe partagé en quatre lobes aigus; les filaments velus à leur partie supérieure, insérés sur le calice, au nombre de quatre, supportant des anthères presque globuleuses.

Cette plante croît dans les prés secs, dans la Virginie & la Pensilvanie. x. (*V. f. in herb. Lam.*)

14. THÉSTON cassant. *Thefum fragile*. Thunb.

Thefum foliis ovato-triquetris, carinatis, decurrentibus; caule angulato; floribus axillaribus, fissilibus. Linn. f. Suppl. pag. 162. — Lam. Ill. Gen. vol. 2. pag. 124. n°. 2781. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1215. n°. 12.

Thefum (fragile), foliis trigono-ovatis, caule angulato, floribus axillaribus. Thunb. Prodrum. pag. 45.

Cette plante est extrêmement cassante, & se présente sous l'aspect d'un *Salvia*, munie de feuilles si petites, qu'elle en paroit dépourvue. Ses tiges sont glabres, droites, anguleuses, très-fragiles; ses feuilles alternes, decurrentes, extrêmement courtes, petites, ovales, triangulaires, relevées en carène sur le dos, glabres, entières; les fleurs axillaires & sessiles.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

15. THÉSTON scabre. *Thefum scabrum*. Linn.

Thefum capitulis pedunculatis, foliis triquetris, margine carinâque scaberrimis. Linn. Spec. Plant. pag. 302. — Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 123. n°. 2781. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1215. n°. 13. — Berg. Plant. Cap. n°. pag. 72. n°. 1.

Thefum foliis triquetris, imbricatis, scabris; caule tereti; floribus terminalibus. Thunb. Prodr. p. 45.

Il existe beaucoup de rapport entre le *Thefum capitatum* & cette espèce; mais cette dernière en diffère en ce que les têtes de fleurs sont supportées par de longs pédoncules, & que les feuilles sont rudes, tant à leurs bords que sur leur dos.

Ses tiges sont droites, cylindriques, légèrement striées, hautes de huit à dix pieds, divisées à leur partie supérieure en rameaux simples, courts, paniculés, garnis de feuilles épaves, sessiles, très-rapprochées, presque imbriquées, longues d'un pouce, triangulaires, tubuleuses, mucronées à leur sommet, herissées, à leurs bords & sur leur carène, de très-petites dents aigües. Les fleurs sont réunies en un épi terminal en forme de tête, situé à l'extrémité d'un pédoncule allongé, muni de bractées glabres, triangulaires, ciliées à leurs bords, persistantes, de la longueur des fleurs. Le calice est tubulé, à cinq découpures d'écus, aigües, garnis intérieurement, vers leur sommet, d'un duvet assez épais, blanc, crépu; cinq filaments courts, filiformes; des anthères presque roudes, triangulaires; un ovaire oblong, anguleux; un style persistant; un peu plus court que les étamines. Le fruit est une capsule ovale, petite, striée, couronnée par les découpures du calice & par le style; une seule loge, une seule semence globuleuse, presque oléuse.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. y.

16. THÉSTON paniculé. *Thefum paniculatum*. Linn.

Thefum foliis lanceolatis, remotis; ramis angulatis, diffusis; floribus terminalibus. Thunb. Prodr. p. 45. — Lam. Ill. Gen. vol. 2. p. 122. n°. 2774.

Thefum (paniculatum), solum paniculatum. Linn. Mantiss. pag. 51. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1215. n°. 14.

Ses tiges sont médiocrement ligneuses, glabres, cylindriques, un peu striées, divisées, dans toute leur longueur, en un grand nombre de rameaux diffus, anguleux, fleuris, paniculés, comme dans les *gadium*. Les feuilles sont alternes, sessiles, fort petites, distantes, linéaires-lancéolées; les dernières tubuleuses. Les fleurs sont très-petites, pédonculées, disposées alternativement dans l'aisselle des feuilles, formant, par leur ensemble, une panicule étalée. Un peu au dessous de chaque fleur est située une sorte d'involucre à trois, quatre

ou cinq divisions. Le calice est court, à cinq découpures à son limbe ; les fruits de la forme & de la grosseur d'une semence de coriandre : un grand nombre de fleurs avortent.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h*

17. THÉSION hispide. *Thesium hispidulum*. Lam.

Thesium coulbus paniculatis, diffusis ; foliis linearibus, hispidis ; floribus terminalibus, sessilibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 124. n°. 2789.

C'est un fort petit arbrisseau, dont les tiges sont hautes de quatre à six pouces, grêles, un peu tortueuses, raboteuses, herissées, ainsi que la plupart des autres parties de cette plante, de poils très-courts, à peine sensibles, qui la rendent rude au toucher, presque accrochant. Les rameaux sont courts, nombreux, diffus, paniculés, presque en buisson, munis de feuilles petites, étroites, linéaires, luisantes, hispides, très-entières, épaisses, sessiles, un peu courbées, longues de trois lignes au moins. Les fleurs sont terminales, réunies en petits paquets sessiles, quelques-uns latéraux, la plupart terminaux, munis de bractées assez semblables aux feuilles.

Cette plante a été recueillie par M. Sonnerat au Cap de Bonne-Espérance. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

18. THÉSION amplexicaule. *Thesium amplexicaule*. Linn.

Thesium floribus subspicatis, secundis, ciliato-lanatis ; foliis cordatis, amplexicaulis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 125. n°. 2782.

Thesium floribus subspicatis, secundis, ciliato-lanatis. Linn. Mant. pag. 213. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1216. n°. 15.

Ses tiges sont droites, médiocrement ligneuses, striées, un peu anguleuses, lisses, hautes de quatre pieds, rameuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, en forme de cœur, un peu épaisses, glabres à leurs deux faces, lisses, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, longues d'environ un pouce.

Les fleurs sont fort petites, disposées presque en grappes à l'extrémité des rameaux ou presque en épis, toutes tournées du même côté, munies de bractées assez grandes, ovales. Leur calice est d'une seule pièce, divisé à son limbe en cinq découpures languineuses, ciliées à leurs bords.

Cette plante croît sur les hautes montagnes au Cap de Bonne-Espérance. *h*

19. THÉSION à trois fleurs. *Thesium triflorum*. Linn. f.

Thesium foliis lanceolatis, caule angulato ; pedunculis axillaribus, trichotomis, compoitis. Linn. f. Suppl. pag. 162. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 124. n°. 2784. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1216. n°. 16.

Thesium (triflorum), foliis lanceolatis, caule angulato, pedunculis trichotomis. Thunb. Prodrum. pag. 46.

Cet arbrisseau a des tiges droites, ligneuses, glabres, un peu striées, rameuses, anguleuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet ; les fleurs situées à l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles. Les pédoncules sont ordinairement trichotomes ou à trois divisions très-écartées entières, terminés par trois petites fleurs.

On rencontre cette plante dans l'Afrique, au Cap de Bonne-Espérance. *h*

20. THÉSION à feuilles charnues. *Thesium euphorbioides*. Linn.

Thesium foliis ovatis, acutis, carnosis ; ramis dichotomis, floribus terminalibus. Thunb. Prodrum. pag. 46. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 124. n°. 2783.

Thesium pedunculis trifloris, terminalibus ; foliis subovatis, carnosis. Linn. Mant. pag. 214. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1216. n°. 17.

Thesium (euphorbioides), floribus terminalibus, pedunculis trifloris ; foliis carnosis, ovato-subrotundis ; caule fruticoso. Berg. Plant. Capenf. pag. 74. n°. 3.

Planta africana, frutescens, portulaca foliis, margini Syrorum, ex brevi pediculo binis. Pluken. Almalch. pag. 173.

Des feuilles grasses & charnues donnent à cette plante l'apparence d'une euphorbe. Ses tiges sont droites, ligneuses, glabres, striées, presque anguleuses, divisées en rameaux de même forme, dichotomes à leur partie supérieure. Les feuilles sont sessiles, alternes, charnues, très-ouvertes, ovales, un peu arrondies, très-entières, glabres à leurs deux faces, un peu aiguës à leur sommet, longues d'un pouce.

Les fleurs sont terminales, axillaires, presque en grappes ; les pédoncules munis ordinairement de trois fleurs, chaque fleur pédicellée ; à la base du pédoncule commun, des bractées ovales, un peu aiguës ; d'autres plus petites, lancéolées, sur chaque pédicelle. Le calice est tubulé, à cinq angles, glabre, à cinq découpures droites, linéaires, concaves, un peu relevées en bourse à leur base exte-

sieurs; cinq filamens courts, subulés; les anthères presque orbiculaires, échancrées en cœur; l'ovaire turbiné, un style plus court que les étamines, surmonté d'un stigmate plane, capité. Le fruit est une capsule un peu arrondie, à une seule loge, couronnée par les découpures du calice.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. *Th*

21. THÉSÉON épineux. *Thesium spinosum*. Linn. f.

Thesium foliis subulatis, apice spinosis; floribus axillaribus, foliariis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 124. n°. 2785.

Thesium (spinosum), *foliis subulatis, spinosis; floribus axillaribus*. Thunb. Prodr. pag. 45.

Thesium foliis subulatis, mucronatis; floribus axillaribus, foliariis. Lion. f. Suppl. p. 161. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 127.

On distingue assez facilement cette espèce au caractère particulier de ses feuilles terminées par une pointe épineuse. Ses tiges sont glabres, striées, dures, rameuses, garnies de feuilles sessiles, alternes, subulées, glabres à leurs deux faces, roides, très-ouvertes, entières, canaliculées en dessus, subulées, prolongées à leur sommet en une pointe roide, piquante. Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles à la partie supérieure des rameaux.

Cette espèce se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

22. THÉSÉON drupacé. *Thesium drupaceum*. Labill.

Thesium aphyllum, fluminum filamentis decem, alternis, sterilibus. Labill. Nov.-Holl. Plant. vol. 2. pag. 68. tab. 93.

Cette espèce peut être placée sur la ligne qui rapproche les *Thesium d. asyris*, ayant des fruits drupacés. C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de cinq à six pieds, dont les branches sont droites, cylindriques; les rameaux striés, anguleux, entièrement privés de feuilles, qui sont remplacées par quelques petites écailles ovales, alternes, appliquées contre les rameaux, caduques. Les fleurs sont disposées en épis latéraux & terminaux, munies de petites bractées en forme d'écaille, ovales, caduques.

Chaque fleur offre un calice d'ont les découpures sont ovales, épaissies à leur sommet; dix filamens courts, insérés sous les divisions du calice, dont cinq alternes avec les divisions & stériles; les cinq autres opposées & fertiles, terminées par des anthères globuleuses, à deux loges; l'ovaire est ovale, le style à peine sensible, le stigmate petit, à cinq rayons. Le fruit est un drupe

ovale, à une seule loge, monosperme; l'embryon fort petit, presque ovale, placé presque à la base d'un périsperme charnu, jaunâtre; la radicule supérieure; les cotylédons très-courts.

Cette plante a été observée par M. Lehillardière au Cap Van-Diemen. *Th* (*Descript. ex Labill.*)

THÉSÉ bois dur. *Securinega*. Genre de plantes dicotylédones, de la famille des euphorbes, qui a des rapports avec les buis, & qui comprend des arbres très-élevés, exotiques à l'Europe, dont le bois est très-dur; les feuilles alternes, très-entières; les fleurs axillaires, agglomérées, moniques (peut-être diciques). ?

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques; les fleurs mâles pourvues d'un calice à cinq découpures; cinq étamines (ou six ?); les filamens presque monadelphes à leur base, entourés en dehors d'une couronne jaunâtre; dans les fleurs femelles, trois styles courts, réfléchis; une capsule à trois loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles sont séparées des femelles sur les mêmes individus ou sur des individus différens.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice court, d'une seule pièce, à cinq découpures.

2°. Point de corolle.

3°. Cinq ou six étamines, dont les filamens sont courts, presque réunis à leur base, environnés en dehors d'une couronne jaunâtre, ou peut-être de glandes conniventes; les anthères ovales.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice persistant, à cinq découpures concaves, arrondies, courtes, un peu charnues.

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne pour elle un petit bourrelet court, presque lobé, qui persiste avec le calice.

3°. Un ovaire globuleux, presque à trois faces, surmonté de trois styles courts, persistans & terminés par trois stigmates obtus.

Le fruit est une petite capsule sphérique, à trois loges, surmontée de styles persistans & réfléchis, tout-nue à sa base par le calice persistant, rabattu en dehors. Les semences....

Observations. Ce genre mérite d'être examiné sur des individus vivans : il est possible que les parties de la fructification soient un peu différentes, ne les ayant observées que sur des individus secs. M. de Jussieu a rapproché ce genre

de celui des buis, qu'il n'en ait point vu les fruits. J'en ai vu quelques uns dans l'herbier de M. de Lamarck; ils m'ont offert, comme ceux du buis, une petite capsule à trois loges, couronnée par les trois styles persistans & réfléchis.

ES P È C E.

THÉSÉ bois dur. *Securinea durissima*.

Securinea foliis coriaceis, ovatis, integris; floribus glomeratis, axillaribus. (N.)

Securinea durissima. Gmel. Syll. Nat. vol. 2. pag. 1008. — Juss. Gener. Plant. pag. 388.

C'est un très-grand arbre dont le bois est très-dur, & se refuse presque à la hache, d'où lui vient son nom: il se couronne de branches fortes, de rameaux nombreux, très-glabres, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, très-coriacées, dures, de couleur à leurs deux faces, entières à leurs bords, d'un vert-pâle & très-lisses en dessus, finement veinées & réticulées en dessous, ovales, obtuses à leur sommet, arrondies à leur base; les pétioles courts, redressés.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles en petits paquets agglomérés, presque sessiles; elles sont monoïques ou peut-être divi-ques, fort petites. Dans les individus que j'ai examinés, j'ai toujours vu les fleurs mâles séparées des femelles sur des rameaux différens, mais je n'ai pu m'assurer s'ils avoient appartenu au même arbre. Le fruit est une petite capsule globuleuse, très-glabre, à peine de la grosseur d'un grain de poivre, couronné par trois styles très-courts, réfléchis; le calice, persistant sous le fruit, m'a paru composé de cinq petites folioles arrondies.

Cet arbre a été observé à l'Île-de-France par Commerçon. *Th* (V. f. in herb. Juss. & Lam.)

THILAQUI. *Thilachium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, apétales, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, très-entières; les pédoncules terminaux, peu garnis de fleurs.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice entier, ouvert & tronqué à la maturation; point de corolle; des étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle; un stigmate sessile; une baie à dix côtes, à une seule loge, polygerme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice en forme de follicule, oblong, surbiné, nerveux, très-entier, acuminé, fermé

jusqu'à l'époque de la maturité, où il s'ouvre & paroît tronqué à son sommet.

2°. Point de corolle.

3°. Un grand nombre d'étamines (environ 70), dont les filamens sont droits, longs, subulés, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthers droites & oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, strié, porté sur un pédicelle de la longueur des filamens; point de style; un stigmate arrondi.

Le fruit est une baie oblongue, pédicellée, à dix côtes, à une seule loge, renfermant plusieurs semences éparies, réniformes.

Observations. Le nom de ce genre est formé du mot grec *thilachion* folliculus, parce que son calice ressemble à une sorte de follicule. Il se rapproche des *acapparis* par ses étamines & par son fruit pédonculé: il en diffère par le défaut de corolle, par son calice singulier & par la forme de son péricarpe.

ES P È C E.

THILAQUI d'Afrique. *Thilachium africanum*. Loureiro.

Thilachium foliis ovatis, alternis; pedunculis polyfloris, terminalibus. Loureiro, Flor. cochinch. pag. 418.

C'est un arbrisseau peu élevé, dont la tige se divise en rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, à peine aigües. Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, réunies en petit nombre sur un pédoncule commun; elles renferment un grand nombre de filamens allongés, couleur de lisian.

Cette plante croît dans les lieux arides & sauvages, sur les côtes orientales de l'Afrique. *Th* (Descript. ex Lour.)

THOA. *Thoa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des orties, qui a de grands rapports avec les *netum*, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les branches sont sarmenteuses & noueuses; les rameaux opposés; les feuilles opposées; les fleurs disposées en épis axillaires & terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Des fleurs monoïques; point de calice ni de corolle; un grand nombre d'étamines dans les fleurs mâles; dans les fleurs femelles un style presque nul; trois ou quatre stigmates; une capsule ovale, à une loge; une seule semence.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques, disposées sur un épi nouveau,

nouveaux, articulé, dont les fleurs mâles occupent presque toute la longueur; les fleurs femelles situées à la base de l'épi.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice nul.

2°. Une corolle nulle.

3°. Un assez grand nombre d'étamines, situées à chaque nœud de l'épi; les filaments libres, courts, filiformes, terminés par des anthères globuleuses, fort petites.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Point de calice, point de corolle.

2°. Deux ovaires opposés, situés à la base de l'épi des fleurs mâles, fécondes; point de style apparent; trois ou quatre stigmates.

Le fruit est une capsule ovale-oblongue, en forme d'olive, munie sous son écorce de puits foveux & piquants; fragile & tâtée intérieurement, à une seule loge, à une seule semence.

ES P È C E.

THOA piquant. *Thoa urens*. Aublet.

Thoa foliis oppositis, integris; floribus spicatis; ramulis oppositis, apice dichotomis. (N.)

Thoa urens. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 874. tab. 336. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 826.

Thoa. Lam. Illustr. Gener. tab. 784. — Juskieu, Genet. Plant. pag. 406.

Arbrisseau dont les tiges, d'une grosseur médiocre, noueuses, un peu souples, sont revêtues d'une écorce glabre, & de laquelle distille une sorte de gomme assez abondante. Les branches sont allongées, pliantes, noueuses, fermement usées; les rameaux opposés, glabres, nouveaux, dichotomes à leur sommet, munis à chaque nœud de deux feuilles opposées, pétiolées, ovales, très-entières, longues de deux à trois pouces & plus, larges d'environ deux pouces, glabres à leurs deux faces, veinées, réticulées, quelquefois un peu ondulées à leur contour, aiguës à leur sommet; les pétioles courts, un peu canaliculés en dessus.

Les fleurs sont monoïques, disposées en épis simples, grêles, allongés, situés à l'extrémité des rameaux & dans leur bifurcation. L'axe de l'épi est divisé par articulations, & par des nœuds renflés en cœur ou en ovale renversé. A chacun des nœuds, excepté aux deux inférieurs, sont placées les fleurs mâles, uniquement composées d'étamines nombreuses, dont les filaments sont courts, les anthères petites, globuleuses; point de calice ni de corolle. Les fleurs femelles sont au nombre de

Botanique. Tome VII.

deux, opposées, situées au nœud inférieur de l'épi; elles n'ont ni calice ni corolle; elles offrent chacune un ovaire fécond, sans style apparent, surmonté de trois ou quatre stigmates. Le fruit est une capsule de la forme d'une olive, mais au moins une fois plus grosse, glabre, un peu mucronée à son sommet, un peu échancrée à sa base au point d'attache, dont l'écorce glabre recouvre des puits intérieurs foveux & piquants; une seule loge, qui ne s'ouvre point; une seule semence ovale-oblongue, bonne à manger.

Cet arbrisseau, que les Galibis nomment *thoa*, croît dans les forêts de la Guiane. Il est presque toujours en fleurs & en fruits.

Observations. « Lorsqu'on entame, dit Aublet, l'écorce & les branches de cet arbrisseau, il en suinte une liqueur claire & visqueuse, qui, en se desséchant, forme une gomme transparente. On en trouve souvent des morceaux attachés au tronc & aux branches. Lorsqu'on coupe le tronc ou les grosses branches, il en découle abondamment une liqueur aqueuse, claire & transparente, que l'on peut boire dans le besoin, faite d'eau; elle n'a aucun goût.

« Si l'on enlève la première écorce de la capsule, on trouve une substance sèche, composée de poils toides, couchés, qui se détachent facilement les uns des autres, & pour peu qu'il en tombe sur la peau, ils causent une grande démangeaison. Sous cette substance est une coque fragile, qui contient une amande à deux cotylédons, dont la peau est roussâtre. Cette amande, bouillie ou grillée, est bonne à manger. Les marais, espèce de coq-d'inde, & les hocos, espèce de faisan, se nourrissent de ce fruit qu'ils avalent tout entier. »

THOUARSE fermenteuse. *Thuarea fermentosa*. Persoon.

Thuarea culmo repente; foliis distichis, tomentosis. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 110.

Cette singulière graminée devant être présentée, avec tous les détails convenables, dans le bel ouvrage que publie M. Aubert du Petit-Thouars sur les plantes qu'il a recueillies à Madagascar, je me bornerai à la mentionner ici en peu de mots, d'après les caractères communiqués par M. du Petit-Thouars, qui en a fait la découverte.

Ses tiges sont rampantes & fermentuses, garnies de feuilles alternes, tomenteuses, disposées sur deux rangs opposés. Ses fleurs sont polygames, disposées en épis, dont le rachis est membraneux, se roule sur lui-même & tombe. Les fleurs inférieures sont hermaphrodites; les supérieures polygames; le calice bivalve, renfermant deux fleurs; la corolle bivalve; les valves ovales, mucigènes; trois étamines; deux styles. Les épillets s'enfoncent dans la tige, comme les fruits de l'aravée.

LIII

hyssaga ; ils y germent & produisent de nouvelles plantes.

Cette plante croit dans le sable, à l'île de Madagascar.

THOUINIA. *Thouinia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des favoniers (*sapindi*), qui a des rapports avec les *toullia*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, simples ou ternées ; les fleurs disposées en épis axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre découpures profondes ; quatre pétales velus en dedans ; huit étamines ; un style ; trois stigmates ; trois capsules monospermes, réunies à la base du style, terminées par une aile membraneuse.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice en forme de cloche, persistant, divisé profondément en quatre découpures ovales, concaves, obtuses, inégales ; deux opposées plus étroites.

2°. Une corolle composée de quatre pétales alternes avec les divisions du calice, garnis intérieurement, vers leur milieu, d'une petite touffe de poils.

3°. Un bourrelet glanduleux, à quatre lobes, situé entre les pétales & les étamines.

4°. Huit étamines, dont les filaments sont libres, de la longueur des pétales, insérés sous l'ovaire, terminés par des anthères ovales, à deux loges.

5°. Un ovaire supérieur, à trois côtés, surmonté d'un style droit, persistant, plus long que les étamines, divisé à son sommet en trois stigmates subulés & divergens.

Le fruit est composé de trois capsules réunies à la base du style, à une seule loge, ne s'ouvrant pas, terminées vers son sommet par une aile membraneuse.

Les semences sont solitaires, ovales, attachées à la base de chaque loge.

Observations. I. On avoit déjà établi deux genres sous le nom de *thouinia*, qui se sont trouvés détruits, soit parce qu'ils appartiennent comme espèces à d'autres genres, soit parce qu'ils étoient déjà connus sous d'autres noms. Ainsi le *thouinia* de Thunberg & de Swartz est une espèce de *chionanthus* (Just. Gener. Plant. 107), & le *thouinia* de Smith est un *entradichium*, Just. 133, & un *humbertia*, Lam. Illustr. Geop. tab. 107. M. Poiteau,

jaloux également de rendre hommage au savant distingué dont il a reçu, comme tant d'autres, des preuves de bienveillance & de bonté, a rappelé un nom chéri pour l'appliquer à un nouveau genre de plantes qu'il a découvert en Amérique.

Observations. II. La position du bourrelet glanduleux entre les pétales & les étamines, & non entre les étamines & l'ovaire, est un caractère qui n'a encore été observé que dans un petit nombre de plantes. Je l'ai trouvé, dit M. Poiteau, dans les fleurs de quatre espèces de *serjania* & dans celles du *cupania*, en Amérique, & je suis porté à croire qu'il existe dans la plupart des genres de la famille des favoniers qui ont leurs étamines libres.

ESR À CES.

t. *THOUINIA* à feuilles simples. *Thouinia simplicifolia*. Poiteau.

Thouinia foliis simplicibus. Poit. in Annal. Mus. Hist. Nat. Paris. vol. 3. pag. 71. tab. 6.

Arbrisseau qui produit un grand nombre de tiges simples, toides, arquées, longues de huit à quinze pieds, souvent soutenues par les arbrisseaux qui les avoisinent ; le bois très-dur ; les feuilles pétioles, alternes, toides, lancéolées, aiguës, très-simples, dentées en scie à leurs bords, glabres en dessus, réticulées & un peu tomenteuses en dessous, longues de trois à cinq pouces, larges de deux environ, terminées en pointe, munies de nervures latérales, nombreuses, parallèles, saillantes en dessous, terminées chacune par une dent à la circonférence ; les pétioles courts, cylindriques, sans stipules.

Les fleurs sont petites, blanchâtres, disposées en épis axillaires, plus courtes que les feuilles. Leur calice est campanulé, persistant, à quatre divisions profondes, ovales, obtuses, concaves, deux opposées plus étroites ; la corolle plus longue que le calice ; les pétales cunéiformes, concaves, alternes avec les divisions du calice, garnis d'une touffe de poils vers le milieu de leur côté intérieur, insérés à la base extérieure d'un bourrelet glanduleux & à quatre lobes ; les filaments de la longueur des pétales, insérés sous l'ovaire, entourés à leur base par le bourrelet glanduleux, soutenant des anthères ovales, à deux loges ; l'ovaire supérieur à trois faces, d'où s'élève un style droit, persistant, plus long que les étamines ; trois stigmates subulés & ouverts. Le fruit est composé de trois capsules qui ne s'ouvrent pas, attachées à la base du style, terminées par une aile membraneuse, contenant une seule semence ovale, insérée à la base de la loge, recouverte d'une seule tunique, composée d'un embryon, dont la radicule est subulée, dirigée vers la base, & dont les deux cotylédons sont inégalement repliés vers la radicule.

Cet arbrisseau croît à l'île de Saint-Domingue, aux environs de la ville du Cap, où M. Poiteau en a fait la découverte. *h* (*Descript. ex Poit.*)

1. THOUINIA à feuilles ternées. *Thouinia trifoliata*. Poiteau.

Thouinia foliis ternatis. Poit. Annal. Mus. Hist. Nat. Paris. vol. 3. pag. 72. & vol. 5. tab. 27.

Anonymos arbor, flore racemosa, albo; fructu triangulari. Deschamps, in herb. Juss.

Arbre dont les feuilles sont pétiolées, alternes, ternées; les folioles en ovale renversé, dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, profondément sillonnées par les nervures latérales, qui sont faillantes en dessous, & munies d'une petite rouille de poils dans chaque angle; la foliole terminale plus grande que les deux autres, longue de trois à quatre pouces; le pétiole commun long de deux pouces, sans stipules à sa base.

Les fleurs sont disposées comme celles de l'espèce précédente, & leur ressemblent; elles sont également petites & blanchâtres, mais un peu plus ouvertes; les pétales en forme de spatule. Les fruits n'offrent aucune différence remarquable; ils ont quelquefois une partie de moins dans ces deux espèces, mais c'est par avortement, les trois stigmates étant toujours présents.

Cette plante croît à Saint-Domingue; elle a été découverte, par M. Deschamps, aux environs du Fort-Dauphin. *h* (*In herb. Juss. & Descript. Poit.*)

3. THOUINIA à feuilles ailées. *Thouinia pinnata*. Turp.

Thouinia foliis pinnatis, floribus pentapetalis. Turp. Annal. Mus. Hist. Nat. vol. 5. pag. 401. tab. 26.

Arbre de moyenne taille, droit, terminé par une tête arrondie, composée de rameaux assez durs, garnis de feuilles alternes, ailées, d'une à trois paires de folioles opposées, ovales-oblongues, coriaces, fermes, glabres, luisantes, entières, un peu écharnées au sommet, longues de deux à trois pouces; point de stipules.

Les fleurs sont nombreuses, petites, blanches, disposées en panicules droites à l'extrémité des rameaux; un assez grand nombre de fleurs mâles par avortement. Le calice est à cinq découpures profondes, ovales-oblongues, inégales; cinq pétales concaves, cuneiformes, rétrécis en onglet à leur base, munis vers cette partie d'un appendice à deux lobes, foyeux comme toute la surface des pétales; huit filamens de la longueur des pétales, foyeux à leur base, entourés d'un boutonnet glanduleux, supportant des anthers droites & ovales; un ovaire libre à trois faces; le style droit; le

stigmate légèrement bifide. Le fruit, beaucoup plus gros que dans les autres espèces, est composé de trois capsules monospermes, terminées chacune par une aile membraneuse, longue de plus d'un pouce.

Cette espèce a été découverte par M. Turpin, à Saint-Domingue, entre Monte-Christi & San-Yago. *h* (*Descript. ex Turp.*)

THRINACE à petites fleurs. *Thrinax parviflora*. Swartz.

Thrinax caudice inermi, foliis fœbelliformibus, laciniis rigidis, spatice longissime ramofo. (N.)

Thrinax parviflora. Swartz, Prodrum. pag. 57. & Flor. Ind. orient. vol. 1. pag. 614. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 202.

Corypha palmata, foliis fœbelliformibus cum appendiculo ad unum; petiolis tenuioribus, flexilibus, compressis. Brown. Jan. pag. 190.

C'est une plante qui appartient à la famille des palmiers, & qui forme un genre particulier, voisin des rotangs (*calamus*). Ses tiges sont droites, épaisses, cylindriques, très-simples, hautes dedit à vingt pieds, dépourvues d'épines, couronnées à leur sommet par une cime composée de feuilles nombreuses, très-amplées, plissées en éventail, glabres, à découpures roides, lancéolées, longuement pétiolées; les pétioles glabres, sans épines, comprimés, plus longs que les feuilles, grêles, flexibles, pendans.

Les fleurs sont disposées en très-longues grappes paniculées, rectilignes, très-rameuses, longues de deux ou trois pieds; chaque fleur pédicelée, composée d'un calice d'une seule pièce, entier, muni de six dents à son orifice; point de corolle; six étamines; un style surmonté d'un stigmate creusé en entonnoir & oblique. Le fruit est une baie écaillueuse qui renferme une seule semence.

Cet arbre croît sur les côtes arides & maritimes de la Jamaïque, & à la Nouvelle-Espagne. *h*

THRINXERME centipède. *Thrixperum centipeda*. Lour.

Thrixperum caule parafitico, lateraliter radicante; foliis lanceolato-linearibus, spicis axillaribus. Lour. Flor. cochinch. pag. 635.

C'est une plante parasite, rampante au pied des arbres, dont les racines sont simples, courtes; les tiges longues, comprimées, vivaces, garnies de feuilles très-petites, vaginales, lancéolées-linéaires, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, réfléchies en dehors. Les fleurs sont disposées latéralement en épis droites, en forme de chapeau.

Chacune d'elles offre :

LIII 2

1°. Pour *calice* un chaton linéaire, comoriné, cernu, chargé d'écaillés alternes, aiguës; une étaille pour chaque fleur.

2°. Une *corolle* à cinq pétales allongés, linéaires, subulés, presque égaux, droits; un hâtième p-tale en forme d'appendice, attaché au réceptacle & situé entre les deux pétales inférieurs, divisé en deux levres; l'inférieure à trois découpures, placée entre les pétales; les deux découpures latérales courtes, obtuses; celle du milieu ascendante, conique, plus allongée; la levre extérieure ovale, entière, saillante & plus longue que les pétales inférieurs.

3°. Une *seule étamine* dont le filament est court, filiforme, inséré sur le pistil, supportant une anthère ovale, à deux loges, opercuée.

4°. Un *ovaire* droit, filiforme, inférieure; le style épais, inégal, adné à la base du sixième pétale; le stigmate simple.

Le fruit est une capsule oblongue, à trois faces, à trois angles, à trois valves, à une seule loge, contenant plusieurs semences longues, très fines, presque semblables à des poils.

Ce genre appartient à la famille des orchidées, & paroît avoir quelques rapports avec les *limodorum*. Son nom est composé de deux mots grecs, *tris* (pylus), *sperma* (samen), c'est-à-dire, semences en forme de poils.

Son caractère essentiel est d'avoir :

Cinq pétales droits, linéaires; la levre extérieure du sixième, ovale, saillante; une étamine; un style; des semences piliformes.

Cette plante croît à la Cochinchine; elle rampe au pied des arbres. (*Descript. en Lour.*)

THRYALLIS. *Thryallis*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des érabes, qui a des rapports avec les *hippocratea*, & même avec les *malpighia*. Il comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les rameaux sont articulés, les feuilles opposées, munies de stipules. Les fleurs disposées en grappes terminales dans la bifurcation des rameaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq pétales; dix étamines; un style; une capsule à trois loges, presque à trois coques.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* profondément divisé en cinq découpures droites, lancéolées, persistantes.

2°. Une *corolle* composée de cinq pétales un peu arrondis, très-ouverts.

3°. Dix *étamines* dont les filamens sont subulés, plus longs que le calice, terminés par un stigmate simple.

4°. Un *ovaire* supérieur, obtus, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une capsule à trois faces, à trois angles, à trois loges, qui se séparent primitivement en trois coques, renfermant des semences solitaires, très-glabres, ovales, obtuses à leur base, recourbées, mucronées à leur sommet.

ES P È C E.

THRYALLIS du Brésil. *Thryallis brasiliensis*. Linn.

Thryallis foliis oppositis, ovatis; stipulis setaceis, racemis terminalibus. (N.)

Thryallis brasiliensis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 554. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 570. — Juss. Gener. Plant. pag. 251.

Fruticosa herba pisonis Marcgrav. Brasil. p. 57. fig. 3.

C'est un arbruste peu élevé, dont les tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, articulés, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, munies à la base de leur pétiole de stipules sétacées. Les fleurs sont terminales, disposées en une grappe simple, longue d'environ un pied, sortant de la bifurcation des rameaux; elles sont munies à la base de leurs pédicelles de petites bractées sétacées, très-courtes; les pédicelles filiformes, plus longs que les fleurs. Celles-ci sont petites, glabres, jaunâtres, à cinq pétales; les capsules se divisent en trois coques, renfermant chacune une semence très-glabre, recourbée & mucronée à son sommet.

Cet arbruste croît naturellement au Brésil. *Th*

THRYOCÉPHALE. *Thryocepalum*. Forst. Nov. Gener.

C'est un genre de plantes mentionné par Forster, encore très-peu connu, qui appartient à la famille des fougères, & qui paroît se rapprocher des *cyperus*.

Ses tiges sont droites, triangulaires, terminées par des fleurs réunies en têtes épaisses, serrées, accompagnées à leur base d'un involucre à trois folioles. Les épillets contiennent environ quatre fleurs, parmi lesquelles une ou deux inférieures femelles; les autres sont hermaphrodites. Chaque fleur est composée d'une paillette qui recouvre

trois étamines; un style surmonté de deux stigmates, auquel succède une semence arrondie.

Cette plante croît dans les îles de la mer du Sud.

THUNBERGIA. *Thunbergia*. Genre de plantes diocotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des acanthes, qui a des rapports avec les *barleria*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs axillaires & solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un double calice, l'extérieur à deux folioles, l'intérieur plus court, à deux dents subulées; une corolle campanulée; quatre étamines didynames; une capsule en bec, à deux loges; deux semences dans chaque loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un double calice; l'extérieur à deux folioles ovales-oblongues, concaves, aiguës, presque de la longueur du tube; l'intérieur, d'une seule pièce, très-court, à douze découpures étroites, subulées, trois fois plus courtes que le calice extérieur.

2°. Une corolle monopérale, campanulée; le tube imperceptiblement élargi; le limbe à cinq découpures ovales, très-obtus, rétrécies à leur base.

3°. Quatre étamines didynames, dont les filaments sont insérés sur le tube de la corolle, terminés par des anthères ovales.

4°. Un ovaire supérieur, surmonté d'un style filiforme, plus court que le tube de la corolle, terminé par un stigmate à deux lobes.

Le fruit est une capsule globuleuse, courbée en bec d'oiseau, à deux loges, s'ouvrant longitudinalement.

Deux semences dans chaque loge, convexes, en forme de rein, un peu ridées.

Observations. Ce genre ne doit pas être confondu avec un autre du même nom, établi d'abord par Mont. Act. Holm. 1773, pag. 182, tab. 11, & qui offre pour espèce un *thunbergia Capensis*, qui a été depuis reconnu pour appartenir aux *gardenia*, & qu'on trouve décrit dans cet ouvrage à l'article *GARDENIA VERTICILLATA*, vol. 2, pag. 67. C'est le *gardenia thunbergia*. Aiton, Hort. Kew, & Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 1216.

ESPÈCES.

1. **THUNBERGIA** du Cap. *Thunbergia Capensis*. Linn. f.

Thunbergia foliis ovatis, ellipticis, subtus hirsutis;

caule diffusio, subhirsuto. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 549. fig. 1.

Thunbergia foliis ovatis, obtusis; caule diffusio. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 388. n°. 1.

Thunbergia Capensis. Linn. f. Suppl. pag. 202. — Retz. Act. Lond. 1. pag. 163. Icon. — Thunb. Nov. Plant. Gener. 1. pag. 21.

Ses tiges produisent plusieurs tiges herbacées, diffusées, quadrangulaires, menues, hérissées de poils courts, garnies de feuilles opposées, presque sessiles, d'une grandeur médiocre, un peu érigées, très-enriées à leurs bords, presque obtuses, glabres en dessus, un peu velues en dessous, ciliées à leur contour; les pétioles extrêmement courts.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures qui leur servent de bractées, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, velus, beaucoup plus longs que les feuilles, presque filiformes; le calice double; l'extérieur composé de deux folioles concaves, lanéolées, aiguës, hérissées de poils un peu rudes; l'intérieur très-court, divisé en douze découpures étroites, subulées; la corolle campanulée, de couleur jaune; son tube un peu plus long que le calice extérieur; son limbe divisé en cinq lobes égaux, très-obtus, presque arrondis, rétrécis en forme d'étranglement à leur base; la capsule globuleuse, subulée, se partageant en deux loges, dont chacune renferme deux semences.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ☉? (V. f. in herb. Lam.)

2. **THUNBERGIA** odorante. *Thunbergia fragrans.*

Thunbergia foliis cordato-lanceolatis, acuminatis, basi auriculatis; caule scandente, glabro. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 549. fig. 2.

Thunbergia fragrans. Roxb. Cotomand. 1. pag. 47. tab. 67.

Thunbergia (fragrans), foliis cordatis, acuminateis, basi subangulato-dentatis; caule scandente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 388. n°. 2.

Bien différente de l'espèce précédente par son port, cette plante a des tiges presque ligneuses, glabres, cylindriques, grimpantes; elle ressemble beaucoup au *convolvulus sepium*. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, acuminées à leur sommet, un peu échanquées en cœur à leur base, munies de deux oreillettes anguleuses, un peu aiguës, glabres à leurs deux faces, enriées à leurs bords; les pétioles cylindriques, plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont opposées, solitaires dans les aisselles des feuilles; les pédoncules simples, glabres, cylindriques, uniflores, plus courts que les

feuilles. Le calice extérieur glabre, à deux folioles concaves, oblongues, acuminées; la corolle campanulée; le tube de la longueur du calice extérieur; le limbe partagé en cinq lobes élargis, quelquefois un peu échancrés à leur sommet, très-obtus, rétrécis presque en onglet à leur base.

Cette plante croît dans les Indes orientales, le long des fleuves, parmi les broussailles. *h* (*P. f. in herb. Lam.*)

THURARIA du Chili. *Thuraria Chilensis*, Molin.

Thuraria frutescens, multicaulis; foliis alternis. (N.)

Thuraria Chilensis. Molin. Hist. Nat. Chili, pag. 135. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 703. — Juss. Genet. Pl. pag. 422. *Sub codon.*

Cette plante, dont Molina, dans son *Histoire naturelle du Chili*, a formé un genre particulier, paraît à M. de Jussieu devoir être réunie comme espèce aux *codon*, dont elle offre les principaux caractères. C'est un arbrisseau qui pousse des tiges nombreuses, rameuses, cylindriques, de couleur cendrée, hautes d'environ quatre pieds, qui distillent des fentes de leur écorce une résine abondante, assez semblable à l'encens. Les feuilles sont à ternes, pétiolées, roides, ovales, très-entières, rigides au toucher, succulentes, longues de quatre poises.

Les fleurs sont petites, terminales, pédonculées, munies d'un calice tubule. La corolle est monopétale, d'un jaune-verdâtre, en forme d'entonnoir; une fois plus longue que le calice, entière à son limbe; elle renferme dix étamines égales, filiformes, plus courtes que la corolle; les anthères à deux loges; deux styles; les ovaires oblongs; les styles serres, plus longs que la corolle; une capsule sphérique, à deux loges, à deux semences brunes & allongées.

Cette plante croît au Chili. *h*

Observations. Pendant l'été la résine suinte à travers l'écorce de cet arbrisseau: on la recueille sous la forme de petits grains ou larmes, d'un blanc transparent, qui s'attachent le long des branches. La récolte s'en fait en automne, lorsque les feuilles commencent à tomber: elle a un goût fort amer, mais l'odeur en est très-aromatique.

THUYA. *Thuya*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des conifères, qui a des rapports avec les cyprès, & qui comprend des arbres ou arbustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont courtes, ordinairement imbriquées, en forme d'écaillés, toujours vertes & persistantes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs mâles disposées en un chaton ovale, composé d'écaillés obtuses, imbriquées sur quatre rangs; quatre anthères sessiles sous chaque écaillé; des fleurs femelles réunies en un cône ovale; les écaillés oblongues, recouvrant deux semences ordinairement munies d'une aile membraneuse.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques; chaque individu portant des fleurs mâles & femelles.

Les fleurs mâles sont réunies sur un chaton ovoïde, composé d'écaillés obtus, imbriquées, presque opposées, sur trois ou quatre rangs. Elles offrent :

1°. Un calice nul, représenté par chaque écaillé.

2°. Point de corolle.

3°. Quatre étamines situées sous chaque écaillé; les filaments à peine sensibles; les anthères situées à la base de chaque écaillé.

Point d'ovaire ni de style.

Les fleurs femelles disposées sur un cône ovale, composé d'écaillés oblongues, un peu épaissies à leur sommet par un tubercule ou un petit onglet, conniventes dans leur longueur. Chaque fleur offre :

1°. Le calice & la corolle comme dans les fleurs mâles.

2°. Deux ovaires sous chaque écaillé, surmonté chacun d'un style très-court, terminé par un stigmate concave.

Le fruit est un cône ovale, allongé, obtus à son sommet, s'ouvrant longitudinalement, formé d'écaillés oblongues.

Deux semences oblongues, entourées d'une aile membraneuse, quelquefois échancrée.

Observations. Les espèces qui composent ce genre se rapprochent beaucoup par leur port des genévriers & des cyprès, particulièrement de ces derniers par leur triduction; mais dans les cyprès les cônes femelles sont globuleux, formés par l'aggrégation d'écaillés épaisses, en tête de clou, attachées à un axe commun par un pivot épais qui s'insère au centre de leur face interne; les semences plus nombreuses, sans ailes membraneuses. Quelques auteurs prétendent que le nom de *thuya* vient du mot latin *thus*, parce que l'on brûloit souvent son bois ou sa résine dans les sacrifices, à la place du véritable encens; d'autres croient qu'il vient d'un mot grec qui signifie *parfumer*, à cause de l'odeur aromatique que répandent la plupart de ses espèces.

Les auteurs du seizième siècle, est-il dit dans la nouvelle édition des *Arbres & Arbustes* de Du-

hamel, ont confondu les différentes espèces de *thuya*. Dalechamp décrit même plusieurs genres sous ce nom, & il en compte quatre espèces : il paroît néanmoins que la seule qu'il connoît étoit le *thuya occidentalis*, cultivé dans les jardins des rois de France à Fontainebleau. Comme tous les auteurs de ce siècle, qui n'étudioient que dans les livres des Anciens, les botanistes voulurent trouver dans Plin ou Théophraste la description d'arbres ou de plantes souvent originaires de l'Amérique : de là les erreurs & les méprises sans nombre que l'on trouve dans leurs ouvrages. J. Bauhin a donné l'Histoire du *thuya* d'Occident, ou arbre de vie ; mais il a judicieusement observé que le nom d'arbre de vie étoit donné dans son pays à des arbres de toutes les contrées : il a pensé que c'est d'une espèce de *thuya* que Lucain a voulu parler, quand il a dit que Cleopâtre possédoit les meubles les plus somptueux faits avec l'ivoire & le *thuya*.

Les *thuya*, ajoutent les mêmes auteurs, servoient autrefois à l'ornement des jardins ; ils prenoient différentes figures, suivant le caprice & le goût du moment ; mais on s'appêrçut que des arbres mutilés par le fer ne pouvoient plus offrir ces formes naturelles & variées, car abandon gracieux dont la main du Créateur a enrichi les végétaux, & leur culture fut négligée. Au lieu de les planter parmi les fleurs ou autour d'un parterre, il seroit plus à propos de les réserver pour les bosquets, & les placer parmi les arbres verts : ils formeroient avec les sapins une des bases des bosquets d'hiver ; leur verdure néanmoins rougit un peu en été & perd son éclat. On peut aussi s'en servir avec succès pour former des abris & des palissades roujoues vertes, qu'on tond au ciseau. Toutes les espèces de *thuya* peuvent s'élever de semence, & c'est le mieux, quoiqu'elles prennent par boutures faites au commencement de l'automne.

E S P A C E S.

1. THUYA d'Amérique. *Thuya occidentalis*. Linn.

Thuya strobilis levibus, squamis obtusis. Linn. Sp. c. Plant. vol. 2. pag. 1421. — Hort. Clif. 449. — Hort. Upf. 139. — Roy. Lugd. Bat. 87. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 182. — Kalm. It. 3. pag. 389. — Mill. D. C. 1. 1. — DuRoi, Harbk. 2. pag. 455. — Blackw. tab. 210. — Kniph. Centur. 1. n. 91. — Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 371. — Cæten. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 62. tab. 91. — Lam. Illud. Geer. tab. 787. fig. 1. — Duham. Arb. vol. 2. p. 310. tab. 90. & edit. nov. — Mich. vol. 1. p. 12. tab. 4.

Thuya foliatis articulis suborbiculatis ; strobilis ovatis, teretibus ; squamis oblongo-ovalibus, ob-

tusis ; seminibus alatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 109.

Thuya Theophrasti. C. Bauh. Pinn. 488. — Tournef. Inst. R. Herb. pag. 587.

Arbor vita. Claf. Hist. 1. pag. 36. Icon. — Dod. Pempt. pag. 838. Icon.

Arbor vita, five paradisifica vulgò dicta, odorata, ad sabinam accedens. J. Bauh. Hist. 1. secundæ pars, pag. 286. Icon.

Vulgairement l'arbre de vie.

2. *Thuya occidentalis, variegata*. Marsh. Amer. pag. 243.

Thuya Theophrasti, foliis eleganter variegatis. Duham. 1. c.

Tuya du Canada.

3. *Thuya occidentalis, odorata*. Marsh. Amer. pag. 243.

C'est un arbre d'une espèce agréable, qui s'élève de vingt-cinq à trente pieds de haut. Son tronc est droit, revêtu d'une écorce brune, gercée, très-branchu, très-rameux ; les rameaux très-étalés, même pendans, d'un jaune-rougeâtre dans leur jeunesse, très-glabres, couverts en partie de feuilles planes, imbriquées, opposées, appliquées contre les tiges, courtes, un peu obtuses, d'un vert-luisant, plus vif en hiver, épaisses, en forme d'écaillures un peu arrondies, relevées en bourse sur leur dos.

Les fleurs sont monoïques ; les fleurs mâles situées à l'extrémité des jeunes rameaux, très-courtes le long des anciens, réunies en chatons ovales, écaillieux, composés d'écaillures disposées sur quatre rangs. Les fleurs femelles forment un cône ovale, situé comme les précédentes, composés d'écaillures oblongues, très-lisses, obtusés à leur sommet ; les semences situées à la base des écaillures, environnées d'une aile membraneuse, échancrée tant à son sommet qu'à sa base.

Cet arbre croît naturellement dans les contrées septentrionales de l'Amérique & en Sibérie, sur les montagnes de la Virginie & du Canada. 77 (P. v.)

Il sert des *thuya* d'Amérique des grains d'une résine jaune & transparente comme le copal ; mais cette résine n'est point dure, & en la brûlant elle répand une odeur de galipot. Quoique leur bois soit moins dur que celui du sapin, il est cependant d'un bon usage & presque incorruptible. On l'emploie au Canada pour palissader les fortifications & pour faire des clôtures de jardin, parce qu'il résiste plus long-tems aux injures de l'air, & qu'il est moins sujet à se pourrir que tout autre bois. Il répand une mauvaise odeur quand on le travaille. On attribue à cet arbre une vertu sudo-

risique : ses jeunes branches & ses feuilles, qui ont une odeur forte, assez agreable, produisent à peu près les mêmes effets que la sabiné.

Lorsque cet arbre fut connu en France on lui donna le nom d'arbre de vie ou de Paradis, à cause de l'odeur pénétrante & aromatique qui s'échappe de ses feuilles quand on les froisse, peut-être aussi parce qu'il conserve son feuillage pendant l'hiver. Le premier thuya qu'on vit en France fut apporté à François 1^{er}; Clusius l'observa dans le Jardin du Roi à Fontainebleau; il fut bientôt répandu en Europe, & du tems de J. Bauhin on le trouvoit déjà dans tous les jardins de botanique & d'agrément. Ses feuilles, qu'il conserve vertes, fixent la place dans les bosquets d'hiver.

2. THUYA de la Chine. *Thuya orientalis*. Linn.

Thuya srobilis squarrosa; *squamis acuminatis, reflexis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1422. — Hort. Ups. 289. — Mill. Dict. n^o. 2. — Duroi, Hist. 2. pag. 458. — Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 371. — Lam. Illustr. Gener. tab. 787. fig. 2. — Gzern. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 61. tab. 91. fig. 2.

Thuya srobilis uncinatis, *squamis reflexo acuminatis*. Roy. Lugd. Bat. 87. — Hort. Cliff. 449. — Duham. vol. 2. pag. 120. tab. 90. fig. 2, & edit. nov. Mich. vol. 2. pag. 12.

Vulgairement thuya, arbre de vie de la Chine.

Cet arbre diffère du précédent par son port & par les écailles de ses cônes pointues & recourbées en hampe; on l'ordinairement il s'élève moins & ne parvient guère qu'à la hauteur de quinze à vingt pieds. Son tronc est droit, un peu raboteux, de couleur brune. Ses rameaux, au lieu d'être étalés & pendans, sont redressés, formant avec les tiges un angle aigu, garnis de feuilles nombreuses, imbriquées, très-glabres, d'un vert luisant surtout en hiver, ovales-obovales, à peine aiguës à leur sommet, épaisses, entières, très-ferrées, souvent un peu tuberculeuses sur leur carène, filonnees & convexes, à peine odorantes.

Les fleurs mâles sont réunies en un chaton allongé, un peu arrondi, très-court, composé d'écailles aiguës, placées sur quatre rangs; à la base de chaque écaille, quatre antères presque sessiles. Les fleurs femelles forment un chaton arrondi, médiocrement allongé, dont les écailles imbriquées sont pointues à leur sommet, & recourbées en hampe; à l'époque de la maturité ces écailles s'apaisissent, sont raboteuses & s'ouvrent longitudinalement; chacune d'elles renferme deux semences nues, ovales, un peu anguleuses, d'un brun rougeâtre.

Cet arbre croît naturellement à la Chine &

dans les Indes orientales. Il est depuis long-tems cultivé en Europe. Th (V. v.)

3. THUYA articulé. *Thuya articulata*. Desfont.

Thuya ramulis planis, articulatis; srobito tetragono, quadrivalvi; vavulis ovatis, infra apicem mucronatis, duabus feminiferis. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 353. tab. 252. — Duham. edit. nov. vol. 2. pag. 15. tab. 5.

Thuya srobilis tetragonis, quadrivalvibus; srobidibus compressis, articulatis, aphyllis. Vahl, Symb. 2. pag. 96. tab. 48.

Cupressus fructu quadrivalvi; foliis equiseti inflar articulatis. Schaw. Afriic. Specim. n^o. 184. Icon.

Cet arbre, très-différent du thuya cupressoides, n'est quelquefois qu'un arbrisseau peu élevé; quelquefois il parvient à la hauteur de quinze ou vingt pieds, lorsqu'il croît dans un sol plus fertile. Son tronc a de huit à quinze poises de diamètre; il se divise en rameaux étalés, ouverts presque en angle droit; les ramifications nombreuses, foliées, fragiles, vertes, articulées, striées; les articulations élargies à leur partie supérieure. Les feuilles sont fort petites, droites, inégales, mucronées à leur sommet, quaternées au sommet de chaque verticille, portant à leur base de fort petites glandes à peine sensibles.

Les fleurs mâles sont disposées en un cône un peu incliné, petit, ovale, légèrement tétragone, composé d'écailles disposées sur quatre rangs, au nombre de quatre à chaque rang, d'un jaune-pâle, pedicellées, en forme de bouchier; les fleurs femelles solitaires, situées à l'extrémité des rameaux, formant un cône tétragone, à angles obtus; quatre écailles ligneuses, épaisses, en forme de cœur, recouvertes longitudinalement à leur face extérieure, convexes en dedans, s'ouvrant de leur base à leur sommet; les deux plus grandes opposées, portant les semences; les deux autres stériles, plus petites; les femences petites, peu nombreuses, munies à leurs bords d'une aile membraneuse.

Cet arbre croît en Barbarie, au mont Atlas & sur les collines incultes. Th (V. v.)

D'après les observations de M. Broussonnet, cet arbre produit la résine connue dans le commerce sous le nom de sandarac, & qui se présente sous la forme de larmes claires, luisantes, presque transparentes, nettes, d'un blanc-jaunâtre. En la faisant dissoudre dans de l'esprit-de-vin, elle fournit un vernis assez tendre & qui s'égrenage aisément; réduite en poudre fine, elle sert à vernir le papier, à lui donner plus de consistance, & à l'empêcher de boire, surtout lorsqu'on a été obligé de le gratter pour enlever l'écriture. Cet arbre fournit-il exclusivement cette sorte de résine, ou bien est-elle également produite par le genévrier

perévrier commun lorsqu'il croît dans les pays chauds, ainsi qu'on l'a cru jusqu'alors?

4. *THUYA* à feuilles de cyprès. *Thuya eupref-foïdes*. Linn.

Thuya srobilis tetragono-globosa. Linn. Mant. pag. 125.

Thuya aphylla. Burn. Prodr. pag. 27.

5. *Cupressus* (aphylla), *foliis tubinatis*, *vaginatis*, *hinc mucronatis*; *frondibus imbricatis*. Linn. Amen. Academ. vol. 4. pag. 295.

Cette espèce, peu connue, paroît se rapprocher du *thuya articulata*, mais les rameaux ne sont point articulés; elle a aussi beaucoup de rapport avec les cyprès. Ses feuilles sont opposées, appliquées contre les tiges, turbinées, presque vaginales, mucronées. Les fruits sont presque globuleux, de la grandeur & presque de la forme de ceux du cyprès, à peine tétragones, mais se séparant longitudinalement en quatre lobes épais, carinés, chargés extérieurement de tubercules épars, aigus à leur sommet; plusieurs semences comprimées, terminées par une aile membraucuse, ovale.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. *h*

5. *THUYA* en doleur. *Thuya dolabrata*. Thunb.

Thuya srobilis squamifolia; *foliis trifariam imbricatis*, *subtus excavatis*, *niveis*. Thunb. Flor. jap. pag. 266.

Thuya (dolabrata), *frondibus ancipitibus*; *foliis trifariis incumbens*, *proliferis*, *convexis*, *viridibus*, *subtus excavatis*, *albis*. Linn. f. Supplem. pag. 427.

C'est un arbre très-élevé, un des plus beaux parmi les arbres verts, dont la cime est ample, fort étendue, composée de rameaux alternes, comprimés, chargés de feuilles imbriquées, assez ordinairement trois par trois, comprimées, ovales, tres-entières, obtuses à leur sommet, vertes, glabres & relevées par un sillon à leur face supérieure; bordées, concaves & d'un blanc de neige en dessous. Ses fleurs sont réunies en un cône composé d'écaillés imbriquées & scarieuses.

Cette plante croît naturellement au Japon. On la cultive & on en garnit les grandes routes. *h* (*Descript. ex Thunb.*)

Observations. J'ai observé dans l'herbier de M. de Jussieu quelques échantillons d'un *thuya* que l'on cultive, depuis quelques années, dans le Jardin botanique à l'île-de-France, & qui croît naturellement à l'île de Madagascar. Ses ramifications dernières sont quadrangulaires; ses feuilles petites, glabres, luisantes, imbriquées sur quatre

Botanique. Tome VII.

rangs; ses cônes composés d'écaillés creusées en dedans en carène; deux de ces écaillés sont opposées & plus petites que les autres. C'est cette espèce qui a été mentionnée, par les auteurs de la nouvelle édition des *Arbres & Arbustes* de Duhamel, sous le nom de

Thuya (quadrangularis), *ramulis quadrangularibus*; *srobilis squamifolia*; *squamis intus carinatis*; *duabus minoribus*, *oppositis*. L. c. vol. 1. pag. 16. n°. 6.

THYM. *Thymus*. Genre de plantes dicotylédones, à fl. urs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille des labiées, qui a de grands rapports avec les *thymra* & les *melissa*, & qui comprend des arbutules ou des herbes basses, odorantes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont agglomérées, axillaires ou terminales; les tiges droites ou couchées; les feuilles petites, ponctuées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice tubulé, à cinq dents, dont trois supérieures; orifice du tube fermé par des poils; corolle courte, labiée; levre supérieure un peu plane, échancrée; lobe du milieu de la levre inférieure entier ou échancré.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, persistant, divisé en deux lèvres, dont l'orifice est fermé par des poils; la levre supérieure plus large, relevée, plane, à trois dents; l'inférieure à deux découpures fines, égales.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, irrégulière; le tube de la longueur du calice; l'orifice étroit; le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure plus courte, plane, droite, échancrée, obtuse; l'inférieure plus longue, élargie, à trois lobes obtus; celui du milieu plus large, entier ou échancré.

3°. Quatre étamines didynames; les filaments un peu courbés; deux plus longs; les anthères petites.

4°. Un ovaire partagé en quatre, surmonté d'un style filiforme, terminé par un stigmate aigu, bisé.

Le fruit consiste en quatre semences petites, un peu arrondies, renfermées au fond du calice reffert à son orifice.

Observations. En bornant les thym à un très-petit nombre d'espèces, ils formeroient un genre naturel, qui comprendrait des plantes presque ligneuses, à petites feuilles opposées, sessiles, M m m

très-odorantes, ponctuées, un peu épaissies, & dont le caractère coulisseroit dans un calice à cinq dents subulées, l'orifice fermé par une rouffe de poils; la corolle divisée en deux lèvres; la lèvre inférieure entière. C'est ainsi que ce genre avoit été circonscrit par M. Lamarck, dans la première édition de la *Flore française*; il avoit formé de quelques autres espèces de thym de Linné & de plusieurs mélanges un genre particulier (le *calamintha* de Tournefort). Ce genre ne diffère des thym, en ne considérant que la fructification, que par un caractère bien faible, celui d'avoir le lobe moyen de la lèvre inférieure de la corolle échancre & non entier, mais le port des espèces est différent. Les tiges sont en général plus élevées; les feuilles plus grandes, plus larges; les fleurs bien plus nombreuses & plus apparentes; mais comme on a cru essentiel de n'établir les caractères des genres que sur les parties de la fructification, il est évident que les *calamintha* de M. Lamarck doivent être réunis aux thym, au moins par une sousdivision, ainsi que l'a fait M. Decandolle dans la nouvelle édition de la *Flore française*, en y réunissant la plupart des *melissa* de Linné, celles qui ont leur calice garni de poils à leur orifice. Comme ces espèces ont déjà été mentionnées dans cet ouvrage à l'article *MELISSE*, nous n'y revenons pas.

Le *thymus virginicus* de Linné forme aujourd'hui un genre particulier bien distinct, établi par Michaux, composé de trois espèces, qui seront mentionnées, à la fin des espèces de thym, avec leur caractère générique.

E S P È C E S.

1. THYM serpolet. *Thymus serpyllum*. Linn.

Thymus floribus capitatis, caulibus repentibus; foliis planis, oppositis, biseiliatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 825. — Flor. suec. 477. 553. — Mat. medic. 151. — Miller, Dict. n°. 5. — Cantz. Austr. pag. 177. — Scop. Carn. n°. 736. — Poll. Palat. n°. 174. — Ludw. F&E. tab. 121. — Kriph. Cent. 6. n°. 91. — Hoffm. Germ. 211. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 259. — vol. II. pag. 38. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 392. & Illustr. Gener. tab. 512. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 138 n°. 1.

Thymus foliis ovatis, basi ciliatis. Haller, Helv. n°. 235.

Thymus serpyllum, repens, foliis planis, floribus verticillato-spicatis. Hort. Cliff. 366. — Royen, Lugd. Bat. 325.

Serpyllum vulgare, minus. C. Bauh. Pin. 220. — Tourn. Inst. R. Herb. 197. — Vaill. Patif. tab. 32. fig. 7.

Serpyllum vulgare. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag.

269. Icon. — Dodon. Pempt. 277. — Blackw. tab. 418.

Serpyllum. Fuchs, 251.

2. *Serpyllum vulgare, majus*. C. Bauh. Pin. 220. — (*Flor. purpureo*.) Tournef. Inst. R. Herb. 197. — Sabbat. Hort. 3. tab. 69. — Vaill. Patif. tab. 32. fig. 8. 9.

3. *Serpyllum vulgare, minus; capitulis lanuginosis*. Tourn. Inst. R. Herb. 197. — C. Bauh. Pin. 220. — Vaill. Patif. tab. 32. fig. 40. 41.

4. *Serpyllum foliis citri odore*. C. Bauh. Pin. 220. — Tourn. Inst. R. Herb. 197.

Thymus citratus. Gater. Mont. 108.

Serpyllum citri odore. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 270. Icon. — Cluf. Pann. pag. 625. tab. 626.

Serpyllum citratum. Tabern. Icon. 360.

5. *Serpyllum angustifolium, glabrum*. C. Bauh. Pin. 220. — Tourn. Inst. R. Herb. 197.

Serpyllum angustifolium, glabroque folio. Cluf. Hist. 359. & Pann. pag. 628. Sine icon.

Vulgairement le serpolet ou thym sauvage.

Ses racines sont grêles, dures, ligneuses; elles produisent des tiges nombreuses, grêles, diffuses, très-rameuses, couchées sur la terre; les rameaux courts, un peu rougeâtres & velus, redressés lorsqu'ils sont en fleurs, garnis de feuilles petites, opposées, presque sessiles, variables dans leur forme & leur grandeur, ovales ou ovales lancéolées, planes, un peu fermes, souvent très-finement ponctuées, nervées en dessous, traversées en dessus par un filon longitudinal, ordinairement ciliées, surtout à leur base.

Les fleurs sont disposées en épis oblongs, ou quelquefois en tête, à l'extrémité des rameaux; ces épis composés de fleurs, ou solitaires, ou en petites grappes opposées, axillaires, pédicellées; leur calice d'un pourpre-violet ou un peu rougeâtre, divisé à son orifice en dents aiguës, inégales, ciliées à leurs bords; la corolle, ou purpurine, ou quelquefois tout-à-fait blanche, variable dans sa grandeur; les étamines tantôt plus courtes, tantôt aussi longues ou plus longues que la corolle. Les feuilles & la corolle sont plus grandes dans la variété 2. Dans la variété 3, qui mérite à peine d'être citée, on remarque de petites tiges blanches, veloutées ou cotonneuses, situées à l'extrémité des rameaux, occasionnées par la piqûre d'un insecte. Une odeur pénétrante de citron ou de mélisse des jardins distingue la variété 4. En général, ces diverses variétés, outre les dimensions des fleurs, offrent des feuilles, ou ovales presque arrondies & fort petites, ou ovales élargies, ou presque lancéolées, ou enfin étroites, aiguës.

Cette plante croît sur les pelouses, les collines, le long des chemins, dans les terrains secs, un peu arides. (P. v.)

Elle est céphalique, résolutive, tonique, nerveuse, astringente : on s'en sert contre la toux invétérée, les pâleurs, les douleurs de tête qui proviennent de la faiblesse de l'estomac, les douleurs scorbutiques, la faiblesse des nerfs. Il agit extérieurement comme sternutatoire. C'est un pâturage agréable, & une nourriture excellente pour les moutons & les chèvres ; il plaît beaucoup aux lièvres, aux lapins, aux abeilles. Il s'étend sur la surface des terres légères, dit M. Duraode, détruit peu à peu les autres plantes ; mais on le détruit lui-même en répandant du fumier : ce moyen de rendre les terres des prés fertiles, est de tout le plus assuré & le plus propre à en écarter les plantes inutiles ou nuisibles. Quelques-unes de ses variétés, surtout celle à odeur citronnelle, servent à orner les jardins. Elles forment des bordures agréables pour la vue, & qui méritent encore par leur odeur pénétrante.

2. THYM lanugineux. *Thymus lanuginosus*.

Thymus floribus capitatis, caulibus repentibus, hirsutis ; foliis obtusis, villosis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 118. n°. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 160.

Thymus lanuginosus, Schkuhr. Botan. Handb. 2. pag. 164. tab. 164.

Thymus serpyllum, Var. 2. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 825. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 392.

Serpyllum angustifolium, hirsutum. C. Bauh. Pin. 210. — Kniph. Centur. 6. n°. 92. — Tournef. Inst. R. Herb. 197.

Serpyllum angustifolium lanuginosae folio, J. Rauh. Hist. 3. pars 2. pag. 270. Icon. — Clus. Pann. 628. Icon.

1. *Thymus pannonicus*, Allion. Flor. pedem. n°. 77. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 160.

Serpyllum pannonicum tertium, Clus. Hist. 235. Icon.

Quoique cette plante ait été considérée comme une simple variété du *thymus serpyllum*, cependant, comme elle le montre constamment par la culture, qu'elle ne perd point les poils abondans qui recouvrent toutes ses parties, quelques auteurs l'ont considérée comme une espèce distincte.

Ses tiges sont grêles, couchées, dures, un peu ligneuses, divisées en rameaux nombreux, un peu redressés ; hérissées de poils nombreux, fins, blanchâtres. Les feuilles sont opposées, presque sessiles, petites, ovales ou un peu arrondies, entières, un peu obtuses, chargées, tant en dessus

qu'en dessous, de poils blancs, laineux. Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux en une tête ou un épi court, velu, garni de feuilles florales assez semblables à celles des tiges ; les calices très-velus, striés, colorés, à cinq dents subulées, ciliées ; la corolle purpurine, quelquefois blanche.

La plante a été rapportée, par M. Decandolle, à cette espèce, qu'il a jugé n'en devoir être qu'une variété. Elle a un aspect un peu plus cotonneux, blanchâtre : ses tiges sont plus hérissées, les feuilles ordinairement un peu plus grandes, plus ovales ; mais elle n'a ni les tiges droites, ni les calices glabres ; ce qui ne permet pas de la rapporter comme variétés au *thymus montanus*. Je la possède des montagnes de la Suisse.

Cette plante croît assez communément dans les départemens méridionaux de la France, sur les collines un peu arides. Je l'ai recueillie dans les environs de Laon & de Soissons. (P. v.)

Elle doit avoir les mêmes propriétés que le *thymus serpyllum* ; elle n'est pas moins agréable aux moutons, &c.

3. THYM lisse. *Thymus levigatus*, Vahl.

Thymus floribus capitatis, caulibus procumbentibus ; foliis linearibus, obtusis, sessilibus, basi angustatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 65. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 139. n°. 3.

Thymus serpyllum, Forsk. Flor. ægypt. arab. pag. 107.

Ses tiges sont médiocrement ligneuses, filiformes, étendues sur la terre, glabres à leur partie inférieure ; velues, de couleur cendrée dorement à leur partie supérieure ; les rameaux articulés ; les articulations forment une sorte d'anneau après la chute des feuilles. Celles-ci sont opposées, sessiles, linéaires, longues d'environ trois lignes, très-obtuses à leur sommet, rétrécies à leur partie inférieure, sans nervures apparentes, très-glabres à leurs deux faces, ciliées particulièrement à leur base, chargées, tant en dessus qu'en dessous, de poils fort petits, profonds.

Les fleurs sont disposées en une tête terminale, sessile, hémisphérique, environnée de plusieurs feuilles semblables en tout à celles des tiges, mais plus grandes. Les calices sont chargés de stries, élevées, pileuses, divisées à leur orifice en dents ciliées, subulées ; la corolle un peu velue ; les étamines plus longues que la corolle.

Cette plante croît dans l'Arabie-Heureuse, sur le Mont Chacra. (V. Vahl.)

4. THYM des montagnes. *Thymus montanus*, Willd.

Thymus floribus verticillatis ; pedunculis unifloris ;
M m m 2

caule erecto, ramoso; foliis ovatis, integerrimis; calicibus glabris. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 143.

Thymus montanus. Walz. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. Ined.

Thymus foliis ellipticis, hirsutis. Haller, Helv. n°. 236.?

Cette plante, qui ne peut être réunie au *thymus pannonicus*, a des tiges hautes d'un demi-pied, droites, rameuses; les rameaux tétragones, pubescentes sur leurs angles, garnis de feuilles petiolées, ovales, très entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, glabres & ponctuées à leurs deux faces, veinées en dessous.

Les fleurs sont situées, par verticilles, dans l'aisselle des feuilles, soutenus par des pédoncules simples; uniflores. Le calice est glabre, strié, divisé à son orifice en deux lèvres, la supérieure composée de trois dents glabres, oblongues, cuspidées; l'inférieure divisée en deux dents plus longues, lancéolées, subulées, ciliées.

Cette plante croît dans les Alpes Suisses, dans celles du Valais & du Piémont. (*Descript. ex Willd.*)

5. THYM commun. *Thymus vulgaris.* Linn.

Thymus caeruleus, foliis ovatis, revolutis; floribus verticillato-spicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 825. — Hort. Cliff. 305. — Hort. Upsal. 160. — Mater. medic. 151. — Royen, Lugd. Bat. 225. — Sauvag. Monsp. 148. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 247. — Pallas, Iter, pag. 72. — Kniph. Centur. 5. n°. 29. — Elackw. tab. 211. — Ladw. Ect. 123. — R. Gault, Botan. Icon. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 392.

Thymus vulgaris, folio tenuiore. C. Bauh. Pin. 219. — Tournef. Inst. R. Herb. 196. — Miller, Dict. n°. 2.

6. *Thymum vulgare, rigidius, folio cinereo.* J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 263. Icon.

7. *Thymus vulgaris, folio latiore.* C. Bauh. Pin. 219. — Miller, Dict. n°. 1. — Tournef. Inst. R. Herb. 196. — Sabbat. Hort. 3. tab. 68.

Thymum durius. Dodon. Pempt. 276.

8. *Thymus supinus, candicans, odoratus.* Tourn. Inst. R. Herb. 196.

9. *Thymus capitulis minoribus, Massiliensis.* Tourn. Inst. R. Herb. 196.

Vulgairement le thym, tin, la frigoûle, la pote.

Cette espèce, l'une des plus communes dans les contrées méridionales de la France, a des racines ligneuses, tortueuses; elles produisent des tiges droites, hautes de huit à dix pouces, li-

gneuses, presque cylindriques, cendrées ou d'un brun-rougeâtre, divisées, presque des leur base, en un grand nombre de rameaux opposés, forts grêles, légèrement velus, redressés, garnis de feuilles fort petites, opposées, filiformes, étroites, d'un vert-blanchâtre ou cendré, ovales, rouées à leurs bords, verdâtres en dessus, pubescentes en dessous, ponctuées, presque obtuses.

Les fleurs forment des épis courts, en forme de tête, verticillés, munis de feuilles florales peu différentes des autres. Les calices sont tubulés, sries, velus, divisés en deux lèvres; à cinq dents subulées, inégales, un peu ciliées; la corolle petite, blanchâtre ou légèrement purpurine. On distingue plusieurs variétés de cette plante. Les principales sont la variété *a*, à feuilles plus larges; dans la variété *y* les tiges sont en partie couchées, les feuilles & les rameaux revêtus d'un duvet blanchâtre, d'une odeur plus pénétrante; enfin dans la variété *δ* les épis de fleurs sont beaucoup plus petits.

Cette plante croît sur les collines sèches des départements méridionaux de la France, en Italie, en Espagne, dans la Sibirie, &c.

Le thym est cultivé dans les jardins potagers comme plante d'assaisonnement, & dans les terres à cause de son odeur aromatique très agréable, pénétrante. Le thym est tonique, astringent, stomachique, cordial, incisif, propre à rétablir les sécrétions; il convient aux personnes âgées, aux cacocymes, dans l'enclenchement, les fluxions catarrhales, les foiblesses d'estomac; on s'en sert extérieurement en fomentation pour ramener le ressort des parties foibles. Il est recherché avec avidité par la plupart des animaux herbivores, par les lièvres, les apins, les chèvres, les moutons, &c. On extrait du thym une huile essentielle assez abondante, qu'on emploie avec succès, dans un véhicule convenable, à la dose de quelques gouttes, contre la colique venteuse & la suppression des règles.

6. THYM-zygis. *Thymus zygis.* Linn.

Thymus floribus verticillato-spicatis; caule suffruticoso, erecto; foliis linearibus, oppositifolius, serratis, margine revolutis, basi ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 140 n°. 7.

Thymus floribus verticillato-spicatis; caule suffruticoso, erecto, foliis linearibus, oppositifolius, serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 826. — Kniph. Centur. 8. n°. 94. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 560.

Thymus ciliatus. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 392.

Thymra hispanica, coridis folio. Tournef. Inst. R. Herb. pag. 197.

Serpyllum silvestre, *tygis clusio*, *thymo vulgariori*, *rigniori simile*. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 271. Icon.

Serpyllum silvestre, *tygis Dioscoridis*. Clus. Hist. 3. pag. 358. Icon.

Thymum angustolobum folio. Barcel. Icon. Bar. tab. 777.

Cette espèce diffère peu du thym commun : on l'en distingue par son port, par ses feuilles ciliées à leur base, & réunies comme par paquets opposés, par son odeur bien moins pénétrante. Ses racines sont dures ; ses tiges droites, grêles, un peu ligneuses, médiocrement élevées, cylindriques, un peu velues, divisées en rameaux nombreux, diffus, recourbés avant la floraison, menus, de couleur grise ou cendrée, velus, garnis de feuilles presque sessiles, opposées, renfermés dans leurs aisselles d'autres feuilles plus petites, plus étroites, toutes linéaires, étroites, raboteuses, presque obtuses, roulées à leurs bords, pubescentes à leur face supérieure, quelquefois un peu rougeâtres & glabres en dessous, ciliées à leur base, pointues à leurs deux faces, sans nervures apparentes. Willdenow en cite une variété à feuilles pileuses.

Les fleurs sont disposées en épis verticillés, situés à l'extrémité des rameaux, garnis de feuilles florales peu différentes de celles des tiges. Les calices striés, velus, divisés en deux lèvres ; la supérieure à trois dents, l'inférieure à deux dents falcées. La corolle est petite, blanche ou légèrement purpurine.

Cette plante croît en Espagne, dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Montpellier, dans les lieux secs, parmi les bruyères. Je l'ai recueillie aux environs de Marseille. *h* (V. v.)

7. THYM de Marshall. *Thymus marschallianus*. Willd.

Thymus floribus verticillato-spiciatis ; caule suffrutescente, erecto ; foliis linearilanceolatis, obtusiusculis, planis, juxtaoppositis, basi ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 141. n° 8.

Thymus tygis. Pall. Nov. Act. Petrop. 10. pag. 313.

Cette espèce est très-différente du thym *tygis* : elle n'en a même le port que médiocrement. Ses racines produisent plusieurs tiges longues d'environ un demi-pied, rameuses dès leur base, droites ou redressées, cylindriques, pubescentes à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, très-médiocrement pétioles, longues d'environ huit lignes, larges d'une ligne & demie, linéaires-lanceolées, planes, rétrécies à leurs deux extrémités, un peu obtuses, glabres à leurs deux faces, marquées en dessous d'une triple nervure

peu sensible, pointues, entières, ciliées à leurs deux bords, particulièrement à leur partie inférieure.

Les fleurs sont verticillées ; les verticilles très-rapprochés & réunis en épis à l'extrémité des rameaux, les verticilles supérieurs munis de feuilles florales, semblables à celles des tiges, mais plus courtes, & marquées de trois nervures plus sensibles ; les calices sont striés, hérissés de poils ; les corolles plus longues que le calice. Cette espèce offre une variété à feuilles deux fois plus étroites.

Cette plante croît dans la Tauride, où elle a été recueillie par Marshall. *h* (*Descript. ex Willd.*)

8. THYM inodore. *Thymus inodorus*. Desfont.

Thymus caule frutescente, ramossimo ; foliis aciformibus, fasciculatis, confertis, flore brevioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 30. tab. 129. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 141. n° 9.

Petit arbuscule très-distinct par son port & par ses feuilles extrêmement courtes, fasciculées. Ses tiges sont dures, droites, longues d'environ un pied, très-rameuses ; les rameaux rapprochés des tiges, un peu tortueux, glabres, presque cylindriques, revêtus d'une écorce un peu rouillée, fendillée sur les vieux rameaux. Les feuilles sont nombreuses, fort petites, persistantes, dures, roides, touffues, réunies en paquets opposés, lanceolées, presque acérées, fort courtes, roulées à leurs bords, nervurées en dessous, ciliées.

Les fleurs sont disposées par verticilles nombreux, axillaires, pédicelles, plus longs que les feuilles ; le calice est grêle, cylindrique, strié, à cinq dents falcées, ciliées, les deux inférieures plus longues ; son orifice fermé par une touffe de poils blancs ; la corolle purpurine, plus longue que le calice, de la grandeur de celle du serotier ; la lèvre supérieure entière, obtuse ; l'inférieure à trois lobes ; les lobes presque égaux, arrondis ; quatre étamines didymes, plus courtes que la corolle ; un style un peu plus long que les étamines, terminé par deux stigmates aigus.

Cette plante croît sur les collines stériles & incultes, aux environs d'Alger, où elle a été découverte par M. Desfontaines. Elle fleurit dans le courant de l'hiver. *h* (*V. f. commun. Desfont.*)

9. THYM de Numidie. *Thymus numidicus*. Poiret.

Thymus floribus capitato-spiciatis, hirsutis ; foliis linearibus, glabris, integerrimis ; bracteis brevissimis. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. p. 187.

Thymus (numidicus), fruticulosus, erectus ; foliis linearibus, patulis, glabris, subius nervosis ; floribus capitatis ; bracteis ovato-lanceolatis, ciliatis ;

callicibus hirsutis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 140. n°. 6.

C'est un très-petit arbrisseau assez élégant, haut de cinq à six pouces au plus, dont les racines sont grêles, ligneuses, un peu tortueuses, garnies de quelques filaments capillaires; ses branches sont chargées presque de leur base de rameaux nombreux, épars, presque opposés, étalés, fort menus, presque simples, un peu anguleux, droits, légèrement pubescens à leur partie supérieure, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, plus longues que les entre-nœuds, très-ouvertes, étroites, linéaires, très-entières, glabres à leurs deux faces, nerveuses & ponctuées en dessous, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, longues de quatre à cinq lignes, larges d'un peu plus d'une demi-ligne, contenant dans leurs aisselles des fascicules de feuilles au moins une fois plus petites, plus étroites.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux en épis courts, un peu oblongs, épais, capités, ferrés, velus, garnis de bractées ovales, lancéolées, nerveuses, aiguës, élargies à leur base, ciliées, ponctuées, de la longueur des fleurs; le calice très-velu, strié, coloré, ponctué, à cinq dents setacées, fortement ciliées de longs poils blanchâtres; la corolle petite, de couleur rose ou un peu purpurine; les étamines plus longues que la corolle; les anthères un peu globuleuses, à deux lobes; le style presque de la même longueur que les étamines; deux stigmates aigus.

J'ai recueilli cette plante sur les côtes de Barbarie, dans les environs de Taccala, aux lieux arides & pierreux. ♀ (V. v.)

* 10. THYM d'Espagne. *Thymus hispanicus*. Hort. Paris.

Thymus fruticosus, suberectus; foliis linearibus, ciliatis; floribus capitatis, subulosis. (N.)

Cette espèce a de très-grands rapports avec notre *thymus numidicus*; ce ne sont peut-être que deux variétés; celle-ci néanmoins s'en distingue par ses feuilles ciliées à leurs bords, par ses têtes de fleurs plus petites, presque glabres ou médiocrement velues; par ses bractées moins élargies. Ses tiges sont dures, grêles, ligneuses, en partie couchées à leur base, redressées, hautes de cinq à six pouces, munies de rameaux nombreux, opposés, un peu ramifiés, fort menus, presque quadrangulaires, pubescens vers leur sommet, garnis de feuilles opposées, sessiles, étroites, linéaires, entières, à peine aiguës à leur sommet, nerveuses & ponctuées, longues de quatre lignes, larges d'une demi-ligne, ciliées à leurs bords, munies, surtout les inférieures, d'autres feuilles plus petites dans leurs aisselles, plus longues que les entre-nœuds.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, de petites têtes courtes, verticillées; les calices tubulés, striés, de couleur purpurine sur les frites, parsemés de quelques poils rares, fins, cendrés, terminés par cinq dents presque setacées, ciliées; l'orifice garni d'une touffe de poils très-blancs; la corolle plus longue que le calice, un peu purpurine; les étamines un peu plus longues que la corolle; les anthères à deux lobes; le stigmate bifide.

Cette plante croît en Espagne; je l'ai aussi observée sur les côtes de l'Afrique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

11. THYM lancéolé. *Thymus lancetolatus*. Desf.

Thymus caule fruticoso, villosa; foliis lancetatis, obtusis, integerrimis; floribus densis spicatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 30. tab. 128.

Thymus floribus verticillato-spiciatis; caule fruticoso, erecto; foliis oblongis, planis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 140. n°. 5.

Arbrisseau remarquable par ses feuilles grandes, lancéolées, pubescentes. Ses tiges, un peu couchées à leur partie inférieure, se divisent presque dès leur base, en rameaux cylindriques, ligneux, droits, longs de huit à dix pouces & plus, nombreux, simples ou ramifiés, pubescens, garnis de feuilles opposées, pétioles, plus longues que les entre-nœuds, assez nombreuses, ovales-lancéolées, obtuses, nerveuses en dessous, très-entières, pubescentes, ponctuées & glanduleuses, longues de six à sept lignes, larges au moins de quatre.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un épi cylindrique, épais, obtus, long de deux à trois pouces, composé de verticilles très-rapprochés, muni de bractées lancéolées, très-entières, plus longues que les fleurs. Le calice est tubulé, cylindrique, strié, pubescent, finement perforé, à cinq dents ciliées, setacées; les deux inférieures plus longues; l'orifice garni de poils très-blancs; la corolle purpurine, glanduleuse, plus longue que le calice, de la grandeur de celle du thym commun; la levre supérieure droite, obuse, échancrée; l'inférieure à trois lobes oblongs, obtus, très-entiers; celui du milieu un peu plus grand; les anthères courtes, bilobées, couleur de rose; les filaments plus longs que la corolle; un style filiforme; deux stigmates aigus.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans le mont Atlas, aux environs de Tlemcen. ♀ (V. f. comm. Desfont.)

12. THYM des champs. *Thymus acinos*. Linn.

Thymus floribus verticillatis; pedunculis unifloris; caulibus cretulis, subramosis; foliis oblongis, acutis, serratis Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 142. n°. 10.

Thymus floribus verticillatis; pedunculis unifloris; caulibus cretulis, subramosis; foliis acutis, serratis Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 826. — Flot. furc. 478. — Pollich, Palat. n°. 575. — Crantz. Austr. pag. 277. — Scopol. Carn. n°. 735. — Kniph. Centur. 8. n°. 93. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 561. — Buliard, Herb. tab. 318.

Thymus caulibus vix ramosis; foliis ovatis, acutis; pedunculis pluribus unifloris Hort. Clif. 306. — Roy. Lugd. Bat. 325. *

Calamintha arvensis Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 394.

Acinos thimoides Mœnch. Method. 407.

Clinopodium foliis ovatis, dentatis; flore folio brevior Haillet, Helv. n°. 237.

Clinopodium arvense, ocyimi facie C. Bauhin, Pinn. 225. — Tourn. Init. R. Herb. 195.

Acinos multis J. Bauh. Hist. 3. pars 1. pag. 259. Icon.

Ocimum silvestre, acinos Dodon. Pempt. pag. 180. Icon.

Clinopodium vulgare Lobel. Icon. 506.

Acinos Rivin. tab. 43.

Vulgairement petit basilic sauvage, roulette, clinopode champêtre.

Ses racines ont une ou plusieurs tiges assez ordinairement un peu couchées, quelquefois droites, presque cylindriques, grêles, légèrement pubescentes, hautes de six à dix poices, un peu dures, rameuses; les rameaux opposés, ouverts, presque simples, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, un peu lancéolées, d'une grandeur médiocre, plus courtes que les entre-nœuds, presque glabres à leurs deux faces, légèrement velues à leurs bords, entières ou munies assez souvent de deux dents de chaque côté, à leur partie supérieure à vertes en dessus, plus pâles & quelquefois blanchâtres en dessous, aiguës à leur sommet, tétrécées à leur base en un pétiole court.

Les fleurs sont souvent solitaires dans les aisselles des feuilles inférieures, réunies cinq à six presque en verticilles aux feuilles supérieures, supportées par des pédoncules très-simples, pubescens. Leur calice a des fibres nombreuses & filamenteuses, un peu velues; il est tubulé, coloré, renflé à sa base à la maturité des semences, divisé en cinq petites dents courtes, aiguës; la corolle

purpurine ou un peu rougeâtre, tachée de blanc à la lèvre inférieure; le lobe du milieu échancré; les étamines plus courtes que la corolle. J'ai recueilli en Provence une variété de cette plante beaucoup plus velue sur toutes les parties.

Cette plante se rencontre en Europe, dans les lieux secs & pierreux. ○ (V. v.)

Elle est céphalique, astringente, résolutive, recherchée par les moutons, les chevaux, quelquefois par les vaches; les chèvres n'en veulent point.

13. THYM des Alpes. *Thymus alpinus* Linn.

Thymus verticillis sexfloris; foliis subrotundis, obtusifolius, concavis, serratis; corollis infatis Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 140. n°. 12.

Thymus verticillis sexfloris; foliis obtusifolius, concavis, subserratis Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 826. — Jacq. Flor. austr. vol. 4. pag. 60. tab. 97. — Scopol. Carn. n°. 734. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 562.

Calamintha alpina Lam. Flot. franç. vol. 2. pag. 394.

Acinos alpinus Mœnch. Method. pag. 407.

Thymus montanus Crantz. Austr. pag. 278.

Clinopodium foliis ovatis, acutis, serratis; flore folio majori Hail. Helv. n°. 238.

Clinopodium austriacum Rivin. Pann. pag. 622. 623. — Clus. Hist. pag. 353.

Clinopodium montanum C. Bauh. Pin. 215. — Boccon. Mus. 2. pag. 50. tab. 45. — Tourn. Init. R. Herb. pag. 196.

Acini pulchra species J. Bauh. Hist. 3. pars 1. pag. 620. Icon.

Très-rapprochée du *thymus acinos*, cette espèce s'en distingue par ses feuilles plus larges, par ses fleurs deux & trois fois plus grandes. Ses racines, dures, ligneuses, produisent des tiges droites, cylindriques, roides, un peu ligneuses, pubescentes, divisées en rameaux opposés, un peu triangulaires, légèrement velus, simples, garnis de feuilles presque une fois plus grandes que celles du *thymus acinos*, opposées, médiocrement pétiolées, ovales, vertes à leurs deux faces, quelquefois un peu plus pâles en dessous, presque glabres, entières ou à peine denticulées à leurs bords, aiguës à leur sommet, finement ponctuées, tétrécées à leur base; les feuilles inférieures un peu arrondies, presque obtuses.

Les fleurs sont situées dans les aisselles des feuilles, réunies en verticilles, ordinairement au nombre de quatre à chaque verticille, médiocrement pédonculees; les pédoncules courts, simples, uni-

flores, velus; leur calice verdâtre, renflé, fortement strié, hérissé de poils courts; la corolle de couleur violette ou bleuâtre, quelquefois blanche, au moins une fois plus longue que le calice, à deux lèvres; la lèvre inférieure à trois lobes; celui du milieu échancré; les étamines à peine de la longueur de la corolle.

Cette plante croît dans les terrains pierreux, sur les rochers, en Suisse, en Allemagne, dans les départemens méridionaux de la France, à Fontainebleau. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

14. THYM hétérophylle. *Thymus heterophyllus*.

Thymus foliis caulinis & inferioribus ovato-spathulatis; ramis lanceolatis, sessilibus, subdentatis; floribus verticillatis, subsessilibus. (N.)

Cette espèce a des rapports avec le *thymus alpinus*; elle en diffère par ses feuilles plus petites, variées dans leur forme; par ses fleurs beaucoup plus petites. Les tiges sont cylindriques, divisées en rameaux opposés, quadrangulaires, d'un brun-rougeâtre, grêles, pubescens; les feuilles opposées; celles des tiges, & principalement les inférieures, ovales, un peu obtuses, épaisses, presque entières, assez petites, à peine pubescentes, rétrécies à leur base en un pétiole un peu allongé; ce qui les rend presque spatulées; les feuilles supérieures, surtout celles des rameaux, sessiles, lancéolées, plus étroites, plus allongées, aiguës à leur sommet, munies à leurs bords & vers leur sommet de quelques dents courtes, en scie.

Les fleurs sont presque sessiles ou à peine pédonculées, réunies en verticille dans l'aisselle des feuilles, munies de petites bractées courtes, à peine sensibles; le calice fortement strié, renflé à sa partie inférieure, velu sur ses stries, garni de quelques poils à son orifice, terminé par cinq dents subulées, presque égales, un peu ciliées. La corolle est purpurine ou couleur de rose, petite, un peu plus longue que le calice.

Cette espèce est bien moins velue que le *thymus acinus*; ses feuilles supérieures bien plus étroites, lancéolées; elle en diffère encore par son port. Je possède cette espèce des Alpes de la Suisse. ♀ (V. f.)

15. THYM de Padoue. *Thymus patavinus*. Jacq.

Thymus floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus ramosis, ascendens; foliis subserratis. Jacq. Obsev. boran. vol. 4. pag. 7. tab. 87. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 28.

Thymus (patavinus). floribus verticillatis, sauce inflata, calice longiore; foliis ovatis, serratis; caulibus suffrutescentibus. Art. Hort. Kew. vol. 1. pag. 314. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 142. n°. 11.

Clinopodium perenne, pulgii odore, majorana folio, patavinum. Boccon. Mus. pag. 60. tab. 45. fig. B.

Quoique cette plante ait de très-grands rapports avec le *thymus alpinus*, elle paroît devoir en être distinguée comme espèce par plusieurs caractères qui lui sont particuliers. Son port n'est pas le même; les feuilles sont plus arrondies, plus longuement pétiolées; les fleurs moins grandes; les calices plus allongés.

Ses tiges sont droites ou un peu coudées à leur base, longues au moins d'un pied, simples ou divisées presque à leur base en longs rameaux simples, droits, rapprochés, quadrangulaires, pubescens, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales-arrondies, quelques-unes entières; la plupart finement dentées en scie vers leur sommet, verdâtres, un peu velues, nerveuses, ponctuées, finement aiguës à leur sommet; les pétioles comprimés, presque aussi longs que les feuilles.

Les fleurs sont disposées par verticilles dans les aisselles des feuilles, au nombre de six ou dix, soutenues par des pédoncules très-courts, simples, uniflores, velus. Le calice est allongé, verdâtre ou cendré, marqué de dix à douze stries faillantes, chargé de poils roides, grêles; l'orifice terminé par cinq dents serrées, roides, un peu courbées; les deux inférieures plus courtes; la corolle violette ou couleur de rose, un peu plus longue que le calice, semblable à celle du *thymus acinus*, mais un peu plus grande; les étamines renfermées dans la corolle.

Cette plante croît sur les collines & dans les sols arides, en Hongrie, dans les contrées méridionales de l'Europe, & en Barbarie aux environs de Mascara. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

16. THYM poivré. *Thymus piperella*. Linn.

Thymus pedunculis multifloris, lateribus; foliis ovatis, obtusis, glabris, nervosis, integerrimis. Linn. Syst. veget. pag. 542. — Allioni, Flor. pedem. n°. 81. tab. 37. fig. 1. — Vahl, Symb. 2. pag. 67. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 28. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 143. n°. 14. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 562.

Martum hispanicum, nigrum; flore purpureo, piperella. Barrel. Icon. Rar. 354. tab. 694. — Boccon. Mus. 2. pag. 166. tab. 117.

Thymus (imbricatus), caulibus decumbentibus, imbricatis; foliis ovatis, acutis; floribus axillaribus, solitariis, sessilibus. Forsk. Flor. ægypt. arab. 108. ?

Ses tiges sont très-étalées, ligneuses à leur partie inférieure, couchées en partie, rameuses, presque

presque cylindriques; les rameaux glabres, re-trecis, un peu grêles, un peu rougeâtres, garnis de feuilles petites, un peu pétioles, ovales, obtuses, un peu épaisses, très-entières, glabres à leurs deux faces, rétrécies à leur base en un pétiole court, vertes, luisantes en dessus, plus pâles & même un peu blanchâtres & nerveuses en dessous, ponctuées; les supérieures fort distantes, d'une odeur aromatique très-agréable lorsqu'on les écrase entre les doigts.

Les fleurs sont situées dans les aisselles des feuilles supérieures, supportées par un pédoncule commun, qui se divise, presque dès sa base, en deux ou trois pédicelles, chacun terminé par une seule fleur; le calice étroit, ponctué, presque glabre, élargi à son ouverture, à cinq dents étacées, ciliées; les deux inférieures plus profondes, recourbées; la corolle pourpre ou un peu rougeâtre; le tube un peu plus long que le calice, point renflé à son orifice; le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure échancrée en cœur; l'inférieure à trois lobes; celui du milieu échanuré.

Cette plante croît sur les rochers, en Espagne, dans les Alpes maritimes du Piémont, en Barbarie, sur les collines incultes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. \mathfrak{H} (V. v.)

17. THYM mastichine. *Thymus mastichine*. Linn.

Thymus verticillis lanuginosus; dentibus calicinis setaceis, pilosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 827. — Mantiss. 413. — Hort. Cliff. 306. — Hort. Ups. 160. — Gronov. Orient. 73. — Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 29.

Thymus floribus verticillatis; calicibus lanuginosis; dentibus calicinis setaceis, villosis. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 145. n°. 20.

Thymbra hispanica, majorana folio. Tourn. Inst. R. Herb. 197.

Marum vulgare, clinopodium. Dodon. Pempt. pag. 271. Icon. — Blackw. tab. 134.

Marum. Tabern. Icon. 341. — Rivin. tab. 40. Bona. — Gerard, Hist. 670. Icon.

Marum, an helenium odorum Theophrasti? Lobel. Icon. 499.

Tragorizonum primum. Clus. Hist. 355. Icon.

Samysucus, five marum mastichen redolens. C. Bauh. Pin. 224.

Clinopodium quibusdam, mastichina Gallorum. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 243. Icon.

C'est un arbrisseau d'un port assez agréable, qui répand une odeur aromatique, pénétrante & suave. Ses tiges sont droites, hautes de deux pieds & plus, ligneuses, glabres, divisées en rameaux presque cylindriques, pubescents dans leur jeunesse ou char-

Botanique. Tome VIII.

gés d'un duvet très-court, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, ovales-oblongues, entières, rarement denticulées, un peu épaisses, glabres à leurs deux faces, à peine pubescentes dans leur jeunesse, ordinairement obtus à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, chargées de pores glanduleux, longues de trois à cinq lignes, larges d'environ deux lignes & demie.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en un épi terminal, épais, en très-oblongue, serrée, composée de verticilles très-rapprochés, excepté les inférieurs; munis de bractées ovales, ponctuées, presque glabres; les supérieures plus courtes que le calice, un peu ciliées. Le calice est chargé de poils lanugineux, d'un blanc-grisâtre; il se divise à son orifice en cinq dents très-longues, subulées, filiformes; les deux inférieures plus longues, ciliées; les cis longs, nombreux. La corolle est blanche, plus courte que le calice, chargée de points transparents; son limbe divisé en deux lèvres; la supérieure droite, courte, obtuse; l'inférieure divisée en trois lobes; les lobes arrondis.

Cet arbrisseau croît dans les lieux pierreux, en Espagne, & dans les montagnes incultes & sablonneuses proche Mascat & Tienfen, en Barbarie. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. \mathfrak{H} (V. v.)

18. THYM de Browne. *Thymus Brownei*. Sw.

Thymus foliis orbiculatis, crenatis; floribus pedunculatis, axillaribus. Swartz, Prodrum. 189. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 144. n°. 15.

Thymus minimus, herbaceus; foliis orbiculatis, crenatis; floribus singularibus ad alas. Browne, Jam. pag. 259.

Cette espèce est fort petite, herbacée; ses tiges grêles, un peu rameuses, sont garnies de feuilles opposées, orbiculaires, crenelées à leur contour. Les fleurs sont pédonculées, axillaires, presque solitaires; leur calice grêle, tubulé, velu à son orifice, à cinq dents aiguës; la corolle monopétale, à deux lèvres; la supérieure médiocrement bise, l'inférieure à trois lobes planes; celui du milieu plus grand, échanuré en cœur.

Cette plante croît à la Jamaïque.

19. THYM à tiges filiformes. *Thymus filiformis*. Aiton.

Thymus floribus axillaribus, solitariis, pedunculatis; foliis cordatis, acutis, integerrimis, petiolatis; caulibus filiformibus, decumbentibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 313. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 144. n°. 16.

Ses racines sont grêles, fibreuses; elles pro-

Nnn

duisent une tige qui, presque dès sa base, se divise en rameaux nombreux, fort menus, presque filiformes, érales, presque couchés, longs de quatre à cinq pouces, un peu pubescents, presque quadrangulaires, médiocrement ramifiés, munis de feuilles opposées, légèrement pétiolées, petites, ovales, glabres à leurs deux faces, verdâtres, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, nerveuses & quelquefois rougeâtres en dessous, soutenues par des pétioles courts.

Les fleurs sont petites, axillaires, solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, à peine de la longueur des feuilles, supportées par un pédoncule court, filiforme, très-simple, un peu pubescent, assez souvent muni dans son milieu de deux petites bractées opposées, subulées. Le calice est rubilé, presque glabre, strié, pubescent sur les filices, termine par cinq dents subulées, presque égales, à peine ciliées; la corolle petite, un peu plus longue que le calice, purpurine ou blanchâtre.

Cette plante croît aux îles Baléares. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Th* (V. v.)

20. THYM de Ténédiffe. *Thymus Teneriffa*.

Thymus foliis ovato-oblongis, subacutis; pedunculis multifloris, caulibus decumbentibus, ramis filiformibus. (N.)

Ce thym, qui paroît tenir le milieu entre le *thymus filiforme* & le *thymus piperelle*, se distingue à ses tiges ligneuses, grêles, couchées, nombreuses ou composées dès leur base de longs rameaux cylindriques, divisés en d'autres très-glabres, filiformes, allongés, bruns ou cendrés, garnis de feuilles sessiles, opposées, fort petites, plus courtes que les entre-nœuds, ovales ou un peu oblongues, à peine aiguës à leur sommet, dures, glabres à leurs deux faces, entières, striées; celles des jeunes tiges plus rapprochées, plus étroites, aiguës.

Les fleurs sont disposées en épis grêles, lâches, sessiles, situés latéralement le long des rameaux; les pédoncules courts, pubescents, supportant deux ou trois fleurs & plus extrêmement petites; leur calice tubulé, étroit, un peu velu, terminé par cinq petites dents très-courtes, très-fines, égales, pubescentes; la corolle un peu violette ou purpurine, plus longue que le calice.

Cette plante croît à l'île de Ténédiffe. *Th* (V. f. in herb. Lam.)

21. THYM hérissé. *Thymus hirsutissimus*.

Thymus foliis ovato-lanceolatis, subsessilibus, hirsutis; specie capitato-subverticillatis, bracteis ciliato-hirsutis. (N.)

Ses tiges sont droites, peu élevées, ligneuses,

glabres, cylindriques, très-rameuses; les rameaux droits, courts, presque fasciculés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, petites, ovales-lanceolées; les supérieures un peu plus allongées, lanceolées, rétrécies en un pétiole très-court, aiguës à leur sommet, très-entières, fermes, pointillées, parsemées de poils rudes, blanchâtres, bulbueuses à leur base; plus longues que les entre-nœuds.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en épis courts, en tête, rousus, très-velus, munis de bractées lanceolées, presque aussi longues que les fleurs, ciliées ou hérissées vers leurs bords de poils rudes, blanchâtres, nombreux. La corolle est légèrement purpurine, un peu plus longue que le calice; celui-ci est tubuleux, ouvert à son orifice, terminé par cinq dents subulées, acuminées, presque épineuses, presque égales, légèrement ciliées.

Cette plante croît naturellement dans le levant; elle a été cultivée dans le jardin de M. Cels. *Th* (V. f.)

22. THYM à grosse tête. *Thymus cephalotes*. Linn.

Thymus capitatus laxè imbricatus; bracteis latè ovatis, coloratis, impunctatis; foliis linearibus, integerrimis. Vahl, Symb. 3. pag. 77. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 144 n°. 17.

Thymus capitatus imbricatus, magnis; bracteis ovatis, foliis lanceolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 826. — Miller, Dict. n°. 3.

Thymus lusitanicus, cephalotes; squamis capitulorum amplioribus. Tournef. Inst. R. Herb. 196.

Tragoragnum distamnicae capite, hispanicum. Barrél. Icon. Rat. tab. 788. — Boccon. Mus. 2. pag. 50. tab. 43.

8. *Thymus lusitanicus, cephalotes, capitulo majori.* Tournef. Inst. R. Herb. 196.

9. *Thymus lusitanicus, cephalotes, capitulo minori.* Tournef. Inst. R. Herb. 196.

On distingue aisément cette espèce à ses épis garnis de larges bractées colorées, sous lesquelles les fleurs sont entièrement cachées. Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges droites, ligneuses, un peu tortueuses, glabres, cylindriques, hautes de six à dix pouces & plus, munies de rameaux droits, rapprochés & presque fasciculés, ramifiés à leur partie supérieure, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, linéaires, un peu lanceolées, très-entières à leurs bords, presque glabres, un peu blanchâtres ou cendrées, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base presque en pétiole très-court.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges

& des rameaux en une tête épaisse, un peu alongée, obtuse, cylindrique, garnie de bractées imbriquées, très-grandes, larges, ovales, colorées, point ponctuées, veinées, un peu aiguës, très-entières; les fleurs sont cachées entièrement sous ces larnes bractées; elles font un peu pédicellées; les calices droits, tubulés, légèrement striés, terminés à leur orifice par cinq dents subulées, un peu inégales; la corolle blanchâtre, petite.

Cette plante se trouve dans l'Espagne & le Portugal. *h* (*V. f.*)

Ses propriétés sont à peu près les mêmes que celles du thym commun, mais plus foibles: elle n'a qu'une légère odeur aromatique.

23. THYM strié. *Thymus striatus.*

Thymus capitatus acule imbricatis, bracteis ovatis foliisque linearilanceolatis, striatis, margine punctatis. Vahl, Symbol. vol. 1. pag. 78. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 144. n°. 18.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *thymus cephalotes*: des caractères qui lui sont particuliers doivent cependant la faire distinguer comme espèce. Ses tiges sont moins hautes, ligneuses, très-roides, presque simples, rameuses seulement à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, plus larges, linéaires-lanceolées, redressées, striées à leur face inférieure, légèrement dentées en scie à leur contour, ponctuées, mais seulement vers leurs bords. Les fleurs sont réunies en têtes terminales plus petites; les bractées bien moins élargies, plus fortement imbriquées, striées & ponctuées.

Cette plante se trouve dans le royaume de Naples. *h*

24. THYM velu. *Thymus villosus.* Linn.

Thymus capitatus imbricatis, magnis; bracteis dentatis; foliis fuscis, pilosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 827. — Miller, Dict. n°. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 145. n°. 19.

Thymus lufitanicus, folio capillaceo, villosa; capite magno, purpurascens, oblongo. Tournef. Inf. R. Herb. 196.

Thymus lufitanicus, folio capillaceo, villosa; capite magno, purpurascens, rotundo. Tournef. Inf. R. Herb. 196.

Cette plante a des tiges droites, ligneuses, fort menues, hautes de six à huit pouces, chargées de poils cendrés, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, sessiles, très-étroites, presque sétacées, velues, les inférieures contenant dans leurs aisselles des paquets d'autres feuilles un peu plus courtes; les feuilles supérieures foliaires, distantes, opposées.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en une tête assez forte, ordinairement un peu alongée, quelquefois arrondie, garnie de bractées grandes, imbriquées, serrées, purpurines, ovales, dentées à leur contour, aiguës à leur sommet; les fleurs à peine plus longues que les bractées, légèrement pédunculées; le calice tubulé, un peu strié, terminé à son orifice par cinq dents subulées, inégales; la corolle de couleur purpurine, de la grandeur de celle du thym commun.

Cette espèce croît naturellement dans le Portugal. *h*

25. THYM faux origin. *Thymus tragariganum.* Linn.

Thymus floribus verticillatis; caule suffruticoso, erecto; foliis hispatis, acuminatis. Linn. Mantiff. 8. — Turc. Farct. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 145. n°. 21.

Tragariganum creticum. C. Pash. Pin. 223. — Rai, Hist. 1. pag. 523.

Tragariganum magnum. Prosp. Alp. Exot. pag. 79. tab. 78.

Tragariganum secundum, altera species. Claf. Hist. 1. pag. 355. Icon.

Ce thym est très-odorant; il est muni de racines dures, tortueuses, divisées en plusieurs branches presque simples; elles produisent des tiges nombreuses, cylindriques, un peu épaisses, velues, droites, hautes d'un pied & plus, rameuses; les rameaux opposés, un peu grêles, garnis de feuilles sessiles, opposées, un peu roides, étroites, linéaires, lanceolées, velues, citées à leurs bords, acuminées à leur sommet, très-pointues à leur base, contenant d'autres feuilles dans leurs aisselles; ce qui les fait paroître verticillées.

Les fleurs sont disposées par verticilles vers l'extrémité des rameaux, un peu plus longues que les feuilles florales, légèrement pédunculées; les pédoncules velus; le calice tubulé, strié, un peu velu sur les bords, à cinq dents subulées. La corolle est petite, bleueâtre, un peu plus longue que le calice; son limbe divisé en deux lèvres, l'inférieure à trois lobes.

Cette espèce croît dans l'île de Crète.

Les feuilles & les fleurs en infusion forment l'estomac, d'après Prosper Alpin; infusées dans du vin, elles soulagent dans les coliques venteuses.

26. THYM de Caroline. *Thymus carolinianus.* Mich.

Thymus erecto-caespitosus, foliis glabris, ovalibus, subintegris; verticillis à binis fasciculis subsessilibus,
Nonn 2

calicibus subtrifido-bilobatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 9.

Thymra caroliniana. Walter. Flor. carol. pag. 162.

Ses tiges sont droites, nombreuses, réunies en gazon, garnies de feuilles opposées, ovales, presque sessiles, glabres à leurs deux faces, presque entières à leurs bords. Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles par verticilles en deux paquets médiocrement pédicellées; le calice à deux lèvres, presque trifide, garni de poils à son orifice.

Cette plante croît dans la Caroline & la Géorgie, sur les bords du fleuve Savannah, proche la ville d'Augusta. (Mich.)

* *Brachystemum*. Mich.

27. THYM de Virginie. *Thymus virginicus*. Linn.

Thymus capitatus terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis. Linn. Syst. veget. pag. 455. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 145. n°. 12.

Satureia virginiana. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 793. — Herm. Patadis. pag. 218. tab. 218. — Miller, Dict. n°. 4.

Pulegium erectum, virginianum, angustifolium, floribus in cymis oppositis. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 371. §. 11. tab. 7. fig. 8.

Clinopodium foliis lanceolatis, acuminatis; capitulis terminalibus. Hort. Cliff. 304. — Gronov. Virgin. 65. — Royen, Lugd. Bat. 314.

Thymus cephalotos, autumnalis, longiore folio. Tournef. Inst. R. Herb. 196.

Clinopodium pulegii angusto rigidoque folio, virginianum, sessilibus in cymis dispositis. Pluken. Almag. pag. 110. tab. 54. fig. 2.

Serpentaria virginiana. Boccon. Mus. 2. pag. 161. tab. 115.

Satureia floribus in summitate dispositis. Hort. Lugd. Bat.

Brachystemum (virginicum), caule strille erecto, pube aspersu scula; foliis lanceolatis vel linearibus, integerrimis, globellus; capitulis subsessileculotis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 6.

Cette plante & les deux suivantes forment, dans la Flore de l'Amérique septentrionale de Michaux, un genre particulier, qu'il a établi sous le nom de *brachystemum*, mot composé de deux mots grecs, (*brachys*, brevis; *stemon*, *flamen*), qui signifient étamines courtes. Cette réforme étoit nécessaire par l'embarras que causoit la plante dont il est ici question; elle n'avoit ni le port ni le caractère des thymus, son calice étant privé de poils à son

orifice; elle n'appartenait pas davantage au *satureia*, auquel Linné l'avoit d'abord réunie. La découverte de deux nouvelles espèces qui s'y rapportoient par leur port & leur caractère, facilitoit la formation d'un nouveau genre, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice tubulé, à cinq dents courtes; orifice dépourvu de poils; filaments très-courts, didynames.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice tubulé, muni à son orifice de cinq dents courtes, droites, presque égales, aiguës; l'orifice ouvert, dépourvu de poils.

2°. Une corolle labiée, dont le tube est grêle, de la longueur du calice; le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure courte, sailante, légèrement échancrée; la lèvre inférieure plusieurs fois plus grande, à trois lobes obtus, celui du milieu prolongé, presque en languette.

3°. Quatre étamines renfermées dans le tube, dont les filaments sont très-courts, didynames; les anthères petites.

4°. Quatre ovaires oblongs, surmontés d'un seul style, terminé par deux stigmates agnus.

Les semences oblongues, cylindriques, renfermées dans le fond du calice persistant.

Le thym de Virginie a des tiges droites, roides, hautes d'un à deux pieds, cylindriques, d'un brun-rougeâtre, glabres, striées, divisées en rameaux opposés, étalés, un peu cylindriques à leur base, tétragones à leur partie supérieure, chargés d'un duvet court, un peu rude; des ramifications nombreuses, courtes, opposées. Les feuilles sont sessiles, opposées, lancéolées, plus longues que les entre-nœuds, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, arrondies à leur base, d'un vert-tendre, glabres à leurs deux faces, ponctuées, un peu plus pâles en dessous, nerveuses à leur face inférieure, longues d'un pouce & plus, larges au moins de quatre lignes. Les feuilles des ramifications plus étroites, presque acuminées à leur sommet; la plupart un peu rétrécies à leur base.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux, en têtes presque globuleuses ou hémisphériques, fasciculées, très- serrées, l'ensemble des dernières ramifications formant une sorte de cime terminale; les bractées disposées à la base des têtes de fleurs en forme de colerettes, assez semblables aux feuilles, mais plus petites, un peu pubescentes, principalement vers leurs bords, ciliées, acuminées; toutes les fleurs sessiles; leur calice court, pubescent, tubulé, à cinq dents courtes; la corolle petite, blanchâtre, un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît dans la Pensilvanie, la Virginie, dans le pays des Illinois, & sur les montagnes de la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris (V. v.)

28. THYM verticillé. *Thymus verticillatus*.

Thymus foliis ovato-lanceolatis, integris; verticillis infra terminalibus paucis, compatis.

Brachystemum verticillatum. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 6. tab. 31.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, munies de rameaux opposés & de feuilles sessiles, opposées, assez semblables à celles du *thymus virginicus*, ovales-lanceolées, longues d'environ deux pouces, très-entières à leurs bords, presque acuminées à leur sommet, arrondies presque en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces; les supérieures plus étroites.

Les fleurs sont réunies en verticilles très-épais, peu nombreux, situés dans les aisselles des feuilles supérieures & terminales, accompagnées de bractées étroites, lanceolées, aiguës, beaucoup plus petites & plus courtes que les deux grandes feuilles qui les reçoivent dans leurs aisselles. Leur calice est tubulé, termine à son orifice par cinq petites dents droites, presque égales; la corolle à peine plus longue que le calice; les étamines renfermées dans le tube de la corolle; le style filiforme, sailant; deux stigmates aigus.

Cette plante croît sur les montagnes de la Pensilvanie, jusque dans la Caroline supérieure. Elle a été découverte par Michaux.

29. THYM à feuilles dentées. *Thymus serratus*.

Thymus foliis lanceolato-ovatis, leviter varietate dentatis; capitulis terminalibus, glabellis; bracteis lanceolatis, non acuminatis.

Brachystemum muticum. Michaux. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 6. tab. 32.

Cette espèce, qui se rapproche beaucoup du *thymus virginicus*, en diffère par ses feuilles légèrement dentées en scie, particulièrement les inférieures. On la distingue aussi du *thymus verticillatus* par ses verticilles tous terminaux. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, rameuses, garnies de feuilles opposées, sessiles, lanceolées, ovales, glabres à leurs deux faces ou légèrement pubescentes dans leur jeunesse, ponctuées, nerveuses, aiguës à leur sommet, dentées légèrement en scie à leur contour, particulièrement les inférieures, longues d'un pouce & demi à deux pouces, sur au moins six lignes de large; les feuilles supérieures entières, plus étroites.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux & des tiges, en verticilles capités, fasci-

culés, très-serrés, garnis de bractées plus courtes que les fleurs, point acuminées, ciliées, un peu pubescentes; le calice court, tubulé, à cinq dents égales; la corolle perice, un peu plus longue que le calice. Le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure légèrement échancrée; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu un peu presque lingué, plus long.

Cette espèce a été découverte par Michaux, dans la Caroline supérieure.

* Espèces moins connues.

* THYM aciculaire. *Thymus acicularis*. Walldt.*

Thymus floribus capitatis; caulis repentibus; foliis linearibus, subiter nervosis sulcatisque; bracteis ovatis. Walldt & Kitaib. Plant. rar. Hung. pag. 157. tab. 147. — Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 130.

Elle paroît avoir de très-grands rapports avec le *thymus mastichine*, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Ses tiges font rampantes, ligneuses, grêles, rameuses, garnies de feuilles étroites, linéaires, opposées, nerveuses & filonnées en dessous. Les fleurs sont ramassées en tête, munies de bractées ovales; la lèvre supérieure du calice nue.

Cette plante croît sur les roches calcaires, dans la Croatie. H

* THYM de Croatie. *Thymus croaticus*. Persf.

Thymus pedunculis suberifloris, axillaribus; foliis ovatis, obtusis, nervosis, integerrimis, sessilibus; corollâ calice duplo longiore, caule villosa-herbaceo. Persf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 130. n°. 15.

Thymus piperella. Walldt & Kitaib. Plant. rar. Hung. vol. 2. pag. 169. tab. 156. (Exclusis synonymis.)

Cette espèce, d'après M. Persoon, ne peut appartenir au *thymus piperella* de Linné; elle s'en distingue par les pédoncules axillaires, à peine munis de trois fleurs. Ses tiges font herbacées, velues, garnies de feuilles opposées, sessiles, ovales, très-entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, nerveuses à leur face inférieure. Le calice est de couleur purpurine; la corolle assez grande, une fois plus longue que le calice; son tube allongé.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Croatie, parmi les roches calcaires.

* THYM de Richard. *Thymus Richardii*. Persf.

Thymus floribus capitatis; bracteis ovatis calicibusque rigidis; foliis late ovatis, subiter nervosis. Persf. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 130. n°. 16. (Ex herbario Richardii.)

Ce thym croît aux Antilles, dans les îles de Majorque & de Minorque. Ses feuilles sont larges, ovales, opposées, nerveuses à leur face inférieure, les fleurs disposées en tête, munies de bractées ovales, roides, ainsi que les calices.

* THYM de Corse. *Thymus coscicus*. Pers.

Thymus pumilus, frutescent, foliis rosulatis, ovato orbiculatis, pilosis; margine subcartilagineo, corollâ calice duplo majore. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 131. n°. 21. (Ex herbario Richardii.)

C'est une plante basse, dont les tiges sont presqu'entièrement ligneuses, garnies de feuilles disposées en rosette ou verticillées, ovales, presque orbiculaires, pileuses à leurs deux faces, un peu cartilagineuses à leurs bords; la corolle une fois plus grande que le calice.

Cette plante croît à l'île de Corse. η

* THYM à petites fleurs. *Thymus micranthus*. Broter.

Thymus pedunculus solitariis, axillaribus, ramosis; floribus brevioribus; caule erecto; foliis ovatis, acutis, nervosis, subtus hirtis; corollâ calice subaequali. Broter, Flor. lusitan. vol. 2. pag. 176. — Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 151. n°. 23.

Cette plante a de très-grands rapports avec les farfiettes; on la distingue à ses petites fleurs. Ses racines produisent plusieurs tiges droites, garnies de feuilles opposées, ovales, aiguës à leur sommet, nerveuses, parsemées en dessous de poils épars. Les fleurs sont placées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules solitaires, rameux, plus courts que les feuilles. La corolle est blanchâtre ou légèrement purpurine, à peine plus longue que le calice.

Cette espèce croît dans le Portugal, sur les collines calcaires.

* THYM à fleurs nombreuses. *Thymus multiflorus*. Pers.

Thymus floribus axillaribus, pedunculatis; pedunculis multifloris; calicibus oblongis; dentibus acutis; foliis ovatis, glabris; ventis subulis prominentibus. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 131. n°. 27.

Cette espèce a le port d'un calament. Ses feuilles sont opposées, ovales, gâbres à leurs deux faces, ponctuées en dessous, marquées à leur face inférieure de veines saillantes. Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, portées sur des pédoncules chargés d'un grand nombre de fleurs; les calices allongés, terminés par des dents aiguës.

Cette plante, dont on ignore le lieu natal, a été autrefois cultivée dans le jardin de Trianon.

* THYM coloré. *Thymus purpurascens*.

Thymus caule ramoso, divaricato, tomentoso; foliis ovatis, subseratis, summis congestis, coloratis; verticillis uni seu bifloris, subapproximatis. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. pag. 131. n°. 5. (Sub acinos.)

Ce thym paroît tenir le milieu entre le *thymus acinos* & le *thymus alpinus*. Ses tiges sont tomenteuses, très-rameuses; les rameaux dressés, étalés, garnis de feuilles ovales, légèrement dentées en scie à leurs bords, traversées par des veines d'un rouge violet; les dernières feuilles très-rapprochées, colorées; les fleurs rapprochées en verticilles d'une à deux fleurs; le calice filonné, à deux lèvres, hispide, relevé en bosse à sa base, velu à son orifice; la corolle allongée, à deux lèvres, un peu renflée à son orifice; la lèvre supérieure droite, échancrée; l'inférieure à trois lobes étalés, celui du milieu concave.

On trouve cette plante dans l'Espagne.

* THYM à feuilles rondes. *Thymus rotundifolius*. Pers.

Thymus foliis orbiculatis, mucronatis; venis subulis prominentibus; caule procumbente, apice calicibus villosis. Pers. Synopf. Plant. vol. 2. p. 131. n°. 6. (Sub acinos.)

Ses tiges sont couchées, velues à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, orbiculaires, mucronées à leur sommet, munies en dessous de veines saillantes. Leur calice est velu, relevé en bosse à sa base. Cette plante croît en Espagne. (Ex herb. Richard.)

THYMBRA. *Thymbra*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, à deux lèvres, de la famille des labiées, qui a des rapports avec les farfiettes & les thym, & qui comprend des plantes ligneuses exotiques ou indigènes de l'Europe, dont les tiges sont grêles, les feuilles petites, opposées, ponctuées; les fleurs verticillées ou en épis.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice comprimé, bordé en dehors d'une rangée de poils sur ses deux bords, nu en dedans; la lèvre supérieure de la corolle plane, échancrée; l'inférieure à trois découpures presque égales.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice monophylle, presque cylindrique, comprimé latéralement, bordé en dehors d'une rangée de poils sur ses deux bords, nu en dedans pendant la maturation, divisé en deux lèvres; la supérieure plus large, à demi divisée en trois découpures égales, conniventes; l'inférieure plus étroite, bide.

2°. Une corolle monopétale, labiée; le tube profond, cylindrique, terminé par un limbe à deux lèvres, la supérieure plane, droite, échancrée; l'inférieure à trois découpures presque égales.

3°. Quatre étamines didynames, dont les filaments inégaux sont rapprochés par paires, les deux inférieurs plus courts; les anthères à deux lobes, placées sous la lèvre inférieure de la corolle.

4°. Un ovaire à quatre lobes, surmonté d'un seul style filiforme, divisé en deux jusque vers son milieu; deux stigmates aigus.

Quatre semences nues, renfermées dans le fond du calice persistant.

Observations. Ce genre est à peine distingué des farfètes: dans ces dernières les deux lèvres du calice sont moins prononcées, leur calice est souvent garni de poils en dedans, surtout à l'époque de la maturation, point mu en dehors d'une rangée de poils sur les deux bords; leur corolle est à cinq lobes presque égaux. Les thymus sont plus tranchés par l'orifice de leur calice garni de poils en dedans.

E S P È C E S.

1. THYMBRA en épi. *Thymra spicata*. Linn.

Thymra floribus spicatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 795. — Mill. Dict. n°. 1. — Kniph. Centur. 3. n°. 94. — Lam. Ill. Gen. tab. 512. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 515. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 46. n°. 1.

Thymra spicata, varior, hispanica. Barrel. Plant. rar. 181. tab. 1250.

Thymra majus, longifolium; stachadia foliaceo capite, purpurascens, pilosum. Pluken. Almag. pag. 368. tab. 116. fig. 5.

Thymra capitata, africana, satureia rigidum, hirsutum folio. Moill. Oxon. Hist. 3. pag. 361.

Satureia hirsuta, purpurea, olivani. Dodard, Mém.

Ses tiges sont droites, ligneuses, hautes d'environ un pied; les rameaux opposés, un peu rougâtres, quadrangulaires, hérissés de poils roides, surtout vers leur sommet; garnis de feuilles opposées, linéaires, presque sessiles, étroites, longues d'un pouce & plus; larges d'environ une ligne & demie, aiguës à leurs deux extrémités, fortement ponctuées, ciliées vers leur base. &c. quelquefois sur leur nervure dorsale; les feuilles supérieures & celles qui accompagnent les fleurs, ciliées dans toute leur longueur.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en verticilles axillaires, très-rapprochés, dont l'ensemble forme un épi terminal, feuillé,

oblong, serré, muni de bractées lancéolées, oblongues, aiguës & ciliées. Leur calice est un peu comprimé, légèrement visqueux, chargé de poils très courts, glanduleux, & d'une rangée de poils un peu plus longs sur les deux bords; son orifice nu en dedans, terminé par cinq dents inégales, les deux inférieures plus longues, aiguës, ciliées; la corolle purpurine, ouverte à son limbe en deux lèvres; la supérieure plane, ovale, presque en cœur, échancrée au sommet, rétrécie à sa base; l'inférieure à trois lobes égaux, arrondis; le tube renflé vers sa partie supérieure.

Cette plante croît dans le Levant, sur le Mont Liban, en Italie, sur les montagnes du Piémont. Elle a une odeur forte & pénétrante. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

2. THYMBRA verticillé. *Thymra verticillata*. Linn.

Thymra floribus verticillatis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 796. — Miller, Dict. n°. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 46. n°. 2.

Hyssopus angustifolius, montana, aspera. C. Bauh. Pin. 218.

Hyssopus montana. Dalech. Hist. 1. pag. 934. Icon. — Fusch. Hist. Icon.

Hyssopus montanus, cilicium quibusdam. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 277. Icon.

Cette plante diffère peu de la précédente: on l'en distingue néanmoins par ses fleurs, dont les verticilles sont plus prononcés, plus distincts. Ses tiges s'élèvent à peine à la hauteur d'un pied; elles sont ligneuses, branchues; les rameaux opposés; les feuilles sessiles, opposées, linéaires-lancéolées, très-entières, ponctuées, glabres à leurs deux faces, point ciliées; celles qui accompagnent les fleurs un peu plus larges, plus aiguës, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont sessiles, parfaitement verticillées dans les aisselles des feuilles supérieures; la corolle purpurine.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. h

3. THYMBRA cilié. *Thymra ciliata*. Desfont.

Thymra floribus capitatis; foliis linearibus, ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 47. n°. 3.

Thymra foliis linearibus, ciliatis; capitulis florum oblongis, terminalibus; bracteis ovatis, acutis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 10. tab. 122.

C'est un arbuste d'un aspect fort agréable, dont les tiges droites, très-rameuses, sont presque cylindriques, gerçées, de couleur cendrée, hautes d'environ un pied & demi; les rameaux grêles, les uns simples, d'autres ramifiés, inégaux, presque cylindriques ou légèrement tétragones, les

plus jeunes chargés d'un duvet très court, lanugineux, un peu griffeté; les feuilles sont opposées, filiformes, roides, linéaires, ouvertes, ponctuées, munies à leurs bords de cils blancs; aiguës à leur sommet, très-étroites.

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux un épi court en tête ovale, cylindrique, obtuse, longue d'un demi-pouce & plus, garni de grandes bractées quelques fois un peu colorées en rouge, ovales, entières, ciliées, acuminées, nerveuses en dessous, presque aussi longues que les fleurs. Le calice est cylindrique, légèrement comprimé, à deux lèvres; à cinq dents, ciliées; les deux intérieures plus longues, fétacées; la corolle de couleur violette; son tube droit, un peu renflé, du double plus long que le calice; le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure un peu plane, entière, obtuse; l'inférieure à trois lobes arrondis, entiers; quatre étamines didynames, à peine plus longues que la corolle; les anthères petites; un style, deux stigmates aigus.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans la Barbarie, aux environs de Mascara, sur les collines arides & incultes. *Th* (*V. J. comm. Desfont.*)

THYMELÉES (les). *Thymela*. Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle comprend un certain nombre de genres qui ont beaucoup de rapport avec les *thymela* de Tournefort, que Linné a divisés en plusieurs autres genres particuliers.

Les plantes contenues dans cette famille sont assez ordinairement des arbrisseaux ou des arbustes, rarement des herbes dont les feuilles sont alternes, quelquefois opposées; les fleurs axillaires ou terminales, agglomérées ou en épis.

Le calice est tubuleux, d'une seule pièce, inférieur; son limbe court, à plusieurs découpures; point de corolle, mais quelques espèces sont munies d'échelles pétaliformes, situées à l'orifice du calice, imitant une corolle polypétale. Les étamines sont en nombre défini, insérées à l'orifice du calice, en même nombre ou en nombre double de celui des découpures calicinales, tantôt alternes avec ces mêmes découpures, tantôt opposées.

L'ovaire est simple, supérieur, surmonté d'un seul style, terminé par un stigmate ordinairement simple; une seule semence supérieure, ou nue, ou en baie, ou capsulaire, enveloppée par le calice; l'embryon dépourvu de péricarpe; la radicule supérieure.

Les principaux genres qui appartiennent à cette famille sont :

Les dicées..... *Dica*.

Les lagetto.....	<i>Lagetta</i> .
Les laurées.....	<i>Daphne</i> .
Les passérines.....	<i>Puffin</i> .
Les stellères.....	<i>Stellera</i> .
Les struthiales.....	<i>Struthiola</i> .
Les lachnées.....	<i>Lachna</i> .
Les dais.....	<i>Dais</i> .
Les guidiennes.....	<i>Gnidia</i> .
Les néandres.....	<i>Néandria</i> .
Les quiquales.....	<i>Quiqualis</i> .

THYSANOS. *Thysanus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des tétréméhacées, qui a des rapports avec les *finaba* & les *ulyanthus*, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, les fleurs disposées en grappes latérales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; cinq pétales; dix étamines; quatre styles; quatre d'opex; un noyau arillé.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, divisé en cinq découpures profondes, colorées, persitantes, concaves, lancéolées, très ouvertes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales, rapprochés en forme de cloche, ouverts, oblongs, égaux au calice.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont courts, réfléchis; les anthères arrondies, à deux loges.

4°. Un ovaire supérieur, à quatre faces, surmonté de quatre styles filiformes, insérés latéralement aux quatre angles de l'ovaire, terminés par autant de stigmates légèrement bifides.

Le fruit consiste en quatre drupes oblongs, en bois, recourbés à leur sommet, revêtus d'une écorce lanugineuse, s'ouvrant latéralement.

Les semences sont autant de noyaux solitaires dans chaque drupe, ovales-oblongs, lisses, nus à leur partie inférieure, enveloppés à leur partie supérieure par un arille ou tunique rouge, charnue, frangée à ses bords.

Observations. Le nom de ce genre vient du mot grec *thysanos* (*fenêtre*), frange, à cause de la tunique des semences, frangée à ses bords.

E S P È C E.

1. **THYSANOS palala.** *Thysanus palala*. Lour.

Thysanus foliis pinnatis; pedunculis polysporis; axillaribus. Lour. Flor. cochinch. pag. 349.

Arbrisseau

Arbrisseau dont les tiges sont presque droites, cylindriques, divisées en rameaux touffus, étalés, glabres, sans épines, garnis de feuilles ailes, compoſées de dix paires de folioles oblongues, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords. Les fleurs ſont latérales, diſpoſées en grappes pedonculées, ſituées dans l'aſſiſſe des feuilles. Leur calice eſt coloré en rouge, à cinq découpures concaves, lancéolées, pileuſes; la corolle blanche, à cinq pétales ouverts, rapprochés en forme de cloche, de la longueur du calice; le fruit eſt compoſé de quatre drupes oblongs; les noyaux entourés à leur partie inférieure par un arille rouge.

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochinchine. *H* (*Deſcript. ex Lour.*)

TIARELLE. *Tiarella*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des ſaxifragées, qui a de grands rapports avec les *miſella*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles ſimples, ternées ou ailées, ordinairement routes radicales; les fleurs diſpoſées en un épi lâche, terminal.

Le caractère eſſentiel de ce genre eſt d'avoir :

Un calice à cinq diviſions; cinq pétales; dix étamines; deux ſtyles; une caſſule à une ſeule loge, à deux valves, l'une plus grande que l'autre.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice perſiſtant, profondément diviſé en cinq découpures ovales, aiguës.

2°. Une corolle compoſée de cinq pétales oblongs, très-entiers, inférés ſur le calice.

3°. Dix étamines dont les filamens ſont ſiliſformes, plus longs que la corolle, inférés ſur le calice, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire biſſide, ſurmonté de deux ſtyles courts, terminés par des ſtigmates ſimples.

Le fruit eſt une caſſule oblongue, à une ſeule loge, à deux valves inégales, preſque planes, l'une plus grande que l'autre; elles renferment pluſieurs ſemences ovales, luſſantes.

Obſervations. Ce genre, qui ne comprend juſqu'aujourd'hui qu'un très-petit nombre d'eſpèces, eſt très-rapproché des *miſella*; il n'en diſſère que par ſes pétales entiers, & par les deux valves des caſſules inégales. Dans les *miſella* les pétales ſont lacinés, preſque pinnatifides; les valves des caſſules égales. Les eſpèces dont ces deux genres ſont compoſés ont le même port, des fleurs diſpoſées en un épi lâche, terminal; des feuilles ob-

Botanique. Tome VII.

linairement routes radicales, ſimples dans les *miſella*, quelquefois ternées dans les *tiarella*, deux fois ternées ou ailées dans une nouvelle eſpèce décrite par M. Venterat. « Si l'attache des ſemences (dit ce ſavant auteur) des deux premières eſpèces, qui n'a été décrite par aucun botaniste, étoit la même que celle de *miſella*, la *tiarella biernata* ne pourroit-elle pas conſtituer un genre nouveau, caractérisé par les placenta ſiliſformes, d'abord adhérents au bord intérieur des valves, & enſuite libres? »

E S P È C E S.

1. **TIARELLE** à feuilles en cœur. *Tiarella cordifolia*. Linn.

Tiarella foliis ſimplicibus, cordatis, ſublobatis, inæqualiter dentatis. (N.)

Tiarella foliis cordatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 580. & Gener. Nov. 188. — Amoen. Acad. vol. 3. pag. 17. — Miller, Dict. n°. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 659. n°. 1. — Lam. Ill. Genet. tab. 373.

Miſella ſcapo nudo. Hort. Clif. 167. — Royen, Lugd. Bat. 459. — Gronov. Virg. 160.

Tiarella foliis cordatis, acutis, ſublobatis, dentatis; dentibus ſcuminatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 270.

Cortufa americana, flore ſpicato, petalis integris. Herm. Paradiſ. pag. 129. pag. 129.

Sanicula montana, americana, repens. Tournef. H. R. P.

Miſella americana, ſorum petalis integris. Tournef. Inſt. R. Herb. 242.

Cortufa indica, vel hederæ terreſtris. Bod. à Stapel. in Theophr. 366. 2

Ses racines ſont vivaces, rampantes, & s'étendent au loin dans la terre; elles produiſent pluſieurs tiges droites, preſque nues, fort grêles, à peine pubeſcentes, hautes de quatre à ſix pouces; il ſort des racines pluſieurs feuilles ſimples, longuement pétioles, larges, preſqu'ovales, en cœur à leur baſe, quelquefois médiocrement lobées, d'un vert-clair, inégalement dentées à leur contour; les dents acuminées; les pétioles grêles, longs d'environ trois pouces & quelquefois une ou deux petites feuilles alternes vers le milieu des tiges.

Les fleurs ſont ſituées à la partie ſupérieure des tiges ou des hampes, ſoutenues par des pédoncules ſimples, alternes, ſiliſformes, uniſères, à peine plus longs que les fleurs. Le calice eſt court, glabre, à cinq découpures ovales, aiguës; la corolle blanche, à cinq pétales lancéolés, une fois plus longs que le calice; les étamines plus longues

O o o

que la corolle ; les ambrères fort petites , arrondies . Le fruit est une capsule à deux valves inégales , comprimées , droites , aiguës .

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique , au Canada , sur les monts Alleghana . On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

2. TIARELLE trifoliée. *Tiarella trifoliata*. Linn.

Tiarella foliis ternatis ; foliis angulatis , serratis , subulatis. (N.)

Tiarella foliis ternatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 405. & Nov. G. net. 188. — Amœn. Acad. vol. 3. pag. 17. — Miller, Dict. n°. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 659. n°. 2.

Tiarella trifoliata , foliis ternatis. Amœn. Acad. vol. 2. pag. 351. n°. 13.

Ses racines sont vivaces & fibreuses ; les tiges droites , hautes d'environ demi-pied , presque filiformes , un peu cylindriques , ruées , pileuses , un peu canaliculées à un de leur côté ; les feuilles ternées , pétiolées , radicales , peu nombreuses , composées de trois folioles anguleuses , dentées en scie à leurs bords , un peu rhomboidales à leur milieu , trapéziformes à leurs extrémités , couvertes de poils roides ; une ou deux autres petites feuilles sur leur tige . L'une vers la racine , & l'autre proche l'épi de fleurs .

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale , longue de six pouces , composée de quelques petits corymbes alternes . Leur calice est presque campanulé , persistant , à cinq découpures ; la corolle blanche , à cinq pétales ovales , insérés sur le calice , à peine plus longs que le calice ; dix filamens subulés , plus longs que la corolle , soutenant des anthères petites , arrondies ; deux ovaires ovales ; deux styles filiformes ; les stigmates aigus ; une capsule plus longue que le calice , à deux valves inégales .

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Asie. (Descript. ex Linn.)

3. TIARELLE bitermée. *Tiarella bitermata*. Vent.

Tiarella foliis bitermatis , flore racemoso-paniculatis. Venten. Hort. Malbais. pag. 54. tab. 54.

Ses tiges sont droites , simples , cylindriques , fistuleuses , médiocrement feuillées , un peu pubescentes , garnies de trois ou quatre grandes feuilles alternes , longuement pétiolées , deux fois ternées , presque glabres à leurs deux faces , d'un vert gai & luisant en dessus , un peu plus pâles & à peine pubescentes en dessous , composées de folioles ordinairement deux fois ternées , quelquefois cinq folioles au lieu de trois , fort grandes , inégales , pétiolées , ovales-oblongues , échancrées

en cœur à leur base , aiguës à leur sommet , incisées ou lobées , irrégulièrement dentées ; les dentelures fortes , arrondies , terminées chacune par une petite pointe courbe ; les pétioles & pedicelles striés , pubescens , canaliculés .

Les fleurs sont disposées , dans l'aisselle des feuilles supérieures , en une ample panicule très-lâche , composée d'un grand nombre de grappes alternes , fort grêles , dont l'axe est parsemé de poils glanduleux , peu apparents , muni de bractées très courtes , glabres , lancéolées , aiguës , jaunâtres & subsistances . Le calice est glabre , d'un jaune de soufre , de la longueur du pélicelle ; la corolle d'un jaune-pâle , de la longueur du calice ; les pétales linéaires , obtus , insérés à la base du calice , alternes avec ses divisions ; dix étamines deux fois plus longues que la corolle ; les anthères à quatre filons ; l'ovaire libre , glabre , ovale . Le fruit est une capsule entourée à sa base par le calice , surmontée des deux styles , se divisant sur ses deux faces & dans toute son étendue en deux valves , dont les bords sont très-approchés , à deux loges , renfermant des semences nombreuses , linéaires , très-petites , adhérentes par leur partie moyenne à des placentas filiformes , qui d'abord font connexifs au bord intérieur des valves , & ensuite deviennent libres .

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale . Elle fleurit au commencement de l'été. (V. f.)

TICORÉE. *Ticorea*. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , régulières , de la famille des azédaracées , qui a des rapports avec les hantols (*sandacium*) , & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe , à feuilles ternées , & dont les fleurs sont disposées en grappes paniculées , axillaires .

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq dents ; cinq pétales réunis en forme d'entonnoir ; un tube à cinq dents anthérifères ; un style ; un stigmate ; une capsule à cinq loges .

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce , fort petit , divisé à son orifice en cinq dents aiguës .

2°. Une corolle composée de cinq pétales , dont les ongles sont très-longs , réunis en tube , en forme d'entonnoir ; le limbe étalé , offrant cinq lobes ovales & réfléchis .

3°. Cinq étamines ; les filamens réunis en un tube membraneux , inséré sur le réceptacle , divisé à son sommet en cinq dents aiguës , chacune d'elles soutenant une anthère oblongue , à deux loges .

4°. Un *ovaire* fort petit, un peu arrondi, déprimé, surmonté d'un style allongé, terminé par un stigmate épais, presque rond.

Le fruit consiste en une capsule à cinq loges.

Les semences n'ont pas encore été observées.

E S P È C E.

TICORÉE PUANTE. *Tisorea foetida*. Aublet.

Tisorea foliis ternatis, longè petiolatis; corymbis terminalibus, longè pedunculatis. (N.)

Tisorea foetida. Aublet, Guian. vol. 2. pag. 689. tab. 277. — Cavan. Dissert. 7. pag. 362. tab. 206.

Ozophyllum trifoliatum. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 585.

Arbrisseau dont les tiges, fortes, droites, s'élèvent à la hauteur de dix à douze pieds, & se divisent en rameaux alternes, étalés, revêtus d'une écorce verte, lisse, garnis de feuilles alternes, longuement pétiolées, ternées; les folioles ovales-lancéolées, très-grandes, pédicellées, molles, vertes, lisses, glabres à leurs deux faces, entières à leur contour, acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, longues d'un pied & plus, sur quatre pouces de large, traversées en dessous par une nervure longitudinale & saillante; la foliole terminale plus grande que les autres; le pétiole long de six à huit pouces.

Les fleurs naissent à l'extrémité des tiges & des rameaux; elles sont situées dans l'aisselle de la feuille supérieure, disposées en grappes paniculées, presque en corymbe; le pédoncule commun long de plus d'un pied, divisé en ramifications qui supportent des fleurs fécondes, alternes. Leur calice est d'une seule pièce, glabre, vert, évasé, terminé par cinq dents courtes, ovales, un peu mucronées. La corolle est blanche, composée de cinq pétales étroits, longs d'un pouce, concaves dans leur longueur, attaches au fond du calice, adhérens inférieurement par leurs bords, & formant une sorte de tube dont la partie supérieure s'évase en cinq lobes lancéolés, rétrécis, obtus; ils renferment un tube blanc, membraneux, inséré sur un disque qui entoure l'ovaire, & qui se divise à son sommet en cinq dents courtes, aiguës, supportant chacune une anthère presque filiforme, renflée, allongée, à deux loges. L'ovaire est à cinq côtes arrondies; le style blanc, allongé; le stigmate arrondi. Le fruit consiste en une capsule à cinq loges.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane, dans les forêts de Caux; il fleurit au mois de février. (Description ex Aublet.)

Ses feuilles écrites entre les doigts exhalent une odeur désagréable, fort approchant de celle

de la pomme épineuse (*Armonium*). Quelques pieds de cet arbrisseau n'ont qu'une tige simple, terminée par des bouquets de fleurs; d'autres pieds sont très-branchus.

TIGARÉ. *Tigarea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dioïques, de la famille des rosacées, qui a de grands rapports avec les *Retracera*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges sont farmentrales, les feuilles simples, rudes ou velues, munies de stipules; les fleurs disposées en grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; un calice à quatre ou cinq divisions; quatre ou cinq pétales; dans les fleurs mâles, un grand nombre d'étamines, un ovaire stérile; dans les fleurs femelles, plusieurs étamines stériles, un seul ovaire, un style; une capsule à deux valves, monosperme.

C A R A C T È R E G É N É R I Q U E.

Les fleurs sont dioïques; les fleurs mâles séparées des femelles, sur des individus différens.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice persistant, profondément divisé en quatre ou cinq découpures ovales, aiguës.

2°. Une corolle composée de quatre ou cinq pétales arrondis, insérés sur le calice, alternes avec les divisions.

3°. Un très-grand nombre d'étamines, dont les filamens sont insérés sur le réceptacle, plus courts que la corolle, surmontés d'anthères petites, globuleuses.

4°. Un ovaire ovale, qui se flétrit & meurt sans fécondation.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice & une corolle, comme dans les fleurs mâles.

2°. Plusieurs étamines, dont les filamens sont, ou privés d'anthères, ou n'en portent que de stériles.

3°. Un seul ovaire supérieur, petit, ovale, surmonté d'un style simple, filiforme, plus long que les étamines, surmonté d'un stigmate fort petit, presque en tête.

Le fruit est une capsule un peu globuleuse, petite, de la grosseur d'un pois, s'ouvrant en deux valves, & ne renfermant qu'une seule semence un peu arrondie.

Observations. Ce genre, très-voisin des *Retracera*, devroit y être réuni si l'observation pouvoit
O o o o 2

nous rendre certains que ses fleurs ne sont dioïques que par avortement, & que le nombre des parties qui lui manquent, sont restituées dans plusieurs individus. N'ayant encore jusqu'à présent rien de positif sur ces faits, les *tigarea* se distingueront des *tetracera* par leurs fleurs dioïques, par un seul ovaire, un seul style, & par une capsule bivalve, monoërme. Le port des espèces se rapporte d'ailleurs parfaitement à celui des *tetracera*, ayant des tiges sarmenteuses, des feuilles munies de stipules, &c.

E S P È C E S.

1. TIGARÉ à feuilles rudes. *Tigarea aspera*. Aublet.

Tigarea foliis subrotundis, undulatis; floribus racemosis. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 918. tab. 350. — Lam. Illustr. Gen. tab. 826.

Tetracera (aspera), foliis subrotundis, subrepandis, scabris; floribus monogynis. Willd. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1241. n°. 3.

Rhinium. Schreb. Gen. Plant. n°. 1545.

Arbrisseau qui produit des tiges sarmenteuses & rameuses, qui s'élèvent jusque sur la cime des plus grands arbres, d'où pendent de très-longes rameaux prolongés jusqu'à terre; ils sont très-rudes & après au toucher, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, longues d'environ trois pouces & demi, sur trois pouces de large, arrondies, un peu ovales, légèrement ondulées à leurs bords, chagrinées & couvertes à leurs deux faces de poils ras, roides & crochus; leur pétiole court, canaliculé en dessus, accompagné à sa base de deux stipules caduques.

Les fleurs sont dioïques, naissent sur des pieds différens; elles sont disposées en petites grappes qui sortent de l'aisselle des feuilles. Le calice est d'une seule pièce, divisé en quatre ou cinq parties concaves, aiguës; la corolle blanche, composée de quatre ou cinq pétales concaves, arrondis, insérés, par un onglet, entre les divisions du calice. Les étamines sont nombreuses, situées au fond du calice, qu'elles recouvrent entièrement; les filamens courts; les anthers jaunes, à deux lobes; le pistil avorte. Les fleurs semelles ont un calice & une corolle semblables aux fleurs mâles; elles renferment des filamens sans anthers; un ovaire arrondi, surmonté d'un style que termine un large stigmate obtus; il en résulte une capsule sèche, rouillée, rude au toucher, accompagnée du calice persistant, s'ouvrant en deux valves qui ne contiennent qu'une seule semence.

Cet arbre croît dans l'île de Cayenne; il fleurit & fructifie dans le mois de janvier. ¶

Les Créoles ont donné à cette plante le nom de *liane rouge*, à cause de la couleur que prend sa

décoloration; elle passe dans le pays pour un bon remède dans les maladies vénériennes. « On rencontre quelquefois cet arbrisseau en si grande quantité dans les bois, dit Aublet, qu'il est impossible de les parcourir sans être incommodé & déchiré par l'apreté de ses rameaux & de ses feuilles, & surtout sans être arrêté par l'entrelacement de ses branches & de ses rameaux. »

2. TIGARÉ à feuilles dentées. *Tigarea dentata*. Aublet.

Tigarea foliis ovato-oblongis, acuminatis, subhis tomentosis. Aublet, Guian. vol. 2. pag. 920. tab. 351.

Tetracera (tomentosa), foliis ovatis, acuminatis, dentatis, supernè glabris, subhis tomentosis; floribus monogynis. Willd. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1241. n°. 2.

« Cet arbrisseau, dit Aublet, ressemble au précédent par ses fleurs & par ses fruits; il en diffère seulement par ses tiges qui sont velues, par ses branches qui sont lisses & plus grosses, par ses feuilles ovales, dentées, terminées par une longue pointe. Elles sont glabres à leur face supérieure, vertes, revêtues en dessous d'un duvet soyeux & tomenteux, longues d'environ cinq pouces, sur deux pouces & demi de large. »

Cet arbrisseau croît dans les bois de l'île de Cayenne; il fleurit en janvier, & donne ses fruits dans le mois de mars. ¶

Les Créoles le nomment *liane rouge*, & l'emploient aux mêmes usages que le précédent.

TIGE ou TRONC. *Caulis. Truncus*. On a donné ce nom à cette partie de la plante qui part directement de l'extrémité supérieure de la racine ou on nomme *le collet*, qui s'élève ensuite perpendiculairement dans l'air, ou rampe sur la terre, ou enfin grimpe & s'entortille autour des différens corps qu'elle rencontre. C'est de cette même partie que sortent ordinairement les rameaux, les feuilles, les supports & les organes de la fructification de la plante. « Cette partie fondamentale du végétal existe, dans toutes les plantes, dit M. DeCandolle, tantôt développée & bien évidente, tantôt tellement rabougrie, que la plante en paroît dépourvue, & que les feuilles semblent naître de la racine, comme dans la jacinthe, le polypode, la primevère, &c. »

Dans le premier cas, on a donné aux plantes le nom de *plantes caulescentes*, ou munies de tiges (*caulescentes*); dans le second, on les désigne sous celui de *plantes acutales*, ou sans tiges, ou sessiles, (*acutales*); mais ces dénominations sont incertaines, puisque la tige existe toujours. Dans la jacinthe & les autres plantes bulbeuses, elle est représentée par le plateau orbiculaire qui émet les racines &

les feuilles ; dans le polypode & les autres fougères européennes, elle se réduit à une souche horizontale & souterraine ; dans la primevère & les autres dicotylédones, elle se confond avec le collet de la racine, mais elle s'allonge quelquefois par la culture ; ce qui prouve qu'elle existe réellement quoique peu développée.

Le tronc proprement dit est la partie qui soutient les branches & les feuilles dans les arbres & les arbrisseaux. Elle a communément des dimensions considérables ; elle est toujours d'une matière ligneuse, & s'élève le plus ordinairement dans une direction verticale ou perpendiculaire à l'horizon.

La tige s'emploie plus ordinairement pour exprimer cette même partie dans les plantes herbacées ou sous-arbrisseaux. Elle s'élève en général beaucoup moins que le tronc, & a, surtout dans les herbes, beaucoup moins de consistance ; mais la tige ou le tronc est pris indifféremment l'un pour l'autre lorsqu'il s'agit de leurs propriétés générales, ou plutôt il conserve le nom commun de tige.

Avant d'entrer dans les détails qui concernent les propriétés des tiges, nous allons les considérer relativement à leur structure, selon qu'elles appartiennent aux plantes dicotylédones ou monocotylédones.

I. La tige des plantes dicotylédones est composée de trois organes distincts ; savoir : la moëlle, le corps ligneux & l'écorce. Si l'on coupe en travers une tige de dicotylédone ligneuse, on observe au centre un canal cylindrique nommé canal médullaire. Ce canal est rempli d'un tissu cellulaire ordinairement blanchâtre, qu'on nomme moëlle (*medulla*). Sur le bord du canal on distingue une rangée circulaire de vaisseaux lymphatiques. La moëlle est très-abondante & toujours humectée dans les jeunes pousses ; elle se dessèche, diminue de volume, & son canal finit par s'oblitérer entièrement dans les vieux troncs, comme on le voit facilement dans le noyer. Cette oblitération est probablement due à la formation de couches ligneuses dans l'intérieur du canal médullaire, ou peut-être à l'endurcissement même de la moëlle. La moëlle, en vieillissant, se déchire de diverses manières, qui sont constantes pour chaque espèce, parce qu'elles dépendent du mode d'accroissement du tronc.

La moëlle communique au travers du corps ligneux avec le tissu cellulaire de l'écorce, par le moyen de prolongemens qui rayonnent en tous sens, & qui paraissent, sur la coupe transversale d'un tronc, comme les rayons d'une roue, lesquels joignent le moyeu à la circonférence. On les a nommés rayons médullaires, prolongemens médullaires, productions & insertions médullaires. En sui-

vant ces rayons dans les plantes à tissu lâche, on voit clairement que la moëlle & le tissu cellulaire sont de même nature ; la première est blanche, parce qu'elle est privée de lumière ; le second est vert, parce qu'il est exposé à la lumière.

Dès la naissance d'une tige, on voit autour de la moëlle une rangée circulaire de vaisseaux ; il s'en développe ensuite une seconde qui naît entre la première couche & l'écorce, puis une troisième, une quatrième, & ainsi de suite. La réunion de toutes ces couches concentriques, dont la plus ancienne est placée au centre, & la plus jeune à la circonférence, constitue son corps ligneux. Par la manière même dont elles se placent l'une sur l'autre, on conçoit qu'une fois nées, elles ne peuvent plus croître ; conséquemment le tronc d'un arbre dicotylédone est composé d'une multitude d'étuis coniques qui s'emboîtent l'un sur l'autre ; chacune de ces couches, visibles à l'œil dans la coupe transversale d'un tronc, est elle-même composée d'un grand nombre de couches ; l'intervalle qui paroît à l'œil est dû au repos de la végétation pendant l'hiver : ces couches annuelles peuvent donc servir à compter l'âge d'un tronc de dicotylédone.

Pendant la jeunesse de la tige, les couches ligneuses qui entourent la moëlle, reçoivent journellement des molécules nutritives qui augmentent leur densité. Tant que ce dépôt de molécules a lieu, elles sont à l'état de bois imparfait, & portent le nom d'aubier (*alburnum*). Dès que l'endurcissement est complet, elles prennent le nom de bois (*lignum*), ou, comme disent les artisans, de cœur du bois. La différence du bois & de l'aubier est quelquefois très-notable ; ainsi, le bois de l'ébène est noir, & son aubier d'un beau blanc. Le bois est toujours plus dur, plus coloré & placé à l'intérieur du tronc. L'aubier est plus mou, plus pâle & placé à l'extérieur. Le bois n'étant plus susceptible d'accroissement, est une partie réellement morte ; aussi est-il soumis à la décomposition, même pendant la vie du reste de la plante. L'aubier est filé à la décomposition pendant la vie ; mais lorsque l'arbre est coupé, son tissu, plus mou & plus aqueux, le dispose à se pourrir facilement. Les plantes herbacées sont celles qui meurent avant que leurs couches aient acquis la dureté du bois.

L'écorce est organisée comme le corps ligneux, c'est-à-dire qu'elle offre des couches concentriques d'abord imparfaites, puis parfaites, & d'un tissu cellulaire ; mais ces trois organes sont placés en sens inverse. Chaque année il se développe une couche d'écorce qui naît à la surface intérieure de la couche précédente, en sorte que dans le cône d'écorce qui recouvre un tronc, les couches les plus extérieures sont les plus vieilles, & les plus jeunes sont à l'intérieur. L'accroissement continu du corps ligneux force cependant l'écorce

à se distendre, & c'est là ce qui produit les gerçures qu'on aperçoit à la surface. Les couches corticales intérieures, qui sont encore jeunes, molles & flexibles, c'est-à-dire, analogues à l'aubier, ont reçu le nom particulier de *liber*, parce qu'elles se fendent quelquefois comme les feuilles d'un livre; les couches extérieures, qui ont acquis toute la dureté qu'elles peuvent avoir, & qui sont analogues au bois, portent le nom spécial de *couches corticales*.

En dehors de ces couches corticales on trouve une couche de *tissu cellulaire*, qui est réellement une membrane extérieure, & qui communique avec la moelle intérieure. C'est ce tissu cellulaire qui, très-développé dans le *chêne-bêlé* (*quercus fuber*), fournit la matière connue sous le nom de *liège*. Les cellules externes de ce tissu étant continuellement exposées à l'air, s'endurcissent, se dessèchent, & leurs parois extérieures forment une membrane continue, & en apparence distincte de l'écorce; elle a reçu le nom d'*épiderme*, de *sur-peau*, de *membrane cutanée* ou de *cuticule* (*epiderma*). & a été long-temps regardée comme un organe distinct. Cette précieuse membrane se retrouve dans tous les végétaux & dans tous les organes de végétaux exposés à l'air; elle manque dans les plantes & les parties des plantes submergées ou très-fugaces, parce que leurs cellules extérieures n'ont pu ni se dessécher ni s'endurcir. Lorsque plusieurs rangs de cellules s'endurcissent & se dessèchent, alors la tige a plusieurs épidermes, comme dans les vieux trunks de bœuf. La manière diverse dont l'épiderme se rompt, tantôt en long & tantôt en travers, dépend de la direction en longueur ou en largeur qu'a été imprimée aux cellules par l'accroissement de l'aubier. Cette loi n'offre d'exception que dans les plantes dont la tige est munie d'angles saillans ou de nervures prononcées qui forcent l'épiderme à se fendre en long, quel que soit le mode d'accroissement de la tige.

II. La structure des monocotylédones, que M. Desfontaines a fait connaître d'une manière si intéressante, est beaucoup plus simple que celle des dicotylédones. On n'y trouve ni moelle, ni prolongemens médullaires, ni corps ligneux, ni écorce véritablement distincte. Pour avoir un emblème grossier de leur organisation, imaginons que le corps ligneux d'une dicotylédone vienne à s'évanouir; que l'écorce continue à croître par l'addition de nouvelles couches placées à l'intérieur; que toutes ces couches soient peu ou point distinctes les unes des autres, & nous aurons une idée de la structure générale d'une monocotylédone; nous concevrons ainsi comment leurs fibres extérieures sont les plus dures, par conséquent les plus dures, & à l'état de bois parfait; comment les intérieures, étant les plus jeunes, sont les plus molles, les plus flexibles, & à l'état d'aubier; com-

ment la tige, n'étant pas formée de couches superposées, conserve, pendant toute sa vie, une forme cylindrique; comment les couches extérieures, étant devenues ligneuses, c'est-à-dire, moires, & n'étant plus susceptibles de végétation, la tige ne peut croître que par la *foimée*; comment enfin, pour juger de l'âge d'un tronc de monocotylédones, on doit compter, non les couches intérieures, puisqu'elles ne sont point distinctes, mais les impressions circulaires souvent marquées en travers sur sa tige.

La coupe transversale d'une monocotylédone présente des vaisseaux ou des fibres tantôt droits, tantôt disposés par faisceaux; chacune de ces fibres est toujours entourée par un tissu cellulaire qui est plus abondant dans l'intérieur du tronc, c'est-à-dire, à l'entour des jeunes fibres, & qui remplace ainsi la moelle des dicotylédones. Les cellules intérieures du tronc se dessèchent & s'endurcissent, comme dans les dicotylédones; & forment ainsi un épiderme plus ou moins épais.

On peut distinguer plusieurs sortes de tiges parmi les monocotylédones, & comme elles s'éloignent beaucoup des formes ordinaires aux plantes de nos climats, on en a désigné plusieurs sous des noms particuliers.

1°. La tige des palmiers qu'on retrouve dans les *yucca*, &c. est forte, droite, ligneuse; elle a reçu le nom de *stipes*, de *caudex*; elle est toujours couronnée par un faisceau de feuilles qui naissent constamment à l'intérieur les unes des autres, de sorte que les plus anciennes sont chassées à l'extérieur par les plus jeunes, & que la tige ne semble être qu'un faisceau de pétioles.

2°. La tige des asparagées diffère de la précédente par sa faiblesse, & parce que les feuilles naissent çà & là le long de la tige; sa structure est encore peu connue.

3°. La tige des fougères est tantôt droite, ligneuse & verticale, comme celle des palmiers; tantôt flexible & grimpante, comme celle de certaines asparagées; tantôt couchée & rampante à la surface du sol ou dans la terre. Elle paraît composée de faisceaux de fibres qui exsudent un suc brun & visqueux; ce qui forme, sur leur coupe transversale, des arêtes sinueuses.

4°. Les tiges en gaine qu'on observe en grand dans les bananiers, & qu'on retrouve dans la plupart des grandes scyramines & des drynaryrhizées, ne sont pas de véritables tiges, mais des bulbes très-allongés. Selon l'observation de M. Desfontaines, elles ne sont composées que par les gaines des feuilles qui s'enveloppent les unes les autres étroitement, & qui se dégradent successivement. Ici, comme dans les palmiers & toutes les monocotylédones, les feuilles les plus anciennes sont extérieures, & les nouvelles naissent du centre.

6°. La tige des graminées, qui a reçu le nom de chaume, semble, comme la précédente, composée par les bases des feuilles engainantes, & étroitement appliquées l'une sur l'autre; mais elle en diffère essentiellement en ce qu'il se forme un nœud, c'est-à-dire, un plexus de fibres dans le lieu où l'une des couches, quittant sa direction, se sépare de la tige pour former une feuille. L'intervalle d'un nœud à l'autre offre souvent une cavité qui se forme pendant la végétation par le déchirement du tissu cellulaire.

6°. La tige des plantes bulbeuses est réduite à ce plateau orbiculaire & souterrain, qui pousse en dessous les racines, & au dessus les feuilles & les fleurs. On donne le nom de *bulbe* ou d'*oignon* (bulbus) à l'assemblage qui résulte de cette tige & des feuilles avortées, semblables à des écailles qui en naissent. La bulbe est ordinairement arrondie: on a coutume de la regarder comme une racine; mais on doit plutôt l'assimiler partie aux tiges, & partie aux bourgeons. On distingue parmi les bulbes plusieurs espèces qui tiennent à la forme de la tige.

La *bulbe solide* ou *tubéreuse* (bulbus solidus, bulbus tuberosus) a lieu lorsque la tige avortée, au lieu d'être réduite à un plateau orbiculaire, prend la forme d'une masse tuberculeuse arrondie ou ovoïde; par exemple, dans les safrans.

La *bulbe allongée* (bulbus elongatus). Je nomme ainsi celles où la tige, au lieu d'être réduite à un simple plateau orbiculaire, s'allonge sous la forme d'un cylindre recouvert de tunique; par exemple, dans l'*Allium senescens*.

La *bulbe des chaumes* (bulbus culmaceus) ne se trouve que dans les graminées; les parties de leur chaume comprises entre les deux nœuds inférieurs, se renflent, se raccourcissent, & étant recouvertes par les gaines de la feuille, ressemblent à une véritable bulbe, tel, par exemple, que l'*orge bulboux*. (Docand. Flor. frang.)

Quant aux autres propriétés des tiges, elles peuvent être considérées, relativement à leur consistance, à leur composition, à leurs divisions, à leur direction, &c. ainsi :

La *tige*, considérée, 1°. dans sa *consistance*, offre différents degrés dont on a désigné les principaux par des noms particuliers. On la nomme

— *Herbacée* (herbaceus) lorsqu'elle est tendre, qu'elle a peu de consistance, & qu'elle périclote avant de durcir, telle que celle de la laitue. Les plantes dont les tiges sont herbacées, sont nommées des *herbes* (herbæ).

— *Sous-ligneuse* (suffrutescens) lorsque sa base subsiste sensiblement, tandis que ses rameaux ou ses sommets sont herbacés & périssent tous les ans, telle que celle de la douce-amère, *folium*

dulcamara. Les plantes de cette nature sont nommées des *sous-arbrisseaux* (suffrutices).

— *Ligneuse* ou *tronc* (fruticosa, lignosa, truncus) lorsqu'elle est d'une consistance solide, semblable à celle du bois, & qu'elle subsiste après son endurecissement. Les plantes ligneuses sont appelées des *arbrustes* (frutices) lorsqu'elles jettent des branches dès leur base, & ne portent point de boutons; *arbrisseaux* (arbutus), quand elles jettent des branches dès leur base, & prennent des boutons; *arbres* (arbores), quand leur tige est simple & nue à la base, & se divise en branches vers le haut.

— *Solide* (solidus) lorsqu'elle est tout-à-fait pleine, comme dans l'*orchis maculé* (*orchis maculata*).

— *Fistuleuse* ou *creuse* (stulosus) lorsqu'elle forme un tube ou un cylindre évidé, comme celle de l'oignon, du potreau, &c.

La consistance de la tige peut encore varier par différents degrés qu'on exprime par les termes de *molle* (molis), quand elle manque de fermeté; *lâche* (laxus, debilis), lorsqu'ayant une situation droite, sa délicatesse ou sa flexibilité la fait jouer librement en tout sens, comme celle de beaucoup de graminées; *spongieuse* (spongiosus), lorsque, ferme & solide au dehors, elle est intérieurement remplie d'une moelle légère, spongieuse; *charnue* (succulentus); *ferme* (rigidus), lorsqu'elle se relève enjurement & avec une espèce d'élasticité toutes les fois qu'on la courbe, comme dans le *carex vulpina*; *seche* (siccus), &c. Ces divers termes ont, en botanique, la même acception que dans le langage ordinaire.

2°. Si l'on considère la *composition* de la tige, on dit qu'elle est :

— *Sans nœud* (anodis, aequalis) lorsqu'elle se continue également sans être interrompue par des nœuds, tel que le scirpe des lacs (*scirpus lacustris*). Ce terme ne s'emploie que par opposition aux suivants.

— *Noueuse* (nodosa) lorsqu'elle offre, d'espace en espace, des nœuds solides, plus ou moins tendus, & très-difficiles à rompre, tel que le chaume des graminées.

— *Articulée* (articulatus) lorsqu'elle offre, d'espace en espace, des places d'extrémités, tendues ou non tendues, où elle se casse facilement, & où elle se divise d'elle-même en articles dans la vieillesse, comme, par exemple, la tige des reillets. On emploie quelquefois le terme d'*articulé* à la place de celui de *noueux*, quoique leurs sens soient absolument contradictoires; ainsi le scirpe articulé devroit être plutôt nommé scirpe *noueux*.

3°. Si l'on considère la tige d'après ses *divisions*, on dira qu'elle est :

— Simple (*simplex*) lorsqu'elle se continue uniformément, & ne se divise que vers son sommet ou même point du tout, comme la tige des *orchis*.

— Rameuse (*ramosa*) lorsqu'on veut exprimer en général que la tige se divise, sans assigner la manière dont elle le fait, ou bien lorsqu'elle se ramifie sans un ordre apparent.

— Branchue (*brachiatus*) lorsque les rameaux sont opposés, & forment des espèces de bras, comme dans le *mercurialis annua*.

— Fourchue (*furcatus*, *bifurcatus*) lorsqu'elle se divise au sommet en deux branches simples.

— Dichotome ou plusieurs fois bifurquée (*dichotomus*), lorsqu'elle se divise en deux branches, qui sont elles-mêmes une ou plusieurs fois divisées en deux rameaux, comme dans la valériane mâche (*valeriana locusta*), &c.

On dit de même trichotome (*trichotomus*) & trifurquée (*trifurcatus*) lorsque les divisions ont lieu trois à trois.

— Paniculée (*paniculatus*) lorsque les rameaux, par leurs fréquentes subdivisions, imitent une panicule, comme dans le *saxifraga corydson*.

— En niveau, nivelées (*sagittatus*) lorsque les rameaux sont tous d'une égale hauteur, comme si on les avoit nivelées en les coupant supérieurement. Par une contradiction bizarre, on emploie aussi le terme latin *sagittatus* pour synonyme de pyramidale.

— Pyramidale (*pyramidalis*, *sagittatus*) lorsque les rameaux, étant droits & ferrés, donnent à la plante l'aspect d'une pyramide élancée, tel que le peuplier d'Italie (*populus pyramidalis*).

— Prolifère (*proliferus*) lorsque la tige ne produit de rameaux qu'à son extrémité, d'où ils partent tous d'un centre commun.

— Effilée (*virgatus*) lorsqu'elle s'allonge en manière de baguette ou lorsqu'elle produit des rameaux droits, allongés, menus & plians comme l'osier.

4°. Si l'on considère la direction ou la situation de la tige, on dit qu'elle est :

— Droite, verticale ou perpendiculaire (*erectus*, *perpendicularis*) lorsqu'elle se relève dans une direction perpendiculaire à l'horizon.

— Roide (*striatus*) lorsque non-seulement elle est roide, mais encore amincie, & annonçant à l'œil une sorte de roideur, comme celle de l'*Helianthus giganteus*.

— Oblique (*obliquus*) lorsqu'elle se relève obliquement à l'horizon, comme dans le *pea annua*,

— Montante ou ascendante (*ascendens*) lorsqu'elle est oblique ou horizontale à sa base, elle se recourbe en se rapprochant de la verticale, comme dans le *panicum colonum*, l'*artemisia glacialis*.

— Genouillée ou coudée (*geniculatus*) quand elle se courbe subitement en forme de coude ou de genou, comme celle de l'*alopecurus geniculatus*, &c.

— Inclivée (*declinatus*) lorsqu'étant d'abord un peu oblique ou droite, elle forme ensuite un arc dirigé vers la terre, tel que, par exemple, le fœu de Salomon (*convallaria polygonatum*).

— Courbée ou penchée (*incurvata*, *nutans*) lorsqu'étant d'abord tout-à-fait droite, son extrémité s'incline ou même retombe perpendiculairement, comme celle de la tritillaire pintade (*tritillaria meleagris*).

— Ouverte (*patens*) lorsque du collet de la racine partent plusieurs tiges un peu divergentes, & formant des angles aigus entr'elles : tel est l'*hesperis trifida*.

— Étalée (*patulus*) lorsque plusieurs tiges partant de la même racine, s'écartent des leur base, & laissent entr'elles un angle obtus.

— Diffuse (*diffusus*) lorsque les rameaux naissent dès la base, forment des angles très-ouverts, divergens dans tous les sens, comme dans le *polygnum divaricatum*.

— Couchée (*procumbens*) lorsqu'étant trop faible pour se soutenir, elle s'étend horizontalement sur la terre sans y pousser de racines, tel que le mouron (*anagallis arvensis*).

— Tombante (*decumbens*) lorsqu'étant d'abord un peu redressée, elle retombe ensuite sur la terre, telle, par exemple, que la bette maritime (*beta maritima*).

— Rampante (*repens*) lorsqu'étant couchée, elle s'attache à la terre par des racines qu'elle pousse çà & là, comme la nummulaire (*lysimachia nummularia*), l'argentine, &c.

— Stolomifère ou traçante (*stoloniferus*) lorsque du collet de la racine partent des rejets particuliers qui s'étendent sur la terre, s'y attachent par des houppes de racines, & reproduisent ainsi de nouvelles plantes, comme dans le fraiser, &c.

— Radicante (*radicans*) lorsqu'étant droite, oblique ou grimpante, elle pousse çà & là des racines, comme la joubarte en arbre.

— Cramponée (*alligatus*) lorsqu'elle pousse des crampons ou appendices particuliers, au moyen desquels elle s'accroche aux corps voisins, comme le kerre, &c.

— Flexueuse ou en zigzag (*flexuosus*) lorsque

d'un

d'un nœud à l'autre elle se rejette en formant alternativement des angles rentrants & saillans, comme dans le *foliolo flexicaulis*, &c.

— *Sarmenreuse* (*sarmenosa*) lorsqu'étant longue & foible, elle s'entortille sur les corps voisins, & s'y soutient sans le secours des racines, des vrilles & des crampons.

— *Grimpante* (*scandens*) lorsqu'étant sarmenreuse, elle s'accroche au moyen des vrilles, comme les branches de la vigne, &c.

— *Enroulée* (*volubilis*) lorsqu'étant sarmenreuse, elle se roule en spirale autour des corps qu'elle rencontre.

On distingue parmi ces spirales celles qui se font de gauche à droite, c'est-à-dire, dans le même sens que le mouvement diurne du soleil, comme dans le houblon, & celles qui se font dans un sens contraire au mouvement diurne du soleil, c'est-à-dire, de droite à gauche, comme dans le haricot. Pour faire cette observation, on se suppose au centre de la spirale, & tourne du côté du midi.

5°. Considérée quant à la figure, la tige se rapporte à quelque figure géométrique régulière. Elle est :

— *Cylindrique* (*teres*, *cylindricus*) lorsque, semblable à un bâton ou à une canne, elle forme un cylindre, & n'a aucun angle remarquable, comme celle du *typha*, &c.

— *Demi-cylindrique* (*femi-teres*) lorsqu'elle approche de la forme cylindrique, comme lorsqu'elle est cylindrique d'un côté & un peu aplatie de l'autre : telle est celle du *staphylea rubra*.

— *Comprimée* (*compressus*) lorsqu'elle semble avoir été aplatie dans sa longueur, c'est-à-dire, lorsque la coupe transversale représente une ellipse, tel, par exemple, que le paturin comprimé, annuel (*poa compressa*, *annua*).

— *Gâtées* ou à deux tranchans (*angustis*) lorsqu'elle est tellement comprimée, que ses deux côtés saillans sont anguleux, comme celle du scou de Salomon (*convallaria polygonatum*), de l'ail penche (*allium nutans*), &c.

— *Anguleux* (*angulosus*) lorsqu'elle est munie longitudinalement de plus de deux angles saillans, comme celle de l'aillette (*waccinium myrtillus*).

On considère souvent le nombre de ces angles, & on dit de la tige, qu'elle est :

— *Triangulaire* (*triangularis*, *trigonus*) lorsqu'elle a trois angles saillans.

— *A trois côtés* (*triqueter*) lorsque ses trois faces sont égales.

— *Quadrangulaire* (*quadrangularis*, *tetragonus*) lorsqu'elle a quatre faces & quatre angles ; enfin,

Botanique, Tome VII.

pentagone (*pentagonus*), hexagone (*hexagonus*), selon le nombre de ses angles.

D'autres fois on considère la grandeur & l'ouverture de ces angles, & on dit que la tige est chargée d'angles aigus (*caulis acutangularis*) lorsque le sommet des angles paroît tranchant, ou d'angles obtus (*caulis obtusangularis*) lorsque le sommet des angles paroît émouffé.

6°. Si l'on observe les accessoires de la tige, on dit qu'elle est :

— *Feuillée* (*foliosus*) lorsqu'elle supporte des feuilles dans sa longueur, outre les feuilles radicales.

— *Non feuillée* (*aphyllus*) lorsqu'elle est entièrement privée de feuilles, excepté les feuilles radicales, qui même n'existent pas toujours ; l'orobanche, &c.

— *Nue* (*nudus*) lorsqu'elle ne porte ni feuilles, ni écailles, ni stipules, ni aucune autre partie remarquable, à moins que ce ne soit des rameaux. Au reste, cette expression ne s'emploie pas toujours dans un sens rigoureux : souvent elle ne fait que désigner l'absence de telle ou telle partie par opposition à quelque autre, & on s'en sert par comparaison pour établir la distinction de deux espèces.

— *Épineuse* (*spinosus*) lorsqu'elle est armée d'épines qui naissent dans le bois, où elles sont adhérentes, comme dans le prunier épineux, l'aube-épine, &c.

— *Aiguillonnée* (*aculeatus*) lorsque sa superficie est garnie d'aiguillons piquans, qui ne tiennent qu'à l'écorce, comme dans la ronce, le rosier, &c.

— *Velue* (*villosus*) lorsque les poils qui couvrent sa superficie sont un peu ramassés, compacts & un peu fermes.

— *Pubescente* (*pubescens*) lorsque sa superficie est chargée de poils foibles, mous, faciles à distinguer.

— *Cotonneuse*, *laineuse* (*tomentosus*, *lanatus*) lorsque sa superficie est chargée de poils tellement entrelacés les uns dans les autres, qu'on ne peut les distinguer séparément, & que leur abondance donne à la plante un aspect cotonneux & blanchâtre, ou forme un tissu qui imite une étoffe de laine : telle est celle du *gnaphalium dioicum*, du *verbascum thapsus*, &c.

— *Cuisante* (*urens*) lorsque sa superficie est couverte de poils ou de petits aiguillons à peine sensibles, dont la piqure cause une démangeaison brûlante & presque inflammatoire, comme l'ortie.

— *Vrillée* (*cirrhosus*) lorsqu'elle est chargée de filets ou de vrilles qui s'entortillent & s'accrochent aux corps voisins.

— Écailluse (*quammosus*) lorsqu'elle est chargée d'écaillés ou de folioles courtes, éparées & membraneuses, qui imitent des écailles, comme les orobanchés, le pas-d'âne (*russuligo*), &c.

— Stipulacée (*stipulatus*, *stipulatus*) lorsqu'elle est garnie de stipules, comme celles de la persicaire, de plusieurs cistes, &c.

— Engainée (*vaginatus*) lorsque les stipules ou les feuilles l'embrassent en forme de gaine, comme dans les *polygonum*, les graminées, &c.

— Imbriquée (*imbriatus*) lorsque les feuilles ou les écailles dont elle est chargée sont éparées, très-rapprochées, &c. se recouvrent mutuellement comme les ruiles d'un toit, tels que l'*aretia helvetica*, le *cupressus sempervirens*.

— Ailée (*alatus*) quand elle est garnie longitudinalement de membranes qui débordent sa superficie, &c. qui sont ordinairement un prolongement des feuilles, comme, par exemple, l'*onopordum acanthium*, plusieurs chardons, &c.

— Inermis (*inermis*) lorsqu'elle n'a ni épines ni aiguillons.

— Glabre (*glaber*) lorsqu'elle n'a ni poils ni duvet cotonneux.

7°. Si l'on considère la superficie de la lige ou sa surface, on dit qu'elle est :

— Subéreuse (*suberosus*) lorsqu'elle est revêtue d'une écorce un peu flexible, mais en même temps élastique, comme celle du liège.

— Crevassée (*rimosus*) lorsque son écorce extérieure est remarquable par des crevasses nombreuses & irrégulières, comme encore celle du liège (*quercus suber*).

— Feuilletée (*unicatus*) lorsque sa superficie paroît recouverte par différentes membranes appliquées les unes sur les autres, comme des feuilles.

— Lisse (*levis*) lorsqu'elle est partout égale, unie, très-polie, comme dans le pavor, le fumetere, &c.

— Striée (*striatus*) lorsque sa superficie est chargée longitudinalement de petites côtes nombreuses & rapprochées, comme dans le *charophyllum sivevire*.

— Sillonée, cannelée (*falcatus*) lorsque les excavations longitudinales, plus profondes & plus élargies, imitent des sillons.

— Rude, âpre (*asper*, *scaber*) lorsque sa superficie est chargée d'éminences ou de points rudes & saillans. On dit encore dans le même sens, qu'elle est raboteuse (*galium parviflorum*).

— Tuberculeuse (*tuberculatus*) lorsqu'elle porte à sa surface des tubercules saillans & arrondis.

— Échiné ou muriqué (*echinatus*, *muricatus*) quand ses tubercules sont grands, pointus, rudes, anguleux, &c. forment des saillies aiguës, un peu piquantes, comme les riges de la grance (*rubia tinctorum*).

TILLANDE, CARAGATE. *Tillandsia*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs régulières, de la famille des ananas, qui a des rapports avec les *burmannia*, &c. qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont presque toutes radicales; les fleurs terminales, disposées en épi ou en panicule.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à trois découpures; une corolle à trois divisions profondes; six étamines; une capsule à trois loges, à trois valves; des semences chrevues.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à trois découpures oblongues, lancéolées, persistantes, roulées sur elles-mêmes.

2°. Une corolle monopétale ou divisée en trois pétales spatulés, plus longs que le calice, ouverts &c. réfléchis à leur partie supérieure, insérés sur le réceptacle.

3°. Six étamines, dont les filaments sont filiformes, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthères inclinées, ovales, en cœur, à deux loges.

4°. Un ovaire supérieur, à trois sillons, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate trisé.

Le fruit est une capsule oblongue-linéaire, acuminée, à trois sillons, à trois loges, à trois valves; les valves doubles, roulées en dedans à leurs bords; les extérieures coriaces; les intérieures un peu plus larges, calleuses, très-luisantes.

Les semences très-nombreuses, allongées, attachées au fond de la capsule, accompagnées de quelques poils réunis, & environnées d'une aigrette très-pileuse.

Observations. Ce genre a déjà été décrit dans cet ouvrage à l'article CARAGATE. Quelques corrections faites dans les caractères génériques, &c. une suite de belles espèces publiées par MM. Ruiz & Pavon dans la *Flore du Pérou*, par M. Swartz dans la *Flore des Indes occidentales*, m'ont déterminé à le rappeler ici sous le nom de TILLANDE, afin de faire connoître ces espèces, qui deviennent un supplément nécessaire à ce genre, &c. qui sont plus nombreuses &c. même mieux observées que celles qui avoient été établies d'abord, la

plupart de ces dernières n'étant décrites que d'après des individus fêcs ou tronqués. Pour compléter autant que possible les observations sur ce genre, j'ai cru devoir rappeler quelques autres espèces déjà mentionnées dans les *caragates*.

ESPÈCES (qu'il faut placer à la suite de l'article *CARAGATE*, vol. 1, pag. 619).

1. *TILLANDSIA FLEXUEUX*. *Tillandsia flexuosa*. Sw.

Tillandsia spicis laxis, flexuosis; floribus distichis, remotis; foliis lanceolatis linearibus, reclinis; caule epice subvisio. Swartz, Prodr. 57, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 590.

Tillandsia (tenuifolia), foliis lineari subulatis, integerrimis, imbricatis; spica simplici, laxa. Jacq. Amer. pag. 92. tab. 73.

Cette plante, d'après M. Swartz, ne doit pas être confondue avec le *tillandsia tenuifolia* de Linné, auquel ce dernier auteur rapporte la synonymie de Jacquin.

Ses racines sont longues, roides, filiformes. Les feuilles, presque toutes radicales, sont sessiles, lanceolées, linéaires, plus élargies, ventrues & embrassantes à leur base, lâches, entières à leurs bords, membraneuses, striées, réfléchies à leur sommet, d'un vert-blanchâtre en dessous, couvertes de très-petites écailles farineuses. De leur centre s'élève une tige plus longue que les feuilles, cylindrique, haute de deux ou trois pieds, chargée d'écailles vaginales, rouges, alternes, lanceolées; les inférieures prolongées en une foliole linéaire.

Ces tiges supportent à leur sommet deux ou trois épis allongés, dont le rachis est flexueux, triangulaire; les fleurs alternes, distantes, presque sur deux rangs, munies de bractées en forme de spathe lanceolées, concaves, striées. Le calice est trigone à sa base, persistant, à trois découpures droites, colorées; trois pétales linéaires, plus longs que le calice, pourpres ou écarlates, réfléchis à leur sommet; six filaments alternes, un peu plus courts que les pétales, filiformes, insérés sur le réceptacle; les anthères ovales, blanchâtres, bifides à leur base. L'ovaire est ovale, à trois faces; le style filiforme; le stigmate trifide; la capsule oblongue, cylindrique, trigone, acuminée, à trois loges, à trois valves; noire & luisante en dedans; les semences couvertes d'une aigrette à poils jaunes, capillaires.

Cette plante croît sur les branches des vieux arbres, dans le voisinage de la mer, à la Jamaïque & aux environs de Carthagène. (*Descript. ex Swartz.*)

2. *TILLANDSIA* à feuilles menues. *Tillandsia tenuifolia*. Swartz.

Tillandsia spicis alternis, imbricatis; floribus distichis; foliis lineari-filiformibus, erectis, apice setaceis. Swartz, l. l. Ind. occid. vol. 1. pag. 592. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 12. n°. 4.

Tillandsia (tenuifolia), foliis filiformibus, integerrimis; spica simplici, laxa. Linn. — Roy. Lugd. Bat. 25. (Exclue Jacquin synonymon.)

Tillandsia parvifolia, parva, foliis tenuissimis, erectis; spica breviori, simplici, distichâ. Bowne, Jam. 194.

Renealmia spica multiplici, angustifolia; flore ceruleo. Plum. Gen. Amer. 34, & Icon. 238. fig. 2.

Viseum euryphyllodes, minus; foliorum imis viridibus, apicibus subrubicundis; flore tripetalo, purpureo; semine filamentoso. Sloan, Jam. 77. Hist. 1. pag. 190. tab. 121. fig. 1.

Cette espèce, qui ne doit pas être confondue avec la précédente, a des tiges simples, hautes d'un pied, feuillées dans toute leur longueur. Les feuilles radicales & inférieures sont aussi longues que les tiges, élargies en gaine à leur base, puis linéaires, filiformes, relevées en carène, roulées à leurs bords, roides, droites, sétacées à leur sommet; celles des tiges vaginales, fortement appliquées contre la tige, terminées par une pointe très-longue, linéaire, filiforme.

Les tiges supportent à leur sommet trois ou quatre épis alternes, sessiles, lanceolés, longs d'un pouce, chargés de fleurs imbriquées sur deux rangs, accompagnées de spathe oblongues, obtuses. Les pétales sont bleus.

Cette espèce croît aux Antilles, sur les arbres. *?* (*Descript. ex Swartz.*)

3. *TILLANDSIA* sétacée. *Tillandsia setacea*. Sw.

Tillandsia spica simplici; spatia distichis, imbricatis; foliis lineari-filiformibus, reclinis, glabris. Swartz, l. l. Ind. occid. vol. 1. pag. 593. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 12. n°. 6.

Elle ressemble beaucoup, par plusieurs caractères, au *tillandsia tenuifolia* Linn.; mais elle en diffère par son port, par ses feuilles inclinées & rabattues, par un épi simple, au lieu de plusieurs épis alternes.

Ses tiges sont presque droites, cylindriques, hautes d'un pied & plus, couvertes dans toute leur longueur de gaines alternes, presque imbriquées, ovales, élargies à leur base, atténuées à leur sommet en une foliole linéaire, sétacée; les feuilles radicales nombreuses, presque aussi longues que les tiges, imbriquées, linéaires-filiformes, sétacées à leur sommet, roides, couvertes d'une poussière cendrée, dilatées à leur base.

Les tiges supportent à leur sommet un épi simple. Ppp 1

ple, entier, ovale-lancéolé, chargé de filurs alternés, disposées sur deux rangs, munies de spatules imbriquées, ovales, élargies, membraneuses, presque coriaces. Les capsules sont ovales, acuminées; les semences aigrettes.

Cette plante croît sur les arbres, à la Jamaïque. *z* (Descript. ex Swartz.)

4. TILLANDE fasciculée. *Tillandsia fasciculata*. Swartz.

Tillandsia spicis lateralibus, distichis, imbricatis; foliis lanceolato-subulatis, erectis, striatis. Swartz, Prodr. pag. 56, & Flor. Ind. occident. vol. 1. pag. 586. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 13. n° 8.

An tillandsia clavata? Lam. Dict. vol. 1. p. 617.

Il y a beaucoup de rapport entre cette espèce & le *tillandsia clavata* Lam. Ses racines sont roides, filiformes; ses tiges simples, feuillées, hautes d'un à deux pieds; les feuilles radicales larges, concaves, vaginales à leur base, lancéolées, droites, roides, subulées vers leur sommet, roulées à leurs bords, pubescentes à l'extérieur, un peu courbées à leur sommet; les caulinaires plus courtes, ovales, presque imbriquées, terminées par une longue pointe subulée.

Les épis sont droits, terminaux & latéraux, alternés, sur deux rangs; leur rachis triangulaire; les spathe ou bractées imbriquées, ovales, acuminées, glabres, membraneuses à leurs bords, chacune d'elles contenant une fleur sessile, foliaire, dont le calice est tubulé, à trois faces, à trois découpures vers son sommet. Le fruit est une capsule oblongue, acuminée, trigone, longue d'un pouce, à trois valves roides, noirâtres en dedans; recouverte par le calice agrandi, divisé en deux parties; la supérieure biffée; l'inférieure convexe, lancéolée; les semences chargées de poils aigrettes, foveux, capillaires.

Cette espèce croît sur les arbres, à la Jamaïque, vers les rives maritimes. *z* (Descript. ex Swartz.)

5. TILLANDE penchée. *Tillandsia nutans*. Sw.

Tillandsia spicis subdivisis, nutantibus; floribus distichis, ovatis; foliis ovato-lanceolatis, membranaceis; caule subnudo. Swartz, Prodr. pag. 56, & Flor. Ind. occident. vol. 1. pag. 588. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 13. n° 9.

Ses tiges, hautes d'un à deux pieds, sont glabres, cylindriques, presque articulées, environnées à leur base de feuilles radicales, ovales-lancéolées, entières, membraneuses & ventruës à leur partie inférieure, glabres, striées, longues d'un demi-pied. Les caulinaires ne sont que des gaines alternes, rapprochées, ovales-lancéolées, acuminées, glabres, membraneuses, striées.

Les épis sont terminaux, un peu difformes, alternés; le rachis incliné, anguleux, chargé de fleurs éparées, rapprochées, mais point imbriquées; les bractées ovales, concaves, obtuses; le calice à trois folioles ovales-lancéolées, persistantes; la corolle blanche; les pétales droits, ovales-lancéolés; les éramines de la longueur des pétales; les anthères ovales, presque sagittées; l'ovaire glabre, acuminé; le style court, trigone; trois stigmates simples; une capsule ovale, un peu arrondie, trigone, acuminée, à trois valves noires en dedans; les semences nombreuses, couvertes de poils très-longs, foveux, luisants, blanchâtres.

Cette plante croît sur les montagnes, à la Jamaïque, sur les branches d'arbre. *z* (Descript. ex Swartz.)

6. TILLANDE farineux. *Tillandsia prainosa*. Sw.

Tillandsia spicis simplicis, spathe imbricatis, foliis lanceolato-linearibus, rectatis, spatheisque squamuloso-tomentosis. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 1. pag. 594. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14. n° 12.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec le *tillandsia recurvata*, dont cette dernière diffère par ses feuilles linéaires, subulées; par les pédoncules qui partent des racines, & par ses spathe à deux fleurs.

Cette plante n'a pas plus de deux ou trois pouces de haut. Ses racines sont petites, roides, crépues, filiformes; ses tiges très-courtes & feuillées; les feuilles radicales larges, ovales, ventruës, membraneuses à leur base, linéaires-lancéolées, striées, roulées à leurs bords, inclinées, tomenteuses & farineuses; les caulinaires semblables aux feuilles radicales, mais point ventruës à leur base.

Les fleurs sont disposées en un épi simple, terminal, long d'un pouce, ovale, aigu, chargé de spathe uniflores, imbriquées, ovales, acuminées, pulvérulentes; les pétales bleus, plus longs que les spathe; les capsules glabres, oblongues, acuminées, à trois faces.

Cette plante croît à la Jamaïque, sur les rameaux des vieux arbres. *z* (Descript. ex Swartz.)

7. TILLANDE blanchâtre. *Tillandsia canescens*. Swartz.

Tillandsia spicis subternis; foliis linearibus, erectis, caule aquantibus, incanis. Swartz, Prodr. pag. 57, & Flor. Ind. occident. vol. 1. pag. 595. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14. n° 13.

Elle se rapproche du *tillandsia polytachia*: on l'en distingue à ses tiges plus élevées, à ses feuilles glabres, flexueuses, rabattues; à ses épis éparés, nombreux, lancéolés.

Ses racines sont brunes, courtes, simples, crépues, filiformes; les tiges feuillées, hautes d'environ un pied; les feuilles radicales imbriquées, droites, linéaires, de la longueur des tiges, roides, blanchâtres, élargies à leur base en une gaine ovale, concave, ventrue, membraneuse; les feuilles caulinaires vaginales, un peu lâches, linéaires, aiguës; les épis ordinairement au nombre de trois, sessiles, terminaux, un peu comprimés, ovales, aigus; les fleurs disposées sur deux rangs; les spathe imbriquées, glabres, ovales-lancéolées; la corolle rouge; les pétales allongés; la capsule oblongue, acuminée, à trois faces, enveloppée par la spathe.

Cette espèce croît sur les arbres, à la Jamaïque.
 x (Descript. ex Swartz.)

8. TILLANDE à feuilles étroites. *Tillandsia angustifolia*. Sw.

Tillandsia spicis fasciculatis; foliis linearilanceolatis, subrectis, glabris, caulem superantibus. Swartz, Prodr. pag. 57. & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 596. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14. n° 14.

Ses tiges, plus courtes que les feuilles, les feuilles droites, allongées, les épis séparés par des gaines foliacées, séparent encore cette espèce du *tillandsia polystachia*. Ses tiges sont simples, droites, feuillées, hautes d'environ deux pieds; les feuilles tant radicales que caulinaires, imbriquées, élargies, vaginales à leur base, lancéolées à leur partie supérieure, linéaires, redressées à leur sommet, glabres, roides, striées.

Les épis sont épars, alternes, presque fasciculés, comprimés, lancéolés, longs d'un pouce & demi, séparés par des gaines foliacées, chargés de fleurs nombreuses, disposées sur deux rangs; les spathe imbriquées, ovales, acuminées, glabres, striées, relevées en carène; les capsules glabres, allongées, acuminées, à trois faces, plus longues que les spathe.

Cette plante croît sur le tronc & les rameaux des arbres, à la Jamaïque & à la Nouvelle-Espagne. x (Descript. ex Swartz.)

9. TILLANDE à quatre fleurs. *Tillandsia tetrantha*. Ruiz & Pav.

Tillandsia erecta, pedunculis reflexis, quadriflora. Ruiz & Pav. Flor. péluv. vol. 3. pag. 39. tab. 267.

Ses racines sont composées de fibres brunes, nombreuses; elles produisent des feuilles toutes radicales, grandes, lancéolées, ensiformes, tachetées de points rougeâtres, réfléchies à leur sommet, imbriquées à leur base.

De leur centre s'élève une hampe solitaire, un

peu plus longue que les feuilles, flexueuse, cylindrique, revêue de plusieurs spathe alternes, presque imbriquées, ovales-lancéolées, acuminées, d'un pourpre-rose; les inférieures droites, concaves, recourbées à leur sommet; celles des fleurs presque horizontales, naviculaires; un pédoncule dans l'aisselle de chaque spathe, soutenant quatre fleurs presque sessiles. Leur calice est jaune, coriace, à trois découpures oblongues; la corolle violette, divisée en trois pétales roulés à leur base, presque tubulés, ouverts à leur partie supérieure, oblongs, cuneiformes, aigus; six filamens insérés sur le réceptacle, plus courts que les pétales, un peu planes; un style court, à trois sillons; trois stigmates; une capsule trigone, pyramidale, à trois loges; des semences nombreuses.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des Andes, sur les arbres & les rochers. Elle fleurit dans les mois de juillet & d'août. x (Descript. ex Ruiz & Pav.)

10. TILLANDE maculée. *Tillandsia maculata*.

Tillandsia paniculata composita, rubicunda; spicis subdivisis; foliis lanceolato-ensiformibus, maculatis. Ruiz & Pav. Flor. péluv. vol. 3. pag. 40. tab. 267.

Souvent cette plante est rouge sur toutes ses parties. Elle a des racines fasciculées, composées de fibres filiformes; elles produisent des feuilles lancéolées, ensiformes, amplexicaules & imbriquées à leur base, obtuses, acuminées à leur sommet, luisantes à leurs deux faces, canaliculées, couvertes de taches rouges ou purpurines, roulées en dehors à leur sommet; les extérieures graduellement plus grandes, étalées.

Les hampes sont droites, solitaires, rougeâtres, hautes d'environ trois pieds, simples, articulées; des écailles ovales, aiguës, striées aux articulations; les inférieures plus rapprochées; les supérieures distantes & plus courtes; une panicule terminale, longue d'un pied & demi, rouge, composée d'épis alternes, presque simples, garnis de bractées ovales, lancéolées, aiguës, concaves, striées, à demi amplexicaules, nombreuses, rougeâtres, ainsi que les calices; la corolle violette, composée de trois pétales roulés à leur partie inférieure, ouverts à leur partie supérieure, petits, perillans; les capsules velues, oblongues; les valves internes, scabres au dehors, renfermant des semences nombreuses, jaunâtres, linéaires, environnées d'une aigrette pileuse.

Cette plante croît au Pérou, dans les Andes, au milieu des grandes forêts, sur les arbres & les rochers; elle fleurit en juillet, août & septembre. x (Descript. ex Ruiz & Pav.)

11. TILLANDE à fleurs rouges. *Tillandsia rubra*. Ruiz & Pav.

Tillandsia paniculata simpliciter, rubra; spicis indivisis; foliis ensiformibus, subacuminatis. Ruiz & Pav. Flor. pér. vol. 3. pag. 40. tab. 266.

Cette plante croît ordinairement par touffes. Ses racines sont fibreuses; les feuilles toutes radicales se recouvrent les unes les autres à leur base; elles sont graduellement plus longues, ouvertes à leur partie supérieure, réfléchies en dehors, ensiformes, médiocrement acuminées, longues d'environ deux pieds, d'un blanc-argenté en dessous, d'un vert-luisant à leur face supérieure; les inférieures droites, les plus grandes garnies à leur base de petits points à peine sensibles.

Les hampes sont droites, solitaires, cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, garnies à leur partie inférieure d'écaillés alternes, spatulées, amplexicaules, striées, acuminées; la partie supérieure divisée en une panicule dense, rugueuse, composée de plusieurs épis simples, alternes, oblongs, lancéolés, divergens, garnis de bractées en forme de spathe, rouges, oblongues, acuminées, naviculaires, longues d'un pouce; ces épis supportent des fleurs sessiles, imbriquées. Le calice est d'un rouge-jaunâtre, de la longueur des bractées; la corolle petite, d'un pourpre-violet, divisée en trois pétales, réfléchis en dehors depuis leur milieu jusqu'à leur sommet; les capsules oblongues, les valves extérieures rudes en dehors, noires & luisantes en dedans, contenant des semences nombreuses, linéaires, environnées d'une aigrette pileuse.

Cette plante croît au Pérou sur les rochers; elle fleurit dans les mois de mars & d'avril. (Description ex Ruiz & Pav.)

12. TILLANDE à petites fleurs. *Tillandsia parviflora*. Ruiz & Pav.

Tillandsia paniculata simpliciter, 3-7 spiculis; floribus parvis, distichis; foliis subulatis, basi amplifolia. Ruiz & Pav. Flor. pér. vol. 3. pag. 41. tab. 269.

Ses racines sont fibreuses, tortueuses, fasciculées, d'un brun clair; elles donnent naissance à un grand nombre de feuilles toutes radicales, imbriquées, très-élargies à leur base, rétrécies & subulées, canaliculées, divergentes, longues de six à neuf pouces, blanchâtres, chargées de petites écaillés farineuses, très-nombreuses.

Les hampes sont droites, solitaires, très-simples, grêles, cylindriques, purpurines, hautes d'un pied, un peu inclinées, chargées d'écaillés alternes, vaginales, subulées, canaliculées, dis-

tantes, blanchâtres; une panicule terminale composée de trois à sept épis, alternes, distiques, écartés, divergens, munis de bractées ovales, lancéolées, blanchâtres, aiguës; le rachis comprimé, fl. xueux, blanchâtre, supportant des fleurs petites, alternes, sessiles, garnies chacune d'une petite bractée concave, une fois plus courte que le calice, ovale & un peu mucronée. Le calice est coriace, pâle; les découpures roulées les unes sur les autres; la corolle est blanche, divisée en trois pétales, étalés à leur partie supérieure, une fois plus longs que le calice; la capsule linéaire, presque huit fois plus longue que le calice, acuminée, à trois loges, à trois valves; les internes hispides & pâles à l'extérieur, luisantes & purpurines en dedans; les semences linéaires, oblongues, rougeâtres, entourées d'une aigrette pileuse.

Cette plante croît dans les Andes du Pérou, sur les rochers, dans les forêts; elle fleurit en août, septembre & octobre. (Description ex Ruiz & Pav.)

13. TILLANDE biflore. *Tillandsia biflora*. Ruiz & Pav.

Tillandsia scapo racemoso; floribus geminis; foliis ensiformibus, acutis. Ruiz & Pav. Flor. pér. vol. 3. pag. 41. tab. 268.

Cette espèce est souvent prolifère; ses racines fibreuses, fasciculées; les feuilles ensiformes, aiguës, presque égales, droites, étalées, striées; les extérieures un peu recourbées.

Les hampes sont droites, solitaires, très-simples, hautes d'un pied & demi, cylindriques, couvertes d'écaillés alternes, amplexicaules, striées, lancéolées, aiguës, terminées par une grappe simple, longue d'un demi-pied, garnie de fleurs geminées, alternes, un peu pédicellées, garnies de spathe allongées, lancéolées, concaves, striées, aiguës, recourbées & d'un vert-pâle à leur sommet; les capsules allongées, droites, de couleur jaunâtre, longues d'un pouce, contenant des semences nombreuses, linéaires, entourées d'une aigrette pileuse.

Cette espèce croît dans les Andes, au Pérou; elle est en fruit dans les mois d'août & de septembre. (Description ex Ruiz & Pav.)

14. TILLANDE purpurine. *Tillandsia purpurea*. Ruiz & Pav.

Tillandsia paniculata polystachia, rosacea; floribus distichis; petalorum laminis purpureis; foliis ensiformi-subulatis, recurvis. Ruiz & Pav. Flor. pér. vol. 3. pag. 41. tab. 270.

Cette plante produit des rejets nombreux, couchés, radicans; les racines sont brunes, ramennées; les feuilles presque vaginales, ensiformes,

divergentes, canaliculées, longues de six à neuf poüces, blanchâtres, toutes couvertes d'écaillés farineuses.

Les hampes sont solitaires, hautes d'un pied, glabres, droites, cylindriques, très-simples, chargées d'écaillés longues, alternes, subulées, élargies, vaginales & amplexicaules à leur partie inférieure, roulées; une panicule terminale, de couleur rose, composée de cinq à neuf épis alternes, munis de bractées ovales, concaves, aiguës, striées & blanchâtres; les fleurs sessiles, imbriquées, accompagnées de bractées oblongues, concaves, couleur de rose; le calice allongé & de même couleur; ses découpures toulées & striées; les pétales roulés à leur partie inférieure, ouverts à leur partie supérieure, blancs sur leurs ongles, d'un pourpre-foncé à leur limbe; la capsule pâle, oblongue, cylindrique, acuminée; les valves intérieures lisses en dehors, luissantes & d'un pourpre-foncé en dedans, contenant des semences nombreuses, un peu jaunâtres, accompagnées d'une aigrette pileuse.

Cette plante croît dans les environs de Lima, sur les collines, & dans les lieux sablonneux & pierreux au Pérou. Elle fleurit en juin & juillet. (Descript. ex Ruiz & Pav.)

15. TILLANDE à sept fleurs. *Tillandsia heptandra*.

Tillandsia spica septemfida, disticha; petalis albis, apice violaceis; foliis ensiformi-subulatis, acutissimis. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 21.

Ses racines sont fibreuses; ses feuilles toutes radicales, presque imbriquées, ensiformes, subulées, très-aiguës, canaliculées, blanches à leurs deux faces, un peu tomenteuses, très-entières.

Du centre des feuilles s'élève une hampe droite, presque haute d'un pied, très-simple, chargée d'écaillés oblongues, à demi-amplexicaules, aiguës; un épi terminal, très-simple, composé d'environ sept fleurs sessiles, disposées sur deux rangs, munies de bractées oblongues, lancéolées, concaves, d'un pourpre-violet. Les pétales sont blanches, un peu violet à leur sommet; la capsule oblongue, presque à trois faces, aiguë à sa base, environnée d'une aigrette capillaire, roussâtre, à plusieurs rayons.

Cette plante croît au Pérou, sur les rochers & les arbres, parmi les précipices; elle fleurit en juin, juillet & août. (Descript. ex Ruiz & Pav.)

16. TILLANDE à fleurs sessiles. *Tillandsia sessiliflora*. Ruiz & Pav.

Tillandsia scapo spicato, simplici; floribus solitariis, sessilibus; foliis sublingulatis, retusis. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 42. tab. 271. fig. 6.

C'est une plante glabre, dont les racines sont d'un brun-jaunâtre, composées d'un grand nombre de fibres capillaires, qui produisent des feuilles radicales, presque planes, un peu lingulées, striées, obtuses, longues de huit à neuf poüces, larges d'un poüce, les extérieures graduellement plus petites.

Les hampes sont droites, hautes d'un pied, grêles, cylindriques, une fois plus longues que les feuilles, articulées, couvertes d'écaillés distantes, vaginales, oblongues, obtuses, striées; un épi simple, droit, terminal, long de six poüces, garni de fleurs alternes, solitaires, & d'autant de bractées ovales, concaves, aiguës; le calice à ses découpures ovales, aiguës, à trois valves; les valves extérieures glumacées; les valves intérieures d'un violet-pourpre en dedans, les lacinies un peu jaunâtres, linéaires, oblongues, aigrettées à leur base; les poils d'un jaune-paillet.

Cette plante croît au Pérou, & fleurit dans les mois de novembre & de décembre. (Descript. ex Ruiz & Pav.)

17. TILLANDE capillaire. *Tillandsia capillaris*. Ruiz & Pav.

Tillandsia pedunculo subnullo, capillari, foliis triplis longiori, glabro; foliis linearibus; caule dichotomo. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 42. tab. 271. fig. C.

Elle a beaucoup de rapport avec le *tillandsia recurvata*; elle en diffère par ses tiges dichotomes; par ses feuilles plus nombreuses, plus larges, moins longues, rétrécies à leur base, point recourbées; par ses pédoncules capillaires, trois fois plus longs que les feuilles; par des bractées solitaires pour chaque fleur.

Elle forme, par ses rejets nombreux, des gains épais, blanchâtres, chargés d'écaillés farineuses, fort petites. Les racines sont courtes, fibreuses, capillaires, d'un blanc-sale; elles produisent des tiges hautes d'environ six poüces, feuillées, quelquefois dichotomes, garnies de feuilles imbriquées, disposées sur deux rangs, très-rapprochées, étalées, réfléchies, linéaires-subulées, striées à leur base, à demi amplexicaules.

Les pédoncules sont axillaires, droits, trois fois plus longs que les feuilles, très-glabres, capillaires, légèrement striés, à une, quelquefois à deux fleurs, munis d'une feuille à leur base; une bractée solitaire, oblongue, glabre, nerveuse. Le calice est partagé en trois découpures coriaces, scarieuses, d'un violet-foncé; la corolle blanche, à peine plus longue que le calice; les anthères jaunâtres. Les capsules sont linéaires, deux fois plus longues que le calice, à trois valves; les extérieures pâles; les intérieures calleuses, luisan-

ris, d'un violet-foncé; les femences linéaires, oblongues, accompagnées d'une aigrette pileuse & blanchâtre.

Cette plante croît au Pérou, sur les rochers, les arbres & les murs; elle fleurit dans les mois de novembre & de décembre. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

18. TILLANDE recourbée. *Tillandsia recurvata*, Linn.

Tillandsia pedunculo bifloro, foliis paulo longiori, leproso; foliis subulatis, declinatis erectisque. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 42. tab. 271.

Tillandsia foliis subulatis, scabris, reclinatiss; calmis unifloris; glanâ biflora. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 9. — Roy. Lugd. Bat. 25. — Swartz, Observ. Bot. pag. 121. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 14.

Viscum caryophylloides minus, foliis pruinâ instar candidantibus; flore tripetalo, purpureo; semine filamentoso. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 190. tab. 121. fig. 1. — Rai, Suppl. 406.

Tillandsia parafitica, parva, pruinosa, scapo tenui, biflora. Brown, Jam. 194.

Cette plante croît en gazon, & pousse des jets nombreux, droits, fasciculés, longs de trois à quatre pouces, simples ou quelquefois bîfides, chargés, sur toutes leurs parties, d'une poussière farineuse, abondante. Les feuilles sont imbriquées, disposées alternativement sur deux rangs, plus larges à leur base, subulées, canaliculées en dessus & les inférieures fortement recourbées; celles du milieu étalées, presque horizontales & les supérieures droites & plus longues.

Les pédoncules sont foliaires, filiformes, droits, un peu plus longs que les feuilles, médiocrement striés, munis d'une seule feuille à leur base, terminés par deux fleurs garnies de trois bractées droites, lancéolées, aiguës, embrassant les fleurs; l'extérieure, plus grande, plus aiguë. Le calice est de couleur purpurine; la corolle violette; les anthères de couleur incarnate; la capsule linéaire, cylindrique, trois fois plus longue que le calice, à trois valves doubles; les extérieurs d'un blanc de paille; les intérieurs d'un pourpre-foncé; les semences de couleur fauve, accompagnées d'une aigrette pileuse.

Cette plante croît à la Jamaïque & au Pérou, sur les pierres, les murs & les arbres, dans les lieux les plus chauds; elle fleurit aux mois de décembre & de janvier. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

Les habitants du Pérou font usage des feuilles de cette plante, broyées avec du sain-doux, dans les douleurs hémorrhoidales.

19. TILLANDE usnée. *Tillandsia usneoides*, Linn.

Tillandsia pedunculo uniflora. Brevi; caule ramoso, filiformi, flexuoso, pendulo; foliis subulato-filiformibus. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 43.

Tillandsia filiformis, ramosa, inorta, scabra. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 9. — Gronov. Vagb. 36. — Barrel. Franc. équinox. 99. — Roy. Lugd. Bat. 25. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 15.

Tillandsia (usneoides), pusilla, filiformis, inorta, pruinosa; floribus foliariis, scissilis. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 195.

Viscum caryophylloides, tenuissimum à ramis arborum musci in modum dependens, foliis pruinâ instar candidantibus, flore tripetalo, semine filamentoso. Sloan, Jam. 77. Hist. 1. pag. 191. fig. 2, 3.

Renalmia parafitica, caule filiformi, ramoso, geniculato, longissimo; foliis subulatis. Brown, Jam. 192.

Cuscuta ramis arborum innascens, caroliniana; filamentis lanugine telis. Pluk. Almag. pag. 126. tab. 26. fig. 5.

Camaboya. Marcgr. Brasil. 46. — Petiv. Gaz. tab. 62. fig. 12.

Cette plante parasite ressemble à ces lichens filamenteux (*usnea*) qui pendent en longs filaments chevelus & entortillés des branches des arbres. Elle est couverte d'écaillés blanches, presque luisantes, très-nombreuses, scarieuses. Les tiges sont grêles, filiformes, cylindriques, très-doux, flexueuses, comprimées, longues de deux à quatre pieds, divisées en rameaux lâches, pendans, de même forme; garnies de feuilles alternes, distantes sur les tiges, plus rapprochées sur les rameaux, molles, cylindriques, subulées, presque capillaires ou filiformes, vaginales à leur base.

Les pédoncules sont opposés aux feuilles, foliaires, sortant de la gaine des feuilles, à une seule fleur, garnis de deux feuilles à leur sommet, l'une plus courte que l'autre. Le calice est coriace; ses folioles roulées l'une sur l'autre; la corolle purpurine, divisée en trois pétales; la tapale oblongue, linéaire, légèrement trigone, à trois valves doubles; les extérieures blanchâtres & les intérieures d'un pourpre-foncé; les semences oblongues, linéaires, d'un fauve-clair, aigrettées.

Cette espèce croît au Pérou, sur les arbres, les arbutus, les rochers & on la trouve également à la Jamaïque, dans la Virginie & à la Caroline. Elle fleurit en octobre, novembre & décembre.

Les tiges & les feuilles de cette plante, par leur finesse, leur flexibilité, sont très-bonnes pour emballer les objets fragiles & délicats. Les habitants du Pérou les emploient contre les hémorrhoides, étant

étant broyées & cuites avec du sain - doux. (V. f.)

10. TILLANDE verdâtre. *Tillandsia viridescens*. Ruiz & Pav.

Tillandsia pedunculo uniflora, foliorum longitudo; bractea solitaria, convoluta; foliis linearibus-subulatis; capsula viridescens. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 3. pag. 43. tab. 170. fig. B.

C'est une petite plante qui croît en touffes gazeuses, prolifères, blanchâtres, verruqueuses, dont les racines sont fibreuses, très-courtes; les feuilles imbriquées sur deux rangs, linéaires-subulées, appliquées à leur partie inférieure contre les tiges, divergentes, réfléchies à leur partie supérieure, striées à leur base.

Les pédoncules sont axillaires, solitaires, uniflores, de la longueur des feuilles; chaque fleur accompagnée d'une bractée oblongue, striée, roulée à ses bords. Le calice est court, d'un jaune de paille; la corolle à peine plus longue que le calice; les pétales ouverts à leur sommet; la capsule verdâtre, une fois plus longue que le calice, à trois valves; les valves intérieures d'un pourpre foncé; les semences fort petites, un peu fauves, munies à leur base d'une aigrette.

Cette plante croît au Pérou, sur les rochers; elle fleurit dans les mois de décembre & de janvier. (Description, ex Ruiz & Pav.)

TILLÉE. *Tillaea*. Genre de plantes dicorélydones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des joubardes, qui a des rapports avec les *crassula*, & qui comprend des herbes fort petites, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont opposées; les fleurs très-petites, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à trois ou quatre divisions; trois ou quatre pétales égaux; trois ou quatre capsules à plusieurs semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice profondément divisé en trois ou quatre découpures ovales, pointues, très-ouvertes.

2°. Une corolle composée de trois ou quatre pétales ovales, aigus, planes, un peu plus courts que le calice.

3°. Trois ou quatre étamines, dont les filaments sont simples, plus courts que la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Trois ou quatre ovaires surmontés par autant

Botanique, Tome VII.

de styles courts & simples, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit est composé de trois ou quatre capsules ovales-oblongues, acuminées, à une seule loge, s'ouvrant longitudinalement par leur côté intérieur.

Deux semences ovales, quelquefois plus.

Observations. Il existe très-peu de différence entre ce genre & les *crassula*, surtout entre les espèces herbacées de ce dernier genre. Les principaux caractères qui les distinguent, consistent particulièrement dans le nombre des parties de la fructification; elles sont de trois à quatre dans les tillées, de cinq à sept dans les *crassula*. Les tillées ne renferment que de très-petites espèces, hautes d'environ un, deux ou trois pouces, à tiges grêles, presque filiformes; les feuilles opposées; les fleurs très-petites, tandis qu'une des subdivisions des *crassula* n'est composée que de végétaux à tige ligneuse. Au reste, les tillées peuvent être considérées comme un passage naturel aux *crassula* herbacées. M. Decandolle regarde comme un caractère propre aux tillées, d'avoir des capsules étranglées transversalement par leur milieu, & ne renfermant chacune que deux semences. En bornant les tillées à ce caractère, il est très-probable qu'il faudrait exclure de ce genre plusieurs des espèces qu'on y rapporte, & avoir sur d'autres des détails plus précis, & qui nous manquent. C'est cette considération qui a déterminé M. Decandolle à faire un genre particulier sous le nom de *bullarda*, du *tillaea Vaillantii* Willd., que nous avons conservé parmi les tillées.

E S P È C E S.

1. TILLÉE aquatique. *Tillaea aquatica*. Linn.

Tillaea caule erecto, foliis linearibus, floribus sessilibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 710. n°. 1.

Tillaea aquatica. Schkuhr. in Uff. Nov. Annal. 6. — Stuck. pag. 6. tab. 1.

Tillaea erecta, dichotoma, foliis acutis, floribus quadrifidis. Linn. Flor. suec. n°. 156.

Crassula caule dichotomo, foliis linearibus, floribus quadrifidis. Flor. suec. n°. 159.

Crassula floribus quadrifidis. Hort. Cliff. 497.

Cette espèce, confondue avec le *tillaea Vaillantii*, en diffère par ses fleurs sessiles & par ses capsules un peu étranglées transversalement dans leur milieu. Ses tiges sont droites, fort menues, glabres, divisées en rameaux alternes, dichotômes, très-peu élevés, garnis de feuilles opposées, sessiles, un peu grasses, linéaires, aigus, très-entières, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont sessiles, situées dans l'aisselle des

Q 999

feuilles, fort petites. Leur calice est divisé en quatre folioles un peu aigues; la corolle composée de quatre pétales à peine de la longueur du calice; quatre étamines plus courtes que la corolle; quatre capsules un peu allongées, acuminées à leur sommet.

Cette plante croît dans les terrains inondés en Europe, particulièrement en Suède. ○

2. TILLÉE de Vaillant. *Tillaea Vaillantii*. Willd.

Tillaea caule erecto, dichotomo; foliis oblongis, acutis, flore pedunculato brevioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 720. n°. 3.

Tillaea (aquatica), caule erecto, dichotomo; floribus pedunculatis, foliatis, quadrifidis. Lam. II. Gen. vol. 1. pag. 361. n°. 1750. tab. 90. fig. 1.

Bulliarda Vaillantii. Decand. Plant. grasses, tab. 74, & Fior. franç. vol. 4. pag. 385.

Tillaea (Vaillantii), caule erecto, dichotomo; pedunculis elongatis, calice turbinato, semi-quadrifido. Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 153. n°. 3.

Sedum minimum, annuum, flore roseo, tetrapetalo. Vaillant, Paris, pag. 181. tab. 10. fig. 1. Bona.

Cette plante est non-seulement très-distincte du *tillaea aquatica*, avec laquelle elle avoit été confondue, mais elle offre encore des caractères particuliers qui ont déterminé M. Decandolle à en faire un genre particulier, sous le nom de *bulliarda*, distingué des *tillaea* par un calice turbiné, divisé en quatre lobes jusqu'à moitié; une corolle à quatre pétales; quatre écailles linéaires, égales à la longueur du calice; quatre capsules point élargies transversalement, comme dans un grand nombre d'espèces de *tillaea*; plus de deux semences dans chaque loge.

Ses racines sont composées de fibres menues, capillaires, qui produisent une tige droite, haute d'environ deux pouces, lisse, charnue, rougeâtre, souvent radicante à ses nœuds inférieurs, munie de rameaux alternes, dichotomes, garnis de feuilles fort petites, opposées, sessiles, oblongues, charnues, ordinairement plus courtes que les entre-nœuds, glabres, étalées, entières.

Les fleurs sont foliaires, situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules simples, uniflores, plus longs que les feuilles. Son calice est divisé en quatre lobes un peu aigus; la corolle d'un blanc-rougeâtre, à quatre pétales ovales, un peu aigus, à peine plus longs que le calice; quatre écailles linéaires, de la longueur du calice; quatre capsules ovales, renfermant un grand nombre de semences extrêmement petites. « On trouve quelquefois, dit M. Decandolle, des fleurs à cinq parties, au lieu de quatre, & alors cette plante semble se confondre avec les *crassula*; mais elle en diffère encore par

la forme de ses écailles. Elle diffère de la plupart des autres *tillaea* par son port, le nombre de ses parties, & surtout par la structure des fruits. »

Cette plante croît dans les marais, les lieux couverts & ombragés; elle est commune dans la forêt de Fontainebleau. Je l'ai aussi recueillie dans celle de Villers-Cotterêts. ○ (V. v.)

3. TILLÉE couchée. *Tillaea prostrata*.

Tillaea caule prostrato, foliis lanceolatis, floribus pedunculatis, pedunculis foliis brevioribus. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 720. n°. 2.

Tillaea prostrata. Schkuht. in Uß. Nov. Annal. 6. — Stuck. pag. 4.

Tillaea obovata. Schkuht. in Uß. Annal. 2. — Stuck. pag. 21. tab. 3. Bona.

β. *Tillaea foliis lanceolato-ovatis, subpetiolatis; pedunculis floribus multo longioribus; caule prostrato, radicante*. (N.)

Ne connoissant point parfaitement l'espèce citée par Willdenow, pour ne point courir le risque d'un double emploi, je me suis borné à y réunir, comme variété, une plante que j'ai recueillie aux environs de Paris, & qui en diffère par ses pédoncules beaucoup plus longs que ses feuilles.

Ses tiges sont très-menues, tendres, très-glabres, couchées, noueuses; de chaque nœud sortent de petites racines fibreuses, & deux très-petites feuilles lanceolées, ovales, un peu aigues, rétrécies en un pétiole court à leur base, un peu charnues, glabres, entières. Quelquefois ces nœuds produisent des rameaux ou d'autres tiges simples, également couchés en partie, longs d'un pouce & plus, & qui deviennent également radicans. Les fleurs sont fort petites, situées dans les aisselles des feuilles, supportées par un pédoncule droit, capillaire, presque une fois plus long que les feuilles; avant l'épanouissement, les fleurs forment une petite tête globuleuse, de la grosseur de celle d'une épingle moyenne. La corolle est blanchâtre, un peu plus courte que le calice; les pétales un peu arrondis.

Cette plante croît dans les terrains humides, inondés, en Allemagne; la variété β, qui est celle que je viens de décrire, aux environs de Paris. ○ (V. v.)

4. TILLÉE du Cap. *Tillaea Capensis*. Linn. f.

Tillaea foliis oblongiusculis, floribus quadrifidis. Linn. f. Suppl. pag. 129. — Lam. Illustr. G. ner. vol. 1. pag. 361. n°. 1753. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. n°. 4.

Crassula (natans), foliis linear-oblongis, floribus quadrifidis, caule simpliciter. Thunb. Prodrum. pag. 54.

Ses racines sont fort menues, composées d'un grand nombre de fibres capillaires, rousses, qui produisent une tige grêle, herbacée, haute d'environ un pouce, glabre, filiforme, simple, dichotome, garnie de feuilles opposées, sessiles, un peu charnues, linéaires-oblongues, lisses, entières, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules simples; leur calice est divisé en quatre découpures profondes, ovales, très-ouvertes; la corolle blanche, une fois plus longue que le calice, composée de quatre pétales ovales; quatre petites écailles triangulaires, purpurines; autant d'étamines & de capsules.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ○

5. TILLÉE perfoliée. *Tillaea perfoliata*. Linn. f.

Tillaea foliis perfoliatis, ovatis; corymbis terminalibus, poribus quadrifidis. Linn. f. Suppl. p. 129. — 1 sm. III. Gener. vol. 1. pag. 361. n°. 1752. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. n°. 5.

Craffula (inanis), foliis perfoliatis, ovatis; floribus quadrifidis, caule simpliciter. Thunb. Prodrum. pag. 54.

An *craffula glomerata*? Dict. vol. 2. n°. 20.

Cette plante, qui nous est peu connue, paroît avoir de grands rapports avec le *craffula glomerata* mentionné dans cet ouvrage. Ses racines sont menues; ses tiges simples, très-grêles; ses feuilles opposées, sessiles, ovales, conniventes à leur base, & comme perfoliées. Les fleurs forment de petits corymbes terminaux; les calices sont divisés en quatre découpures; la corolle composée de quatre pétales; les autres parties de la fructification en même nombre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ○

6. TILLÉE connée. *Tillaea connata*. Ruiz & Pav.

Tillaea caule erecto, foliis connatis, linearibus, carnosis; floribus axillaribus, tetrapetalis. Ruiz & Pav. Flor. péruv. vol. 1. pag. 70. tab. 96.

C'est une plante glabre, annuelle, fort tendre, qui a des rapports avec le *tillaea perfoliata*, & dont les racines sont fibreuses; les tiges droites, hautes d'environ trois pouces, rougeâtres, glabres, cylindriques, médiocrement rameuses; les rameaux étalés, dichotomes, souvent une des branches de la bifurcation plus courte que l'autre. Les feuilles sont sessiles, opposées, conniventes à leur base, linéaires, charnues, un peu concaves, très-entières à leurs bords, non brisées, peu distantes les unes des autres, plus longues que les entre-nœuds.

Les fleurs sont fort petites, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, courts, très-glabres; le calice glabre, partagé en quatre découpures profondes, acuminées; la corolle à quatre pétales, quatre étamines, autant de capsules.

Cette plante croît au Pérou sur les collines & les rochers, aux environs de Chancay. Elle fleurit dans le courant des mois de juin & de juillet. ○ (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

7. TILLÉE ombellée. *Tillaea umbellata*. Willd.

Tillaea foliis subpetiolatis, ovatis, obtusis, integris; caule capillari, erecto; floribus umbellatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. n°. 6.

Craffula umbellata. Thunb. Prodrum. pag. 54.

Ses tiges sont droites, capillaires, garnies de feuilles opposées, légèrement pétioles, ovales, un peu charnues, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, rétrécies à leur base & obtuses à leur sommet. Les fleurs sont réunies en une sorte d'ombelle terminale.

Cette espèce se trouve au Cap de Bonne-Espérance. ○

8. TILLÉE renversée. *Tillaea decumbens*. Willd.

Tillaea decumbens, foliis subulatis, petalis calice brevioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. n°. 7.

Craffula procumbens. Var. n°. Thunb. Prodrum. pag. 54.

Cette plante ne paroît différer des *craffula* que par le nombre des parties de la fructification. Ses tiges sont couchées, petites, très-grêles, garnies de feuilles opposées, sessiles, très-étroites, glabres, un peu charnues, subulées. La corolle est composée de quatre pétales plus courts que le calice.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance. ○

9. TILLÉE mouffe. *Tillaea muscosa*. Linn.

Tillaea procumbens, floribus crispis, aggregatis, flosculosis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 361. n°. 1751. tab. 90. fig. 2.

Tillaea (muscosa), procumbens, floribus crispis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 186. — Hort. Ups. 24. — Sauvag. Monsp. 127. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 285, & Plant. grasses, tab. 73. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 721. n°. 8.

Tillaea. D. lib. Patif. pag. 43.

Tillaea muscosa, anua, perfoliata. Mich. Gen. 22. tab. 20.

Croffula foliis fissilibus, connatis; floribus aggregatis in foliorum alis. Guettard, Stamp. vol. 1. pag. 97.

Polygonum muscosum, minimum. Boccon. Sic. pag. 56. tab. 29.

Sempervivum omnium minimum, repens, muscosum, polygoni facie. Boccon. Mus. 2. pag. 56. tab. 22.

A. Tillæa (rubra), cretæ, floribus lateralibus, foliis obtusis. Gouan, Hort. Monsp. pag. 77. — Sauvag. Monsp. 129.

An croffula verticillaris? Linn. Mant. 261. ?

C'est une très-petite espèce, composée de tiges rougeâtres, fort menues, hautes à peine d'un pouce ou d'un pouce & demi, en partie couchées, ramassées, très-lisses, entrecoupées par des nœuds très-rapprochés; les rameaux opposés, surtout les inférieurs, simples, rarement dichotomes, garnis de feuilles très-petites, opposées, sessiles, conniventes à leur base, ovales, un peu aiguës ou obtuses, contenant d'autres feuilles dans leurs aisselles.

Les fleurs sont axillaires, quelquefois solitaires, plus souvent agrégées, sessiles, fort petites; leur calice divisé en trois folioles ovales, aiguës; la corolle blanche, à trois pétales ovales, aigus, de la longueur du calice; trois étamines & autant de petites écailles; trois ovaires & autant de styles & de capsules; celles-ci ovales, aiguës, à une seule loge, ne renfermant ordinairement que deux petites semences globuleuses. La variété *β* ne diffère de la précédente que par une teinte rouge plus prononcée; elle lui ressemble d'ailleurs dans toutes ses parties.

Cette plante croît en Europe, dans les bois humides, le long des allées, au bord des mares, dans les tourbières, à Fontainebleau, & plus particulièrement dans les départements méridionaux de la France. ○ (*V. v.*)

TILLEUL. *Tilia.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des lilacées, qui a des rapports avec les *grewia*, & qui comprend des arbres, les uns exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, à feuilles alternes, simples, en cœur ou tronquées obliquement à leur base, munies de stipules très-caducues; les fleurs disposées en corymbe; le pédoncule commun, inséré dans le milieu d'une bractée membraneuse & lanceolée.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice caduc, à cinq divisions; cinq pétales; un grand nombre d'étamines; un style; une capsule ou noix globuleuse, à cinq loges, à cinq valves constamment fermées.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, libre, très-caduc, divisé en cinq découpages concaves, colorées, presque de la grandeur de la corolle.

2°. Une corolle composée de cinq pétales oblongs, alternes avec les divisions du calice, nus ou munis d'une écaille à leur base.

3°. Un grand nombre d'étamines dont les filaments sont insérés sur le réceptacle commun, presque égaux, subulés, de la longueur de la corolle; des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, surmonté d'un style filiforme, cylindrique, terminé par un stigmate en tête, à cinq dents.

Le fruit est une capsule ou une petite noix globuleuse, velue, coriace ou ligneuse, à cinq valves qui ne s'ouvrent point, à cinq loges monospermes, & dont quatre avortent ordinairement.

Les semences solitaires par avortement, quelquefois deux, arrondies; l'embryon entouré d'un périsperme charnu; lobes finesses ou dentées.

Observations. 1. Les tilleuls, malgré les rapports nombreux qu'ils ont avec les *grewia*, forment un genre naturel & bien distinct; séparés des *grewia* par leur port, par l'insertion de leur pédoncule adhérent dans presque toute l'étendue de sa partie inférieure, à la nervure moyenne d'une bractée lanceolée & membraneuse, & surtout par les fruits qui, dans les *grewia*, consistent en un drupe à quatre lobes, renfermant quatre noix osseuses, à deux loges.

Les tilleuls étoient bornés, dans les *Species Plantarum* de Linné, à deux espèces; mais comme il en existoit plusieurs autres qui n'étoient mentionnées que d'une manière vague & faiblement caractérisées, telle par exemple que le *tilia caroliniana* de Waltherus, &c., M. Venter a donné, dans les *Mémoires de L'Institut*, une très-belle monographie de ce genre, dans laquelle on trouve beaucoup d'observations nouvelles & importantes, dont nous profiterons pour l'exposé des espèces.

Les tilleuls sont des arbres assez élevés, dont le tronc est revêtu d'une écorce loupée & plantée, & dont le bois est tendre & léger. Les feuilles féminales, tant dans les espèces d'Europe que dans celles d'Amérique, sont divisées en cinq lobes inégaux, observation qui a été faite pour la première fois par Jean Bauhin, sur les tilleuls d'Europe; les feuilles de la tige ou des rameaux sont simples, alternes, en cœur ou tronquées obliquement à leur base, plicées en dedans & à bords parallèlement rapprochés l'un de l'autre avant leur deve-

veloppement, munies de stipules très-caduques) les fleurs disposées en corymbe, au sommet d'un pédoncule latéral, libre dans la partie supérieure, adhérent dans la partie inférieure à la nervure d'une bractée lanceolée. Les tilleuls d'Amérique ont leurs pétales munis d'une échelle à leur base : ce caractère n'existe pas dans les tilleuls d'Europe. Martinus pense que le nom de *tilia* est formé d'un mot grec qui signifie paille, aile, ainsi nommé à cause des bractées qui accompagnent les fleurs, & qui ressemblent en quelque sorte à des ailes.

Nous croyons devoir ajouter ici une observation sur la dénomination des fruits du tilleul. L'on dit que leur péricarpe est une capsule à cinq valves & à cinq loges qui ne s'ouvrent pas. (Zetterer a donné à ces sortes de capsules le nom de *noix* (*noxx*), lorique, dit-il, les capsules n'ont point de valves. *Nux* à capsules diffit plenariou valvularum usquidum. Mais dans les tilleuls, peut-on dire qu'il n'y a point de valves ? Elles l'ont à la vérité conniventes & réunies, mais bien marquées par les loges intérieures de l'ovaire, & par les cinq failles ou côtes s'extérieures du péricarpe, qui les font distinguer au dehors.

Il est rare que les fruits du tilleul, n'importe dans quelle espèce, présentent constamment cinq loges : dans leur intérieur, on trouve cinq semences ; on les distingue assez bien dans l'ovaire, mais à mesure que la maturité s'opère, plusieurs des loges & des semences, ou plutôt leur embryon, disparaissent : très-ordinairement les loges se réduisent à une seule, les autres, rétrécies & appliquées contre le péricarpe, tombent avec lui ; cette loge ne renferme qu'une, quelquefois deux semences, rarement trois.

Observations. Il. Le tilleul se plaint en général dans les terres qui ont beaucoup de fond, qui sont peu légères que fortes, & qui sont un peu humides. On le multiplie ordinairement de marcottes, & on greffe avec succès les espèces étrangères sur celles qui croissent dans nos climats. Il est peu d'arbres qui présentent autant d'objets d'utilité dans toutes leurs parties. L'écorce est employée à faire des cordes, & les parties intérieures de cet organe fournissent aux pêcheurs de la Suède des nasses pour prendre le poisson, & aux bergers de la Carniole & de quelques autres contrées, une toile, à la vérité grossière, mais qui leur sert néanmoins pour se soustraire aux injures de l'air.

Michaux nous a appris qu'on faisoit du papier dans l'Etat du Connecticut avec le *liber* du tilleul glabre. Les sculpteurs préfèrent le tilleul au peuplier, parce que son bois le coupe mieux, & qu'il est moins exposé aux piqûres des vers. Comme il est aussi très-léger, on en fait du charbon qui est très-propre à la fabrication de la poudre à canon. La sève du tilleul est aussi abondante que celle du bouleau & de l'érable. & ce célèbre naturaliste

ont pensé qu'on pourroit, par des ébullitions & des clarifications répétées, en extraire du sucre.

Les habitants de la Suède, de la Norvège, de la Carniole, de la Suisse, &c. ramassent avec soin les feuilles du tilleul pour la nourriture des troupeaux : ils les donnent également aux bœufs ; mais Linnæus a observé qu'elles communiquent une mauvaise qualité au lait des vaches.

Les fleurs de toutes les espèces de tilleul répandent un odeur agréable ; elles contiennent la liqueur précieuse dont les abeilles composent leur miel. Cette tubifance est très-abondante en Lithuanie, parce qu'il exille une grande quantité de tilleuls dans les forêts de cette partie de la Pologne.

Les fruits du tilleul ont été long-tems regardés comme ne pouvant étre d'aucun usage. Miffa, médecin de la Faculté de Paris, eût le premier qui découvroit qu'ils avoient une propriété qu'on étoit bien loin de foupçonner. En triturant les fruits du tilleul, mêlés avec quelques-unes de ses fleurs, ce fuyant obtint un beurre qu'il difoit étre parfaitement femblable au chocolat, ayant le même goût & donnant la même pâte que le cacao. Les étrangers accueillirent cette découverte avec plus d'intérêt que ne le firent alors les François. Frederic le-Grand engagea Margraff à vérifier les observations du médecin françois. Le chimifte pruffien fit plufieurs expériences qui lui démontrèrent qu'a la vérité on pouvoit obtenir, des graines du tilleul, une efpece de chocolat, mais que ce chocolat, préparé félon les procédés de Miffa, ne pouvoit jamais durer comme celui du cacao ; qu'il devenoit plutôt ranc, & qu'il en différoit beaucoup quant à la confiftance, quant au goût & quant à l'odeur.

Les expériences de Marcgraff prouvent sans doute que la découverte du médecin français n'était pas aussi importante que le croyoit son auteur; néanmoins j'ai cru devoir la rappeler, parce qu'il pourroit se faire qu'en employant les graines de quelques-unes des espèces d'Amérique, on parvint peut-être à réaliser les espérances que Mifs avait conçues. (Vénétas.)

ESPECES.

* *Tillandsia* d'Europe ; pétales rosés.

1. TILLEUL à petites feuilles, *Tilia microphylla*.
Venten.

Tilia foliis cordato-subrotundis, acuminatis, acutè ferratis; nuce subglobosâ, vix costulatâ, tenuissimâ, fragili. Vent. Monogr. pag. 4. tab. 1. fig. 1.

Tilia (europæa, var. γ), *floribus nectario distinctis*. Linn. Spec. Plant. pag. 733. — Mater. med. 136. — Grœcl. Sibir. vol. 4. pag. 129. — Crantz.

Austr. pag. 96. — Poll. Palat. n°. 510. — Ludw. F&C. tab. 48. — Oeder. Flor. dan. tab. 553. — Kniph. Cent. 10. n°. 89. — Knorr. Del. 1. tab. 1. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1161.

Tilia. Hort. Cliff. 204. — Flor. suec. 432. 471. — Philo. Bot. 259. — Roy. Lugd. Bat. 477.

Tilia ulmifolia. Scopol. Flor. carn. edit. 2. n°. 642.

Tilia (parvifolia), *foliis cordatis, acuminatis, inaequaliter serratis; fructu quinqueloculari*. Hoffm. Germ. 185. — Ehm. ex Sur. Flor. helv. 1. pag. 317.

Tilia fil. effria. Desfont. Catal. Hort. Parif. pag. 152. — Tragus, IV.

Tilia femina, *folio minori*. C. Bauh. Pin. 426. — Tournef. Infl. R. Herb. 611. — Vaill. Botan. Parif. pag. 192. — Dalib. Flor. parif. var. 4. pag. 153. — Duham. Arbr. vol. 2. n°. 1. tab. 95.

Tilia folio minore. J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 137. Icon. — Rai, Hist. Plant. pag. 1695. — Garid. Aix, pag. 464.

Tilia betulula nestratis folio. Fluk. Mann. p. 191.

Vulgairement tilleul à petites feuilles, ou tilleul des bois, tillau, tillor, tillier, te il.

Var. 4. *Tilia* (bohémica), *foliis minoribus, glabris; fructu oblongo, utrinque acuminato, minimè costulato*. Till. Hort. Pis. tab. 49. fig. 3. — Vaill. Herb.

Tilia folio glabra, duriori, minori. Hall. Enum. pag. 358. n°. 2.

Son tronc s'élève à la hauteur de quarante ou cinquante pieds; il est revêtu d'une écorce épaisse, dont l'épiderme est crevassée dans la partie inférieure, lisse dans la partie supérieure. Les rameaux sont nombreux, glabres; les plus jeunes un peu anguleux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, un peu arrondies, échanquées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, d'une substance ferme, membraneuse; vertes, glabres à leur face supérieure, presque toujours pubescentes en dessous, munies dans l'aisselle de nervures latérales d'une petite touffe de poils ferrugineux, dentées en scie à leur contour; les dentelures mucronées.

Les fleurs sont axillaires, odorantes, réunies en corymbe ou en un petit bouquet lâche, composé de deux à six fleurs, de couleur blanche; le pédoncule commun inferé, à sa partie inférieure, sur le milieu d'une bractée d'un blanc-jaunâtre, membraneuse, longue, étroite, obovée, lincéolée; les pédoncules partiels glabres, filiformes, simples, un flora. Les fruits sont petits, presque globuleux, pubescents, munis de côtes peu sensibles, qui quelquefois un peu aigres à leurs deux extrémités; leur péricarpe fragile & mince.

Cet arbre croît dans les forêts de l'Europe, en France, en Bohême, dans le Danemarck, & presque dans toute la Russie. (V. v.)

Observations. Ce tilleul, dit Duhamel, forme une très-belle rigole; il fournit bien ses branches, & sa tête prend naturellement une belle forme; de plus, comme on peut sans danger le tondre avec le croissant ou les ciseaux, on en fait de beaux portiques, des boules en forme d'orangers, &c. Ses fleurs paroissent dans le mois de juin; elles répandent alors une odeur douce & agréable; ses fruits mûrissent en automne. Il se trouve naturellement dans nos forêts, où l'on en voit qui ont jusqu'à neuf pieds de circonférence, sur trente ou quarante de hauteur.

Le bois des tilleuls est blanc & léger; il n'a pas beaucoup de dureté, mais il est liant, & il n'est pas trop exposé à être piqué des vers. Les menuisiers en font quantité d'ouvrages légers; les tourneurs le recherchent, & les sculpteurs le présentent à tous autres quand le noyer leur manque. Quand on a mis à rouir ou remper dans l'eau les tilleuls, leur écorce se détache par lames minces; on en fabrique des cordes qui s'emploient à Paris & ailleurs pour garnir les puits.

Les fleurs du tilleul en infusion sont recommandées en médecine pour les affections du cerveau, contre l'épilepsie, les vertiges & les étourdissements; les feuilles & l'écorce de cet arbre passent pour être détersives & apéitives, & les semences pour être astringentes. On en fait respirer par le nez pour arrêter les hémorrhagies de cette partie.

On lève, dit sileurs ce même sivant, l'écorce des tilleuls & des mûriers pour d'autres usages. On choisit des tilleuls âgés depuis huit jusqu'à seize ans; on en prorioit auti lever fur de fort gros, dans le cas où l'écorce ne seroit pas galeuse. On abat ces arbres à la fin de mai ou commencement de juin, lorsqu'ils sont en pleine sève; on choisit même un temps chaud & humide, afin que l'écorce se lève plus facilement. Il faut, disent les ouvriers, que le vent soit alors à la sève. L'écorce se lève autior que les arbres sont abattus, afin qu'elle soit moins adhérente au bois. Cette écorce se peut lever également sur le tronc & sur les branches qui portent un ponce de diamètre au petit bout; on en lève quelquefois fur des branches plus menues, mais celle-ci ne peut servir qu'à faire des liens.

Pour lever l'écorce du tilleul ou du mûrier, on la fend dans fa longueur, & on la derache avec un os taillé en pied de biche. Autior qu'on a levé un bout de l'écorce, on achève de la deracher en la tirant avec la main. Quand l'écorce est enlevée, on l'étend sur terre pour la faire sécher; on en met deux ou au plus trois lamères les unes sur les

autres. Quand cette écorce est sèche, on la met en bottes. Pour cet effet on met deux perches au milieu d'un cent de lanières d'écorces, pour les assujettir droites, & ensuite on les lie avec quatre liens. On conserve ces bottes dans un lieu frais & sec, pour les vendre aux cordiers qui en font des cordes à puits, dont l'usage est si commun.

« Quand les cordiers veulent employer cette écorce, ils la mettent tremper dans l'eau, & en peu de tems les feuilletts corticaux qui forment son épaisseur, se séparent aisément les uns des autres. Les meilleures écorces sont les plus intérieures; celles du dehors, qui sont trop grossières pour en faire des cordes, sont vendues pour en faire des liens aux gerbes de paille; c'est aussi pour cet usage qu'on lève quelquefois l'écorce des menues branches.

« Les tilleuls dépouillés d'écorce, se vendent suivant leur grosseur; savoir: les gros aux tourneurs, qui achètent aussi les grosses perches, qu'on nomme *bourdons*; les moins grosses se vendent aux vigneron ou aux jardiniers, pour servir d'échelles ou de perches à palisser; enfin les plus menues, qui proviennent des petites branches, servent aux paysans pour tamer des pois, des fèves, &c.

« Relativement à la qualité du bois de cet arbre, celui de l'espèce la plus estimable est le tilleul de nos bois à petites feuilles. Il a cet avantage, qu'il parvient à une grande hauteur sans se creuser: c'est pourquoi on en livre dans les ports des gros troncs pour faire les figures de l'avant des bâtimens de mer; quant aux autres pièces de sculpture, on préfère ceux qui sont moins gros. On estime ceux dont le bois n'est pas parfaitement blanc. Toutes les espèces de tilleul s'emploient à faire des ouvrages de tour & de raclette: on en débite en planches pour de légers ouvrages de menuiserie; mais quand le tilleul à petites feuilles a pris la croissance dans un terrain plus sec qu'humide, & qui a beaucoup de fond, il peut fournir de bonnes poutres.

« Il y a dans nos forêts des tilleuls à petites feuilles, dont le bois est très-ferme quand les arbres ont crû dans des terrains qui ne sont point trop humides; leur bois n'est pas d'un grand blanc; la couleur est d'un roux un peu pâle; les plus gros peuvent être débités en bois carré, & fournir de très-bonnes poutres; mais communément on descend toutes les espèces de tilleul en plateaux, qu'on vend ou sculpeurs qui travaillent pour les monuments civils: on les vend aussi aux tourneurs pour en faire de petits barils dans lesquels les charrues conservent leur poudre à tirer. Souvent les bois-fiers les achètent sur pied pour les faire travailler en sabots; enfin on les débite en planches de différentes longueurs & épaisseurs pour l'usage des menuisiers, & en certains pour les tonnes de marchan-
disées sèches.

« C'est le tilleul qui a servi à faire l'expérience de physique végétale, par laquelle on a prouvé que de la tête d'un arbre on peut en faire les racines, & des racines la tête. Le tilleul seroit, parmi les Anciens, à quelques usages. Il a, dit Plin, entre l'écorce & le bois, plusieurs tuniques ou pellicules dont on fait des liens; les plus minces de ces pellicules, appelées *philyra*, sont célébrées par l'usage qu'en faisoient les Anciens pour les bandelottes de leurs couronnes.

« On peut élever les tilleuls de semences. Si l'on conserve la graine pour ne la mettre en terre qu'au printemps, elle ne lève souvent que dans la seconde année; mais si on la mêle aussitôt qu'elle est mûre avec du sable ou de la terre, pour la fermer au printemps suivant, elle lève souvent dès la première année. Comme les tilleuls élevés de semence sont long-tems à parvenir à une grandeur convenable pour être plantés en avenues, les jardiniers ont coutume de les élever de marcottes; pour cet effet, ils coupent au ras de terre un gros tilleul; alors la souche pousse quantité de jets vigoureux, & en couvrant ensuite cette souche avec de la terre, tous ces jets poussent des racines & fournissent du plant en abondance. Les tilleuls souffrent très-bien d'être tondus au ciseau; c'est maintenant l'arbre à la mode, & depuis qu'on s'est dégoûté des marronniers d'Inde, on n'en plante pas d'autres dans tous les jardins.

Dans les terres argileuses alliées de sable, le tilleul vient d'une croissance prodigieuse. « J'en ai vu un, dit Duhamel, que quatre hommes avoient de la peine à embrasser. » Cet arbre ne devient pas gros dans les terrains secs, arides & pierreux; il s'accommode mieux des terrains fort humides; mais son bois n'y est pas, à beaucoup près, si bon que dans les sables gras ou dans les fonds de bonne terre franche: alors on en peut faire du lambris, des planches & même des poutres qui subsistent long-tems sans être piquées de vers.

Placé dans un terrain convenable, cet arbre s'élève à une grande hauteur. Rai parle, d'après Evelyn, d'un tilleul qui, sur trente pieds de tige, avoit environ quarante-huit pieds de circonférence. Thomas Browne fait mention d'un autre tilleul qui avoit quarante-cinq pieds de circonférence à un pied & demi de terre, & soixante-quinze pieds de hauteur. Dans une note communiquée par M. Grelet-Després, de Niort, à M. Venetant, il est dit « qu'on trouve devant le château de » Chailly, commune de Saint-Martin-lès-Melle, » près de Melle, & sur la route de Niort à Melle, » un superbe tilleul de quarante-huit pieds de cir- » conférence; & d'environ soixante pieds de hau- » teur; il porte au moins cent cinquante pieds » dans les branches, sans aucune marque de vé- » tusté & de dépérissement. »

2. *TILLEUL à larges feuilles. Tilia platyphyllos.*
Vent.

Tilia foliis cordato-subrotundis, acuminatis, inaequaliter serratis; nuc. turbinatâ, costis prominentibus; insignitâ, lig. ovali, c. eff. d. Vent. Monograph. pag. 6. tab. 1. fig. 2. — D. cand. Flor. franç. vol. 4. pag. 8. 6. — Duham. edit. nov. tab. 50.

Tilia (europæi, var. a), *floribus nectario deficiuntis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 711. — Bliock. tab. 769. — Gouan, Flor. Monsp. — Villars, Plant. du Dauph. vol. 4. pag. 798. — Czern. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 150. tab. 113. — Lam. Illustr. Gener. tab. 467. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1161. — Desfont. Catal. Hort. Par. p. 172.

Tilia platyphyllos. Scop. Flor. carn. edit. 2. n°. 641.

Tilia (granifolia), *foliis cordatis, acuminatis, serratis, subhirsutis; fructu quadriloculari*. Hoffm. Germ. 184. — Ehh. Ex. Sut. Flor. helv. 1. pag. 317.

Tilia (cordata), *foliis cordatis, acuminatis, inaequaliter serratis; fructibus quinquelocularibus, tomentosis*. Mill. Dict. n°. 1.

Tilia foliis cordato-lanceolatis, spongiosis ad nervorum folii angulos fissilibus. Hall. Helv. n°. 1030.

Tilia femina, folio majore. C. Bauh. Pin. 426. — Tourn. Inst. R. H. rb. 611. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 436. — Linn. Flor. suec. edit. 2. pag. 183. — Quer. Bot. e'pan. vol. VI.

Tilia vulgaris, platyphyllos. J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 133. Icon. — Rai, Synopf. pag. 473. & Hist. pag. 1694. — Magn. Bot. Monsp. p. 254.

Tilia femina. Lobel. Icon. 606.

Tilia fiefaca, folio maximo, variet & profundi serrato; fructu subrotundo, anguloso & lanuginoso. Till. Hort. Pil. pag. 165.

Vulgairement tilleul à grandes feuilles, tilleul de Hollande. Duham. Arbr. vol. 2. n°. 2.

a. *Tilia corallina*. Ait. Hort. Kew. vol. 2. p. 229.

Tilia (europæi), *foliis acuminatis, serratis, subhirsutis; fructibus tetragonalibus, subpilosis*. Mill. Dict. n°. 2.

Tilia silvatica nostras, foliis amplis, hirsutis, pubescentibus; fructu tetragono, pentagono aut hexagono. Pluk. Almag. pag. 363.

Tilia foliis molliter hirsutis, viminibus rubris, fructu tetragono. Rai, Synopf. pag. 473.

Tilia foliis amplioribus, mollibus, subhirsutis. Hall. Enum. pag. 357. n°. 1. — Bœhm. Lipl. n°. 397.

TILLEUL dont les feuilles sont légèrement ve-

lues, les jeunes branches teintes de rouge, & le fruit triangulaire. Duham. Arbr. vol. 2. n°. 4.

β. *Tilia variegata, folio majore, variegato*.

TILLEUL à grandes feuilles panachées. Duham. Arbr. vol. 2. n°. 3.

Cet arbre, réuni par Linné au précédent comme variété, paroît néanmoins former une espèce dont les caractères sont constants. Ils consistent dans la hauteur du tronc bien moins considérable : ses feuilles sont d'environ un tiers plus grandes, plus molles, plus souples, plus velues, dentées inégalement en scie à leurs bords : les fleurs s'épanouissent un mois plus tard, & quoiqu'elles ne diffèrent point de celles du tilleul à petites feuilles, les fruits qui leur succèdent ne sont point arrondis ; ils sont plus gros, à peine pucierons : leur forme est ovale ou presque en toupie, il y subsiste plus dure, plus épaisse, d'une consistance presque ligneuse, relevée de cinq côtes saillantes.

Cette espèce croît dans les bois de l'Europe ; elle y est moins commune que la précédente ; mais il est des contrées où elle le trouve seule, telles qu'en Suède & en Espagne. M. Desfoucault, inspecteur des forêts, botaniste très-distingué, m'a dit l'avoir trouvée dans les bois de l'arrondissement de Péronne. (V. f.)

Observations. Linnæus paroît avoir exposé dans l'*Hortus Cliffortianus*, pag. 204, les motifs qui l'ont déterminé à réunir les deux tilleuls d'Europe. « Les fruits sont globuleux, dit-il, lorsque une seule semence parvient à maturité ; mais si routes cinq réussissent, alors le fruit devient anguleux. (Fructus globosus si modò unico prægnaus est semine, ut communitur fit ; si verò omnia quinque semina ad maturitatem perveniunt, angulatus fit fructus). » Pour juger du degré de confiance que méritoit cette observation de Linnæus, nous avons ouvert, dit M. Ventenat, un grand nombre de fruits des deux espèces, & nous pouvons assurer qu'il n'en est aucun où nous ayons trouvé plus de deux semences, & que le plus grand nombre n'en contenoit qu'une seule ; il est d'ailleurs des pays où l'on ne trouve qu'une seule espèce de ces deux tilleuls. Par exemple, on ne trouve en Bohême, en Danemarck, &c. que le *tilia myrcophylla*, tandis qu'en Suède, en Espagne & dans d'autres parties de l'Europe, on ne rencontre que le *tilia platyphyllos* ; mais si ces deux espèces étoient des variétés l'une de l'autre, pourquoï n'existeroient-elles pas ensemble dans les mêmes lieux ?

On choisit de préférence le tilleul à larges feuilles pour l'ornement des jardins & des lieux publics : dès les premiers jours du printemps, il se pare de son joli feuillage, & contribue à la fraîcheur des allées qu'il ombrage. « Susceptible d'être taillé & conduit au cîteau, dit M. Dumont-Courcier, on l'employoit

l'employoit beaucoup autrefois à des formes symétriques, & à des décorations d'architecte végétale, qui ont été long-tems adoptées pour l'ornement des jardins. Ce mauvais goût; que l'on portoit quelquefois jusqu'à l'extravagance, a cédé la place à la nature, & l'art y ajoute aujourd'hui, ce n'est que pour l'aider dans ses développemens. Cet arbre a le défaut de se dépouiller de très-bonne heure. On emploie assez inutilement les fleurs & l'écorce de cette espèce ou de la précédente, mais le bois en est moins estimé.

On le multiplie par les semis & par les dragées enracinées; mais la première méthode est préférable: il reprend très-bien à la transplantation. Il est avantageux de le planter jeune, parce que sa tige devient plus droite, & il convient de la laisser entière, sans l'éêter, comme l'on fait souvent.

«Voici quelques observations, dit Duhamel, sur le premier développement des bourgeons de cet arbre. Quand les feuilles sortent des boutons, elles sont plies en deux; les plus petites feuilles qui se développeront dans la suite ne sont pas placées dans la duplicature des grandes feuilles, mais elles sont appliquées en dehors, & sont recouvertes par deux grandes stipules creusées en cuilleron: ces stipules, qui accompagnent les pétioles des feuilles, prennent de l'étendue. En examinant avec attention le dessous des feuilles, on aperçoit aux angles formés par les nervures, de petites houppes de poils qui, à la vue simple, paroissent comme des angles.»

• • *Tilleuls d'Amérique. Pétales munis d'une écaille à leur base.*

3. TILLEUL glabre. *Tilia glabra*. Vent.

Tilia foliis profunde cordatis, argutè serratis, glabris; petalis apice truncatis, crenatis; nucè ovata, subglobosa. Venten. Monograph. pag. 9. tab. 2.

Tilia (americana), floribus nectario instructis; foliis profunde cordatis, argutè serratis, glabris. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 219. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1162. n° 2.

Tilia americana. Lezerm. Catal. des Arbres de l'Amér. sept.

Tilia foliis majoribus, macronatis. Clayt. Flor. virg. pag. 58. — Duham. Arb. vol. 2. n° 5.

Tilia amplifolia glabra foliis, nostrati similis. Pluken. Mantiss. pag. 181.

Tilia (americana), floribus nectario instructis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 733.

Tilia (americana), foliis cordatis, acuminatis, serratis, subius pilosis; floribus nectario instructis. Miller, Dict. n° 3.

Tilia caroliniana. Wangenh. Amér. 56. — Duroi, Harbk. 2. pag. 469.

Botanique. Tome VII.

Cet arbre, distingué par sa hauteur, par ses feuilles glabres, profondément échanrées en cœur, s'élève à soixante ou soixante-douze pieds & plus. Son tronc est droit, cylindrique, épais; ses branches, ainsi que ses rameaux, sont recouvertes d'une écorce glabre, ridée, d'un brun-foncé. Ses feuilles sortent de boutons glabres, ovales, d'un pourpre-noirâtre; elles sont amples, en forme de cœur, vertes à leurs deux faces, d'abord légèrement pubescentes dans leur jeunesse, ensuite parfaitement glabres à leurs deux faces, d'une consistance ferme & un peu coriace, très-aiguës à leur sommet, dentées en scie à leurs bords; les dentelures mucronées; les nervures saillantes; latérales, un peu ramifiées, d'un blanc-jaunâtre; les pétioles presque de la longueur des feuilles, filries, un peu cylindriques.

Les fleurs sont latérales & terminales, situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en un corymbe lâche, & supportées par un pédoncule commun, glabre, cylindrique, une & deux fois plus long que les pétioles, ramifié à son sommet; les ramifications courtes, inégales, réunies en bouquet; les bractées lancéolées, plus longues que le pédoncule commun; le calice glabre ou à peine pubescent, à cinq découpures concaves, ovales; la corolle blanche, plus longue que le calice; les pétales tronqués & dentés à leur sommet. Le fruit est une capsule ou une sorte de noix ovale, un peu pubescente, de couleur cendrée, relevée de cinq côtes peu saillantes.

Cet arbre croît au Canada & sur les montagnes élevées de la Caroline. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. C'est la première espèce de tilleul qui ait été découverte en Amérique. Il se rit au printemps: ses fruits sont mûrs en automne. & (V. v.)

4. TILLEUL pubescent. *Tilia pubescens*. Vent.

Tilia foliis basi truncatis, obliquis, denticulato-serratis, subius pubescentibus; petalis emarginatis; nucè globosa, levi. Vent. Monogr. pag. 10. tab. 3. — Duham. Arb. edit. nov. tab. 51.

Tilia (pubescens), floribus nectario instructis; foliis basi truncatis, obliquis, denticulato-serratis, subius pubescentibus. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 228. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1162. n° 3.

Tilia (caroliniana), foliis cordatis, obliquis, glabris, subserratis cum acumine; floribus nectario instructis. Miller, Dict. n° 4. — Lezerm. Catal. des Arb. de l'Amér. sept.

Tilia (americana), floribus nectario instructis, stipulis floriferis. Walther, Flor. carol. pag. 153.

Tilia americana. Wangenh. Amér. 55.

5. *Tilia (leptophylla), foliis basi oblique truncatis.* R. & T.

tus, lani: feratit, tenuissimis, subcaprytatis, subtilis pubescentibus. Venten. l. c. pag. 11.

Tilia multiflora. Lemon. Hort.

Cet arbre, voisin du *tilia glabra*, en diffère par plusieurs caractères qui lui sont particuliers, par les proportions de grandeur, par les feuilles tronquées obliquement à leur base. Son tronc, bien moins élevé, est recouvert d'une écorce mince & filonnee; ses branches sont plus étalées, plus horizontales; les rameaux cy-indriques, cendrés, striés, chargés de boutons tomenteux & de couleur cendrée; les feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales, en forme de cœur, tronquées obliquement à un des côtés de leur base, tomenteuses en dessous dans leur jeunesse; mais à mesure qu'elles prennent de l'accroissement, une partie du duvet tombe, & les poils qui persistent sont alors disposés en étoiles, à peu près comme dans la plupart des alyflus; elles sont beaucoup plus petites que celles du *tilia glabra*, acuminées, dentées; les dents qui les bordent, plus distantes, moins profondes.

Les fleurs sont axillaires, disposées en un corymbe paniculé; les ramifications pubescentes, cendrées, la plupart opposées, étalées, uniflores; le pédoncule commun presque filiforme, un peu plus long que la bractée sur laquelle il est inséré. Le calice est pubescent, à cinq découpures ovales, un peu lanceolées, aiguës; la corolle blanche; les pétales étroits, presque terminés en pointe, échancrés à leur sommet; les étamines nombreuses, plus courtes que la corolle; le style presque aussi long que les pétales; le stigmate à échancrures profondes & ouvertes. Le fruit consiste en une capsule globuleuse, lisse, tomenteuse.

Cette plante croît à la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Observations. « Quoique quelques botanistes, dit M. Ventenat, aient considéré la variété *g* ou le tilleul de la Louisiane, qui a été cultivé dans les jardins de Janfin & de Lemonnier, comme une espèce distincte qu'ils désignent par le nom de *tilia multiflora*, néanmoins nous pensons qu'il n'est qu'une variété du *tilia pubescens*. En effet, il présente les mêmes caractères que cette dernière espèce, & il n'en diffère que par les feuilles extrêmement minces, dont les dents sont plus écartées. »

g. TILLEUL à feuilles arrondies. *Tilia rotundifolia*. Vencn.

Tilia foliis cordato-subrotundis, subsinuatis, dentatis, vorticulosis, subtilis albo-tomentosis; nucæ ovata. Venc. Monogr. pag. 12. tab. 4. — Duham. edit nov. tab. 51.

Tilia (alba), foliis profunde cordatis, subsinuatis, dentatis, subtilis tomentosis. Aiton, Hort. Kew.

vol. 2. pag. 240. — Wokstein & Knebel, Plant. Hung. tab. 3. — Willd. Arbo. 189, & Spec. Plant. vol. 2. pag. 1162. n°. 4.

Tilia (tomentosa), foliis cordatis, acutis, serratis, subtilis tomentosis. Moench, Weissenf. 136.

Tilia americana. Duroi, Harbk. 2. pag. 467.

Tilia argentea, tilia alba. Catal. Hort. Paris. pag. 152.

C'est une espèce parfaitement distincte, & très-bien caractérisée par la surface inférieure des feuilles d'un blanc de neige, par les fleurs très-odorantes, assez semblables à celles du *tilia glabra*, mais plus petites.

Ses racines, d'abord pivotantes & cylindriques, se divisent en plusieurs rameaux qui tracent à la surface du terrain, & qui sont munies d'un grand nombre de chevelus. Les feuilles féminales sont palmées, divisées en cinq lobes inégaux, le moyen & les deux extérieurs plus longs. Il s'élève des racines un tronc cylindrique, très-rameux, recouvert d'une écorce épaisse, dont l'épidémie est cendré, & plus lisse que dans les autres espèces; les branches alternes, divisées en rameaux presque sur deux rangs opposés, couverts d'un duvet repais & cendré qui s'enlève aisément lorsque l'on passe le doigt dessus, chargés de boutons ovales, tomenteux, d'un vert-cendré, garnis de feuilles alternes, pétiolées, arrondies, en cœur à leur base, inégalement dentées en scie, souvent sinuées à leurs bords, aiguës à leur sommet, planes, verrucées, munies de nervures très-rameuses, d'abord tomenteuses & d'un blanc de neige à leurs deux faces, ensuite glabres & d'un vert-sombre à leur face supérieure, longues d'environ quatre pouces sur autant de large, soutenues par des pétioles tomenteux, environ du tiers de la longueur des feuilles, garnis à leur base de deux stipules opposées, linéaires-lanceolées, membraneuses, très-calcuques.

Les fleurs sont disposées en un corymbe serré, d'abord d'un jaune de soufre, puis blanchâtres, d'une odeur semblable à celle de la jonquille, soutenues par un pédoncule commun, cylindrique, livide à son sommet en plusieurs pédicelles tomenteux; les bractées, sur lesquelles s'insèrent le pédoncule, oblongues, obtuses, veinées, pubescentes, un peu plus longues que le pédoncule; les pédicelles uniflores, tomenteux, munis chacun d'une partie moyenne de deux bractées presque opposées, linéaires, pubescentes, fort courtes, très-caduques; le calice à cinq divisions ovales, aiguës, convexes & pubescentes en dehors, vertes à leur base, d'un blanc-jaunâtre à leur partie supérieure; la corolle d'un jaune-pâle, composée de cinq pétales oblongs, presque obtus, légèrement crenelés à leur sommet, un peu plus longs que les divisions du calice; cinq écailles en spa-

rûle, opposées aux pétales, de la même couleur que la corolle & un peu plus courtes; des filamens nombreux, de la longueur des écailles, supportant des anthères arrondies, à deux loges; un ovaire tomenteux, blanchâtre; un style glabre & cylindrique, un peu plus long que la corolle; un stigmate dilaté en cinq lobes. Le fruit est une capsule ou une noix ovale, coriace, relevée de cinq côtes peu saillantes, tomenteuses, de couleur cendrée.

Cet arbre croît naturellement dans la Hongrie & dans les environs de Constantinople. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

Observations. « Cette espèce, dit M. Veneat, présente plusieurs avantages qui lui feront sans doute obtenir la préférence pour l'ornement des jardins. Ses feuilles, plus épaisses & plus charnues, résistent mieux aux chaleurs de l'été; elles procurent, par leur situation verticale, un abri impenétrable aux ardeurs du soleil. La blancheur de leur surface inférieure, le vert-fombre de leur surface supérieure & la couleur dorée des fleurs forment un contraste qui charme la vue. Nous pouvons encore ajouter que les fleurs sont plus nombreuses que dans les autres espèces, qu'elles répandent une odeur plus suave, & qu'elles durent plus long-temps.

« Ce tilleul, originaire, selon Aiton, du nord de l'Amérique, croît naturellement dans la Hongrie: MM. Beugnière & Olivier l'ont trouvé près de Constantinople. M. Garton l'introduisit en Angleterre en 1767. Aiton, directeur du jardin de Kew, en envoya quelques pieds il y a environ quinze ans à MM. Thouin & Cels, qui l'ont propagé avec succès, l'un dans le Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, & l'autre dans la pépinière d'Arcueil. Parmi les individus qui existent dans ces deux établissemens, il n'en est aucun qui soit l'œuvre de pied. Tous ont été greffés sur le tilleul dit de Hollande. Néanmoins ces arbres adoptifs croissent avec autant de vigueur qu'ils eussent été dans leur pays natal. Quelques-uns d'entre eux ont fleuri & fructifié. M. Thouin a semé leurs graines, qui ont parfaitement levé, & nous pouvons espérer que bientôt cette espèce intéressante embellira les jardins des amateurs. »

6. TILLEUL hétérophylle. *Tilia heterophylla*. Vent.

Tilia foliis ovatis, argutè serratis, basi nunc cordatis, nunc obliquo aut aqualiter truncatis, subtus tomentosis; nucè pyriformi. Vent. Monogr. pag. 16. tab. 5.

« Cette espèce, dit M. Veneat, que Fraser & Michaux ont trouvée dans la basse-Caroline, & qui doit exister aussi dans le Maryland, quoiqu'il nous avons vu dans l'herbier de M. Lamarck quelques

échantillons qui proviennent de cette contrée, diffère de la précédente par un grand nombre de caractères.

« Les jeunes pousses & les boutons sont d'un pourpre noirâtre & presque glabres; les feuilles, d'une forme ovale, tantôt échancrées à leur base, tantôt tronquées obliquement ou sur le même plan, finement dentées en scie & pointues à leur sommet, glabres & d'un vert-fombre en dessus, drapées, d'un blanc de neige en dessous & munies d'une petite touffe de poils roussâtres dans les poirs d'où partent les nervures latérales. Les pédoncules sont trois fois plus longs que ceux du *tilia rotundifolia*. Les fruits sont globuleux, à peu près de la grosseur d'un pois, relevés de cinq nervures, entre lesquelles il en est d'autres moins saillantes, qu'on apperçoit néanmoins sans avoir recours à la loupe.

« Cet arbre se trouve particulièrement dans les parties maritimes de la Virginie & de la Caroline; il ne s'élève qu'à la hauteur de nos arbres fruitiers. »

Observations. Michaux, dans la *Flore de l'Amérique septentrionale*, a mentionné deux espèces de tilleul qu'il ne rapporte à aucune espèce connue. Comme il ne présente d'autres détails qu'une seule phrase spécifique, & que je n'y trouve d'ailleurs aucun caractère saillant qui les distingue parfaitement des espèces précédemment décrites, je me bornerai à rapporter ce qu'il en dit.

« *Tilia (laxiflora), foliis cordatis, sensim acuminatis, rariorè dentatis, membranaceis; paniculis laxifloris, stylo petalis longiore.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 306.

Cette espèce se trouve sur les côtes maritimes de la Caroline & de la Virginie. Son caractère le plus frappant est d'avoir le bord de ses feuilles garnies de dents rares; ces feuilles sont en forme de cœur, insensiblement acuminées à leur sommet, membraneuses; les fleurs disposées en panicules lâches; le style plus long que les pétales. (P)

* *Tilia (scandens), foliis suborbiculato-cordatis, abruptè acuminatis, crispifoliis; paniculis confertissimis; stylo petalis subaequali.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 306.

Cette plante est remarquable par ses feuilles presque orbiculaires, en cœur, un peu épaisses, bruyamment acuminées à leur sommet; les fleurs forment des panicules serrées; le style est presque égal aux pétales en longueur; elle croît au Canada & sur les hautes montagnes de la Caroline. (P)

* *TIMONE. Timonius. Timon.* Rumph. Herbar. Amboin. vol. 9. pag. 1216. tab. 240.

Cet arbre présente un tronc fort épais, médiocr

crement élevé, revêtu d'une écorce épaisse, fongueuse, fendue, parsemée de taches noires; son bois est blanc, très-humide; ses branches peu nombreuses, chargées de rameaux opposés, articulés, garnis vers leur sommet de feuilles opposées, pétioles, simples, très-rapprochés, ovales-lancéolées, très-entières, longues de quatre à cinq pouces, larges d'environ deux pouces, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, assez semblables à celles du laurier, mais plus étroites & plus aiguës.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, disposées en grappes ou en petites panicules, dont les ramifications sont courtes, opposées; chaque fleur pédicellée. La corolle est blanche, monopétale, tubulée, allongée; le tube cylindrique; le limbe court, divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës. Le fruit est une petite baie globuleuse, couronnée par le calice persistant, à plusieurs découpures; d'abord d'un vert pâle, & puis d'un jaune-noirâtre.

Cet arbre croît partout dans l'île d'Amboine, principalement dans les vastes campagnes & sur les collines exposées aux vents. Ses branches sont employées à faire des pieux; les oiseaux mangent ses baies; son écorce est amère.

TINELIER ou ANGUILLIER. *Anguillaria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, dont la famille naturelle n'est pas encore bien déterminée, qui paroit avoir des rapports avec les *embelia*, qui comprend des arbres & arbustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples, alternes; les fleurs ordinairement nombreuses, axillaires, en grappes paniculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle monopétale, à cinq découpures profondes, réfléchies; cinq étamines; un style; une baie sèche à une loge monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, partagé en cinq découpures ovales, lancéolées, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, profondément divisée en cinq découpures lancéolées, ouvertes, souvent réfléchies, une fois plus longues que le calice.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts, insérés à la base de la corolle, terminés par des anthères droites, sagittées, assez grandes.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, surmonté

d'un style filiforme, plus long que les étamines; terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une baie sèche, globuleuse, coriace, à une seule loge, nuicronée par le style persistant.

Une seule semence globuleuse, marquée à sa base par une solette ombilicale.

Observations. La famille naturelle de ce genre n'est pas facile à déterminer; il offre un grand nombre des caractères des boraginées, mais les fruits l'en éloignent. Il réunit plusieurs espèces qu'on avoit d'abord présentées isolément comme autant de genres particuliers, telles que l'*icacorea* d'Aublet, le *dadula* de Justieu, le *harthea* de Commerson, l'*hiberdenia* de Banks, &c. Les uns ont donné à ce genre le nom d'*ardisia*, d'autres celui d'*anguillaria*, que nous avons conservé, & qui a été présenté déjà par M. de Lamarck dans les *illustrations des Genres*.

ESPÈCES.

1. **TINELIER de Ceylan.** *Anguillaria zeylanica*. Lam.

Anguillaria paniculata terminalibus; pedicellis subumbellatis; foliis ellipticis, coriaceis, integerrimis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2738. tab. 136. fig. 2. *Sub icacorea*. — Gertn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 373. tab. 77.

Ardisia (humilis), racemis terminalibus, compressis; pedicellis umbellatis; foliis lanceolato-ellipticis, integerrimis, coriaceis, venosis. Vahl, Symbol. 3. pag. 40.

Tinus humilis, zeylanica, foliis crassis, venosis. Burm. Zeylan. pag. 122. tab. 103.

C'est un petit arbrisseau, qui à presque l'aspect d'un cerisier, dont les branches sont diffusées, arâles; les rameaux glabres, cylindriques, très-lisses, garnis principalement vers leur sommet de feuilles alternes, épaisses, médiocrement pétioles, très-rapprochées, assez nombreuses, lancéolées, elliptiques, épaisses, coriaces, très-entières à leurs bords, veinées, très-glabres, vertes & luisantes, longues au moins de trois à quatre pouces & plus, larges de deux pouces & demi, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole court.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en une panicule terminale, très-étalée, composée de petites panicules partielles ou de grappes médiocrement rameuses, dont les pédoncules sont glabres, cylindriques; les pédicelles plus longs que les fleurs, munis à leur inflexion de petites bractées courtes, subulées, caulesques. Le calice est fort petit, d'une seule pièce, divisé à son limbe en cinq lobes égaux, ovales, persistants; la corolle monopétale, un peu rougeâtre ou pur-

purine, presque en roue. Le tube très-court; le limbe partagé en cinq découpures ouvertes, ovales, aiguës, plus longues que le calice; cinq étamines insérées à la base des découpures de la corolle, alternes avec celles du calice; un ovaire supérieur, surmonté d'un style très-court, terminé par un stigmate en tête. Le fruit est une petite baie de la grosseur d'un pois, un peu comprimée, d'un rouge un peu jaunâtre, à une seule loge, renfermant une seule semence à demi globuleuse, revêtue d'une arille pulpeuse & litée; l'embryon oblong, cylindrique, jaunâtre, un peu flexueux.

Cet arbrisseau croît dans les Indes orientales, à Ceylan, à Malacca, dans les marais salins aux environs de Siam. *h* (*V. f. in Herb. Juss.*)

2. TINELIER de la Guiane. *Anguillaria isacorea*. Lam.

Anguillaria racemis axillaribus & terminalibus; foliis ovatis, acuminatis, integerrimis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2739. tab. 136. fig. 3. *Sub isacorea*.

Ardisa (acuminata), paniculis axillaribus terminalibusque; foliis oblongis, acuminatis, basi attenuatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1062. n°. 4.

Isacorea Guianensis. Aubl. Guian. vol. 2. Supplém. pag. 1. tab. 368. — Lam. Dict. vol. 3. pag. 224.

Cet arbrisseau a déjà été mentionné dans cet ouvrage sous le nom d'ICACORE: il doit être placé dans ce genre, dont il présente tous les caractères; il parait même avoir beaucoup de rapport avec l'*anguillaria lateriflora*, dont il diffère principalement par l'absence d'un petit involucre situé dans ce dernier à la base des pédicelles, & par ses fleurs en grappes & non en une sorte d'ombelle.

Son tronc s'élève à la hauteur de six à sept pieds; il se divise en branches & en rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, glabres, très-entières, ovales, longuement acuminées à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, décourtes sur des pétioles courts & planes. Les fleurs sont disposées en grappes latérales & terminales, situées dans l'aisselle des feuilles, lâches, médiocrement rameuses, sans bractées ni involucre; les pédicelles courts, inégaux; le calice divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle monopétale, à cinq divisions profondes, lancéolées. Le fruit est une baie sèche, un peu globuleuse, coriace, à une seule loge, qui renferme une semence dure, foliatare, arrondie.

Cette plante se trouve à la Guiane dans les bois & dans les champs cultivés. *h* (*V. f.*)

3. TINELIER de la Jamaïque. *Anguillaria tinifolia*.

Anguillaria paniculata terminali, corolla reflexa; foliis ellipticis, integris, nervosis; caule arboroso. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2740.

Ardisa (tinifolia), floribus paniculatis, foliis ellipticis, integris, nervosis; caule arboroso. Swartz, Prodr. pag. 48. & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 468. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1062. n°. 1.

Isifnum forte arborum, foliis laurinis, obtusis. Sloan, Hill. 2. pag. 98. tab. 103. *Figura rudis*.

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à vingt-cinq pieds, sur un tronc très-droit, revêtu d'une écorce lisse, cendrée, parsemée de taches roussâtres; son bois est rouge, tendre, peu estimé; les rameaux longs, glabres, lâches, fragiles, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, presque elliptiques, un peu roides, longues de deux pouces, luisantes, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, légèrement nerveuses; les pétioles glabres, cylindriques, d'une longueur médiocre.

Les fleurs sont nombreuses, réunies en panicules droites, roides, terminales, médiocrement divisées; les pédicelles très-courts, alternes, colorés, uniflores; les calices divisés en cinq découpures droites, subulées, persistantes; la corolle d'un rouge-clair; les divisions du limbe très-ouvertes, réfléchies; les filaments insérés à la base du tube; les anthers presque sagittées, rapprochées autour du style à son sommet, jaunes, perforées à leur sommet; le style plus long que les étamines, un peu ascendant. Le fruit glabre, globuleux, rouge, de la grosseur d'un grain de poivre, à une seule semence.

Cet arbre croît à la Jamaïque, sur les montagnes arides; il fleurit en juillet & août. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

4. TINELIER coriace. *Anguillaria coriacea*.

Anguillaria floribus paniculatis; foliis oblongis, integris, avenis, coriaceis. Swartz, Prodr. pag. 48. & Flor. Ind. orient. vol. 1. p. 470. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1062. n°. 2. *Sub ardisia*.

Petit arbrisseau dont les rameaux sont cylindriques, striés, inégaux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, un peu convexes à leur contour, coriaces, luisantes, sans veines ni nervures apparentes; les pétioles glabres, cylindriques, longs d'un demi-pouce.

Les fleurs forment à l'extrémité des tiges, des panicules droites, rameuses; les rameaux alternes, érales, chargés de fleurs éparies, un peu grandes, pédicellées, d'un pourpre-écarlate. Le calice est divisé en cinq folioles, fort petites, arrondies,

persistantes, membraneuses à leurs bords; la corolle presque en roue; le limbe à cinq lobes; les anthères droites, rapprochées autour du style; les loges perforées à leur sommet; le style filiforme, incliné; le stigmate simple.

Cette plante croît aux Antilles. *(Descript. ex Swartz.)*

5. TINELIER à feuilles de laurier. *Anguillaria laurifolia*.

Anguillaria racemis simplicibus, axillaribus & terminalibus; foliis lanceolato-ovatis, obtusis, integris, coriaceis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2741. — Juss. Heib.

Balaiba. Surian. Herb. n°. 790.

Il y a tant de rapport entre cette plante & l'*Anguillaria coriacea* de Swartz, qu'il seroit difficile d'affurer qu'elles ne soient pas la même espèce, & moins qu'on ne les voit bien vivantes: celle-ci ne paroît en différer par son port, par la forme un peu différente de ses feuilles, par la disposition de ses fleurs.

Ses tiges sont divisées en rameaux alternes, cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, alternes, assez ordinairement épaisses & ramassées aux sommets des rameaux, coriaces, ovales-lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, longues de quatre à cinq pouces. Les fleurs sont disposées en grappes simples & non paniculées, situées dans l'aisselle des feuilles, les unes latérales, d'autres terminales.

Cette plante croît aux Antilles. *(V. f. in Herb. Juss.)*

6. TINELIER à longues feuilles. *Anguillaria barthea*. Lam.

Anguillaria paniculis elongatis, axillaribus; foliis lanceolato-oblongis, levibus, integerrimis. Lam. Ill. Gen. vol. 2. pag. 109. n°. 2740.

Barthea. Commerç. Herb.

Badula. Juss. Gener. Plant. pag. 410.

Vulgairement bois de pistade.

Cette espèce est remarquable par la longueur de ses feuilles. C'est un arbrisseau dont les tiges se divisent en branches alternes, garnies de rameaux glabres, cylindriques, qui supportent des feuilles alternes, épaisses, médiocrement pétiolées, oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, vertes, très-lisses, très-entières à leurs bords, obtus à leur sommet, rétrécies en un pétiole court à leur base, longues de cinq à six pouces. Les fleurs sont latérales, situées dans l'aisselle des feuilles & disposées en grappes paniculées, allongées. Le rameau divise en cinq découpures petites, arrondies;

la corolle blanche, une fois plus longue que le calice, en roue, à cinq lobes égaux, ouverts; cinq filamens très-courts, insérés à la base de la corolle, supportant des anthères oblongues, aiguës, opposées aux découpures de la corolle, un peu plus courtes qu'elle; un ovaire ovale, supérieur, surmonté d'un style court, épais, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une petite baie sèche; de la grosseur d'un grain de poivre au plus, très-glabre, globuleuse, micronée par le style, tournée à sa base par le calice persistant, renfermant une semence environnée d'un arille pulpeux, frié.

Cet arbrisseau a été découvert par Commerçon à l'Île-de-France, où il porte le nom de bois de pistade. *(V. f. in Herb. Lam. & Juss.)*

7. TINELIER à feuilles dentées. *Anguillaria serrulata*.

Anguillaria floribus paniculatis; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, rugosis; caule frutesco, pubescente. Swartz, Prodr. 48, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 471. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1062. n°. 3. 525 *aristata*.

Celtis folio citrei, subtus auro; fr. & rubro. Plum. Catalog. 18, & Icon. 80.

Anguillaria (chrysophylla), paniculata terminalis; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, serrulatis, subius aureis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 109. n°. 2743. 2

Arbrisseau dont les tiges sont droites, hautes de deux ou trois pieds, glabres, cylindriques, un peu couverts de toaille; les rameaux velus, ferrugineux, cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales-lancéolées, uncinées à leur base, acuminées à leur sommet, dentées en scie à leur contour, un peu épaisses, glabres à leurs deux faces, nerveuses, ponctuées & ferrugineuses en dessous.

Les fleurs sont réunies en panicules terminales, divisées en rameaux alternes, horizontaux, anguleux, un peu pubescents & de couleur de rouille; les pédicelles colorés, très-rapprochés, nombreux, un peu ombellés. Le calice le divise en cinq découpures ouvertes & colorées; la corolle est d'un rouge-foncé; le tube à peine sensible; les découpures du limbe ciliés à leurs bords; les anthères jaunes, composites, acuminées; le style blanchâtre, persistant; le fruit globuleux, d'un rouge de sang d'abord, & puis noir, renfermant une semence très-blanche.

Cet arbrisseau croît en Amérique, à la Nouvelle-Espagne, sur le bord des rivières, parmi les gazons. *(Descript. ex Sw.)*

Observations. L'*Anguillaria chrysophylla* des H-

Infructus des Genres n'offre point affez de différence avec cette espèce pour en être séparée. Ses fleurs sont violettes, disposées en panicule pyramidale; les baies rouges; les feuilles presque d'un jaune doré en dessous: elle croît à Saint-Domingue.

8. TINELIER pyramidal. *Anguillaria pyramidalis*.

Anguillaria foliis lanceolato-ovatis, glabris; racemis terminalibus; pedunculis umbelliferis, compressis. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 1. tab. 502. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 233. *Sub ardisia*.

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt à vingt-cinq pieds, muni de rameaux épars, garnis de feuilles nombreuses, épaisses, presque sessiles, lancéolées, ovales, un peu dentées en scie vers leur sommet, glabres à leurs deux faces, longues de six pouces & plus, rétrécies en pétiole à leur base.

Les fleurs sont disposées en une ample panicule pyramidale, presque longue d'un pied, droite, terminale, composée de petites ombelles latérales, alternes, dont les pédoncules sont plus courts à mesure qu'ils approchent du sommet, rougeâtres, un peu comprimés, supportant à la partie supérieure huit à dix fleurs en ombelle; les pédicelles filiformes, longs d'un demi-pouce & plus, munis à leur base d'une bractée courte & tronquée. Le calice est rougeâtre, libre, persistant, composé de cinq folioles ovales, aiguës, légèrement ciliées, trois fois plus courtes que la corolle: celle-ci est rouge, monopétale; son tube court; son limbe à cinq découpures profondes, lancéolées; les filaments courts, insérés sur le ruban de la corolle; les anthères droites, presque sagittées, tétragones, à deux loges, un peu plus courtes que la corolle; un ovaire sphérique; un style filiforme plus long que les étamines; un stigmate aigu. Le fruit est une drupe sphérique, coriace, à une seule loge, à une seule semence dure, sphérique, couverte d'une pellicule roussâtre.

Cette plante croît en Amérique, proche Santa-Cruz. *Th* (*Descript. ex Cavan.*)

9. TINELIER en dens de scie. *Anguillaria serrata*.

Anguillaria foliis sparsis, lanceolatis, serratis; racemis terminalibus, compressis. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 2. tab. 503. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 233. *Sub ardisia*.

Cette espèce, qui se rapproche beaucoup de l'*Anguillaria pyramidalis*, en diffère par les feuilles lancéolées, dentées en scie. C'est un arbre dont le tronc parvient à la hauteur de quinze à vingt pieds, divisé en rameaux glabres, alternes, garnis de feuilles épaisses, rapprochées, pétioles,

oblongues, linéolées, très-glabres à leurs deux faces, demeurés en scie à leurs bords, longues d'un demi-pied & plus, larges à peine de deux pouces, rétrécies à leur base en un pétiole court, d'environ six lignes de long.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en une panicule pyramidale, longue d'un pied, composée de corymbes ou de petites ombelles alternes, latérales; les pédoncules rougeâtres, divergens; les inférieurs plus longs, munis à leur base d'une petite bractée courte & tronquée; la corolle à cinq découpures ovales-lancéolées; les autres parties semblables à celles de l'*Anguillaria pyramidalis*.

Cette plante croît en Amérique, proche Sainte-Croix. *Th* (*Descript. ex Cavan.*)

10. TINELIER à fleurs latérales. *Anguillaria lateriflora*.

Anguillaria racemis lateralibus, axillaribusve, compressis; floribus umbellatis; foliis oblongis, acuminatis, integerrimis; caule fruticoso. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 109. — Swartz, Prodr. pag. 48, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 473. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1063. n°. 7. *Sub ardisia*.

Les rameaux de cet arbrisseau sont glabres, alternes, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétioles, oblongues, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, très-entières à leurs bords, veinées & nerveuses; les pétioles courts, glabres, arrondis en dessous, canaliculés en dessus, un peu membraneux à leurs bords.

Les fleurs sont disposées en grappes latérales, axillaires, composées de petites grappes épaisses, beaucoup plus courtes que les feuilles; les terminales sont réunies en petites ombelles avec un involucre composé de plusieurs petites folioles très-courtes. Le calice est fort petit, à cinq découpures; la corolle divisée presque jusqu'à sa base en cinq découpures acuminées, réfléchies; cinq filaments droits; les anthères acuminées & convergentes; l'ovaire est arrondi, le style de la longueur des étamines, le stigmate aigu. Le fruit consiste en une drupe globuleuse, rude, punctué, à une seule semence.

Cette espèce croît dans les Indes occidentales. *Th* (*Descript. ex Sw.*)

11. TINELIER parasite. *Anguillaria parasitica*.

Anguillaria racemis axillaribus, simplicibus; foliis sessilibus, lanceolato-ovatis, linearis; caule fruticoso. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 109. — Swartz, Prodr. pag. 48, & Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 474. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1063. n°. 9. *Sub ardisia*.

Arbrisseau parasite, très rameux, dont les branches, grêles, fragiles, glabres, cylindriques, sont chargées de rameaux tétragones, garnis de feuilles sessiles, alternes, lancéolées, un peu ovales, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, très glabres, d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, traversées par des veines noires.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, axillaires, droites, filiformes, plus courtes que les feuilles; les pédicelles sont courts, munis à leur base de très-petites bractées; le calice divisé en cinq découpures colorées, ovales, aiguës; la corolle blanchâtre, un peu purpurine, ponctué en dedans, presque enroulé; les filaments courts, insérés sur le tube de la corolle; les anthères ovales, échanquées, divergentes & colorées à leur sommet; l'ovaire un peu arrondi; le style à peine de la longueur des étamines; le stigmate obtus. Le fruit est une drupe globuleuse, agréablement ponctué.

Cet arbrisseau croît à l'île de Saint-Domingue, sur le tronc des arbres, au revers des montagnes. (Description, ex Swartz.)

12. TINELIER folané. *Anguillaria folanacea*.

Anguillaria corymbosa axillaribus, tripartitis; foliis oblongis, utrinque acuminatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1063. n°. 6. Sub ardisia.

Ardisia folanacea. Rozburg. Cotomand. vol. 1. pag. 27. tab. 27.

Son tronc se divise en branches & en rameaux glabres, alternes, cylindriques, garnis de feuilles médiocrement pétioles, alternes, très-amplés, oblongues, glabres à leurs deux faces, très-entières, aiguës à leurs deux extrémités, rétrécies à leur base & prolongées en un pétiole court, longues de quatre pouces & plus, larges de deux pouces. Les fleurs sont latérales, situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en corymbes à trois principales divisions; les pédoncules partiels réunis par cinq en ombelle; le calice divisé en cinq découpures égales, beaucoup plus courtes que la corolle, ovales, aiguës; la corolle grande, de couleur incarnate, à cinq divisions planes, ovales.

Cette plante croît aux Indes orientales, sur les lieux montagneux. h

13. TINELIER crénelé. *Anguillaria crenulata*, Vent.

Anguillaria panicula terminali; foliis lanceolato-ovatis, repando-crenatis, acuminatis, basi attenuatis. Ventr. Choix de Pl. pag. 5. tab. 5. — Pers. Synops. Plant. vol. 1. pag. 233. Sub ardisia.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, divisées en branches médiocrement étalées, gar-

nies de rameaux alternes, épars, presque cylindriques, glabres, munis de feuilles pétioles, alternes, lancéolées-ovales, glabres à leurs deux faces, rétrécies à leur base, acuminées à leur sommet, sinuées & crénelées à leur contour. Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles supérieures en une panicule terminale, étalée.

Cette plante croît aux Antilles. h

14. TINELIER de Bahama. *Anguillaria bahamensis*. Gærtner.

Anguillaria bahamensis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 110. tab. 136. fig. 1. Sub icacorea. — Gærtner. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 372. tab. 77. fig. 1.

Heberdenia excelsa. Banks. Herb.

Cette espèce ne nous est connue que par les fruits dont Gærtner nous a donné la description, sans aucun autre détail sur les autres parties de cette plante; de sorte qu'il ne seroit pas étonnant qu'on ne puisse la rapporter à une des espèces citées plus haut. Ses baies sont une fois plus grosses que celles de *Anguillaria zeylanica*; elles font globuleuses, supérieures, noires, glabres, coriaces, à une seule loge, conservant à leur base le calice à cinq découpures profondes, lancéolées, aiguës; une semence solitaire, pâle, globuleuse, marquée à sa partie inférieure d'une large fossette ombilicale, revêtue d'un arille épais, longueux, coriace, friable. L'embryon est cylindrique, flexueux; les cotylédons linéaires, oblongs & très-courts; la radicule filiforme, très-longue.

Cette plante croît à l'île de Madère. Willdenow la regarde comme appartenant à l'*Ardisia excelsa* Aiton.

* *Anguillaria (excelsa), racemis axillaribus, simplicibus; foliis obovatis, marginibus cartilagineo-serratis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 110. — Aiton, Hort. K. w. vol. 1. pag. 261. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1062. n°. 8. Sub ardisia.

TINIER d'Occident. *Tinus occidentalis*. Linn.

Clethra (tinifolia), arborea, foliis oblongo-lanceolatis, integerrimis, subtus incanis; racemis paniculatis, spissifloribus, tomentosis. Swartz, Prodr. pag. 74, & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 845.

Clethra (tinifolia), foliis oblongis, integerrimis, subtus incanis; racemis paniculatis, florentibus bracteatis, pedunculatis tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 610. n°. 4.

Tinus occidentalis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 330.

Vallantia arborea, foliis oblongo-ovatis, alternis, superius glabris, subtus juvenculis & nervosis; foliis ramosis & terminalibus. Brown. Jam. pag. 214. tab. 21. fig. 1.

Baccifera

Bacifera arbor, calyculata, foliis laurinis, fructu racemoso. Sloan, Hist. 2. pag. 86. tab. 198. fig. 2. (*Icon, non descriptio.*)

Tinnus. Juss. Gener. Plant. pag. 264.

C'est plutôt comme espèce que comme genre que nous mentionnons ici cette plante. Le caractère de sa fructification, d'abord imparfaitement connu, l'avait fait considérer comme constituant un genre particulier, auquel Linné avoit donné le nom de *tinnus*. M. de Jussieu avoit soupçonné qu'il pouvoit bien y avoir quelque erreur, surtout dans le nombre des étamines, &c. que cette plante devoit être rapprochée des *eleuthra*. Des observations récentes ont confirmé les soupçons de ce célèbre professeur, & le genre *tinnus* de Linné est devenu une espèce de *eleuthra*, ayant dix étamines & les autres caractères de ce genre.

C'est un arbrisseau d'un aspect assez élégant, & qui présente le port des autres espèces de *eleuthra*, mais beaucoup plus fort & plus élevé, dont les rameaux sont étalés, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, oblongues, lancéolées, simples, très-entières à leurs bords, glabres & vertes à leur face supérieure, blanchâtres & légèrement tomenteuses ou velues en dessous, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux, en grappes alongées en forme d'épis, & ramifiées en une panicle, dont les pédoncules sont tomenteux & blanchâtres, dépourvus de bractées. Le calice est un peu pubescent, divisé en cinq découpures égales; la corolle composée de cinq pétales un peu élargis, & connivens à leur base; les étamines au nombre de dix; les filaments libres point saillans; le style terminé par un stigmate à trois divisions. Le fruit est une capsule bacciforme, à trois loges, à trois valves, glabre, arrondie.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, sur les hautes montagnes. T

TIONGINE. *Beckaa*. Genre de plantes dicorollées, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des onagres, qui paroît avoir des rapports avec les *ophira*, & qui comprend des arbrutes exotiques à l'Europe, dont le port approche de celui des auresnes, & dont les rameaux sont opposés; les feuilles petites, linéaires, opposées; les fleurs solitaires, axillaires, très-petites.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice monophylle, à cinq dents; cinq pétales; huit filaments; un style; une capsule à trois ou quatre loges polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

Botanique. Tome VII.

1°. Un calice persistant, monophylle, un peu turbiné, divisé en cinq dents inégales, aiguës.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ouverts, un peu arrondis, inférés sur le calice, alternes avec les découpures.

3°. Huit étamines, dont six filaments réunis par paires, deux autres solitaires, très-courts, rétrécis en dedans; les anthères un peu ovales, fort petites.

4°. Un ovaire arrondi, enveloppé par la partie inférieure du calice, surmonté d'un style filiforme, plus court que la corolle, terminé par un stigmate en tête.

Le fruit consiste dans une capsule globuleuse, couronnée vers son sommet par les dents du calice, s'ouvrant en trois ou quatre valves, divisée en autant de loges, qui renferment quelques semences arrondies, anguleuses à une de leurs faces, fort petites.

ESPÈCES.

1. **TIONGINE** de la Chine. *Beckaa chinensis*. Gzert.

Beckaa foliis oppositis, mucis; dentibus calycinis membranaceis, coloratis. Smith.

Beckaa frutescens. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 514. — Smith, Act. Soc. Linn. Lond. 3. p. 260. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 434. n°. 1. — Lam. Illustr. Gen. tab. 285.

Beckaa chinensis. Gzert. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 157. tab. 31. fig. 7.

Beckaa. Osbeck. Itin. pag. 251. tab. 1.

C'est un petit arbrisse, dont le port approche beaucoup de celui de l'auronne, qui s'élève sur une tige grêle, cylindrique, munie de rameaux glabres, opposés, effilés, courts, très-simples, garnis de feuilles sessiles, opposées, fort petites, courtes, linéaires, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, mais point piquantes, nombreuses, rapprochées, un peu plus longues que les entre-nœuds.

Les fleurs sont petites, solitaires, opposées, médiocrement pédonculées, situées dans l'aisselle des feuilles; les pédoncules presque seracés, nus, glabres, beaucoup plus courts que les feui les; le calice, glabre, un peu turbiné avant l'épanouissement des fleurs, devient presque campanulé, & enveloppe par sa base la moitié de l'ovaire ou des fruits sur lesquels il persiste; il se divise à son orifice en cinq dents aiguës, un peu inégales. La corolle est fort petite, composée de cinq pétales un peu arrondis, à peine plus longs que le calice, inférés sur les parois internes, opposés à ses divisions; les filaments plus courts que la corolle;

fix rapprochés par paires, deux solitaires, très-courts, supportant des anthères fort petites, un peu ovales; l'ovaire un peu arrondi; le style plus long que les étamines, plus court que la corolle, surmonté d'un stigmate capité. Le fruit est une capsule fort petite, un peu plus grosse qu'une tête d'épingle; la moitié inférieure environnée par le calice; la supérieure nue, globuleuse, arrondie, obscurément trigone, à trois ou quatre loges, à autant de valves; les cloisons opposées aux valves; chaque loge renfermant fix à huit semences fort petites, jaunâtres, glabres, anguleuses; l'embryon droit, un peu cylindrique.

Cette plante croît à la Chine. f_3

1. *TRIONGNE* à feuilles serrées. *Beckea densifolia*. Smith.

Beckea foliis quadrifidam imbricatis, obtusis; mucronulo reflexo; dentibus calicinis foliaceis. Smith, Act. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 260. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 435. n^o. 2.

Cet arbrust se distingue du précédent par son port, par les feuilles, par les dents foliacées de son calice. Ses tiges sont rameuses, garnies de feuilles petites, opposées, très-rapprochées & même imbriquées, sur quatre rangs, linéaires, glabres, filices, entières, obtuses à leur sommet, terminées par une petite pointe mucronée & réfléchie en dehors; les fleurs petites, axillaires; le calice divisé à son bord en cinq petites découpures foliacées.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, au port Jackson. f_3

TITHONIE. *Tithonia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, radiées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *rudbeckia*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, & dont les fleurs sont solitaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs radiées; un calice composé d'un double rang de folioles presqu'égalles, conniventes à leur base; les fleurons ventrus à leur base; les semences couronnées par cinq paillettes; le réceptacle convexe, garni de paillettes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1^o. Un calice cylindrique, dont les divisions sont très-profondes, ovales-allongées, disposées sur deux rangs.

2^o. Une corolle radiée; les demi-fleurons stériles; les fleurons tous hermaphrodites, à cinq dents; leur tube réflé près de la base.

3^o. Cinq *laminae* syogénètes; les filaments stériles; les anthères allongées, de la même longueur que les filaments, réunies en cylindre.

4^o. Un ovaire oblong, grêle, surmonté d'un style simple, plus long que les étamines, terminé par deux stigmates écartés & courbés en dehors.

Les semences solitaires, lisses, couronnées par quatre ou cinq paillettes blanches, aiguës.

Le réceptacle convexe, garni de paillettes concaves, aiguës, un peu plus longues que les semences.

Observations. « J'ai donné à ce genre, dit M. Desfontaines, le nom de *tithonia*, à cause de la couleur aurore de ses fleurs. Il a du rapport avec le genre *gaillardia* de Fougereux, ou *virgilia* de L'Heritier; il en diffère par son calice cylindrique, dont les divisions sont sensiblement égales, ovales-allongées, serrées & disposées sur deux rangs; par les fleurons renflés près de la base; les graines du *gaillardia* sont concaves & couronnées de huit paillettes distinctes; celles du *tithonia* sont très-allongées, & surmontées de quatre à cinq paillettes.

ES P È C E.

TITHONIE à fleurs de sagette. *Tithonia tagetiflora*. Desfont.

Tithonia foliis alternis, cordatis, triangularibus, in petiolum productis; inferis trilobis. Desf.

Tithonia tagetiflora. Desf. Afr. Paris. extr. vol. 12. & Annal. Mus. Hist. nat. Paris. vol. 1. pag. 49. tab. 4. — Lam. Illustr. Gen. tab. 708. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 2246.

Ses racines sont annuelles & rameuses; elles produisent une tige droite, cylindrique, de la grosseur du doigt, hautes d'un pied & demi ou deux pieds, couverte d'un duvet fin, très-court, divisée en plusieurs rameaux stériles, inégaux, renflés, privés de feuilles au sommet, terminés chacun par une feuille. Les feuilles sont alternes, en cœur, rudes, velues, dentées, un peu pendantes, marquées de trois nervures longitudinales, décurrentes sur un pétiole un peu creusé en gouttière; les feuilles inférieures ordinairement divisées en deux ou trois lobes un peu aigus, dont les sinus sont arrondis.

Les fleurs sont terminales & solitaires à l'extrémité de chaque rameau. Leur calice est glabre, cylindrique, à dix ou douze divisions profondes, égales, ovales-allongées, rapprochées, disposées sur deux rangs, réfléchies en dehors à l'extrémité, après l'épanouissement de la fleur; la corolle radiée, d'un jaune-aurore, composée de neuf à douze demi-fleurons stériles, elliptiques, obtus, irrégulièrement dentés ou seulement

échancrés au sommet, portés sur un tube court, filiforme, velu, légèrement arqué; les fleurons sous hermaphrodites, couronnés de cinq petites dents aiguës; le tube cylindrique, renflé près de sa base.

Cette plante croît dans les environs de la Vera-Cruz, où elle a été découverte par Thierry, cultivée en 1778 au Jardin des Plantes de Paris, perdue depuis. O

Elle mériterait d'être cultivée dans les parterres dont elle ferait un des plus beaux ornemens. On ne lui connaît aucun usage ni dans la médecine ni dans les arts. Elle fleurit dans l'été.

TITI *Karin rigera*. Rheed, Hort. Malab. vol. 6. pag. 45. tab. 25.

C'est une plante du Malabar, qui appartient à la famille des papilionacées, dont les tiges ligneuses se divisent en branches un peu tortueuses, & en rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles ovales, un peu arrondies, très-obtus, échancrés à leur sommet, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, la plupart rétrécies en pointe à leur partie intérieure, marquées de nervures simples, latérales, opposées.

Les fleurs sont presque solitaires, ou réunies quelques-unes ensemble dans l'aisselle des feuilles, sessiles, blanchâtres, papilionacées: il leur succède des gousses droites, renfermant des semences lufantes, un peu jaunâtres, courbées en rein.

Cette plante croît au Malabar, dans les lieux montagneux; elle reste verte toute l'année. On tire de ses racines une huile employée pour les cheueux.

TITIFEN. *Tittius. Titi*. Rumph. Herb. Amb. vol. 3. pag. 38. tab. 20:

Arbre de l'île d'Amboine, qui pourroit appartenir à la famille des *guttiferes*, le rapprocher beaucoup des *cornutis* ou des *clerodendrum*, dont il n'est peut-être qu'une espèce: il est également très voisin du *cumbula*, Rheed, Malab. 1, tab. 41, qu'on pourroit presque placer dans le même genre.

Cet arbre s'élève fort haut. Son tronc est fort épais, & pourroit à peine être embrassé par un homme. Il est revêtu d'une écorce glabre, cendrée, un peu succulente; il supporte une cime touffue, composée de branches & de rameaux diffus, garnis de feuilles amples, éparfes, quelques-unes opposées, pétiolées, simples, arrondies, ovales ou quelquefois un peu lancéolées, pendantes, longues de douze à quinze pouces, glabres à leur face supérieure, lanugineuses en dessous, entières ou un peu sinuées à leur con-

tour, terminées à leur sommet par une petite pointe courte, arrondies & presque en cœur à leur base; les pétioles épais, beaucoup plus courts que les feuilles, un peu velus.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une panicule cralée, assez ample, composée de petites grappes partielles, ramifiées; les rameaux courts, presque o; poies, à plusieurs fleurs pédicellées, dépourvues de bractées. Ces fleurs sont grandes, légèrement odorantes; leur calice court, à cinq découpures ovales, presque obtuses, persistantes. La corolle est purpurine, tubulée, campaniforme, divisée à son limbe en cinq découpures ovales, un peu réfléchies en dehors; les étamines, au nombre de cinq, presque aussi longues que la corolle; les anthères jaunes, un peu inclinées. L'ovaire est ovale, un peu globuleux, surmonté d'un seul style. Le fruit est charnu, de la grosseur d'une petite prune; il renferme un noyau silié, un peu tuberculeux, dur, osseux, à cinq angles saillans.

Cet arbre croît naturellement à l'île d'Amboine, dans les forêts; il est aussi cultivé dans la plupart des jardins. Son bois est blanc, tendre, léger, peu durable: la facilité de le travailler le fait employer fréquemment, par les habitants du pays, dans la construction de leurs barques; ils en font aussi plusieurs ustensiles. Son écorce verte & récente passe pour déterive: on l'applique pilée sur les blennies & les ulcères; elle est aussi un peu astringente.

Observations. Rumphie cite une autre espèce de *tittius*, qu'il appelle *tittius, tittarella*, & qui paroit être la même plante que le *clerodendrum infornatum* Linn. (Voyez PERAGU, vol. V, pag. 163, n°. 1.)

TOCOYÈNE. *Tocoyena*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *cinchona* & les *posqueria*; il renferme des arbrutes indigènes de l'Europe, à feuilles simples, opposées, munies de stipules, & dont les fleurs, longuement tubulées, sont terminales, rapprochées, garnies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice court, à cinq dents; une corolle tubulée; le tube très-long; le limbe dilaté en cinq lobes; cinq étamines courtes; un style épais au sommet; une baie charnue, couronnée, à deux loges polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice adhérent, d'une seule pièce, un peu campanulé, divisé à son orifice en cinq dents courtes, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, régulière, rubulée; le tube très-long, presque cylindrique, un peu dilaté vers son sommet; l'orifice nu; le limbe court, en faucoupe, à cinq découpures ovales ou linéaires.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont courts, insérés à l'orifice du tube, terminés par des anthers oblongues, sagittées, à peine saillantes.

4°. Un ovaire ovale, un peu allongé, adné avec le calice, surmonté d'un style filiforme, presque de la longueur du tube de la corolle, épaissi & fusiforme à sa partie supérieure; le stigmate en massue, divisé en deux lames.

Le fruit est une baie capsulaire, un peu charnue, ovale, à une seule valve, divisée intérieurement en deux loges, couronnée à son sommet.

Des semences petites, nombreuses, arrondies-ovales, un peu aigües à leur base, enveloppées d'une pulpe molle.

Observations Ce genre est à peine distingué des *prosopteria*, dont il diffère par l'orifice de la corolle nue, par son fruit moins succulent. Les découpures linéaires du limbe de la corolle du *tocoyena latifolia* servent de passage de l'un à l'autre genre: les *cinchona* en sont plus séparés par leur fruit capsulaire, qui se divise en deux valves. Ces trois genres sont remarquables par la longueur du tube de leur corolle.

E S P È C E S .

1. TOCOYÈNE à longues feuilles. *Tocoyena longifolia*.

Tocoyena foliis lanceolato-oblongis, acuminatis; floribus subsessilibus, aggregatis. (N.)

Tocoyena longiflora. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 131. tab. 50. — Lam. Illustr. Gener. tab. 163. fig. 1.

Uriana speciosa. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 961.

Cette plante a des tiges droites, glabres, verdâtres, hautes d'environ trois pieds, un peu ligneuses, tendres & moelleuses sous l'épiderme; de la grosseur du petit doigt, quadrangulaires, les angles mousses & divisées en rameaux opposés & de même forme, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, étroites, lanceolées, fort longues, glabres à leurs deux faces, molles, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues d'environ douze à quinze pouces, sur deux ou trois de large; munies à leur base d'un pétiole très-court, de stipules ovales, aigües, un peu charnues, sessiles, presque amplexicaules.

Les fleurs sont réunies presque en tête, au nombre de douze à quinze, à l'extrémité des rameaux.

Elles sont presque sessiles, rapprochées, d'une odeur suave, chacune séparée par une petite bractée ovale, pointue. Leur calice est fort court, à cinq dents ovales, aigües; la corolle tubulée; son tube cylindrique, un peu renflé vers le haut, de couleur jaune, long d'environ huit à neuf pouces. Le limbe est blanc, à cinq lobes courts, ovales, aigües; l'ovaire ovale, couronné par un disque charnu; le style de la longueur du tube, velu particulièrement vers sa partie supérieure, renflé en massue; le stigmate épais, divisé en deux lames, marquées chacune extérieurement de cinq filirs. Le fruit est lisse, ovale, un peu charnu, divisé en deux loges séparées par une cloison très-mince; les semences comprimées, arrondies, fort petites, placées les unes sur les autres, enveloppées d'une pulpe visqueuse.

Cette plante croît en Guinée, dans les bois d'Atoura. h

2. TOCOYÈNE à larges feuilles. *Tocoyena latifolia*.

Tocoyena foliis lato-ovatis, coriaceis; floribus racemoso-paniculatis. (N.) — Lam. Illustr. Gener. tab. 163. fig. 2.

Cette espèce est très-distincte de la précédente par la forme de ses feuilles & la disposition de ses fleurs. C'est un arbruste dont les tiges sont glabres, rameuses, garnies de feuilles amples, larges, opposées, médiocrement pétioles, ovales, coriaces, glabres à leurs deux faces, luisantes à leur face supérieure, très-entières, arrondies à leur base, obtuses à leur sommet, un peu mucronées, longues de six à huit pouces & plus, larges de quatre; leur pétiole court, comprimé, strié.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une petite grappe droite, un peu paniculée; les ramifications peu nombreuses, courtes, souvent dichotomes, uniflores; les calices très-courts, glabres, un peu campanulés, à cinq dents courtes, aigües; le tube de la corolle long de quatre à cinq pouces, glabre, cylindrique; le limbe divisé en cinq découpures profondes, linéaires, obtus; les étamines insérées à l'orifice du tube; les filamens presque de la moitié de la longueur des divisions du limbe; les anthers vacillantes, sagittées à leur base, aigües, à deux loges.

Cette plante croît dans les forêts de la Guinée: elle m'a été communiquée par M. Dupuis. h (V. f.)

TODDALI. *Toddalia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des térébinthacées, qui a des rapports avec les *amyris* & les *schinus*, & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont

les feuilles sont ternées, les folioles percées de points transparents, les fleurs disposées en panicules axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq dents ; cinq pétales, cinq étamines ; un stigmate presque sessile, aplati ; une baie sèche, à quatre ou cinq loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, fort petit, à cinq dents courtes, aiguës.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ovales-oblongs, concaves, beaucoup plus longs que le calice.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont droits, fubulés, de la longueur des pétales, terminés par des anthères ovales, assez grandes.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, remplissant la corolle ; le style nul ou à peine sensible ; un stigmate aplati, tronqué, à cinq lobes peu marqués.

Le fruit est une baie sèche, de la forme & de la grosseur d'un pois, globuleuse, un peu ponctuee, à quatre ou cinq loges, contenant dans chaque loge une semence foliaire, ovale : quelques loges & semences avortent assez ordinairement.

Observation. Ce genre a été présenté par Smith, Willdenow, &c. sous la dénomination de *Scopolia*. MM. Lamarck & Jussieu l'avoient auparavant établi sous le nom de *toddalia*. D'où vient donc cet abus de changer des noms reçus, pour leur en substituer d'autres sans aucune utilité ? Ici c'est bien pire : on emploie un nom (*Scopolia*), qui déjà a été donné à deux autres genres, à une plante d'Amérique par Linné fils (Voyez SCOPOLIA, vol. VII, pag. 14), à une plante de la mer du Sud par Forster. Peut-être dira-t-on que ces deux genres ne sont point admissibles, & que par conséquent le nom reste à la disposition de celui qui voudra s'en servir. Hé bien ! je crois que, même dans ce cas, il seroit avantageux pour la science d'éviter de rappeler un nom qui déjà a été employé, quoique pour un genre reconnu faux. Bien des gens ne seront pas de cet avis, & l'on peut aisément en soupçonner la raison.

E S P A C E S.

1. TODDALI asiatique. *Toddalia asiatica*. Lam.

Toddalia caule, ramis folisque aculeatis ; foliis ovato-lanceolatis, subserratis. Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 116. n°. 2737.

Scopolia (aculeata), caule aculeato ; foliis ovatis, acuminatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1115. n°. 1. — Smith, Icon ined. vol. 1. p. 34.

Paullinia (asiatica), foliis ternatis, petiolis cauleque aculeatis. Jacq. Observ. vol. 3. pag. 11. tab. 62. fig. 1.

Paullinia (asiatica), foliis ternatis, caule aculeato, cirrhis nullis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 524. — Flor. zeylan. 143.

Cranzia. Schreb. Gener. Plant. n°. 362.

Frutex baccifer, indicus, spinosus, trifolius, floribus spicatis. Pluken. Almag. pag. 202. tab. 95. fig. 5.

Kaka-toddali. Rheed. Malab. vol 5. pag. 81. tab. 41.

2. *Toddalia (nitida), subaculeata, foliolis ovatis, venosis, nitidis, subserratis inermibus*. Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 116. n°. 2738. tab. 139. fig. 1.

Chamelaa trifoliata, aculeata, floribus spicatis. Burm. Zeylan. pag. 58. tab. 24.

Arbrisseau dont les tiges grêles & les rameaux sont armés de piquans courts, en crochets, assez nombreux, larges & blanchâtres à leur base, noircissant à leur sommet ; souvent ces piquans se trouvent également fur la nervure moyenne des folioles ; les rameaux sont alternes, élancés, irréguliers, garnis de feuilles ptiolées, alternes, ternées ; les folioles ovales-lancéolées, sessiles, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles & presque cendrées en dessous, obtuses à leur sommet, rétrécies en pointe à leur base, entières ou légèrement denticulées à leurs bords, marquées de nervures latérales, un peu ram. usés.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, ordinairement plus courtes que les feuilles, quelquefois plus longues, médiocrement ramifiées ; les ramifications grêles, nues ; les pédicelles courts, inégaux, capillaires ; le calice glabre, fort petit ; les pétales ovales, obtus. Le fruit est une petite baie sèche, de la grosseur d'un pois, de couleur jaunâtre, parsemée de petites taches noires, à cinq, plus ordinairement à trois ou quatre loges ; autant de semences que de loges ; elles sont ovales, lisses, de couleur grise ou cendrée.

La plante se ne m'a paru être qu'une variété de la précédente, bien moins épineuse ; les piquans plus courts, quelquefois presque nuls ; les feuilles entières, un peu repliées à leurs bords, dépourvues de piquans ; les grappes de fleurs plus longues que les feuilles.

Cet arbrisse croît dans les Indes orientales & à l'île de Ceylan. (V. f.)

2. TODDALI paniculé. *Toddalia paniculata*. Lam.

Toddalia inermis, foliolis ovatis, glaberrimis; panicula terminali; floribus quadrifidis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 117. n°. 2761. tab. 139. fig. 2.

Scopolia (inermis), caule inermi; foliolis obovatis, ovatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1116. n°. 2.

Cet arbrisseau a presque le port d'un sumac : ses tiges se divisent en rameaux alternes, dépourvus de piquans, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles filiformes, ovales, très-entières à leurs bords, parfaitement glabres, parsemées de points transparents, obtuses & arrondies à leur sommet, rétrécies en pointe à leur base; les pétioles à margines. Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en une panicule droite, médiocre, plus longue que les feuilles; les ramifications glabres, courtes, inégales; les fruits sont de petites baies sèches, globuleuses, à quatre côtes arrondies, à quatre loges & autant de valves, renfermant chacune une semence.

Cette plante croît à l'île-de-France, où elle a été recueillie par Joseph Martin. (V. f. in herb. Lam.)

3. TODDALI à feuilles lancéolées. *Toddalia lanceolata*. Lam.

Toddalia inermis, foliolis lanceolatis, acuminatis, nitidulis; racemulis subterminalibus; floribus quadrifidis. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 117. n°. 2760.

Cette espèce a de grands rapports avec la précédente; elle doit cependant être distinguée par ses feuilles lancéolées, un peu luisantes, acuminées à leur sommet & non pas obtuses. Les fleurs sont disposées en petites grappes, les unes latérales, d'autres terminales, formant par leur ensemble une panicule courte & terminale; les baies sèches, petites, arrondies, glabres, à quatre lobes, autant de loges & de semences.

Cette espèce a été recueillie à l'île-de-France par Commerson. (V. f. in herb. Juss.)

4. TODDALI à feuilles étroites. *Toddalia angustifolia*. Lam.

Toddalia inermis, foliolis angustis lanceolatis, venosis, superius nitidis; ramulis pubescentibus. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 117. n°. 2759.

Cet arbrisseau a des tiges droites, cylindriques, chargées de rameaux alternes, un peu grêles; les plus jeunes pubescens, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées; les folioles étroites, lancéolées, luisantes à leur face supérieure, veinées particulièrement en dessous, entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont frisées dans l'aisselle des feuilles, disposées en petites grappes courtes, bien moins longues que les feuilles, médiocrement ramifiées; les pélicelles courts, inégaux, supportant une petite fleur à cinq pétales ovales, obtus, auxquels succède une baie globuleuse, arrondie, fort petite, à quatre ou cinq loges.

Cet arbrisseau a été observé dans les Indes orientales par M. Sonnerat. (V. f. in herb. Lam.)

TOLPIS. *Tolpis*. Ce genre a été établi pour séparer des *crepis* une espèce qui n'en avait point les caractères. M. Adanson lui a donné le premier le nom de *tolpis*, dans ses *Familles naturelles*. M. de Jussieu, qui a également senti la nécessité de cette réforme, a nommé ce nouveau genre *drepania*, mot grec (*drepané*) qui signifie une faulx, & qui exprime un des caractères des écailles calicinales, celui d'être courbées en faulx. Gærtner a rappelé le nom de *tolpis*, conservé par M. de Lamarck dans les *Illustrations des Genres*, & par M. Desfontaines dans la *Flore du Mont Atlas*; enfin par Willdenow.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice composé de plusieurs rangs d'écailles scarieuses, sétacées, épaisses; les extérieures plus longues, & courbées en faulx à l'époque de la maturité; une corolle qui ne contient que des demi-fleurs tous hermaphrodites; les semences légèrement ciliées à leur sommet; celles du centre couronnées par une aigrette à deux ou quatre arêtes; celles de la circonférence dentées, irrégulières; le réceptacle alvéolé.

Ce genre est borné jusqu'à présent à une seule espèce, qui est le *crepis barbata* Linn. Comme elle a déjà été décrite à l'article *CRÉPIDÉ*, je me restreindrai à quelques détails courts & à quelques nouveaux synonymes.

E S P È C E.

TOLPIS barbue. *Tolpis barbata*.

Tolpis involucris calice longioribus; squamis setaceis, sparsis. Linn. Spec. Plant. 1131. *Sub crepide barbata*. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 227. — Lam. Dict. vol. 2. pag. 178.

Tolpis barbata. Gærtner. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 372. tab. 160. fig. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 232. — Lam. Illustr. Gener. tab. 651. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1608.

Drepania. Juss. Genet. Plant. pag. 169.

Tolpis. Adans. Famille des Plant. vol. 2. pag. 169.

Hieracium calicibus setis longissimis, dispersis, patentibus obvallatis. Sauvag. Monsp. 83. — Hott. Cliff. 387.

Drepania barbata. Desfont. Catal. Hort. Parif. pag. 88.

§. *Drepania pallida*. Desfont. l. c.

C'est une plante d'un aspect assez agréable, & qui peut, nourrie par la culture, être admise au nombre des fleurs de nos parterres. Ses fleurs sont d'un jaune de soufre, d'un pourpre-noir dans leur centre; elles sont beaucoup plus pâles dans la variété §. Les longs filets épars, setacés, qui forment une sorte de calice extérieur, rendent presque ces fleurs barbues. Leur réceptacle est plane, alvéolé; les alvéoles légèrement demiculés à leurs bords; les semences couronnées par des cils très-courts, & par deux ou quatre arêtes ou filamens roides, subulés, alongés.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, en Italie, en Espagne; je l'ai également observée sur les côtes de la Barbarie. (V. v.)

TOLUT. *Toluifera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, irrégulières, de la famille des térébinthacées, qui a des rapports avec les *buisers* (gomart), & qui comprend des arbres résineux, exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées avec une impaire ou simples; les fleurs disposées en grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice campanulé, à cinq dents; cinq pétales, dont quatre linéaires, le cinquième plus grand, en cœur; dix étamines; un stigmate sessile.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, à cinq dents presque égales.

2°. Une corolle irrégulière, composée de cinq pétales, insérés sur le réceptacle, dont quatre linéaires, égaux, un peu plus longs que le calice; le cinquième une fois plus grand, en forme de cœur, muni d'un onglet de la longueur du calice.

3°. Dix étamines dont les filamens, insérés sur le réceptacle, sont très-courts, & supportent des anthères plus longues que le calice.

4°. Un ovaire oblong, privé de style, surmonté d'un stigmate aigu.

Les fruits ne sont pas encore bien connus : se lon Miller ils consistent en une capsule? de la grosseur d'un pois, à quatre loges; une semence dans chaque loge.

Observations. Ce genre, encore médiocrement observé, a de très-grands rapports avec les *buisers*.

Les parties de la fructification exigeroient d'être beaucoup mieux connues, principalement les fruits & les semences.

ESPÈCES.

1. **TOLUT balsamifère.** *Toluifera balsamum*. L.

Toluifera foliis impari-pinnatis; floribus racemosis, axillaribus. (N.)

Toluifera balsamum. Linn. Spec. Plant. & Mater. medic. 114. — Miller, Dict. n°. 1. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 545.

Balsamum toltanum, foliis ceratix similibus. C. Bauh. Pin. 401.

Balsamum provincia Tola, balsamifera quarta. Hernandez. Mex. 53.

Balsamum toltanum, ex arboribus pumilibus, pinis similibus. Dalech. Hist. 2. App. pag. 17.

Balsamum de Tolu. J. Bauh. Hist. 1. pars 1. pag. 296.

Valgairement baumier de Toiu, baume de l'Amérique, baume de Carthagène, baume dur, baume sec.

C'est un arbre dont le tronc s'élève à une hauteur considérable, qui est revêtu d'une écorce rude, fort épaisse, de couleur brune; qui se divise en branches fortes, nombreuses, très-étalées, ramifiées. Les rameaux garnis de feuilles pétioles, alternes, ailées, avec une impaire, composées de folioles alternes, ovales-oblongues, sessiles, d'un vert-clair, lisses à leurs deux faces, très-entières, arrondies à leur base, obtuses & mucronées à leur sommet; la foliole terminale un peu plus grande, longue de quatre pouces sur deux de large.

Les fleurs sont réunies en petites grappes, situées dans les aisselles des feuilles, supportées chacune par un pédoncule partiel, grêle, simple, filiforme, long d'environ un ponce. Les calices sont glabres, campanulés, divisés à leurs bords en cinq dents obtuses, presque égales; la corolle jaune, composée de cinq pétales, dont quatre; les courts, étroits, linéaires, à peine plus longs que le calice; le cinquième à un onglet de la longueur des pétales, & se termine par une lame de forme ovale, en cœur; dix étamines courtes; les anthères d'un jaune de soufre, droites, oblongues; l'ovaire oblong, un peu arrondi; il se convertit, dit Miller, en un fruit rond, de la grosseur d'un gros pois, & se divise en quatre loges, renfermant chacune une semence ovale, oblongue.

Cet arbre croît en Amérique, dans les environs de Carthagène, dans une contrée que les Indiens appellent *Tolu*, & les Espagnols *Honduras*. h

Il découle de l'écorce de cet arbre, par inci-

tion, un baume connu sous le nom de *baume de Tolu*; c'est un suc résineux, renace, d'une consistance qui tient le milieu entre le baume liquide & le fec, tirant sur la couleur d'or, d'une odeur qui approche de celle du *benjoin*, d'une faveur douce & agréable; ce qui le fait diffuser efficacement des autres baumes, qui ont une faveur âcre & amère. La faveur agréable de celui-ci le rend plus propre à être pris intérieurement, ayant surtout l'avantage de ne point exciter de nausées comme les autres baumes. Lorsqu'il est bien fec, il est fragile & cassant. Les Indiens le recueillent dans des coques ou cuillères faites de cire noire, & le versent dans des calebassés. On en fait usage intérieurement dans la phthisie & les ulcères internes: c'est un excellent vulnéraire; il consolide & guérit en très-peu de tems les plaies récentes. On lui reconnoît en général les mêmes propriétés que celles du baume de *Judée*.

2. *TOLUT de la Cochinchine. Toluifera cochinchinensis. Lour.*

Toluifera foliis ovatis, integerrimis; pedunculis polyfloris, lateralibus & terminalibus. Lour. Flor. cochinch. pag. 321.

Il est évident que cette plante est très-distincte de la précédente, par ses feuilles simples: il y auroit à douter si elle n'appartiennoit pas plutôt aux *bursera* par ses baies monospermes.

C'est un arbrisseau dont les tiges droites, dépourvues d'épines, très-rameuses, s'élèvent à la hauteur d'environ cinq pieds, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétioles, ovales, longues de trois pouces, d'une odeur de citron, luisantes, d'un vert-foncé, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, obtuses, quelquefois un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en petites grappes axillaires & terminales. Leur calice est court, campanulé, muni de cinq dents à son orifice; la corolle blanche, composée de cinq pétales oblongs, convins, presque égaux; l'intérieur plus grand, mais point en cœur. Le fruit est une baie arrondie, d'un blanc-rougeâtre, petite, glabre, succulente, presque diaphane, remplie d'une pulpe résineuse, d'une faveur & d'une odeur agréable, à une seule semence arrondie, quelquefois deux, mais alors hémisphériques, dans une seule loge. Il y a dix étamines courtes; un stigmate sessile, lenticulaire, persistant.

Cette plante croît en plaine, dans les lieux incultes, à la Cochinchine. (J. *Descript. ex Lour.*)

Toute cette plante est aromatique, d'une odeur agréable; elle est stomachique, échauffante, résolutive: les indigènes font usage de la racine & des baies, mais non de la résine, qu'ils négligent de recueillir.

TOMÉ. *Tomex.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dont la famille naturelle & les rapports ne sont pas encore bien déterminés, qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les rameaux sont pubescens ou tomenteux; les feuilles simples, alternes, très-entières; les fleurs axillaires, latérales, réunies en paquets.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un involucre à quatre ou six folioles; point de corolle; un calice à cinq folioles; douze étamines inégales; cinq écailles entre les étamines inférieures; une baie monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont munies d'un involucre persistant, composé de quatre à six folioles qui entourent plusieurs fleurs réunies.

Chacune d'elles offre :

1°. Un calice divisé en cinq découpures très-profondes, d'après Jussieu, & qui forment la corolle, selon Thunberg & autres.

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne le calice pour elle.

3°. Douze étamines inégales, dont cinq extérieures, sept intérieures; cinq écailles situées entre les filaments des étamines extérieures; les antères oblongues, à plusieurs loges.

4°. Un ovaire supérieur, ovale-oblong, à trois côtes; un style cylindrique, plus ou moins long, quelquefois nul; un stigmate simple.

E S P È C E S.

1. *TOMÉ du Japon. Tomex japonica. Thunb.*

Tomex flosculis corollaris, foliis subtus tomentosis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 838. n°. 1.

Tomex japonica. Thunb. Flor. japon. pag. 190. & Nov. Gen. pag. 65.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, cylindriques, hautes de huit à dix pieds, rameuses; les rameaux tomenteux; leurs divisions ou les plus jeunes anguleux, garnis de feuilles alternes, pétioles, oblongues-lancéolées, droites, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, vertes & glabres à leur face supérieure, tomenteuses & blanchâtres en dessous, marquées de nervures parallèles; longues d'environ trois pouces, soutenues par des pétioles tomenteux, striés, anguleux, longs d'un pouce.

Les fleurs sont latérales, situées dans l'aisselle des feuilles, réunies en petites têtes (diosques, selon Thunb.), soutenues par un pédoncule commun, solitaire, strié, tomenteux, long d'environ trois

trois lignes, muni vers sa base de bractées fort petites, opposées, tomenteuses; un involucre composé de quatre, que souvent cinq folioles, renfermant cinq ou six fleurs pédicellées; les pédicelles très-courts, tomenteux, longs d'une demi-ligne; le calice propre (la corolle, Thunb.) à cinq découpures très-protendues, colorées; douze étamines inégales; cinq petites écailles entre les cinq filaments inférieurs. Le fruit & les fleurs femelles n'ont point été observés.

Cette plante croît au Japon. *Th (Descript. ex Thunb.)*

2. TOMÉ tétranthère. *Tomex tetranthera*. Willd.

Tomex flosculis corollatis, foliis glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 839. n°. 2.

Tetranthera laurifolia. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 1. pag. 59. tab. 113.

Les tiges de cet arbrisseau sont garnies de rameaux glabres, cylindriques, jaunâtres; les jeunes rameaux velus, munis de feuilles pétioles, éternes, oblongues, en ovale renversé, glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, veinées, un peu velues sur leur principale nervure, vuës à la loupe; les pétioles hérissés de poils longs de six lignes.

Les fleurs sont latérales, situées sur la partie nue des plus jeunes rameaux, réunies au nombre de deux à cinq paquets, entourées d'un involucre composé de quatre folioles un peu arrondies, concaves, pubescentes, contenant environ dix-huit fleurs pédicellées; les pédicelles hérissés. Le calice (ou la corolle) est formé de cinq folioles blanches, un peu dentées à leur sommet; autant d'écailles verdâtres, en forme de cloin; plus courtes que les éramines; de douze à dix-sept filaments subulés & pileux, surmontés d'anthers plénes, oblongues, à quatre lobes séparés; un ovaire oblong, un style très-court, un stigmate simple. Le fruit est une baie rouge, globuleuse, de la grosseur d'un grain de groseille, ne renfermant qu'une semence.

Cette plante croît à la Chine. *Th*

3. TOMÉ sebifère. *Tomex sebifera*. Willd.

Tomex flosculis apetalis, foliis glabris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 840. n°. 3.

Sebifera glutinosa. Lour. Flor. Cochinch. p. 783.

Berrya chinensis. Klein. in Lett.

Laurus (involucrata), foliis obovatis, umbellis involucreatis. Retz. Observ. 6. pag. 27.

Tallow-Tree. Angl.

C'est un arbre très-élevé, dont les rameaux sont cylindriques, un peu noueux, revêtus d'une Botanique. Tome VII.

écorce luisante & jaunâtre; les jeunes rameaux couverts d'un léger duvet, garnis de feuilles opposées, pétioles, en ovale renversé, ou ovales-oblongues, très-entières à leurs bords, obruës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, veinées, soutenus par des pétioles pubescens, longs d'un pouce.

Les fleurs sont latérales, disposées dans l'aisselle des feuilles, réunies en fascicules à l'extrémité d'un pédoncule commun, quadrangulaire, pubescent; l'involucre composé de quatre folioles ovales, concaves, tomenteuses en dehors, renfermant huit à dix fleurs pédicellées; point de corolle; point de calice, excepté le rebord très-entier du pédicelle; douze à quinze étamines; les filaments appliqués fortement contre l'ovaire, filiformes & pileux; les anthers ovales-oblongues, filiformes; des corpuscules à la base des filaments; l'ovaire ovale, surmonté d'un style filiforme, une fois plus long que les éramines, terminé par un stigmate épais, concave, réfléchi à ses bords. Le fruit est une baie globuleuse, monosperme.

Cet arbre se trouve en Chine & dans les forêts de la Cochinchine. *Th (Descript. ex Willd. & Klein.)*

TONDI. *Tondi-Teregam*. *Tondi-Caravatti*. Rheed. Hort. Malab. vol. 4. pag. 123. tab. 60.

Grand arbre du Malabar, qui s'élève à la hauteur de plus de soixante pieds, sur un tronc fort épais, chargé de branches & de rameaux alongés, redressés, très-rudes, d'un vert foncé, lanugineux; le bois blanchâtre; la moëlle tendre & langueuse. Les feuilles sont simples, opposées, pétioles, très-grandes, ovales, oblongues, acuminées à leur sommet, molles, épaisses, finement dentées en scie à leur contour, vertes, glabres & luisantes en dessus, plus pâles & lanugineuses à leur face inférieure; elles exhalent une odeur suave; leur saveur est aromatique.

Les fleurs sont latérales, situées dans l'aisselle des feuilles, en petites panicules courtes, opposées, érales; les ramifications divariquées, presque dichotomes, courtes, terminées par des fleurs solitaires, fort petites, de couleur purpurine, d'une odeur suave lorsqu'on les broie entre les doigts; leur calice, court, verdâtre & lanugineux, se divise en quatre découpures, qui renferment autant d'étamines; un style rougeâtre. Les fruits ne sont pas connus.

Cet arbre croît au Malabar, dans les sols sablonneux; il reste vert toute l'année, & fleurit dans le courant du mois de juillet. Ses fleurs durent long-temps.

TONINE. *Tonina*. Genre de plantes monocotyledones, dont la famille naturelle n'est pas en-

T t t

core bien déterminés, qui paroît se rapprocher de celle des graminées, qui comprend des herbes fort petites, moniques, qui naissent dans le fond des eaux, dont les feuilles sont alternes, graminiformes, amplexicaules; les fleurs fasciculées, axillaires, réunies en tête à l'extrémité d'un pédoncule commun.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs moniques; dans les fleurs mâles, un calice à trois lobes; point de corolle; une vesicule centrale, tronquée, supportant à son sommet six étamines. Dans les fleurs femelles, un ovaire à trois frises; trois stigmates; une semence enveloppée de trois valves capsulaires (ou calcinales).

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont moniques, réunies en tête par fascicules à l'extrémité d'un pédoncule solitaire, axillaire; chaque fascicule contient deux fleurs pédicellées; l'une mâle, munie d'une bractée; l'autre femelle, garnie de trois longues bractées. Chaque pédicelle supporte en outre une bractée étalée, plus longue aux fleurs mâles.

* Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice divisé profondément en trois lobes concaves, arrondis & courbés en voûte à leur sommet.

2°. Point de corolle.

3°. Six *étamines*, dont les filamens, très-fins, sétacés, sont situés à l'extrémité & sur les bords d'une vesicule centrale, oblongue, tronquée à son sommet, marquée de six nervures, qui paroissent se prolonger en filamens; les anthères petites, globuleuses.

4°. Un style très-fin, stérile, sortant du milieu du sommet de la vesicule.

* Les fleurs femelles offrent :

1°. Point de calice, à moins qu'on ne considère comme tel les trois valves capsulaires qui enveloppent la semence.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire supérieur, ovale, marqué de trois frises saillantes, surmonté d'un style cylindrique, terminé par trois stigmates aigus, un peu divergens.

Le fruit consiste en une seule semence ovale, obtuse à ses deux extrémités, striée, enveloppée de trois valves capsulaires, qui font peut être trois folioles calcinales fortement appliquées contre l'ovaire & les semences.

Observations. Ce genre, d'après les observations de M. de Jussieu, paroît avoir beaucoup d'affinité

avec la famille des graminées, quoique les feuilles ne soient point vaginales, mais amplexicaules; il est par conséquent à présumer que les semences sont unilobées. Quoiqu'Aublet lui donne des fruits capsulaires, à trois valves, l'analogie des fleurs femelles avec les fleurs mâles paroît indiquer que ces dernières ayant un calice à trois divisions profondes, les trois valves de la capsule pourroient bien être le calice persistant des fleurs femelles, appliqué fortement contre les semences, comme il arrive dans un grand nombre de graminées. Ce genre mérite un nouvel examen sur les plantes vivantes.

ESPÈCE.

TONINE fluviale. Tonina fluvialis. Aubl.

Tonina foliis alternis, amplexicaulis, lineari-lanceolatis, acutis; floribus fasciculato-capitatis, pedunculatis, axillaribus. (N.)

Tonina fluvialis. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 570. — Aubl. Guian. vol. 2. pag. 856. tab. 330. — Lam. Illustr. Gener. tab. 772.

Tonina. Juss. Gener. Plant. pag. 443.

Hyphydra amplexicaulis. Vahl, Symb. 3. pag. 99. — Wild. Spec. Plant. vol. 4. pag. 619.

Eriocaulon (amplexicaule), caule repente, angulato; foliis confertis, canaliculatis, semi-amplexicaulis; floribus capitatis, difformibus. Rottb. Diff. Plant. rar. Surinam. 4. tab. 1. fig. 1.

Petite plante, qui croît sous les eaux, dont la tige, couchée à sa partie inférieure, produit pour racine un grand nombre de petits filamens capillaires, presque simples, terminés par une très-petite bulbe ovale. Ces tiges sont presque cylindriques, grêles, rendres, un peu velues, garnies dans toute leur longueur de feuilles nombreuses, rapprochées, un peu courtes, graminiformes, alternes, amplexicaules, étroites, linéaires, très-aiguës, presque glabres, un peu striées longitudinalement, munies vers leurs bords de cis très-fins, à peine sensibles, excepté à la loupe.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, réunies, à l'extrémité d'un pédoncule commun, en un fascicule capité; chaque fleur pédicellée; le pédoncule capillaire, simple, glabre, plus court que les feuilles; les pédicelles très-courts, munis vers leur milieu d'une petite bractée membraneuse, ovale, lancéolée, ciliée; celle des fleurs mâles plus longue. Outre ces bractées, les fleurs mâles en offrent une autre étroite, aiguë; les fleurs femelles en contiennent trois plus allongées.

Cette plante croît à la Guiane, dans le fond des eaux fluviales. (*Descript. ex Aubl.*)

TONTANE. Tontanea. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, infundibuliformes, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *naubias*, qui comprennent des herbes rampantes, radicantes, exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, et les fleurs en cimes axillaires, pédonculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre découpures ; une corolle en entonnoir ; quatre étamines ; un style bifide ; une baie couronnée, à deux loges, se partageant en deux ; des semences nombreuses.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice tubulé, connivent avec l'ovaire par la partie entière ; le limbe découpe en quatre parties aigues.

2°. Une corolle monopétale, en forme d'entonnoir ; le tube cylindrique, plus long que le calice ; le limbe divisé en quatre lobes aigus.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont insérés à l'orifice de la corolle, presque aussi longues que le limbe, terminés par des anthères arrondies & saillantes.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un style filiforme, bifide à la partie supérieure, terminé par des stigmates obtus.

Le fruit est une baie ovale, couronnée par les divisions persistantes du calice, partagée en deux loges, qui se séparent à l'époque de la maturité.

Les semences nombreuses, arrondies, convexes, bordées, attachées à la cloison.

ESPÈCE.

TONTANE de la Guiane. *Tontanea guianensis*. Aublet.

Tontanea foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, integris ; floribus cymosis, axillaribus. (N.)

Tontanea guianensis. Anbl. Guian. vol. 1. pag. 108. tab. 42. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 280. n°. 1460. tab. 64.

Billardia repens. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 616.

Anacardium ? Brown, Jam. pag. 144.

Plante herbacée, dont les racines sont fibreuses ; les tiges rampantes, médiocrement rameuses, cylindriques ; les rameaux velus, ascendants, garnis de feuilles opposées, pétioles, très-entières, pubescentes, ovales, un peu lancéolées, aiguës à leur sommet, arrondies à leur base ; les pétioles de deux tiers plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, disposées presque en une cime lâche, peu garnie, à l'extrémité d'un pédoncule commun, plus court que les feuilles, pubescent ; les pédoncules partiels simples, inégaux, munis à leur base de petites bractées très-courtes, pubescentes. Le calice est droit, turbiné, divisé à ses bords en cinq dents droites, ovales-oblongues, aiguës ; la corolle en forme d'entonnoir ; son tube presque une fois plus long que le calice, cylindrique, un peu tendu ; la sa moitié supérieure ; le limbe entièrement divisé en quatre découpures ouvertes, ovales-lancéolées, aiguës ; les filaments insérés presque à l'orifice de la corolle ; les étamines saillantes. Le style, beaucoup plus long que les filaments, filiforme, se divise à son sommet en deux parties divergentes ; les stigmates aigus. Le fruit est une baie ovale, enveloppée par le calice adhérent & persistant, dont les divisions forment une couronne au sommet ; divisée en deux loges qui se séparent. La cloison supporte des semences nombreuses, convexes, arrondies, entourées d'un bouret.

Cette plante croît à Cayenne, & dans les forêts de la Guiane. x

TONTEL. *Tontela*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, à cinq pétales réguliers, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, qui a, par son port & par ses fleurs, de nombreux rapports avec les *hypocrates*, mais dont il diffère essentiellement par les fruits. Il comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à tige sarmenteuse, dont les rameaux & les feuilles sont opposés, les fleurs disposées en panicules axillaires & terminales, opposées, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; cinq pétales ; un godet qui supporte trois étamines, environnant l'ovaire ; un style ; une baie à quatre semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, urcéolé, persistant, à cinq découpures ovales, aiguës.

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, arrondis, persistants, un peu plus longs que le calice, insérés sur un urcéole flaminifère.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont insérés aux parois internes de l'urcéole, ouverts après la floraison ; les anthères arrondies.

Un urcéole très-entier, flaminifère, environnant l'ovaire.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, environné

Ttt 2

par l'urcéole, surmonté d'un style court, terminé par un stigmate simple & obtus.

Le fruit est une baie sphérique, à une seule loge, environnée par le calice & la corolle persistans, renfermant quatre semences fort petites.

E S P È C E S.

1. TONTEL grimpat. *Tontelea scandens*. Aubl.

Tontelea foliis subsessilibus, oppositis, integerrimis, acuminatis. (N.)

Tontelea scandens. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 31. tab. 10. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 58. n°. 421. tab. 16.

Tontella (scandens), foliis integerrimis, acuminatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 194. n°. 1.

Tontella scandens. Vahl, Symb. 2. pag. 17.

Arbusteau dont les tiges sont longues, grimpantes, cylindriques, plantées, divisées en branches opposées & en rameaux également opposés, alongés, effilés, glabres, cylindriques, munis de feuilles opposées, presque sessiles, oblongues-lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, rétrécies presque en un pétiole très-court à leur base, longues de trois pouces & plus, larges d'un pouce, marquées de nervures latérales, alternes, presque simples, & de veinules très-fines, ramifiées.

Les fleurs sont latérales & terminales, situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en petites panicules opposées, médiocrement ramifiées, chaque division munie d'une petite bractée étroite, courte, subulée. Le calice est glabre, petit, entier; son orifice divisé en cinq découpures ovales, aiguës; la corolle à peine plus longue que le calice, à cinq pétales ovales, obtus, insérés sur un tube urcéolé qui supporte également trois étamines plus courtes que la corolle. Le fruit est une baie sphérique, un peu ovale, enveloppée par le calice & la corolle, renfermant quatre semences dans une seule loge qui ne s'ouvre pas.

Cette plante croît dans la Guinée & à l'île de la Trinité. h

2. TONTEL d'Afrique. *Tontelea africana*.

Tontelea foliis oppositis, obtusis, glanduloso-dentatis; antheris sessilibus. (N.)

Tontella (africana), foliis obtusis, glanduloso-dentatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 194. n°. 2.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; elle n'en diffère, d'après Willdenow, que par les feuilles beaucoup plus petites, obtuses à leur sommet, très-légèrement glanduleuses

& denticulées à leur contour. La corolle est plus grande que celle du *tontelea scandens*, & les anthers sessiles. Le fruit n'a pas été observé.

Cette plante croît en Guinée. h

TOPOBÉE. *Topobea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, presque irrégulières, de la famille des mélastomes, qui a des rapports avec les *melastoma*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, parasites, dont les tiges sont farmenteuses, tétragones; les pédoncules agrégés, axillaires; les feuilles opposées, pétiolées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice double; l'extérieur à quatre folioles en croix; l'intérieur campanulé, à six dents fort petites; six pétales inégaux; douze étamines; les filaments rapprochés en cylindre; un style; un stigmate capité, à six côtes; une baie enveloppée à sa base par le calice, à six loges polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double; l'extérieur d'une seule pièce, à quatre divisions profondes, arrondies, un peu acuminées; l'intérieur campanulé, évasé, à six petites dents très-courtes, aiguës.

2°. Une corolle composée de six pétales inégaux, ovales, un peu arrondis, insérés sur l'orifice du calice intérieur.

3°. Douze étamines, dont les filaments sont planes, recourbés, rapprochés en tube, insérés sur un disque qui couronne l'ovaire; les anthers oblongues, aiguës, d'abord courbées, puis redressées & à deux lobes.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style long, charnu, rougeâtre, incliné vers le pétale intérieur, terminé par un stigmate capité, marqué de six sillons.

Le fruit est une baie rouge, spongieuse, à six loges, environnée par la base charnue du calice; la partie supérieure caduque.

Les semences sont nombreuses, fort petites, placées dans une pulpe molle.

E S P È C E S.

1. TOPOBÉE parasite. *Topobea parasitica*.

Topobea foliis ovatis, subcordatis, quinque-nerviis; pedunculis axillaribus, aggregatis; caule farmentoso. (N.)

Topobea parasitica. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 476. tab. 189. — Juss. Gen. Plant. pag. 329.

C'est une plante parasite, qui croît ordinairement sur le tronc des plus grands arbres. Ses tiges se divisent en longs rameaux sarmenteux, inclinés vers la terre, de la grosseur du doigt, quadrangulaires, ligneux, garnis à leur partie supérieure de feuilles pétiolées, opposées, ovales, entières, quelquefois un peu échanquées en cœur à leur base, longues d'environ six pouces, sur trois pouces & demi de longueur, vertes en dessus, un peu rougeâtres en dessous, marquées de cinq nervures sailantes, longitudinales, couvertes de poils roussâtres; les pétiolés longs de deux pouces, canaliculés, rougeâtres, charnus, garnis de quelques poils à leur base.

Les fleurs sont pédonculées, réunies plusieurs ensemble dans les aisselles des feuilles; les pédoncules simples, plus courts que les pétiolés; le calice interne est campanulé, rouge & membraneux à sa partie supérieure, à six faces à sa partie inférieure, terminé par six petites dents aiguës, recouvert extérieurement par quatre folioles opposées, en forme d'écailles; la corolle couleur de rose, à six pétales arrondis, inégaux, ongiculés, insérés sur la partie moyenne & interne du calice; douze étamines attachées au dessous des pétales sur un disque qui couronne l'ovaire; les filaments courbés en arc, larges, aplatis, connexes; les anthères courbées en faucille, inclinées sur leur filament jusqu'à leur attache, formant par leur réunion une couronne centrale, s'ouvrant antérieurement en deux valves dans toute leur longueur; le style est long, rouge, charnu; il surmonte les étamines & se courbe sur le pétales inférieurs, plus petit que les autres; le stigmate est rouge, un peu renflé, à six côtes. Le fruit consiste en une baie rouge, un peu succulente, spongieuse, de la grosseur d'une noisette, divisée intérieurement en six loges, remplies de semences fort petites.

Cette plante croît à Cayenne, sur les bords de la rivière de Sinémari, & dans les environs de la Crique des Galibis. (Descript. ex Aubl.)

Les Galibis mangent les fruits de cette plante, & l'emploient quelquefois pour donner une couleur rouge à leurs petits meubles.

TOQUE. *Scutellaria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, labiées, de la famille des labiées, qui a des rapports avec les brimelles, & qui comprend des herbes, dont quelques-unes à tige presque ligneuse, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont nues, solitaires, axillaires, quelquefois en épis terminaux ou latéraux, & munis de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice très-court, à deux lèvres entières; la su-

périeure munie d'une écaille sailante & concave; une corolle labiée, courbée à sa base, comprimée à son sommet; la lèvre supérieure en voûte, deux dents à sa base; l'inférieure plane large, échanquée; quatre étamines didynames; stigmate mâle à peine bifide; quatre semences renfermées dans le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice très-court, d'une seule pièce, persistant, divisé à son limbe en deux lèvres entières, la supérieure portant une écaille concave & sailante, en forme d'opercule.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, beaucoup plus longue que le calice; le tube courbé à sa base, renflé & comprimé dans les trois quarts de sa longueur; le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure concave, creusée en voûte, presque entière, munie de deux dents à son origine; l'inférieure plus large, échanquée à son sommet.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont didynames, places sous la lèvre supérieure de la corolle, dont deux plus longs; les anthères petites.

4°. Un ovaire à quatre lobes, du centre desquels s'élève un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate recourbé, presque simple.

Quatre semences nues, arrondies, situées dans le fond du calice persistant, & dont l'orifice est fermé par une écaille en forme d'opercule insérée sur la lèvre supérieure.

Observations. Les toques, rapprochées des brimelles, s'en distinguent, ainsi que de tous les autres genres de la famille des labiées, par un caractère qui leur est particulier; il consiste principalement dans leur calice à deux lèvres entières, la lèvre supérieure portant une écaille sailante & concave qui, après la floraison, & à l'époque de la maturité des semences, devient une forte d'opercule qui recouvre l'orifice du calice persistant.

ESPÈCES.

1. TOQUE du Levant. *Scutellaria orientalis*.

Scutellaria foliis incisifolia, subulis tomentosis; spicis rotundato-tetragonis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 832. — Hort. Upsal. 1753. — Mill. Dict. n°. 4. — Kniph. Cent. 5. n°. 82. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 171. n°. 1.

Scutellaria foliis pinnatifidis. Hort. Cliff. 316. — Roy. Lugd. Bat. 310.

Cassida orientalis, folio chamædrys, flore luteo. Tourn. Coroll. 11. & Itin. vol. 3. pag. 306.

tab. 306. — Commel. Rat. 30. tab. 30. — Mart. Cent. pag. 18. tab. 18.

3. *Cassida orientalis, incana, foliis laciniatis, flore luteo.* Tournef. Coroll. 11.

Il fort des mêmes racines plusieurs tiges étalées, souvent couchées sur la terre, obscurément tétragones, dures, un peu ligneuses, surtout à leur base, revêtues d'un duvet gris-cendré, ai si que les rameaux; ceux-ci sont opposés, grêles, nombreux, quadrangulaires, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, irrégulièrement incisées ou crénelées, longues d'environ un pouce & plus, sur huit à dix lignes de large, vertes & glabres à leur face supérieure, pubescentes & blanches en dessous, obtuses à leur sommet; les pétioles grêles, plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires, opposées, pédonculées, situées le long des rameaux, dans l'aisselle des feuilles florales ou de bractées opposées, assez semblables aux autres feuilles, mais plus petites, très-entières, ovales-elliptiques, pétiolées, diminuant de grandeur à mesure qu'elles approchent du sommet; il résulte, de cette disposition, que les fleurs forment par leur ensemble de longs épis grêles. Leur pédoncule est pubescent, un peu plus court que le pétiole des bractées; le calice légèrement velu; la corolle jaune. Dans la variété β , les feuilles sont presque une fois plus petites, & souvent si profondément incisées, qu'elles paroissent pinnatifides ou laciniées & dentées.

Cette plante croît dans le Levant, l'Arménie, aux environs de Téphlis, dans la Mauritanie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. β (V. v.)

2. TOQUE à grandes fleurs. *Scutellaria grandiflora.* Curtis.

Scutellaria foliis cordatis, incisis, crenatis, utrinque pubescentibus, petiolo brevioribus; spicis brevissimis, tetragonis; corollis hispidis, bracteis quadruplo longioribus. Curtis, Magaf. tab. 633. — Pers. Synops. Plant. vol. 2. pag. 136. n°. 2.

Cette plante, qui se rapproche du *Scutellaria orientalis*, s'en distingue principalement par ses grandes fleurs. Ses tiges sont droites, courtes, quadrangulaires, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, échanquées en cœur à leur base, pubescentes à leurs deux faces, incisées & crénelées, plus courtes que les pétioles. Les fleurs sont disposées en épis terminaux, fort courts, tétragones; la corolle, qui a quelque ressemblance avec celle des *anchurinum*, se divise en deux lèvres; son tube est allongé, rougeâtre, velu en dehors, ainsi que les lèvres; la lèvre in-

férieure jannâtre; les bractées quatre fois plus courtes que la corolle.

Cette plante croît dans la Sibérie.

3. TOQUE à fleurs blanches. *Scutellaria albidia.* Linn.

Scutellaria foliis subcordatis, serratis, rugosis, opacis; spicis secundis, bracteis ovatis. Linn. Mantif. pag. 248. — Sabbat. Hort. Roman. 3. tab. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 171. vol. 2.

Scutellaria teucris facie, flore albo. J. Bauh. Hist. 3. pag. 291. Icon.

Cassida flore enalbido. Tourn. Inst. R. Herb. 181.

Cassida flore ex albo pallente. Colum. pars 1. pag. 190.

Ses tiges sont hautes d'environ un pied & demi, un peu ligneuses, quadrangulaires, velues, munies de rameaux opposés, très-étalés, garnis de feuilles pétiolées, opposées; les inférieures oblongues, un peu arrondies, plus grandes; les supérieures plus petites, presque en cœur, toutes épaisses, ridées, velues, densées en scie à leur contour, presque obtuses à leur sommet; les pétioles velus, plus courts que les feuilles.

Les fleurs forment par leur ensemble de longs épis terminaux à l'extrémité des rameaux; elles sont placées dans l'aisselle des feuilles, opposées, solitaires, pédonculées; ces feuilles sont regardées comme autant de bractées presque sessiles, ovales, entières, aiguës, presque tomenteuses, beaucoup plus petites que les feuilles, vertes ou un peu rougeâtres. Les calices sont courts, lanugineux; la corolle blanche ou quelquefois un peu rougeâtre.

Cette plante croît dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris; elle fleurit dans le courant du mois de mai. β

4. TOQUE arbrisseau. *Scutellaria frutesco.* Desf.

Scutellaria foliis cordatis, rugosis, tomentoso-incanis; caule fruticoso. Pers. Synops. Plant. vol. 2. p. 136. n°. 4. — Desf. Catal. Hort. Pat. f. p. 63.

Ses tiges sont dures, ligneuses, médiocrement velues, rameuses, hautes d'environ un pied, garnies de feuilles opposées, ovales en cœur, ridées, blanchâtres & tomenteuses. Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux & des tiges en un épi droit; les calices courts, partagés en deux lèvres; la corolle d'un blanc-jannâtre. Le tube gèle, très-long.

Cette plante croît dans la Perse. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. β

5. TOQUE des Alpes. *Scutellaria alpina.* Linn.

Scutellaria foliis cordatis, inciso-serratis, crena-

ris; *spici imbricatis*, *rotundato-tetragonis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 834. — Kniph. Centur. 9. n°. 87. — Allion. Flor. pedem. n°. 142. tab. 26. fig. 3. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 572.

Scutellaria (alpha), *foliis cordatis*, *inisofer-ratis*, *crenatis*; *spici imbricatis*, *rotundato-tetragonis*; *bracteis floris duplo brevioribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 171. n°. 3.

Scutellaria foliis ovatis, *spici imbricatis*. Hort. Clifflort. 317. — Hort. Upfal. 173. — Royen, Lugd. Bat. 311.

Cassida procumbens, *foliis ovatis*, *arenatis*; *spiciis raris*, *foliosis*. Haller, Helv. n°. 281.

Teucrium alpinum, *inodorum*, *flore magno*. C. Bauh. Pin. 247, & Prodrom. 116. — Burf. 15. 35.

Cassida alpina, *supina*, *magno flore*. Tournef. Infl. R. Herb. 182.

Cette espèce se distingue à ses fleurs disposées en un épi épais, touffu, & dont les bractées imbriquées sont beaucoup plus courtes que la corolle, qui a la lèvre supérieure violette.

Ses tiges sont longues d'environ un pied, un peu couchées à leur base, quadrangulaires, principalement à leur partie supérieure; un peu velues, divisées en rameaux opposés, égaux, un peu grêles, tétragones, velus, garnis de feuilles petites, opposées, ovales, un peu en cœur; les inférieures plus larges, un peu arrondies; les supérieures plus étroites, plus alongées, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, légèrement velues, crénelées à leur contour, terminées à leur sommet par une pointe énouffée ou obtuse.

Les fleurs sont disposées en un épi terminal à l'extrémité de chaque rameau, garni de bractées imbriquées, ovales, entières, filiformes, un peu aiguës, membraneuses, presque transparentes, pâles, colorées vers leur sommet, beaucoup plus courtes que le tube de la corolle; celle-ci est longue, fail-lante; la lèvre supérieure velue & de couleur bleue; l'inférieure blanche; le tube d'un blanc un peu jaunâtre.

Cette espèce croît sur les rochers arides, parmi les pierres, dans les départements méridionaux de la France, en Suisse, en Savoie, dans les Pyrénées, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Cette plante est d'un saveur amère. On lui attribue les mêmes propriétés qu'à la roque casside, surtout comme fébrifuge, & on la lui substitue dans quelques pays.

6. TOQUE lupuline. *Scutellaria lupulina*. Linn.

Scutellaria foliis cordatis, *inciso serratis*, *acutis*,

glabris; *spici imbricatis*, *rotundato-tetragonis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 834. — Hort. Upfal. 173. — Miller, Dict. n°. 6. — Pallas, Irin. 2. pag. 29. — Willch. in Nov. Act. A. N. C. vol. 4. pag. 117.

Scutellaria foliis cordatis, *iniso-ferratis*, *acutis*, *glabris*; *spici imbricatis*, *rotundato-tetragonis*; *bracteis floris longitudine*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 172. n°. 4.

Cassida alpina, *supina*, *magno flore albo*. Tournef. Infl. R. Herb. 182.

Quoique très-approchée du *scutellaria ovale*, cette espèce s'en distingue par son port, par ses bractées plus alongées, plus aiguës; par ses feuilles plus alongées.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, glabres, un peu tétragones, couchées, munies de rameaux grêles, redressés, pubescens, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, un peu oblongues, vertes & glabres en dessous, plus pâles, légèrement pubescentes en dessus, orbiculées à leur sommet, crénelées à leurs bords; les crénelures obtuses, un peu arrondies; les pétioles grêles, pubescens, de moitié plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en un épi épais, un peu court, cylindrique ou obscurément tétragone, muni de bractées membraneuses, colorées, un peu purpurines, ovales, un peu acuminées, ciliées, imbriquées, la plupart plus longues que le tube de la corolle; celle-ci d'un jaune-pâle, quelquefois blanchâtre; la lèvre supérieure velue en dehors, quelquefois tachetée de pourpre.

Cette plante croît dans la Sibérie, la Tartarie, sur les montagnes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

7. TOQUE à fleurs latérales. *Scutellaria lateriflora*. Linn.

Scutellaria foliis levibus, *carinâ scabris*; *racemis interaxiis*, *foliosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 833. — Lam. Illustr. Gener. tab. 515. fig. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 172. n°. 5.

Scutellaria foliis cordato-lanceolatis, *serratis*; *pedunculis multifloris*. Royen, Lugd. Bat. 311.

Scutellaria foliis ovato-lanceolatis, *psilolatis*; *racemis foliosis*. Gronov. Virgin. 91.

Scutellaria (lateriflora), *ramosissima*, *g'abri-fcula*; *foliis longe psilolatis*, *dentatis*; *aulinis fus-cordatis*, *ramis ovali-lanceolatis*, *floribus minimis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 11.

Scutellaria pal-flris, *repens*, *virginiana*, *major*, *flore minoris*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 416.

Ses tiges sont herbacées, peu élevées, & se

divisent, presque dès leur base, en rameaux nombreux, diffus, opposés, quadrangulaires, presque glabres. Les feuilles sont petiolées, opposées; celles des tiges plus larges, plus longuement pétiolées; celles des rameaux ovales, un peu en cœur, presque lancéolées, nerveuses, presque glabres, dentées à leur contour, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en petites grappes, portées sur de petits rameaux latéraux, médiocrement feuillés; chacune d'elles pédicellée, le pédicelle muni de deux petites bractées serrées, caduques. Leur calice est court, d'un jaune-pâle, à peine pubescent; la corolle petite, d'un bleu-clair ou blanchâtre, un peu veinée; le tube presque une fois plus long que le calice, un peu grêlé, renflé vers son orifice.

Cette plante croît sur les montagnes, dans la Virginie, au Canada. On la cultive au Jardin du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. (V. v.)

8. TOQUE pileux. *Scutellaria pilosa*. Mich.

Scutellaria caulibus foliisque pilosissimis; foliis subrhomboides-ovalibus, crenatis; floribus laxius calicifatis, bracteis parvis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 11.

Scutellaria (caroliniana), foliis cordato-ovatis, obtusis; ferratis; spicis terminatis, subhirsutis. Walther. Flor. carol. pag. 163. ?

Ses tiges sont droites, tétraèbres, très-pileuses, garnies de feuilles opposées, ovales, presque rhomboïdes, crénelées à leur contour, chargées de poils fins, nombreux. Les fleurs disposées à l'extrémité des tiges en épis un peu lâches, munis de fort petites bractées.

Cette espèce croît dans la Caroline & la Géorgie. (Descript. ex Mich.)

9. TOQUE de la Havane. *Scutellaria havanensis*. Linn.

Scutellaria foliis cordato-ovatis, crenatis; floribus solitariis, axillaribus; corolla labio utroque trifido. Linn. Syst. veget. pag. 457. — Jacq. Observ. 2. pag. 5. t. b. 29. — Jacq. Amer. 172. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 174. n°. 10.

Plante herbacée, fort tendre, dont les tiges sont étendues sur la terre, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, en cœur, presque glabres, crénelées à leur contour, longues à peine d'un demi-pouce. Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules opposés, uniflores; le calice divisé en deux lèvres; les découpures arrondies, très-entières, presque égales; la corolle bleuâtre, longue d'environ un pouce, à deux lèvres; la lèvre inférieure plus longue, à demi divisée en trois découpures un peu arrondies; celle

du milieu plus large, échancrée; les latérales très-entières.

Cette plante croît à la Havane, sur les rochers, le long des côtes maritimes. Elle fleurit dans le courant du mois de décembre. (Descript. ex Jacq.)

10. TOQUE caillée. *Scutellaria galeculata*. Linn.

Scutellaria foliis cordato-lanceolatis, crenatis; floribus axillaribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 835. — Flor. Japon. 239. — Flor. fusc. 499; 538. — Hort. Clifford. 216. — Roy. n. Lugd. Bat. 310. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 227. — Crantz, Austr. p. 275. — Pollich, Pal. n°. 176. — G. ler. Flor. dan. tab. 647. — Blackw. tab. 516. — Kniph. Censur. 8. n°. 83. — Silbat. Hort. 3. tab. 30. — Hoffm. Germ. 213. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 258. — vol. II. pag. 36. — Bulliard, Herb. tab. 276. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 172. — Deand. Flor. franc. vol. 3. pag. 572. — Lam. Ill. Genr. tab. 515. fig. 1. — Gerard, Em. 477. fig. 10. — Dalib. Paris. 184.

Coffida galeculata. Scopol. Carn. edit. 2. n°. 741.

Cassida foliis oblongis cordatis, crenatis; verticillis nudis, bifloris. Haller, Helv. 180.

Scutellaria. Rivin. tab. 77.

Scutellaria palustris, repens, caerulea. Morif. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 20. fig. 6.

Lyfimachia caerulea, galeculata, seu gratiola caerulea. C. Bauh. Pin. 246.

Lyfimachia galeculata. Dalchomp, Hist. 2. pag. 1060. Icon. — Lobel. Icon. 344, & Observ. 186. Icon.

Cassida palustris, vulgarior, flore caerulea. Tourn. Inst. R. Herb. 182.

Tertianario, aliis Lyfimachia galeculata. J. Bauh. Hist. 3. pag. 435. Icon.

Tertianaria. Tabern. Hist. 2. 1093.

Judaea herba, altera species. Dodon. Pempt. 93. Icon.

C. Cassida palustris, vulgarior, flore albo. Tourn. Inst. R. Herb. 182.

Vulgairement toque, centaurée bleue, tertianaire.

C'est une plante assez élégante par son port & par ses fleurs d'un bleu-vif. Ses racines produisent plusieurs tiges droites, carrées, hautes d'un à deux pieds, à angles tranchés, très-glabres, vertes ou légèrement purpurines, quelquefois simples, plus ordinairement munies de rameaux assez nombreux, opposés, élaucés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, oblongues-lancéolées, échancrées

échancrées en cœur à leur base, vertes, glabres, très-lisses, longues d'un à deux pouces & plus, sur un demi-pouce au moins de large, presque obtuses, lâchement dentées à leurs bords; les dentelures peu profondes, obtuses, distantes; les pétioles courts.

Les fleurs sont solitaires, opposées, médiocrement pédonculées, situées dans l'aisselle des feuilles & souvent tournées du même côté; les pédoncules très-courts, munis de deux petites bractées scissées, très-caduques; le calice glabre, la corolle bleue ou violette, quelquefois blanche, trois & quatre fois plus longue que le calice, très-glabre.

Cette espèce croît en Europe sur le bord des eaux, dans les marais. (V. v.)

Cette plante a été long temps employée pour guérir la fièvre-tierce, d'où lui venoit son nom de *tertiana*; elle est aujourd'hui très-peu en usage en médecine. Elle passe pour vermifuge, apéritive & stomachique. M. Willemer l'a vue substituer au *scutarium scordium*. Les moutons, les chèvres & les vaches mangent cette plante; mais les chevaux & les cochons la refusent.

11. TOQUE naine. *Scutellaria minor*. Linn.

Scutellaria foliis cordato-ovatis, subintegerrimis; floribus axillaribus. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 835. — Hudf. 265. — Hoffm. Germ. 213. — Roth. Germ. vol. 1, pag. 258. — vol. II, pag. 38. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 173. n°. 8. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 572. — Curtis, Flor. lond. tab. 283.

Scutellaria minor, repens, flore rubente. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 20. fig. 8.

Scutellaria hastifolia. Thor. Chlor. Lond. 260.

Cassida palustris, minima, flore purpurascens. Tourm. Infr. R. Herb. 182. — Rai, Angl. 3. pag. 244.

Cette espèce, très-voisine du *scutellaria galericulata*, s'en distingue par son port, par ses feuilles entières, par toutes ses parties beaucoup plus petites. Ses racines sont fibreuses, capillaires; elles produisent une tige très-grêle, quelquefois simple, bien plus souvent rameuse, à peine velue, quadrangulaire, verte ou un peu purpurine, haute de quatre à six pouces au plus; les rameaux presque niformes, opposés; les feuilles pétioles, opposées, ovales-oblongues, un peu échancrées en cœur à leur base, principalement les inférieures; très-entières, rarement munies de quelques dents, surtout vers leur base; obtuses à leur sommet, presque glabres à leurs deux faces, nerveuses; les supérieures presque sessiles, beaucoup plus étroites, lancéolées.

Botanique. Tome VII.

Les fleurs sont semblables à celles de l'espèce précédente, mais au moins deux fois plus petites, plutôt rougeâtres que bleues, axillaires, opposées, pédicellées; le calice un peu velu dans sa jeunesse, la lèvre inférieure de la corolle d'une couleur pâle, & chargée communément de petits points blancs.

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la précédente, mais elle est moins commune. On la trouve aux environs de Paris, d'Orléans, &c. Je l'ai recueillie aux environs de Fougères en Bretagne. O (V. v.)

12. TOQUE haillée. *Scutellaria hastifolia*. Linn.

Scutellaria foliis integerrimis, inferioribus hastatis, superioribus sagittatis. Linn. Spec. Plant. p. 334. — Iter Gott. 212. — Flor. suec. 500. § 39. — Scholl. Barb. n°. 483. — Scop. Carn. n°. 742. — Hoffm. Germ. 213. — Roth. Germ. vol. 1, pag. 258. — vol. II, p. 37. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 173. n°. 7.

Scutellaria folio non serrato. Riv. Monog. p. 77.

Scutellaria foliis inferioribus, basi dentatis, hastatis; superioribus sagittatis, integerrimis. Crantz, Austr. pag. 276.

Scutellaria (auriculata), foliis lanceolatis, basi auriculatis; floribus minimis. (N.)

Scutellaria racemosa, foliis hastato-lanceolatis, floribus racemosis. Peiff. Synopf. Plant. vol. 2. p. 136. n°. 13.

Cette plante n'est que médiocrement distinguée des deux précédentes, dont elle paroît tenir le milieu. Ses racines sont petites, un peu fibreuses; ses tiges grêles, striées, quadrangulaires, ramuées, velues aux articulations; les rameaux axillaires & opposés; les feuilles médiocrement pétioles, glabres, haillées, élargies à leur base, presque triangulaires, garnies de deux ou trois dents; les supérieures très-entières, sagittées, vertes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, très-veinées.

Les fleurs sont axillaires, opposées, d'un bleu vif; le calice velu; le tube de la corolle blanchâtre à sa base, allongé, velu, droit, anguleux; l'orifice élargi, marqué de deux folioles; la lèvre supérieure à trois découpures; les latérales réfléchies.

Cette plante croît en Suède, en Allemagne, en Autriche, sur le bord des eaux. x

J'ai extrait de Crantz les détails que je viens de présenter sur cette plante que je ne connais pas. Je suis porté à croire qu'elle n'est qu'une variété intermédiaire entre les deux espèces qui précèdent, plus petite que la première, plus grande que la seconde; mais ses principaux caractères sont communs au *scutellaria minor*.

V v v v

La plante est probablement une espèce distincte, voisine de la précédente, dont elle diffère par ses fleurs beaucoup plus petites, foliaires, axillaires; les pédoncules capillaires, presque aussi longs que la corolle; les calices courts, à peine pubescens; les feuilles étroites, glabres, entières, lancéolées, munies à leur base de deux petites oreilles divergentes; les tiges glabres, rameuses, menues, quadrangulaires.

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par Commerson. (*V. f. in herb. Lam.*)

13. TOQUE de la Caroline. *Scutellaria caroliniana*.

Scutellaria foliis lanceolato-linearibus, glaberrimis, integris; floribus spicatis; calicibus obusis, minimis. — Lam. Illustr. Gener. tab. 515. fig. 3.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, rameuses, très-glabres; les rameaux opposés; les feuilles pétiolées, opposées, fort étroites, linéaires-lancéolées, longues d'environ deux pouces sur deux ou trois lignes de large, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures, qui tiennent lieu de bractées, beaucoup plus petites & plus étroites.

Les fleurs sont foliaires dans l'aisselle des feuilles supérieures, opposées, pédunculées, formant par leur ensemble un épi pins ou moins allongé; les pédoncules un peu plus longs que les calices, légèrement pubescens; les calices presque campanulés, très-courts, à cinq petites découpures presque obtuses; la corolle longue d'environ un pouce, glabre, d'un blanc-jaunâtre, tachetée de bleu à son sommet, divisée en deux lèvres presque entières, obuses; le style un peu plus long que la lèvre supérieure.

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été recueillie par Ftaier. (*V. f. in herb. Lam.*)

14. TOQUE petite. *Scutellaria parvula*. Mich.

Scutellaria pusilla, densè pubens, foliis ovalibus, integris, omnibus conformibus; floribus axillaribus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 11.

Cette toque a beaucoup de rapport avec la *Scutellaria minor*; mais elle en diffère par de nombreux caractères, ainsi qu'on en jugera par leur exposition. Ses tiges sont très-peu élevées, velues, quadrangulaires; les feuilles sessiles, opposées, pubescentes, ovales, toutes semblables, entières à leurs bords, quelquefois les inférieures médiocrement dentées à leur base; toutes les fleurs axillaires, opposées, pédicellées.

Cette plante croît dans le pays des Illinois & au Canada. (*Descript. ex Mich.*)

15. TOQUE à feuilles entières. *Scutellaria integrifolia*. Linn.

Scutellaria caulis erectis, simplicifolius; foliis obusis, inferioribus obsolete crenato-dentatis; superioribus oblongis, integris; floribus laxè spicatis, majusculis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 12.

a. *Scutellaria (integrifolia), foliis sessilibus, ovatis; inferioribus obsolete serratis, superioribus integerrimis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 816. — Mill. Dict. n°. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 174. n°. 9.

Scutellaria foliis integerrimis. Gronov. Virg. 91.

Scutellaria carulea, virginiana, lamii aut potius teucii folio minor. Pluk. Almag. pag. 338. tab. 313. fig. 4.

Scutellaria teucii folio, marilanæica. Rai, Suppl. 310.

β. *Scutellaria (hyssopifolia), foliis lanceolatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 836. — Gronov. Virg. 91. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 174. n°. 12.

Cassida marina, hyssopifolia. Petiv. Aët. Angl.

γ. *Scutellaria (ovalifolia), foliis sessilibus, ovatis, serratis; superioribus lanceolatis, subintegerrimis.* Pers. Synopt. Plant. vol. 2. pag. 136. n°. 14.

D'après les observations de Michaux, les deux plantes de Linné, que je présente ici comme variétés, ne sont en effet distinguées entr'elles que par des caractères légers, peu tranchés. Les tiges sont droites, quadrangulaires, presque simples, plus souvent rameuses dans nos jardins, hautes d'environ deux pieds, à peine pubescentes, garnies de feuilles opposées, pétiolées; les inférieures ovales, grossièrement dentées ou crénelées, quelquefois toutes entières; les supérieures ovales-oblongues, très-entières. Dans la variété β, toutes les feuilles sont lancéolées, linéaires, entières, presque sessiles.

Les fleurs sont disposées en un épi simple, ou divisé en d'autres épis opposés, étalés, presque paniculés, lâches, fort longs; chaque fleur médiocrement pédicellée; la corolle assez grande, purpurine, un peu velue en dehors sur la lèvre supérieure.

Cette plante croît dans la Virginie, & depuis la Pensilvanie jusque dans la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (*V. f. in herb. Lam.*)

16. TOQUE élevée. *Scutellaria altissima*. Linn.

Scutellaria foliis cordato-oblongis, acuminatis, serratis; spiciis subnudis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 816. — Miller, Dict. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 176. n°. 16.

Cassida orientalis, altissima, urtica folio. Tourn. Coroll. pag. 11.

Ses racines sont vivaces, & produisent une tige droite, tétragonne, rameuse, haute de trois ou quatre pieds; les rameaux grêles, opposés, garnis de feuilles pétioolées, opposées, ovales ou oblongues, en cœur, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, dentées à leur contour; les feuilles supérieures plus étroites, moins pétioolées.

Les fleurs sont remarquables par leur longueur, disposées vers l'extrémité des rameaux en épis presque nus, principalement vers leur sommet, grêles, allongés; les pédicelles courts; le calice court, tronqué; la corolle purpurine; le tube plusieurs fois plus long que le calice; le limbe divisé en deux lèvres inégales.

Cette espèce croît dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

17. TOQUE purpurine. *Scutellaria purpurascens.* Swartz.

Scutellaria foliis petiolatis, cordato-ovatis, dentatis; racemis nudis, terminalibus; corolla labio utrinque trifido. Swartz, Prodr. pag. 89. — Vahl, Symbol. vol. 2. pag. 66. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 174. n°. 11.

Ses tiges sont simples, couchées, herbacées, glabres, obscurément tétragones, longues de sept à huit pouces, garnies de feuilles pétioolées, opposées, longues d'un pouce, ovales, en cœur, glabres à leurs deux faces, plus pâles en dessous, sans nervures sensibles, dentées en scie à leurs bords; les dentelures distantes, obtuses.

Les fleurs sont disposées en grappes nues, terminales, flexueuses, longues d'environ un pouce & demi; la pédoncule commun pubescent; les fleurs alternes & distantes, munies chacune d'une petite bractée sur leur pédicelle; le calice tronqué obliquement, très-entier; la corolle pubescente, une fois plus longue que le calice; la lèvre supérieure divisée en trois lobes inégaux.

Cette plante croît dans la partie méridionale de l'Amérique. ☉ ? (Descript. ex Vahl.)

18. TOQUE étrangère. *Scutellaria peregrina.* Linn.

Scutellaria foliis cordatis, serratis, glabris; spicis elongatis, secundis; bracteis petiolatis, ovatis, calice longioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 175. n°. 13.

Scutellaria foliis subcordatis, serratis; spicis elongatis, secundis. Linn. Hort. Cliff. 317. — Hort. Lipf. 172. — Roy. Lugd. Bat. 311. — Mill. Dict. n°. 1. — Kniph. Centur. 5. n°. 84.

Scutellaria foliis cordatis, obtusis, obtusis serratis; spicis foliosis in summo caule. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 228.

Cassida latifolia, mentha facie, semine flavicante. Amm. Ruth. n°. 52.

Lamium peregrinum, seu Scutellaria. C. Bauh. Pin. 231.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, hautes d'environ deux pieds, légèrement pubescentes ou velues, rameuses; les rameaux grêles, opposés, allongés, garnis de feuilles opposées, pétioolées, ovales, en cœur, longues d'environ un pouce, glabres à leurs deux faces, minces, vertes, un peu plus pâles en dessous, crénelées ou dentées à leur contour; les crénelures obtuses, marquées de quelques nervures & de veines très-fines, réticulées; les pétioles presque filiformes, de moitié au moins plus courts que les feuilles, glabres, striés; les feuilles supérieures souvent emboîtées, plus petites.

Les fleurs sont disposées en longs épis grêles, terminaux, élançés. Ces fleurs sont distantes entr'elles, la plupart tournées du même côté, insérées dans l'aisselle d'une grande bractée pétiolée, ovale, obtuse, très-entière, plus longue que le calice. Celui-ci est court, tronqué, parsemé de quelques poils fins; la corolle purpurine, quelquefois blanche, d'une grandeur médiocre, plieuse en dehors, particulièrement sur la carène de sa lèvre supérieure; les semences au nombre de quatre, arrondies, jaunâtres.

Cette plante croît dans les grands forêts, en Italie, aux environs de Florence, de Livourne, dans la Sibérie & la Hongrie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

19. TOQUE de Columna. *Scutellaria Columna.* Willden.

Scutellaria foliis oblongis, cordatis, serratis, pubescentibus; spicis elongatis, secundis; bracteis petiolatis, ovatis, calice brevioribus. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 175. n°. 14. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 571.

Scutellaria villosa, caule erecto, brachiato; foliis cordatis; floribus racemosis, interceditis lepidioribus. Allion. Flor. pedem. n°. 145. tab. 84. fig. 2.

Cassida. Column. Ecphr. vol. 1. pag. 18. tab. 189. — Tournet. Inst. R. Herb. 181.

Elle a des rapports avec le *Scutellaria peregrina*; elle en diffère par ses feuilles pubescentes, par les bractées souvent plus courtes que les calices, & par son port. Ses tiges sont érigées, simples ou rameuses, pubescentes, d'un vert-foncé, hautes d'environ un pied, hérissées de poils vers leur sommet; les rameaux étalés, garnis de feuilles

opposées, pétiolées; les inférieures ovales, en forme de cœur; les supérieures oblongues, toutes dentées ou crénelées à leur contour, pubescentes, obtuses.

Les fleurs, toutes tournées du même côté, sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un épi allongé, presque nu; chaque fleur munie à sa base d'une petite bractée pédicellée, aiguë, plus courte que le calice; ce dernier très-velu. La corolle est droite, bleue, longue d'environ un pouce; la lèvre inférieure purpurine, tachetée de blanc.

Cette plante croît en Italie, dans le Piémont, le long du torrent qui descend du bourg de Grogard. *z* (*V. f. in herb. Lam.*)

20. TOQUE de Crète. *Scutellaria cretica*. Linn.

Scutellaria villosa, foliis cordatis, obtusis obtusius serratis; flosculis imbricatis, bracteis setaceis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 836. — Roy. Lugd. Bat. 311. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 176. n°. 17. — Miller, Dict. n°. 2.

Cassida cretica, fruticosa, folio cataria, flore albo. Tournef. Coroll. pag. 11.

Velu sur toutes ses parties, cette plante, par son port, ressemble à un *napeta*, & presque à un *teucrium* par le caractère de ses corolles.

Ses tiges sont droites, ligneuses, rameuses, chargées de poils, hautes d'environ deux pieds; les rameaux opposés, grêles, élançés, velus, quadrangulaires, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, en cœur, d'un vert-tendre en dessus, blanches, presque tomenteuses à leur face inférieure, obtuses à leur sommet, dentées en scie à leurs bords; les dentelures obtuses.

Les fleurs sont presque imbriquées de feuilles florales, disposées à l'extrémité des rameaux en épis allongés, très-velus, serrés, munis à la base des pédicelles de bractées setacées, hérissées de poils. Le calice est court, à deux lèvres courtes, velues en dehors; la corolle blanche, fort petite, assez semblable à celle des *teucrium*, hérissée en dehors; la lèvre supérieure extrêmement petite, échancrée.

Cette plante croît dans l'île de Crète. *z*

21. TOQUE des Indes. *Scutellaria indica*. Linn.

Scutellaria foliis subovatis, obtusis, crenatis, petiolatis; racemis nudiusculis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 836. — Osbeck, Iter, 244. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 175. n°. 15.

Serratula amara. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 459. tab. 170. fig. 1. 2.

Scutellaria finica, beconica folio, floribus albis. Pluk. Amalth. pag. 190. tab. 441. fig. 1.

C'est une petite planie, dont les tiges sont courtes, à peine rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, presque orbiculaires, un peu ovales, obtuses à leur sommet, crénelées à leur contour; les crénelures peu profondes; les fleurs disposées en une grappe terminale, munie de bractées linéaires, très-courtes. Les calices sont courts, presque tronqués; la corolle blanche, étroite, allongée.

Cette plante croît dans les Indes & en Chine.

TORDYLE. *Tordylum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs polypétales, en ombelle, de la famille des ombellifères, qui a de grands rapports avec les *anedia*, & qui comprend des herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont ailées; les ombelles & les ombellules munies d'un involucre.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un involucre à plusieurs folioles; cinq pétales courbés en cœur, égaux dans les fleurs du centre, très-grands à la circonférence; fruits comprimés, orbiculaires, entourés d'un rebord épais, cannelé.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont disposées en une ombelle à rayons inégaux, étalés, munies d'un involucre à plusieurs folioles entières, allongées; les fleurs du centre, très-inégales; les fleurs du centre quelquefois stériles, à fruits difformes; leur involucre composé d'environ trois folioles tournées du même côté.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, à cinq dents courtes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales égaux dans les fleurs du centre, courbés en cœur; ceux des fleurs de la circonférence de même forme; mais un pétale plus grand, extérieur, bifide.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont capillaires, surmontés d'anthères simples.

4°. Un ovaire un peu arrondi, surmonté de deux styles courts, terminé par des stigmates obtus.

Le fruit est comprimé, orbiculaire ou un peu ovale, entouré d'un rebord épais, calcaire, crénelé ou cannelé; il se divise en deux semences planes; dans quelques espèces (les *Hasselquistia* Linn.) les fruits du centre hémisphériques, urcéolés, presque difformes; les semences concaves intérieurement; les plus intérieures stériles.

Observations. Deux caractères principaux constituent l'essence de ce genre, savoir : 1°. les pétales de la circonférence, beaucoup plus grands que les autres & fendus en deux; 2°. les semences planes, entourées d'un rebord épais, granuleux

ou cann. l'é. Par le premier, ce genre se lie avec les caudales, qui en diffèrent par leurs semences hérissées de poils roides; par l'un & l'autre il le rapproche davantage encore des *artedia*; mais dans ces derniers les semences, au lieu d'avoir un bourrelet, sont environnées d'une membrane crénelée, assez large, élégamment sinuée ou scabre.

Il étoit nécessaire de quelques réformes parmi les espèces, pour rendre ce genre à ses caractères naturels: il a donc fallu renvoyer parmi les caudales le *tordylium auriculifera*, & le *tordylium nasosum* de Linne, qui ont les semences hérissées & ovales: il a fallu y faire entrer les *huffelquistia* de Linne, qui ne diffèrent des *tordylium* que par des fleurs stériles dans la centre des ombellules, & par des semences difformes dans le disque, tandis que les fleurs & les semences de la circonférence sont parfaitement semblables à celles des *tordylium*, ainsi que les involucre, tant universels que partiels. Il est assez probable que la stérilité de quelques fleurs & la difformité de quelques semences ne sont que l'effet d'un avortement, qui, quand même il seroit constant, ne peut être employé pour un caractère générique.

D'après cet ordre & cette réforme, les *tordylium* deviennent un genre très-naturel (ce qui est assez rare parmi les ombellifères), qui ne peut être confondu avec aucun autre, & qui occupe le milieu entre les caudales & les artédies.

ESPÈCES.

1. *TORDYLE* de Syrie. *Tordylium syriacum*. Linn.

Tordylium foliis subrotundo-lobatis, inaequaliter crenatis; involucri umbellâ longioribus. (N.)

Tordylium involucri umbellâ longioribus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 345. — Hort. Cliff. 90. — Hort. Upl. 58. — Royen, Lugd. Bat. 95. — Sauvag. Method. 230. — Gronov. Orient. 78. — Miller, Dict. n°. 3. — Jacq. Hort. tab. 54. — Riv. Pent. 238. — Kniph. Centur. 8. n°. 95. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1381. n°. 1. — Lam. Ill. Gener. tab. 193. fig. 1. — Germ. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 85. tab. 21. fig. 3.

Tordylium syriacum, humilis, semine granulato, majore. Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 317. 5. 9. tab. 16. fig. 7, & Ombell. 37.

Gingidium foliis pinnatis latifolia. C. Bauh. Pin. 151.

Caucalis syriaca, cum maximo semine. J. Bauh. Hist. 3. pars 12. pag. 86. Icon.

Gingidium primum. Dodon. Pempt. 702. Icon.

Tordylium minus, limbo granulato, syriacum. Tournes. Inst. R. Herb. 320.

Gingidium foliis baucis, syriacum. Lobel. Icon. 715, & Observ. 418. Icon. — Dalc. Hist. 1. pag. 710. Icon.

Gingidium latifolium, secundum. Tabern. Icon.

Ses racines sont grêles, presque fusiformes, dures, junarces, garnies de quelques fibres; elles produisent plusieurs tiges étalées sur la terre, courtes, rudes, cannelées, un peu pubescentes, & se divisent en quelques rameaux très-ouverts, à peine redressés, opposés aux feuilles; celles-ci sont pétiolées, ailées, alternes; les radicales simples, lobées; les inférieures à cinq folioles; les supérieures à trois; les folioles inégales, opposées, un peu ovales, arrondies, irrégulières, médiocrement lobées ou crénelées, presque glabres, un peu rudes.

Les fleurs sont blanches, petites; les rayons de l'ombelle universelle peu nombreux, épais, rudes, velus, très-ouverts; les ombellules ramassées en petits paquets; les involucre, tant universels que partiels, composés de plusieurs folioles très-longues, linéaires, simples, bien plus longues que les ombelles, un peu élargies & même quelquefois divisées vers leur sommet. Le fruit est grand, ovale, presque orbiculaire, divisé en deux semences planes, glabres, un peu convexes & presque pubescentes dans leur milieu, entourées d'un rebord blanc, épais, crénelé en tubercules.

Cette plante croît dans la Syrie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (P. v.)

2. *TORDYLE* officinal. *Tordylium officinale*. Linn.

Tordylium involucri partialibus, longitudine florum; foliis ovatis, laciniatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 345. — Hort. Cliff. 90. — Hort. Upl. 58. — Royen, Lugd. Bat. 95. — Mater. medic. 77. — Sauvag. Monsp. 230. — Miller, Dict. n°. 2. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 335.

Seseli creticum, minus. C. Bauh. Pin. 161.

Seseli creticum. Dodon. Pempt. 314. Icon. — Lobel. Icon. 716, & Observ. 415. Icon.

Tordylium narbonneuse, minus. Tournes. Inst. R. Herb. 320.

Caucalis minor, pulchro semine, sive bellonii. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 84.

Caucalis seu caucalitria. Bellon. Observ. pag. 106. Icon.

Ses racines sont cylindriques, presque fusiformes, grêles, presque simples; il s'en élève une tige droite, striée, haute d'environ un pied, très-rameuse, velue; les rameaux étalés, alternes; les feuilles pétiolées, alternes, assez pour imparer, composées de folioles irrégulières, ovales, incisées, crénelées, presque laciniées, rudes &

pileuses, au nombre de sept à neuf & plus; les folioles des feuilles supérieures moins nombreuses, découpées en lanières étroites, écartées; les pétioles en gaine membraneuse à leur partie inférieure.

Les fleurs sont blanches, d'opposées en ombelles planes; l'involucre des ombelles composé de plusieurs folioles simples, plus courtes que les rayons; celle des ombellules de la longueur des fleurs. Les fruits sont comprimés, presque orbiculaires, presque glabres, entourés d'un bourrelet blanc, épais, calleux, crépu & comme granuleux; ils se divisent en deux semences un peu bombées dans leur milieu.

Cette plante croît dans le Levant, en Italie, en Sicile, dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

Cette espèce passe pour incisive, surtout sa racine; ses semences sont diurétiques, emménagogues. Bellon dit que les Turcs mangent cette plante en salade quand elle est jeune. On ne fait plus aujourd'hui aucun usage de cette plante, quoique l'on prétende que ses semences peuvent être substituées au cumin.

3. TORDYLE étranger. *Tordylium peregrinum*. Linn.

Tordylium seminibus sulcatis, rugosis, plicatis; involucre universali, monophyllo, subtrifido. Linn. Mant. pag. 55. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1381. n°. 3.

Caucalis peregrina, femine rugosa. C. Bauh. Pin. 153.

Caucalis hispanica. Cam. Hort. 37. tab. 11.

Caucalis hispanica, femine rugosa. J. Bauhin, Hist. 3. pars 2. pag. 83. Icon. pag. 84. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 9. tab. 14. fig. 11.

Ses tiges sont droites, cylindriques, glabres, rameuses; les feuilles alternes, ailées, assez semblables à celles du cerfeuil; les folioles ovales, un peu étroites, incisées, aiguës, glabres à leurs deux faces; les fleurs blanches, en ombelle; l'ombelle universelle, ordinairement composée de trois rayons & d'un involucre à trois divisions profondes, linéaires, beaucoup plus courtes que les ombelles; les ombellules à sept rayons environ, & leur involucre à cinq folioles de la longueur des ombellules; routes les fleurs fertiles: il leur succède des fruits ovales, médiocrement comprimés, un peu convexes, marqués sur chaque semence à l'extérieur de trois sillons profonds, ceux des bords plissés & lamelleux.

Cette espèce croît dans le Levant & dans l'Espagne. ○

4. TORDYLE d'Italie. *Tordylium apulum*. Linn.

Tordylium umbellulis remotis; foliis pinnatis; pinnis subrotundis, laciniatis. Linn. Sp. c. Plant. vol. 1. pag. 346. — Hort. Cliff. 90. — Royen, Lugd. Bar. 94. — Miller, Dict. n°. 4. — Jicq. Hort. tab. 51. — Kniph. Centur. 12. n°. 96. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1381. n°. 4.

Tordylium apulum, minimum. Column. Eclipt. 1. pag. 122. tab. 124. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 9. tab. 16. fig. 6. — Tournef. Inst. R. Herb. 310.

Seseli creticum, minimum. C. Bauh. Pin. 161.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ huit à dix pouces, velues, liriées, cylindriques, médiocrement rameuses, garnies de feuilles ailées, velues; les folioles un peu arrondies, peu nombreuses, laciniées à leur contour ou un peu lobées; les feuilles radicales ovales, entières, en cœur, crénelées à leurs bords, longement pétioles; les caulinaires la plupart à trois folioles.

Les fleurs sont blanches; l'ombelle générale est composée d'environ huit rayons allongés, soit ouverts, supportant chacun une ombelle fort petite, ferrée; les involucre, tant généraux que partiels, composés de plusieurs folioles étroites, aiguës; celles de l'ombelle un plus courtes que les rayons; celles des ombellules plus longues; les pétales extérieurs de la circonférence beaucoup plus grands & bifides; les semences arrondies, comprimées, à rebords blancs, tuberculeux.

Cette plante croît aux lieux incultes, dans l'Italie & la Pouille. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

5. TORDYLE élevé. *Tordylium maximum*. Linn.

Tordylium umbellis confertis, radiatis; foliis lanceolatis, inciso-serratis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 345. — Hort. Cliff. 90. — Royen, Lugd. Bar. 94. — Sauvag. Montpellier. 240. 259. — Mill. Dict. n°. 1. — Crantz, Austr. 153. — Jacq. Flor. austr. tab. 141. — Scopul. Carn. n°. 319. — Hoff. Germ. 92. — Roth. Germ. vol. 1. p. 131. — vol. II, pag. 349. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 335.

Tordylium foliis pinnatis, pinnis semipinnatis, seminis limbo levi. Haller, Helv. n°. 811.

Tordylium. Rivin. Pent. 1.

Caucalis major, femine minus pulchro, hispida. J. Bauh. Hist. 3. pars 2. pag. 85. Icon.

Caucalis maxima, sphaerodysli aculeato femine. C. Bauh. Pinn. 152.

Caucalis major. Clus. Hist. 2. pag. 101.

Seseli crassum, majus. C. Bauh. Pinn. 161.

Tordylium maximum. Tournef. Inst. R. Herb. 330 tab. 1. 0.

Cette espèce est rude, hérissée de poils sur toutes ses parties, une des plus grandes de ce genre. Ses racines sont épaisses, presque simples, dures, un peu fibreuses; elles produisent une tige droite, roide, cannelée, rameuse, haute d'environ trois pieds, hérissée de poils fermes, réfléchis en en bas; les rameaux nombreux, divariqués, garnis de feuilles assez amples, pétiolées, alternes, ailées, composées d'environ sept folioles lancéolées, un peu distantes, opposées, un peu pétiolées, bordées de larges dentelures en scie, souvent incisées, presque pinnatifides, pubescentes; la foliole terminale, au moins une fois plus longue & plus grande que les autres.

Les fleurs ont une teinte rougeâtre en dehors avant leur développement; elles sont blanchâtres dans leur entier épanouissement. Les ombelles sont composées de six à huit rayons courts, très-roides, inégaux, scabres, cannelés; l'involucre à cinq folioles tubulées, presque filiformes, plus courtes que les rayons; les ombellules petites, très-ferrées; leur involucre à cinq folioles également tubulées, de la longueur des fleurs; deux intérieures très-petites; toutes les fleurs fertiles. Il leur succède des semences d'une grandeur médiocre, presque ovales, hérissées de poils rudes, entourées d'un rebord épais, velu, médiocrement tuberculé, un peu rougeâtre dans sa jeunesse; il devient souvent d'un blanc-jaunâtre à l'époque de la maturité.

Cette espèce croît dans les terrains arides & incultes, en Suisse, en Italie, en Autriche, dans les départements méridionaux de la France. Je l'ai recueillie aux environs d'Aix en Provence. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

6. *TORDYLE* à fleurs de berle. *Tordylium filifolium*. Scop.

Tordylium umbellatis confertis, radiatis; foliis angulatis, dentatis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1383. n.° 6.

Tordylium (filifolium), folia pinnata; pinnis filiformibus, oblongis, serratis; petala rubra, uno maximo in floribus exterioribus. Scopol. Carn. edit. 2. n.° 318. tab. 8.

Cette espèce diffère peu du *tordylium maximum*, peut-être n'en est-elle qu'une variété, qui s'en distingue par ses folioles anguleuses, dentées en scie, point incisées. Ses tiges sont moins élevées, droites, rameuses, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ailées; les folioles sessiles, opposées, pubescentes, oblongues, anguleuses, dentées en scie à leur contour; les fleurs réunies en ombelles

ferrées, la corolle rougeâtre, les pétales courbés en cœur; un de ceux des bords extérieurs beaucoup plus grand que les autres.

Cette plante croît sur les montagnes alpines de la Carniole.

7. *TORDYLE* à tige basse. *Tordylium humile*. Desfont.

Tordylium foliis inferioribus pinnatis; foliis lobatis, incisis; caule inferius piloso; involucri minimi, filicis; seminibus margini crenatis. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 235. tab. 58.

Ses racines sont droites, simples, entières, presque pivotantes; elles produisent plusieurs tiges droites, filiformes, un peu velues à leur partie inférieure, hautes de huit à dix pouces, quelquefois plus, médiocrement rameuses, à peine feuillées, excepté à leur base. Les feuilles inférieures ou radicales sont pétiolées, ailées, composées de pinnules presque sessiles, ovales ou un peu arrondies, inégalement incisées & lobées; les lobes obtus, presque glabres; les pétioles un peu pileux, membraneux, & se recouvrant les uns les autres à leur partie inférieure.

Les fleurs sont blanches; les ombelles de cinq à neuf rayons glabres, filiformes, munis à leur base d'un involucre court, composé de folioles tubulées, scabres; les ombellules un peu ferrées; les folioles de l'involucre plus courtes que les pinnules; les pétales inégaux, ceux de la circonférence plus grands & bifides; les fleurs du centre ordinairement stériles. Le fruit consiste en deux grandes semences planes, orbiculaires, environnées d'un bourrelet épais, cartilagineux, crenelé; rudes à leur face extérieure.

Cette espèce a été découverte par M. Desfontaines dans le royaume de Tunis, où elle croît parmi les moissons, proche Hamamelit. ○

8. *TORDYLE* d'Égypte. *Tordylium aegyptiacum*.

Tordylium seminibus disci utrolatatis, foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis. (N.) Lam. Illustr. Gen. tab. 193. fig. 1.

Hasselquistia (aegyptiaca), foliis pinnatis, foliolis pinnatifidis. Linn. Syst. veget. pag. 175. — Linn. f. Suppl. pag. 179. — Gärtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 84. tab. 21. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1379. n.° 1.

Hasselquistia. Linn. Amoen. Academ. vol. 4. pag. 270. — Jacq.-Hort. tab. 87. — Gouan, Illustrat. pag. 11.

Pojkinata orientalis, foliis eleganter incisis. Buxb. Cent. 3. pag. 16. tab. 27. ?

Ses racines sont fusiformes, blanches, de la grosseur du petit doigt; il s'en élève une tige

droite, cylindrique, haute d'un pied & demi, hérissée de poils blanchâtres à la partie inférieure, qui deviennent rudes & presque piquans à la partie supérieure. Les rameaux sont simples, & sortent de l'aisselle des feuilles supérieures; les feuilles alternes, distantes, pétioles, ailées; les folioles pinnatifides, rugées en dessous sur leur principale nervure, crénelées à leurs bords; les crénelures arrondies, obtuses, inégales; le pétiole rude, vaginal & ventru à sa partie inférieure; les bords de la gaine blanchâtres & laineux vers le haut, de couleur purpurine à la partie inférieure.

Chaque rameau se termine par un pédoncule droit, roide, hérissé, presque à cinq angles; il supporte une ombelle étalée, composée d'environ dix rayons inégaux; ceux du centre plus courts, munis d'un involucre fort petit, à cinq folioles simples, subulées, fort petites; les ombellules planes: chacune d'elles renferme dans son centre le rudiment d'un corps charnu, avorté, pédicellé, presque trigone, noirâtre, un peu comprimé, couvert en dessus de poils blanchâtres; les involucre à trois folioles extérieures, subulées, inclinées, de moitié plus courtes que les pédicelles; les ombelles conniventes à l'époque de la fructification; la corolle blanche; les pétales inégaux, courbés en cœur, échancrés; les pétales extérieurs de la circonférence bifsides; chaque découpure échancrée; toutes les fleurs de la circonférence hermaphrodites; celles du centre mâles; cinq étamines; les anthères verdâtres; les styles filiformes, persistans; les fruits des fleurs extérieures, composés de deux semences ovales, comprimées, glabres, à rebords épais, crénelés. Les fruits des fleurs intérieures ne forment qu'une semence hémisphérique, inclinée, urcéolée, assez semblable à une membrane vésiculeuse; à côté une petite écaille sèche, qui paroît être la seconde semence avortée; point de semences aux fleurs du centre.

Cette plante croît dans l'Égypte & l'Arabie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

9. *TORDYLE* à feuilles en cœur. *Tordylium cordatum*.

Tordylium seminis disci urceolatis, foliis inferioribus ternatis; superioribus cordatis, simplicibus. (N.)

Huffel; uisium (cordata), foliis cordatis. Linn. Syst. veg. pag. 275. — Linn. f. Suppl. pag. 179. — Jacq. Hort. 2. pag. 91. tab. 193. — Gz. in. de Fruct. & Semin. vol. 1. pag. 85. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1380. n. 2.

Ses tiges sont droites, flexueuses, légèrement striées, piluleuses à leur partie inférieure, garnies de feuilles alternes; les inférieures pétioles, ternées, à trois folioles; les deux latérales pro-

cessées, ovales, crénelées; la terminale pétiole, échancrée en cœur à sa base, obtuse à son sommet; les feuilles supérieures simples & en cœur; quelquefois toutes les feuilles sont simples.

Les fleurs sont blanches; les ombelles composées de rayons nombreux, munis d'un involucre formé de plusieurs folioles setacées, réfléchies, de moitié plus courtes que les corolles; les involucre partiels de la longueur des corolles; point de fleurs stériles dans le centre; dans les cornues de la circonférence, deux pétales plus grands, planes, en ovale renversé; les autres petits, presque égaux, ovales, entiers; les semences semblables à celles de l'espèce précédente, mais plus petites; celles de la circonférence membraneuses, comprimées, environnées d'un rebord glabre, blanc, étroit; les semences du centre solitaires, ovales, renflées en bulle, ouvertes à leur sommet, & entourées d'une bordure épaisse, blanche & glabre.

La partie de cette plante n'est pas connue. O

TORÈNE. *Torenia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, tubuleuses, irrégulières, de la famille des scrophulariées, qui a des rapports avec les *gratiola* & les *vascellia*, & qui comprend des herbes à tiges rampantes ou dressées, à feuilles opposées, pétioles; les fleurs solitaires, axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux lèvres; la supérieure à trois pointes cuspidées; une corolle tubulée; le limbe à quatre lobes inégaux; quatre filamens; les deux inférieures à deux divisions, dont une sans anthère; une capsule à deux loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, d'une seule pièce, tubulé, anguleux, à deux lèvres; la supérieure à trois pointes aiguës; l'inférieure entière, plus étroite.

2°. Une corolle monopétale, tubulée; le limbe presque à deux lèvres, dilaté en quatre lobes inégaux; un supérieur très-entier, trois inférieurs presque ondulés; celui du milieu plus allongé.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont diadelphes; deux supérieurs simples, plus courts, sétiles; deux inférieurs, parrés en deux découpures filiformes; l'inférieure stérile, plus courte; les anthères à deux loges, rapprochées par paires.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, épais à sa partie supérieure, terminé par un stigmate bifside, aigu.

Le

Le fruit est une capsule oblongue, à deux loges, à plusieurs semences; les semences attachées sur une cloison parallèle aux valves.

ESPECES.

1. TORÈNE d'Asie. *Torenia asiatica*. Linn.

Torenia glabra, foliis ovatis, acutis, serratis; caule repente. (N.)

Torenia asiatica. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 862. — Amer. Acad. vol. 3. pag. 25. — Osb. Iter, 210. — Lam. Illustr. Genet. tab. 525. fig. 1.

Torenia (asiatica), glabra, caule repente. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 265. n° 1.

Euphorbia affinis, pusilla planta. Pluken. Amalth. pag. 85. tab. 375. fig. 2.

Asrina foliis & facie, capsula bivalvi, lignosa. Pluken. Amalth. pag. 40.

Hedera terrestris species. Comm. Mal. 35.

Kaka-pu. Rheed. Hort. Malab. vol. 9. pag. 103. tab. 53.

Petite plante herbacée, dont les tiges sont glabres, un peu grêles, en partie rampantes, redressées vers leur sommet, radicantes à leur partie inférieure, médiocrement rameuses. Les feuilles sont pétiolées, opposées, ovales, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, longues à peine d'un pouce, munies de nervures simples, latérales, presque opposées; les pétioles presque de moitié aussi longs que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, terminales, pedunculées; le peduncule un peu plus long que les feuilles; le calice oblong, tubulé, glabre, à deux lèvres aiguës; la supérieure à trois pointes; la corolle tubulée, assez grande: son limbe partagé en quatre lobes inégaux; le tube cylindrique, un peu plus long que le calice; une capsule presque cylindrique, à deux loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à la Chine. (V. f. in herb. Lam.)

2. TORÈNE velue. *Torenia hirsuta*. Lam.

Torenia foliis ovatis, subacuminatis, villosis; caule erecto. (N.) — Lam. Illustr. Genet. tab. 523. fig. 2.

Torenia (hirsuta), caule erecto. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 266. n° 2.

Cette espèce diffère de la précédente en ce qu'elle est un peu plus grande & velue sur toutes ses parties. Ses tiges sont droites, un peu fortes, striées, hérissées de poils toides, divisées en rameaux opposés, redressés, garnis de feuilles op-

Botanique. Tome VII.

posées, médiocrement pétiolées; les supérieures presque sessiles, ovales, très-aiguës, presque acuminées, longues de plus d'un pouce, dentées en scie à leur contour, munies de poils très-courts, couchés, & de nervures simples.

Les fleurs sont terminales, solitaires, moins grandes que celles de l'espèce précédente, pedunculées; les peduncules simples, velus, plus courts que les feuilles; le calice oblong, divisé jusqu'au-delà de la moitié en deux découpures lanceolées, aiguës; la corolle tubulée; le tube cylindrique, à peine aussi long que le calice; le limbe à quatre lobes très-entiers, inégaux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

TORMENTILLE. *Tormentilla*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, régulières, de la famille des rosacées, qui a de grands rapports avec les *potentilla* & les *fragaria*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à feuilles digitées, à fleurs axillaires, terminales, presque solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à huit découpures, quatre alternes plus petites; quatre pétales; un grand nombre d'étamines; réceptacle des semences petit, point charnu.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice plane, divisé en huit découpures, dont quatre alternes, plus petites, aiguës.

2°. Une corolle composée de quatre pétales planes, ouverts, en cœur renversé, insérés sur le calice par des onglets courts.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filaments sont tubuleux, de moitié plus courts que la corolle, insérés sur le calice, terminés par des anthères simples.

4°. Des ovaires, ordinairement au nombre de huit, fort petits, ramassés en tête, surmontés de styles filiformes, de la longueur des étamines, insérés latéralement, terminés par des stigmates obtus.

Des semences nues, arrondies, placées sur le réceptacle commun, & environnées par le calice persistant.

Observations. Ce genre n'est qu'un démembrement du genre très-naturel des *potentilla*, dont il ne peut être rigoureusement séparé. Il n'en diffère que par le nombre de ses parties, par huit découpures au calice, au lieu de dix; par quatre pétioles au lieu de cinq. Ces deux genres diffèrent des fraisières par leur réceptacle sec & non charnu.

XXX

1. *TORMENTILLE droite*. *Tormentilla erecta*. Linn.

Tormentilla caule erectiusculo, foliis sessilibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 716. — Pallas, Iter 2. pag. 655. — Pollich, Palar. n°. 500. — Blackw. tab. 445. — Ludw. Ect. tab. 174. — Eder. Flor. dan. tab. 189. — Kniph. Centur. n°. 93. — Knorr. Del. 2. tab. T. 1. — Hoffm. Germ. 180. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 220. — vol. II, pag. 566. — Lam. Illustr. Gener. tab. 444. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 454. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1112. n°. 1.

Tormentilla officinalis. Curtis, Flor. lond. tab. 35.

Tormentilla silvestris. C. Bauh. Pin. 326. — Tournef. Infr. R. Herb. 198. — Garid. Aix, pag. 468. tab. 93.

Tormentilla. Camer. Epitom. 685. Icon. — Flor. japon. 215. — Flor. suec. 421. 459. — Mater. medic. 132. — Hort. Cliffort. 194. — Royen, Lugd. Bat. 267. — Dodon. Pempt. 118. Icon.

Fragaria tetrapetala, foliis caulinis sessilibus, quinatis. Haller, Helv. n°. 1117.

Fragaria, tormentilla officinarum. Crantz, Austr. pag. 80.

Potentilla, tormentilla erecta. Scopul. Carn. pag. 620.

Potentilla (silvestris), caule erectiusculo; foliis ternis, sessilibus; corollis tetrapetalis. Neck. Gallob. pag. 121.

Potentilla tormentilla. Abbot. Bedf. 114.

Pentaphyllum didum tormentilla. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 2. tab. 19. fig. 13.

Ses racines sont dures, épaisses, presque horizontales : il s'en élève des tiges droites ou re. tressées, quelquefois couchées & diffuses, peu épaisses, presque cylindriques, légèrement velues, rameuses à leur partie supérieure ; les rameaux alternes, axillaires, garnis de feuil. s sessiles, alternes, composées de trois à cinq folioles digitées, lancéolées, inégales, incisées ou profondément dentées ; les dentelures un peu lancéolées, aiguës, et vertes, munies de quelques poils rares, fins & courts.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, portées sur de longs pedoncules simples, filiformes, pubescens. Le calice est à huit divisions profondes, lancéolées, alternativement plus courtes, légèrement velues. La corolle est jaune, composée de quatre pétales à peine plus longs que les plus grandes découpures du calice, ovales, un peu échancrés en cœur à leur sommet, rétrécis en onglet à leur base.

Cette plante croît en Europe, sur le bord des bois, des chemins ; sur les pelouses & dans les pâturages secs. ♀ (V. v.)

Toute la plante est astringente, & propre à tanner les cuits, à faire de l'encre ; elle entre dans les teintures : les Lapons l'emploient pour teindre le cuir en rouge. On s'en sert pour raffermir les genives lorsque les dents sont vacillantes. On la prescrit contre les hémorrhagies, la diarrhée, la dysenterie, lorsqu'elles sont entretenues par la faiblesse & le relâchement : peu utile dans les prairies, elle est broutée dans les pâturages par les vaches, les chèvres, les moutons ; les chevaux n'en veulent point.

2. *TORMENTILLE couchée*. *Tormentilla reptans*. Linn.

Tormentilla caule repente, foliis petiolatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 716. — Hudf. Angl. 157. — Hoffm. Germ. 180. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 220. — vol. II, pag. 557. — Smith, Flor. britan. 553. — Decand. Flor. franç. vol. 4. pag. 454. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1112. n°. 2.

Tormentilla radice repente. Tournef. Infr. R. Herb. 198.

Pentaphyllum minus, viride, flore aureo, tetrapetalo, radiculari in terram à geniculis dimittens. Murif. Oxon. Hist. 2. pag. 190.

Pentaphyllum reptans, alatum, foliis profundius serratis. Plot. Oxf. 6. §. 7. tab. 9. fig. 5.

Potentilla procumbens. Sibth. Oxon. 162.

Cette espèce diffère de la précédente, en ce qu'elle est plus petite dans toutes ses parties ; que ses tiges sont toujours couchées, & ses feuilles les pétioles. Ses racines sont traçantes ; elles produisent des tiges très-grêles, filiformes, étendues sur la terre, rameuses, un peu pubescentes ; les rameaux plusieurs fois bifurqués, très-ouverts ; les feuilles alternes, médiocrement pétioles, digitées, à trois folioles étroites, en forme de coin, profondément dentées ou incisées vers leur sommet, à peine velues, accompagnées à leur base de deux stipules petites, lancéolées, très-entières, presque sessiles.

Les fleurs sont solitaires, situées les unes dans l'aisselle des feuilles, d'autres dans la bifurcation des rameaux ; les pedoncules simples, très-longs, presque capillaires, pubescens ; les calices courts, à peine velus, la corolle jaune, presque une fois plus petite que celle de l'espèce précédente ; les pétales ovales, ongiculés, presque entiers.

Cette espèce croît à l'ombre dans les forêts, en Angleterre, en France, en Allemagne. M. Boucher l'a recueillie dans la forêt de Creilly, près Auberville. Je l'ai trouvée aux environs de Fougères en Bretagne, dans la forêt. ♀ (V. v.)

TORTULE rude. *Tortula aspera*. Roxb.

Tortula foliis oppositis, asperis; scicis filiformibus. (N.)

Tortula aspera Roxb. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 339.

C'est une plante herbacée, qui constitue un genre particulier établi par Willdenow, qui paroît devoir appartenir à la famille des scrophulaires; elle a le port du *verbena lappacea*. Ses tiges sont droites, quadrangulaires, rameuses, géniculées; les nœuds inférieurs renflés. Les feuilles sont opposées, pétioolées, longues de trois pouces, ovales, presqu'en cœur, un peu obtusifs à leur sommet, grossièrement dentées à leur contour, veinées, rudes à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en épis filiformes, très-longes; elles sont alternes ou opposées, très-rapprochées vers l'extrémité de l'épi: les inférieures distantes, toutes pédicellées, munies d'une bractée tubulée. Leur calice est entier, divisé en cinq découpures, hérissé de poils, droit quand la plante est en fleurs, réfléchi & renflé à l'époque de la maturité des fruits. La corolle est monopétale, tubulée, à deux lèvres; le tube contourné en spirale; quatre étamines didynames. Le fruit consiste en deux noix, à deux loges, fortement ridées à l'extérieur.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; le tube de la corolle contourné en spirale; deux noix à deux loges, ridées à l'extérieur.

Cette plante croît dans les Indes orientales, où elle a été recueillie par Roxburgh. (*Descript. ex Willd.*)

Observations. Hedwig a établi sous le nom de *tortula*, un genre qui appartient à la famille des mousses, qui ressemble en grande partie des *oryzium* & des *minium* de Linné, qui la plupart ont été décrites dans cet ouvrage aux articles *BRY* & *MYNIE*. On sent la nécessité de changer un de ces deux noms (*tortula*). Peut-être que Willdenow, en l'employant pour le genre que je viens de mentionner, se propose, ou de ne point y mettre le genre *tortula* d'Hedwig, ou d'en changer le nom: dans ces deux cas, il eût fallu éviter d'appliquer à un nouveau genre un nom déjà employé pour un autre, quoique supprimé.

TOUCHIROA. *Touchiroa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, de la famille des légumineuses; qui a de très-grands rapports avec les *apalata*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles simples, & dont les fleurs sont disposées en épis latéraux, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice turbiné, à quatre découpures; point de corolle; six étamines libres; une gousse uniloculaire, entourée d'une aile membraneuse.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, turbiné, dont le limbe est divisé en quatre découpures oblongues, aiguës.

2°. Une corolle nulle.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont libres, beaucoup plus longs que le calice, insérés à son orifice, terminés par des anthères ovales, à deux loges.

4°. Un ovaire ovale, oblong, anguleux, velu, pédicellé, surmonté d'un style long, recourbé, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une gousse un peu arrondie, ridée, environnée d'une aile fort ample, membraneuse, ondulée à ses bords; une seule loge qui ne s'ouvre pas; une semence solitaire, réniforme.

ES P È C E S.

1. *TOUCHIROA* aromatica. *Touchiroa aromatica*. Aubl.

Touchiroa foliis ovatis, acuminatis, simplicibus; floribus spicatis, axillaribus. (N.)

Touchiroa aromatica. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 385. tab. 148. — Lam. Illustr. Gener. tab. 339.

Crudia (aromatica), *foliis simplicibus, ellipticis, acuminatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 540.

C'est un assez grand arbre, dont le tronc s'élève à la hauteur de quarante ou cinquante pieds & plus, sur environ deux pieds de diamètre, revêtu d'une écorce griseâtre. Le bois est blanc, peu compacte; les branches nombreuses, très-étalées, chargées de rameaux qui supportent des feuilles alternes, médiocrement pétioolées, ovales, très-entières, vertes, lisses à leurs deux faces, terminées à leur sommet par une petite pointe mousse; les pétioles accompagnés à leur base de deux petites stipules très-caduques.

Les fleurs sont verdâtres, situées dans l'aisselle des feuilles & disposées en un épi très-court, latéral. Leur calice est monophylle, concave, partagé à son orifice en quatre découpures aiguës; elles n'ont point de corolle. Les étamines, au nombre de dix, sont attachées à l'orifice interne du calice; les filaments sont grêles, très-longes; les anthères ovales, à deux loges; l'ovaire oblong, anguleux, pédicellé, hérissé de poils; le style termine par un stigmate obtus. Le fruit est une gousse de couleur rouilâtre, coriace, comprimée, bor-

X x x x

dée d'un large feuillet membraneux; elle renferme une semence verdâtre, folitaire.

Cet arbre croit dans la Guiane, aux lieux marécageux, dans les grandes forêts. Il fleurit dans le mois de décembre, & donne ses fruits au mois de mai. Son bois est léger & un peu aromatique. h

TOULICIA. *Toulícia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des savonniers, qui a des rapports avec les *medicoca*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées sans impaire, & les fleurs disposées en grappes paniculées, terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; quatre pétales; huit étamines; trois styles; une capsule à trois loges, à trois ailes; les loges monospermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq découpures concaves, un peu arrondies.

2°. Une corolle composée de quatre pétales lancéolés, plus grands que le calice, velus à leur sommet, insérés sur le réceptacle du pistil.

3°. Huit étamines, dont les filamens sont alternativement plus courts, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthères ovales, à deux loges.

4°. Un ovaire oblong, presque à trois faces, porté sur un réceptacle en forme de disque, surmonté de trois styles courts, terminés par des stigmates aigus.

Le fruit est une capsule roussâtre, à trois côtes en forme d'aile, à trois loges; chaque côte bivalve, contenant une semence ovale & folitaire.

ES P È C E S.

1. **TOULICIA** de la Guiane. *Toulícia guianensis*. Aubl.

Toulícia foliis abrupte pinnatis; foliolis oblongis, acutis; racemis terminalibus, paniculatis. (N.)

Toulícia guianensis. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 359. tab. 140. — Lam. Illustr. Gener. tab. 317.

Poua saponarioides. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 470.

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ trente pieds & plus sur un tronc de sept à huit pouces de diamètre, revêtu d'une écorce cendrée; le bois est blanc, peu compacte; il supporte à son sommet trois ou quatre branches garnies dans toute leur

longueur de feuilles éparées, pétioolées, ailées sans impaire, composées d'environ huit paires de folioles presque sessiles, alternes ou opposées, ovales-lancéolées, fermes, très-entières, glabres à leurs deux faces, un peu ondulées à leurs bords, inégalement divisées par la nervure du milieu, vertes, très-lisses, longues de huit pouces, larges de trois; le pétiole commun a environ deux pieds & plus de long, cylindrique à sa base; il devient triangulaire à sa partie supérieure, & se termine par une petite pointe.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en grappes paniculées, éparées, sur lesquelles ces fleurs sont réunies en petits paquets sessiles. Leur calice est d'une seule pièce, divisé en cinq découpures concaves, arrondies; la corolle est composée de quatre pétales ovales, aigus, blanchâtres, bordés à leur extrémité supérieure de trois ou quatre petites éminences jaunes, chargés de poils blancs, attachés autour d'un disque rouge & charnu: il y a huit étamines, dont quatre plus grandes; l'ovaire est surmonté de trois styles fort courts; il se convertit en un fruit sec, arrondi, roussâtre, à trois ailes, qui se divisent chacune en deux valves membraneuses, renfermant une seule semence.

Cet arbre croît à l'île de Cayenne, sur les bords de la rivière de Sinemari; il fleurit & fructifie dans le mois de novembre. Les Galibis le nomment *toulci*. h (*Descript. ex Aubl.*)

TOUNATE. *Tounatea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *passira*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, ailées avec une impaire, à pétiole membraneux, dont les fleurs sont disposées en grappes latérales, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice turbiné, à cinq découpures; point de corolle; des étamines nombreuses; un style; une gousse à deux valves, à une seule semence.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice turbiné, coloré, persistant, divisé à son limbe en cinq découpures oblongues, aiguës, un peu courbées en dedans.

2°. Une corolle nulle.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filamens, insérés sur le réceptacle, sont très-longs, capillaires, tous un peu inclinés du même côté, terminés par des anthères oblongues, à deux loges.

4°. Un ovaire ovale, saillant hors du calice,

surmonté d'un style court, recourbé, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une capsule ovale, jaunâtre, à une seule loge, à deux valves, renfermant une seule semence ovale, emboîtée à sa base par une enveloppe particulière, blanche, membraneuse.

ESPÈCES.

L. TOUNATE de la Guiane. *Tounatea guianensis*. Aubl.

Tounatea foliis impari-pinnatis; petiolis marginatis; racemo laterali, simplicif. (N.)

Tounatea guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 350. tab. 218. — Lam. Illustr. Gener. tab. 462.

Swartzia (alata), foliis pinnatis, petiolo communi alato. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1210. n°. 6.

Swartzia. Schreb. Gener. Plant. n°. 1217.

Cet arbre s'élève à la hauteur de vingt-cinq à trente pieds, sur un tronc qui a au moins un pied de diamètre : son écorce est lisse & cendrée ; son bois blanchâtre, peu compacte ; ses branches supérieures droites ; les inférieures très-étalées, munies de rameaux assez nombreux, diffus, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées avec une impaire, composées de folioles alternes, pédicellées ou presque sessiles, ovales-lancéolées, inégales ou presque sessiles, ovales-lancéolées, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de huit pouces sur trois de large ; le pétiole commun muni des deux côtés d'une aile décurrente.

Les fleurs sont fort petites, latérales, disposées en grappes à l'extrémité d'un pédoncule commun, simple, nu, long d'environ six pouces, grêle, filiforme ; chaque fleur pédicellée, munie à la base du pédicelle d'une petite bractée courte, caduque. Le calice est d'un blanc-sale, divisé en quatre découpures profondes, aiguës. Il n'y a point de corolle. Les étamines sont très-nombreuses, attachées sur le réceptacle, réunies autour de l'ovaire ; les anthères jaunes, à deux loges ; le style très-court, terminé par un stigmate obtus. Le fruit est une gousse ovale, à deux valves, jaunâtre, marquée des deux côtés d'une petite ligne saillante, renfermant une seule semence ovale, très-glabre, noirâtre, environnée à sa partie inférieure par un arille blanc, membraneux, attaché au fond du péricarpe.

Cette plante croît dans les grandes forêts de la Guiane, dans le voisinage de la Crique des Galibis ; elle fleurit & fructifie au mois de novembre. Les Galibis la nomment *toulou*. (J. *D. scripta*, ex Aubl.)

TOVOMITE *Tovomita*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des guttaires, qui a des rapports avec les *garcinia*, & qui comprend des arbres résineux, exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont à demi amplexicaules par leur pétiole ; les fleurs disposées en corymbes terminaux, à divisions trichotomes, deux bractées à chaque division.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux folioles ; quatre pétales ; des étamines nombreuses ; un stigmate sessile, à quatre lobes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de deux folioles concaves, arrondies.

2°. Une corolle à quatre pétales verdâtres, concaves, ovales, aigus.

3°. Des étamines nombreuses (de vingt à vingt-cinq), dont les filaments sont droits, insérés sur le réceptacle, terminés par des anthères bivalentes, à deux loges.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, marqué de quatre sillons ; point de style ; quatre stigmates sessiles, arrondis.

Le fruit & les semences ne sont pas connus.

ESPÈCES.

L. TOVOMITE de la Guiane. *Tovomita guianensis*. Aubl.

Tovomita petiolis oppositis, semiamplexicaulibus; floribus terminalibus, trichotomè corymbosis. (N.)

Tovomita guianensis. Aubl. Guian. vol. 1. p. 556. tab. 264. — Juss. Gener. Plant. pag. 216.

C'est un arbre de moyenne grandeur, qui s'élève à la hauteur d'environ dix pieds sur un tronc d'un pied de diamètre, dont le bois est dur, compacte ; l'intérieur rouge ; l'obier blanc ; l'écorce rougeâtre, qui transsude par larmes une résine jaune & transparente. Les rameaux sont branchus, & portent, les plus jeunes seulement, des feuilles opposées, pétioles, ovales, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de trois à quatre pouces sur environ deux pouces de large, traversées par des nervures rougeâtres ; les pétioles plus courts que les feuilles, à demi amplexicaules.

Les fleurs sont petites, disposées à l'extrémité des rameaux en corymbes trichotomes, articulés à chaque division comprimée, munie de deux petites bractées opposées. Le calice est formé de deux petites folioles vertes, glabres, concaves, arron-

dies. La corolle est verte, à quatre pétales ovales, concaves, aigus; les étamines nombreuses; les filaments droits, presque égaux; les anthères à deux loges écarriées entr'elles; un ovaire presque quadrangulaire, surmonté de quatre petits corps sessiles, arrondis, qui sont autant de stigmates. Le fruit n'a pas été observé.

Cet arbre croît dans la Guiane, dans les grandes forêts. Il fleurit au mois de septembre. *Th* (*Descript. ex Aubl.*)

TOURNOULIER. *Touroulia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, qui paroît avoir des rapports avec le *vananea*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, stipulacées, ailées avec une impaire; les folioles décurrentes sur le pétiole; les fleurs disposées en grappes paniculées, terminales; les ramifications opposées, munies de deux bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq dents; cinq pétales; des étamines nombreuses; un style; une baie striée, à deux loges; une semence nue dans chaque loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, turbiné, à cinq dents; les dents un peu arrondies, aigües.

2°. Une corolle composée de cinq pétales concaves, arrondis, ouverts, alternes avec les dents du calice.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filaments sont insérés sur le calice, beaucoup plus courts que la corolle, terminés par des anthères à deux loges divergentes.

4°. Un ovaire adhérent avec le calice; point de style; un stigmate sessile, oblong, strié.

Le fruit est une baie charnue, fortement striée, orbiculaire, comprimée, couronnée par les dents du calice, divisée en deux ou sept loges. Chaque loge renferme une semence oblongue, anguleuse à son côté intérieur, convexe en dehors, revêtue de poils roussâtres.

E S P È C E S.

1. **TOURNOULIER de la Guiane.** *Touroulia guianensis*. Aubl.

Touroulia foliis impari-pinnatis, foliis lanceolatis acuminatis, panicula terminali. (N.)

Touroulia guianensis. Aubl. Griseb. vol. 1. p. 422. tab. 194. — Lam. Illustr. Gen. tab. 414.

Robinia melianthifolia. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 999.

C'est un grand arbre qui s'élève à la hauteur de quarante à cinquante pieds, sur un tronc d'environ deux pieds de diamètre, dont le bois est roussâtre, revêtu d'une écorce épaisse & ridée. De son sommet partent plusieurs longues branches rameuses, étendues en tout sens, les unes droites, les autres horizontales; les rameaux noueux, quadrangulaires, garnis à chaque nœud de deux feuilles opposées, pétioles, ailées avec une impaire, composées d'environ quatre paires de folioles sessiles, opposées, lancéolées, vertes, glabres à leurs deux faces, dentées à leur contour, acuminées à leur sommet, longues de quatre à cinq pouces sur environ un pouce & demi de large, traversées latéralement par des nervures simples, parallèles, qui se terminent au bord des folioles en un petit aigü; le pétiole canaliculé, bordé entre les folioles d'une membrane décurrenente, muni à sa base de deux petites stipules intermédiaires & caduques.

Les fleurs sont presque sessiles, disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes paniculées, amples, étalées, dont les ramifications sont opposées, munies à leur base de deux bractées concaves, courtes, jaunâtres, opposées, aigües, qui se retrouvent également sous le calice. Le calice est d'une seule pièce, de forme conique, divisé à son limbe en cinq petites découpures verdâtres; la corolle jaune, à cinq pétales arrondis, concaves, onguiculés; les étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle. L'ovaire se convertit en une baie couronnée par les divisions du calice, roussâtre, striée, d'une saveur agréable, acidulée, divisée en plusieurs loges (de deux à sept) séparées par des cloisons membraneuses; chaque loge renferme une semence oblongue, comprimée à ses deux faces, revêtue d'un duvet roussâtre.

Cet arbre croît dans la Guiane, dans les forêts désertes, voisines de la rivière de Sinémari. Il fleurit dans le mois de novembre, & fructifie en mai. Les Galibis le nomment *touroulia*. *Th* (*Descript. ex Aubl.*)

TOURETTIE. *Turretia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, personnées, de la famille des bigoniées, qui a des rapports avec les *marynia*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, rampantes ou grimpantes, à feuilles opposées, ternées; les fleurs disposées en épis terminaux, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux lèvres; la lèvre supérieure de la corolle prolongée en capuchon, l'inférieure nulle; quatre étamines adnues; une capsule hérissée à deux valves, à quatre loges.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice tubulé, divisé jusque vers son milieu en deux lèvres; la supérieure plus étroite, acuminée; l'inférieure plus large, à quatre crêtes peu marquées.

2°. Une corolle monopétale, personnée; le tube resserré dans son milieu; le limbe prolongé en une seule lèvre supérieure, courbée vers son sommet en capuchon; deux petites dents à la place de la lèvre inférieure.

3°. Quatre étamines didynames; les filaments placés sous la lèvre supérieure, terminés par des anthères à deux lobes.

4°. Un ovaire ovale, presque cylindrique, surmonté d'un style droit, terminé par un stigmate aigu.

Un réceptacle utéroïde, presque opposé à l'ovaire.

Le fruit est une capsule ovale, coriace, presque ligneuse, hérissée de pointes épineuses, courbées en crochets, à deux valves; une cloison centrale, prismatique, prolongée le long des valves, munie de chaque côté d'une aile qui divise les loges en deux, d'où résultent quatre loges.

Les semences peu nombreuses, comprimées, ovales, en cœur, bordées à leur contour.

Observations. La manie de changer les noms donnés d'abord à des genres nouveaux, & dont j'ai fait voir si souvent l'abus, a occasionné de la confusion pour le genre dont il est ici question. Dombey, qui le premier l'avoit établi, lui avoit donné le nom de *M.* de la Tourrette, naturaliste distingué de Lyon (*Turretia*). M. Lhéritier l'a supprimé pour lui faire porter le nom de son propre créateur (*Dombeya*). Cette dernière dénomination n'a point été admise; mais pour ne point priver les botanistes du plaisir de voir renaître, parmi les belles productions du règne végétal, le nom d'un botaniste célèbre, qui a tant contribué, par ses voyages, à en faire connoître un plus grand nombre, le *Dombeya* a été appliqué à d'autres genres; d'abord à un arbre du Chili par M. de Lamarck (voyez DOMBEY du Chili, vol. 2, pag. 301), ensuite à quelques espèces de *pentapetes* Linn., dont M. Cavanilles a fait un nouveau genre, sous le nom de *Dombeya* (voyez PENTAPETES, vol. 5, pag. 153). C'est ainsi que la maladresse, l'amour-propre ou quelque autre vue particulière hérisse de difficultés une étude aimable en elle-même; c'est ainsi que l'on surcharge la mémoire d'une nomenclature inutile, qui embrouille les idées, & rebute ceux qui desireroient être initiés dans cette science. Je le répète: dès qu'un nom a été donné à un genre nouveau, il doit être

conservé scrupuleusement, quel qu'il soit; & si le genre est reconnu faux, son nom ne doit être employé qu'avec beaucoup de réserve pour un autre genre. Celui dont il est ici question se rapproche des *martynia* par la construction interne des capsules, & du *xanthium* par leur apparence extérieure. Ses fruits & la corolle, dont le limbe n'a qu'une seule lèvre, le distinguent de tous les autres genres de cette famille.

E S P È C E S.

1. TOURETTIE hérissonnée. *Turretia lappacea*.

Turretia foliis oppositis, ternatis; petiolis circrhosis, racemis terminalibus. (N.)

Turretia lappacea. Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 261. — Lam. Ill. Gen. tab. 547. — Juss. Gen. Plant. pag. 139. — Fouger. de Bandar. Act. Acad. Paris. 1784. pag. 200. tab. 1.

Dombeya lappacea. Lhérit. Stirp. Nov. vol. 1, pag. 33. tab. 17. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2, pag. 296.

Turretia volubilis. Gmel. Syst. Nat. vol. 2, pag. 294.

Plante herbacée, à tiges rampantes ou grimpantes, longues de trois à quatre pieds, fistuleuses, tétragones, bisfurquées, rameuses; les rameaux très-ouverts, opposés. Les feuilles sont pétioles, opposées, ternées, à trois folioles glabres, ovales, ziguées à leur sommet, dentées en scie à leur contour; les deux folioles latérales, quelquefois entières, plus souvent divisées en deux autres; les pétioles opposés aux feuilles, forment une vrille rameuse, couronnée.

Les fleurs sont disposées en une grappe droite, simple, presque en épi, terminale, située dans la bifurcation des rameaux, dépourvue de feuilles; les fleurs inférieures médiocrement pédicellées, distantes; les supérieures sessiles, très-rapprochées, dont plusieurs plus grandes, flétries; toutes munies à leur base d'une petite bractée tétaquée. Leur calice est glabre, légèrement cilié sur sa carène; la corolle d'un pourpre-violet; le tube à peine aussi long que le calice, resserré dans son milieu; deux petites dents courtes remplacent la lèvre inférieure; la supérieure presque de la longueur du tube; une capsule ovale, oblongue, pointue, hérissée de pointes épineuses & crochues.

Cette plante croît au Pérou, où elle a été découverte par M. Dombey. O (V. f.)

TOZZIA. *Tozzia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, tubulées, voisin de la famille des lythnaches, qui se rapproche beaucoup des rhinanthacées (Decand.),

qui a des rapports avec les *conoba*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à tige droite, écaillée à sa base, à feuilles opposées, & dont les fleurs sont solitaires, axillaires, pédonculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à cinq dents ; une corolle tubulée ; le limbe à cinq lobes inégaux ; quatre étamines adynamiques ; une capsule bivalve, à une loge monosperme.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice très-court, d'une seule pièce, tubulé, persistant, à cinq dents aiguës.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, presque à deux lèvres ; le tube cylindrique, plus long que le calice ; le limbe divisé en cinq lobes presque égaux, arrondis, deux constituant la lèvre supérieure, & trois la lèvre inférieure.

3°. Quatre étamines adynamiques, dont les filaments sont inégaux, placés sous la lèvre supérieure, terminés par des anthères arrondies, à deux lobes ; l'un des lobes surmonté d'un petit filet fofoyeux.

4°. Un ovaire ovale ; un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate en tête.

Le fruit est une capsule globuleuse, à deux valves, à une seule loge recouverte par le calice, & renfermant une seule semence ovale.

Observations. Ce genre, rangé parmi les lysimachies par M. de Jussieu, en diffère, dit M. Decandolle, par sa fleur irrégulière, à quatre étamines ; par sa capsule monosperme, &c. Son port & son fruit monosperme & bivalve le distinguent des pyrénacées, avec lesquels M. Adanson l'avait réuni. La structure de ses anthères, observée par M. Ramond, le nombre de ses étamines, sa fleur labiée, ses feuilles opposées, ont déterminé M. Decandolle à le placer à la suite des rhinanthacées, dont il diffère par sa capsule uniloculaire & monosperme.

ESPÈCES.

TOZZIA des Alpes. *Tozzia foliis oppositis*. Linn.

Tozzia foliis oppositis, sessilibus, densatis ; floribus solitariis, axillaribus, pedunculatis. (N.)

Tozzia alpina. Linn. Spec. Plan. vol. 2. pag. 844. — Hall. Helv. n°. 298. — Crantz, Austr. pag. 305. — Jacq. Flor. austr. tab. 165. — Lam. Ill. Gen. tab. 122. — Decand. Flor. franç. vol. 3. pag. 487. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 102.

Tozzia alpina, lutea, alcinis folio, radice squamata. Mich. Gen. 20. tab. 16.

Euphrasia lutea, alci-folia, radice squamata. C. Bauh. Pinn. 234, & Prodr. 111. Icon.

Dentaria buguloides, radice globosa ; squamulis myonoides, alpina. Mentz. tab. 9. fig. 3. 4.

Orobancha buguloides, radice rotunda ; squamulis myonoides, alpina. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 12. tab. 16. fig. antepennultima.

Anonyma seu Gregorii, radice dentaria. Col. Ephr. 2. pag. 49. tab. 50.

Ses racines sont ovales, tubéreuses, recouvertes d'écaillés imbriquées à leur collet & à la base de la tige ; celle-ci est droite, foible, glabre, cylindrique, tendre, herbacée, rameuse ; les rameaux opposés, axillaires, garnis de feuilles sessiles, opposées, presque à demi amplexicaules, ovales ou quelquefois un peu arrondies, à peine de la longueur des entre-nœuds, glabres à leurs deux faces, légèrement dentées à leur contour, presque obtuses à leur sommet, marquées de trois à cinq nervures.

Les fleurs sont solitaires, opposées, situées le long des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, formant par leur ensemble un épi lâche & feuillé, supportées par des pédoncules simples, filiformes, glabres, uniflores, ordinairement un peu plus courts que les feuilles. Leur calice est glabre, fort petit, d'une seule pièce, à cinq dents courtes, aiguës ; la corolle jaune, tubulée, presque en forme d'entonnoir irrégulier, petite ; le tube un peu plus long que le calice ; le limbe à cinq lobes arrondis, presque égaux, ouverts, presque à deux lèvres ; les étamines non saillantes ; une capsule fort petite, globuleuse, recouverte par le calice.

Cette plante croît sur les montagnes alpines, dans les Alpes, les Pyrénées, en Autriche, en Italie, dans les bois ombragés, un peu humides ; on la rencontre aussi dans les départements méridionaux de la France, à la Grande-Chartreuse, dans le Jura, &c. & (V. f.)

TRACHANTE (racine). *Radix repens*. On donne ce nom aux racines lorsqu'elles s'étendent horizontalement, & qu'elles poussent des rejets de tous côtés, sans pénétrer profondément dans la terre, comme celle du *panicum dactylon*.

Les tiges portent également le nom de *trachantes* ou de *stolonifères*, lorsque du collet des racines partent des tiges particulières, qui rampent, s'étendent au loin sur la terre, s'y attachent souvent par des troupes de racines, & reproduisent ainsi de nouvelles plantes ; telles sont les tiges du fraiser, *fragaria vesca* Linn.

TRACHÈLE. *Trachelium*. Genre de plantes dicotylédones,

dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, inéquilatérales, de la famille des campanulacées, qui a des rapports avec les *campanula* & les *roella*, & qui comprend des herb. exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, entières, & dont les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, muni de petites bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle en entonnoir ; le limbe à cinq lobes ; cinq étamines ; trois stigmates courts ; une capsule à trois loges.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, divisé à sa partie supérieure en cinq découpures.

2°. Une corolle monopétale, en forme d'entonnoir, dont le tube est très-long, fort menu, cylindrique, évasé en un limbe court, partagé en cinq lobes ovales, ouverts.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont capillaires, point dilatés à leur base, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire adhérent à la partie entière du calice, arrondi, à trois faces, surmonté d'un style filiforme, une fois plus long que la corolle, surmonté de trois stigmates très-courts.

Le fruit est une capsule arrondie, à trois lobes peu marqués, à trois loges, s'ouvrant à la base par trois trous ; elles contiennent des semences nombreuses, fort petites.

Observations. Ce genre diffère des *campanula* & des *roella* en ce que ses filamens ne sont point dilatés en forme d'écaïlle à leur base. Il se distingue des premières par sa corolle en entonnoir & non campanulée ; il s'en rapproche par ses trois stigmates très-courts, réunis en tête ; par ses capsules à trois loges. Il se distingue des *roella* en ce que ceux-ci n'ont que deux stigmates, une capsule à deux loges ; d'où il résulte que les *trachelium* doivent être placés entre ces deux genres, de quels ils se rapprochent encore par leur port.

ESPÈCES.

1. TRACHÈLE bleue. *Trachelium caeruleum*. Linn.

Trachelium ramosum, erectum, foliis ovatis, serratis, planis ; floribus corymbosis. Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 73. n°. 1599. tab. 126.

Trachelium ramosum, erectum, foliis ovatis, serratis, planis. Linn. f. Suppl. pag. 143. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 926. n°. 1. — Gztn. de Frucht. & Sem. vol. 1. pag. 155. tab. 31. fig. 4. — Desfont. Flor. Atlant. vol. 1. pag. 182.

Botanique, Tome VII

Trachelium. Hort. Ups. 41. — Mill. Dict. n°. 1. — Kniph. Cent. 10. n°. 89.

Trachelium foliis ovatis, serratis ; corymbis corymbosis. Virid. Cliff. 17. — Roy. Lugd. Bat. 248.

Trachelium foliis ovatis, serratis ; caule umbellâ terminato. Hort. Cliff. 66.

Valeriana caerulea, arctica folio. Bartel. Icon. 683. 684.

Rapunculus valerianoides, caeruleus. Motif. Oxon. Hill. 2. §. 5. tab. 5. fig. 52.

Cervaria valerianoides, caerulea. C. Bauh. 95.

Trachelium azureum, umbelliferum. Pon. Bald. Ital. 44. — Tournef. Inst. R. Herb. 130.

Trachelium valerianoides, umbelliferum. Dodart, Icones.

Sa racine est tubéreuse, charnue, vivace ; elle pousse des tiges glabres, cylindriques, un peu anguleuses, très-dilées, rameuses à leur partie supérieure, hautes d'un pied & demi ; les rameaux alternes, étalés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, un peu lancéolées, minces, glabres à leurs deux faces, longues d'environ deux pouces, sur un de large, aiguës à leur sommet, irrégulièrement dentées en scie à leur contour, quelquefois accompagnées de quelques petites feuilles dans leurs aisselles ; les pétiolés planes, étroits, de la longueur de la moitié des feuilles.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, de très-beaux corymbes d'un bleu d'azur, épais, touffus ; les principales ramifications simples, alternes, terminées par autant de petits corymbes partiels, garnis de petites bractées très-étroites, linéaires, aiguës. Le calice est glabre, petit ; la corolle bleue, quelquefois blanche, en forme d'entonnoir ; son tube grêle, alongé ; le limbe court, à cinq lobes concaves ; les étamines insérées à la base de la corolle ; le style saillant ; trois stigmates fort petits ; les capsules presque globuleuses, petites, à trois loges ; les semences très-petites, nombreuses, comprimées, glabres, elliptiques, luisantes.

Cette plante croît en Italie, dans la Barbarie & dans le Levant, aux lieux ombragés. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit en juin & juillet. & (V. v.)

2. TRACHÈLE diffuse. *Trachelium diffusum*. Linn. f.

Trachelium ramosissimum, diffusum, ramis divaricatis, recurvis, foliis subulatis. Linn. f. Suppl. pag. 143. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 71. n°. 1601. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 926. n°. 2.

Yyy

Trachelium foliis linearifolulatis, ramis diffusis.
Thunb. Prodr. Flor. cap. pag. 38.

Cette plante est très-reconnoissable par son port. Ses tiges sont chargées de rameaux nombreux, très-diffus, tellement étalés & divariqués, qu'ils se recourbent en dehors. Ils sont garnis de feuilles alternes, linéaires, subulées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été découverte par Thunberg.

3. TRACHÈLE à feuilles menues. *Trachelium tenuifolium*. Linn. f.

Trachelium erectifolium, foliis linearibus, ciliatis, hispida. Linn. f. Suppl. pag. 143. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 73. n°. 1600. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 947. n°. 3. — Thunb. Prodr. Flor. cap. pag. 38.

Nous ignorons si cette plante, ainsi que la précédente, est munie de fleurs semblables à celles du *trachelium caruleum*; si elle a la même disposition. On peut le présumer, Thunberg ne présentant pour caractère distinctif de ces deux espèces, que la forme des feuilles. Celle-ci a des tiges redressées, rameuses, garnies de feuilles alternes, menues, étroites, linéaires, ciliées à leurs bords, hérissées de poils.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

4. TRACHÈLE à feuilles étroites. *Trachelium angustifolium*. Schoub.

Trachelium erectum, foliis linearibus, sessilibus, integerrimis, glabris. Schoub. Maroc. vol. 1. pag. 85. — Pers. Synop. Plant. vol. 1. pag. 195. n°. 3.

On distingue encore cette espèce à la forme de ses feuilles. Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, divisées en rameaux alternes, étalés, garnis de feuilles alternes, sessiles, glabres à leurs deux faces, linéaires, étroites, peu longues, très-entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet. Les fleurs sont terminales, disposées en un corymbe touffu.

Cette plante a été observée, par Schousboue, dans le royaume de Maroc, aux environs de Tetza, aux lieux montagneux & arides.

TRAGIE. *Tragia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des euphorbes, qui a des rapports avec les *acalypha* (ricinelle) & les *eroton*, & qui comprend des herbes ou sous-arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges sont ordinairement grimpantes, les feuilles alternes, stipulacées; les fleurs mâles en épis; les femelles ordinairement solitaires à la base de l'épi ou séparées; toutes munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles, un calice à trois découpures; point de corolle; trois étamines presque sessiles. Dans les fleurs femelles, un calice à cinq découpures; point de corolle; un style; trois stigmates; une capsule à trois coques, à trois semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques; les fleurs mâles & femelles situées sur les mêmes individus.

* Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice à trois découpures planes, ouvertes, ovales, aiguës.

2°. Point de corolle.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont très-courts, terminés par des anières un peu arrondies.

* Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice partagé en cinq découpures très-profondes, ovales, concaves, aiguës, persillantes.

2°. Point de corolle.

4°. Un ovaire uni peu arrondi, marqué de trois sillons, surmonté d'un style court, quelquefois trifide, terminé par trois stigmates divergens.

Le fruit consiste en une capsule à trois coques arrondies, à trois loges, très-souvent hispides; chaque loge munie en dehors & à sa base de deux points; une semence globuleuse dans chaque loge.

Observations. J'ai exposé à l'article RICINELLE (*acalypha*) les causes qui rendoient si difficiles à distinguer les *tragia* des *acalypha*, deux genres très-voisins, & qui ne peuvent être bien observés que sur des individus vivans; encore seroit-il à désirer qu'on pût y trouver des caractères plus constants que ceux qui sont employés pour les distinguer, n'étant la plupart appuyés que sur le nombre des parties de la fructification, variables dans ces deux genres. Cette variété se retrouve également dans les feuilles: il est des espèces qui en offrent de formes différentes. On trouve quelquefois sur le même individu des feuilles ovales ou lancéolées; les unes petites, les autres beaucoup plus grandes, entières ou dentées, glabres ou pubescentes, &c. selon leur âge, leur développement, leur position.

ESPÈCES.

* Tige grimpante.

1. TRAGIE grimpante. *Tragia volubilis*. Linn.

Tragia foliis cordatis, ovatis, acuminatis, ser-

ratia, glabrescens; petiolis ciliatis; foliis caliginis femineis indivisis, hirsutis; caule scandente. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 312. n°. 1.

Tragia foliis cordato-oblongis, caule volubili. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 980. — Lœffling. Iter, pag. 231. — Miller, Dict. n°. 1. — Burm. Flor. ind. pag. 264. — Trew. tab. 15. — Lam. Illustr. Gener. tab. 754. fig. 1.

Tragia scandens, foliis hastatis, serratis, hispides. Brown, Jam. pag. 336.

Tragia alia scandens, urtica folio. Plum. Gener. Amer. pag. 14. & Icon. tab. 252. fig. 2.

Urtica racemosa, scandens, angustifolia, fructu viscoso. Sloan, Jam. pag. 38. Hist. 1. pag. 123. tab. 82. fig. 1. — Rai, Suppl. 105.

Funis urens. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 13. tab. 9.

A. Tragia scandens, longo hestonia folio. Plum. Gen. 14. & Icon. tab. 252. fig. 1.

Ses tiges sont dures, ligneuses, grimpantes; elles s'entortillent autour des arbres ou arbrutes qu'elles rencontrent, & s'élèvent à la hauteur de sept à huit pieds. Leurs rameaux sont alternes, pubescents, cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales ou oblongues, échancrées en cœur à leur base, plus allongées, plus étroites dans la variété 3; rudes, un peu renversées, aiguës ou acuminées à leur sommet, irrégulièrement dentées en scie à leurs bords, parsemées à leurs deux faces de quelques poils rares, piquants, roides & couchés; les pétioles très-velus, d'une grandeur médiocre, munis à leur base de bractées caduques.

Les fleurs sont moniques; les fleurs mâles disposées, dans l'aisselle des feuilles, en un petit épi droit, solitaire, plus court que les feuilles, excepté les dernières feuilles, beaucoup plus petites que les autres. Ces épis sont variétés, composés de fleurs un peu pélicelles, fort petites, munies de petites bractées lancéolées; leur calice à trois découpures aiguës, renfermant trois étamines presque sessiles; les anthères jaunes. A côté des épis mâles, & à leur base, s'élève un pédoncule filiforme, velu, un peu courbé, articulé, simple, de la longueur des épis mâles, supportant une seule fleur femelle, dont le calice est à cinq découpures étroites, aiguës. Les capsules sont composées de trois coques globuleuses, de la grosseur d'un pois, hérissées de poils roides, courts, piquants, chacune d'elles munie à sa base & en dehors de deux points saillants, & contenant une semence arrondie.

Cette plante croît dans les deux Indes, à la Jamaïque, dans les contrées méridionales de l'Amérique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 3 (P. v.)

2. TRAGIE EN CŒUR. *Tragia cordata*. Vahl.

Tragia foliis cordatis, acuminatis, serratis, subius hispides; foliis caliginis femineis pinnatifidis, hirsutis; caule scandente. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 312. n°. 2.

Tragia foliis cordatis, caule volubili, bracteis femineis, pentaphyllis, pinnatifidis. Vahl, Symbol. pag. 76.

Jatropha pungens. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 163. n°. 32.

Cette espèce se rapproche beaucoup du *tragia volubilis* & du *tragia involucreta*; mais dans le premier les feuilles sont grossièrement dentées en scie, & dans le second les feuilles sont acuminées à leurs deux extrémités.

Ses tiges sont ligneuses, grimpantes, hispides; les feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, échancrées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, vertes en dessus, plus pâles & hispides à leur face inférieure. Les fleurs sont disposées en épis terminaux; les folioles calicinales des fleurs femelles pinnatifides, hérissées de poils roides; le fruit est une capsule velue, à trois coques.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. 3

3. TRAGIE À INVOLUCRE. *Tragia involucreta*. Linn.

Tragia hirsuta, foliis sub lanceolatis, serratis; bracteis femineis pentaphyllis, pinnatifidis. (N.)

Tragia foliis hispides, ovatis, acuminatis, serratis; foliis caliginis femineis pinnatifidis, setoso-hispides; caule scandente. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 314. n°. 7.

Tragia bracteis femineis pentaphyllis, pinnatifidis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 980. — Miller, 1) 11. n°. 2. — Jacq. Icon. Rar. tab. 56.

Acalypha involucreis femineis pentaphyllis, pinnatifidis. Flor. zeylan. n°. 440.

Croton foliis ovato lanceolatis, serratis, hispides; caule fruticoso. Royle, Lugd. Bat. 201.

Ricinocarpus zeylanica, hirsuta, foliis lanceolatis, serratis. Burm. Zeylan. pag. 202. tab. 92.

Schorigeram. Rheed. Hort. Malabar. vol. 2. pag. 72. tab. 39. — Rai, Hist. 160.

Urtica frutescens, malabarica, schorigeram dida. Comm. Malabar. 69.

Cette espèce est très-variable dans son port & dans la forme de ses feuilles; on la distingue aux bractées de ses fleurs femelles à cinq folioles pinnatifides. Ses tiges sont droites, à peine grimpantes, presque simples, cylindriques, hispides, quelquefois presque glabres, longues de trois à quatre pieds, garnies de feuilles également his-

Y y y y 2

pides, pétioles, alternes, lancéolées ou ovales-oblongues, acuminées, très-aiguës à leur sommet, dentées en scie à leur contour; les dentelures profondes, inégales, très-aiguës; le pétiole d'une longueur médiocre, presque nul aux feuilles supérieures, accompagnées de petites stipules caduques.

Les fleurs sont monoïques, situées dans les aisselles des feuilles; les fleurs mâles disposées en un épi court, grêle, droit, presque cylindrique; les fleurs femelles foliaires, dans les mêmes aisselles que les fleurs mâles, supportées par un pédoncule simple, unifoire, allongé, velu; la fleur environnée d'un involucre profondément divisé en cinq découpures finement pinnatifides, linéaires, obtuses. Le fruit est une capsule à trois coques arrondies, hispides & monoïpermes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. v.)

4. TRAGIE hispide. *Tragia hispida*.

Tragia foliis cordatis, lanceolatis, acuminatis, subintegerrimis, hispidis; foliolis calicinis femineis pinnatifidis, staphis-hispidis; caule scandente. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 323.

Ses tiges sont grimpantes & hispides, garnies de feuilles médiocrement pétioles, lancéolées, acuminées, échanquées en cœur à leur base, très-entières à leurs bords, quelquefois munies d'une ou de deux dents très-obtuses, longues de deux pouces, hispides à leurs deux faces, particulièrement en dessous; les pétioles très-courts, extrêmement velus. Les fleurs sont disposées en épis axillaires, pédonculés; les calices des fleurs femelles à cinq folioles, presque pinnatifides, couvertes d'un grand nombre de poils blancs & soyeux.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* (*Descript. ex Willd.*)

5. TRAGIE à gros fruit. *Tragia macrocarpa*.

Tragia foliis profundè cordatis, ovatis, acutè dentatis, hispidis; caule scandente. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 320. n°. 4.

Tragia (cordata), scandens, hispida, foliis latioribus, eximie cordatis, acutè dentatis; capsula majusculâ. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 176.

Ses tiges sont firmes, grimpantes, légèrement hispides, garnies de feuilles pétioles, alternes, ovales, profondément échanquées en cœur à leur base, un peu élargies, dentées en scie à leur contour; les dentelures aiguës; les capsules plus grandes que celles des autres espèces de ce genre, à trois coques au moins de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît dans l'Amérique, dans le Kentucky, où elle a été découverte par Michaux.

*** Tige droite, point grimpante.*

6. TRAGIE à feuilles de chataire. *Tragia nepetifolia*. Cavan.

Tragia foliis cordatis, ovatis, serratis; caule erecto, hirsutissimo. Willden. Spec. Plant. vol. 4. pag. 324. n°. 8.

Tragia caule humili, ramis alternis, foliis petiolatis, cordato-oblongis, dentatis. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 37. tab. 557. fig. 1.

Cette espèce est remarquable par la ressemblance de ses feuilles avec celles du *nepeta casaria* Linn. Ses tiges s'élèvent peu; elles sont droites, hérissées de poils rudes & nombreux, chargées d'érauciers alternes, un peu étalés, garnis de feuilles pétioles, alternes, ovales-oblongues, échanquées en cœur à leur base, dentées en scie à leur contour, velues, un peu épaisses. Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles en épis grêles, allongés; les fleurs mâles en occupent presque toute la longueur; les fleurs femelles, très-peu nombreuses, sont presque foliaires à la base du même épi, munies de bractées.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. *O*

7. TRAGIE mercurielle. *Tragia mercurialis*. Linn.

Tragia foliis cordatis, ovatis, acuminatis, serratis; spicis paniculatis, caule erecto. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 324. n°. 10.

Tragia foliis ovatis. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 119. n°. 3. — Flor. zeylan. 334. — Ancen. Académ. vol. 5. pag. 409.

Mercurialis maderaspatensis, tricoceas, acutabulis destituta. Pluken. Aimag. pag. 248. tab. 205. fig. 4.

Pec-cupameni. Rheed. Hort. Malab. vol. 10. tab. 82. — Rai, Suppl. 205.

p. Croton foliis cordatis, serratis, petiolatis; floribus spicatis. Gronov. Virgini. 155.

Manihot minima, chamærifolia. Plum. Spec. 10. & Icon. tab. 172. fig. 2.

Urtica minor, iners, spicata, folio subrotundo-serratis, fructu tricoeco. Sloan, Jam. 38. Hist. 1. pag. 125. tab. 82. fig. 3.

y. Tragia (urticæfolia), erecta, caule hirsutissimo, foliis cordato-ovalibus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 176. ?

Tragia (urticæfolia), foliis cordatis, ovatis, serratis; caule erecto, hirsutissimo. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 324. n°. 9.

Cette plante ressemble tellement à la mercurielle commune, qu'on pourroit presque s'y tromper.

Ses tiges sont nombreuses, diffuses, presque glabres, striées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, en cœur, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, obtuses à leur sommet, vertes, tendres; les pétioles grêles, un peu plus courts que les feuilles. Les fleurs sont disposées en grappes filiformes, plus longues que les feuilles situées dans leurs aisselles, munies de bractées ovales, à dentelures profondes, aiguës, quelquefois presque palmées; les fleurs mâles assez nombreuses, situées à la partie supérieure des épis; les fleurs femelles, en très-petit nombre, à la base des mêmes épis; les capsules petites, globuleuses, pubescentes, verdâtres.

Cette plante croît à la Jamaïque. (*V. f. in herb. Lam.*)

8. TRAGIE corniculée. *Tragia corniculata*. Vahl.

Tragia foliis ovatis, acuminatis, subintegerrimis; capsularum valvulis bicornibus; caule erecto, piloso, ramofo. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 325.

Tragia foliis subcordato-ovatis, attenuatis, subintegerrimis; valvulis capsularum bicornibus. Vahl, Egl. 2. pag. 55.

Ses tiges sont herbacées, droites, rameuses, pileuses, garnies de feuilles alternes, ovales, acuminées, très-entières, quelquefois munies d'une ou de deux dents vers leur base, traversées par des veines pubescentes. Les fleurs sont disposées en épis axillaires; les capsules comprimées à leurs deux faces, les valves munies de deux cornes tant en dessus qu'en dessous.

Cette plante croît à l'île de la Trinité & à la Guiane. (*V. f. in herb. Lam.*)

9. TRAGIE à feuilles colorées. *Tragia colorata*.

Tragia foliis lanceolatis, subintegris, obtusis, margine & nervis rubro-purpurascentibus. (N.)

Gogana seu vallis-vara. Rheed. Malab. vol. 12. pag. 59 tab. 30. : (*Folii acutis.*)

g. Eadem, foliis minoribus; stipulis minimis, rotundatis.

Cette plante a de très-grands rapports avec la figure que j'ai citée de l'ouvrage de Rheed; mais les feuilles y sont représentées aiguës: les échantillons que j'ai observés dans l'herbier de M. de Lamarck ont tous les feuilles obtuses.

Les rameaux sont ligneux, glabres, cylindriques, d'un brun-foncé, garnis de feuilles alternes, lancéolées, médiocrement pétiolées, longues de trois pouces & plus, larges d'un pouce, arrondies,

presque tronquées, & un peu échancrées en cœur à leur base, élargies vers leur partie supérieure, obtuses à leur sommet, épaisses, coriaces, glabres à leurs deux faces, entières, quelques-unes dentées en scie à leur contour, marquées en dessous de nervures & de veines très-fines, souvent purpurines; le bord des feuilles ordinairement d'un rouge lie de vin; le pétiole très-court. Les fleurs sont axillaires, disposées en grappes ou en une sorte de chaton cylindrique, serré, à peine pédoncule, au moins de moitié plus court que les feuilles.

La plante se constituerait peut-être une espèce si elle étoit mieux connue; elle offre les mêmes caractères que la précédente, mais ses feuilles sont deux fois plus petites: leur pétiole est accompagné à sa base d'une très-petite stipule arrondie, que je n'ai point observée dans la première plante, peut-être parce qu'elle étoit tombée: je n'ai point vu les fleurs femelles.

Cette plante croît dans les Indes orientales, & à l'île de France, où elle a été recueillie par Comerson. h (*V. f. in herb. Lam.*)

10. TRAGIE bordée. *Tragia marginata*.

Tragia foliis lanceolato-ovatis, dentatis, utrinque pubescentibus, acutis, albo-marginatis; spicis axillaribus, subsessilibus. (N.)

Cette espèce se rapproche beaucoup du *Tragia colorata* par son port; mais les feuilles sont plus grandes, plus ovales, pubescentes à leurs deux faces.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, glabres, un peu pubescents sur les jeunes pousses, striés, cendres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, très-variables dans leur grandeur, lancéolées, un peu ovales, longues de deux à six pouces & plus, sur un demi-pouce & trois pouces de large, épaisses, coriaces, d'un vert-pâle, luisantes à leur face supérieure, d'un gris cendré & pubescentes en dessous, & même à leurs deux faces dans leur jeunesse, dentées en scie à leurs bords, acuminées à leur sommet, entourées la plupart d'une bordure blanchâtre, traversées par des nervures simples, alternes, & par des veines lâchement réticulées, saillantes, velues; les pétioles longs d'environ un pouce, un peu pubescents, roides, striés; les fleurs disposées en épis alternes, axillaires, presque sessiles, cylindriques, plus courts que les feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales. h (*V. f. in herb. Lam.*)

11. TRAGIE réticulée. *Tragia reticulata*.

Tragia foliis ovatis, obtusis, glabris, crenatis, subius argute venoso-reticulatis; caule fruticoso. (N.)

Ses rameaux sont ligneux, cylindriques, glabres, d'un brun-cendré, un peu lisses, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, obtuses à leur sommet, longues d'un pouce & plus, crenelées à leurs bords, glabres à leurs deux faces, arrondies à leur base, un peu minces, lisses en dessus, munies en dessous de nervures fines, lâches, alternes, & de veines très-fines, réticulées; les pétioles cylindriques, filiformes, longs de trois à quatre lignes; les fleurs disposées en épis grêles, presque cylindriques, pédonculées, un peu pubescentes, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, plus longues que les feuilles lorsqu'elles sont dans leur entier développement.

Cette plante a été recueillie à l'Île-de-Bourbon par Commerçon. h (V. f. in herb. Lam.)

12. TRAGIE piquante. *Tragia urens*. Linn.

Tragia foliis lanceolatis, sessilibus, obtusis, apice fuscidentatis, caulibus erectis, ramosis, pubescentibus. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 525. n°. 12.

Tragia erecta, caule minutissimè puberulo; foliis sessilibus, ovali-lanceolatis linearibusve, rariter dentatis; capsulis hirsutulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 175.

Tragia foliis lanceolatis, obtusis, subdentatis. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 120. n°. 4.

Var. *a.* — *subovalis, foliis oblongo-ovalibus, nonnullis subcuneatis.* Mich. l. c.

Ricinus parvus, urens, foliis quercinis, virginianus. Pluk. Almag. pag. 3. o. tab. 107. fig. 5.

b. — *lanceolata, foliis lanceolatis, subdentatis integrif.* Mich. l. c.

Tragia (innocua), foliis lanceolatis, subdentatis, pilosis, spica terminali. Walter. Flor. carol. p. 229.

y. — *linearis, foliis linearibus, serè omnibus integris.* Mich. l. c.

Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses, presque glabres; les rameaux alternes, légèrement pubescentes, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, principalement les supérieures, très-variées dans leur forme, ovales-lancéolées ou linéaires, parsemées de poils rares & piquans, lâchement dentées à leur contour, obtuses à leur sommet, quelques-unes aiguës. Dans la variété *a*, ces feuilles sont oblongues-ovales, quelques-unes rétrécies en coin à leur base; elles sont lancéolées, à peine dentées, presque entières, pileuses dans la plante *b*, dont Walpæus avoit fait une espèce, & que Michaux regarde comme une variété; enfin, dans la plante *y*, les feuilles sont linéaires, presque toutes entières.

Les fleurs sont placées dans l'aisselle des feuilles supérieures, disposées en épis très-grêles, presque

filiformes, ordinairement plus longs que les feuilles; les fleurs mâles fort petites, nombreuses, à peine pédonculées, un peu verdâtres; leur calice à trois découpures profondes, aiguës; les fleurs femelles foliaires, pédonculées; elles produisent une capsule à trois coques, de la grosseur d'un grain de poivre, d'un jaune un peu verdâtre, à peine velues.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, dans la Caroline, la Nouvelle-Géorgie, &c. (V. f.)

13. TRAGIE charmée. *Tragia chamaea*. Linn.

Tragia foliis linearilanceolatis, integerrimis, obtusis; fructibus echinatis. (N.)

Tragia foliis lanceolatis, obtusis, integerrimis. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 120. — Flor. zeyl. n°. 335.

Tragia foliis linearilanceolatis, petiolatis, obtusis, mucronatis; caule ramoso, diffuso; capsularum valvulis dorso denticulatis. Willd. Sp. c. Plant. vol. 4. pag. 326. n°. 13.

Chamaea foliis linearibus, fuscis spicatis, echinato fructu. Burm. Zeyl. pag. 59. tab. 25.

Codi avanaçu. Rheed. Hort. Malab. vol. 2. pag. 63. tab. 34.

Lathyrus frutescens, fructu in foliorum alis echinato. Rai, Hill. 1710.

Tithymalus tenuifolius, aquaticus, foliis raris. Burm. Zeyl. pag. 225, & Flor. Ind. 205.

Tithymalus tenellus, indicus, foliis linearis raris. Hem. Zeyl. pag. 33.

Ses tiges sont grêles, droites, glabres, divisées en longs rameaux redressés, ligneux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, étroites, linéaires-lancéolées, entières à leurs bords ou à peine sensiblement denticulées, obtuses à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, longues de deux ou trois pouces, larges à peine de trois ou quatre lignes, quelquefois plus grandes, soutenues par des pétioles d'environ deux tiers plus courts.

Les fleurs mâles sont disposées dans l'aisselle des feuilles en un petit épi court, un peu étroit, garni de bractées fort petites, caduques. Les fleurs femelles sont placées les unes dans l'inflexion des rameaux sur les tiges, d'autres dans les aisselles des feuilles à l'extrémité d'un pédoncule simple, filiforme, un peu plus long que les pétioles, terminé par une seule fleur dépourvue de bractées. Le fruit est composé de trois coques hérissées de petites pointes épineuses; elles renferment trois semences oblongues, cendrées, foliaires dans chaque loge.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à l'île de Ceylan. *h*

14. TRAGIE à feuilles de chanvre. *Tragia cannabinina*. Linn. f.

Tragia foliis profundè trilobis, dentatis; lobo intermedio elongato, caule erecto. Willd. Spec. Plant. vol. 4. pag. 326. n°. 14.

Tragia foliis tripartitis. Linn. f. Suppl. pag. 415.

Croton (hastatum), foliis trilobis-hastatis, lanceolatis, dentatis. — Syll. veget. edit. 13. pag. 722. — Burm. Flor. Ind. pag. 305. tab. 63. fig. 2. — Pluk. Almag. pag. 320. tab. 220. fig. 2.

Croton (urens), foliis ternatis, ferratis, lanceolatis. Syll. veget. edit. 13. pag. 722.

Ricinus urens, cannabis foliis, triphyllis. Pluk. Phytogr. 120. fig. 6.

Linné fils a cru devoir réunir ces deux espèces de *croton*, qu'il a reconnues appartenir aux *tragia*, & qui sont à peine de simples variétés l'une de l'autre. Les tiges de cette plante sont droites, hispides, cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétioles, hispides, divisées presque comme celles du chanvre, en trois découpures lancéolées, sinuées à leur contour; les pétioles accompagnés à leur base de deux bractées courtes, lancéolées. Les fleurs femelles se divisent en six folioles pectinées; elles sont supportées par un pédoncule simple, latéral, solitaire, uniflore, de la longueur des feuilles.

Cette plante croît au Malabar. (*Descript. ex Linn. f.*)

15. TRAGIE en baguettes. *Tragia virgata*.

Tragia foliis subpetiolatis, ovato-lanceolatis, subacutis, obtusè ferratis; glabris; ramis virgatis, alternis, supremis trifidulatis. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 764. fig. 2.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de six pieds & plus, sur une tige grêle, cylindrique, divisée en rameaux alternes, grêles, élancés, très-glabres; les supérieurs opposés, quelquefois faiculés, munis à leur base de petites stipules courtes, membraneuses, terminées par un filet sétacé. Les feuilles sont alternes, médiocrement pétioles, ovales-lancéolées, les unes aiguës, d'autres très-obtusées, glabres à leurs deux faces, dentées, presque crénelées à leur contour; les dentelures obtuses; les pétioles à peine longs d'une ligne. Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles en grappes très-grêles, plus longues que les feuilles.

Le lieu natal de cette plante ne nous est pas connu. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

16. TRAGIE filiforme. *Tragia filiformis*.

Tragia foliis ovato-lanceolatis, laxè dentatis, glabris, mucronatis; spicis filiformibus, bracteatis maximis. (N.)

Elle se rapproche beaucoup des *acutylpha* par ses grandes bractées. Ses rameaux sont glabres, ligneux, cylindriques, striés, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales-lancéolées, minces, longues d'un à deux pouces, glabres à leurs deux faces, d'un vert tendre, mucronées & obtusées à leur sommet, lâchement dentées en scie à leur contour, à peine nerveuses; les pétioles presque capillaires, glabres, longs d'un demi-pouce, accompagnés à leur base de bractées sétacées.

Les fleurs sont latérales, axillaires, disposées en longs épis très-grêles, filiformes; les fleurs mâles verdâtres, fort petites, sessiles; les femelles distantes des mâles, occupant la partie inférieure de l'épi, solitaires, munies de bractées foliacées, fort grandes, presque arrondies, glabres, légèrement crénelées, surtout à leur sommet.

Le lieu natal de cette plante ne m'est pas connu. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

* Espèces moins connues.

* *Tragia (villosa), foliis cordatis, villosis, subsistis hispatis; caule scandente*. Thunb. Prodr. p. 14.

Ses tiges sont grimpantes, garnies de feuilles pétioles, alternes, échancrées en cœur à leur base, velues à leurs deux faces, hérissées en dessous de poils plus nombreux. Cette espèce croît au Cap de Bonne-Espérance.

Tragia (capensis), foliis cordato-ovatis, dentatis, hispatis; caule volubili, involucrio pectinato. Thunb. Prodr. pag. 14.

Cette plante, ainsi que la précédente, a été découverte par Thunberg au Cap de Bonne-Espérance. Ses tiges sont grimpantes, garnies de feuilles pétioles, alternes, ovales, échancrées en cœur à leur base, hispides; l'involucre des fleurs femelles est composé de folioles pectinées.

TRALLIANE. *Tralliana*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont grimpantes, les feuilles simples, alternes; les fleurs disposées en grappes latérales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice inférieur à cinq découpures; cinq pétales réfléchis; cinq étamines; un appendice inférieur, à dix dents; un style; une baie à deux loges, à deux semences.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* inférieur, persistant, divisé en cinq découpures courtes, arrondies.

2°. Une *corolle* composée de cinq pétales oblongs, ouverts, réfléchiés en dehors, plus longs que le calice.

Un *appendice* intérieur, grand, droit, à dix crénelures.

3°. Cinq *étamines*, dont les filamens sont courts, insérés sur le réceptacle, supportant des anthères à deux loges, presque rondes.

4°. Un *ovaire* presque rond, supérieur, surmonté d'un style aussi long que les étamines, terminé par un stigmate (point observé).

Le *fruit* est une baie arrondie, à deux loges, à deux semences arrondies extérieurement, anguleuses à leur face intérieure.

Observations. Ce genre porte le nom d'un an-

cien médecin, Alexandre Trallien, de l'Asie-Mineure.

E S P È C E.

TRALLIENE grimpante. *Tralliana scandens*, Lour.

Tralliana foliis cordatis, crenatis; flore dichotomo. Lour. Flor. cochinch. pag. 195.

Cette plante pousse des mêmes racines plusieurs tiges glabres, ligneuses, très longues, dépourvues d'épines, rameuses, grimpantes; les rameaux nombreux, géniculés, garnis de feuilles alternes, en forme de cœur, un peu arrondies, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet. Les fleurs sont d'un blanc-verdâtre, disposées en grappes latérales, dichotomes, &c dont le pédoncule commun est fort long.

Cette plante est commune à la Cochinchine; elle s'entortille autour des arbres &c des autres plantes qui l'avoiinent. h (*Descript. ex Lour.*)

Fin du tome VII.

646276



T A B L E

Des noms latins des genres de Plantes, contenus dans ce Volume.

<i>A</i> <i>Asonia</i> , <i>Anguillaria</i> ,	A. voyez Tamboul. Tinellier.	<i>Scotia</i> , <i>Scrophularia</i> , <i>Scutellaria</i> , <i>Scyphophorus</i> ,	voyez Scotie. Scrophulaire. Toque. Scyphophore.
<i>Backea</i> , <i>Banum</i> ,	B. Tiongine. Terre-noix.	<i>Secale</i> , <i>Sechium</i> , <i>Securidaca</i> , <i>Securinea</i> ,	Seigle. Sechi. Securidaca. Thésé.
<i>Calendula</i> , <i>Cordia</i> , <i>Cordilocarpus</i> , <i>Cratava</i> , <i>Crotonopsis</i> , <i>Cyperus</i> ,	C. Souci. Sébastier. Sinapi. Tapier. Seratone. Souchet.	<i>Silguera</i> , <i>Schima</i> , <i>Selago</i> , <i>Selinum</i> , <i>Senebiera</i> , <i>Senecio</i> , <i>Senra</i> ,	Seguier. Schime. Selagine. Selin. Senebrière. Seneçon. Senrée.
<i>Datura</i> , <i>Dillenia</i> ,	D. Stramoine. Sialite.	<i>Sepias</i> , <i>Seriola</i> , <i>Serissa</i> , <i>Serpicula</i> ,	Septade. Sériole. Sériffe. Serpicule.
<i>Glechoma</i> ,	G. Tertrette.	<i>Sesamum</i> , <i>Sesban</i> ,	Sésame. Sesbane.
<i>Philadelphus</i> ,	P. Sringa.	<i>Siseli</i> , <i>Sisteria</i> , <i>Sissea</i> ,	Seseli. Sestère. Sessée.
<i>Rhus</i> ,	R. Sumac.	<i>Sesuvium</i> , <i>Shawia</i> , <i>Sheffieldia</i> ,	Sésuve. Shawia. Sheffieldie.
<i>Salfola</i> , <i>Sambucus</i> , <i>Scavola</i> , <i>Scleria</i> , <i>Sclerocarpus</i> , <i>Sclerosium</i> , <i>Scolopia</i> , <i>Scolofanthus</i> , <i>Scolymus</i> , <i>Scoparia</i> , <i>Scopolia</i> , <i>Scorzonera</i> ,	S. Soude. Sureau. Sévole. Sclérie. Sclérocarme. Sclérote. Scolopier. Scolofanthe. Scolyme. Scopaire. Scopolier. Scorzonère.	<i>Sibbaldia</i> , <i>Sibthorxia</i> , <i>Sicyos</i> , <i>Sigesbeckia</i> , <i>Silene</i> , <i>Silphium</i> , <i>Sinapis</i> , <i>Simulata</i> , <i>Simira</i> , <i>Singana</i> , <i>Sipanea</i> , <i>Siparuna</i> , <i>Siphonanthus</i> ,	Sibbalde. Sibthorpe. Siciote. Sigesbèque. Silené. Silphie. Simabe. Simbulète. Simire. Singane. Sipane. Siparounier. Siphonanthé.

Botanique. Tome VII.

Sisymbrium,
Skimmia,
Smithia,
Solandra,
Soldanella,
Sophora,
Soramia,
Sorbus,
Spandunea,
Sparganophorus,
Sparmannia,
Spathelia,
Spergula,
Spergularium,
Spermocoe,
Sphagnum,
Spharia,
Spheranthus,
Spelmania,
Spigelia,
Spilanthus,
Spinifex,
Spiraea,
Splacnum,
Staavia,
Stachys,
Stadmannia,
Stapelia,
Staphylea,
Starkea,
Statice,
Stake,
Stahelina,
Stellaria,
Stelis,
Stellera,
Stemodia,
Stemonitis,
Stephania,
Sterculia,
Stereosylon,
Steripha,
Steris,
Stevensia,
Stewartia,
Stilbum,

voyez Sisymbre.
 Skimmie.
 Smithie.
 Solandre.
 Soldanelle.
 Sophora.
 Soramie.
 Sorbier.
 Spandunea.
 Sparganophore.
 Sparmane.
 Spathelier.
 Spargoutie.
 Spargoutine.
 Spermococé.
 Sphaigne.
 Sphérie.
 Sphérante.
 Spilmane.
 Spigée.
 Spilante.
 Spinelle.
 Spirée.
 Splanc.
 Staavia.
 Stachide.
 Stadmane.
 Stapèle.
 Staphylit.
 Starkia.
 Statice.
 Strébé.
 Sarrète.
 Stellaire.
 Stélide.
 Stellaire.
 Stemodia.
 Stémonite.
 Stéphanie.
 Sterculier.
 Stéréoxylone.
 Stériphe.
 Stétis.
 Stevensia.
 Stewarte.
 Stilbe.

Stilbosporum,
Stillingia,
Stipa,
Stipulicida,
Stobea,
Stratiotes,
Streptaria,
Streptopus,
Strigilia,
Strophanthus,
Struchium,
Strumaria,
Strumphia,
Struthiola,
Stylosanthes,
Styphelia,
Subularia,
Swerbia,
Suffrenia,
Suillus,
Suriana,
Symphonia,
Symplocos,

voyez Stilbospore.
 Stillingue.
 Stipe.
 Stipulicide.
 Stobée.
 Stratiote.
 Stréltiz.
 Streptote.
 Strigilie.
 Strophante.
 Struchium.
 Strumaire.
 Strumphia.
 Struthiole.
 Stylosanthe.
 Styphélie.
 Sabulaire.
 Suerce.
 Suffrénie.
 Suille.
 Suriane.
 Symphonia.
 Symploque.

T.

Tabernamontana,
Tacca,
Tachi,
Tachibota,
Tachigali,
Tacsonia,
Tagetes,
Talauma,
Taligala,
Talinum,
Talissa,
Tamarindus,
Tamarix,
Tamonea,
Tampona,
Tanacetum,
Tanacium,
Tanibouca,
Tapiria,
Tapogomea,
Tapura,

Taberne.
 Tacca.
 Tachi.
 Tachibote.
 Tachigale.
 Tacfone.
 Tagète.
 Talauma.
 Taligale.
 Talin.
 Talifier.
 Tamarinier.
 Tamarix.
 Tamonée.
 Tampona.
 Tanaïse.
 Tanacium.
 Taniboucier.
 Tapirie.
 Tapogome.
 Tapure.

<i>Taralea</i> ,	voyez Taralea.	<i>Thymbra</i> ,	voyez Thymbra.
<i>Tarconanthus</i> ,	Tarconante.	<i>Thymus</i> ,	Thym.
<i>Targionia</i> ,	Targione.	<i>Thysanus</i> ,	Thysanos.
<i>Tariri</i> ,	Tariri.	<i>Tiarella</i> ,	Tiarelle.
<i>Telephium</i> ,	Téléphe.	<i>Ticorea</i> ,	Ticorée.
<i>Temus</i> ,	Temo.	<i>Tigarea</i> ,	Tigaré.
<i>Ternstromia</i> ,	Ternstrome.	<i>Tilia</i> ,	Tilleul.
<i>Tetracera</i> ,	Tétracera.	<i>Tillandsia</i> ,	Tillande.
<i>Tetradium</i> ,	Tétradium.	<i>Tillia</i> ,	Tillée.
<i>Tetragonia</i> ,	Tétragonie.	<i>Tinus</i> ,	Tinier.
<i>Tetranthus</i> ,	Tétranthe.	<i>Tithonia</i> ,	Tithonie.
<i>Tetrapilus</i> ,	Tétrapile.	<i>Tocoyena</i> ,	Tocoyène.
<i>Tetrapogon</i> ,	Tétrapogone.	<i>Toddalia</i> ,	Toddali.
<i>Tetratheca</i> ,	Tétratheca.	<i>Tolpis</i> ,	Tolpis.
<i>Thalia</i> ,	Thalie.	<i>Toluisfera</i> ,	Tolur.
<i>Thapsia</i> ,	Thapsie.	<i>Tomex</i> ,	Tomé.
<i>Thea</i> ,	Thé.	<i>Tonina</i> ,	Tonine.
<i>Theca</i> ,	Teck.	<i>Tontanea</i> ,	Tontane.
<i>Thelobolus</i> ,	Thélébole.	<i>Tontelea</i> ,	Tontel.
<i>Thelophora</i> ,	Théléphore.	<i>Topobea</i> ,	Topobé.
<i>Theligonum</i> ,	Théligone.	<i>Tordylium</i> ,	Tordyle.
<i>Thelimitra</i> ,	Thélimitra.	<i>Torenia</i> ,	Torène.
<i>Themeda</i> ,	Théméda.	<i>Tormentilla</i> ,	Tormentille.
<i>Thesium</i> ,	Thésion.	<i>Tortula</i> ,	Tortule.
<i>Thilachium</i> ,	Thilaqui.	<i>Toulicia</i> ,	Toulicia.
<i>Thlaspi</i> ,	Tabouret.	<i>Tounatea</i> ,	Tounate.
<i>Thoa</i> ,	Thoa.	<i>Tovomita</i> ,	Tovomite.
<i>Thouinia</i> ,	Thouinia.	<i>Touroulia</i> ,	Touroulier.
<i>Thrinax</i> ,	Thrinace.	<i>Tozzia</i> ,	Tozzia.
<i>Thryxpermum</i> ,	Thrixperme.	<i>Turretia</i> ,	Tourretie.
<i>Thryallis</i> ,	Thryallis.	<i>Tachellum</i> ,	Trachèle.
<i>Thunbergia</i> ,	Thunbergia.	<i>Tragia</i> ,	Tragie.
<i>Thuaerea</i> ,	Thouarfe.	<i>Tralliana</i> ,	Tralliane.
<i>Thuraria</i> ,	Thuraria.		
<i>Thuya</i> ,	Thuya.	<i>Weinmannia</i> ,	

W.

Tanrouge.

Fin de la Table du tome VII.



